









THE SAURUS  
MEDICINÆ  
PRACTICÆ  
THOMÆ BURNET.



THESE  
MEDICAL  
PRACTICE  
THOMAS BURNET.



# THE SAURUS MEDICINÆ PRACTICÆ

Ex Præstantissimorum Medicorum Observationibus, Consultationibus,  
Consiiliis, & Epistolis, summa diligentia collectus, ordine  
Alphabetico dispositus, & in octodecim Libros divisus.

AUCTORE

THOMAS BURNET 51632

Scoto-Britanno, Med. Doct. & Medico Regis Ord.

EDITIO NOVISSIMA,

Pluribus ipsius Auctoris Additamentis, aliis omnibus  
hactenus vulgatis, longè auctior.

CUI DENIQUE ACCEDIT

HIPPOCRATES CONTRACTUS

In quo Magni Hippocratis Medicorum Principis Opera omnia, in brevem  
Epitomen summa diligentia, ab eodem Auctore habentur redacta.

*Cum Indicibus Sectionum & Auctorum.*



VENETIIS, MDCCXXXIII.

APUD HIERONYMUM SAVIONI.

SUPERIORUM PERMISSU AC PRIVILEGIO.



THESE  
MEDICAL  
PRACTICE

BY  
THOMAS BURNET

OF  
THE  
FACULTY OF  
PHYSIC  
IN  
THE  
UNIVERSITY OF  
EDINBURGH  
BY  
JAMES  
WATSON  
OF  
THE  
FACULTY OF  
PHYSIC  
IN  
THE  
UNIVERSITY OF  
EDINBURGH  
BY  
JAMES  
WATSON  
OF  
THE  
FACULTY OF  
PHYSIC  
IN  
THE  
UNIVERSITY OF  
EDINBURGH




61-1780

VENIET  
MDCCLXXIII



# PRÆFATIO AD LECTOREM.



Nihil Hominibus (Lector Penevole) datum est, aut dari potest, in hoc mundi Theatro degentibus, Sanitate, vel utilius, vel pretiosius. Hæc sola, inter omnia scilicet Dei Opt. Max. naturalia dona, ut acquiratur, nostrum præcipuè meretur studium, quippe quæ Divitiis, Honoribus, Voluptatibus, imò Scientiæ ipsi, & Prudentiæ longè præferenda videtur. Sine hac nemo usque adeò felix minimè sapit vita, reliqua plus Aloes quam mellis habent. Quis enim ea privatus, licet aliàs omnibus Animi ac Fortunæ bonis quam maximè afflueret, non statim millies potius optaret mori, quàm languescens morborumque ferocium quotidie insultantium vehementia oppressus, miseram in multos annos protrahere vitam; at illa, tanquàm itineris suavissima Duce, perpetuum comitatus placidè fert quivis quascunque hujus brevis vitæ laboriosas Ærumnas. Ita verissimum est, quam benè valere melius in vita nihil. Hanc vero nobis felicitatem votis quidem omnibus expetendam promittit simul & præstat, præclarum Dei munus, medendi facultas, quæ vel propterea, ut in summo honore atque pretio ubique habeatur, jure meritò postulat. Vix certe dici potest, quàm misera foret, & miseranda Mortalium conditio, nisi quotidianis ipsorum ærumnis continuò subveniret salutaris hæc Disciplina, ejusque cultor industrius Medicus; qui id unice agit, sollicitèque curat, ut prosperam valetudinem sartam tectam tueatur & conservet, amissamque citò, tutò, & jucundè restituat. Ob quæ ægregia indies in genus humanum collata beneficia, Antiqui pene omnes, Medicos tanquam aliis multis meritò anteponendos, laudibus immensis ferebant ad Cælum, & ipsorum plurimis divinos plane decernebant Honores. Quod Ethnicorum hominum factum, cum Superstitiosi nimium, veri Dei nescii, Idolorumque cultores fuerint, laudare equidem nequeo, imò è contra vitupero & abominor: quid ni tamen affectum & judicium approbem? quippe qui hoc ipso omnibus testatum volebant, quàm rectè senserint, docto Medico, multum celeri, atque fideli nullum meritis satis dignum præmium persolvi posse. Sicut enim (ait *Seneca*) Medicinæ apud ægros usus, etiam apud sanos honos est. Ingratitudine ergo ipsa ingrator videtur, & ipsa prope vita indignus, qui Medicinam Artium Nobilissimam, alteram, secundum Deum, vitæ Parentem, Tutricem & Vindicem non amat, non honorat, non suspicit & veneratur; præsertim cum ejus adminiculo & præsidiiis nunquam ulli non sit opus. Hanc autem Artem sæpius laudatam, satis pro dignitate nunquam, quæ *Plutarcho* Auctore, nulli, Liberalium nitore, copia, aut jucunditate cedit, Cedro haud indignis eruditissimis scriptis exornarunt plurimi omni ævo præstantissimi viri; qui in ea excolenda tam fortiter feliciterque defudarunt, ut nihil jam amplius desiderari possit. Sed cum varia sint ac diversa hominum ingenia nec voto fere vivatur uno, nil mirum eandem omnes, in Medicina, illu-



illustranda, non tenuisse viam. Quibusdam magis placuit Institutiones & Controversias Medicas doctè pulchrèque exarando, immortale sibi & duraturum comparare nomen. Alios plus delectavit *Hippocratem*, & *Galenum*, summos illos Medicinæ Antistites, Commentariis, Notis atque Scholiis, mira ingenii dexteritate adjectis, eleganter enucleare dilucidare & explicare. Non pauci porrò potiùs doctissimis in lucem editis medendi methodis, & medicinis practicis, tam universalibus, quàm particularibus, famæ suæ consulere maluerunt. Aliqui rursus in Chirurgia expolienda, alii in Materia Medica locupletanda, & Pharmacopœis, tam Chymicis, quàm Dogmaticis instruendis, quidam item in rebus Anatomicis, & Anthropologiis describendis, vel consenuisse amarunt. Multis denique iisque minimè contemnendis plus cordi fuit, magisque arrisit utilissimum illud per Observationes, Consultationes, & Consilia, Scriptionis genus. In tanta hac eximiorum ingeniorum varietate, doctorum virorum suffragiis, abundè jam ratum atque confirmatum habetur, excellentes hos, quos ultimo loco posui, artisque usu celeberrimos Authores, præ cæteris quibuscunque longè maxima laude dignos censendos, ac ob summam, ex tali scribendi modo, perceptam utilitatem, de genere humano quàm optimè meritos; adeò quidem, ut rectè videantur omnibus præripuisse palmam. Singulari etenim hoc artificio, id Artem hanc jucundissimam exercentibus, facillimum effectum, quod in ea omnium semper difficillimum judicatum est, universalia nimirum præcepta dextrè appositeque particularibus applicare. Longum quippe est (ut ait eleganter nec minùs verissime Morum incomparabilis Præceptor, *Anneus Seneca*) ad Scientiam, vel Artem, iter per Præcepta, breve & efficax per exempla: nullaque re nos magis quàm exemplo doceri, alicubi etiam annotavit, trium Imperatorum Medicus doctissimus, *Crato*. Hanc proinde præcipue ob causam, mihi semper mirum in modum placuerunt Observationes, & Consilia Medicorum illustrium, majoremque ex assidua horum lectione, quam Practicorum Libris, sperari posse Medicinæ Candidatis, profectum haud male fortassis huc usque existimavi. Nihil enim iis, ad rectum aut faciliorem Artis usus utilius, vel conducibilius hætenus excogitari potuit. Ita ut verè quis audeat affirmare, absque experientia, & observatione (quibus tanquam fulcis Medicinam stabiliri noster sæpe testatur *Galenus*) methodum universalem probatum, ut decet, expertumque Artificem efficere non posse. Hinc luce meridiana clariùs videtur hoc summè utile scribendi genus aliis omnibus plurimùm antecellere. Quæcunque enim ad actionem referuntur eadem semper optima esse oportet. Neutiquam ergo mirandum, si verbis satis exprimi nequeat, quam grande illi & immensum præsentibus, posterisque contulere beneficium, qui in observationibus super difficillimis casibus conscribendis, felicissimè, simul & doctissimè tam strenuam navarunt operam. Si omne tulit punctum qui miscuit utili dulce, hi certè egregia hac laude fraudari minime debent, qui utiles cum sint, ut nihil supra, non minùs etiam jucundi esse voluerunt. Idcirco monendi hic veniunt Filii Artis, serioque rogandi, ut postpositum, pro virili, nec sine fructu, Medicinæ tyrocinium, omnibusque ad eam addiscendam requisitis probè præcognitis, huc tandem præcipue sua studia convertant. Nullam quippe operam, vel tempus, facile perdent, maleve collocabunt,



cabunt, quod Consiliis & Historiis Medicis attente legendis necessariò impendendum, è contra, per quam utilem & frugiferum, ut credere est æquum, hunc indies deprehendent laborem, neque unquam erit, cur ejus illos imposterum pœniteat.

Verum enim verò cum hanc apprimè necessariam materiam ractantium tantus jam hodie existat numerus, quorum operibus evolvendis vix quidem ullius suffecerit ætas, paucisque tantum suppetat illorum copia, optandum utique foret, quempiam, laborioso huic oneri sustinendo idoneum iri repertum, qui ex singulis prius diligenter perlectis, optima quæque curiosè & cum judicio exciperet, riteque postea omnia in ordinem disponderet, & in unum corpus demum redacta, juvandæ Reipublicæ Medicæ causa in publicum proferret. Næ ille quisquis fuerit proficuum valde, nulloque non ære redimendum aggrediretur opus. At quod vehementer dolendum, qui id attentaret inveniri hætenus nemo potuit. Fatendum quidem est Clarissimum æternaque memoria dignissimum Jo. Schenkium hanc olim metam rectè attigisse; sed præterquam quod superiore, quo vixit ille, seculo, rari erant numeroque pauci, qui utile hoc argumentum ex proposito pertractarint, potiusque ex practicis, aliisque mixtis, quam observationum & Consiliorum Authoribus, videatur aureum suum composuisse Librum, minimam sanè ejus partem morborum curationibus insumptam voluit. Quare, ut ad instituti nostri rationem, proprius accedam, operæ pretium me haud aspernabile, nec ingratum facturum speravi, si quem declinarunt alii, hunc ego lubens mihi sumerem laborem. Quo nunc tandem aliquando, utcunque defunctus; an rectè aut secus memet gesserim, æquis rerum æstimatoribus judicandum relinquo. Invidorum enim & obtreçantium censuram nihil moror, parvi-que pendo. Certè quam potui, jam à multis retroactis annis, in conquirendis undique his toties laudatis Scriptoribus summam diligentiam adhibui, & si non omnes (arduum prorsus id fuisset) quam plurimos tamen eosque ni fallar optimos, & experientissimos sedulò, nec oscitanter consulvi: singulos enim a capite ut dicitur ad calcem usque studiosè oculis perlustravi, quæque inter legendum notatu digna, sæpe fiebat, subinde occurrebant, ea rite excerpta indiarium protinus retuli, omnia denique ob faciliorem eorundem usum, per ordinem, ut videre licet, Alphabeticum, disponere placuit. Et sic demum post infinitos propemodum exantlatos molestissimos labores, ad postremum emerfit, quem nunc Medicæ Artis Candidatis exhibeo *Medicinæ Practicæ* Thesaurus ditissimus. In quo quidem Morborum ac Symptomatum pene omnium, tam internorum, quam externorum insignes & multiplices curationes existunt; plurima quin etiam rara, multa *εὐρησθέντα*, non pauca a Chymicis petita, omnia verò utilia longoque usu probata proponuntur remedia. Ubique fere Affectuum descriptionem breviter perstrinxi, & ad majorem operis auctoritatem suum cuique observationi, & consilio proprium fideliter assignavi Auctorem, cujusque porrò ipsissima verba, nihil fere immutando, ut plurimum apposui, parum sollicitus quod quædam aliquando seu Typothetarum incuria, seu alias, minùs rectè dici videantur, cum quilibet judicio valens ea nullo negotio deprehendere ac corrigere possit. Nihil mihi in hoc lucubrandi genere multarum licet vigiliarum, præter con-

qui-



quirendi digerendique laborem vendici. Absit igitur me quisquam existimet  
vana auram popularem aucupandi ambitione inductum, quicquid est quod  
nunc in lucem datur, propalare voluisse. Quid enim ex alienis Scriptis lau-  
dis captarem? in mustaceo utique hoc esse Laureolam quærere. Longè sanè a-  
lia mihi mens aliud consilium fuit, honestiorque hujus speciminis propo-  
situs finis, nimirum; ut ejus in lucem publicam emissionem, non solum multo-  
rum hominum saluti confulerem, studiumque meum bene de omnibus prome-  
rendi posteritati notum facerem, verum etiam, ut conatu hoc qualicunque,  
alios rebus omnibus instructiores, ad tantum tamque præclarum opus aliquan-  
do suspiciendum, ac melius perficiendum excitare possim. Quos scopos si af-  
secutus fuero, non mediocri perfundar gaudio. Atque hæc (Amice Lector)  
in vestibulo præfari libuit, quæ ut æqui bonique consulas, amantissimè ro-  
go. Dumque alii rectiora & meliora proferant, tu interim his nostris Labo-  
ribus, ab animo Reipublicæ Litterariæ modis omnibus inserviendi cupidissi-  
mo, susceptis, benevola mente, & feliciter fuere, ad Supremi Numinis Glo-  
riam, tuum insuper proximique Commodum, ac Utilitatem.

---

## NOI REFFORMATORI Dello Studio di Padoa.

**H** Avendo veduto per la Fede di Revisione, & Approbatione del P. F.  
Tomaso Maria Gennari Inquisitore nel Libro Intitolato. *Hippocrates  
Contractus*, in quo magna Hippocratis Medicorum Principis Opera omnia in  
brevem Epitomen, Studio, & Opera Thomæ Burnet, non v'esser cos' alcu-  
na contro la Santa Fede Cattolica, & parimente per Attestato del Segre-  
tario Nostro; niente contro Principi, & buoni costumi, concedemo Li-  
cenza à *Girolamo Savioni Stampatore*, che possi esser stampato, osservando  
gli ordini in materia di Stampe, e presentando le solite copie alle Publi-  
che librerie di Venezia, & di Padoa.

Data li 14. Aprile 1733.

( Gio: Francesco Morosini Kav. Reff.

( Andrea Soranzo Proc. Reff.

( Pietro Grimani Kav. Proc. Reff.

*Agostino Gadaldini Segr.*

Adi 18. Aprile 1733. Registrato al Magistrato Eccell. della Bestemmia.

*Angelo Logrenzi Segretario.*





# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER PRIMUS.

*De Affectibus cum litera A incipientibus.*

### SECTIO PRIMÆ.

*Pro Abdominis Abscessu.*



Uer quidam tumore ventris laborans, hydropicus censebatur, & cum umbilicus valde promineret, apertio tandem facta est, ex qua puris laudabilis octo vel decem libræ profluxere; sicque omnino æger curatus est.

Advertant tyrōnes in pueris frequenter tales abdominis abscessus generari, qui hydropem mentiuntur, & si maturè à perito artifice aperiantur, ægros à certo interitu plerumque liberari. *Petrus Estanove, Obs. 2.*

Puella quedam ventris tumorem patiebatur octo mensium spatio, cum doloribus assiduis, quibus ad extremam maciem perducta fuerat: Hydropica ab omnibus censebatur. Ego verò ad eam vocatus, & ventrem diligenter explorans, abscessum latentem invenio intra musculos Hypogastrii, cumque caustico potentiāli aperio, unde 15. aut 20. libræ puris laudabilis effluxere intra plures dies, sicque ægra perfectè curata est. *Petrus Estanove, Obs. 3.*

*Brunet Parte I.*

### SECTIO SECUNDA.

*Pro Abdominis Musculorum Inflammatione.*

**I**Nflammatiō musculorum abdominis ex iis est, quæ rarissimè contingunt: idcirco & Medicum iudicio falli facilè contingit.

Scriba quidam, cum ruri haud procul *Antuverpia* esset, dexteri lateris cum febrī, dolore correptus, sed juxta, ac paulo infra nothas costas: Medicum accersivit, qui venæsectione imperata, eclegmata, linimenta que prescripsit, qualia pleuriticis adhiberi solent (pleuriticum enim morbum esse existimabat) ab his verò cum malè æger haberet, febrisque intenderetur, domum vehi postulavit. Ad quem deinde vocatus, hominem offendi febricitantem quidem, sed debilem & viribus parum valentem, dextrum hypochondrium nonnihil dolentem, ventre verò vehementer distento, ac veluti hydropici alicujus tumenta. Exhibui mox purgans medicamentum, sed in exigua quan-

A

tita,



titate, quod cum foeliciter cessisset, postridiè idem, sed in maiore quantitate propinavi, quo expurgatis multis vitiosis humoribus, sinistra ventris pars tota subsedit: dextræ verò tumor permansit. Et cum non modò tumida hæc pars relicta esset, sed & durior, ac digitis renitens, cataplasma admovi, quo tumore intra paucos dies emollito, nusquam verò apparente loco, per quem pus erupturum sperari poterat, Sectionem adhibuimus, diligenter caventes ne peritonei membrana vulneraretur: qua circa inferiorem ventris partem facta, mox copiosum effluxit pus; quo deinde expurgato, vulnereque solidato, æger sanitati restitutus est: adhibita interim bona victus ratione, & paucis remediis. *Rembertus Dodoneus Cap. 29. Obs. Medicin.*

### SECTIO TERTIA

#### *Pro Abdominis musculorum Scirrho.*

24. **A** Mmoniac. Galban. bdellii, an. part. æq. terantur in mortario cum ol. Lil. deinde adde mucilag. Sem. scænuigræc. lini & ficuum ad pondus omnium prædictorum, contundantur omnia simul, donec in unum coeant: & F. Cataplasma.

Hoc medicamentum ad Scirrhos amolliendos & discutiendos omnium sanè efficacissimum est. *Tob. Zecch. Consult. 48.*

### SECTIO QUARTA.

#### *Pro Abdominis musculorum tumore.*

**N**uper vidi mulierculam, cujus abdomen Saxo durius erat, sub musculorum tamen Idæa ac caractere: Emplastrum iussi ad moveri de mucilag. rubicundior cum evasisset locus ac cum cedere videretur aliquantulum, iussi pertundi, satisque altum infligi vulnus: erupit maxima puris copia, evasit.

Musculi illi abdominis crassissimam membranam habent, quæ nisi pertundatur, non unquam ferè spontè crumpere

poterit pus. Vidi propterea non sectos illos tumores in saxa abiisse, totumque mesenterium in saxum ferè inde commigrasse. *Job. Heurnius ad Aphor. Hippocr. 7. Sect. 6.*

### SECTIO QUINTA.

#### *De Abortu.*

**A** Bortiant adeo frequenter mulieres, ut si quis id diligenter examinet, facile inveniet, plures esse uteri deperditiones, quam partus legitimos: si intra septimum à conceptione diem excludatur genitura, effluxio nuncupatur, seu falsum germen; post diem verò quadragesimum, abortus dicitur: qui nihil aliud est quàm violenta & intempestiva immaturi foetus foras exclusio, expultrice uteri irritata, vel mole, vel pondere, vel morfu. Hinc ex parte uteri abortus triplex est causa, moles nimia, pondus aliquod, aut morfus. Moles ubi amplius distendi uterus recusat; pondus, quum supra vires ejus est, quod continet, morfus demum, ubi, vel humores, qui in membranis continebantur, his ruptis, in ipsum uterum effunduntur, vel etiam totus foetus putrescit. Ab his ita gravatur & irritatur expultrix uteri facultas, ut ad expellendum protinus insurgat. His præterea adde matricis morbos omnes similes, organicos & communes, qui, si graviores sunt, abortiendi ansam quàm maximè suppeditant; præcipuè verò uterus ob pituitam, & mucos humidior & laxior, qui foetum commodè continere nequit. Dispositiones etiam omnes maternæ insigniores, abortus grande invehunt periculum.

Ex parte autem foetus tres alix sunt abortus causæ, foetus nimirum imbecillitas, nutritus inopia, & vinculorum quibus utero alligatur laxitas. Causæ abortus procatacæ sunt, ..... aeris constitutiones inclementiores sibi invicem inæqualiter succedentes, quales annotavit *Hippocrates Aphor. 12. Sect. 13.* nimia ciborum ingestorum copia, longa & arcta



arcta jejunia; cacochymorum ciborum usus, vigilæ immensæ, vehementiores animi perturbationes, labor vehemens, violenta corporis commotio, ex cursu, saltu, choreis, lapsu ex alto, gravioris oneris sublatione, & ex gravi ad ventrem ictu, vestium coarctationes ab assulis illis ligneis, eburneis, aut balænaceis, quas mulieres vestibus ad sternum subiiciunt ad corporis venustatem, evacuationes item immodicæ per vomitum, alvi fluxum, & sudores sanguinis etiam per nares, hæmorrhoides, sed potissimum per uteri venas, immoderata profusio, tetri omnes odores, ut extinctæ lucernæ, & similia, Cathartica vehementiora, & menses morventia, largior denique phlebotomia, postremis potissimum mensibus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Abortu.*

**N**ihil melius scio quàm in victu non errare, ne vitiosi humores in corpore colligantur; deinde ut vitet affectuum immoderationem, iram securas, vehementes corporis motus, & quicquid sanguinem potest commovere. Ad Sanguinem sistendum si fortè fluat, & sanguinis boni adsit copia, suaderem & ego, ut cæteri Medici, venæsectionem, nec moveret me *Hippocratis* autoritas, qui venæsectioni in gravidis tantopere adversatur, cum nostro tempore diæta alia sit, quàm olim fuerit, & experientia testetur, sæpe multos gravidarum morbos venæsectionem postulare, & ferri ab eis sine incommodo. Aliqui ad sanguinem sistendum prædicant pulverem ranæ ustæ in olla recenti, in sacculo de collo appensum, experiri licet, contra abortum utilis est hic pulvis, manè sumptus in ovo sorbili.

℞. Rad. bistort. ℥i. gran. Kermes, sem. plantag. portulac. an. ℥ss. Coriandr. preparat. ℥ii. sacchar. ad pondus omnium, fiat pulvis. *Job. Crato, Consil. 32. lib. 4.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Ad Abortum præcavendum.*

**I**nter intrinseca pulvis hic noster, si frequenter ex vino propinetur, magnopere profuturum non dubito.

℞. Spec. diamargarit. utriusque ℥ss. pulv. cancr. fluviatil. ℥ij. coagul. lepor. pulv. ℥i. corall. rubr. ℥ii. m. f. pulvis. cujus ℥i. ex vini albi ℥iii. vel ex aq. plantag. horis 4. ante cibum, bis terve in hebdomada exhibeatur.

Inter extrinseca, quæ lumbis, spina dorsali libera relicta, & locis apponuntur, est imprimis unguentum celebratissimum Comitissæ appellatum, præbatissimum est subscriptum ceratum, quod sæpius scilicet usurpatur.

℞. Thuris mastich. ladan. an. ℥ss. lapid. hæmat. boli armen. coagul. lepor. ras. ebore. an. ℥i. resin. pini q. s. f. Ceratum S. A. quod applicatum lumbis non immutetur, nisi 10. dierum spatio adhæserit, detineatur tribus à conceptu mensibus, deinde auferatur, detur quandoque pulvis corall. rubr. ad ℥i. in ovo sorbili, quod remedium licet vulgare sit, ad hoc tamen officium efficacissimum est. *Job. Zecchius, Consult. 94. & 89.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Abortu frequenti.*

**M**ensibus absolutis, quando certum est eam nondum concepisse, ad matricem corroborandam, & expurgandam, & ut habilis ad conceptum fiat, infusione sequenti utatur, singulis noctibus cubitum itura, idque per dies 4. vel 5. continuos, sedendo in eam per horam antequam lectum ingrediatur.

℞. Rad. Lil. valerian. bryon. ana ℥iii. herb. matricar. calamenth. fol. lauri, rubi. bacc. juniper. an. m. j. flor. lavend. ros. sambuci an. p. j. balauft. ℥ss. bacc. Lauri. p. j. Coq. in aq. pluviali, addendo mensuram unam vini rubri, & tantumdem aq. fabrorum extinctionis ferri & aluminis ℥ii.



Post insectionem suffitum excipiat utero in Sella, qui fiat ex trochiscis gallicæ, & aliptæ moschatæ: manè tertio quoque die, capiat de sequenti confectione magnitudine nucis moschat. superbibendo parum vini generosi.

℞. Conserv. flor. rosmar. majoran. scabios. an. ℥i. spec. diamb. diamosch. an. ℥i. ras. ebor. ℥℥. nucis moschat. cinam. an. ℥i. sem. fileris mont. ℥℥. cum syrup. de betonica f. Electuarium.

Quando verò menses tempora convenienti non fluunt, suspicioque est, illam concepisse, nihil adhuc agendum, donec altero mense, quoque menses non rediisse certum sit, tuncque incipiat illis, quæ conceptum retinent, & uterum firmant, uti. Primum Ceratum sequens lumborum regioni noctu cubitum itura applicet, illudque tota nocte retineat, idque saltem ab initio tribus noctibus semel, & post mensem quartum, alternis noctibus, & quò magis uterus crescit eò frequentius; mutando aliquoties locum, ita ut quando quater in lumbis gestavit, postea in ventre sub umbilico totidem noctes ferat.

℞. Rad. bistort. sem. Coriandr. an. ℥ii. nuc. Cupress. santal. rubr. Hypocist. an. ℥i. ladan. mastich. an. ℥℥. chur. bdellii an. ℥ii. corall. succin. an. ℥i. pulverisanda pulveriscentur, & excipiantur oleo mastichino, addendo ceræ & terebinth. q. s. f. Cerata quadrata duo vel tria ad usum.

Interea utatur tabulis, quæ mirè ad abortum præcavendum sunt utiles, capiendò unam alternis vel ternis diebus manè.

℞. Sem. Coriandr. præp. ℥ii. rad. bistort. ras. eboris, corall. rubr. an. ℥i. succini crystalli, an. ℥i. cocci infect. ℥℥. sacchar. dissolut. in aq. ros. ℥iv. f. tabulæ pond. ℥i. lapides ætites, lazuli, jaspis, brachiis alligati proprietate juvare creduntur. Caveat cum uterum gestat, à nimio motu, tussi, sternutatione, ab aromatis nimis & vino generoso. *Felix Platerus obs. lib. 3. pag. 744.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Abortu.

**A**dmoveatur regioni uteri ceratum infra scriptum, mihi pluries expertum, & ad octavum usque mensem gestetur.

℞. Mastich. ℥i. ladan. ℥vi. rad. bistort. ℥v. nuc. cupress. hypocistid. sang. draconis, ros. rubr. santal. rubr. Corall. rubr. menth. sicca, Coriandr. præp. gall. mosch. terræ sigillat. an. ℥ii. ol. olivarum, ceræ citrin. terebinth. claræ, picis an. q. s. m. f. Ceratum.

Sed & quæ à proprietate abortum prohibent non sunt negligenda; quare intus pulvis Cancrorum fluvial. coagulum leporinum, lapis aquilinus pulveratus & ex vino nigro austero datus non improbatur. *Jul. Caesar Claudinus Consul. 34.*

℞. Gran. Kermes ℥i. santal. rubr. ℥℥. caryophit. nucis mosch. an. ℥i. rad. tormentill. ℥℥. Margarit. corall. rubr. præpar. an. ℥i. fol. auri, num. 3. manus ch. perlat. ℥iii. f. pulv. sumat ad ℥i. cum paucò vino rubro. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 71.*

Mulier quædam pituitosa natura, sæpius abortierat, cum verò medicinarum usum iniit, feliciter gestationem perfecit. *Jo. Henricus, ad Aphor. Hippocr. 45. Sect. 5.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Ad Abortum præcavendum.

**M**ulier quædam *Mospeliensis* tres abortus consequentes passa erat, variis gestationis temporibus. Jam verò à duobus mensibus gravida patiebatur dolores circa umbilicum & lumbos, qui abortum minabantur. Alter Medicus duo Emplastr. præscripserat lumbis, & umbilico admovenda, ex mass. Emplastr. pro fractur. unde melius habuit ad aliquot dies, postea verò iidem dolores reversi. Vocatus ego advertens mulierem juvenem & sanguineam, venam secari jubeo, unde



de intra paucas horas à doloribus & metu abortus omnino libera est. Sanguiserat valde serofus, tandem ad præcautionem præscribo rhab. pulv. mi. cum jusculo, iterandam semel in septimana per mensem, unguentum adstringens lumbis, & ventri admovendum pridie purgationis, & opiatam astringentem, postridie rhab. quibus tamen non usa est. Symptomata illa accesserant eo prorsus tempore, quo menstruas purgationes pati consueverat extra graviditatem, tertio deinde mense eadem symptomata redierunt, & venæsectione statim liberata est, quarto itidem, quinto, sexto, septimo & octavo, iisdem symptomatibus periodicè recurrentibus, iterata est venæsectio, & statim liberabatur; ultima venæsectio celebrata fuit octo diebus ante principium noni mensis, cum eodem fructu, & in fine noni mensis peperit filium benè habitum & vitalem, sed pallidiusculum, *Lazarus Riverius, Obs. 35. Cent. 1.*

Valdè efficax est sequens opiata.

℥. Conf. ros. ℥ii. cortic. citric. citri condit. ʒ i. pulp. dactyl. myrabol. condit. an. ʒ . Coral. præp. margarit. præp. & ras. eboris an. ʒi cum Syr. Cydon. f. opiata de qua capiat frequenter magnitudinem castanæ. Quamprimum dolores & tormina apparuerint in ventris fundo, versus pubem, in lumbis & osse sacro eorum sedationi incumbendum est, tam sumptis quàm adnotis, pro varietate causarum adhibitis. Si ob cruditates & flatus excitentur (quod frequentissimum est) exhibendus erit pulvis ex aromatico rosato & sem. Coriandri compositus, imò aqua imperialis exhiberi poterit, si major sit pituitæ & flatuum congeries, eodem tempore applicentur abdomini carminantia, ut sacculi ex sem. anis. fenicul. fenugræ. florib. Chamæm. Sambuc. anthos, & stœchados compositi, vel placenta rosacea frixa in sartagine cum vino generoso & pulv. nucis mosch. & coriandri conspersa. Si hisce dolores non cesserint, iniciatur Clyster ex vino & oleo confectus in quo philonii rom. ʒii. dissolvi poterunt; aut etiam narcotica per os, in minima dosi exhiberi, ad

*Brunet Parte I.*

frænandum flatuum & humorum impetum. Sequentia duo remedia pro secreto habentur, & foetum certò retinere creduntur, si antequam foetus à cotyledonibus divulsus fuerit, usurpentur.

℥. Fol. auri numero 12. Spodii, ʒi. germina trium ovorum non subventaneorum, ms. probè, postea dissolvantur in dimidio cyatho vini albi, & detur mane per triduum.

Eodem tempore sequens cataplasma admoveatur.

℥. Thuris masculi pul. ʒii. album ovorum nu. 5. agitentur simul super prunas semper movendo ne concrecant, addendo terebinthinam, ne nimis adherant, postea stupis excipiantur, & quantum ferre poterit, calidissima umbilico applicentur bis in die, manè & serò, per triduum prædictum. *Lazar. Riverius, cap. 17. lib. 15. prax. Medica.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### *Pro Abortus præservatione.*

**A** Bortum ex vitiosis humoribus ad uterum, à toto corpore confluentibus, suæque prava qualitate, aut copia foetum enecantibus, aut cotyledones relaxantibus frequenter concitari, res est manifesta. Fœminæ plures hac ipsa de causa sæpè abortiebant, ex iis quædam foetum trimestrem, septimestrem, lacrum tamen, & omni putrilagine infectum multoties enixæ, nullo alio præsidio, quàm excitato cauterio in brachio, aut crure feliciter pepererunt. Hoc ad originem fluxionis exerce, hujus enim ope ante conceptionem adaperiti, illæ foetus sanos, nullaque labe fædatos legitimo tempore in lucem edidere. *Zacutus Lusitanus, observ. 150. lib. 2. de praxi Med. admir.*

Occultum proprietatem habere corium equi marini pro retinendo foetu in utero, certus sum; ex quo si fiat Zona, & toto gestationis tempore juxta carnem, Cinguli modo feratur, abortus non continget, quod auxilium pluribus incassum tentatis, præstantissimum semper inven-



Si haberi nequit, utere zōna ex lupino corio parata, quam huic usui esse mirabilem, fidissimo experimento adinveni. *Zacutus Lusitanus, obs. 152. lib. 2. prax. Med. admirand.*

Fœmina quædam primaria Lipsiæ aliquoties periclitata de abortu, sub medium gestationis tempus utebatur vino malvatico, cum panis frustulo eodem imbuto, manè jejuno ventriculo. Ita insigniter roborato fœtu fœliciter enitebatur, vinum malvaticum cum amygdalis celebratur ad idem apud Sennertum. *lib. 4. instit. Med. part. 2. cap. 2. Hier. Reusnerus, observ. 109. & Schol.*

Ubi metus est abortus propter concussionem, vel casum ventris inferioris, gravidam dispone in lectum, ut quiescat, & singulis diebus manè exhibe cum ovo recenti cocto gallaturas num. 7. vel 8. cum serico Kermisino ad Si. inciso minutissimè, vel tantundem granorum Chermes. Ventri autem pro confortando fœtu impone sacculum è foliis cupressi, majoran. & rosmarin. in vino & aqua coctis. Sic conservabitur fœtus ad justum pariendi tempus, ex obstetrice gallica. *Parte 1. cap. 2. Wolfgangus Hoeserus, lib. 7. Hercul. Medic. cap. 3.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### De Abortus causa insolita.

**M**ulier quædam ad quinti mensis finem ferè, signis omnibus fœtus vivi apparentibus, gravida fuit. Circa finem verò quinti mensis, fœtus primò imbecilliter ac languidè movebatur, ita ut vix persentiri potuerit, deinde paulatim & intra paucos dies omninò cessabat moveri mammæ quoque antea lacte turgébant, nunc subsidebant, aliaque signa aderant, ex quibus fœtum in utero mortuum esse facillimè conicere licuit, tandem circa finem octavi mensis parturientium doloribus correpta, enixa est masculum, quem per tres ferè menses mortuum gestaverat. Hujus autem abortus causam nullam aliam invenire potuimus, quàm malam conformationem vasorum

umbilicalium; Chorda enim ut vocant umbilicalis quæ communiter & in omnibus vulnerum aliquot longitudine esse solet, in hoc abortu vix spithamæ erat longitudinis, hinc perspicuum fit crescentem fœtum in utero materno paulatim placentam ab acetabulis abstraxisse & separasse, abstracto autem hepate uterino necessario moritur fœtus. *Fabritius Hildanus, observ. 50. Cent. 2.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### De Abortu revocato.

**M**ulier quædam 13. hebdomade impregnationis, cervicis cocturæ assistens, situlamque pleniorè imprudentiùs tollens, abortum ferè rejecit, ruptis membranis & exitum embryone moliente, forte empiricus præsens ad omnia audax, huic incommodo succurrere fatagens, suavit sine mora & situ prægnantis, & manus dexteritate, reponendum fœtum. Capite igitur gravidæ declivi, elasticisque cruribus, obstetrix subtili manuum opera embryonem proditurum intrusit; statimque peracta operatione in lecto composuit matrem, ut fœtus repositus solitum locum repeteret. Fluxere tamen Lochia ad tertium diem, ad membranæ ruptæ generationem, suavit idem congressum cum marito; hinc retentus fœtus iusto tempore, deinde fuit exclusus, adhuc superstes. *Thomas Bartolinus, histor. 37. Centur. 4.*

## SUBSECTIO NONA.

### Pro Abortientibus & parientibus æs molarum patientibus.

**I**D quod non rarò experientia comperit habeo, nunc pro exemplo in muliere quadam contingens, bona fide referam. Peperit mulier geminos, masculum & fœminam, alterum vivum, alterum verò mortuum. Inde mulier hæc malè habere cœpit, & continuò febriebat; & ingentem sanguinis fluxorem patiebatur, adeò ut de eo constringendo Medici valde solliciti



solliciti essent. Cæterum quò magis constringentia darent admoventve, eò magis hæc mulier in sanguinis rivos deveniebat, ut ad obitum prope jam deveniret, & domestici de funere jam curarent. Porro cum in hoc infortunio & agone esset, ecce molam quandam, carneum scilicet frustulum prædurum emisit, & illico libera & sana facta fuit. Conatur autem natura tantum malum in utero contentum, hoc est molam, expellere: unde non cessat expultrix facultas sanguinem transmittere, quoad scopum desideratum attingat: Id aliis mulieribus abortientibus, & quæ pepererunt; evenisse, non raro observatum habeo. ALPHARI-  
NIUS. Quid tunc agendum suades, o Amate, cum sic in has enixas mulieres, à quibus tantus effluit sanguis, inciderimus. AMATUS. Ego vero tantum abest ut constringentibus tunc utar remediis, ut potius ad abortum facientia & molas evocantia Medicamenta confugientia, tam per os concessa, quam per inferiora immissa: hic etenim natura vult juvari, quæ per se sola cum propellere Molam utero affixam non valet, adjuta tamen potest, & opus coniecit: Sic enim hoc modo sanguis reprimitur, & mulier liberatur: *Amatus Lusitan Cent. septima. Curat. 54.*

## SECTIO SEXTA.

### De Abscessu spirituofo.

**A**bscessum patiebatur Adolescens Raguirus sub ala, & illum quidem præmagnum, qui temporis successu mollior & lividus magna cum pullatione ita evasit, ut intra eum pus contineri Medici & chirurgi pro certo haberent. Itaque de eo aperiendo nulla inter eos discordia habita, opus aggressi sunt; Sed quali successu audite: vix enim Abscessus Phlebotomo apertus fuit; ex quo sanguis impetuosè, quodam cum spiritu strepitu, profudit, cum agrotus ipse, posito capite, expiravit. *Amatus Lusitanus, Centur. 6. Curat. 82.*

Tumorem hunc rectius forsan Aneurisma vocasset.

## SECTIO SEPTIMA:

### De Aceto.

**V**ermes sunt in aceto copiosissimi tam viventes quam mortui; viventes per acetum ut pisces vagantur, mortui verò in fundo resident, rursus mortui qui sunt in fundo paulatim corrumpuntur, & tanquam nubem efficiunt: ex qua vermes renascuntur: & sic in his animalibus phœnicis historiam renovatam vides. Quo acetum est acrius, eò copiosius habet vermes. Si acetum coletur, aut altretur, habebimus limpidum absque ullis vermibus, ferè per triduum, quo transacto vermes denuo oriuntur. Si vini quantitas exigua 4. vel 5. guttarum in libram aceti infundatur, omnes vermes interficit. Si etiam in aceti libras duas misceas theriacæ 3i. omnes interimit, ultimo mixta theriaca cum aceto in vase clauso, exponatur vas soli per mensem, semel in die agitando, & postmodum relinquendo, ut theriaca in fundo remaneat, quo peracto diligenter coletur, & habebimus acetum non solum semper sine vermibus, sed summo perè utile ad pestem & febres malignas, vermes hi in aceto observantur beneficio microscopii. *Dominicus Panarolus, obs. 36. Pentecoste 4.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Achoribus.

**A**chores sunt capitis ulcera manantia, tenuissimis foraminibus cutem perforantia, ex quibus glutinosa sanies effluere solet. Causa proxima est, humor acris, serosus, nitrosus & mordax, crasso admixtus: remota, malum regimen in sex rebus non naturalibus, præsertim in cibo & potu. Puerilis ætas est huic morbo maxime obnoxia, sed mulieres & viros acrius & molestius infestat. Achoribus affinis est alius affectus, qui favus Latinis, Græcis *Χηψο* dicitur. Hæc statuitur inter ipsos differentia, quod in achoribus foramina sint minora, in Favis ve-



rò majora, & quòd humòr; qui è favis, emanat, sit melli consistentia similis, unde modò meliccris, modò Cerium dicitur.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Achore seu tinea crustosa in puero 13. annorum.*

**P**Uerum hunc sequentibus remediis ita curavimus.

℥. Fumariz M. iii. scabios. beten. borrag. acetos. viol. agrimon. an. M. i. sem. endiv. acetos. anis. an. ℥i. rad. enul. ℥ss. Epithim. ℥i. uvarum passarum exacinat. ℥. liquirit. ℥iii. f. omnium decoctio in aq. communis & fumariz an. pt. æqu. & q. f. pro ℥i. in colat. dissolv. Syr. de fumar. ℥iii. Syrup. de Epithymo, borag. & stœchad. an. ℥. m. f. apozema, capiebat bis in vie, erat facilis solutionis; quotidie enim ter ad minus hoc decocto alvus solvebatur, aliquando & quinquies alvum deponebat. Deinde ut hoc capitis lavacro uteretur mandavi.

℥. Fumar. betæ, lapath. acut. cum toto, chelidon. cum toto, malv. fol. Heder. arbor. radic. althææ, an. Mi. fl. Chamæm. melilot. & furfur an. Mss. coq. in aqu. qu. f. pro ℥iii.

Deinde ut crustum melius emollescerent, jussi ut post lotionem inungeret caput infra scripto linimento.

℥. Mucilag. scenugræc. sem. lini, cum aq. malv. extract. axung. gallinæ, porcina, ol. ex vitell. ovorum an. ℥ss. Croci ℥. M. pro linimento ut artis est. hisque sæpius reiteratis, caput deindera di jussimus novacula, continuando lotionem & inunctionem manè & hora quarta pomeridiana.

Post sex deinde dies paravimus iterum apozema purgans sicut antè, addendo polidod. q. ℥ss. ras. ligni sanct. quart. i. ex quo sumebat aliquando semel, aliquando bis in die, si alvus minùs responderet. Novacula rursus abrafo capite, ut materia magis foras evocaretur, ad lotionem hanc plus detegentem devenimus.

℥. Fumiterr. scabios. Caul. rub. bræ,

fol. Heder. arbor. malv. ras. ligni Guajac. an. Mss. rad. enul. Chelidon. alth. an. ℥i. flor. Chamæm. furfur. an. pii. farin. fabarum lupinorum an. ℥i. Coq. in aq. pro ℥iv. Post lotionem hoc linimento inungi mandavimus ad detergendum & magis exsiccandum.

℥. Pulv. rad. enul. camp. litharg. auri & argenth. Ceross. alumin. roch. combust. an. i. terantur subtilissimè & incorporentur cum linimento priùs descripto; addendo ol. vitell. ovorum q. f. & ceræ albæ modicùm ut in unguenti formam coeat.

Post quinque rursus dies propinavimus infusum fol. orient. Epithym. & rhei in aq. fumar. scabios & beton. addendo cassia & confect. Hamec. an. ℥ii. Syrup. de fumar. n. quo sexies multa & varia excrementa deposuit, die sequenti rursus exhibuimus, & adhuc sexies dejecit. Postea lotionibus dictis urinam antiquam adjecimus, & inter bulliendum vitrioli exiguum quo ter tantum caput ablui imperavimus, eò quod robustius medicamentum esset, cæterum post istam lotionem caput, infra scripto unguento inungebatur.

℥. Litharg. auri & argent. cum aceto accerrimo & ol. ros. nutriti ℥ii. ceruss. ablutæ cum aq. Solan. ℥i. alum. roch. combust. ℥. fuligin. furni, rad. enul. exsic. & in pulverem tritæ vel combustæ, chartæ exustæ an. ℥ii. ol. ex vitell. ovorum axung. gallinæ, porcina, an. ℥. ol. laurin. ros. & aceti exigui q. f. Incorporentur in mortario S. A. ut in forma unguenti mollioris cocant.

Istud unguentum est apud me magni pretii, & mirabile magnæque efficaciæ, ut patet ex illis quæ ingrediuntur. Galenus sola charta combusta, & aceto diluta locum affectum illinebat, & uno aut altero die, hoc medicamento utens exsiccante, plurimos curavit.

Tandem unguento ultimo præscripto adjunximus argenti vivi cum saliva extincti ℥i. vitriol. rom. optimè calcinati ℥i. & bis dictis remediis ab achore seu tinea humida liberatus est puer spatio duorum fere mensium. *Petrus Forestus, observ.*



17. lib. 8. de extr. capitis vitiis.

tur. Julius Caesar Baricellus, in bortulogentiali.

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Achore in puero octo annorum.*

**P**ost lotiones & universalia remedia præcedenti observatione dicta, topico remedio sequenti fuit curatus.

℞. Succ. fumar. ℥ii. succ. scabios. borrag. Chelidon. succ. rad. enul. lapath. acut. an. ℥i. cum pauxillo fœcis ol. antiq. & ol. ros. addendo axungie porcine q. s. & aceti exiguum, bulliant lento igne ad succorum consumptionem, in fine addendo pulv. litharg. auri & argenti, pulv. ireos, lupinorum an. ℥i. pulv. ros. lign. guajac. an. ℥ss. bene incorporentur & f. linimentum. S. A. Expertus sum etiam valere decoctum guajaci, ut in morbo gallico uti solemus, cum optimæ victus ratione; interea adhibendo lotiones, linimenta, & unguenta, in observatione præcedenti prescripta. *Petrus Forestus, observ. 8. lib. 8. de externis capitis vitiis.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Achoribus in puero 15. annorum.*

**C**ontra hoc malum sequens lixivium inveniebam.

℞. Absinth. flor. Chamæm. serpill. matricar. an. Mß. bacc. Lauri rad. Ireos an. ℥i. rad. asar. ℥ss. incidantur & sacculo condita, coq. in lixivio ex ligni juniperini cinere facto. Hoc luna decresciente caput lavabatur quotidie, ac brevi sanitatem recuperavit. *Martinus Rulandus, curat. 54. cent. 1.*

Quendam achoribus tineaque per multos annos turpiter affectum, (cui varia fuerat incassum applicata remedia) præmisso cathartico, linimento ex oleo in quo ad exactam coctionem bufo, sive rana terrestribus ebullierat, optimè curavi, quippe simplici hoc remedio per paucos dies in capite utens, sanus, & capillatus factus est, durante autem linimento pili emortui, vulsellis a Chirurgo extirpan-

## SECTIO NONA.

*De Ægilope.*

**I**nter nares & majorem oculi angulum oriri solet abscessus Ἀἰγίλος Græce, i. e. oculus caprinus dictus, quod capræ huic vitio peculiariter sint obnoxie. Exiguum quoddam est tuberculum, cum vel sine inflammatione, inter magnum oculi canthum & nasi os situm, quod ruptum si negligatur, in fistulam abit usque ad os ipsum progredientem. Secundum Paulum ab Ægin. priusquam tuberculum in ulcus erumpat, Anchilops, post eruptionem, si in fistulam tendat Ægilops, vocatur: aliis verò Authoribus, & ante & post eruptionem, Ægilops dicitur; aliqui hoc vitium fistulæ lachrymalis nomine indignant, sed perperam, nam licet sæpe sæpius in fistulam mutatur, propriè tamen loquendo, Ægilops fistula non est, neque semper necesse est ut in fistulam transeat, si fiat cum inflammatione, pro parente agnoscit afluxum sanguinis ad angulum oculi majorem ob nimiam ejus in corpore plethoram, si absque inflammatione appareat, a vitiosis sit humoribus in eam corporis partem delatis; frequentius autem ab humore pituitoso, crasso, & viscido.

Causa verò fistulæ est, quòd Ægilops non sat citò aperiatur, vel quod post apertionem, pus non liberè efluat, sed diutius cohibeatur; quo fit, ut in subiectas partes semper agens, easdem erodat, exedat, atque excavet. Absumpta in angulo caruncula, lachrymalem fistulam mentitur, adeò ut multi decipiantur; nam ex foramine, quod conspiciunt, perpetim fluunt lachrymæ & pituita, verum non est fistula, quia locus iste, non est præter, sed secundum naturam, foraminulentus, eique foramini incumbit dicta caruncula ad cohibendas istas humiditates.



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Ægilope in fistulam lachrymalem terminante.*

**C**hirurgus suo tempore insignis *Domicellam* quandam religiosam ex *Ægilope* fistula lachrymali laborantem, hoc modo sanavit, optima victus ratione præscripta, & pharmacis universalibus adhibitis, tum etiam venæsectione præmissa brachii & pedis, orificium ulceris tenta aperuit ex gentiana radice confecta, & orificio successivè satis aperto, pro ulceris mundificatione sequens medicamentum præscripsit.

℥℥. Mell. communis ℥ii. viridis æris, ℥ss. aq. rutæ ℥iv. æs viride pulverisetur, & cum aliis lento igne decoquatur, ad tertiæ partis consumptionem. Colatura repidè & suaviter per syringam imponebatur: si acrius videbatur, aq. rutæ ulcus abluerebatur omni die, & post lotionem exiguum unguenti apostol. admovebat, hoc modo tribus continuis septimanis procedebat, superponendo etiam emplastrum conveniens, & oculum rosac. aqua defendebat. Postea pro tertia intentione perficienda, nempe incarnandi atque cicatrizandi, ulcere jam satis repurgato, illud collyrium præscripsit.

℥℥. Thuris, sarcocoll. Aloes, sang. drac. balauft. antim. alumin. an. ℥i. virid. æris, gr. v. subtiliter pulverisentur, & cum aqu. rutæ fiat collyrium satis liquidum. Imponebatur leviter cum rutæ stipite, deinde exsiccabat, continuabat ter in die, tribus septimanis; postea bis in die minorando tentam, deinde tantum lavabat, diapalma superimposita, & panno lineo raro loco compressionis, atque hoc modo feliciter absolvebat curationem.

*Jacobus de Carpo.* Chirurgus suo tempore expertissimus, ad fistulam lachrymalem sequenti collyrio utebatur.

℥℥. Aloes, myrrhæ, Croci an. part. xq. infundantur in aq. vitæ quinquies sexiesve distillatæ q. s. per noctem, & diem, deinde coletur, & colaturæ add. theriac.

opt. & camphoræ q. s. f. f. Collyrium. *Petrus Forestus, observ. i. lib. ii. de morbis ocul.*

*Amatus Lusitanus* ceratum contra *ægilopes* describit curatione 68. cent. 5. & multis laudibus effert, quod ita se habet.

℥℥. Pulv. testarum Cochlearum ℥ii. myrrh. aloes lotæ, thuris, an. ℥ss. Sarcocoll. sang. drach. Ceruss. an. ℥iii. op. poponac. aceto soluti, & lapidis hæmath. an. ℥ss. Croci ℥ii. ceræ & resinæ an. ℥iii. M. simul ad ignem S. A. & fiat ceratum, angulo oculi applicandum. *Lazarus Riverius, cap. 15. lib. 2. prax. medic.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Ægilope.*

**Æ**gilops avena est, cujus farina cum floribus Labruscæ, i. vitis sylvestris, cataplasmata, a principio, quando apparere incipit, sanat.

Aliud: quo non solum incipientes, sed & disruptas *ægilopas*, etiam præsentem mala intemperie, brevi tempore, curatas vidi, foramine etiam ad os perveniente unâ cum inflatione.

℥℥. Mellis puri, aloes hepatic an. ℥ii. Myrrh. ℥i. Croci ℥ss. aq. sibi coq. lento igne ad consumptionem medietatis, in hac decoctione calente infundatur parva spongia nova, quæ expressa & in subulpetia bene munda involuta ligatur deturper, & videbis mirabilem effectum sicut ego sæpe expertus sum. *Petrus Bayrus, cap. 26. lib. 3. prædic.*

*Ægilops* uti ophthalmia primò curari amat: nam & sæpè ei ophthalmia conjuncta est, adhibe ergo imprimis generalia, venæsectionem, purgationem, cucurbitulas, & alias revulsiones ibi dictas, tum repellentia applica, deinde digerentia; quod si inflammatio ad suppurationem tendat, ea juvari debet Cataplasmate ex farina tritici, lacte, ovi vitello & modico croco. Non est autem expectandum, donec disruptio per se fiat: sed ante completam maturationem scalpello, vel cauterio aperiendus locus est, ne ex longa mora internæ hæ partes teneræ corrumpantur,



tur, quapropter ratione loci latum quoque foramen fieri debet, ut exitus pueri detur, aperto tuberculo, imponatur peniculus, melle rosaceo imbutus, vel Ægyptiaco unguento, si sordet ulcus. Est herba quædam veteribus dicta Ægilops, estque eadem atque avena; hujus farina cum plantag. aut parietaria, aut portulaca in modum cataplasmatismis appositæ est specificum ad ægilopem.

Chalmeton. insignis Chirurgus hoc velut præstantissimum commendat.

24. Aqu. vitæ, vel vini opt. mell. rosat. colat. an. ʒi. myrrhæ ʒii. M. F. linimentum, quo manè & vesperi locus liniatur. *Vospicus Fortunatus Plempius, Ophthalmograph. lib. 5. cap. 17.*

Quando cauterio ægilops aperitur, applicetur fronti & oculo spongia aq. ros. madida, vel stupa cum abdomine ovi. Dolorem ex cauterio lenit vitellus ovi cum oleo rosaceo, per unum vel tres dies appositus, ruptum ulcusculum abstergetur, melle rosaceo, vel oxymel. simpl. laudatur thus cum stercore recenti columbino & cum farina cum melle. Fortius est unguentum Ægyptiacum, æs viride per se solum pro secreto habetur. *Daniel Sennertus, practic. libr. 1. part. 3. sect. 2. cap. 3.*

## SECTIO DECIMA.

### De Affectione Hypochondriaca.

**A**cepit hæc affectio Nomen à loco affecto, Hypochondriis scilicet. Mirachialem vocant barbari, Dioclès verò ab Hippocrate fama & autoritate secundus, affectum flatulentum nominavit. Describi potest quòd sit colluvies quædam variorum humorum, imprimis atrabiliorum, sæpe etiam pituitosorum, & biliosorum, in venæ portæ, arteriæ celiacæ & mesentericæ ramis, ob vitium lienis, absque putredine collecta; è qua vapores horum naturam redolentes, varia & plurima symptomata excitant, qualia sunt, ventriculi cruditas, & æstus flatus, ventris rugitus, ructus acidi, saliva multa, vomitus pituitosi, cardialgiæ,

alvus astrictior, æstus in hypochondriis quasi inflammatorius, quem interdum sequitur malarum & totius faciei rubor, ob vaporum ascensum. Urina modò tenuis, modò turbida, crassa & rubra, in hypochondrio sinistro distentio, & non rarò pulsatio, & dolores vagi, respiratio difficilis, pectoris dolor, cordis palpitatio, vertigo & oculis obversans caligo, vigilie pertinaces, animi anxietas, phantasia perturbata, in quibusdam etiam metus & tristitia.

Pars hic primariò affecta jure creditur esse lien cujus fermentum, plus, aut minus commotum, suprarecensita symptomata producere solet, ob solos aliquando diætæ errores nullo antè, in ventriculo, vel liene, vitio existente, hoc malum generari potest, existimantque præstantissimi Medici hanc ipsam in diætâ peccandi hodie licentiam, causam esse, cur pauci ab hoc malo immunes sint.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro affectione hypochondriaca cum Lienis tensione.

**E**xteriùs Lienis & toti abdomini de obstructura conveniunt, propterea soleo hujusmodi oleo sæliciter uti.

Accipio utrumque oleum amygdalinum, cum modico vini Cretici, iisque in duplici vase incoquo spicam, absinth. rutam, corticem cappar. rad. filicis maris, Calamenth. puleg. organ. Capill. ven. Ceterach. liquiritiam, althæam, nucem moschat. schenanth. quousque absumatur vinum; deinde totum ventrem hoc oleo ungi, aut etiam embrocari jubeo, postea devenio ad Ceratum Sacrum. *Julius Caesar Claudinus, consult. 74.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro affectione Hypochondriaca.

**S**entiebat nobilis quidam Burgundus; à longo tempore, tensionem in sinistro hypochondrio, cum rugitu & murmure, & quia corpus nonnihil macrum fiebat,



siebat, faciesque decolor, graviora meruens, cum post remedia multa, quibus jam usus fuerat, non remitteret malum; meum experivit consilium huc veniens, iudicavi causam in venis Mesaraicis, lienem copiose ambientibus potius, quam ipso liene contineri, esseque illic illuviem, unde tetri vapores & flatus gignantur cum obstructione horum ductuum, quibus emendandis hisce fuit usus.

Syrupum sequentem præscripsi.

℞. Rad. Cichor. fœnicul. apii veri, Irid. an. ℥i. Enulæ, ℥vi. asar. ℥ii. rad. liquiritiæ ℥i℥. cort. tamarisc. rad. Cappar. Sambuc. Ebul. an. ℥i. Herbarum Endiviæ, Chamæpit. chamædr. eupator. veronic. capill. ven. Ceterach. bugloss. utriusque fumar. summit. lupul. asparag. an. Mi. flor. bugl. utriusque genist. tamarisc. an. p. i. Sem. anisi, fœnicul. an. ℥ii. Carvi, petrosel. an. ℥i. Cicer. rubr. p. i. passul. enucleat. ℥i℥. prunorum paria v. F. decoctio in aq. & tertia parte vini & in Colaturâ ℔b. viii. Infunde fol. Sen. mund. ℥iii. rad. polipod. ℥ii. turpeth. ℥℥. Sem. Cartham. conquassat. ℥i℥. Mirobol. Citrin. & Chebul. an. ℥iii. F. iterum decoctio addendo rhabarb. in panno ligat. ℥℥. Spic. Schenanth. an. ℥i. Cinnamomi ℥ii. post levem ebullitionem colentur, adde succi pomorum odor. ℥iv. Sacchar. q. s. decoquantur ad Syrupi consistentiam Capiat ℥i℥. pro vice per se, vel cum juscule cicerum rubr. & rad petrosel. si non operatur sufficienter, dissolve in uno haustu, diagridii rectè præp. gr. iii. continuet illius usum aliquot dies, postea hebdomadatim, dein menstruatim.

Pilulis sequentibus utatur interdum loco Syrupi.

℞. Aloes ℥ii. rhab. agar. an. ℥i℥. extract. absinth. ℥i. gummi ammon. dissol. in oxymel. squill. ℥℥. mastich. ℥i. rad. Gentian. summit. Cent. min. an. ℥i. rad. asar. ℥℥. Spic. ℥℥. limatur. chalib. præp. ℥i℥. diagrid. ℥i cum resina laricea. F. Massapil. capiat. ℥ii. vel ℥i. pro vice. Emplastrum hoc sinistro hypochondrio applicet.

℞. Emplastr. de baccis Lauri, de melilot. an. pt. æqu. malaxentur oleo de cap-

par. extende supra corium, subducatur Sindone rubra nè nimium adhæreat. Hac ratione se integrè fuisse sanatum per alios, quos ad me consilii causa ablegavit, mihi significavit. *Felix Platerus, observ. l. 2. p. 496.*

Post ritè purgatum corpus, pro minorum vasorum obstructione referenda, per dies aliquot, usum pulveris de limatura chalybis præscripsimus, qui fiebat hoc modo.

℞. Limatur. Chalyb. (ex acubus detrita quæ sæpius cum vino seluatur, ac deinde in q. s. aceti acerrimi in crucibulo igne circulari tam diu coq. donec omnino absumpto aceto limatura igniatur, & candescat, quæ post modum in marmore levigetur) ℥vi. spec. diarrhod. abbat. diacroc. an. ℥i℥. pul. Cinnamom. Caryophyll. an. ℥℥. rad. liquiritiæ ℥ii. Croci ℥℥. manus ch. perlat. ℥i. M. F. pul. dos. ℥℥. quotidie bis vacuo stomacho in haustu vini medicati sumenda. *Gregorius Horstius, observat. 27.*

## SECTIO UNDECIMA.

### De Albugine.

**A**lbugo est macula alba, in cornea oculi tunica, quæ si tenuis est, & superficialia, dicitur nebula; si crassa & profundior proprie vocatur albugo, Græcè *νεύρωμα*, Gignitur cum pituita inter corneam collecta, ejus perspicuitatem tollit, visumque impedit; vel, dum post vulnus, vel ulcus corneæ cicatrix manet, quæ in nigro oculi alba apparet, à qua cornea ita densa redditur, ut speciebus visibilibus transitus denegetur. Capi vaccius putat solam eam esse veram albuginem, quæ à cicatrice fit; sed hoc non est necesse dicere, cum ab humore crasso & lento exsurgere etiam possit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Albugine.

**P**ræmissis universalibus evacuationibus ad materiam coneretam emolliendam



## SECTIO DUODECIMA.

## De Alopecia.

dam, fœtus admovendus est, cum spongiis mollioribus, ex decocto scœnugræci, meliloti, chelidonæ, & scœniculi paratus. Vel ejusdem decocti vapor, ut & sequentis, oculis excipiat.

℞. Rad. althææ. ℥i. sol. malv. Euphras. Chelidon. maj. an. Mi. Sem. lini & scœnugræci an. ℥iii. flor. melilot. p. i. F. decoctio in aqua fontis, cujus vapor recipiatur in oculum manè & serò.

Potenter albuginem discutit succus scœniculi recenter extractus, cui balsami Peruviani gutta una admista sit. Idem præstat oleum ex linteis combustis cum saliva pueri mistum, & penna illitum. Elicitur hoc oleum linteis accendendo, & inter duas patinas suffocando, materia refrigerata, guttæ illius olei patinæ adherentes inveniuntur. *Lazar. Riverius, c. 7. lib. 2. Prax. Medic.*

℞. Mellis albi ℔i. summit. scœnicul. flor. Sambuc. & Euphrag. an. p. i. sacchar. cand. ℥ii. F. destillatio in Bal. M. & aqua infundatur in oculum. *Rodericus à Fonseca, Tom. 2. Consult. 55.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Albugine.

**P**Uellæ cujusdam sinister oculus admodum rubebat, pruriebatque, lachrymæque continuè ex illo fluebant, & quia jam diu hic affectus duraverat, albugo in oculo nata, mediam ferè iridis partem obtexit, ita ut de visus amissiones, esset periculum, jussu cucurbitulas cervicis regioni aliquoties applicare, & cataplasma sequens oculo clauso imponere, continuoque gestare, & bis in die renovare.

℞. Pulp. pomorum odor acidulorum quart. ℔. incid. minutim, & in aq. ros. & scœnicul. coq. donec in pulvem. redigatur cui contusæ, adde mucilag. semin. scœnugræc. ℥ii. album ovorum num. 3. cortic. granat. pulv. ℥i. lapid. hamatit. exactè triti ℥℔. ol. rosac. parum M. F. cataplasma.

Hujus remedii per d. es. usu, oculus ad colorem statumque naturalem rediit, albugoque & macula penitus sublata sunt.

*Æliæ Platærus, obs. lib. 1. p. 113.*

**A**Lopecia & Ophiasis congeneres sunt morbi, & pilorum Symptomata, quæ definiti possunt, quod sint capillorum defluvium areatim factum a pravo & corrupto humore pilorum radices erodente, ortum habens. Utrique affectui commune est quod areatim pili decidant: unde etiam sub areæ nomine, tanquam sub genere, uterque comprehenditur. In hoc verò differunt, quod Alopecia nullam certam figuram habeat, sed sub qualibet extendatur. Ophiasis verò serpentis more tortuosè serpat, & modo ab occipite extenta, utrinque ad aures usque serpendo vergat, latitudine ferè duorum digitorum; modo aures prætervecta ad ipsam usque frontem progrediatur, donec se duo capita in anteriorem partem committant. Præterea Ophiasis sedem in capite perpetuò habet, & infantibus solum accidit, & ad lepram dispositis. Alopecia verò non minùs barbam reliquasque corporis partes pilosas, quàm caput occupat; nec minùs etiam alias ætates quàm infantiam infestare solet; & nunquam nisi ope medicamentorum evelli potest; cum Ophiasis absque ullo externo auxilio, suæque sponte frequenter desinat. Nomen accipit Alopecia ἀπὸ τῶν ἀλωπίδων; quod vulpibus anosis familiaris sit hæc passio, oborta per ætatem scabie. Ophiasis verò à serpentis figura dicitur.

Causa utriusque mali est, humor prævus & acris, pilorum radices erodens, cujuscunque ille sit generis, plerumque tamen sit hoc malum a pituita salsa, adusta & corrupta. Quod autem nunc Alopecia nunc Ophiasis excitatur, seu pili nunc aream rectam, hunc tortuosam constituunt, causa est materiæ copia & qualitas: Si enim sit copiosior & tenuior, in pluribus & majoribus locis æqualiter pilos erodit, si paucior, & cum crasso mista humore inæqualiter & tortuosè sit pilorum defluvium. Differt Alopecia à calvitie quæ ἀλωπετία Græcè dicitur, quod hæc ex humorum pilos nutrientium penuria



nuria proveniat, illa verò à vitiosis & corruptis humoribus oboriatur.

## SEBSECTIO PRIMA.

### Pro Alopecia.

**P**ost ritè purgatum corpus, jussi ut unguentum tale quo Rondeletius utitur, componeretur.

℥. Ol. abrotani ℥ii. pinguedinis urfi vel cuniculi, vel talpæ, ℥i. vel an. ℥ß. ciner. pellis urfi, vel echini terrestr. aut marin. ℥iii. nucum ustarum abrotan. usti an. ℥i. propolis ℥ii. Mell. ℥i. incorporerentur omnia simul, & fiat unguentum, quod non nimium adhæreat, nec pilos relictos sua tenacitate avellat. *Petrus Forestus, obs. 2. lib. 8. de externis capitis vitiis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Alopecia in Juvene quodam ex Lue gallica.

**P**ost venam sectam & assumptum catharticum, ut sudor eliceretur ad decocta devenimus.

℥. Sarfapar. selestiff. in partes minutas concisæ ℥ij. lign. sanct. cum cortic. limat. ℥iß. rad. Chinæ ℥ß. fol. Sen. ℥ß. polipod. q. ℥ß. turbith. gummos. rhapontici an. ℥iß. rad. asparag. fœnicul. petroselin. apii ana ℥ii. fol. sumar. virid. agrim. veronic. Salv. beton. majoran. chamæpit. chamædr. an. Mi. borrag. bugl. scabios. an. Mß. sem. anif. Cartham. an. ℥iv. bacc. juniperi ℥i. bacc. Lauri ℥iß. liquiritiæ ras. ℥iii. macerentur omnia in aqu. pluviali optima, herbis radicibusque concisis, & seminibus mediocriter contusis ut artis est per 24. horas. Deinde F. omnium decoctio in aqu. ℥bxxv. & in Bal. M. coq. ad ℥bviii.

De hoc decocto fumebat bis in die manè, & hora quarta pomeridiana, sudabat egregiè, & quotidie alvum bis aut ad minus semel deponebat. Pro potu ordinario fiebat hoc decoctum secundum.

℥. Aq. puræ ℥bxxx. proiciantur supra residuum decoctionis superscriptæ fortiter expressæ, addendo ligni sanct. cum

cortice ℥i. Sarfap. ℥iß. Coq. rursus in B. M. ad ℥bxxv. pro potu ordinario. In fine curationis pro Alopecia, ut hoc lavacro capitis uteretur mandavi, (caput radere nolebat, quod tamen præsticisset.)

℥. Fol. Marrhub. abrotan. verben. an. Miii. centaur. herb. capill. an. Mi. lupinorum, fabarum. an. ℥ii. fl. rosmar. Mi decoq. in aq. communi pro ℥biii. addendo ℥vi. decoctionis secundæ ex Sarfa. Deinde cum cineribus testarum nucum amygdal. amar. cineribus pilorum hominis fani, Cinerib. abrotan. usti, & pilorum capræ an. ℥i. fiat lixivium ut artis est, quo lavetur caput.

Deinde hoc linimento loca depilata iungat.

℥. Cineris testar. nucum, amygdal. amar. ciner. abrotan. usti. Pili cremati hominis, an. ℥i. nu. ℥i. nucum combustarum cum testis ℥i. cineris apum ℥ii. ol. laurin. ℥iß. unguenti martiati axung. porcin. urfi, an. ℥i. ol. nucum ℥ß. ol. juniper. terebinth. an. ℥ii. myrrh. ℥i. Euphorb. ℥iß. mellis ℥iß. optimè incorporerentur ut fiat unguentum.

Post aliquot dies, imperavi ut huic unguento adderetur aliquid Emplastri de ranis, in quo intrat argentum vivum: tetrum odorem lixivium habebat ob crines combustos, qui facile corrigitur adjecta alypta vel Gallia Moschata.

Alium quendam unà cum uxore Alopecia ex lue gallica affectum, post decoctum guajaci solo adipe urfi capite uncto curavimus. *Petrus Forestus, obs. 4. lib. 8. de externis capitis vitiis.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Alopecia.

**H**æc quæ sequitur compositio omnes alias, vi sua præcellit, faciens ad profluvium capillorum, & ad capillos rarefcentes, & in calvitium prolabentes, estque omninò admirabilis.

℥. Murium domestic. ustor. pannicul. ampelini (i. e. Linci) usti, adipis urfi. medulæ cervin. cortic. arundinis, an. p. eq. hæc omnia arida levigentur, & sufficiunt.



ficienti melle admixto, ad crassitudinem mellis redigantur, postea adeps & medulla liquefacta addantur, & pharmacum ipsum in aream pixidem reponatur, ex eoque alopecia, donec capillos producat, defrigetur. *Gal. libr. 10. de comp. med. secundum locos. Amat. Lusit. cent. 4. cur. 14.*

Inter omnia ad Alopeciam hoc à me ut probatum accipe.

℥℥. Absinth. vulg. cortic. pinearum, fol. myrti, cap. ven. cortic. arundin. an. mss. thuris, mastich. an. ℥ii. myrrh. ℥ss. gallar. ℥ii. Comburantur omnia. Huic cineri adde ladani triti ℥ii. ol. lentiscini & vin. vet. an. q. s. & cum axungia ursina f. linimentum. Caput rasum fricatumque diu, abluatur decocto absinth. adianth. abrotan. deinde ungatur præscripto linimento. Notandum pinguedinem ursinam propria quadam qualitate omne capillorum defluvium maximè juvare. *Nicolaus Fontanus. Analect. cap. 8.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### De Alvi adstrictione.

**N**Ovi illustrissimas & formosissimas dominas, quæ cæterùm sanissimæ, & quotannis uterum gerentes, nunquam nisi vigesimo, vel serius die, alvinas feces deponerent; nec quidquam inde incommodi etiam puerperæ sentiebant.

Vixi cum sacerdote religioso, omnium quos novi mortalium ingeniosissimo, linguas enim Orientales, Hæbreæ, Syriacæ, Arabicæ, autotidactos ita calluit, ut eas publicè, in celeberrima Germaniæ Academia docuerit, summa cum laude. Hic nunquam nisi post 24. diem alvi beneficium à puero sensit, sanissimus, nec ullum unquam expertus pharmacum.

Generosus quidam jam multos annos ita vivit, ut fecum alvinarum nihilo plus per anum quàm per oculos excernat, accumbit sub meridiem mensæ opiparæ, convocatis ut plurimum aliquot nobilibus; comedit, bibit, nihil à quoquam accumbentium discrepans. Sub horam primam surgit à mensa, pridianum prandium, removit, retentis accuratissimè om-

nibus recens ingestis, postridie illa, ut hæsterna egesturus, putidissima, atque ab alio stercore non differentia, in vomitione conatus nullus, mora nulla, simul & semel magnam quantitatem extomachatur, abluto aquis odoratis ore, ad mensam reddit: ventriculum interim quod illi in sequentis diei meridiem satis sit, resumere cogit, jentacula, cœnasque ignorat, solo prandio contentus. Sic jam ultra 20. annum continuat.

Sæpè mihi in mentem venit, duos illi, ut animantibus ruminantibus esse ventriculos, quorum unus altero recens impleto vomitu se depleat. *Henricus ab Heers, observ. 29.*

Amicus quidam meus non solum 10. 15. aut 20. dierum spatio incolumis sine fecis dejectione servatus est, sed contigit aliquando, alvum, ita exsiccatam fuisse, ut usque ad tres menses sanus perfectè extiterit. *Dominicus Panarolus, observ. 1. Pentecoste 1.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

### Pro Alvo constipata in virò quodam.

**C**UM nullis medicamentis solvi poterat alvus, & jam per dies 14. ex toto suppressa erat, ipsi statim dedi mox ante cibum ℥i. sequentis electuarii, è Zizibus dicti devorandam, quo certè alvus continuò fuit emollita, mota & subducta, nec de novo alvus suppressa fuit.

Electuarium è Zizibus ζορραγωγός sic se habet.

℥℥. Polip. q. recent. bene mundat. ℥viii. sol. orient. rad. althææ an. ℥iv. anisi ℥ss. fiat omnium decoctio S. A. in aqu. font. donec veniat ad ℥bii. plus minusve, postea cola cum levi expressione. Colaturæ expressæ adde pulpæ Zizibi (i. e. juiub.) tota cum vino albo potenti & maceratur in dicta decoctione, postea per setaceum transmissa, ibi. Sacchar. albisse ℥iv. bulliant iterum ad cidonyati consistentiam. In defectu Zizibi, ponatur uva passa detractis arillis.

Hoc Electuarium communicatum est; ab excellentissimo D. Doctore *Alexandro Petro-*



*Petronio, Martinus Rulandus, curation.*  
79. *centur.* 10.

*Hier. Thriverus, comm. in aphor.* 20. *sect.* 2. *Hippocr.* scribit; rusticos jamdudum nosse experientia, si nudis pedibus humi obambulent, ventrem pertinacem solvi, atque eius rei historiam refert *Brassavolus. cap.* 6. *tract. de medic. purgant.* dum scribit Ferrariensium Ducem Borsium in alvi duritiem incidisse, & per tri-duum nihil excrevisse, & consultum ea de re Medicum eo tempore insigniem, Michaellem Savonarolam, suasisse clysterem iniici, quo nihil proficiente, iussit pavimentum, quod erat marmoreum, frigida aqua copiosiore conspergi, & Ducem lecto surgere ac nudis pedibus ambulare: non 50. passus perrexerat dux, & per ventrem dolorem, ac *Βορβορυμδ'* sentire cepit, sedem petiit, & potentissimè excrevit, quo facto iussit Savonarola, aqua in qua herbae calidae essent decoctae, ducis pedes, ac crura ablui, quod consilium, Dux centum aureis remunerari iussit.

Hoc procul dubio accidit ob pedum; quem cum partibus nervosis & membranosis, qualia etiam sunt intestina, habent consensum, & ob intestinorum refrigerationem; sicut alias etiam, si venter frigori exponatur, dolor colicus, & alvi excretio copiosa excitari solet.

Verùm *Brassavolus* hoc periculosum auxilium esse putat, & non tentandum, cum tormina inducere possit, & Diarrhæam. Nonnullis ex solo purgantium odore, alvus laxabatur. Novi Medicum cui si in vola manus, pomum colocynthidis contineret, donec incalesceret, alvus laxabatur. *Daniel Sennertus, cap.* 4. *Sect.* 2. *par.* 2. *libr.* 3. *practica.*

Cuidam alvi faeces duræ in podice subsisterunt, nec egredi et si vehementi conatu propellere tentaret, poterant, adeo ut podicem, cum cruciatu, nimium aperirent, & veluti divellerent, huic ut mederer, sternutationem movi, & cum tussire iussi, prius podice fomentato cum oleo, quibus conatibus & impetibus Scibalon propulsum & ejectum est, reliqua-que excrementa subsecuta sunt. In mul-

tis aliis, quibus ob duritiem excrementa ægrè per podicem feruntur, tussim imperando, ea ut prodirent, quæ alio conatu exprimi non poterant, effeci. *Felix Platerus, observat. lib.* 1. *pag.* 225.

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### *Pro alvo duriorè.*

**S**eni cuidam, qui singulis tribus septimanis, aut aliquando mense alvum semel reddebat, hoc consilium dedi ut pinguibus jusculis uteretur, in quibus & malva incocta esset. Romana quadam mulier urtica tenella ex oleo & sale comesta alvum sibi reddebat. *Petrus Forestus, observ.* 24. *lib.* 21. *de mesenterii & intestin. affectibus.*

Linimentum hoc illitum umbilico alvum movet, nec post se detrimentum relinquit.

*℞.* Ol. amygdal. d. rec. pinguedin. anser. butyr. mai. unguenti dialth. an. ℥ii. colocynthid. gr. xvi. salis diss. spec. hirc. simpl. di. diagrid. gr. iv. M. pro linimento. *Reinerus Solenander, consil.* 29. *sect.* 3.

In tardissima alvi deiectione à quacunque causa procedente mirabilis est effectus essentia salis tartari cum spiritu vini extracta, & ad consistentiam redacta, cuius guttae ii. usque ad iv. vel viii. singulis diebus vesperi, horis duabus a cœna in haustulo vini, vel alio liquore exhibeantur, donec sponte subsequatur lubricitas alvi. Hoc felicissimè usus tum in melancholia hypochondriaca. *Job. Harmanus, pract. Chimiatriæ pag.* 189.

Vidi duos qui nullo antimonio, aut alio ecprotico nè quidem hellebori extracto alvum laxabant, cum meo consilio propriorum unguium, præsegmina & rasuram bibissent, vomitu iuxta læcèsi-que abundè se deplebant. *Henricus ab Heers observ.* 29.

Cum quidam sint, qui non possunt nisi purgationibus, Clysteribus, supposito-riis, ptisanis, vel aliis irritantibus remediis alvum exonerare, remedium iucundum & facillimum hic inferere volui quo alvi pigriores benignè excitantur:



torreatur mica panis, oleo olivarum irroretur, & mane deglutiatur, & videbis effectum si bis vel ter idem facias. *Petrus Borellus, observ. 14. cent. 2.*

In constipatione ventris fumantur ante prandium 4. caricæ sarcitæ carthamo mundato. *Arnoldus de Villa nova practica summaria capite undecimo.*

Vir quidam natus annos supra 90. incurrit in alvum constipatam toto mense cum febre quotidiana, dyspnæa, anorexia, siti, dysuria pervigiliisque. Sed Deo Omnipotente Archiatro sanus iterum evasit in hunc modum.

℥℥. Vini Absinthiaci lib. ii. fol. sen. mund. ℥i. Macerentur simul, fiatque infusum. Istud vinum bibit in prandio & cœna, ac pro sedanda siti; & ubi ebibit primæ huius macerationis vinum, affudit & infudit secunda, item tertia vice supra eandem prius maceratam Senam aliud recens vinum absinthiacum. Quod cum indies biberet; laxatus ac purgatus mox fuit indies sine molestia, caputque facile & absque dolore lotium reddere, febris desit, sitis remisit, appetitus rediit citra difficultatem spiravit, beneque dormivit, atque omnia præter omnium spem Dei Omnipotentis manu & ope in senē decrepito intra dies 12. ad eò meliora facta, ut diceret sese a morte reviviscere, & iuvenescere ex senio. *Martinus Rulandus, Cur. 90. Cent. 5.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### De Alvi pertinaci obstructione.

**V**ir quidam corpore athletico post viscerum intemperiem, & gravem morbum per 18. dies, alvum habuit suppressam, cui ter injecti, clysteres sed in ventre resistentes & alia medicamenta exhibita, non potuere ad obsequium sollicitare. Tandem cum omnia videret esse conclamata, nec ullam superesse sanitatis vitæque diuturnioris spem, amicos convocat, inscissque medicis aliquot vini rhenani Cyathos ebibit, solitas delicias, ultimum ita vale illis dicturus, Dehinc tamen post vini, cuius usu assue-

*Brunet Parte I.*

verat, haustum siccatosque calices, murmure in ventre oborto, liberaliter soluta alvus agerque medicis stupentibus, celeriter pede ad se, & sanitatem rediit, dinque superstes inter amicos pancreaticæ vixit. *Thomas Bartolinus, Histor. 40. centur. 5.*

Quidam sutor per mensem aut ultra, feces alvi non excreverat, multis clysteribus, ac potionibus purgantibus frustra usurpatis, tandem interiit; aperto cadavere, omnia intestina inventa sunt fecibus, aut alimentis vel potulentis, omnino repleta, instar sanguiculorum vulgò (*boudins*) quod iudicatum fuit à facultate intestinorum expultrice abolita provenisse. *Samuel Forminus, observatio- ne 18.*

Cum longa alvi suppressio, an ideo ad acerrima clysmata recurrendum? nequaquam, imò blandiora sæpius repetita magis conferunt, vehementiora sæpe voluolos iutulerunt, efficiunt enim ut puncta acrimonia medicamenti intestina, motum peristalticum suum internè sursum immutent. *Gulielmus Ballonius, Epid. & Ephemer. libro primo.*

## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

### Pro Alvi fluxu in puero.

**P**uer quidem 4. annos natus, diuturno alvi fluxu laborabat, cum inappetentia & dejectione virium. Origo illius alvi fluxus erat ex prava victus rationem, cum enim plurimis cibis ingurgitabant, & merum aliquando ei exhibebant. Indè calor nativus ita attritus est, ut alimenta in cruda & pituitosa excrementa converterentur; nihil enim ferè, nisi meram pituitam deiciebat, quo tempore cum videre cepi, cum tamen antea flava viridia, eruginosa, & sanguinolenta rejecisset. Instituti victus ratione, præscribo medicamentum ex Syrup. de cich. cum rheo ℥i. cum rei ℥℥. per triduum exhibendum deinde tincturam coralliorum manè & serò sumendam ad cochlearia duo; intra 5. dies melius habuit, & continuatis remediis,

B

pau-



paucis diebus restitutus est. *Lazarus Riverius, observ. 88. cent. 2.*

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

*Pro Alvi fluxu cholericis febribus intermittentibus superveniente.*

**Q**ui febribus intermittentibus biliosis, & malignis laborant, præcipue duplici tertiana, propter multitudinem materiæ biliosæ furentis in choleram morbum incidunt, recurrente paroxismo, cujus impetum si non frænaveris, medicamentis infra à me describendis, morietur æger intra duos aut tres paroxismos.

Vir quidam literis apprime tinctus, ejusmodi febre laborans, vix potuit à paroxismo servari, cui supervenerat cholera morbus; frigus marmorcum, pulsus minutulus, & semè deficiens, oculi concavi, aliaque horrenda symptomata. Tandem post innumera adhibita remedia, a faucibus orci reddiit. Ego ut crastinam tempestatem averterem, jussi ægrotum panatellis crassiusculis & gelatinis recreari, ut frænum injiceretur humoribus sequenti die sævituris. Epithemata præscripsi, & opiatas ex conserva rosarum bugl. borrag. myrobal. saccharo conditis, margaritis tribus verò horis antè paroxysmum, Clysterem hunc mirabilem iniiciendum curavi, sine quo actum erat de meo amico.

℞. Ros. rubr. Mi. Coqu. in juscule capitis & pedum vervecis, in colaturæ libi. dissolve theriacæ recentis ℥ii. vitellum ovii. F. elyster, quem retinuit ad reditum usque paroxysmi, qui alvi fluxum reduxit, sed minorem multò. Huic methodo inhærens multos deploratos servavi. *Petrus Pacheguus, observ. 4.*

## SECTIO DECIMA NONA:

*Pro Alvi nimia profusione à medicamento cathartico.*

**I**n nimio profluvio hoc maxime juvare solet.

℞. Theriac. ℥ss. aq. theriacal. ℥ss. aq. Cinamom. aq. Card. ben. ℥ii. Mss. homo hydræleo tepido immittatur.

Ultrajecti quidam in officina Medica, me præsentem, purgandi causa, bellebori albi radices siccas masticabat, & vorabat: dicebat se sæpius id fecisse innoxie: tandem nimia alvi profusione enecatus fuit. *Iob. Heurnius, ad Aphor. Hippocr. Sect. 5.*

## SECTIO VIGESIMA.

*Ad Alvum sistendam.*

**E**lectuarium hoc mihi semper cum successu familiare fuit.

℞. Sem. ros. oxalid. plantag. portulac. an. ℥i. corall. rubr. c. c. usti, an. ℥i. amyli, tragacanth. an. ℥ss. Sacchar. rosar. veter. ℥iv. cum Syrup. de rosis siccis, q. s. F. Electuarium, cujus ℥ss. detur tribus saltem horis ante prandium, *Iob. Zechius, consult. 37.*

## SECTIO VIGESIMA PRIMA

*De Amaurosi.*

**A**maurosis (quæ species est cæcitatæ & gutta serena vulgo dicitur) affectus est oculi, in quo visio prorsus perditur, nullo sensibili vitio in oculo apparente generatur ut plurimum anervorum opticorum obstructione perfecta, aliquando etiam ab eorum adstrictione & compressione, vel humore pituitoso, sanguine, pure, aliave materia circa nervos illos collecta & cummulata, vel à tumoribus quibuscunque in iis partibus genitis. Huic morbo affinis est alius affectus, qui ambluopia vocatur, quæ visus est hebetudo, citra manifestum oculorum vitium. In hoc conveniunt, quod in utroque illæsus conspiciatur oculus, pupilla clara & nitida existente: in eo verò differunt, quod in amaurosi, visio toto pereat, in ambluopia duntaxat imminuatur. Hæc eandem cum amaurosi agnoscit sui causam, sed imbecilliolem, obstructionem nimirum nervorum imperfectam, spiritum



tum item inopiam & crassitiem. Apud authores practicos confunduntur sæpe hi duo affectus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Amaurosi, seu visus imbecillitate.*

**C**Omnes quidam *Lotharingus* de visionis imbecillitate conquerebatur, quod resexactè, siue propinquas, siue distantes, dijudicare non posset, obstare dicens veluti summum, seu nubeculam quandam, quæ sibi visum obscuraret. Cum omnia diligenter inquirerem, nihilque in pupilla obscuri appareret, & non semper in eodem statu permaneret, hic visionis defectus, sed nunc major, nunc minor esset, à vaporibus potius, quàm vitio in oculo hoc evenire judicavi, atque ostendi vapores non oculum subire, uti credebat, sed cerebrum, juxta nervorum opticorum exortum, impetere. Usus jam erat multis evacuationibus & diversionibus, & inter reliqua etiam setaceum in cervice gestabat.

Præscripsi illi pilulas sequentes.

℞. Fol. Sen. (oculi appropriata esse creditur) ℥ij. sem. fœnicul. ℥ij. pil. sine quibus, & Lucis, an. ℥ij. cum Syrup. de tumaria, quæ & ipsa oxydorifica est. F. Massa. Capiat ℥i. singulis mensibus ter sine custodia, cum leviores sint.

Cucurbitulas applicet menstruatim duas collo, duas scapulis sine scarificatione, continuando per triduum.

Paretur vinum hoc Euphragiatum visioni convenientissimum, de quo nonnunquam haustum in mensæ principio, vel mane bibat jejunos: sic enim ejus vis, per vapores cum vino rectius ad caput ascendit.

℞. Fol. Euphrag. sic. ℥i. rad. fœnicul. ℥iij. fol. caryophyllatæ ℥vi. beton. verben. majoran. an. ℥ß. flor. rosmar. ℥iij. sem. Fœnicul. ℥ß. gran. juniper. ℥i. incidantur, & in dolio collocentur, affunde vini albi generos. mensuras 10. vel. 12. serventur ad usum vel vindemiarum tempore affunde mustum recens, & finito effervesce. Poterit & cinnamomum ad gratiam addi.

Pulverem sequentem mensura unius cochlearis, noctu cubitum iturus, præcedenti lævi cœna, sumat superbibendum parum vini, vel proiectum in vinum cum eo bibat.

℞. Sem. coriand. præp. ℥iij. sem. fœnicul. anis. an. ℥i. carvi, Sileris mont. an. ℥ß. Sinapi ℥i. fol. Euphrag. majoran. an. ℥ß. Cinamom. ℥iij. maceris, ℥ß. Caryophyll. ℥i. Sacchar. ros. tabell. ℥iij. fiat pulvis subtilissimus.

Sal in mensa ad manum habeat, quo ova recentia, vel etiam alios cibos quandoque saliat.

℞. Salis puri ℥iij. sem. cavi ℥i. fol. Euprag. majoran. an. ℥i. nuc. mosch. ℥ß. F. pulvis.

Comedat frequenter iccora caprarum iuniorum assa, confrixa caryophyllis & cinamomo. Hæc & illi & alteri cuidam, admodum profuerunt. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 106.*

Uso vini Euphragiatum oculi senum rejuvenescunt; aufert impedimentum eorum, & defectum visus in quocunque homine. Quidam permansit nihil videns per longum tempus, & intra annum restitutus est ei visus ejus usu. Habet hoc herba à proprietate, & quando pulvis ejus comeditur cum vitello ovi facit idem; vel de pulvere accipiat cum vino. Insuper sunt testes fide digni, qui periculum fecerunt in se ipsis, non poterant legere sine specillis, legerunt postmodum absque illis etiam litteram subtiliorem: ita ut usus vini Euphragiatum non habeat simile in conferendo visui. *Arnoldus Villanovanus. tractatu de Vinis.*

Opiata ad hunc affectum ita componi poterit.

℞. Conserv. flor. beton. & anthos. an. ℥iij. myrobalan. condit. num. 2. theriac. vet. ℥iij. pulv. fol. Euphras. ℥iij. sem. fœnic. ℥iij. nuc. moschat. cinam. & caryophyll. an. ℥i. cum syrup. ex succo fœnic. rutæ, chelidon. cum melle confecto: fiat Opiata. De qua capiat ad magnitudinem castaneæ superhausto vini aqua fœniculi diluti momento. Topica oculis adnota nullius aut exiguae sunt efficaciæ, propterea quod eorum vis ad nervos opticos penetrare non possit. In casu desperato, postquam omnia remedia frustra usurpata sunt, vesicatorium toti



capiti raso instar cucuphæ admotum multum aliquando profuit, etiam bis aut ter admotum, ubi priores vesiculæ & ex coriathiones exsiccatae fuerint. *Lazarus Riverius, Practic. lib. 2. cap. 1.*

Experimentum ad oculos aureum, quod *D. Insellio ex Italia* transmissum fuit.

24. Mell. anthos. q. s. despumetur, diligenter, ut fluxilis seu fluentis maneat consistentiæ, & cera separata sit ab eo. zinzib. optimi, caryophyll. opt. contusi minutissimè, salisan. ʒss. M. omnia cum melle. f. unguentum. Huius frustulum quantitate sem. sinapi indito in oculum affectum. Primum quidem mordet oculum & vellicat; sed statim desinit, & plurimum humiditatis inde ex oculo effluit. Hoc unguento *Kratislavia* scemina quædam, quæ per 14. annos altero oculo nihil vidit, curata & pristinae sanitati restituta fuit. Usa autem fuit eo bis in die. Præterea Unguentum hoc omnem etiam cataractam tollit & adimit. *Job. Philipus Brendelius. Consil. 55.*

Juvenis mulier in guttam serenam inciderat, quæ ita afflicta fuit, ut cibi abstinentia sibi mortem inferre decreverit; cum tamen maritus & astantes aliquid iusculi aut vini sorbere per vim cogerent, & illa perexiguam sumeret, omnia quantum poterat respuendo. In eo statu per annum integrum, perseveravit, & ad extremam maciem perducta est, calore nativo, defectu pabuli, humidum substantificum depopulante. Cum eo verò omnis simul corporis humiditas, tum ipsa materia guttam serenam efficiens, absumpta est, & sic ægra visum recuperavit ac post modum sensim victu analeptico resecta est. *Samoel Formius, Observ. 29.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Amaurosi ad principem quendam.*

**I**N victus genere, inter alia hæc celebria habentur.

Raparum in cibo usus acutiores reddit oculos. Passerum & columbarum esum visum mirificè tueri ferunt, nucis moschata in cibis pro condimento, & extra cibum, manè mediocris usus feminis scenicul. her-

ba in iusculis inter olera, & semen frequenter à cibo inter bellaria diu mansum, & deglutitum juvant, in cibis & cum cibo uti hoc sale commisto licebit, quo observatum est oculos caligantes & hebetiores mirificè recreari.

24. Nucis mosch. macis, cinamom. opt. cardamom. an. ʒi. fol. & flor. Euphrag. sic. ʒij. vel ʒiij. salis communis ʒi. F. omnium pulvis ad usum, vino mediocri, non admodum fumoso, aut generoso, non dulci, neque crasso, non musto, uti juvat. Euphragiati vini continuus usus plurimos restituit hoc vitio laborantes etiam senes, qui ocularium ope diu antea vix difficulter viderant.

Arnoldus de Villa nova Medicus celeberrimus, mirum in modum laudat, & ego aliquoties in operibus artis verum comperi. Non temere hæc herbulæ in floribus, oculorum characterem, & signaculum a natura impressum habet.

Euphrasia benè asservata sicca pro magnitudine vasis quantitate convenienti musto injicitur dum effervesceat, cum defecatum expurgatumque vinum est, asservatur remedio probatissimo.

Si ventriculus ferre potest, nec concoctio labe factatur, cum simplicis puri puti vini in mensa usus fuit, magno commodo haustus aquæ fontis puræ prandium & cœnam claudat, nam ita minus vaporum è cibo in cerebrum fertur. *Aristot. in Probl.* scribit, eos acutiùs videre qui aquam bibunt.

Præparanda quoque ex flosculis Euphrasie recentibus, & saccharo, conservata, cum frequens Euphrasia floret eo modo quo rosacea conserva apparatus, ex florum parte una, sacchari duabus, & si haberi tum possunt roris marini flores, etiam istorum partem addere licebit ista conserva mane & vespere sumenda iuglandis quantitate, potissimum vespere, cum decumbendum erit: ita juvatur concoctio, tolluntur viscerum obstructions, visus hebes non solum instauratur, verum & ceteri sensus vegetiores fiunt, & memoria confirmatur.

Ad corporis quoque & capitis ab excrementis purgationem laudo ut Celsus. tua subscriptis pilulis utatur, subinde noctu cum decumbendum erit, deglutienda una

atque.



atque altera pilula, ternis aut quaternis quibusque diebus, ita semper aliquid excrementitium paulatim, & quasi insensibiliter à capite abducitur, & si quando in oculos maior humorum influxio urgeat, illarum pilularum, statim  $\text{℥} \text{iv}$ . plus minus, i.e.  $\text{xxi}$ . pilulæ post mediam noctem, vel summo mane deglutiantur. Pilulæ hæc esse possunt.

$\mathcal{R}$ . Massæ Pil. Hier. cum agar.  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . Aloes rosac.  $\mathfrak{z} \text{i}$ . pil. Lucis, asai. ceret. an.  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . rhab. opt.  $\text{aq}$ . Cinam. irrorandi  $\mathfrak{z} \text{i}$ . cum Syrup. ros. solut. F. pasta mollis instillando ol. fœnicul. gutt. v. F. pilulæ molles ex qualibet  $\mathfrak{z} \text{i}$ . pil. num. 8. super pulvere nucis moscatae.

Oculis quæ insequuntur tutissimè, & cum singulari iuvamento ad moveri possunt manè, cum nullum efficacius medicamentum ad manum est, massicentur grana aliquot fœniculi, item aliquando tantillum cinamomi, istis iam infecta saliva tingantur & illinantur leviter oculi summo digito. Itē fœniculi & cumini semen pinsatur in pane, is calens ē forno extractus, & discissus admoveatur ita ut oculi vapore madescant. Vel hordeaceus panis calens ē forno extractus dividatur medius, & asperso ad inferius latus, fœniculi & carvi semen pulvere, adhibeatur ita oculis, ut fixi in panem intuitu oculi vapore ipsius humectentur, ita absumpta in oculis excrementitia humiditate, lentoreque ipsius & crassitie tenuata & absterfa, vaporibus crassis discussis, visus mirum in modum facili remedio recreatur & reficitur.

Verum quia hæc etiam si paratu facilia sunt, non tamen semper haberi possunt, præscribam hic ordine tria, quæ apparari in tempore, & in usus adservari possunt. Primum hoc esto.

$\mathcal{R}$ . Succ. rutæ per residentiam depurati  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . succi euphras.  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . succ. fœnicul. defæcat.  $\mathfrak{z} \text{iv}$ . Mell. virgin. puriss.  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . mista ponantur in ampulla vitrea menses tres ad solem secus parietem, deinde coletur succus instilletur quotidie, si res ferat, digito una gutta in oculum quemque. Alterum hoc sit.

$\mathcal{R}$ . Chelidon. maj. verben. rutæ, fœnicul. Eupras. ros. an. Mi. vel ii herbas recenter manè cum rore lectas & selectas minutim consinde & impone in vitream cucur.

*Brunet Parte I.*

bitam, & lento igne per Bal. M. destilletur aqua pro oculis humectandis.

Tertium quod etiam *Antonius Valerius* in Hollerium, sed paulò aliter adnotavit, erit sequens quod ego etiam antea a Bairo monitus, iam dudum in simili casu compari efficax fuisse.

$\mathcal{R}$ . Ovum recens, coqu. sub cineribus ad duritiem, tum dividatur medium, & eiectio vitello impleatur tribus partibus vitæ Romani, & una parte lapidis calaminaris, exacte pulveratis & mixtis, deinde ambabus partibus ovi aptè colligati, maceretur in  $\text{aq}$ . ros. partibus duabus,  $\text{aq}$ . fœnicul. & Euphras. utriusque parte una, ex quantitate, qua mergi largè ovum possit idque dies tres vel quatuor, deinde per tenue linteum mundum exprimatur liquor cum affusa aqua, & servetur in vitreo vasculo pro collirio, ex eo quotidie oculis cum digito aut penna instillando.

Si forte aliquando ex novo sanguinei humoris influxu malum exacerbatum fuerit, ita ut rubore, calore, dolore oculi infestentur, iuvabunt sequentia. Veris tempore cum salix floret, inciso cortice fluat liquor quidam, vel detracto cortice abstergitur, is oculis instillatus aut illitus, mirum quam superfluum humiditatem absorbendo lachrymas oculorum sistat, & hebetem visum exsuscitet recreetque, deinde hoc collirio uti licebit, quod dolores lenit, ruborem discutit, calorem & humoris acrimoniam temperat, & influxum exsiccat, & arcet, visumque recreat.

$\mathcal{R}$ . Gum. arabic. tragacanth. ceruss. lot. an.  $\mathfrak{z} \text{ii}$ . lap. calamin. tutiæ præparat. an.  $\mathfrak{z} \text{i}$ . vitriol. rom.  $\mathfrak{z} \text{ss}$ . Camphor. gr.  $\text{iii}$ . Sarcocoll. nutritæ  $\mathfrak{z} \text{ss}$ . amyli, cortic. ovorum pulv. an.  $\mathfrak{z} \text{i}$ . thur. alb. gr.  $\text{viii}$ . cum album ovi F. trochisci exigui.

$\mathcal{R}$ . Horum trochiscorum 4. aut 5. includantur puro tenui linteo, & iniciantur in vitrum affusis aquis rosac. partibus tribus, fœnicul. pt. una quantum visum fuerit, tum adde tantillum sacchar. candidi & bene tecta asserva: ista aqua laventur sæpe oculi noctu & interdium.

Hic monere Celsitudinem tuam volo, ut primo vere imperet, ut fol. cydoniorum integra, illæsa, colligant, eaque diligen-



ter adservent, ne situ, pulvere, aliisve inquinamentis oblādantur, horum foliorum licebit subinde manipulum integrum accipere, incoquere purissima aqua: ea saepe numero oculi hebetes laventur; mirum quam istos præservant, ruborem discutiant, & influentem humorem arcent, quod sine ullo incommodo fieri potest. Ad humorem etiam capitis absumentum, cerebrumque & ipsius partes roborandum, vesperi inspergantur sincipiti tria aut 4. grana pulvisculis caryophyll. vel rorismarini foliorum, nam mirum quantæ sit hoc leve remedium efficaciam. *Reinerus Solenander, consil. 8. sect. 2.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### *Pro Amaurosi in puero.*

**H**Oc malo cum premeretur puer quidam, & ilæso apparente oculo, videndi actione prorsus careret; & distillatione è capite per multos annos, per oculos excreta copiosa materia, crassa & sordida, laboraret, hunc obstructione instrumenti, hoc est visualium nervorum, per quos vis viva ad chrystallo idem videtur, esse affectum deprehendimus. Vitium hoc ab omnibus putatur incurabile. Nos hoc ordine curationem sumus exorssi, instituto regimine recto, celebratisque auxiliis universalibus, quorum ope mucosa excrementa sunt evacuata, per 30. dies sudationes imperavimus ex radice Chinæ. Deinde cuculis exsiccantibus, & lavacris supra caput admotis, rasis prius pilis, usi sumus Masticatoria & errhina medicamenta non prætermisimus, quorum ope, tenax per os & nares excernebatur humor. Ut nares spirarent, quæ cum oculis maximè consentiunt, causticum retro ipsas affiximus, & simul setonem nucae indidimus, ut per has partes vacuaretur humor in oculos delapsurus, toto, & capite belle repurgatis à levioribus collyris incepimus; primum fuit verbenæ decoctum, pulvis ossis sepiæ, succus rutæ, & fœniculi depuratus, aq. stillatitia ex raphanis & eorum foliis, mel cum marrhubii succo, decoctum Euparasiæ, Chelidonæ. His factis

inditum est testitudinis fel, cum saccharo candido commistum, vinum album in quo aurum quinquies erat ignitum, at cum lucem jam aliquantisper videret, hoc deinceps auxilio, quod licet videretur contemtibile, est tamen mirabilis efficaciam, visum recuperavit.

24. Frustula porcinæ carnis vetustæ, ea in minutissimas taleolas seca, serva in olula parva adjecto sale & odorifero vino albo, post 10. dies aqua stillabit, quam ad recuperandum visum, roborandos nervos visuales, auferendam obstructionem, mirificam opem fidissimo experimento adinveni. *Zactus Lusitanus, observ. § 6. lib. 1. prax. admirand.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### *Pro Amaurosi a tumore globoso nervos opticos premente.*

**G**Allus quidam jurium studiosus Basileæ versans, dolore capitis correptus est mox secuta febris, qua cessante, cephalalgia reliquæ aliquæ nihilominus remanserunt, cum vigilis & capitis imbecillitate, tandem in oculo sinistro, visio obscurari cœpit, & post mensem etiam in dextro oculo, secutaque est paulo post in utroque oculo omnimoda amaurosis, seu cæcitas, nullo vitio in oculo apparente. Postmodum etiam cæcus ille, convulsionibus laboravit, quæ illum per vices, tota hyeme affligebant; quibus initio veris cessantibus, supervenit tussis, febris hæctica expulsio purulenta, & tabes, qua diu molestatus & consumptus, tandem expiravit. Corpore per anatomen aperto, pulmonum vitium deprehendimus; verum cum causam cæcitatis, aperta calvaria in cerebro perquireremus, invenimus cerebrum, aqueo copioso humore irriguum, partemque illius anteriorem, sinistra præsertim in sede, tumidiorem, à qua cum portio adimeretur, inventus est tumor seu globus quidam glandula seu strumæ instar inclusus in cerebri substantia, ab ea tamen separatus, propriaque membrana dura contentus; per quam venæ aliquæ capillares dispersæ erant, ovæ gallinaceæ magnitudinem



dinem superans, inæqualis & formam pie-  
næ nucis exprimens, cujus interior substan-  
tia, albida & æqualis ovi albumen coctio-  
ne induratum, referebat sed durior illo e-  
rat. Hic, cono obtusiore, nonnihil sur-  
sum prominebat, basi verò latiore, ven-  
triculo cerebri, anteriore sed innitebatur,  
& pondere suo, quod erat  $\text{Zxxiv}$ . nervorum  
opticorum exortui in cerebro, incumbebat,  
eosque comprimebat. Quam causam fuisse  
cæcitatis, quod spiritus animalis transitus  
ad oculos fuerit impeditus, conclusimus;  
cùm alioquin in nervis opticis nulla ob-  
structio, aut aliud vitium, uti nec in ocu-  
lo apparuerit. Hinc conicere licet, graves  
& diuturnos cerebri vitio accedentes & in-  
curabiles morbos, ab ejusmodi, occultis in  
cerebro latentibus tumoribus, aut vitiis,  
frequenter accidere, & cùm rarissimè hæc  
secciónem indagentur, Medicos, qui causam  
cerebri in temperiei, aut humoribus attri-  
buunt, atque hisce remedia accommodan-  
do, oleum & operam perdunt, latere.  
*Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 108.*

## SECTIO VIGESIMA SECUNDA.

### De Ambustione.

**A**mbustio est solutio continui, epider-  
midis & cutis ut plurimum, nonnun-  
quam etiam carnis musculosæ, venarum,  
arteriarum, nervorum, &c. vi ignis impref-  
sa, quam sequuntur mox dolor acerbissi-  
mus, inflammatio, pustulæ, & si combu-  
stio profunda, corpusque cacochymicum  
fuerit, ulcus foetidum & malignum: ambu-  
stionum tres sunt gradus seu species, levissi-  
ma nimirum, mediocris, & insignis. Si  
materia quæ erit, non usque adeò diu cor-  
pori adhæserit, aut levis, fuerit, tunc tan-  
tummodò eleventur pustulæ, estque hic  
primus gradus; cujus signa sunt, cutis ru-  
bescenda, dolor pungitivus, & nisi statim  
remedia adhibeantur, cuticulæ à vera cute  
separatio, cum vesicarum eruptione, in  
quibus aqua alba & limpida continetur.

Secundus gradus censetur, si materia  
paulo diutius adhæserit, aut violentiore  
calore prædita fuerit, tunc enim non solum  
elevantur pustulæ verum etiam ipsa cutis  
aduritur, exsiccatur, & contrahitur, non-

dum tamen facta est crusta vel eschara: di-  
gnoskitur hæc species, quòd præter partis  
affectæ ruborem & dolorem illicò & ipso  
momento eleventur pustulæ in quibus con-  
tinetur aqua subtilis, & flavescebat, æger-  
que de tensione cutis conqueratur.

Tertius gradus dicitur, si res ignita diu-  
tissimè adhæserit, & violentissimum calo-  
rem in se continuerit, tum non solum cu-  
tis, verum etiam caro, venæ, arteriæ, ner-  
vi, &c. Comburentur contrahuntur, & in  
escharam siccantur. Hujus signum est, si  
subjecta cutis nigra, vel saltem livida con-  
spiciatur, & si scalpello pungatur, obtusè  
sentiat, dura nimirum, & exsiccata existen-  
te crusta, quam demum deciduam excipit  
ulcus profundum & putridum.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Ambustionibus.

**I**nter selecta medicamenta combustionibus medentia, hoc primatum obtinere certum est.

$\text{Zc}$ . Lauri folia, super quæ porcinam pin-  
guedinem ignitam de alto cadere facies,  
quousque folia ipsa in cinerem vertantur:  
eo verò cinere pinguedine obvoluto ac in  
unguenti formam redacto, combustionem  
particulam inungens bis in die, & eam intra  
tres dies sanam reddes. *Amatus Lusitanus, curat. 92. cent. 2.*

Puella quædam aqua ebulliente super  
ventrem ad umbilicum excocta fuit, unde  
vesiculæ ortæ sunt, & tanquam mortua ja-  
cebat, ad eam vocatus, unguento populeo-  
ne totum ejus ventrem illiniri feci, & vitis  
folia superaddere, quo remedio intra 4 ho-  
ras, puella ad se rediit, & paucis postea die-  
bus, ex toto sana evasit. Quòd verò intus  
intestina, ex aquæ ingenti caliditate, tu-  
muerint, unde symptomata prædicta or-  
tum traxerunt, pro certo crediderim. Ul-  
cera tamen postea ex unguento, à calce sæ-  
pe loca, parato, sana sunt reddita, *Amatus Lusitanus, curat. 34. cent. 4.*

Optimum auxilium est lutum superim-  
positum, quam citissimè, mirificè enim, ut  
sæpius vidi, dolorem mitigat, cruciatum  
lenit, & eutem tuetur, *Dominicus Pana-  
rol. obs. 22. Pentec. 3.*



## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Ambustione.*

**A**D Ambustionem utimur mucagine sem. Cydon. cum aq. ros. extracta, ut in nepotulo meo, qui ex igne oculum combustum habens hoc modo pluma ad-mota curatus est.

Mulieri cuidam in fronte ab igne combusta, applicata est ex alterius mulieris consilio, hæc mixtura, quæ illicò dolor intensissimus sedatus est, ipsa combustio curata.

24. Mell. farinæ triti, an. part. xq. vitellum ovi unius, probè inter se mista apponebantur.

Elideus præceptor meus, si nihil aliud ad manum esset, utebatur succo cape, quo ambustionem obliniebat: dicebat succum cape multum conferre combustionibus à proprietate occulta, hoc etiam sequenti utebatur.

24. Ol. Hyperic. ʒi. calcis bene lotæ extin-ctæ ʒii. Ms & illiniatur locus affectus, donec sanatus sit. Idem quoque ad ambustionem primum applicabat albumen ovi, illud enim facit ne vestigium relinquantur. Deinde accipiebat calcis decies lote, lythar. auri an pt. xq. & cum oleo Hyperici faciebat unguentum, quo ungebat locum. *Pet. Forestus, obs. 16. lib. 2. observ. Chirurg.*

Mulieres Delphenses in famulis cerevisiariorum, applicant folia hederæ arboreæ cocta in aqua, & sic curant eos quando ab igne vel aqua calente quod sæpe fit, adusti sunt. Mulieri consulvi, ut cruri combusto folia hederæ decocta in cerevisia apponeret, & illicò optimè fuit curata. *Petrus Forestus, obs. 18. lib. 2. observ. Chirurg.*

Loco ambusto in principio linimentum hoc sine ulla dubitatione apponito. Ego enim ipsum expertus sum feliciter cum multis ambustis, & præcipuè cum *Angela* filia mihi charissima, quæ dum tertium decimum mensem ageret in ignem nutricis incuria cecidit, & totam fere faciem sibi combussit.

24. Albumin. duorum ovorum ol. ros. ʒii. aq. ros. ʒi. M. & simul omnia optimè con-quasentur: postea panniculus albus, subtilissimus, aut lini aut serici, madefactus prius in dicto linimento, superponatur lo-

co ambusto, & ligetur & nunquam aufe-ratur; donec convalescat; sed quotidie bis terve, sine remotione ipsius panniculi, lo-cus affectus, super ipsum panniculum in-ungatur & illinatur. Transacto verò prin-cipio, & hoc usque ad diem ambustionis quartum, loco albuminis ovorum, ponan-tur & conquassentur in dicto linimento vi-telli eorum, & semper super ipsum panni-culum inungit; donec videatur cutis rege-neratio nova fieri. Tunc vero cum forfice paulatim de die in diem, ubi nova cutis ip-sa & sanitas apparuerit, panniculum inci-dere debemus, adeò ut totus paulatim au-feratur, quo ablato videbitur locus affectus proculdubio sine ullo signo permanere. *Omnibonus Ferr. lib. 4. Art. Med. Inf. cap. 25.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Ambustione.*

**P**rimum & præcipuum negotium in combustionibus est, ut Chirurgus im-pediat, ne pustulæ oriantur, si enim id fie-ri possit, non est quod æger postea ullam molestiam vereatur, itaque quamprimum quis igne, aqua, aut oleo fervido, aut si-mili, quapiam re combustus, ac combustio levis fuerit, illicò locus ambustus aqua, aut proprio sputo madefiat & ab ignem admo-veatur, ut incalescat, quantum ferre po-terit, vel in aquam calidam immergat lo-cum ambustum: aut si id fieri nequit, in-tingatur spongia, aut linteam reduplica-tum in aqua calida, & applicetur: calor enim ille externus Empyreuma hoc est ca-lorem ab igne in parte combusta relictam, ad se attrahitur *Aristoteles* & experientia testantur: estque ignis, teste *Fernelio*, pro-prium inusti mali alexiterium. Cepe etiam in mortario cum sale contusa, & illicò loco combusto applicata, Empyreumata extra-hunt, nec sinunt ut pustulæ eleventur, pos-sunt & in taleolas scindi, & loco ambusto imponi una ad alteram donec tota pars combusta sit cooperta. Sequens quoque unguentum Empyreuma potenter extra-hit, nec sinit pustulas elevari.

24. Capæ crud. ʒi. salis, saponis albî venet. an. ʒi. M. in mortario, fiatque un-guentum.



guentum cum ol. rosac. & amygd. d.

Anno 1604. Cum dulcissima mea conjux sapam in magno aheno coqueret, ac ipsam spatula agitare vellet, ex improvise dextram ad carpum usque in sapam ebullientem immittit, ea autem manui tantò tenaciùs adhærebat, quantò magis ad consistentiam & spissitudinem cocta erat, ideoque illicò exortus est dolor vehementissimus, non solum in ipsa manu, verum etiam in toto brachio. Sapa abluta calida aqua, unguentum jamjam descriptum (quod opportunè tum temporis in promptu mihi erat) applicui; totum brachium oleo rosaceo inunxi, & fascia poscia intincta involvi, sæpiusque omnia illa reiteravi. Hinc divino favore, ex tanta combustione nulla secuta est cutis exulceratio, præter duas parvas pustulas, unam in pollice, alteram in digito indice, quæ tamen parvo negotio unguento basilicone curatæ fuerunt.

In combustionibus verò universalibus procedatur, quemadmodum sequenti exemplo declaratur.

Anno 1605. Paterniaci tinctoris cujusdam famulus, in ahenum tinctura calida plenum incidit. Hinc totius quidem corporis combustio secuta est, sed quia tinctura non omnino fervida, illæ potissimum partes corporis, quæ fecibus tincturæ in fundo aheni inhæserant, veluti brachia & facies, combustæ fuerunt, accersitus illicò totum corpus, facie excepta, unguento hoc inunxi.

℞. Saponis liquid. ℥ss. cæpæ crud. ℥ii. Sal. ℥iss. ol. vitell. ovorum ℥i. ol. ros. & amygd. d. an. ℥iii. mucil. sem. Cydon. ℥ii. M. F. Unguentum. Oculis sequens instillavi collyrium anodinum.

℞. Aq. ros. ℥iii. aq. plantag. ℥i. sem. cydon. & fœnugræc. an. ℥ss. M. maneat in infusione supra cineres calidos per horam, deinde exprimantur, addaturque lactis muliebris parum, & oculi calidè instilletur.

Reliquis verò partibus faciei, unguentum quoque ex sapone, solidum tamen, & spissum, ne ad oculos perfunderet eosque læderet, applicui. Hujus autem unguenti hæc est descriptio.

℞. Gummi elemi ℥i. ol. de vitell. ovorum ros. an. ℥iii. saponis alb. venet. ℥ii. dissolvatur gummi cum oleis, omnia in mortario di-

ligenter commisceantur, fiatque unguentum, quod super linteum extensum applicetur toti faciei. De quatuor in 4. horas, reiterentur unguenta collyrium verò singulis horis. Eodem quoque die sanguinem ex vena basilica ad ℥x. extraxi, erat enim vir robustus & plethoricus; sequenti vero die pharmacum exhibui: quò etiam die, ut & tertio, simili unguento totum corpus bis inunxi, & faciei, unguentum quod præscripsi, applicui; oculisque collyrium frequentissimè instillavi. Et sic hic ex tanta combustionione plenissimè sanatus fuit.

Si facies pulvere bombardico combusta, & grana pulveris cuti infixæ fuerint, illicò extrahendus est pulvis, quantum fieri poterit, idque acu aut aliquo alio instrumento acuto. Postea expectandum est, ut pustulæ eleventur, sic enim quod reliquum est pulveris in cute, parvo negotio extrahi, & cutis mundificari poterit.

Si verò Chirurgus in principio non advocatus fuerit, ita ut cutis jam cicatrizata, maculæ verò nigræ ex pulvere relictæ fuerint, necesse est denuo exulcerare cutem; id autem commodè fiet sequenti vesicatorio.

℞. Cantharid. num. vi. fermenti ℥ss. M. in mortario cum gutta, una aut altera aceti, fiatque unguenti instar, de quo F. parva emplastra, quæ maculis applicentur, cum primum pustulæ fuerint elevatæ, incidendæ sunt forficibus, postea acu, aut instrumento aliquo acuto eximendus est pulvis, tandemque applicandum est sequens unguentum.

℞. Butyri sine sale ℥i. ung. basilic. ol. Lil. alb. de vitell. ovorum an. ℥ii. M. F. ung. Quotiescunque Chirurgus tractat ulcera, prospiciat, ut nigredinem pulveris diligenter abstergat, aut cum decocto fœnugræci, & flor. mehloti abluat, postea applicet præscriptum unguentum; atque ita procedat, donec ulcera satis sint mundificata. Ego hoc in casu aliquoties usus sum pulvere præcipitati, idque maximo cum fructu ægrotantium, circumcirca verò ulcera doloris leniendi gratia, sequens applicetur unguentum anodinum.

℞. Ol. amygd. d. rosat. ceræ alb. an. ℥i. liquefiant, & misceantur, postea adde Camphuræ ℥i. mucil. sem. Cydoniorum parum M.F.



M. F. Unguentum. Si pulvis in oculos impulsus fuerit, abluendi sunt lacte muliebri, aut aq. ros. tepida.

Si verò combustio altius penetraverit, ita ut non solum pustulæ eleventur, verum etiam cutis combusta, siccata & contracta fuerit, tunc neque cæpæ, sapo, sal, & quæ ex hujusmodi fiunt medicamenta, multò minus frigida & sicca, sed quæ cutem emolliunt, & lubricam reddunt, erunt applicanda: ea autem sunt temperata, calida scilicet & humida. Itaque hoc modo procedendum. Imprimis pustulæ omnes forficibus incidantur, quò aqua acris & calida effluere possit, epidermis item ubicunque separata est, abstrahatur, ne sub ipsa pus colligatur. Et quia illicò humores & sanguis ad locum affectum affluunt, necesse est, ut affluxui illi humorum defensivis adversetur, applicetur itaque unum ex sequentibus defensivis, ad latitudinem palmi minoris supra locum ambustum.

℥. Pulv. boli armen. sang. drac. gallarum, Croci martis, acaciæ, an. ℥ss. ol. ros. ℥iii. ceræ novæ ℥i. F. ung. S. A. addendo parum aceti. Vel

℥. Farin. hord. argill. fornac. an. ℥ii. coq. cum aceto & aq. ad formam cataplasmatidis, in fine admisce albumina ovorum nu. 2. hoc defensivum singulis diebus bis, aut ter reiteretur, ne in parte affecta exsiccetur, & dolorem exciter.

Toti verò loco ambusto imponatur sequens unguentum.

℥. Ung. Basilic. ℥i. ol. rosac. Lil. alb. an. ℥ss. vitell. ovorum n. 2. M. Sequens quoque unguentum combustionibus summopere convenit, dolores mitigat, cutem emollit, & humores affluxos resolvit.

℥. Butyr. recent. sine sale, pingued. Gallin. rec. an. ℥i. ceræ novæ, ol. Lil. alb. an. ℥ss. liquefiant simul, postea admisce croci ℥i. mucilag. sem. cydon. ℥i. M. in mortario fiatque unguentum.

Utor ut plurimum emollientibus, usque ad finem curationis.

Præparo quoque unguentum ad omnes combustiones præstantissimum hunc in modum.

℥. Butyr. rec. & lot. in aq. ros. ℥iii. ol.

viol. de vitell. ovorum, amygd. d. an. ℥ss. farin. hord. ℥i. Croci ℥i. mucilag. sem. Cydon. ℥i. ceræ q. s. F. unguentum. Hoc emollit, dolorem lenit, & paulatim cicatricem inducit. Sed quia combustiones, imprimis quæ in cutis sunt superficie, vehementissimo sensu sunt præditæ, videant Chirurghi ut blandè ulcera abstergant; ego nè abstergendo ulcera, excitem dolores, tela subtilissima, qualis est Cambriacensis, coopero totam partem ambustam, nec illam amoveo, donec ulcera sint sanata; per hanc enim telam pus facillimè effluit, & virtus medicamentorum ad ulcera pervenit. *Guiliel. Fabritius Hildanus, cap. 6. & 7. lib. De Combustionibus.*

Adeps porci bullicens guttatim super lauri foliis proicitur, & hoc oleo ambustum locum inunge, & intra tres dies curabitur, quasi quodam incantamento, licet pars ambusta maxima fuerit, quovis quoque modo. *Petrus Borellus, obs. 76. cent. 1.*

℥. Corticem viridem Sambuci, aut prima Sambuci germina, contendantur, coq. in butyr. rec. q. s. colentur, ut fiat Linimentum, ambusto membro illinendum. *Dam. Sennertus, præct. lib. 5. p. 1. cap. 18.*

Sambuci cortex interior, ambustis impositus, ad ardorem igneum extinguendum, efficax esse perhibetur. *Joh. Rajus, Catalog. plantarum Angliæ.*

## SECTIO VIGESIMA TERTIA.

### De Aneurismate.

**A**neurisma (quod barbaris depravata voce emborisma, & mater sanguinis dicitur) arteriæ est dilatatio, vel tumor tactu mollis, pulsans, digitisque cedens, ab arteriæ tunica interioris quidem a pertione, exterioris verò dilatione ortum habens.

Hujus affectus causa proxima, quæ est interioris arteriæ tunica a pertio, & exterioris dilatatio, originem suam debet sanguinis impetui vehementi, externæ etiam cuilibet violentiæ arteriam nimirum distendenti; sæpissimè item Chirurghi imperitiei, arteriam pro vena, vel cum vena secantis, tum enim exteriore tunica utpote molli coalescente, & interna duriore



manente aperta, per foramen sanguis erumpit, & externam distendit.

## SUBSECTIO PRIMA:

*Pro Aneurismate in flexura cubiti à male instituta vene Sectione.*

**C**Erata plura in usum hîc vocantur, sed inter cetera laudo ego illud Montagnanæ, ex scoria ferri, in suo antidotario, quod ita se habet.

℞. Scoriæ ferri. ℥v. mumix, tragacanth. gummi arab. an. ℥iii. thuris, acaciæ, Sandarach. an. ℥i. piscium glutinis, gallarum, cupress. an. ℥i. visc. q. ℥iii. gypsi. ℥ii. resin. ibi. F. Ceratum cum succo consolid. maj. aceto & cera rubra.

Emplastrum etiam, ex cortice ulmi cocto sapa excepto, & appposito, detentoque ad siccationem, est miri usus; quemadmodum focus cum spongia madefacta in aceto decoctionis scoriæ ferri. *Jul. Cesar Claudianus, consult 67.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Aneurismate ex incisa arteria in Brachio.*

**Q**uidam Ludimagister cum propter scabiem ex humore melancholico ortam, sibi venam basilicam dextram à barbitonfore incidi curasset, arteria quoque simul compuncta fuerat. Unde paulatim aneurisma exortum est, cui cum mensis spatio & ultra, medicamenta multa (frustra tamen, adhibita fuissent; ad me tandem Pateriniacum venit. Eo loci, ubi venæ sectio facta fuerat, deprehendi tumorem, magnitudine ovum anserinum adæquantem, pallidum, & utcunque durum, in quo pulsatio non tantum digito per sentiebatur, verum etiam oculis conspiciebatur: talis enim erat pulsatio, ut pulvisculos & fascias circumpositas in altum protruderet. Brachium quoque extendi non poterat, dolor tamen non erat adeo ingens, nisi cum brachium extendere vellet. Ego cum curatu difficillimum hunc affectum animadverterem, manum quidem admo-

vere recusavi; precibus tamen ipsius commotus, curationem sic aggressus fui.

Instituta primò optima victus ratione, applicatoque tumori duro, emplastro nostro de cicuta, Clysterem injedi, & appropriatis catharticis, corpus à pravis humoribus exoneravi, qui spiritum & sanguinem in aneurismate contentum, ad interiora adeo revocarunt, ut postea nulla nobis nec appareret, nec sentiretur pulsatio, tumor quoque multum imminutus conspiciebatur. Unde tum sequens emplastrum applicui.

℞. Empl. diacalciteos. ℥ii. pulv. mastich. ros. rub. myrtill rad. Symph. maj. an. ℥i. cum olei ros. q. s. formetur emplastrum. Postea pulvillum, aut potius nodulum ex linteo multoties reduplicato formavi, & tumori imposui, fasciaque firmiter ligavi, idque in eum finem, ut tumor reprimeretur, & sanguinis vitalis, ex ipsa arteria in externam membranam dilatatam, influxus impediretur. Atque his remediis brachium Dei beneficio, brevi in integrum restitutum fuit. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 44. cont. 3.*

## SECTIO VIGESIMA QUARTA.

*De Angina.*

**A** Ngina (quæ Græcis *Κυρῶσις* & *ὤρυξις* *ἄνγξιν* dicitur ab *ἄνγξ* strangulo) symptoma est faucium & laryngis proprium, idque terrificum, & lethale, tum ob doloris acerbitem, tum propter interceptionem officii ad vitam tuendam necessarii, & oppressionem partis, cujus officio vita carere nequit, nam & deglutionem impedit ad vitam necessariam, & respirationem tollit, sine qua ne ad punctum quidem temporis animal vivere potest, definitur quod sit affectus phlegmonodes, fauces, i. e. summas gulæ, gutturisque partes, per quas tum cibi potusque, tum Spiritus introitus est, præcludens.

Alia vera est & Legitima, alia notha.

Veræ 4. sunt species, una quam omnium periculosissimam censuit Hippocrates, ubi neque in faucibus, neque in cervice quicquam apparet, hujus quippe inflammatio peni-



penitus abstrusa, graviora infligit sympto-  
mata, non sine metu præsentis strangulatio-  
nis. Hac vidit *Fernelius* sublatum egrorum  
horis 18. constante mente, integrisque sen-  
sibus, angina latens hæc species dicitur.

Altera est, quum interiores laryngis fau-  
ciumque musculi manifesta phlegmone  
tentantur; hæc æque ac superior sympto-  
matis sæva est, sed minore tamen sit peri-  
culo, quod manifesto se proferat tumore.

Tertia fauces interiores una cum cervice  
occupat, in qua foris tumor, atque rubor  
est conspicuus, cum calore & dolore, Sym-  
ptomata huic nihilo sunt quam cæteris le-  
viora, sed tamen spes salutis melior, quod  
inflammatio foras profluens evocari dige-  
rique possit.

Quarta omnium levissima, atque tutis-  
sima censetur, quæ non interiores fauces,  
sed solum cervicem, ejusque musculos pre-  
hendit, quorum tamen tumore, interio-  
res laryngis musculi comprimuntur, in-  
troitusque omnis coarctatur.

Omnium causa est fluxio biliosa aut san-  
guinea, quæ in has sedes influens, vel ery-  
sipelas, vel phlegmonem parit.

*Dividi* aliter solet angina in *Κυρῶν*, *πε-  
ριχυρῶν*, *εὐρυρῶν*, & *παρερυρῶν*: *Κυρῶν*  
dicitur, quando interni gutturis mus-  
culi inflammantur, cum maxima respira-  
tionis angustia; *παρερυρῶν* verò, quando  
inflammantur externi; *εὐρυρῶν* rursus,  
quando phlegmone internos faucium mus-  
culos apprehendit, & deglutitionem po-  
tissimum impedit, *παρερυρῶν*, demum ex-  
ternas faucium partes & mentum obsiden-  
te inflammatione.

Angina notha febris est expers, sit cum  
pituitosa destillatio, in fauces cervicisque  
musculos decumbit, ac tum fortassis tumor  
inest, sed sine rubore, & febre.

Alia adhuc est angina species, quæ nullo  
sit quidem proprio faucium affectu, sed  
quum cervicis vertebræ intro luxatæ, fau-  
ces ac gulæ gutturisq; introitus premunt,  
ac arctius coangustant; dignoscitur, quod  
cervix ponè excavatur, agrè & cum dolo-  
re inflectitur, casus quoque aut ictus an-  
tecessit, vel humor præter naturam verte-  
brarum vincula laxavit.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Angina in viro quodam ex sangui-  
nis repletionem.*

**S**anguine extracto, & clystere iniecto;  
hoc gargarisma præscriptum.

℥. Fol. Plantag. M i. flor. ros. rubr. p. i.  
gallam omphacitidem (i. viridem) crasso  
modo contusam. Sem. Cydon. ℥i. bulliant in  
℔i. aq. plantag. addendo aq. solani, equi-  
seti, an. ℥ij. colaturæ immisce diamor. dia-  
nuc. an. ℥i. fiat gargarisma, quo cum gar-  
garisasset, loqui potuit, quod antea mini-  
mè poterat; deinde hoc sequenti usus est.

℥. Fol. plantag. bellid. min. an. M i. flor.  
ros. rubr. p. i. balauft. ℥i. hord. communis,  
p. i. coq. in ℔ij. aquæ communis ad ℔i. cui  
adde ℔. aq. plantag. & aq. Scabios. ℥ij. sem.  
lini. fœnugræ. malv. (cum iam in augmen-  
to essemus) an. ℥i. gallam unam crasso modo  
contusam, nidum hirundinis cum plumis  
incisum) ad resolutionem aliqualem) bul-  
liant hæc semel, fiat levis, colatura,  
addendo diamor. dianuc. an. ℥i. mell.  
rosat. colat. ℥. M. eo plurimum dele-  
ctabatur, cum se levamen inde sentire  
fateretur.

Secundo die manè, glande alvo exo-  
nerata, venas sub lingua incidere jubeo,  
crassissimo sanguine ac nigerrimo effluen-  
te; & melius habere cœpit, & spiritum  
liberius ducebat: eodem tamen die, gut-  
tur inunximus linimento sequenti, si-  
mul etiam cataplasmate imposito.

℥. Ol. amygd. d. ℥i. pingued. Gal-  
lin. butyr. rec. in aq. viol. & camom.  
loti an. ℥. mucilag. sem. Lini. fœ-  
nugræ. malv. alth. extract. cum aq.  
Chamæ. an. ℥ij. ceræ cærinæ medi-  
cum. F. linimentum, Lana succida su-  
perposita.

℥. Rad. althææ, ℥i. fol. malv. viol.  
an. M i. flor. chamæ. melil. an. p. i.  
coq. in aq. ad mollitudinem, pistentur,  
adde farinæ sem. fœnugræ. lini, hor-  
dei an. p. i. nidum hirundinis in pul-  
verem redactum, ol. amygd. d. viol.  
butyri rec. an. ℥ij. ol. chamæ. ℥i. F.  
Cataplasma, & amota lana, calidè ap-  
ponatur.



Istis præfidiis cum paucis aliis, morti additus, luci fuit restitutus. *Petrus Forestus, observ. 16. lib. 15. de faucium, gutturis, gulæ, & asperæ arteriæ affectibus.*

In Anginâ periculosa festinandum est; veteres eodem die, & sanguinem mittebant, & medicamenta exhibebant. Ego sane (inquit *Trallianus, lib. 4. cap. 1.*) novi me, cum usus valde urgeret; venam manè aperuisse: diluculo linguæ subiectas secuisse; & vespere ex cremore pituitæ lachrymam scammon. exhibuisse; atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potui dissolvere. Et alium quendam novi me, postquam duorum brachiorum in cubito venas secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato. *Petrus Forestus, observ. 13. lib. 5.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Angina cum tumore in faucibus.

**V**ocatus ad quendam, cui gutturis regio adeo intumuerat, ut ne verbum proloqui posset, & serè suffocaretur, tumore in faucibus manifestè apparente; cum adhærente tenacissima pituita & lentore. Statim cucurbitulas cum scarificatione scapulis adhaui, & gargarismum sequentem suasi.

4. Aq. Solan. plantag. an. ℥iv. syrup. viol. mell. viol. an. ℥ss. diamori. ℥i. aceti flor. papav. rhæad. ℥ii. fiat gargarisma.

Applicuit collo sequens cataplasma in illius ambitu sub mento.

4. Farin. hord. fabarum an. ℥iv. nid. hirund. ℥ii. stercor. canis sic. ℥i. mellis ℥ii. ol. rosac. q. s. fiat Cataplasma. Hisce vix dum per diem usurpatis, melius habere cepit, & è summo periculo evasit. *Felix Platerus observ. lib. 2. pag. 412.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Angina.

**P**rotinus alvi excrementis per acrem injectum Clysterem depositis, cephalicam dextri brachii venam incidere iussi, hoc etiam gargarisma præscripsi.

4. Syrup. de ribes; Rob. mororum an. ℥i. aq. plant. stipit. ros. an. ℥viii. M. F. gargarism. quo sæpè utatur.

Foris etiam ubi tumor in collo apparebat, locus oleo Chamæm. superaddita succida lana, fectus fuit. Vespere verò ex sinistra Saphena sanguinis. ℥vi. fuerunt extractæ: sequenti verò die, cucurbitulæ ad primam vertebra & scapulas sunt applicitæ, tum olei vice, quod foris admovebatur, emplastrum hoc apponi iussimus.

4. Rad. alt. fol. malv. an. Mi. rad. Lil. alb. num. 2. ficcum ping. num. 10. F. decoctio in aq. donec mollescant, dein in mortario optimè pistentur, & per setaceum transmittantur, quibus postea adde, farin. hord. sem. Lini scenugræ. an. p. i. Cineris hirund. ℥ii. stercor. canin. arid. & alb. ℥ii. farin. chamæ. piß. decocto prædicto omnia excipiantur, & F. Emplastrum cui adde ol. chamæmil. rosac. an. ℥i. M. & ad ignem parum tractetur, & collo affecto applicetur. Porro hujus Emplastri vice stercus caninum aridum pistum & melle exceptum, & dolenti parti admotum præstantissimum est remedium. Item Cinis hirundinis cremat. efficax quoque remedium est, si modò cum melle admoveatur. Emplastrum etiam ex nido hirundin. magnam in hoc casu habet prærogativam. Nec sunt audiendi qui ex nido hirundini tanquam ex terra frigida, emplastrum fieri formidant; cum revera terra nidi hirundinis cum paleis, & cæteris in eo contentis, discutiendi vires habeat. Quamquam præsci Græci nunquam quod legerim, nido isto in hoc affectu usi fuerint, sed potius cinere hirundinum. *Amatus Lusitanus, Cent. 3. curat. 28.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Angina gravi in viro quidam.

**C**lysterem primùm paulò acriorem in hunc modum præscribo, quod adstrictæ alvo esset.

4. Herb. 4. emol. fol. Caul. rubr. hyssop. Cent. min. an. Mi. polip. q. ℥i. sem. Cartham. contus. ℥x. agaric. in petia ligat. ℥iii. sem. melon. cum cortic. contus. ℥i. sem. anisi, & anethi. an. ℥iii. flor. chamæm. & melil.



& melil. furfur. Macri. ana p.i. F. omnium decoctio. in colaturâ ibi. dissol. Catholic. ℥i. hiera Galen. ℥v. ol. viol. & Liliorum an. ℥iii. mell. ros. colat. ℥ii. F. Clyster.

Ingentem excrementorum copiam deiecit æger, à qua alleviationem sensit, ejecto Clystere sanguinem eodem die bis è cubito detraho ad ℥xx. quod & æger valentissimis viribus esset, & morbus quoque magnus. Interea gargarismate adstringente & repellente uti ægrum jubeo.

Sequenti die è venis sub lingua sanguinem detraho, & Cucurbitulas cum scarificatu, sub vesperam admoveri scapulis jubeo, à quibus mirificè se levatum sensit, & paulò tum faciliùs respirare cœpit. Interim in omnimoda abstinencia ægrum continuo; nec per primos tres dies, quicquam aliud præter aquam mulsam sumere jussi, neque etiam solidiora alimenta sumere potuit, ut qui etiam mulsam ore sumptam per nares reiiceret, quod anginosus frequens esse solet, infernas partes vinculis deligo, collo & cervici hæc impono.

℥℥. Ol. Chamæ. viol. Liliorum & Cheirini, an. ℥ii. ol. amygd. d. rec. ℥iii. axung. Gallin. rec. ℥i. butyr. rec. sine sale ℥i. Croci. ℥i. F. linimentum, quod calidum collo & cervici, mollibus lanis pinguibus intectum admoveri jubebam. Ubi verò ad tertium diem ventum est, mox propinare medicamentum solvens satago, sed frustra id tentatum est, quare dabam alternis diebus Clysterem superscriptum, à quo alleviari se plurimùm æger sentiebat.

Cùm autem ad quartum diem rubor aliquis cum dolore ac tentione foras ad maxillam dextram se proderet, bonum id esse sum, ex Hippocr. & Galeni sententia, arbitratus, itaque naturæ motum secutus, foras humorem evocare studui, in hunc modum.

℥℥. Fol. plantag. Hyssop. Caul. rubr. an. Mß. Caric. ping. nu. 12. uvarum pass. exac. num. 20. liquirit. rasæ ℥i. ros. rubr. p.i. hord. cum cortice pß. fiat omnium decoctio in aq. hordei, in colat. Ibiß. adde diamor. & dianuc. an. ℥iß. oxymel. simpl. Syrup. viol. an. ℥ii. mell. ros. ℥i. M. fiat Gargarism. quo sæpe utatur.

Foris verò ad tumorem prominentem

evocandum, & suppurandum tali sumus cataplasmate.

℥℥. Fol. malv. alth. cum radic. an. Mii. fol. caul. rubr. viol. hyssop. an. Mi. caric. ping. nu. 30. flor. chamæ. & melil. an. p.i. sem. Lini. & fœnugræc. an. ℥i. Caput Liliorum alb. ℥ii. furfuris p. i. fiat. omnium decoctio in aqua, pistentur & cribrentur. Cribaturæ adde nidi hirund. in ol. Lil. præbulliti & cum toto probè in mortario macerati, & postea cribrati ℥ii. farin. sem. Lini & fœnugræc. farin. frumenti an. ℥i. Coquantur farinæ cum oxymel. ad convenientem glutinositatem. Postea adde axungia Gallinæ rec. but. sine sale an. ℥i. Croci ℥i. ol. Lil. ℥iii. M. F. Cataplasma; mirificè profectò humorem foras evocavit, atque ad suppurationem deduxit, intra biduum namque suppuratus ferè, qui foras subsederat tumor, fuit; cui tamen tertio post die canini stercoris sicci ℥iii. adjunxi, quod si quid aliud, vel Pauli vel Avicennæ testimonio, huic affectui maximè prodest, occulta quadam vi & proprietate. Suppurato tumore ad 7. diem candenti ferro aperiri jussi, quod id ulceribus & abscessibus plurimùm conferrat, exsiccando, & virus malum ignis potentia corrigendo. Pus fœtidissimum, virulentum & copiosum prodiit, ulcus mundificari curavimus, unguento ex melle rosato, succo apii & absinth. farin. hord. myrrha & aristoloch. postea probè deterso ulcere, quod intra 20. diem contigit, ad sarcotica & cavum ulcus implentia nos contulimus unguento ex thuris polline, myrrha, iride, aloëque confecto, ad Chalciteos emplastro, sicque Dei nutu integrè curatus fuit, magna omnium admiratione.

Interim dum hæc facio, reliquorum præsidiorum, quæ juvare posse sum arbitratus, minimè obliviscor: nam quum devorare potuit æger, purgans medicamentum, & catapotia dedi, ad deducendum humorem, quæ quidem fœliciter operabantur. Exhibui etiam rasuræ dentis apri ℥i. ex oleo amygd. d. & Sacch. cando, quæ in hoc affectu, prout & in pleuritide, præsentaneum est remedium atque arcanum *Franciscus Valerius, obs. 10. lib. 2.*



Præstantissimum est hoc cataplasma, quo in alio, angina præfocativa correpto, secundo tertiove die sum usus, à quo secuta est tumoris suppuratio, respirandi & deglutiendi facilitas, & ab eo æger mirificè se alleviari sentiebat, ita ut perpetuò loco affecto adherere juberet.

℥℥. Nidorum hirund. cum toto nempe stramine, luto, & stercore hirund. numero 2. bulliant in ol. Chamæmel. & Lilior. Pistentur & fetaceo cribro transmittantur, adde stercoreis canis ossa comedentis, ℥ii. Oesypi humidi ℥i. ol. Liliorum q. s. fiat puls in modum cataplasmatismatis, & loco affecto calidè admoveatur. Est enim in hoc casu præsentaneum hoc remedium; sicuti cinis crematarum hirund. devoratus ad ℥i. pondus, ex hydromelite, vel etiam illitus, ut *Dioscorides & Galenus* affirmant. *Franciscus Valeriola, observ. 10. lib. 6.*

Venæsectione peracta, mox instituenda purgatio, præcipuè si bilis in corpore abundet, ut illa pharmaci irritatione, motus humorum fiat *ἡσυχία*; recentiores hinc laudant sal prunellæ in oris solutionibus.

Si dolor sit vehementior, utilissimum est Lac. Postquam venæsectio in cubito, & purgatio est instituta, ad derivationem, etiam venæ narium, & quæ sub lingua sunt, aperiantur, aut hirudines venarum narium, frontis, post aures & cervici applicentur. Nonnulli & scarificationes aurium adhibent. A proprietate prodest fungus Sambucinus coctus & bibitus, & foris etiam impositus. Lignum quoque hederæ à proprietate valere dicitur, unde *Job. Marquardus* scribit, quòd comedens ex cochleari de ligno hederæ, vel bibens ex vase hederaceo, nunquam, vel rarò in apostema gutturis, vel uvulæ incidat. Commendant etiam tanquam expertum lupi guttur, seu asperam arteriam, si angina laborans per eam bibat. Commendantur & exuvie serpentis in ol. amygd. d. coctæ, si in oleo illo liatcum tingatur, colloque circumponatur. Cochlex item cum testis ustæ, & Cancriusti; item rasura dentis Castorei an. ℥i. vel ℥ss. in aq. scabios. propinata, *Da-*

*niel Sennertus, prætic. libr. 2. part. 1. cap. 24.*

Si abscessus intus in ore rumpatur, decocto hordei, aut hydromelite detergitur. Si aliquando ulcus sordidum redatur, tunc ad potentiora remedia confugiendum est, in hunc modum.

℥℥. Fol. Scabios. & agrimon. an. Mi. nuc. cupress. ℥i. rad. ireos florent. & aristoloch. rot. an. ℥ss. myrrh. ℥ss. ros. rub. p. ii. coq. in hydromelite ad ℔bi. Colatura colluantur frequenter ulceratæ partes. Si non sufficiat, ad collyrium Lanfranci deveniendum erit, quod mirabilis est efficaciam. *Lazarus Riverius, prax. medic. libr. 6. cap. 7.*

Anginam magnam & periculosam, non omisissis, quæ ex universalium genere conveniebant, hoc gargarismo percuravi.

℥℥. Semperviv. Mss. flor. prunell. p. iii. salis armoniac. ℥ii. decoq. in aq. ℔bi. ad casum unius, & utere pro gargarismo. *Hieronymus Reusnerus, observ. 57.* Vidi cuidam angina deplorata laboranti, a quam è stercore vaccino destillatam, exhibitam ita profuisse, ut mox convalescit. *Hieronymus Reusnerus, observ. 191.*

℥℥. Flor. Chamæmel. Miii. aceti & olei an. pt. æqu. decoq. pro Cataplasmate, quo calidè applicato extrinsecus ad locum affectum, intra horæ spatium apostema disruptum est, ac per os saniosa & cruenta multa rejecit, & mox convaleuit. *Martinus Rulandus, Cur. 56. Cent. 4.*

Mulier quædam supersticiosè butyrum mense Majo asservabat, & colligebat tribus diebus rogationum, viris è lacte vacæ quæ marem peperisset, mulieribus, quæ fœminam, urgente malo inungebat, collo, cervici, & partibus vicinis, carpo plurimùm fricando atque hac ratione non paucos sanitati restituit. *Jac. Hollerius, cap. 23. lib. I. de morbis internis.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Angina ad suppurationem tendente:*

**G**argarismate usi sumus ex decocto ficuum, fœnugræc. & alth. cum spica, croco, & melle, & rosis in exigua quan-



quantitate admixtis. Similiter emplastrum sequens maturativum nonnihil, & rumpens, extrinsecus admovimus.

24. Alth. ʒij. rad. Lilior. ʒi. ficuum pinguium num. 5. fol. malv. Mij. flor. melilot. & chamamil. an. p. i. coctis & confusis adde nidum hirund. farinæ hord. M. ʒol. chamamil. amygd. d. butyri rec. an. q. s. F. ad modum emplastri; Eo vix ad horam imposito, collo & maxillæ usque ad aurem, intus ruptum est apostema, deinde solo absterforio gargarismo utens convaluit. *Petrus Forestus, observ. 23. lib. 15.*

Facta maturatione, secunda succedit intentio, nimirum apostematis ruptio, quæ modò cum medicamentis, modò manu Chirurgica perficitur. Maturantibus itaque addimus aliqua acria, ut hirundinis excrementa vel cinerem, aut sterco caninum. Fermentum quoque foris rumpit cum sale & oleo. Plurimum etiam facit ad ruptionem vociferatio, & fortis motus gutturis intransglutendo, violenta etiam transglutitio crustæ panis, hoc enim sæpè contulisse compertum est. Quidam, ut empirici, si neque hæc juverint, candela ceræa in guttur demissa, abscissum rumpunt, ut fecit Amatus in quodam anginoso tentandi causa, unde repente pus effluere cœpit per os, & æger liberatus est, cum Medici eundem pro deplorato reliquerint. Alii Scalpello aperiunt, deinde prono capite Saniem expurgant, & sic tertia succedit intentio repurgandi, & ulcus detergendi cum aqua mellis vel hordei decocto cum melle. Quarta intentio consolidandi perficietur hoc gargarismo.

24. Aqu. decoctionis rosar. rub. Gall. myrtill. ʒi. thuris. sang. drac. Sarcocoll. an. ʒʒ. Syrup. ros. sic. ʒi. M. Nonnulli addunt pulverem pilor. lepor. combust. *Petrus Forestus, Schol. observ. 23. lib. 15.*

Dum regalia celebrantur & vino hypocratico aromatite indulgetur, cuidam juveni, qui illud vinum biberat, de nocte angina oborta, cum strangularetur, iugulum gladio aperuit, saniei plurimum emanat, convaluit. Hic fortuna plurimum potuit; an urgente necessitate idem fieri potest. *Guilielmus Ballonius, lib. 1. Epidem, & Ephemerid. pag. 11.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Angina.

**A** Provisiōne habita totius corpōis seca venas sub lingua, & si non juvat, jugula res in collo externas, & gula infusetur pulvis hirundinum, & foris admove emplastrum ex nido hirund. cum aceto, si ad pus abeat.

24. Myrrhæ ʒii. sinapi ʒi. morsus diaboli. scabios. an. Mj. coq. ex aq. ad ʒbi. colat. adde mellis optimi, & dianuc. an. ʒij. fiat Gargaris.

Ad ruptionem etiam facit hoc Emplastrum.

24. Farin. tritic. hord. sem. fœnugræc. an. ʒii. rad. Lil. alb. ʒij. si cum num. 6. Levistic. Chamamel. melilot. malv. an. M. ʒ. fermenti acris ʒij. decoctis ut dæcet ex aqua F. cataplasma, dolorem sedans est quod sequitur.

24. Medullæ pomorum sub prunis coctorum ʒvi i i. butyri rec. ʒij. pingued. gallin. ʒʒ. lactis muliebris ʒij. farinæ hord. ʒi. bulliant ad spissitudinem, in fine adde vitell. ovorum numero 2. & parum crocis F. cataplasma anodinum. *Job. Heurnius, ad Hippocr. Aphor. 43. sect. 2.*

Cum in gutture morbilli magis emergent, non sine magno dolore & calore, ut sese suffocari clamaret, mandavi, ut continuò cum lacte caprino, & aqua plantag. simul mixtis tepidè gargarisaret: quod miraculi instar profuit. Præservat enim maximè ab angina & suffocatione, etque oris & gutturis præstantissimum remedium, cum signa exanthematum se produnt. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 1. de febr. Ephemeris.*

Ex Hippocratis consilio omnia admovebimus ut foras prodeat in collum materia: tale est Emplastrum quod coquitur ex nido hirund. ex decocto malvarum, meliloti, ficuum, fl. Sambuci, additur theriaca & crocus. Ita litus ex adipibus, & oleo amygdalino, cum croco. *Job. Heurnius, ad Hippocr. Aphor. 37. sect. 6.*

Summus laudibus ad anginam com-



mendatur filium purpureum, quo viperæ strangulantur, in quem finem nonnulla intorta fila, Patavio mecum attuli, quibus viperas strangulatas vidi. Collo circumliganda sunt. *Galenus est observatio lib. 6 de simpl. medic. facult. lit. G. in glycyfida, cui consentit Æginata, lib. 3. de re medica. Cap. 26. Thomas Bartolinus, histor. 73. cent. 4.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Angina.*

**S** Artor quidam angina laborabat, qua deglutitio impediabatur; ei secta fuerat vena, Clysteres inieci, & admotum vesicatorium.

His non proficientibus, me vocant, advertens eum vix tantillum iusculi ex cochleari magno conatu deglutire, ac per consequens medicamentum purgans haurire non posse, præscribo aq. benedict. ℥ii. quibus purgatus est pluries per vomitum & secessum, eodemque die ab angina liberatus. *Lazarus Riverius, observ. 24. cent. 2.*

Juvenis quidam fossor angina laborabat ita vehementi, ut nec loqui, nec deglutire posset, respiratio tamen integra manebat, cum ad eum vocatus sum, inieci fuerat Clyster, statim verò sanguinem mitti iubeo ad ℥x. postea admoveatur vesicatorium posteriori cervici, cucurbitulæ scapulis admoventur cum scarificatione, & 4. horis a venæ sectione exhibentur aquæ benedict. ℥ii. quibus purgatus est per vomitum & per alvum; & inde loqui ac deglutire cœpit, ac paulò post integre curatus est. *Lazarus Riverius, observ. 10. cent. 2. vide ejusdem observ. 60. cent. 4.*

Hoc emplastro mulier quædam me præsentente quendam squinantium Romæ curavit.

℥4. Stercor. canis ossa rodentis, fursur. triti. an. cum mell. q. s. f. Emplastrum, & calidum sæpius superpone gutturi ad locum dolentem. Item sterco. canis siccum modicum assum, & cum diamoro gargarisatum, & cum melle pistum & emplastratum gulæ, multum valet contra-

*Brunet Partie I.*

squinantiam: *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 1.*

In ea sum sententia, in desperata angina laryngotomiam esse celebrandam; auxilium certè nec veterum nec recentiorum placitis adversum. *Galenus, Paulus, Aræteus, Avicenna & omnes Arabes* unanimiter hoc approbant præsidium; imò *Avenzoar* proprio illud comprobavit exemplo *lib. 1. Thesir. tract. 10. cap. 14.* in capra quadam aspera arteria dillecta, quam deinde abstergentibus & agglutinantibus, citra vitæ periculum, persanavit. Qua de causa annuit *Albucasis. lib. 2. Chirurgiæ cap. 43.* & Classici non renuunt, ut *Hollerius lib. 1. Practic. cap. 23.* & *Jachinus* in nonum ad *Almansorem Rhafis* librum de Angina. Hanc denique praxin propria experientia feliciter confirmatam vidi. *Nicolaus, Fontanus, Analect. cap. 3.*

Si oleum Amygd. d. rec. expressum, & sacchar. candi aliquid & pulv. dentis apri exhibeatis, præsentissimum in Angina remedium est, quod etiam in pleuritide valet: & certè hic solus haustus, curat & Anginam & pleuritidem. Est hoc medicamentum arcanum & ἀνόσιτον, quo solo vidi anginosos & pleuriticos curari. Etiam ipse hoc sæpissime sum usus fructu magno. *Jo. Scroterus apud Job. Kvittichium. Consil. 30.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### *Pro angina notha in matrona.*

**P**Ræmissis clystere & venæ sectione, hoc Linimentum paravi.

℥4. Ol. Chamæmell. melil. an. ℥i. nidi hirund. pulv. ℥β. alb. græc. ℥i. pingued. hirci. ℥ii. Cerae, qu. l. f. unguentum super linteam duplicatum extensum, collo calidè applicetur, ab ejus usu dolor abiit, deglutitioque facilis & integra rediit, & ipsa ægra integrè convaluit. *Job. Petrus Lothichius, observ. 1. cap. 7. lib. 2.*



## SUBSECTIO NONA.

*Pro Angina.*

**I**lluſtris mulier Gabriela Couſier Domina à Saulteno: cùm angina autumnali omnium periculoſiſſima detineretur, venit in mentem me legiſſe apud *Ætium lib. 15. cap. 6.* agaricum occultos abſceſſus abſorbere, vel foras materiam evocare; ſtatim agaricum in taleolas conciſum in decocto radicis althææ, ficuum, cum momento Zinziberis & quarta parte vini albi maceravi, addidi Syrupum de althæa, & potionem ægrotae dedi, monuique ne illam ſtatim deglutiret, ſed aliquod tempus in imis faucibus contineret ſi hac potione vitam ſibi redimere veller, obſequitur ægrota, interim dum cum illa ſermonem conſero, ecce magna puris albi copia, tam putridi & graveolentis ore rejicitur, ut filia quæ ad matrem cum pelvi adſtabat, excipiendi puris ergo, prægravi ejus foetores, conciderit animo, ad ægotam poſtea rediens, eam & vocis vitio & respiratione difficili, & gravi deglutitione, & febre levatam reperi, & ab omni vitæ periculo tutam, qua nunc fruitur incolumis, *Jacobus Dovinetus, apolog. lib. 3. cap. 1.*

Hiſpanus quidam cùm acutiſſima angina in horas ſtrangulari videretur, & omnia univerſalia & localia per venam ſectam, ſcarificatas in collo cucurbitulas, acres Clyſteres, eſſent celebrata auxilia, & ipſe nigricante facie velut emortuus jaceret: peritiſſimi Medici jugulares ſecandas imperarunt: adfuit Chirurgus ſecandi arte dexterrimus; illas ſanguine ad caput ruente, vaporeque multo impletas, turgentes & conſpicias reſecuit, irreparabili ſanguinis fluxu ſequuto, ægroque lapſo in omnimodam virium jacturam, ſpes ſalutis abeſt; quum de coob violentum ſanguinis fluxum, iam deſperarent omnes, vocatus accurro; Emplaſtrum Galenicum ex aloe, thure, pilis leporis exactiſſimè trituratis & mixtis cum candido ovi, ſuperimpono, quo ipſe ad arteriarum & iugularium hæmorrhagias ſœliciter utitur; ſicque collo commodè ligato, ægrum iam iam

exauſtum refocillo, qui poſt horas aliquot, respirare & loqui cœpit, & à morbo immunis revixit. Nec mireris ad tam periculoſum remedium nos confuſiſſe, quando enim ſalutis unica eſt via, hæc licet cum periculo, tentanda; cum ſatiùs ſit ægrum periclitari quam ſpe adempta certò perire, ut monet Magiſter, nam malo nodo malus cuneus quærendus eſt raroque crudele malum niſi crudeli depelli poteſt auxilio. *Zac. Luſitanus, obſerv. 95. lib. 1. prax. admirand.*

Angina canina cùm ſcœmina quædam nullo apparente tumore graviter corripetur, magna cum violentia respirans, ita ut in horas ſtrangulari videretur, & neque cephalicæ, aut venarum ſublingua ſectio, in occipitè ſcarificatæ cucurbitæ, acria clyſteria illi opem ferre poſſent, tandem eodem die quo omnia ob procratiſtinationis periculum acta ſunt, ſub mento ſcarificatæ cucurbita ſummo fuit auxilio, aſſumptis, deindè Syrupis, excretaque per ſputum pituita crassa & multa, altero die melius habuit. *Zac. Luſitanus, obſerv. 94. lib. 1. prax. admirand.*

Juvenis quidam 20. annos natus, pituitofus, poſt celerioſam de ambulationem, avidè hauſit frigidam cereviſiam, undè intra horam deglutitio admodum difficilis, fauciumque dolor & tumor apparuere, vocatus venæſectionem levem inſtitui iuſſi, ſequentiſque gargarifmate curatus eſt.

℞. Aq. flor. Sambuc. ℥iv. myrrh. pulv. ℥ß. Spir. vini rectificat. ℥iii. Spirit. Salis armoniac. ℥i. ſucc. taraxac. expreſſ. ℥ii. M. pro gargarifm. Puella 20. circiter annorum ſubitò in maximam respirandi difficultatem incidit, cum faucium tumore & dolore, ut ne guttulam quidem liquoris deglutire potuerit; vocatus ſtatim venæſectio celebrata fuit ad ℥vi. moxque ſequens apozema pro gargarifmate præſcripti, undè levamen quoddam obſervavit.

℞. Flor. roſ. rub. ℥i. bacc. Lauri ex-cort. ſem. Levistic. an. ℥iß. coq. in aq. communis ſibi. vaſe optimè clauſo, in colat. diſſolv. Mell. roſ. ℥i. aq. theriac. ſimpl. ℥v. ſpir. ſalis armoniac. ℥i. M. pro gargarifm. Sequenti die clyſterem purgantem miſer curavi, undè optime deiecit, eodemque die collo ſequens ca-



caplasma bis de die renovandum applicari iussi.

℞. Nid. hirund. num. i. flor. Sambuc. p. iii. cœparum sub cineribus coctarum num. 2. coq ex cerevis. tenui. Contusis; adde albi Græci ℥iii. olei oliv. q. s. M. F. Caplasma, quo quarto die abscessus fuit ruptus, ulteriusque usa fuit solummodò melle rosac. pro linctu. *Fredericus Deckeers Observ. ad cap. i. lib. 2. praxeos Barbetiana.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### *Pro Angina Latente.*

**A** Ngina laborabat Nicolaus Rota, nullus tamen rubor aut tumor, vel intus in gula, vel extra videbatur; & ipse nihilominus vix spiritum trahens, quicquid præterea edendum sumeret, per Os statim & Nares reiciebat: quare cum arescente corpore, pallente iam facie, ac vertentibus oculis, spes omnis sublata esset, & Medici, quibus cura demandata fuerat, ægrum amplius non adirent; me licet iuniorem convocant, ægrum ostendunt, & quæcunque acta fuerant exponunt; at ego cum & ægrum ipsum ad mortem tendere, & Medicos quæcunque opportuna fuerant præsidia adhibuisse intelligerem, cœpi ipse mecum cogitare, satius ne esset, ægrum ipsum Deo & Naturæ, ut cæteri Medici, incuratum dimittere, an aliquod licet insolitum, utile tamen auxilium experiri: Verùm adhortantibus his qui ægro assistebant, consilium capio, & locum altioribus plagis sub ipsis Maxillis, ac etiam supra collum incido, ex quo cum sanies multa prorumperet, adeo morbus levatus est, ut faucibus ipsis spiritum simul & cibum capientibus, facilis dein ad bonam valetudinem egro daretur regressio. *Antonius Benvenius. Cap. 38. lib. De abditis Morborum & Sanationum Causis.*

## SECTIO VIGESIMAQUINTA.

### *Pro Ani Abscessu & Ulcere.*

**R** Upto abscessu, & pure effluente, locum affectum continuo deterfimus cum decoct. hordi & melle Rosac. cum satis deterfum videretur, mandavi, ut hoc unguento incarnante & consolidante, & cicatricem inducente inungeretur.

℞. Ung. alb. Camphorat. ℥i. tutiæ. Lytharg. an. ℥i. Sarcocol. thuris. balaust. an. ℥ss. ducatur in mortario plumbeo, donec fuscum fiat; inungatur, vel super pannum lineum inductum apponatur. Ad idem quoque valet unguentum de plumbo, quo sæpius utor, non solum ad ulcera, sed ad rhagades ani. Ita describitur apud *Montagnanam*.

℞. Plumbi usti ℥ii. Lythargir. ℥i ceruss. lotæ, aceti, an. ℥ss. ol. Rosac. ℥iii. mell. rec. ℥i. vitell. ovor. num. iii. myrrh. ℥ss. ceræ, q. s. fiat unguentum.

Valeat in omnibus excoriationibus, inflammationibus, & ulceribus fraudulentis, & corrosivis, & antiquis gangranis crurum, & aliarum partium.

Utitur & *Montagnana* pro ano gangrenato, hoc unguento.

℞. Ung. de cerussa ℔bi. plumbi usti ℥ss. thur. myrrhæ an. ℥ii. lythargir. despumat. ℥ss. incorporentur in mortario ultima contritione. *Petrus Forestus, observ. liber. 23. De Sedis & Ani vitis.*

## SECTIO VIGESIMA SEXTA.

### *Pro Ani Fistula.*

**S** I incommodum quod adfert Fistula non magnum sit, nec multum saniei effluat, nec foetor adsit magnus, multi Medici suadent, eam non attingendam esse, cum Natura interdum superfluas corporis humores per eam expellat, & vitium hæmorrhoidum suppleat, Quicquid tamen dicant Autores, quod fistulæ cura dimittenda est, bonum est, ut omni die ablatur decoctione agrimonie, foliorum olivæ & aluminis usti per syringam quatuor aut quin-



quinque vicibus immiffa; deinde cum pannis lineis exsicceatur; & fi foramen fit nimis anguftum, aperiatur cum medulla Sambuci, aut Gentianæ, ne fanies in ea retineatur, & partes vicinas corumpat: Et fi easdem melle madefeceris fuperspergendo pulv. aluminis ufti, melius erit, & citius aperiatur; & femper lavetur cum dicta lotionē, in qua reperitur sæpè juvamentum magnum, vel repurgetur cum collyrio apud *Valescum* descripto, lib. 2. cap. 4. De *Fistula Lachrymali*, quod ita se habet.

24. Aloes, thuris, an. ʒi. Sacocol. balauft. sang. dracon. antimon. alumin. an. ʒiʒ. ærugin. aris. quartam partem ʒi. De isto collyrio distemperato cum vino, vel decocto gallarum, quod melius est, gutta tres vel plures in fistulam distillantur & utatur; mundificet cum melle & vino & virid. aris, donec consumatur caro mortua, quæ apparet in fistula, & occultetur caro sanguinea, ulcus probe repurgatum, curetur incarnativis. Si istis non curetur, tunc Chirurgia curanda erit, cauteriis actualibus, cum cautione tamen, cauterisando superficiem fistularum; id tamen fieri non debet, si fistula intestino, aut vesicæ propinqua existat. Alii utuntur incisione. Sed non nisi à Chirurgo peritissimo talia sunt peragenda. *Petrus Forestus, Schol. observ. 15. lib. 23.*

## SECTIO VIGESIMA SEPTIMA.

### *Pro Ani condylomatibus.*

**Q**ui Condylomata patiebatur, ex quibus interdum humiditas aquosa tenuis emanabat, huic iussi, ut folia viridia rutæ cataplamatis instar, loco affecto apponeret. Egregiè enim illud ad condylomata & hæmorrhoides facit. Si neque illa juvarent, imperavi ut pulvis subtilissimus conficeretur, ex ferrugine ferri, qui cum succo taphi barbari mixtus cum bombace applicentur. Omnia quæ Condylomatis conducunt! (teste *Ætæo*) adstringentia esse oportet. *Petrus Forestus, observ. 8. lib. 23.*

Condylomata, omnisque generis ver-

rucas, ficus mariscas, & mora ani prorsus tollunt cineres stercoreis murium cum vino cocti & applicati insensibiliter. Idem faciunt Conchyliæ juxta fluminum littora reperta oblonga, calcinata, & cum vino cocta & applicata. Sic crocus metallorum cum aqua Fœniculi distemperatus, & in petiis applicatus, dolores primò sedat, & deinde ipsa Condylomata consumit. *Joa. Hartmanus, prax. Chimiatri. pag. 203.*

## SECTIO VIGESIMA OCTAVA.

### *Pro Ani Intertigine.*

**Q**uibus ex equitatione Ani intertiginēs contingunt, argentina herba confusa commode apponitur: Hujus herbæ succo, si nates liniantur frequenter, mirabiliter juvat. Alii sebacea candela ad ignem leviter calefacta, intertiginēs inungunt, ut equites facere consueverunt. *Petrus Forestus, observ. 13. lib. 23.*

## SECTIO VIGESIMA NONA.

### *Pro Ani pracidencia ex Tenesmo precedente.*

**C**um manu molliori intestinum relictum prolapsum introduci non posset Spongia Anum foveri iussimus cum decocto Malvæ adjecto butyro, & ubi detumuerat, cum pars stercore inquinata esset, vino rubro abluere mandavimus; deinde ut mollioribus manibus imponeretur, ubi verò intestinum repositum esset, fovere iussimus decocto adstringente & roborente ex gallis, cort. granat. ros. plantag. & balauft. in aq. Chalibeata decoctis & podicem inunximus oleo myrtino, pulvere superinsperso, ex myrtil. ros. corn. cerv. ufto & gallis; quibus subsidiis curatus fuit. *Petrus Forestus, observat. 2. lib. 23.*

Reposito ut decet intestino, ad adstringentia accedendum, tum interna, tum externa. Inter interna laudabile est decoctum radicis prunellæ sylvestris in Cerevisia vel Aqua, quod sæpius haustum, in die per aliquod tempus leniter adstringit, sed ita, ut alvus quoque libera simul



sic, quam in ejusmodi casibus semper oportet esse talem.

Externa sunt varia, sed elegans est, quod sit ab asserere querno apprimè lævigato, & cum Mastiche, postquam ille incaluerit ad ignem, illito & statim ano supposito, supersedendo, ad tolerantiam tamen ipsius caloris: quod si autem intestinum repositum, nullo modo vel arte intus manere, aut hærere possit, hoc unicum est præsens remedium.

℞. Scarabæos in stercore equino natos mortifica in vitro clauso ad solem, benè exsiccantur & F. pulvis tenuissimus, de quo sparge super intestinum prolapsum, & quoquomodo poteris repone, nunquam egredietur amplius; præsertim si deinceps decoctum radicis prunellæ sylvestris ad tempus usurpatum fuerit. In procidentia etiam oculi prodest hoc remedium ex Scarabæis petiitum. Aluminis usus propter nimiam stipticitatem cautè evitandus. *Job. Hartmanus. Prax. Chimiatri. pag. 205.*

Infantes ani procidentia imprimis ob refrigerationem laborantes, quod & in adultis fieri potest, bonum est supra truncum quercus recenter cæsæ, calefactum, & secundum rectitudinem ligni erectum, collocare; idque ideo quia ejusmodi truncus de ligno recenti maxima astringendi vi præditus est. *Fælis Platerus, Prax. Med. Tom. 3. lib. 2. pag. 578.*

## SECTIO TRIGESIMA.

### Pro Ani Prolapsu.

**Q**Uinquagenarius quidam, cum Multo oneratus, ex oppido domum rediens, in via alvum exonerare vellet, ac sese inclinaret, prolapsum ipsi est intestinum, & quia tunc aer frigidiusculus erat, exortus est dolor maximus, ita ut ulterius ad suos progredi, neque ad oppidum redire posset: Verùm fortè fortuna a prætereunte quodam semianimis repertus, mihi adductus fuit, tum intestinum rectum prolapsum, & ad magnitudinem ovi ostrutii temefactum reperi; dolor ingens aderat, & excrementa continuò, eaque liquida & viscida ef-

*Brunet Parte L*

fluebant: In curatione sic processit; primò sequens applicui fomentum.

℞. Fol. & flor. Verbasci albi flor. Chamæm. Melit. rad. & fol. Alth. an. Mj. sem. lini & fenugræc. an. ʒss. ani si ʒi. coque lacte vaccino rec. multo. in decocto isto lintamina reduplicata intinxi, & per horam integram calidè applicui. Deindè toti intestino sequentem inspersi pulverem.

℞. Ros. rub. cort. granat. nuc. cupres. mastic. thuris, croci martis, plumbi usti, an. ʒi. M. F. pulvis.

Tandem caput ægri in terram inclinaui, pedes verò ut in altum a duobus viris fortibus elevarentur operam dedi; mox indice meo dextro linteo molli & suavi involuto, & decocto præscripto intincto, nec non in centro ejus quod prolapsum fuerat, posito, intestinum in locum suum fœliciter reduxi; altero die os sacrum & coccygis sequenti linimento inunxi.

℞. Ol. lumbric. ros. an. ʒi. ol. ex floribus ʒss. M. Sequenti die Syrup. ros. solut. compos. cum rheo. agar. & Sen. corpus leniter purgavi, venamque in brachio incidi; & sic in pristinam sanitatem restitutus fuit, nec postea amplius prolapsum est intestinum. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 76. Centur. 3.*

## SECTIO TRIGESIMA PRIMA.

### De Aphthis.

**Q**Uæ in oris interna superficie fiunt ulcera, ac ignei caloris quiddam obtinent, Græcis ἀφθῆς (fortè ἀποτρεφῆ ἀπὸ τῆς θερμότητος, accendi) Latinis Lactucimen, Barbaris, Alcola nominantur.

Sunt ulcera non admodum cava in quamvis oris partem serpentina, in palatum, in gingivas, in linguæ latera, & radicem.

Oriuntur, ut plurimum infantibus, puerisque lactentibus, quibus admodum familiare est malum, quum scilicet, aut lac nutricis vitiosum fuerit, aut non probè ipsum infans concoxerit ex qua lactis acrimonia



nia & putredine, fursum elati habitus, partes illas molliores & delicatas facile exulcerant: fiunt etiam aliquando in iis, qui ad perfectam aetatem pervenerunt; & tum causæ sunt tenuens, serosi, & acres humores, in toto corpore redundantes, & ad supradictas partes delati. In febribus frequentes sunt Aphthæ, nonnunquam & sine febre graves, quales sæpè mensibus suppressis observantur. Eas etiam venerea lues & hydrargyri perunctio solet excitare. Ex pustularum colore præfagientia signa sumimus: albicantes enim ac rubentes tutiores sunt, & curatu faciles; lividæ autem; aut subnigræ perniciosæ, & sæpè lethales habentur.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### *Pro Aphthis Puerorum.*

**N**Os linctu utimur ex diamoto, succo granat. & melle, hoc etiam addam quod à Pharmacopæo accepimus. Multi Infantes cum *Anteuverpia* ex Aphthis morerentur, ex vetulæ consilio, ranulam vivam ori puerorum admovebant, suctione malignitatem attrahentem, eaque defessa & mortua, alteram ori imponebant: deinde rursus aliam, si opus esset; quin præsidio, & pueri, & infantes evadebant. Idem in pueris suis, tum aliis expertum narrabat. *Petrus Forestus observ. 21. lib. 14. De Affectibus Labiorum gingiv. dentium, oris & lingue.*

Juvenis biliosus, cum in Aphthas incideret, & valdè ignitas & flavas, postquam ex infuso rhab. purgatus esset, collutionem præscripsi, quæ refrigeraret, & fervorem restringeret in hunc modum.

℞. Fol: plantag. bellid. min. portul. semperviv. solan. an. mj. flor. ros. rub. p. i. sem. Cydon. ℥ss. F. decoctio in aqua in colat. fbi. dissolv. diamor. ℥ii. succ. mali punici acid. ℥ss. M. F. collutio. Postea adjeci ad majorem refrigerationem, succum solani, & aceti modicum. Deinde ut magis abstergeret, in decocto adjeci hordeum integrum, etiam mellis rosati nonnihil, ut citra mordacitatem magis discuteret. *Petrus Forestus, observ. 22. lib. 14.*

Hic Syrupus mirum in modum prodest.

℞. Fol. viol. fragar. semperviv. bellid. min. plantag. portulac. an. mj. sem. Cydon. ℥i. coq. in aqua communi colat, fortiter expressæ add. sacch. q. s. & Coq. ad consistentiam Syrupi, S. A. ut melius abstergat, loco Sacchari, meladdi potest. *Petrus Forestus, Schol. Observ. 24. lib. 7. De Februm Symptom.*

### SUBSECTIO SECUNDA.

#### *Pro Aphthis.*

**F**Illius meus quatuor annos natus, passus est fluxionem acerrimam in linguam & fauces, ut infinitis ulceribus scaterent, iisque albicantibus, & admodum dolorificis, cum magna inflammatione, non poterat cibum, aut jusculum capere, nec lac sugere; diebus ac noctibus ejulabat insomnis, macilentus, ac ferè consumptus. Ex remediis non profuit mel rosaceum cum Spir. Vitrioli, quod alias mirificè conduxerat: aderat alvi fluxus copiosus, quo bilem porraceam ejiciebat vesicatorium valdè profuit: sed dolores & clamores perseverabant, & continuo ager per os humorem serosum & acrem emittebat, dolore & inflammatione magis ac magis attrahente, tandem exhibui Laudan. gr. i. cum jusculo, coque dolor sopitus est somnus levissimus conciliatus, qui postmodum perseveravit moderatus & suis horis adveniens. Hinc cœpit convalescere, & fluxio illa humoris per os emanantis omnino cohibita est: Sequenti tamen die purgans medicamentum exhibitum est, quod multum etiam profuit. *Lazarus Riverius, Observ. 43. Cent.*

Quædam mulier laborabat Aphthis contumacissimis, quæ neque venæ sectionibus, neque purgationibus multis, neque julepis refrigerantibus, neque illitu ex spiritu sulphuris curari potuerant: noctes insomnes traducebat, & vix cibum devorare poterat, quia omnes oris partes hujusmodi ulcusculis scatebant: sumpsi noctu Laudani gr. iiii. idque remedium continuavit per triduum, & sic fluxio acris in oris partes defluens cohibita est, ac consequen-



quenter oris ulcera paucis diebus percussata sunt. *Lazarus Riverius, Observ. 35. Cent. 3.*

Colluatur os sæpe decocto Satureiæ in vino, vel etiam decocto Veronicæ, quod præstans est, præsertim si adjiciatur aliquid mellis rosati. In Aphthis contumacibus hisce decoctis adde aliquid spiritus Vitrioli, & non resistant. In Aphthis ex Lue venerea omnem absolvunt nodum aquæ virides infra sectione de ozæna describendæ, imprimis si loco aq. simplicis, assumatur aqua persicariæ. *Jobannes Hartmannus, prax. Chimiatri. pag. 123.*

Lingua infantium, & oris partes, quæ pustulis sunt conspersæ, eluantur & confricentur bis terve post suctionem lacte bubulino, vel caprino, in quo auriculæ judæ vel fungi sambucini sunt incocti; cum ipsis itaque fungis & lacte, aut foliis salviæ virentibus in eodem lacte madefactis pustulæ confricentur & abstergantur: quibus absterfis partes oris pustulosæ inungantur, aut melle rosaceo, aut diamoro, aut rob. ribium, omnium autem certissimum & præstantissimum remedium ad Aphthas, cujuscumque coloris, tam in infantibus, quam adultis est, eas prius diuigenter ablutas & absterfas oblinire sequenti remedio.

℞. Mellis Rosac. ℥β. ol. vitriol. ℥i. fiat Linimentum *Frasciscus Joel. Sect. 7. lib. 2. Practica.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Aphthis.

**I**N puerulis aphthis laborantibus nihil est quod tam præsentaneam afferat operam quàm oleum raparum, si in eo tantùm dissolvatur sacchari, quantum potest, illudque ori illitum lambant: quod in meo filiolo vix octo dies nato expertus, cui aphthis laboranti dedi oleum raparum saccharatum, & paucorum dierum spatio curatus est. *Ludovicus Hanemannus. observ. 82. Misc. Curios. Med. Phys. ann. 4. decur. prim.*

### SECTIO TRIGESIMA SECUNDA.

#### De Apoplexia.

**A**poplexia morbus est gravissimus, qui primò caput obsidet, & protinus ac subito sensu & motu universum corpus privat, ita ut exitus spiritus animalis à cerebro prohibeatur, & vitalis a dictis a corde ad cerebrum præpediatur *ἐπὶ τοῦ κεφαλῆς*, i. e. a percutiundo nomen habet, quòd, qui ea laborent, veluti de cælo percussi videantur. *Avicenna* Apoplexiam definit, quod sit otiositas sensus & motus per interceptionem spiritus sensitivi & motivi ab oppilatione ventriculorum cerebri. Ejus plures sunt causæ: fit enim aliquando cerebri phlegmone, nonnunquam a glutinosa pituita, cujus nimia abundantia repletur cerebrum, ut in Apoplexia hyberna & senum, sit etiam a lymphæ crassiore, nervos magna ex parte obstruente, uti etiam ab effuso in cerebrum sanguine. Duplex est secundum *Hippocratem*, una fortis, altera debilis; distinguuntur majore & minore difficultate spirandi, ac omnis morbus est maximus, utpotè in quo Symptomatum summa sunt omnia, quæ hominem ad exitium præcipitant, antequam remedia convenienter adhiberi possint.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Apoplexia pituitosa in Sexagenario.

**S**artor quidam pallidi coloris extra urbem existens, subito Apoplexia correptus, in domum sine sensu ac motu fertur; qui cum pituita abundaret, & venæ non apparerent, sectionem venæ prætermisimus. Sed ut subito materiam a capite divertendo avellerem, ut hic Clyster infunderetur mandavi.

℞. Cent. min. puleg. calamenth. organ. beton. rutæ, saliv. mercurial. hyss. an. M i. fol. Lauri, fl. stœch. & anthos; an. p. i. sem. anis. fœnic. cartham. contus. an. ℥ii. uvarum pass. enucl. ℥i. colocynth. ℥iβ. coq. in aq. communi, in col. fbi. dissolv. elect. hieræ simpl. benedict. laxat. an. ℥β. hier. logad. diacolocynth.



n. Ziß. ol. chamæm. rutæ. an. Zi. ol. anethi, Zi. ol. castori Zi. ii. ß. salis gemm. sal. communis, an. Zi. M. F. Clyster: Interim dum Clyster parabatur, etiam alvus irritata est ad solutionem glænde infra-scripta.

℥. Troch. alhand. ℥ii. spec. hieræ picr. ℥i. sal. parum, mellis q. s. F. suppositorium.

Adhibui etiam frictions; & vincula tum femoribus, tum brachiis injeci, quibus adhibitis, tendebat in paralyfin: Sed non expectata digestionem, ut has pilulas devoraret præcepi.

℥. Pil. coch. Zi. castor. ℥i. cum syrup. de stach. fiant pil. 7. quas, cum non potuit devorare, dedimus solutas cum. aq. beton.

Cum ventrem egregiè solvissent, cepit melius loqui. Exhibuitunc Syr. è Stœchade, & Oxym. scillit. Et postea cum pilulas, devorare posset, prædictas deglutiendas dedi. Nucham quoque inunximus oleo Sampsuchino & Nardino simul mixtis. Deinde pro particulari evacuatione, palatum inunximus cum theriaca & sinapi; etiam masticatoriis quoque adhibitis & errhinis cum succo betæ, rutæ & majoranæ, & sternutamento hunc in modum præscripto.

℥. Nigell. piperis alb. nuc. mosch. an. ℥i. helleb. alb. pyrrhr. castor. an. ℥ß. M. F. pulvis. paxillum ejus calamo infusetur in nares. Ultimò ad majorem resolutionem & capitis roborationem, theriac. mithridat. oxymel scillinum, dedimus, & imperavimus ut ex hoc sequenti condito fumeret subinde.

℥. Conf. flor. Rosmar. beton. salv. an. Zi. mithridat. Zi. theriac. el. Zi. spec. diamb. diamosch. plirifarchont. an. ℥i. diacori, ℥ii. oximel. Scillin. syrup. è stach. an. Zi. M. bibebat & hoc Claretum.

℥. Salv. majoran. hyssop. beton. an. Mi. flor. rosmar. stœch. an. p. i. liquir. ras. Zi. coq. in aq. q. s. in colat. Zi. dissolv. mellis despum. syrup. è stach. an. Zi. clarificetur & aromatizetur cum Zi. cinam. fiat claretum pro tribus dosibus.

Exterius verò spinam totam inungebat, & crus paralyticum his oleis.

℥. Ol. Nardin. sampsuch. an. Zi. ol. vulp. Zi. ol. caryophil. gutt. v. tempore inunctionis addebatur aliquid aquæ vitæ rectificatæ, & sic hic fuit tandem egregiè curatus. *Petrus Forestus, observ. 77. lib. 10. De cerebri morbis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Apoplexia à delapsu ex sublimi.*

**T**heologus quidam ferè sexagenarius, scalam domi descendens decidit, capite pavementum feriens; subito collapsus instar mortui jacet, sine voce, nec videns, nec audiens; quin etiam tactu, motuque privatus, cum stertore quodam, pulsu adhuc integro, sine febre, mox vomitus subsequitur.

His signis perdurantibus, prognosin facillimè fecimus, nimirum affectum lethalem esse; secundum *Aphor. 42. sect. 2.* Ne tamen quicquam quod Christiana Charitas requirebat, intermitteretur, aliquid tentandum esse judicavimus, propterea quòd interdum etiam in desperatis casibus benedictio divina luculenter præter spem, dum ex officio extremè laborantibus succurrimus, nobis apparere solet. Hinc revulsionem a capite variis mediis instituendam, & deinde omni ingenio facultatem animalem excitandam esse putavimus. Pro primo statim venæsectionem instituimus in brachio dextro, sanguinis  $\text{Zvi. iij.}$  extractis, propterea quòd suspicio esset, sanguinem ex concussione capitis, cò confertim affluxurum. Quanquam verò sanguinis missione dextrè peracta respiratio levior videretur, in cæteris tamen nulla mutatio sequebatur, unde non tantum extremorum frictions, & ligaturas dolorificas ordinavimus, sed paulò post clysterem sequentem suavisimus,

℥. Fol. beton. Salv. prim. veris, Cent. min. Calamenth. mont. an. Miß. fol. Sen.  $\text{Zvi.}$  pulp. Colocynth. Zi. coq. in aq. & vino ad tertias, in colat. Ibi. dissolv. elect. hieræ simpl. Indimaj. an. Zi. ol. rut. de castor. anethan. Zi. sal. gemm. Zi. M. E. Clyster. Præter hæc remedia revulsionum partem affectam quoque non negleximus quam ob causam, pro secundo, non tan-



tum aq. apoplecticam Langii cum spiritu ceras. nigr. permistam, aliquoties infudimus corroborationis gratia, sed etiam oleo succini verticem tempora, & nares inunximus, ac tandem sternutatoriis ex castoreo & similibus ( quæ post universalia & revellentia rectius, quàm in principio adhibentur ) naturam excitare conati sumus sed frustra, sensim etiam vitali facultate remittente. *Gregorius Horstius, observ. 13. lib. 2. De morbis capitis.*

## SEBSECTIO TERTIA.

### De Apoplexia.

**A**dam hic descriptionem istius aquæ vitæ contra apoplexiam, paralytism, epilepsiam reliquosque capitis morbos frigidos, unâ cum confectioe quibus Palatini Comites Electores uti consueverunt.

℥℥. Flor. Lil. Conval. M. viii. vini generos. alb. ℥iv. post 4. vel 5. dierum infusionem in vitrea boccia, & quotidianam agitationem, distillantur in Balneo M. deinde.

℥℥. Flor. stœch. arab. M. j. flor. Lavend. Miß. flor. rosmar. Mi. Caryophil. nuc. mosch. an. ℥iiss. cubeb. ℥ii. visc. q. ℥iiiss. rad. pœoniæ ℥ß. rad. dictamn. alb. ℥iii. findantur radices, & cætera conscindantur, & commisceantur supra scriptæ aquæ destillatæ, quæ rursus indita in vitream bociam per dies 7. ad solem, & sæpius agitata deinde destillantur in Balneo M. & servetur aqua diligenter.

Confectio vel tabulatum hoc sit.

℥℥. Sem. pœon. excortic. ℥ß. margarit. ℥i. macis ℥ß. fol. auri, nu. 7. Sacch. finiss. in aq. supra scripta soluti ℥v. F. rotulæ. *Reinerus Solenander, consil. 14. sect. 3.*

Extractum Salvie pro magno secreto exhibent Cymici. Confectio anacardina, ut in omnibus cerebri frigidis morbis, sic & hic summopere probatur: quæ potius quàm theriaca, aut aliis opiatis utimur; per se eam exhibendo, vel cum aqua vitæ dissolvendo. *Felix Platerus, cap. 1. lib. 1. tom. 1. prax. med. pag. 49.*

Sunt qui theriacam aut mithridatum bibendum exhibent, magno quidem erro-

re, quoniam in illis tametsi diu servatis, vis opii non omnino perit, ut taceam antidota ea composita esse ex multis quæ astringentium & frigidorum, quantumvis hebetata, facultas suspectu est quoniam humor unde morbus hic committitur, cerebri corpus imbuat, & altius impingitur his medicamentis. At ubi fuerit cerebrum expurgatum tuto dantur, quoniam cerebro imbecillo ex morbo præcedenti robur addunt. *Guiliel. Rondeletius, cap. 22. lib. 1. prax.*

Sternutamentum provocare (quod per vulgato errore statim faciunt omnes) noxium est, quia humor pituitosus in corpore cerebri est, non in ejus ventriculis; itaque sternutatione non potest excuti. Præterea agitatione capitis & pectoris cerebrum oppletur, humoribus ad se tractis. Quare sternutatio non conducit, sed etiam lædit plurimum. *Idem ibidem.*

Quidam in apoplexiam cadit, omnibus modis agitur, pulvis hieræ iniicitur in nares, an ita agendum? observatum est apoplecticum injecto simili pulvere Epilepticum extitisse, quæ calidiora in os & nares ad sternutamentum excitandum iniiciuntur, quia cruda omnino materia est, amovenda sunt. *Guill. Ballonius. lib. 1. Epid. & Ephemer. pag. 6.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Apoplexia terminante in paralyfin cum sopore inexpugnabili.*

**V**ir quidam temperamento phlegmatico sanguineus, 55. annorum præterpropter, posteaquam præcedentibus diebus Symposiis operam dedisset, in prandio, inter cibum potumque incipit balbutire, mox insequens apoplexia terminatur in paralyfin lateris dextri quam comitatur inexpugnabilis dormiendi cupiditas. Secundo die morbi adveniens, ægrum omnino & paror reperio soporique deditum, facie tamen sana, & omnia intelligentem, solum latere dextro immobili, & paralytico: præmissio morbi curatu difficilis prognostico, illico hunc clysterem iniiciendum curavi.

℥℥. Rad. angel. Zardoar. an. ℥i. fol. rutæ, cent.



cent. min. organ. serpill. beton. mercurial. an. Mi. flor. Sambuc. cent. min. Cordial. omnium an. pß. sem. Cumin. anif. an. ʒß. bacc. Laur. ʒß. fol. Sen. el. ʒi. F. decoctio in colat. ʒv. dissolv. diaphæn. diacathol. ana ʒi. benedict. Laxativ. ʒß. oleum Chamæm. aneth. irin. an. ʒi. Sal. gemm. ʒi. F. Clyster. statim iniiciendus. Interius accepit per vices cochlear unum hujus aquæ apoplecticae.

ʒ. Aq. hirund. apoplect. Lang. an. ʒi. aq. pæon. Lil. convall. an. ʒß. ol. succini gutt. vii. M. diligenter ad vitrum. Postea vertex, totumque sinciput unâ cum nucha, illinebatur primum cum ol. succini calidè, deinde cum hac aqua.

ʒ. Aq. Salv. rosmar. Lavend. an. ʒiß. aq. vitæ opt. ʒi. ol. Salv. Succin. destill. an. ʒß. M. ad vitrum. post fotum cum hac aqua illinebantur partes illæ cum his oleis.

ʒ. Ol. Lumbric. Laurin. an. ʒß. ol. costin. nardin. an. ʒiii. ol. vulpin. ursin. an. ʒi. ol. ros. mar. Lavend. an. ʒß. M. ad fictile.

Sequenti die cum in soporem subinde relaberetur, injectus est alius clyster paulo acrior. additis spec. de hiera. ʒii. diacolocynth. in petia ligati. ʒii. sed neque hic quicquam promovit, tametsi per horam mediam & paulo ultra subsisteret, ideoque elapsa hora, ex indito supposito tandem bisterque dejecit. A meridie contra soporis augmentum sequentibus pugnatum est.

ʒ. Rad. Angelic. imperator. Zedoar. tormentill. dictamn. an. Mi. fol. Satureiæ (quæ contra veterum peculiaris) Mii. Lavend. Rutæ, serpill. majoran. an. Miß. coq. in q. s. vini & aceti vinosi, pro decocto, petiæ duplicatæ hoc liquore impregnatæ, tam fronti, quàm nuchæ calidè adhibeantur, & sæpius renoveantur.

Succus rutæ cum aceto acerrimo mistus; ex spongia subinde naribus objectus.

Intus de hac mixtura ori ingestum.

ʒ. Oxymel. scilicet. ʒß. mithrid. el. ʒii. Castor. pur. ʒi. cum confectioe enacardiæ fiat mixtura.

Oleo etiam sequenti paulo fortiori, prærunte aqua superscripta, juxta cum

spina dorsi nucha calidè fovebatur.

ʒ. Ol. Laurin. petrol. an. ʒi. ol. Castor. laterin. an. ʒii. Euphorb. pul. ʒi. ceræ rubræ & aceti parum M. F. Linimentum.

Pulvis pariter sternutatorius naribus insufflatus est. Gargarismi etiam tentati. Denique ut intam magno peneque desperato morbo, nullum remedium aliàs salutare, prætermitteretur, Clysteriis suppositoriisque nihil aut parum facientibus, sequentes pilulas capitales pro revulsione ac minoratione repletionis istius apoplecticae præscripsi.

Extract. pil. Coch. ʒi. gummi. gutt. lax. el. gr. v. castor. el. gr. iv. ol. Succin. gutt. iii. Syrup. de Stœch. q. s. F. pil. nu. ʒ. in aurentur quia deglutiri non poterant, sic dissolutas propinavi.

ʒ. Aq. pæon. Salv. an. ʒx. dissolv. pil. prædict. adde aq. Cinam. perlat. an. ʒi. Sp. vitrioli, gutt. iii. M. F. haustulus brevis. Elapsa hora excrevit aliquoties materiam duram, nigram, foetentemque pro majori revulsione, ab utraque parte nuchæ applicata sunt vesicatoria, sed omnia præsidia frustranea, *Joannes Petrus Lotichius observ. 10. cap. 1. lib. 2.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### De Apoplexia forti ab ebrietate.

**A**nglus sexagenarius virginum Anglarum Leodii agentium, Symphonix organisque præfectus, media quadragesima ebrius, in penuarium hospitii pugilum, in quo poterat, delapsus, occipite contuso, osse tamen calvariae integro, vera, & forti apoplexia correptus fuit. Medicis omnibus illum soli prognostico relinquentibus, rogavi partes & virgines Anglas, quibustum ordinariam medicinam faciebam, paterentur ne me aliquid tentare, remediumque nullo modo anceps experiri illis annuentibus, ægro validè concusso & ægitato, Clysterem protinus acerrimum inicio, quo duabus horis cessante, & glande acri evocato cum insigni evacuatione, toti capiti raso cataplasma ex fimo columbino, euphorbio, pyrethro, & sinapi applico, hinc multæ magnæque vesicæ cum se furrigerent, omnibus.



## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Apoplexia.*

bus foreipe sectis, aquæ flavissimæ plurimum effluxit, suppositis rubrorum caulium foliis contulis, multà iam nocte domum redeo. Postridie specierum hier. Colocynth. ℥ii. Castor. ℥ß. rutæ ℥i. cum aq. antapoplectica propinavi, quæ potio cum ex voto successisset, cucurbitulas humeris cum scarificatione applicui, unde minuto stercore, salivaque circa os omnino siccata, in spem erectus vesicis capitis non amplius fluentibus, novas in nucha, & vicina, sed solis cucurbitis excito in hunc modum. Capiò latioris cucurbitis excito in hunc modum. Capiò latioris cucurbitam vitream, quam stupra ardente ut sit munitam applico, cum per horæ quadrantem hæserit detraho, novamque cum flamma maxima adpono, paulo post in iunioribus & eufarcis. (In senibus aut densa cute præditis tardius, vesiculæ surgunt parvarum acicularum capitella vix æquantes: quibus omnibus horæ spatio cocuntibus, surgit vesica maxima orificio cucurbitæ par vel major; tum si cucurbita vitrea non habet foramen cera obductum, quo acu perforato, flatu exeunte sponte sua cadit, plerumque vitrum cultro percussum frango, alioquin vesicam, dum manu avellitur lacerans dolorem sævum excitat. Hoc modò innoxie & intra horarium spatium, certò certius surgunt vesicæ, cum alia vesicantia, post multas horas sæpe spem nostram eludant. Est hoc meum inventum, & quod sciam ante me nemini usitatum, usitatis deinde remediis usurpatis & continuatis, ab hoc malo tandem, ut & succedente, linguæ paralyfi, liber evasit.

Alium Anglum apoplecticum in cuius caput magna porta cum trabecula adhærebat, deciderat, ita curavi; illius capiti raso post universalia imposui Emplastrum *Alexandri Benedicti*, quod etiam *Valeriola* commendat. obs. 9. lib. 5. quod quia fidum inveni, hic describam.

℥i. Gummi hederæ, ceræ, terebinth. an. ℥iij. resinæ purgatæ, ℥ß. Succ. Corymbor. hederæ, ℥iv. ammoniac. ℥ij. ol. ros. ℥iij. farin. fabarum q. s. F. Ceratum. *Henricus ab Heers, observ. 21. lib. 1.*

**P**ROVISIONE habita totius corporis, prae caput ea parte ubi sunt futurae & impone illi Emplastrum ex sinapi, castoreo, & aceto forti. Brachia & crura illico stringe vinculis; jubeque fricari manus & pedes nitro cum sale, sub lingua ponatur castoreum. Deinde Saphena vena utriusque pedis aperiatur. Hinc manus vena tundatur: tandem nasi, vel jugulares postridie Clyster repetatur.

℥i. Castor. & Euprob. an. ℥i. id totum infletur radici linguæ, id extrahet picuitæ maximam copiam per palatum horæ spatio. *Johannes Heurnius, ad Hippocr. Aphor. 42. sect. 2.*

Medicus apoplecticum aggressurus, ante omnia consideret, an in agro adhuc signa aliqua vitæ adsint; quibus cognitis ad curam sese statim accingat, egrum hinc inde agitare, & membra ejus fricare mandet, abradis capillis verticem statim & nucham inungat oleo succini statimque si os clausum sit, illud aperiat, apertumque conservet. Capiti sæpius admoveat laminam ferream ignitam. Per os si fieri potest, exhibeatur cochlear unum hujus aquæ antapoplecticæ meæ compositionis, quæ ad præservationem & curationem unice prodest.

℥i. Fl. Lil. convall. mense Majo cum exortu solis collectos (maturos & adhuc rordos statim in vitrumingere sine lotionem) eoque recentes sine apiculis, saltem protuberantes flores abscerptos in vino generoso, malvatico vel alio dulci digere ad solem, in vitro optimè clauso, relinque tamdiu, donec etiam lavendula floreat cujus flores caruleos sine calicibus, & apiculis diligenter separatos, æquali pondere, conjunge cum floribus Lili Convallium in idem vitrum, quod firmiter clausum relinque usque ad mensem Septembrem: tandem per alembicum ex B. destilletur, & quæ primo loco egreditur aqua spiritiosa diligenter reserve-tur. Est enim pretiosa, & tam præservando quàm curando apoplecticis prodest (reliqua etiam usui esse potest, sed

tam



tam virtuosa non est, facit imprimis ad frictiones membrorum) hæc aqua diu durat & fragrantissima est. Si nimiam sentit sanguinis abundantiam, venam brachii, immisso tamen prius Clystere acriore, aperiat. Hinc ad vomitoria aquam scilicet benedictam confugiendum, ubi notandum, quod in duplici semper quantitate, prout sopitæ vires, exhibenda. Interim continuanda exhibitio aquæ apoplecticæ, *Johannes Hartmanus*, prax. Chi-miatr. pag. 75. & 80.

Fortissima apoplexia correpta fuit mulier quædam 48. annorum, habitu corporis *εὐραπῆα* ac carnosum, concidit subito. Seniores Medici vocati nihil spei superesse judicabant: tandem 16. ab invasione horis vocatus accessi, tum temporis adhuc juvenis observavi gravissimam cum difficili admodum respiratione apoplexiam: pulsus fortem & magnum, tentandam esse curationem existimavi, itaque sanguis illo die bis, & quidem satis copiosè, detractus, semel è brachio dextro, deinde ex pede: Enemata quoque hoc ipso die satis acria duo injecta, deinde singulis diebus singula, adhibita & localia quædam, ita tandem octavo aut nono die suos domesticos agnoscere cœpit, & nonnihil balbutire. Postea purgantibus medicamento per os exhibitis, deinde *πυρρῆσις*, apophlegmatismis, aliisque similibus usa, meliuscule habuit; verum eousque perducere non potuit, ut mentis ac sensuum integrè compos fieret, aut pedibus consisteret. Mansit reliquo tempore impotens: sedebat, ac gestabatur in sedili, ita tamen aliquot annis supervixit. *Rembertus Dodonæus*, cap. 8. observat. Medicinal.

In apoplexia summum & unicum remedium habentur cucurbitulæ capiti impositæ; quod remedii genus D. Fracastorius apoplexia correptus nutibus suis indicasse fertur: sed non intellectus perit. *Daniel Sennertus*. cap. 33. part. lib. 1. Practicæ.

Spiritus Salis dulcis rite præparatus magnæ est efficaciz continuò in vino potuè assucto ad gutt. x. vel xv. assumptus. *Paulus Barbette*, prax. lib. 1. capit. 2.

Ego verò spiritum salis armoniaci, cum aq. Serpilli, & Lavendulæ destillata assumptum, ad præservationem scilicet præferrem *Fridericus Dechers*, notis ad cap. 2. lib. 1. prax. *Barbettiana*.

Aqua destillata è nucibus moschatis, auribus, palato, naribus, ebibita, omnium est remediorum accommodatissimum, quod si fiat, cum aqua vitæ destilatio, multo erit efficacior, hoc præsidium Senectensem Episcopum horas iam 20. iacentem excitavit.

Rhazes sartagine calefieri, dum candeat, interdum laudat, & de proximo admoventi capiti. *Jacobus Hotterius*, cap. 7. lib. 1. De morbis internis.

Ab hinc 4. annis, præsidem Valentem qui ab obstructione venarum iugularium, & catotidum arteriarum apoplecticus pene conciderat, liberali sanguinis detractone; curavi, hunc etiam in apoplexia totam noctem dormire permisi; quoniam absque stertore dormire visus est, unde melius habuit, nam si cum stertore dormiat apoplecticus, statim excitandus est. *Ludovicus Duretus*. in annotat. ad cap. 7. lib. 1. *Jac. Hellenil*. De morbis internis.

D. *Screvelius* anno 1639. commemoravit mihi quod Hagæ Comitum tractasset Chirurgum quendam apoplecticum; qui statim ac corripiebatur morbo, clamabat pellis humana: *Screvelius* quærebat quid ea vellet? collo appensam dicebat, eomodo enim ante tempus aliquod apoplecticum Germanum sanatum vidisse qui subinde cutem humanam expetebat: quam cum ipse à *Petro Pavv* anatomiz Professore *Leydensi* petisset, illicò colo appendebat, & apoplexia planè liberabatur. *Otto Heurnius*, ad capit. 3. liber. 5. pathologiæ *Job. Fernelii*.

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Apoplexia præservatione.

**S**I propter intemperiem frigidam, totius cerebri, huic morbo aliquis est obnoxius, singulis diebus aliquid assumendum est, quod spiritus animales & calos



calorem naturalem refocillet, & temperamentum cerebri conservet.

Nihil ad hoc ambra convenientius itaque his orbiculis singulis diebus uti convenientissimum.

℥. Sacchar. albiss. in aqu. ros. & lavend. dissol. ℥iv. ol. amf. destill. gutt. iii. ambr. grif. gr. iv. M. & F. confectio in rotulis. Vel;

℥. Spec. diamb. diamosch. d. an. ℥j. Sacchar. albiss. in aq. borrag. solut. ℥iv. ol. amf. gutt. ii. M. F. rotulæ.

Nucem etiam moschatam tostam, & frustulatim incisam, sæpe in ore detineat. Nam hæc cerebri intemperiem frigidam corrigit.

Inchoante apoplexia, plerique omnes subito sanguinem mittunt, sed hoc certum, occidere missionem cum non liberat.

Suffitum etiam ex succino statim, factum, quidam vehementer probant rationibus verò eos destitui, satis ostendere eruditi Medici possunt. Sternutoria quoque periculosa sunt, utilia tamen si in loco adhibeantur. Concutere partes superiores maximè colli, rectum est. De raso capillo cucurbitulam vertici imponere utilissimum esse, magnus Medicus experientiæ didicit. De aquis vitæ mortiferis nihil dico. Magna est varietas, summa in usu vanitas, atque non minus interdum quàm ebrietas, quæ hujus mali mater est, nocent. *Johannes Crato, consil. 5.*

Habeo pro singulari experimento in arcenda apoplexia usum subscriptarum pilularum de quibus ℥i. ad noctem novilunii & plenilunii exhibeo etiam æstivo tempore, debet autem frugalior cœna antecedere.

℥. Cubeb. calamenth. mastich. nuc. mosch. Caryophil. an. ℥i. ambr. ℥ss. mosch. gr. vi. cum succo majoran. formantur pilulæ. *Abraham Seyler. Epist. 4. lib. 6. Epist. Cratonis & aliorum Medicorum d. Scholtzia editorum.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### De Apoplexia ex cerebro fluido:

**A**Nus quidam Monspeßuli subito apoplexia tacta, expiravit, cuius calvariam, cum aperiremus cerebrum in menynge crassa hinc inde fluctuareprehendimus, quod & dissecta dura matre, instar liquoris alicuius spissioris, & albi pulstem referentis, per faciem universam defluebat. *Fælix Platerus. Observ. lib. 1. pag. 16.*

## SECTIO TRIGESIMA TERTIA:

### Pro Apum ictu.

**A**B apum aculeo ictus in cute extrema indicis, cum intolerabili cruciabar dolore, autoritate Dioscoridis inductus, accepi folia viridia ipsius lauri, & fortiter pistillo ligneo in mortario lapideo contudi, & emplastri modo, hora nona ante meridiem loco affecto apposui, & sensi statim attractionem vehementem, ita ut ante prandium magna ex parte dolor ille ingens cessaverit; post meridiem autem nullum vestigium doloris in digito relictum est, hora tertia pomeridiana emplastrum cum amoverem vidi aculeum prorsus extractum, & radicitus ab emplastro evulsum, ita ut supra carnem digiti icti iaceret. Denuo Emplastrum per totam noctem admovi, & manè abiciendo, nullo alio medicamento utens, sine dolore tum Sanus evasi. *Petrus Forestus, observ. 34. lib. 6. observ. Chirurg.*

Mercator Monspelienfis quinquagenarius, cum summo mane ex urbe egressus esset, peregrè discessurus, & mille passuum iter ab urbe perfecisset, examen apum in aere volitans eum subito invasit, & totam faciem ac cervicem infinitis aculeis compunxit. Undè gravissimi dolores statim exorti sunt, qui eum domum repetere confestim coegerunt. Ad illum statim vocatus, hominem invenio maxima doloris impatientia oppressum, ut vix in lecto se continere posset, facies intumescebat, & rubore undique infecta erat. Iubeo statim partes compunctas illigiri theriaca, quæ



quæ cum doloris atrocitatem non compesceret, solum præscribo ex eadem theriaca in aqua vitæ dissoluta, quo dolores aliquantulum mitigati sunt, & tumore faciei imminutus. Postmodum locis magis dolentibus admotæ fuerunt capæ contusæ in modum cataplasmatum. Lac ficulneum etiam quibusdam particulis admotum, ac deinde inunctiones factæ ex oleo Scorpionum *Mattioli*. Doloris acerbitas remedia sæpe mutare cogebat, quæ per duas horas continuata, & exhibita potione cardiaca & alexipharmaca, dolores in omnibus ferè partibus cessarunt. Adhuc tamen infestabat dolor acutissimus in auris sinistra cartilagine, qui predictis remediis sedari non potuerat. Animo revolvens non solum apes parti admotas venenum attrahere, & dolorem sedare, sed etiam alia muscarum genera, existimavi cantharides duplici nomine conferre posse: tum quod inter muscarum species numerentur, tum etiam quod attrahendi vi potentissima præditæ sint. Et cum emplastrum vesicatorium, quod in Officinis habetur, magnam cantharidum copiam in sua compositione recipiat: ex eo paratum emplastrum auri admoveo, quod intra horæ quadrantem dolorem omnino submovit, vesicis, non excitatis propter moram exiguam. *Lazarus Riverius, Cent. 3. Observ. 14.*

## SECTIO TRIGESIMA QUARTA.

*De Apostemate circa genu cujus purulenta materia per secessum excreta est.*

**V**ir quidam apostemate circa genu regionem torquebatur, quo suppurato, illud ferro aperire Medicis annuentibus Chirurgus decrevit: sed jam labente sole, & in occasum die, tumoris sectio procrastinata fuit: mane redeuntibus Medicis & Chirurgo (mirandum dictu) tumorem evanuisse, & pus per secessum evacuatam repererunt: legas & consideres lector, quomodo, & per quas vias materia purulenta in cavitatem hypochondrii, inde per intestina remeans, per anum excreta fuerit. *Dominicus Panarollus. Obs. 42. Pentateuche 1.*

## SECTIO TRIGESIMA QUINTA.

*Pro Appetentia canina.*

**A**ppetentiam caninam (hujus causa succus vitriolatus in ventriculo, non ergo imperandus est vomitus, ne moto humore sequatur Cholera, nec dandi sunt succi vitriolati acidi, ne malum augeatur) tollit. essentia melissæ cum spiritu vini extracta; cujus dosi cochlear. i. Misce cum aliquot guttis ol. carvi, præmittenda tamen sunt universalia, quæ succum vitriolatum seu bilem minuunt, & per inferiora seducunt, sic extract. Rhabbarbari, mechoacannæ, item panchymaggon vegetabile maximè hic laudantur. Vitelli ovorum indurati sæpius comesti, à specifica proprietate *Kurps&or* solvunt. *Job. Hartenanus, prax. Chimiatri. pag. 168.*

Curabitur fames aucta, exhibendo ea quæ acidum succum in corpore temperant, infringunt, & emendant, ejusdemque augmentum præveniunt: potentissimè succum acidum infringunt salia lixiva, tum fixa, tum volatilia, ut & alia alterutro abundantia, coralia, margaritæ, oculi cancerorum: creta, lapis hæmatites, Succinum, Chalybis limatura, & similia. Eundem succum acidum obtundunt pingua, & oleosa omnia. Eum pariter temperat Spiritus volatilis ex vino, aliisve paratus, eum denique diluunt & enervant aquea quævis copiosè usurpata, abstinendum ab usu acidorum. Exempli loco sunt sequentia.

℞. Coroll. rubr. præp. marg. præp. an. ℥i. Cretæ alb. ℥ss. Sacch. alb. ℥iii. M. F. pulvis in 6. doses dividend. & bis in die tribus saltem quatuorve post cibum assumptum horis, ex vini potentioris cochleari assumendus, cui forma liquida magis arridet, capiat subinde sequentis misturæ cochlear. re unum.

℞. Aq. menth. ℥ii. aq. cochlear. tincturæ cinamomi cum spiritu vini rectificato per infusionem paratæ, an. ℥ss. syrup. absynthii. ℥i. M. Vel.

℞. Ol. macis, granorum juniper. an. ℥i. M. in vitro.

Hujus olei guttas 2. vel 3. sumat æger aliquoties in die, ex vini malvatici, alteriusve



riusve generosi, aut præmissæ mixturæ cochleari.

Utatur quoque fame aucta pressus, jussulis tum pinguioribus, tum ad gelatinæ consistentiam proximè accedentibus, nulloque acido conditis: nulla hîc purgantia præscribo, quoniam nulla sunt hæcenus mihi nota, quæ humores acidos educant blandè. *Franciscus Sylvius, cap. 2. sect. 16. lib. 1. Prax. Med.*

*Villanovanus* refert quendam hoc affectu percitum, panem calentem, amurca olei imbutum, comedisse, & mulierem bovis liquatum adipem, cum pari calentis olei quantitate, duabus vicibus bibisse; & intantum cibi fastidium utrumque incidisse, ut nihil per 5. dies comederint, & à priori affectu liberati sunt: Narcotica medicamenta sensum ventriculi nimis exquisitum obtundendo, famem illam caninam possunt imminuere. Inter ea theriaca recens magis est ex usu, quia præter vim narcoticam, humorum etiam malignam qualitatem, quæ à nonnullis in hoc affectu subesse creditur, virtute alexiteria corrigere valet. Narcotica tamen rarò & non nisi summa urgente necessitate usurpanda sunt. Ambra grisea ad gr. v. vel vi. cum ovo sorbili sumpta, non solum ventriculum roborat, sed etiam proprietate specifica huic affectui prodesse creditur. *Lazarus Riverius, cap. 2. lib. 9. Prax. Med.*

Magister meus quendam curavit, qui propter malam complexionem stomachi patiebatur appetitum caninum, & in cura multorum steterat Medicorum, qui eum non poterant curare. Fecit eum infundere panem in amurca olei, & postea vinum dulce & spissum dedit illi in potu, postquam panem in amurca olei infusum comedisset, & sic fastidiatus & curatus ab illa ægritudine fuit. Vidi alium quendam, qui libram unam adipis vaccini in lb. 1. olei fecit liquefieri in modum unguenti, & totum comedit, & tantum fastidiatus est, quod stetit per quinque dies, quod non comedit: & sic ab illa ægritudine curatus est. *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 15.*

## SECTIO TRIGESIMA SEXTA.

### Pro Area.

**P**ost universalia remedia, commodè hoc Linimentum ex cinere apum & oleo myrtino paratum præscripsimus, quo *Helideus* præceptor meus *Bononia*, uti solebat. At locus affectus prius lavari debet Lixivio aliquo convenienti; si caput etiam radatur, & pulvere apum fortiter fricetur, capillos evocat, uti famulo cuidam evenit.

Alter etiam juvenis cum calvus esset, neque tegmen à capite deponere auderet, ob crinium defectum. Emplastrum ex muscis tritis, terebinth. & vitell. ovorum concinnatum, appositum est; quo remedio capilli in maxima copia creverunt. Nonnullis profuit liquor à limacis rubris sale aspersis stillans, cum oleo ovorum mixtus, loco prius panno aspero fricato. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 8. De externis capitis vitis.*

## SECTIO TRIGESIMA SEPTIMA.

### De Argento vivo sine noxa deglutito.

**H**Ydrargyrum in occluso vase reconditum, cum casu mulier ebibisset, statim timore percussa, ad me consilii causa properavit, atque in itinere magnam illius, & in hypocausto meo quoque involuntariè per secessum elapsi copiam excrevit, nec quid mali postea est passa. *Felix Platerus; observ. lib. 3. pag. 900.*

Agrestem novit *Prævotius*, qui ad deturbandam alvum argenti vivi ℥ii. quovis die acciperet, quas rejectas & probe lotas, iterum consueto more usurpabat. *Job. Rhodius, observ. 85. cent. 3.*

Quidam sibi violentas manus inferre cupiens, libram dimidiam argenti vivi deglutivit, sed sine noxa, quod tamen contra vulgarem sententiam est, valdè enim nocuum creditur, at modò crudum sit, pondere suo subito transit ad anum, & Catalauni illum sic puerulis adversus vermes, quos mirè fugat, propinant. *Petrus Borellus, observ. 29. cent. 2.*



## SECTIO TRIGESIMA OTTAVA.

*Pro Aronis punctura.*

**E**Go cum Aron herbam degustarem, atque linguæ punctiōem maximam sentirem, statim commanducato Millefolio, punctio illa cessavit. *Petrus Forestus, Scholast. observ. 10. libr. 30. De Venenis.*

## SECTIO TRIGESIMA NONA.

*Pro Arsenici Veneno.*

**M**ulierem quæ illud sumpserat, statim ad vomitum coegi, & butyrum cum oleo communi una cum Cerevisia, quæ ad manum erant, propinavi, mox oleum amygd. dulc. dedi in magna copia, & egregiè vomuit; quod oleum cum sæpius capisset, maxime contulit. Nam quadam proprietate (ut in aliis experti sumus) Arsenici excoarationi resistit. Mox theriacam dedimus, & sic fuit curata: quod si non habuisset hæc remedia successum, dedissem propriam antidotum, estque Zi. Cryſtalli veri, subtilissime triti, cum oleo amygd. dulc. dedi etiam pingua jura. *Petrus Forestus, observat. 23. libr. 21. De Intestinorum Affectionibus.*

Butyrum cum valde oleosum sit natura, & emolliens, & largius potum resolvat ventrem, contra hoc venenum utiliter usurpatur. Sic puer qui arsenicum sumpserat cum jure piscium, quia Butyrum copiosè anteederat, ab omni malo liberatus est. Alii etiam pueri hoc veneno intoxicati, butyrum copiosè cum cerevisia fumentes, melius quoque habuerunt. Sic & caniculus meus domesticus, cum Arsenicum in uvis passis progilirebus, occidendis repositum devorasset, maximaque angustia afficeretur, copiosè butyrum devorandum dedimus, quo valde vomuit, & illicò restitutus est. In aliis etiam quamplurimis experti sumus in hoc casu, butyrum præ cæteris valere. *Petrus Forestus, Schol. obser. 8. libr. 30. De Venenis.*

Sumptis venenis erodentibus, non est præsentius remedium lacte bovino, sibi batur in magna quantitate, ad exigentiam sitis; quia sæpe sequitur sitis ingens tali sumpto veneno. Hoc modo liberaui octo liberos rusticos ad Benacum, qui ruri absentibus parentibus, ranas captas in oleo frixerant, involutas prius farina, quæ arsenico ad capiendos mures infecta erat, & has postea ederant. Deinde etiam Psaltriam illam & Meretricem Veronensem, quæ comederat pisces frictos in oleo cum sale & agresta, quæ omnia à marito suo infecta erant veneno, ad hoc ut omnes in domo occideret, & unà etiam amasium nobilem, qui casu retentus erat apud amicos, ut non interesset huic prandio. Ubi notandum, quod ipsa Meretrix, & pater, & canicula, qui statim lac biberant, liberi omnes evaserunt. Mater, quæ primò bibere noluit, donec videret rem in deterius vergere, & post ipsa etiam bibit, evasit & ipsa; ita tamen ut paralytica esset in utroque genu, Ancilla (quam non voluerat interficere maritus, tanquam infontem, sed jusserat ex ædibus ire, aliamque dominam magis honestam quærere) cum non vellet bibere, sola est mortua. *Joh. Baptista Montanus Consil. 367.*

## SECTIO QUADRAGESIMA.

*Pro Arteria incisa.*

**O**Rta, ut assolet, inter Commensales lite, cum quidam è convivis arreptum calicem in *Alphonſi* Hispani familiaris nostri faciem projecisset, & incisa arteria; ac cutæ dilacerata sanguis copiosior erumperet, multa quidem sed frustra, adhibita sunt medicamenta: cum ea sit arteriæ conditio, ut incisa coire aut sanescere citra ustionem non possit, quare cum sanguis eo semper vehementius flueret, quo plura experirentur auxilia, & homo jam venis exaustis, prorsus deficeret, ad me tandem mittunt rogantes, ut si fieri possit, amicum à morte præripiam. Veni igitur ad eum, vulnus inspicio, virtutem probe, nullum superesse præsidium judico, præter

ulio-



ustionem solam: quare ea qua potui diligentia incisam arteriam candenti ferro inuro, & statim suppressus est sanguis, quo inhibito, reliquum puræ faciem satis & expeditum habuit ad sanitatem regressum.

*Antonius Benivenius, cap. 49. lib. De abditis morborum & sanationum causis.*

## SECTIO QUADRAGESIMAPRIMA.

### De Arthritide.

**A** Rthritis, seu morbus articularis (quem guttam Barbari dicunt) articularum plurimum est dolor subinde recurrens, quem humoris serosi & acris, fluxio in eos decumbens, excitavit; Partes affectæ sunt membranae, tendones, & ligamenta à perioftio ortum ducentia, ac proinde sensu prædita; ab illis enim omnibus firmatur articulus. Conjuncta Arthritidis causa unitatis est solutio, antecedens verò humor serosus salsus & tartareus, ab alimentis tartaro imprægnatis, propter partium concoctioni prospicientium imbecillitatem, non ritè digestis, originem suam trahens. Ad articulos ut pervenit humor hic salsus, & subtilis, partes sentientes partim ob loci angustiam distendendo partim verò ob sui acrimoniam lacerando & vellicando, sævissimos & acutissimos parit cruciatus, qui vix ac ne vix quidem sopiri queunt, quamvis vel ipsius Apollinis auxiliares adhibeantur manus. Hinc est quod etiamnum nuncupetur Medicorum opprobrium.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Arthritide in Muliere.

**Q**Uædam bene habita & crassa admodum mulier annorum 25. quæ semel ad hæc tantum pepererat, cruciatu magno affligebatur circa coxendicis articulum, mox etiam in poplite, tandem in manibus, pedibusque, & in dorsi regione atque cervicis, ipsiusque mandibulae articulo: tumor cum rubore in certis locis se manifestabat adeoque torquebatur, ut ex contactu, decubitu, & sessione dolores intolerabiles pateretur. Vocatus ego à vino

*Burnet Parte 1.*

illam abstinere jussi, illiusque loco aquam coctam, & lac amygdalinum bibere. Pilulas has quoque exhibui.

24. Pil. sine quibus ʒii. cum aq. salviæ formentur.

Sequenti die inungere jussi loca dolentia.

24. Ol. Chamæm. Lil. amygd. d. an. ʒi. unguenti dialth. ʒß. M. Ungantur manibus made factis prius Aqua vitæ.

Sequente die permanente summo dolore, sub vesperam bibit sequentem julepum.

24. Syrup. papav. julep. rosat. aq. ros. an. ʒß. M. quievit & sudavit, sicuti post narcotica sumpta fieri solere, jam sæpe observavi; quia verò sudor profuerat, ut deinceps quoque sudaret ordinavi ita.

24. Lig. Guajac. ʒi. Sarsaparil. rad. liquoritiæ, ʒi. passul. ʒiii. fiat decoctio in mensura iß. seu lbvi. ) aq. ad tertiæ partis consumptionem aromac. cinamom. bibat de hoc decocto summo manè, sudet. Usatus est dies aliquot, & tolerabilius ferebat dolores.

Iterum redeuntibus doloribus, sumpsit tabulas meas opiatas, & placidè dormivit, iterumque sudavit, ab eoque tempore cæpit malum mittere. Ad tollendas mali reliquias, detracto primum sanguine, quia corpus plethoricum erat, dedi sequens Apozema.

24. Ligi Gujac. ʒii. lig. Sassafras ʒi. rad. enul. ʒß. fol. Chamæpit. Mi. flor. anth. Salv. an. p. i. fol. Sen. ʒiß. sem. Coriand. ʒi. sem. Fœnic. ʒii. sem. Cartham. contus. ʒi. F. decoctio in Colat. lbi. infunde agarici troch. ʒiii. zinzib. ʒß. F. expressio, aromat. cinamomi ʒiii. fiat apozema pro 4 vel 5. dosibus; addendo sacchari ʒiß. Inde melius habuit, & iterum sanitati restituta est. Præmonita prius, ut parcè cœnaret, aliquando quoque cœnam omitteret. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 491.*

Aqua frigidissima dolentem locum perfundere docet *Hippocrates*, quod, cum admodum repellendum & refrigerandum, fieri potest. Nivem etiam adhibitam aliquibus profuisse constat. Acetum quoque frigidum infusum; vel cum pannu in eo madefacto, applicatum, sæpeque repetitum, aliqui valde laudarunt. *Felix Platerus. Præcos Med. Tom. 2. c. 16. pag. 643.*

Aliqui cum inceperunt hoc morbo laborare,



borare, frequenter in aqua frigida nataverunt, & sic evaserunt morbum, roboratis partibus, & vasis constrictis, & repulsis humoribus partes internas. *Guil. Rondeletius cap. 81. lib. 3. Prax. Med.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Arthritide & præcipue Gonagra in Muliere.*

**I**Nter alia plurima quibus utebatur, decoctum hoc illi imprimis profuit.

℥. Lig. Guajac. ras. ℥ss. rad. enul. ℥ss. ebul. ℥i. hermodactil. ℥ss. sen. ℥iij. agaric. ℥ss. zinzib. ℥i. mellis ℥ss. vini poculum i. aquæ mens. iij. Coq. ad consumptionem medietatis, aromat. cinamom. ℥j. bibit dies aliquot cum levamine singulis diebus poculum j.

Cùmque gonagra potissimum illam excrucicaret, deque hoc dolore præsertim præ aliis conqueretur, aquam hanc, qua genu inungeret præscripsi.

℥. Aq. vitæ compos. ex speciebus calidis, herbis capital. aromatib. & castor. paratæ ℥ss. aq. vitæ simplicis ℥iij. opii dissolut. in aq. vitæ ℥j. croci, storac. liquid. an. ℥j. M. qua aliquoties usa tantum levaminis sensit, ut quiete fruens, nullo se usum remedio quod citius & rectius quam hoc dolorem sustulisset, prædicaret, verum cum postea nonnihil dolor denuo erupisset, & prius medicamentum absumptum esset, sequens ordinavi.

℥. Aq. vitæ. compos. ut prius ℥iij. Croci, storac. liquid. an. ℥i. ol. spicæ ℥ss. castor. ℥i. M. utatur, quod ita profuit, ut nunquam dolorem amplius in genu senserit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 496.*

Dolenti genu in viro quodam, hoc Cataplasma valde profuit.

℥. Medull. panis lbi. Coq. in lacte, adde farin. sem. papav. nig. ℥i. psyllii, ℥ss. lini ℥i. ol. chamæm. ranarum, an. ℥ij. croci ℥i. curatus sic fuit. *Platerus observ. lib. 2. pag. 496.*

## SEBSECTIO TERTIA.

*Pro Arthritide generali.*

**A**Dvocatus quidam, post varios morbos, quibus à teneris erat obnoxius, & tandem post dysenteriam, & podagram, in Arthritidem, plurimis articulorum locis simul affectis & dolentibus, inciderat, cujus causam cum illi exposuissem, curationem sequentem præscripsi.

℥. Hermodactyl. veri ℥ij. agar. rhabarb. an. ℥i. myrobal. citrin. chebul. an. ℥ss. rad. pentaphyl. aristol. rot. an. ℥ss. spic. mastich. succin. an. ℥i. cubeb. zinzib. an. ℥i. diagridii, ℥i. Extract. chamepit. ℥i. resin. Latic. q. S. F. massa pilul. Sumat bis in septimana, an. ℥ss.

Multum ille successum pilularum prædicavit. Electuario etiam sequenti usus est.

℥. Fol. Chamædr. chamæpit. an. ℥ss. fol. salv. beton. thymi, an. ℥i. sem. hyperici. ℥ij. rad. acori veri, pentaphyl. an. ℥i. succinebor. cineris cranii hominis, an. ℥ss. margar. ℥ss. mellis anthos. ℥iv. F. Electuarium, capiat ℥i. alternis diebus manè superbibendo aq. hyper. & chamepit. ℥ij. dulcorando eas cum hydromelite vero, quod malvaticum vinum refert, ut sudaret quoque altero die, quoties pilulis præcedenti usus esset. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 498.*

℥. Ol. Laurin. ℥ij. ol. lumbric. ℥ss. aq. vitæ, ℥ss. camphora, ℥i. opii, ℥ss. Coque, & illinat locos dolentes, manè & vespere, pannoque tepido partes obvolvatur. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 493.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Arthritide ex materia calida in viro quodam 40. annorum.*

**P**Ropinata Cassia, venam in brachio secari jussi: deinde Cassia dissoluta, cum succo solani apposita, iuxta *Avicen.* egregiè profuit. Si succus deficit, *Petrus Bayrus, Caroli II. Sabaudie Ducis Medicus*, eius loco aquam accipit, & unà cum Cassia infusa, petias ex panno in iisdem infundit, & ætate frigide hyeme calide frequenter applicat.



cat. Si dolor non fuisset sedatus, locum affectum oblivissem. Iuxta eundem, cum vitello ovi soluto cum ol. rosac. aut cum fantalis rubris, succo solani, portulac. aquæ lenticulæ, succo radicis salicis. Oleum de ranis etiam mirabiliter prodest. Conferunt hæc in Arthritide calida, remittendo dolorem, & prohibendo fluxum humorum ad locum dolentem. Plurimi antiqui & moderni utuntur in forti dolore linimentis ex opio. Sed illud non laudo cum *Bayero*; quia impingunt materias in parte affecta, quæ postea tardè aut nunquam resolvuntur. Ego potius utor (quod etiam idem *Bayerus* commendat) lacte calido cum pannis ex lino infuso, unum post alium sæpe imponendo, id multis profuit. *Petrus Forestus, observ. 2. lib. 29. De Arthritide & extern. partium affectibus.*

Electuarium Caryocostinum mirabile est ad auferendum dolores iuncturarum, subito solvens sine molestia, ignitum calorem extinguens, & temperans membra patientis in tantum, ut a Sella, redeat ad locum proprium sine alterius auxilio; sicut in me ipso expertus sum. Correptus fui a doloribus iuncturarum, 8. aut 10. vicibus, qui omnes meas iuncturas minimo tempore, citissime & furiosè occupabant: Cepi itaque de eo ʒss. in aurora involvendo in nebula madefacta in vino albo illine ad duas horas incepit operari fortiter, absque ulla molestia. Eram adeò impotens, quod solam linguam movere poteram, & quando ibam ad sellam, oportebat me habere quatuor homines, qui me ponerent super eam, & maxima cum difficultate; postquam solutus est venter 4. sedibus in quinta sensi me à doloribus multum alleviatum, & cum auxilio Dei, absque alterius adminiculo ivi ad sellam, & ab eadem redii, & eodem die ambulavi liberè per Musæum meum: Sequenti verò die liber evasi; & illud met expertus fui duabus aliis vicibus. Tandem cogitavi longè præstantius esse uti regimine præservativo, quàm expectare, quoad dolores me surriperent; nam statim cum sentiebam me habere signa repletionis, capiebam de dicto Elect. ut supra, & hoc ter aut quater in anno, ita quod sunt modò plus quàm 26. anni, quibus nullo modo a dictis dolo-

ribus fui molestatus; & adhuc eundem modum observo. *Gal. secundo ad Glauconem*, huius electuarii mentionem facit. *Petrus Bayerus, lib. 18. Practica sua, cap. 1.*

Post universalia remedia, solo lactis cremore oblinendo partes affectas, dolorem mirum in modum sedavimus. Chirurgus quidam *Leydanus* lenticulum aquæ & flor. chamæm. decoquebat in lacte, addendo parum hordei farinæ in fine ad modum Cataplasmatidis, & apponebat ad sedandum dolorem cum maximo miraculo; in progressu addebat plus de farina hordei. Quidam curati sunt ex testudinum carne applicata. Quidam podagræ ingentes dolores patiens, capram intra cubiculum suum apportari, ac ut ex ea lac supra membrum dolens emungeretur curabat, quo dolores diminui & meliuscule se habere evidenter sentiebat. Nec quidem iniuria, nam lac sic recens emulsum dolores mitigat & remittit, est autem remedium hoc, ut refert *Amatus cent. 6. curat. 41.* Turcarum principibus commune & familiare fati. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 29. De Arthritide, &c.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Arthritide ex materia pituitosa in muliere.*

**H**Uic pilulas ex hiera & agarico exhibuimus, crassosque humores extenuavimus cum oxym. simpl. & compos. postea purgavimus cum infuso agarici, & oxymel, deinde decoctum Sasaeparillæ dedimus & locis affectis imponi iussimus (iuxta Benedictum Veronensem) rapas concoctas, & contusas, idque calidè. Nam rapæ ferventis calor impositus prodest, uti & radix cucumeris sylvestris ex aceto cocta & illinita, & menthastrum tritum impositum, quæ egregiè iuverunt.

ʒi. Ol. Lumbric. Lilior. aneth. rutæ. an. ʒiij. vini alb. & sapæ. an. ʒiij. ranarum num. 30. salis. ʒi. decoq. ad ossium separationem facta forti expressione, adde terebinthinæ, & Croci parum, F. linimentum quo ungantur partes affectæ. *Petrus Forestus, observ. 8. & Schol. lib. 29.*



## SUBSECTIO SEXTA.

## Pro Arthritide.

**Q**uidam gravissimos dolores articulares, podagricos, & Chiragricos, sæpius levabat caulibus rubris, apud ignem calefactis, & locis affectis impositis. Butyro recenti aut majali caules primò obtinebat, deinde applicabat, & sæpius renovabat. Sequenti quoque experimento, post universalia remedia, plurimà dolore tum podagræ, tum Chiragræ, ac morbi articularis liberati sunt.

℥. Scipites duos Sambuci, 10. vel 12. digitorum, à quibus extrahatur medulla interior, tum impleatur crasso sale, & luto, utrinque foramina sigillentur, ne sal excidat, postea integula ignita sæpius circumvolvendo comburantur, & fiat pulvis: cui addatur ol. Lavendul. & rosac. q. s. ut coeant in unguentum, quo loca affecta & dolorosa inungantur, hoc remedio multi sanati sunt. *Petrus Forestus, observ. 10. & Schol. lib. 29. De Arthritide, &c.*

Retulit mihi Vastellius, quondam pensionarius Mechliniensis, se, cum in lecto decumberet ex doloribus articularum, ut nulla membra movere posset, bibisse decoctum Cerevisiæ in aqua radix lappæ incocta erat: quo epoto, cum nullis remediis à Medicis curari posset, plurimum mixxit lotium album instar Lactis, & à doloribus curatus fuit. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 29.*

Multos curavi post universalia remedia, libo lini decocto cum aqua malvæ vel Chamæ. aliquando cum lacte.

Hoc Empiricum propriè in declinatione, aut in materia frigida, post purgationes, egregiè commendatur: & est *Bertratii*.

℥. Adipis ranarum lbj. butyri rec. ℥iv. ung. mariat. agrippæ, dialthæ. an. ℥iii. ol. Chamæ. aneth. Castor. an. ℥ii. ol. ros. ℥iv. ol. costin. terebinth. an. ℥i. ol. communis antiquiss. lbj. Cerae ℥i. Sevi castrati vetustissimi lbj. Euphorb. ℥℥. resin. pini ℥ii. rhuris ℥i. conficiantur omnia simul ad formam unguenti, ad ignem calidè inungantur, est mirabile. *Petrus Forestus, observ. 12. lib. 29.*

Inter externa remedia utilis est sal tritus oleo dulci commixtus, atque artubus affricatus, quo tempore dolores non urgent; nam partes quascunque dolore affectas, non esse irritandas, sed in quiete detineri debere, aquod omnes constitutum est. *Hier. Mercuriali, consult. 78. tom. 1.*

Arthriticos dolores omnis generis, ischiadicos, & podagricos, curabat vetula quxdam Ulmenis, miro effectum in plurimis, hac ratione.

℥. Senecion. agrimon. artemis. Scolopendr. summitat. juniper. hederæ, filicis an. Mii. F. decoctio in aq. font. q. s. & ex hac fomentum pro pedibus, agro undique probe tecto, ne vapor à pedibus convertatur, postea inungit hoc linimento.

℥. Pingued. Canis. Ol. Lini. Laurini, Medull. cerv. an. ℥℥. F. linimentum.

Nobilis quidam nullum præstantius experimentum testabatur doloribus podagricis, quàm pinguedinem erinacei inunctam, quod Chirurgi cujusdam Austriaci summum secretum sæpe fœliciter usurpatum viderat. *Hier. Reusnerus, observ. 115.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

## Pro Arthritico dolore.

℥. Pulv. ros. ℥ii. mastich. ℥i. Croci ℥i. Camphor. ℥℥. farin. hord. lbj. bulliant omnia lento igne in vino albo, usque ad eorum convenientem inspissationem, eadem continuò cum spatula commiscendo, & de hoc calido membra omnia diligenter emplastrentur, & circumligentur. Hoc medicamen non solet me decipere in confortando membra, sedando dolores, resolvendo & exsiccando materias. Dico etiam, quòd si magna quantitas pulveris Hermodact. teratur cum lacte caprillo, & spongia iis intusa calidis, fomententur membra, confert solenni juvamento. *Bartholomæus Montagnana, consil. 238.*

℥. Ol. rosat. omphac. an. ℥i. mastich. Sandarach. an. ℥℥. Croci. ℥i. conquassentur in mortario, & liniatur cum iis membrum decies in die, & infundantur in ipso panni lini quibus membrum circumligetur. Et si velis hoc medicamen

selet.



fetur ꝑ. aceti . Ipsum enim dato quod sit frigidum , confertim Emplastris Scia & dolorum juncturarum , eo quod penetrare facit alias medicinas , versus finem augmenti ita agendum .

Ꝟ. Lactis vaccini . ꝑ. Croci . ꝑ. vitelli . ovorum numero iii . albumina duo ovorum , farin . hord . ꝑ. Conquassentur hæc omnia in mortario , & Emplastrentur membra intincto in iis coto : Cum autem dolores vehementissimè molestant , erit conveniens anodynum .

Ꝟ. Vitelli . ovorum numero x . Conquassentur in frixorio , & super cineribus calidis coq . levissimè , cum ꝑ. ol . rosat . usque ad inspissationem addendo Croci ꝑ. hoc remedium vidi dolores in instanti sedatos . Et si renovetur sæpe , non fuit mihi necessarium recurrere ad alia auxilia ; & non est mirabile , in hoc enim composito latet virtus anodynitatis , melior fere quàm reperiri possit , taceo hinc narcoticorum applicationem , quæ nunquam mihi placuit . *Bartholom. Montagnana , consil . 242 .*

Non abs re fuerit , si semel saltem in mense caperet ex elect . caryo costino ꝑ. vel ꝑ. vel ad summum ꝑ. manè horis 4 . ante prandium , quod maximè commendatum est in hoc genere morbi , sicut experimento fuit sæpius comprobatum . Non solum solvet alvum , sed etiam materias morbificas educet . *Hieron . Capivaccius consil . 26 . lib . 7 . Consil . Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum .*

Quidam dixit mihi quòd accipiebat noctuam bene pinguem , & deplumata coquebat in modum pulli , & dabat eam ad comedendum , & brodium ad bibendum , & hoc solo multos arthriticos curabat .

*Electuarium Papa Valens contra Chiragram , Podagram , Sciaticam , Colicam & Ileum .*

Ꝟ. Succu foenugr . depurati ꝑ. mell . depumati ꝑ. ii . bulliant lento igne ad succi consumptionem , tunc deponatur ab igne , & infrigidari permittatur , deinde adde pulv . hermodactyl . ꝑ. ut fiat electuarium de quo sumat . ter in hebdomada mane ad magnitudinem castaneæ in aqua appropriata . Mustela in vino & oleo cocta usque ad dissolutionem , deinde pistetur , per pannum coletur , & addita cera fiat ceratum , partibus affectis applicetur . Utile est :

*Brunet Parte I .*

Item Ꝟ. Raf . c . cervi . Coqu . in vino ad vini consumptionem . Item addatur vinum , & hoc fiat ad minus ꝑ. vicibus . Cum eo quod remanserit liniantur loca dolentia : mirabiliter enim dolorem amputabit . *Arnoldus Villanovanus , Practic . lib . 2 . cap . 31 .*

Post purgationem utebatur tali balneo :

Ꝟ. Aluminis crudi M . i . sal . M . ii . fol . quercus , plantag . ramentorum ligni juniperini , an . M . v . Mixta coq . omnia in aq . font . q . l . ad balneum . In hoc agrotus quotidie bis , mane & vesperi , residebat ad duas horas , & tertio quoque die renovabat : sicque brevi tempore sanitati restitutus fuit , *Deo Archiatro soli laus . Martinus Rulandus , cur . 48 . cent . i .*

Mulier arthriticæ 62 . annorum sequentem adhibui Medicinam . Purgato corpore per dies aliquot in aurora bibit de sequenti decocto ꝑ. calidè , quo in lecto multum sudabat , ac ipsi valde proficiebat . Est autem hoc .

Ꝟ. Summitat . cent . min . M . ii . rad . asar . ꝑ. bulliant in aqua ꝑ. x . ad medias , & colentur . Cum manè quotidie sudaret modo prædicto , vesperi utebatur balneo isto .

Ꝟ. Gran . juniperi ꝑ. ligni juniperini ꝑ. Coq . in aqua font . q . f . ad balneum . In hoc patiens quotidie residebat vesperi ad duas horas vel diutius . Atque sic brevi temporis spatio dolores omni ex parte levati sunt , & ægrota mulier perfectè sanata est . *Martinus Rulandus , cent . 2 . cur . 32 .*

Arthriticis utilissimus est lactis potus , qui ab aliquot annis revocatus est in usum à Medicis *Parisiensibus* , exemplo *Hippocratis* , qui lib . de Affection . jubet podagricis lac asininum præbere ; non solum autem lac , sed serum lactis coctum . Cum enim causa arthritidis efficiens falsum quid , aut acidi & acris naturam redoleat , nihil est quod sales illos magis temperet . Ipso lacte & ejus seto , quod *Hippocrates* coctum iubet potandum , ne frigiditate , ut opinor , stomachum lædat : Quo autem modo sic utendum , in qua etiam quantitate sumendum , non docet . Hodie tamen , more recepto ex Medicis *Parisiensibus* , Arthritici solo lacte nutriuntur , ipsoque



vaccino. Quòd si lac non sufficiat ad nutriendum, mica panis albi infunditur in lacte tempore prandii, & manducatur. Hoc modo nullus datur locus materiæ tartaræ generationi, & si qua sit in corpore demulcetur. Hac victu ratione multi ab Arthritide fuerunt immunes, impedita materiæ acutæ falsæ & corrodentis generatione. *Nicolans Chesneau. lib. 4. observ. c. 1.*

Continuo lactis usu, & abstinencia ab aliis cibis, novi quamplurimos *Lutetia Parisiorum* a diro illo morbo liberatos. *Hippocrati. lib. de morbis usum lactis a sinini laudat, serioque commendat. Spiritus salis aqua ulmaria temperatus, & parti dolenti penna illitus, conducit. Constantinus Rompfius. Compend. Medic. practic.*

*D. Michael Doringius* collega meus, propria morbi calamitate coactus, sequentes pilulas præservativas invenit quas per 30. dies singulo trimestri pondere ℥℥. sumit, & ab insultibus, quos antea passus est, se ipsum præservat; quæ ita habent.

℥℥. Pulvi chamæpit. chamædr. veræ ani ℥ii. cent. min. rad. aristoloch. rot. rha. pontici veri, gentianæ, sem. hyperic. cranii humani præp. an. ℥i℥. rad. cichor. santal. rubr. an. ℥i. Incorporentur cum f. q. succi chamæpit. addendo nonnihil terebinth. cypreæ pro meliore unione f. pilulæ pro lubitu. His ipsis eodem modo præscriptis mercatorem hic jam in tertium annum præservavi, ut non nisi levissimos tantum arthritidis insultus semel expertus sit, quos gravissimos antea sæpius annuatim sensit. *Gregorius Horstius, observ. lib. 8. observ. 3.*

Purgantibus maximè convenientibus accedat hoc specificum, pulvis scilicet arthriticus, qui semel saltem in mense circa plenilunium, cum maximè turgent tumores, à ℥i. ad ℥iv. plus aut minus pro morbi magnitudine, virium præsertim ægri habitatione, usurpari debet. Qui sunt plethorici, & podagra graviter vexantur, ii quoque illum in usum ducere poterunt, suspectis præcipuè tempestatibus, ex pingui caponum juscule, vino albo, cremore hordei, lactis sero, cujus haustum à sumpto medicamento ingerere convenit.

℥℥. Ras. carni humani insepulti, turbith. hermodactyl. jalap. sen. crem. tartar. diagrid. caryophyll. an. ℥i. M. ac in subtilem

pulverem terantur. Hic pulvis vicem aliorum supplere potest, excepto mercurio, cujus vim & energiam cæteris omnibus antepono. Cujus ℥i. felicissimo successu exhibetur, additis stimuli gratia, ne moram trahat in corpore, 20. aut 25. granis. pil. coch. min. & correctionis gratia, aiquot auri foliis, guttisve oleorum destillator. rorismar. anisi, aut cinnamomi.

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Arthritide.

**I**N principio consulo, ut viæ per quas humor illabatur, astringantur, nimirum si in pedibus dolor est, obvolvatur crus aliquo astringenti medicamento qualicunque, exempli gratia, fascia madefacta in posca quæ malicorium incoxerit, vel gallas albumen dissolverit, vel illita unguine ex rosaceo myrtino oleo, admixto aceto, albumine ovi & pulvere aliquo adstringenti, hoc quanti sit momenti in omnibus defluxibus, si sint in principio, vix credi potest; quare minor hoc tempore fere à ple-risque Medicis omitti. In principio etiam, munita hoc modo via, exhibere soleo magno cum successu, purgans aliquod medicamentum, pro ratione humoris: doctus primum ab *Alex. Traliano lib. 11.* cujus opinionem etiam ex Galeno comprobare possum, licet à multis hoc tempore reformidetur: quasi quæ exagitata sit; non amplius moveri debeat materia, ne magis magisque in partes imbecillas labatur. Cum tamen eo tempore fluens illa materia haud sit furenti vel turgenti dicta ab *Hipp.* dissimilis, quam primo & quarto aphor. libris, jubet nulla interposita mora evacuari à corpore. Sane nulla alia ratione conveniret saltem revulsionis & aliquando derivationis vices sustentaret, quapropter & si vomitus sollicitaretur non improbarem. Præterea nolo tibi hoc ignotum, me hic scilicet uti solo & simplici diachalcitide: cujus facultates vide apud *Gal. lib. 1. de comp. med. fec. genera.* Hoc illitum supra alutam applico juncturis, quæ pati solent, & jubeo ut continuò applicitum circumferant, sub noctem auferentes si lubet, & exsiccantes mane reponant, testorque hic Genuenses esse



esse prædivites mercatores, quibus alias cum solet esse res cum podagra, jam se hujus esse integrum quinquennium reddiderunt. *Reinerus Solenander, conf. 19. lib. 1.*

## SUBSECTIO NONA.

### *Pro Arthritide ad virum quendam.*

**P**RO præfervatione, sanguinis missionem, & purgationem, certis anni temporibus, tibi proficua judico; ut & usum decocti ligni Guajaci. Inter utrumque tempus purgationis, videretur mihi consultum esse, uti aliquando leviori purganti medicamento, quod prima solum viscera aliquando aggravata expurgaret, quare sit usus hujus electuarii frequens.

℥. Succi fœniculi depurati ℔ii. melis despumat. ℔i. coq. lento igne usque ad succi consumptionem, frige facto adde hermodactyl. ℥i. M. dosi Castaneæ magnitudo bis terve in hebdomada cum decocti anisi, fœniculi, carvi, sen. agar. ℥i. hujus loco velim aliquando, in ingressu mensæ assumere cochlear unum Syrup de spina Cervina, quem sæpe in hac dispositione proficuum cognovi, exhibeatur dissolutus in vino vel jure carniū, & quoniam fere solum serosum humorem educit, & aliqua ex parte biliosum, minus pituitosum & crassum, poteris aliquando uti his pilulis videlicet semel in mense.

℥. Agar. troch. hermodact. an. ℥i. turbit. el. ℥i. troch. alhand. ℥i. mirobal. Chebul. Citrin. an. ℥iv. rei, mastich. Zinzib. an. ℥ii. spec. hieræ simpl. ℥i. cum melle rosac. f. pasta pro pilul. quæ crassa & viscida recrementa educunt potissimum. Ut artus firmantur, ad vigilandum ne pedes, vel ceteri artus ullo frigore premantur, aut humore madescant, abstergendi tam vesperi quàm manè sicciore linteo. Lavandi item singulis 14. diebus aqua chalibeata, fassa, incoctis rosis, salvia, iva, verbasco, artemisia, vel id genus similibus. Post ablu-tionem perungendi oleo rosaceo omphacino, intrito sale. Ad mali præsentis curationem jam veniendum. In principio influens humor statim vacuandus venit, & revellendus, quod commodissimè fieri potest vomitu & medicamento purgante: quod licet

quibusdam non probetur, tamen ego multa experientia didici mirum in modum prodesse; neque novum illud est, & inusitatum etenim *Trallianus lib. 2.* expressis verbis jubet exhibenda solutiva non solum præfervationis ratione, per morbi intervalla, sed in ipsis mali paroxysmis. Intercipiantur viæ, ut dictum est supra, quoties medicamentum purgans per os assumendum erit: nam sic fiet, ut exagitatus & ad motionem expeditus humor, minùs illabatur in juncturas. Si dolor vehemens accesserit, utatur hoc cataplasmate quo frequenter scèliciter usus sum in magnis doloribus tam ischiadis, quam podagræ.

℥. Cicutæ, parietar. Lapath. malv. an. quantum placet, coque in vino albo bono, coctis & contusis adde axungiam porcina recentem, & subtilissimè tritum fursur. Et F. Cataplasma, applicetur loco dolenti, postquam fluxio destitit & dolor cessavit, humoris resolutio tentanda est fotu cum decocto rad. alth. flor. stæchad. Lavendul. Calamenth. Chamæm. melil. & salis momenti, & hoc cerato.

Diacalcit. ℥iii. diachyl. ireat. ℥i. Emplast. è melilot. vel oxycroc. (ubi magis resolvere velis) ℥ß. emoliantur instillato oleo vulpino, & extendi super alutam.

In hunc usum etiam mirè valet decoctum vulpis integri adjectis ranis, & lumbricis, & herbis paulo ante dictis, hisce addam (licet quæ hætenus scripsi sufficiant) hoc naturale remedium, cujus ego experimentum vidi hisce meis oculis, Episcopus quidam mihi familiariter notus, graviter laborabat arthritide: cum ubique auxilium imploraret, remediaque undique conquireret, inteligit monachum quendam eodem morbo laborantem, remedio sequenti curatum esse. Accipiatur testudo mascula (cognoscitur inter cætera ex caudæ discrimine, & lemi, sub inferiore testa incisuta) ubi luna fuerit maximè lumine diminuta, priusquam cum sole jungatur: amputentur vivæ crura omnia, ea confuta in sacculos, ex pelle hædina angustos, alligentur membris patientibus, ita ut dextrum crus testudinis dextro cruri ægrotantis respondeat, sinistrum sinistro: item antèrus crus dextrum, brachio dextro applicetur,



sinistrum sinistro, quo loco alligari debeant non expressit Siculus Medicus cuius fuit experimentum certissimum: Monachus verò supra genua suspenderat, & in brachiis supra cubita. Quibus postquam usus esset, cœpit paulatim melius habere, genua quæ humore mirum turgida fuerant, cæterique pedum articuli egregie detumuerunt, adeo ut membra iam agilia sine scipione levarentur. Aptavimus his intellectis idem remedium Episcopo, ex quo tempore cœpit paulatim melius habere, sed cum statim mihi abeundem fuit, intelligere non potui an penitus convaluerit. De differentia testitudinis nihil addidit Monachus: Si quid tamen inde auxilii sperandum sit, arbitror in podagra frigida, applicandas terrestres; in calida, aquaticas. Nam illud discrimen observare soleo, in unguento quodam quod ex testudinibus ad arthritidem compono, quo alias sum feliciter usus. Nolim hoc aut simile remedium parvi fieri, quod ab usu communi, aut a ratione alienum videatur: nam multa sunt in rerum natura, quæ experientia talia comprobant; licet ratio nihil inveniat, quo illa diiudicet. *Reinerus Solepander, consil. 20. sect. 1.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### *Pro Arthritide.*

**U**T articuli firmiores fiant ac roborentur, & eorum laxitas constringatur, solent Medici à Galeno edocti, quietis tempore extra paroxysmum artus confricare oleo crudo, vel rosaceo intrito sale. Inungatur etiam hoc linimento, quod valde probo.

24. Ol. omphacin. ℥ij. ol. mastich. ℥i. Sal. bene torrefact. ℥ij. boli armen. ℥iij. Sang. drac. hypocistid. thuris, mastich. an. ℥iij. terantur quælibet per se prius subtilissime, tum cum oleis in mortario exactæ lævigata. Misce pro linimento.

Probant multi partium parti solitarum lotiones ex aqua aluminosa, quæ mihi magis placerent, si alumi salis aliquid, & sulphuris modicum adjiciatur, ut Guainerius habet: nam ita sulphuris vi resolvente, & emolliente aliorum efficacia temperatur.

Conscindunt aliqui ligni iuniperini scobem aut ramenta, aqua pluvia chalybeata sufficiente coquunt, donec aqua ex ligno tingatur, & cum ea fiat crurum, pedum, & articulorum lotio. Ita enim vidi aliquoties incipiens malum percuratum discussumque.

Andernacus in fine secundi dialogi de balneis, lotionem pedum ad podagram habet, quam dicit multis valde profuisse; lixivium parat ex fagi cineribus, & ter aut quater colat; deinde tantumdem vini admiscet aluminis postea ℥ij. adduntur: omnia in fictili vitreato conjuncta calefiunt ad ignem, sed ita ut non effervescent, deinde transfunduntur in vas in quo pedes consistere poterunt: hi autem tam late lavacro insistent, ut aqua supra talos excedat; extrahit humidam pituita materiam in articulis hærentem, quæ deinde luteo puro abstergi debet, tam calidum erit lavacrum quam pedes ferre possint, adhibeatur manè & vespere ante cibum. Cum malum minatur accessionem, & post ipsam, utile esse potest idque in septimana quater aut quinquies; nec deterreat si pedes tumidos inde rubentesque fieri conspiciat; hæc Andernacus. Huic simile est quo ego feliciter aliquoties usus sum. Adnascitur ad radices quercus fungi rubri quædam species, quemadmodum hypocistis sub cytto, quare etiam hypodryn hunc fungum nominare soleo: hunc concisum minutim in laminas cum trito sale, in ollam testaceam indo, ita interspergens salem tritum, ut particularum strata quælibet salem intermedium recipiant. Sic permixtum conditum fungum in penu subterraneo sepono, ita resolvitur & magna ex parte liquefeit in muriam: ea muria confricantur, & illi nuntur partes parti solitæ: quem ego primum isto uti vidi, is in doloribus utebatur, & profuit multis, verum quia siccat vehementer, & discutit, laxatamque ab affluxo humore partem mirificè roborat, & confirmat; principio utilior priusquam dolor invaluerit, ejus usus esse possit, aut jam declinante paroxismo ad materiam absumentam, partique robur & firmitudinem addendam, potissimum situm aliquoties interponatur fons, & lotio partium, ex decocto verbasci, absinthii.



Chamæm. herb. paralyf. Salv. Chamæpit. arterifm. rofmar. melilot. rof. & id genus aliarum, quæ incidere, abtergere, discutere, ficcare mediocriter, & roborare valent.

In ipfo paroxifmo materia jam articulos obfidente, purgatio adhiberi debet; exhibeatur tum Electuarium quod Bayrus Caryocoffinum vocat, mirisque laudibus effert; vel in ufum vocentur pilulæ fequentes, quas Rhafis commendat eo encomio, quod incedere non valentes, faciant ire pedes.

24. Aloes-hepat. purioris ʒβ. rof. abfciffis unguibus ʒii. hermodactil. albor. à cortice mundator, ʒiβ. diagrid. ʒi. cum aqua Ivæ, vel fucco caulium, vel Syrupo ex decocto Ivæ, cum melle facto, R. Massa. Dofis. *Reinerus Solenander, confil. 24. & 25. Sect. 4.*

## SUBSECTIO UNDECIMA.

### Pro Arthritide.

**I**ntertopica hoc fingulare eft.

24. Ranas v. Lumbric. terreft. elotor. vino ʒiii. coq. in ol. rof. quo aut illine moliter articulum dolentem, aut fæpius riga. Egregium hoc eft, quod fubfcribo. Canicula caftretur, faginata deinde mactetur, atque aqua calente depilata amputetur caput: tum in fimplici aqua egregie coquatur, tandem omnis ex refrigerato jure pinguedo innatans auferatur, ferveturque in ufus ad illitiones, aut.

24. Iltius pinguedinis ʒiii. aq. rof. vel aq. verbafc. ʒvi. M. ad lentum ignem, coq. ad aquæ confumptionem, pinguedine dolentes articuli perlinantur. Memini Elidæum Bononiensem celebrem Medicum hoc fæpius uti.

24. Ol. vitell. ovorum ol. rof. an. ʒi. vitell. ovorum numero 2. additis aliquando opii & croci an. gr. iij.

*Amatus Lufitanus* tanquam fingulare probat, quod fcribit Turcis magnatibus familiare eſſe remedium, nimirum quod introductam in cubiculum capram emulgeant in locum dolentem. Sed quia aliquid periculi timendum eſt ex applicatione huius remedii, fœmineum exuberibus lac fi-

ne periculo falubrius meo iudicio emulgeri poteſt.

Novi Chirurgum Parmenſem qui cum ſuffarcinatum omni exempto pingui ex rubro catulo præpinguem anferem, confutumque in veru torruiffet, extillata pinguedine vaſeque excepta, articulos dolentes fœlici ſucceſſu illinebat. Comperi in ruſticis vaccinum ſtercus tum etiam expreſſum ex eo liquorem, cum guttula dilutioris aceti ſæpe profuiſſe *Reinerus Solenander. confil. 41. Sect. 5.*

Obvoluntur cuidam arthritico manus & pedes Cataplaſmate ex rapis, ſimila, & lacte parato, reponitur in ſella in conclavi inferiore; abeunt domeſtici digreſſi in hortum ædibus contiguum; Sus autem quædam, foribus non clauſis, ædes ingreditur, hinc hypocaustum, & olfaciens pultem illa æfirum aggreditur, conatur pultem vorare, & eum proſternit cum ſella in pavementum: Hic dum ſe à ſue defendere nequit, dein multumque domeſticos inclamat, qui tandem recurrunt, & ſuam abigunt: eo verò die dolores imminuntur, deincepsque paulatim donec prorfus ceſſarent, neque unquam redirent. *Philippus Salmuthus, obſerv. 48 cent. 1.*

Pro leniendo dolore fœliciter mihi ſuccedit, præter illitum factum cum oleo roſaceo completo, & vitello ovi, irrigatio facta cum decocto verbaſci, nec non Embrocha ex lacte, ac illitio ex oleo ranarum partibus dolentibus adhibita. *Joh. Caſar Claudinus. Conſult. 6.*

Pro articulis lumentum ex communiſale uſto, & in pulverem deducto cum oleo roſi completo plumbeo mortario uſque adeo ducto ut unguenti conſiſtentiam ſubeat, citra omnem controverſiam primas partes obtinet. *Joh. Zecchiſ, conſult. 5.*

Pro Arthritide optimum mihi remedium hoc.

24. Vivas ranas, has coque in butyro inſuſſo, hoc illinat ſe.

In Arthritide calida maximo ſucceſſu uſtor ſotu aquæ ſeminis ranarum. *Joh. Heurnius, ad Hippocr. Aphor. 16. Sect. 3. & 25. Sect. 5.*



## SUBSECTIO DUODECIMA.

*Pro Arthritide.*

**U** Sum Betonica sibi faciat familiarem singularem enim habet proprietatem in Arthritide, ad ipsius symptomata mitiora reddenda.

Dominum Rosetum olim Syndicum Genevensem quotidiano betonica usu, ab arthritide, qua in juventute vexatus fuerat, tandem in senectute curatum fuisse, ex ipsius ore intellexi. Diversis autem modis betonica uti poterit, primò foliis adhuc tennellis in acetariis, & cum jusculis, & carne coctis; item conserva ipsius, aut etiam extracto.

Generosus quidam Bernensis exsiccatam betonicam in pulverem redigit, eoque pulvere saccharo permixto ad ℥j. vel ℥jss. utitur cum fructu.

Alii tabellas ex pulvere betonicae cum saccharo aqua betonicae dissoluto præparant, & ad usum reservant. Medicamenta autem ex betonica, duabus vel tribus horis post brevem cœnam sumenda sunt; noctu enim propter vaporum abundantiam qui in somno sursum elewantur, vis medicamenti facilius quàm interdiu, ad cerebrum elevatur, & ad nervos pervenit. *Fabritius Hildanus, observ. 32. cent. 6.*

Aliquando comedat folia Salviæ vel sola, & sine condimento, vel cum modico salis, olei, ac vini resperfa, & capiat quando ita cubitum. *Hier. Capivaccius. Consil. 26. libr. 7. Consil. Cratonis, & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Rustici nostri pice seu axungia Norvvegica illinunt affectas manus à cubito ad digitorum extrema, & pedes à genibus ad summos pedum digitos, quotiescunque arthritici dolores insurgunt, idque spatium 14. dierum, testantur tum non solum mitigari dolores articulorum, sed tophos ipsos resolvi excidente tartaro impacto, & vel in totum auferri molestum malum, vel inducias aliquot annorum dari; quibus elapsis, si recurrat affectus, repetunt eadem fœlicitate, eodemque modo picis inunctionem.

In Insula nostra Samo inter rusticos pervulgatum est remedii genus, narrante ejus-

dem insula Præfecto bonæ fidei viro; aquæ exinde extillatæ plus inesse virium alius memonuit, facili & parabili in Septentrione remedio, prompta subest ratio. Resina enim hæc ex abiete, pinguibusque pini lignis per descensum eliquata, insignem vim resolvendi, emolliendique habet. Balsamum suum Sulphuris ad tophos articulorum emolliendos & discutiendos *Rulandus (cent. 2. curat. 92.)* mirè laudat, cui substituant jam Agyrtæ & pro balsamo sulphuris ad nos deferunt sub sigillo, resinam pini, pretio quidem illo inferiorem, neutiquam virtute. *Thomas Bartholinus. Histor. 95. cent. 6.*

Partes dolentes illinentur oleo catellorum, deinde integentur pelle arietina recens detracta. *Guill. Ballonius, consil. 3. lib. 2.*

Multi sunt quibus arthriticæ fluxiones sunt, & propter dolorem subinde sibi detrahi sanguinem patiuntur. An non peccant? Ita sanè, quia corpus & refrigerat, & nervi debilitantur, & quod majus est, facultas retentrix infirmatur. *Guil. Ballonius. lib. 2. Epidem. & Ephimer.*

*Jobanni Picquet* fluxio arthritica & valde dolorosa, incredibilis humorum rabies mox in has, mox in illas partes, quia nervi, & arteriæ, & venæ sanie quadam scatebant, Phlebotomia quinquies celebrata meliùs habebat. Prudentis est Medici videre, an non secure vena his in morbis aperiatur, an verò prudenter prætermittatur. Si facultatis retentricis imbecillitas est, prudenter omittitur: Si Cacochymia est, imò virulentia, quæ tantæ tragædiæ author sit; audaciùs id faciendum. *Guil. Ballonius, lib. 2. Epidem. & Ephimer.*

## SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

*Pro Arthritide.*

**P**armacopœus quidam *Gratiano Politanus* decumbebat ex doloribus articulorum, qui pedes & brachia, aliasque partes affligebant, cum tumore, inflammatione, & febricula: à 20. diebus hoc affectu laborabat, eique novies proprio nutu secta fuerat vena, aliquoties etiam purgatus fuerat; tandem meo jussu, illi exhibetur



betur pulvis juscule ex Calomelanos  $\mathfrak{z}$ i. diagridii. gr. vii. i. Carioph. numero i. blandè & copiose purgatus est, ac multò melius habuit; deinde sumpsit mane & serò julepum refrigerantem, in cuius dosi matutina infundebatur Sen.  $\mathfrak{z}$ iii. cum sem. Coriandri  $\mathfrak{z}$ ß. frigide per biduum. Postea sumpsit eundem pulverem pari successu & integre curatus est. *Lazarus Riverius, observ. 31. cent. 1.*

Domina quædam arthritide universali laborans, liberata fuit, beneficio croci metallorum. *Petrus Pachequus, observ. 31.*

Dolor arthriticus citissime sedatur, fovendo partem aqua foliorum fraxini destillata in alembico plumbeo, *Samuel Forminus, observ. 39.*

*Franciscus Alexander* Medicus de *Francisco Pechio* scribit, cum iam quinquagenarium morbo articulari graviter afflictum totis annis 20. turri inclusum fuisse, vixisse autem sola aqua & pane. Ea dieta beneficio naturæ materiam absumptam, & motu & exercitio articulos adeo roboratos ut liberatus nullos unquam dolores podagricos senserit. Ex quo perspicuum est immoderationem in victu huius morbi quasi matrem esse, *Iob. Crato. Consil. 21. lib. 4.*

Scio quosdam existimasse se iuvamentum sensisse, si aliquoties in anno, non tamen doloribus affecti, venam secarent in pede, vel Cucurbitulas adhiberent; verum quàm facti sunt miseri, memini initio venam secare in brachio rectissimum est, sed tamen si sæpe redeat malum propter intemperantiam minime rectum. *Iob. Crato. lib. 4. Epistol.*

De balneo ex ovis formicarum, res omnibus vetulis in Silesia nota, exsiccat multum, si lubenter utitur incessionibus, non poterit nocere, utuntur etiam mulieres ad imprægnationem, *Iob. Crato. lib. 4. Epistol.*

Obstetrix Gallica idem balneum componit, ex integro formicarum maiorum globo, unà cum ovis, parte terræ ab ipsis collecta, & segmentis quibus inhabitant: ita ut hæc omnia sacco inclusa, aqua fervente calefiant, & ager insidens tam diu duret, donec vires fuerint, vix unquam fallit, *Vvolfgangus Heferus. Herculis Medici, lib. 4.*

Multi confidunt senecione, in ea lavan-

tes 15. diebus, semper dimidiam horam ante cœnam. Multi etiam salutariter utuntur ligno Juniperi, & in eo aliquot diebus lavant, & maximè laudant ad roborandos articulos. Imprimis autem laudatur hoc unguentum.

24. Duas ollas supra æqualiter respondentes in medio pone orbem incrustatum ustum, sed plenum foraminibus, & ita infima olla terræ infodiatur, huic primæ impone ollam alteram, quæ supra terram emineat, in hanc inferre olla confusa calvaria equina (alii ossibus humanis utuntur) & cum bene argilla munitum vas est, ignis incendatur undique (sicut cum destillatur lignum juniperi) tum effluit succus in inferiorem ollam, quo illine deorsum articulos. Dolorem in paroxismo lenit in magna inflammatione Emplastrum factum ex aq. rosarum, & veronica, paucò alumine camphora, & fimo vaccæ nigra loco affecto impositum. Item.

24. Mastich. thur. myrrh. ammoniac. opopanac. bdellii, mumia, an.  $\mathfrak{z}$ ii. vittrior.  $\mathfrak{z}$ bi. mellis  $\mathfrak{z}$ bi. tartar.  $\mathfrak{z}$ ß. Spir. vini  $\mathfrak{z}$ bi. r. v. destill. Id præbet optimum balsamum; lenit mirifice, si penna illinatur etiam intolerabilem dolorem. Item olei rosacei,  $\mathfrak{z}$ bi. ranæ duæ, & pugillus unus lumbricorum in vino lotorum, ad ignem coquantur, exprimantur, & applicentur. Item urina pueri distillata penna illita, modo prius putrefacta sit ante destillationem. Oleum etiam hyoscyami commendavit Imperatori *Maximiliano* Elector Palatinus, dolorem quidem sedat, sed articulos depravat, iuvat Catellus dolores podagricos, *Iob. Crato. Consil. 26. lib. 2.*

*Adrianus Spigelius* apud *Moravos* in usu, & nobile experimentum pro sanandis illico doloribus podagricorum, ulmaria cum radicibus & floribus destillate aquam esse scribit: quæ & Silesiis in frequenti usu est, commodum etiam est decocto parietaria partem affectam fovere. *Daniel Sennertus, tractat. de arthritide, cap. 5.*

*Hercules Sexonia* panis recenter e furno extracti 10. aut 12. ordines secundum omnem corporis circumferentiam admovet, quibus sudor copiosè provocatur & dolores auferuntur. In principio fluxionis sequens cataplasma applicetur.



℥. Farin. hord. & fabar. an. M. i. flor. camomill. & ros. an. M. ℥. aq. verbas. & fol. salic. an. q. s. vel aq. plantag. & vini an. q. s. Incorporentur omnia simul in formam cataplasmati. Aqua spermatis ranarum mense Majo destillata partibus dolentibus imposita mirè dolores lenit, & partis inflammationem ac ruborem temperat. Cum illa etiam sequentia utiliter admisceri poterunt.

℥. Aq. spermatis ranar. tapsi barbat. & filicis, an. ℔i℥. in quibus infund. tuthiæ lithargyr. an. ℥i. vitriol. calcinati, alumin. an. ℥i. foveantur partes dolentes tepidè. Oleum ex pedibus vituli extractum ad dolores arthriticos sedandos præstantissimum est, & hoc modo elicetur.

Pedes vituli contundantur & ossa confringantur, deinde coquantur ad putrefactionem. Oleum aquæ supernatans misce cum aqua vitæ & sale, hisque partes dolore affectæ illinantur.

Balsamum Saturnicum oleo violato vel rosato paratum dolorem sedat efficacissimè.

Ex cerussa fit emplastrum magnæ efficacitæ, quod ab initio morbi admoveri potest, etiam tumore atque inflammatione presente, ejusque compositio talis est.

℥. Ol. communis lib. i. vini ℔i℥. bulliant ad mediam vini consumptionem, deinde adde cerussæ subtilissimè pulveratæ lib. i. camphoræ ℥iij. coq. ad emplastri consistentiam. Ubi magna est inflammatio, loco vinacetum est reponendum. Extendatur empl. super lintea ut commodius partes obvolvantur.

Catellus vivus parti laboranti admotus dolorem valde demulcet: Dolore admodum sæviante ad narcotica licet confugere, quamvis ea diu in parte retinenda non sunt, cum calido nativo & nervis sint inimica.

℥. Spirit. vini per croci infusionem flavescens ℥iv. camphor. ℥i. bulliant parum. Deinde dissolve opii ℥i. eoque liquore pars dolens illinatur. Tutum & efficacissimum est remedium. Folia nicotianæ recentia contusa & admota dolorem arthriticum sedant, & vim quandam narcoticam obtinere dicuntur.

Inter derivantia remedia locum habent hirudines partidolenti admotæ, post suf-

ficienter evacuatum corpus: tunc enim valde præfunt, præsertim cum venæ in parte affecta distentæ & sanguine turgidæ apparent.

Inter res solventia hæc sunt proficua: In urina calx viva extinguatur, & cum ea per residentiam aut colatura depurata locus dolens foveatur. Dein ex calce & aceto factum probatur. Inter foci parati faciles commendatur ille qui fit ex sale ammoniaco septies sublimato, & in vino aut aqua ritè dissoluto; vel ex urina juvenis bene sani ad medietatem usque cocta, & cum linteis admota.

Ad dolorem sedandum & materiam arthritidis resolvendam laudatur liquor limacum, in hunc modum compositus.

In manicam Hippocratis conijca limacum integrorum M. i. tum super illos injice salis communis M. i. super saltem seminis ebuli subtilissimè triti M. i. & sic vicissim limaces, salem, semen, donec omnium sigillatim 4. vel 5. strata conseceris. Manica dependeat in cella vinaria humida, & post paucos dies destillabit ex ea liquor lubricus & pinguis, quem soli exponito per quatrimum, & locum affectum eo illinito.

Emplastrum diapalma maximo in usu est, vel solum, vel addita camphora, in hunc modum.

℥. Mass. empl. diapalm. ℔. ℥. camphor. ℥ij. M. simul. Idem emplastrum cum sequentibus permixtum inter excellentissima remedia arthritica censi debet.

℥. Emplastrum diachalcit. vino rubro austero soluti & ad vini consumptionem cocti ℥i. myrtill. ros. rubr. mastich. tartari vini rubr. pulver. an. ℥ij. chamæpit. & chamæmel. odorati veri pulverat. an. ℥ss. f. Emplastrum, applicandum; ubi tumor valde imminutus fuerit. Non parum utile est hoc emplastrum ad articulos roborandos, convenitque omni arthritidi. Vidimus nos arthriticos, qui hujusmodi emplastrum in pedibus & carpis continuo gestarent felicissimo successu. Aptatur ad formam membri; in pedibus ex aluta tenui fiunt calcei, qui hoc emplastro obducti pedibus aptantur.

Tandem in dolore diuturno & valde canumaci, à materia præsertim frigida oriun-



oriundo, confugiunt nonnulli ad vesicatoria partibus affectis admota. Eorum mentionem facit *Sennertus*, sed quæ anodynus permisceantur. At emplastro vesicatorio, quod in nostris Officinis habetur, solo & impermixto, sapientissimus *Varandæus* feliciter usus est: coque curavit magnum & contumacem tumorem genu occupantem, cum alii Medici multas purgationes & diætam sudorificam, nec non topica per multa frustra usurpassent.

In omnium autem prædictorum remedium usu hoc unice annotandum est, ut à juvantibus & lædentibus sumatur indicatio; quandoquidem variæ sunt hominum naturæ, varia temperamenta, & varii generis excrementa in iis colliguntur, unde summa in morbis varietas solet exoriri. Ideo quod uni prodest, alteri sæpe inutile est, quod maxime usu venit in arthritidis curatione. Eaque ratione unicuique præctico medicamentorum Sylva habenda est, ut, si unum frustra tentetur, ad aliud atq; aliud confugere possit, ea semper diligendo, quæ rationali methodo magis consentanea videbuntur. Vinum arthriticis maxime noxium, multique ejus abstinentia penitus fuerunt liberati. Ad præservandum ab hoc morbo, phlebotomia instituenda est, præsertim verè & autumno, in iis qui sanguine abundant ejusque effervescentiæ obnoxii sunt. Purgatio verò non solum vere & autumno, sed etiam quater in anno, imò & singulis mensibus in valde cacochymis celebranda est. In quem finem utiles sunt pilulæ sequentes.

℞. Aloes, hermodactyl. an. ʒss. chamæpit. ʒij. chamædr. stœch. Arab. an. ʒi. sem. hyperic. ʒss. cum terebinthin. *Venet. f. massa pilul.* quæ quia minùs purgant, frequentius exhiberi poterunt. *Lazarus Riverius, practic. lib. 16. cap. 1.*

#### SUBSECTIO XIV.

##### *Pro Arthritide nodosa.*

**I**N Arthritide nodosa jam facta, longè facilius esse consilium dare, quàm consulta exequi, ipse optimè scio: ne tamen morbus gravior emergat, cavendum, optimam victus rationem imprimis requiri

manifestum est. Cruditas vitanda, & cum nausea adest, à cibo abstinendum, ac si fieri potest, vomendum vomitu enim ad præcautionem in morbis articularibus nihil conducibilius. Monentur Medici ratione & observatione, ut morbis articularibus obnoxiiis interdicannt usum pomorum, caponum frequentem, anserum & Carpio-num, nam poma humores solvunt, & fluere faciunt; & caponum caro humorem quendam habet, quem ad articulos natura extrudit; piscium verò humidiorum par est noxa; sed caponum caro, licet nimium etiam nutrire videatur, tamen parcius usus nequaquam reprehendi potest. Non minùs nocent quæ replent corpus cruditatibus, quàm quæ vel materiam ipsam fundunt, vel ad articulos deducunt; itaque vina potentia, & acetosa fugienda, nec priùs bibendum quàm cum solidior cibus ingestus fuerit, valde enim noxium est sumpto saltem jussulo, aut paucio cibo vinum bibere, multò verò magis, inani & jejuniò ventriculo, vel iam concoctionem cibi elaborante, vino se obruere.

Cum autem in exactissima etiam victus ratione, semper aliqua superfluitas colligatur, Medici annuas purgationes, vernas atq; autumnales præscribunt, ac Galenus affirmat, se multos ita tutos reddidisse præsertim verò sectione venæ adhibita,

Rarò curatur Arthritis, quòd ut plurimum hæreditarium sit malum, vel intemperantia accersitum ad quam cum redeant homines, non mirum si morbus quoque revertatur. An aliquo modo possint dissolvi tophi, & quibus medicamentis, cum maxime curationi obstare videantur magnam hæc difficultatem habent. Quidam magnæ cruditionis & authoritatis viri existimant, atque sic præscribunt posse solvi tophos, si caseus putridus, cum jure in quo sailla perma cocta fuerit imponatur.

*Julius Scaliger*, Pulverem piperis usui addit, quidam coccognidium cum myrrha & aceto tritum adhibent, utrumque emollita, hæc experiri minimè laboriosum. Sed inter optima remedia & tutissima, quæ partes etiam affectas reborant, & calorem innatum sovent, hoc præcavendum, & diligenter singulis annis cum amplius fieri nequeat usurpandum vide-



licet ut tempore vindemiæ immergantur pedes atque manus affectæ vinaceis post expressionem calentibus adhuc, vel multo calido calefactis manè per 15. dies. Et si enim hoc remedium non planè tophos discutit, tamen articulis maximum robur addit, ac possum nominare virum præstantem, cui hoc medicamentum communicavi, atque ab eo præclaro munere sum donatus, qui planè incidere non poterat, & isto remedio, beneficio Dei, restitutus est. Quo autem uvæ maturiores, eò plus adjumenti vinaceorum usus affert, alia remedia non addo, nisi fortè vigentibus atque urgentibus doloribus catulum parti affectæ, vel distillatum fol. verbasci cum rhure, & myrrha modica adhibere velit. Fomentationes ex artemisia, origano, Chamæmel. & absinth. Cessantibus jam doloribus præclare juvant. *Joh. Crata. consil. 34. lib. 7.*

## SUBSECTIO XV.

### *Pro Arthritide vaga Scorbutica.*

**H**ic affectus idem planè est cum eo quem *Vestphali, Friski, Geldri*, item & *Hollandi*, apud quos sæpe vidi, *De varen*, vel *lophen de varon* appellant. Se prodit cum vagis doloribus in omnibus corporis membris valde excruciantibus, potissimum in dorso & lumbis. Doloris speciem statuunt ipsi ægri exedentem corrodentemque, qui vermiculum, musculos, & alias partes subito ac nonnunquam momento variis simul locis permeantem depascentemque arguere videtur.

Ejus causa propria & proxima est tartarus scorbuticus resolutus & cum fluxili materia humorum singulari proprietate nervosum ac musculosum genus petente, permixtus. Curatur hic morbus in *Vestphalia* per lumbricos, ejus alexipharmacum tantopere à *Viero* decantatum hoc modo.

℞. Lumbricos in mortario contusos cum 2. Coch. vini, per pannum expressos: his addatur dimidia vini mensura, sumantur coch. 3. manè meridie & vespere.

Medicus Campensis apud *Forestum*,

præmissa conveniente evacuatione, hanc potionem proponit.

℞. Rad. Succisæ, ℥i. aristol. rot. ℥iii. fol. Salv. beton. an. Mi. abrotan. rutæ, vincpervinc. Sabin ad. pi. Coq. in aq. fluminis ad med. cum hujus decoct. ℥iv. trahantur lumbrici terrestres circulis in collo insigniti, vino prius abluti & triti, numer. 5. deinde admisce theriac. ℥ss. pulv. cynamom. ℥i. Sacch. q. v. exhibe manè calidè ad sudorem, per aliquot dies. Quidam etiam talpæ adustæ pulverem in hoc affectu exhibent cum vino aut cerevisia, qui tartareas quidem collectiones promptè dissolvere potest: qua ratione *Gesnerus* exterius etiam cinerem talparum cum melle subactum strumis convenire statuit. *Henricus Petreus*, & *Gregorius Horstius*, observ. 8. lib. 8.

In hoc affectu aqua Lumbricorum magistralis in Pharmacopœia *Londinensi* præscripta, egregie convenit, quin spiritum & salem C. Cervi, spiritum sanguinis, flores salis armoniaci, cum bono successe sæpius adhibui, porro pulveres testacei Sc. oculi cancerorum, Corallia, margaritæ, & vegetabilia quæ arthritidis antidota feruntur, ut radix aristoloch. fol. Chamæpit. Chamædr. & similia antiscorbuticis conjuncta, morbi hujus sanationi conducunt, inter externa, oleum Lumbricorum, ranarum, & bufonum non raro sunt valde proficua. Accipi à viro insigni huic morbo valde obnoxio, quod aqua è contentis ventriculo bovis nuper mactati exemptis per destillationem prolicita, levamen certissime adferret, si ei petiæ calidæ intingantur, atque pro foru applicentur. *Thomas Willis*. Tractatu de Scorbuto.

Perspecta morbi idea & doloris specie, de arthritide vaga cogitare cœpi, cum & affectus scorbutici haud obscura deprehenderem indicia. Conjecturæ certitudinem exploravi lumbricis terrestribus, imponendo eosdem vivos, partibus dolentibus, qui initio, quasi vi illata, exilire, circumgyrari, mox languescere momentanea tæbe consumpti, subito emori non sine adstantium admiratione videbantur. Cognito morbo, ejusdemque causa, quam tartarum scorbuticum resolutum, & cum tenui serosaque humorum materia; singulari



gulari quadam proprietate nervorum ac musculorum genus petente permixtum esse constat; præmissis universalibus, digestivis & evacuantibus, appropriata quædam præscripsi, potiunculam nempe Medici *Campensis à Foresto* descriptam, tincturam tartari, spiritum lumbricorum terrestrium, decoctum specificum *Horstii*, bezoardicum joviale *Mynsichtii*. Verum nihil æquè profuit ac specificum meum cujus usu per integrum ferè mensem continuato planè convaluit ægra. Descriptio ejus hæc est.

℞. Rad. vincetoxic. enul. aristol. rot. zedoar. caryophyllat. pæon. an. ℥ii. summitat. salviæ, beton. serpill. abrotan. rutæ, chamædr. chamæpit. an. ℥i. spec. diamosch. d. dianth. lætific. Galen. an. ℥i. anthos ℥i℥. sem. citri ℥iv. theriac. Androm. ℥℥. sæcul. aronis ℥iv. pulverisatis affunde spir. vini malvat. ad eminentiam 4. digitorum. Stent bene tecta in digestionem per dies 3. postea spiritus vini abstrahatur ad consistentiam mellis; reaffunde spirit. vini modo abstracti ℥℥℥. spir. cochlearum ℥ii. spir. nasturt. aq. ℥i. spir. rubi Idæi ℥℥. essent. lumbric. terrestr. ℥vi. Digerantur per 3. dies postea diligenter filtrentur, & serventur pro usu, Sumpsit elixiris hujus specifici singulis matutinis ℥ii. ex aqua nostra anti-scorbutica, sudoribus plerumque copiosè & cum notabili allevatione promanantibus. Circa vespèram duabus circiter ante cœnam frugalem, horis, exhibui electuarium meum anti-scorbuticum tinctura tartari imprægnatum. Noctu, si quando vigilæ urgerent & dolor, delibavit anodynum meum opiatum in forma liquida. Extopicis profuit oleum lumbricorum, ligni sancti tinctura, cataplasma ex nasturtio aquatico, & illud quod a VViero describitur ex radicibus cicutæ aquaticæ. Nulla tamen victima magis placari potuit hæc furia quàm lumbricis terrestribus vivis partibus dolentibus impositis: vehementi namque lucta in vermiculos defæviens malignitas, subita tabe consumptis occisive hostibus ad tempus deferbuit, subinde iterum, relectis ex intervallo viribus, repetens, donec longo continuoque specifici suprà descripti usu penitus extirparetur. *Baldas-*

*sar Timæus, Cas. 36. lib. 3.*

## SUBSECTIO DECIMA SEXTA.

*Pro Artuum doloribus ex Lue venerea.*

**E**Mpirici rationale hoc remedium introduxerunt.

℞. 40. Ovorum vitellos coctione induratos & dissipatos, cum ℥vi. pyrethri in pulverem redacti, contundito & per retortam destillato lento primùm igne, postea vehementiori: liquorem qui fluxerit, cum ℥i. castorei, & ℥℥. thuris alb. commiscito, adjectis hermodactyll. ℥. vi. & ut ante destillato, tertio liquorem cum fœcibus suis subigito, & Lauri baccas adicito, & destillato. Si sæpius id feceris, oleum elicies in discutiendis morbi hujus doloribus nulli remedio conferendum. Cuidam qui in tibia dolorem ex hac lue habebat, cum nullo modo curari posset, *Amatus* (Cent. 5. Curat. 72.) theriacam veterem apposuit, & dolor evanuit, ut mus conspecto fele. *Petrus Forestus, Sch. ad observ. 23. lib. 32. de Lue venerea.*

## SECTIO XLII.

*De Asthmate.*

**A**sthma (quod Græc. ab ἀσθμα, i.e. anhelare nomen habet, Lat. verò Suspirium dicitur) ἀσπνους species est. Definiri potest, quod sit crebra, densa & anhelosa respiratio, citra febrem ut plurimum, cum summa thoracis contentione conjuncta. Causa ejus proxima consistit in angustia pulmonum, quæ à lento, crasso, viscidoque humore, fistulis & cavernis pulmonum tenacissimè impacta, easque coarctante, originem trahit, tenues etiam ac serosi humores, dummodò copiosi sint, hoc malum non rarò efficiunt. Crudum item tuberculum, & calculi in pulmone hærentes sæpe sæpius suas agunt partes in hoc affectu producendo. Hæc omnia asthma inferre solent, asperam arteriam vel obstruendo, vel, si in levibus arteriis, ac substantia pulmonum subsistant, comprimendo, materia autem morbifica, sive obstruens, sive comprimens, ali-



aliquando in pulmōnibus, ob visceris debilitatem, sensim colligitur, aliquando aliunde affluit, à capite per modum catarri, quod rariùs, vel ab arteria pulmonali.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Asthmate ex congestione humoris viscosi in pulmonibus, ad generosum quendam.*

**U**T humor hic expectoretur, remedia quadam præscripti: inter quæ hæc fuerunt præcipua.

℥. Spiritus Anisi, part. ii. mellis scillit. part. i. aq. Cinamom. part. β. M. F. Julepus, capiat semicochl. pro vice.

℥. Oxymel. veri ex hydromel. malvatic. parati part. i. mellis scillit. part. ii. Syrup. de hyssopo, & de liquirit. tantumdem, capiat eodem modo. Vinum medicatum, ut interdum bibat.

℥. Rad. liquirit. ℥iv. rad. ireos ℥ii. rad. enul. ℥i. rad. angelic. ℥β. Scyl. præpar. porrorum bulborum præpar. ℥ii. Siliquarum ℥iii. Sem. fœnicul. anisi. an. ℥i. Sem. urtic. angelic. an. ℥ii. Sem. Nastur. ℥i. mellis ℥β. Sacchar. ℥bi. cinamom. ℥. vii. spirit. anisi. ℥β. vini generosi mens. viii. Servetur in dolio ad usum.

Novem exactis septimanis post hoc datum consilium, ad me nobilem equitem ablegavit, significans mihi per literas, ab eo tempore quo ceperit remediis meis, & præsertim oximelit, & Julepo uti, de die in diem se meliùs habuisse, neque ulla defluxiones sensisse, & nunc sine omni impedimento, liberæ spiritum ducere, neque angustiam ullam pectoris aut in pulmonibus sentire. *Felix Platerus, obs. lib. I. p. 178.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Asthmate anniversario.*

**A**Nte omnia materiam viscidam pituitosam incidendam & præparandam esse diximus, qua de causa digestivum sequens ordinavimus per octiduum.

℥. Rad. helen. ℥β. liquirit. petrosel. an. ℥vi. fol. mariub. alb. capill. ven. beton. an.

Miss. sem. fœniculi ℥iii. caric. ping. num. s. passul. min. ℥vi. F. decoctio in feri lactis destillati, q. s. in colat. ℥β. dissolv. syrup. de prassio, de liquirit. an. ℥iβ. M. pro tribus dosibus, jejuno stomacho assumendis. Hoc præmissio, peccantis materiæ evacuationem hoc diluto agarici instituimus.

℥. Agarr. opt. ℥iii. zinzib. ℥i. cremor. tartar. ℥β. trita per noctem macerentur in sero lactis cum aq. veronicæ æqualiter permisto. Manè coletur, & adde oximel. Scillit. ℥β. elect. caryocostin. ℥iβ. M. pro haustu. Taliter præservatione, causæ antecedentis respectu, instituta, quoad ipsum pectus, adeoque causæ proximæ gratia commendavimus usum frequentem pil. de terebinthina eam oximelite diuretico, balsamoque sulphuris terebinthinato: quibus aliquot annis mediocriter valuit. *Gregorius Hostius, observ. s. lib. 3. De morbis pectoris.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Asthmate.*

**F**iat diversio per Clysteria; deinde præcuretur dilatatio pectoris cum oleo amygd. d. id continuò paulatim lambendo. Fuit quidam domesticus patris mei, qui semper cum sentiret venturum paroxysmum asthmaticum, bibebat, hauttum olei simplicis, & sanabatur. *Joh. Baptista Montanus, consil. 123.*

℥. Loch. de pino, ℥iβ. penidiar. ℥β. incorporerentur simul in mortario, ut fiat Electuarium de quo sæpius in die & nocte teneat in ore ad quantitatem fabæ sensim deglutiendo. Si fastidiatur Loch illius loco in ore teneat frustum confectiois diapenidionis. Omni etiam sero quando vadit ad lectum, à principio capillorum usque ad summitatem capitis ponat de hoc pulvere sparso inter capillos quantitatem 4. granorum hordei. Et cum reponit secundum, cum pectine deponat primum.

℥. Sandarach. (i.e. gummi juniperi) ℥ii. caryophil. ℥i. magis. ℥ii. rosar. flor. nyphæ. viol. cortic. papaver. an. ℥β. lign. aloes. ℥i. F. omnium pulvis per se.

Ultimum remedium est, ut pectus ejus omni sero in ingressu lecti, ante & retro ungat-



tingatur hoc unguento secundum omnem ambitum costarum.

24. Ol. viol. amygd. d. an. ʒi. pingued. anat. butyr. rec. an. ʒiv. croci ʒii. ceræ. q. s. fiat unguentum, *Bartholomæus Montagnana. consil. 101.*

Millepedes si panno lineo involuti, in vino macerentur, & expressi potui dentur, magnum in asthma remedium aliqui se expertos esse prædicant. Urinæ propriæ potus plurimum juvare creditur. Oleum amygd. recens bibitum plurimum confert; vel butyrum recens affatim sumptum. Caricæ parum assæ, & in aqua vitæ macerata, & esitata conveniunt. Ceparum vel porrorum radices coquantur sub cineribus, & comedant pauperes cum melle & butyro. Laudatur & hoc plurimum.

24. Croci ʒi. vel ʒʒ. mosch. gr. i. detur cum vino albo. *Fælix Platerus, practic. tom. 1. lib. 2. cap. 4. pag. 391. & 392.*

Asthmaticis extremis vomitorum satis validum succurrit; qua ratione superioribus septimanis honestam scæminam, jam ex suffocatione expirantem, pulsu formicante, frigidisque sudoribus præsentibus, vitæ restitutam fuisse memini, mox Syrupi emetici ʒi. exhibita, cujus operatione, materiz tenacis ac viscidæ libræ aliquot. rejectæ fuerunt. *Gregorius Horstius, observ. 3. lib. 10. De Pharmaceuticis.*

24. Aq. benedict. ʒi. F. potio, quæ paucis horis ex toto contumax cujusdam senis asthma removit, & sanitatem ipsi reddidit, licet octogenarius erat. *Martinus Rulandus, curat. 85. cent. 7.*

Mulier quedam anhelosa erat, & suspiriosa, difficillimè trahens spiritum, adeo ut ob pectoris angustiam, suffocationem timeret; hujus affines, cum ad me petendi consilii causa advenissent, potionem deploratæ talem mitto.

24. Serilactis bene despumati ʒvi. extract. esulæ ʒi. permixta, colataque bibit; multoties egressit, & Dei misericordia continuo sanitatem acquisivit, ut renunciatum mihi fuit ab ægrota: cibis me jussu utebatur calefacientibus & humectantibus, vino autem hyssopite. *Martinus Rulandus, curat. 90. cent. 2.*

## SUBSECTIO QUARTA.

## Pro Asthmate.

24. **P**ll. de agar. ʒʒ. sulphur. triti, ʒʒ. gummi ammoniac. ʒi. cum aqua tussilag. F. pil. ix. devorentur manè horis 5. ante cibum; die sequenti fiant quæ sequuntur.

24. Gallum antiquum 3. aut 4. annorum cum virgis, ut irritetur, flagelletur, sed leviter ne occidatur; dein decolletur, & deplumetur, demum exenteratus & vino ablutus, infarciatur his medicamentis.

24. Sem. Cartham. ʒi. sem. anis. aneth. an. ʒii. rad. enul. liquirit. an. ʒvi. polipod. ʒx. passul. ʒvi. ficcum ping. num. 6. fol. tussilag. marrhub. hyssop. an. ʒiii. tartar. alb. ʒiiii. agar. candid. ʒi. Contundantur omnia crassiuscule, & in ventrem galli intromittantur, & suatur locus ne exire possint.

Deinde coquatur Gallus in lb. 40. aquæ, quousque caro ab ossibus separetur. Facta galli forti expressione, caro ejus & ossa proiciantur, & decoctum per linteolum coletur, & aeri exponatur, donec faciat residuum, deinde quod clarum est per se asservetur.

24. Prædicti juris clari ʒvi. oxymel. scilicet ʒʒ. pulmon. vulpis subtiliter tusi, ʒʒ. M. F. haustus sumendus, mane calidus jejunio stomacho, reiterando per octo dies continuos. Dum sumit magnificus Dominus hunc potum, fiat quotidie vesperti horis duabus ante cœnam Clyster infra scriptus.

24. Juris galli præscripti turbidi lbi. hieræ simpl. Gal. ʒvi. agar. præp. ʒii. ol. aneth. ʒii. vitell. ovi nu. i. sacchar. rubr. ʒi. Sal. ʒi. M. F. Clyster.

His factis, si morbus adhuc perseverabit,umat alternis diebus hoc alterum medicamentum, quod.

24. Sulph. vivi in aq. tussilag. infusi, & intenuiss. pulv. triti ʒi. terebinth. lotæ in aq. tussilag. mel. despumat. an. ʒʒ. M. F. bolus. *Johan. Nefus, consil. 7. lib. 2. consil. Johan. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*



Præmissis universalibus ad humorem pulmonibus impactum detergendum expectorantibus utendum erit Suffitibus, Syrupis & Eclegmatis. Suffitum ex multis facere solebant antiqui, at ego nullum præstantius novi quàm ex follis siccis tabacci factum: mirum certè remedium est, quod non modo potenter expectorat quicquid in ipso thorace continetur; sed etiam roborat pulmones. Debet autem fieri jejuno stomacho quinque aut sex continuis matutinis ante prandium horis quinque. Syrupum ergo expectorantem sic soleo præparare.

℞. Rad. helenii, & polipod. q. macerator. in vino albo dulci horis 12. an. ℥ii. passul. Corinthiac. ℥ss. Sebest. num. 15. farfar. pulmonar. Satureiæ, & calamenth. an. mi. folium unum magnum tabacci, liquiritiæ rasæ, ℥ii. sem. urtic. & bombac. an. ℥ss. Coq. in mulla dilutissima ad ℔ss. & cum Sacchar. fini tantundem F. Syrupus perfectè coctus. Hoc utor exhibendo cum cochleati eo modo quo eclegmata solent sumi, addendoque oleum sulphuris hac proportionem.

℞. Syrup. de Helenio (sic enim voco) ℥iv. ol. Sulph. ℥i. m. pro Eclegmate. Soleo etiam scilicet semper successu præparare Syrupum ex Tabacco hoc modo.

℞. Decoctionis fol. tabacci ℔ss. Sacchar. fini tantundem F. Syrupus optimè coctus: De quo exhibeo lambendo cum mulla diluta, facta ex decoctione hordei, sumendo hujus Syrup. ℥ii. & mullæ ℥iv. & verò habere vim magnam pro sanando Asthmate semper novi. *Horatius Augenius, to. 2. Epistol. & Consult. lib. 4. Epistol. ultima.*

Vinum quo profanando Asthmate *Ludovicus* pater utitur, hujusmodi est.

℞. Vini dulcis, melicrati cocti, an. ℔. x. pulv. fol. tabacci siccator. in umbra. ℥ss. rad. polipod. q. recent. ac minutissimè concisi. ℥iii. cort. rad. helenii incisi. ℥iv. macerentur horis 48. postea colentur per manicam *Hippocr.* & conservetur vinum in loco frigido.

Dabat ℥vi. pro vice singulis diebus, horis 5. ante prandium. Ego vero exhibeo illud frequentius more Eclegmatum, sic.

Sumo illius vini ℥iv. & admisceo diatr. Nicol. ℥ii. & loch efficio agitando leviter apud ignem, ac ubi refrigeratum fuerit,

addo oleum Sulphuris ℥i. & semper observavi pro viscidis & maximè crudis humoribus expectorandis conferre. *Horatius Augenius, Tom. 2. Epistol. & Consult. lib. 3. Epistol. 6.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Asthmate ad virum quendam.*

**O**Mnem aeris inclementiam devitet, animo & corpore quiescat, ita tamen ut moderato exercitio singulis diebus ante cibum utatur; ab immodicis vigiliis caveat, alvus, si libera non fuerit, altero quoque die clystere aliquo ducatur. Panis quotidianus sit modico sale vel sceniculo conditus, vino utatur tenui, non vinoso, atque ligni visci queres aut salsæ decocto attemperato. Inter alimenta, tria maxime proficua commendantur, quæ & alimenti & medicam. vices gerunt. jus caulium cum hyssopo & butyro recenti, hordei cremor, cum melle vel saccharo, atque cicerum alborum cremor, cum amygd. d. lacte, saccharo & butyro. Quod ad pharmaciam attinet, corpus quàm primum est ab omnibus excrementis purgandum. Eapropter alvo lenita, ex medulla Cassiæ recentem cum oleo amygd. d. extracta ℥i. & Spec. hier. simpl. ℥iv. apparandi erunt humores noxii in toto, & præsertim in cerebro & thorace concepti. Syrupus de Betonica, de Hyssopo, & Oxymelite simplicis, vel Scillino, aquis stillatitiis parem vim retinentibus additis. Hi deinceps præparati purgandi erunt pil. cochiis & de agarico.

Licet præsens affectus à sanguine non pendeat, nihilominus ut medicamenta exhibenda in corporis penitiores partes promptius penetrare possint: ante præscriptam purgationem, si sanguinis ℥vi. vel ℥vii. ex cubiti dextri vena detrahantur, emolumentum non ignobile laborantem hunc inde percepturum non diffidimus.

Corpore hunc in modum evacuato, ad medicamenta cerebrum & pulmones exsiccando roborantia sine mora confugiendum, ut.

℞. Conserv. anthos, beton. an. ℥ii. pulv. liqui-



liquirit. ℥ii. bolli armen. pulm. vulp. præpar. an. ℥ii. Syrup. hyssop. q. s. F. elect. cujus ℥ß. tribus horis ante prandium, & totidem dormiturus devorabit. Theriaca item & mithridatium, cum diamoscho d. vel amaro, in hunc usum interdum vicissim administrati utiliter poterunt. Thorax quoque universus, hoc tempore illinendus erit ol. amygd. d. cum recentibus butyro & croci modico, partibus asperiore linteolo molliuscule perfricatis: Propinetur etiam decoctum ex Sarfa cum modico ligni gaiaci 20. saltem diebus.

Ad materiam in thoracem dilapsam summovendam, ammoniacum aceto mulso in mortario liquatum, sæpè & modicè devoratum, non ignobilem opem præstat, quippe quod calefaciendi moderatè, siccandi, detergendi, & pulmonum cavernulas dilatandi vim obtineat, unde materiæ in pulmonibus tenaciter impactæeductio per sputum sequitur; & per halitum digestio.

Verùm enim verò inter alia medicamentum huic operi opportuna, unum est illudque efficacissimum, quo quidem semper scælici cum successu usi sumus. Est autem huiusmodi.

℥. Terebinthin. clarè ℥i. ammoniac. ℥ii. sulphur. purgati ℥i. M. & F. pilulæ molles, quarum una singulis duabus horis deglutatur ex Syrup. de hyssopo ℥ß. Hic unum maximi momenti memoriæ mandandum, videlicet in asthmatica accessione, nec cathartico medicamento, nec errhinis utendum esse, ne materia nimirum agitata largius cum suffocationis periculo illi pulmones præcipitetur. *Joh. Zecch. consult. 38.*

Ad lambendum ut sputum faciliè reddatur, in usum vocetur electuar. de pulm. vulp. mixtum cum elect. de iride & de pino cum Syrup. Hyssopi, non preterirem sem. urticæ, quæ quoties miscui cum his electuariis, mihi visa sunt valde profuisse. *Christophorus Guarinonius, consult. 228.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Asthmate.

℥. Och. de pino ℥ii. bolli armen. ℥iv. Syrup. de liquirit. q. s. F. Eclegma,

cujus ℥ß. paulò plus minusve sumat dum it dormitum: Hoc enim quàm maximè fluxionem in thoracem arcet & sistit, simulque excrementa pulmorum dissipat.

℥. Conserv. beton. viol. loch. de pino, an. ℥i. pulm. vulp. præp. & in pulv. redact. ℥i. terebinth. lamina ferrea ignita siccata & pulverata ℥i. liquirit. pulv. Ireos an. ℥ii. Syrup. de hyssop. q. s. F. electuarium. Sumatur ℥ß. spatio 15. dierum, immediatè ante haustum juris galli antiqui, decocti cum herbis & radicibus thoracicis, & cephalicis, unà cum ligno indico & visco q. Quod jus ita sumptum cum electuario præcedenti, incredibilem utilitatem afferet; ita enim peccantium humorum reliquæ, in cerebro, & pulmonibus, vel etiam in toto corpore, faciliè digeruntur & dissipantur.

In Asthmatis paroxysmo ad evitandum suffocationis periculum; si nil aliud prohibeat, quàm primùm secetur vena cubiti, secta vena. Sicyæ affigantur spondilis & thoraci sine scarificatione, dein statim talis propinetur bolus.

℥. Ammoniac. ℥ß. croci. Sulphur. aq. viol. sæpius levigat. an. gr. v. mosch. gr. ß. M. & cum oxymel. simpl. F. bolus mollis; ab hoc sumpto bolò, 5. vel 6. horis, malo non cedente, vini albi potentis subdulcis ℥iii. vel ℥iv. cum ℥i. croci, & grano medio Moschi propinentur, sitque potio actu calida. Radix etiam aræ in vino albo excocta, mediæ uncie pondere, cum loch. de pino, vel cum syrup. de hyssopo, eclegmatismo exhibita, paroxysmum asthmaticum mirificè sedare solet. Si adhuc malum non remittatur, ad capitis inuersionem, *Hippocratica* more, vel saltem ad Sinapismos, aut Phænigmos sincipiti de more admovendos, confugiendum. Toto autem accessionis tempore sola ptisana hordeacea cum melle propinabitur; bibendumque illi erit sæpè & modicè, ut humectatis viis, facilius spura evocentur. *Joh. Zecchius, Consult. 45.*

Quia flores sulphuris in omni asthmate, efficaciam habent præcipuam, ideo hoc Loch instituiimus.

℥. Diatragac. frigid. diatr. an. ℥iii. Sacchar. can. penidior. an. ℥ß. flor. sulph. ℥ii. syrup. capill. ven. tussil. an. q. s. F. Loch.



*Rodericus à Fonseca. Tom. 1. Conf. 11.*

Inter cibos medicatos convenit pomum dulce, quod cavetur à parte superiori, & in illo intromittatur pulv. thur. masculi ℥i. Sacchar. cand. ℥ss. deinde obturatum suo operculo, & involutum charta madida, concoquatur sub calidis cineribus, postea mundetur, & detur patienti per horam ante cœnam ad aliquot dies: Est enim remedium præstantissimum, ad omnes effectus pulmonis, quia lenit, maturat, & sputum adjuvat. Quod si huic pomo intromittatur etiam ℥i. flor. sulph. erit adhuc præstantius, sed tunc sufficit ℥ss. thuris. *Rhoderic. à Fonseca. tom. 2. Consult. 85.*

Flores Rosmar. & defectu eorum folia, si coquantur cum vino optimo & melle, ad dimidiæ partis consumptionem, capianturque ante somnum, asthmati mirè conferunt, vocemque clarificant optimè. *Petrus Borellus, observ. 46. cent. 4.*

Non improbo suffumigium ex Styrace, Benzoino, Thure, & Myrrha, sicuti nec improbat extrinsecus cauterium in ipso medio thorace. Videbitur vobis immanis operatio, sed quid dicetis, si *Ætium* legatis, qui in hoc casu, octo facit inustiones, quas tamen ego minimè probo. Non tamen displicet in suffocationis periculo fricatio thoracis ad rubrificationem, & propterea sinapismi, & dropaces, quæ vini habent rubrificandi & attrahendi, in hoc casu probantur.

Præmissis totius, & capitis evacuationibus, ac revulsionibus convenientibus, laudo ut per 5. dies continuos præbeatis ℥ss. hujus electuar. ter in die naturali, videlicet tres hor. ante prandium, duas hor. ante cœnam, & hor. sex post cœnam.

℥i. Penid. ℥iii. mann. el. ℥ii. ol. amygd. d. rec. ℥i. flor. cass. noviter extract. ℥ss. pulm. vulp. præp. ℥ii. ducantur in mortario, & F. electuar. alvum servat lubricam, & partes thoracis dilatat.

℥i. Rad. ireos, sem. bombac. an. ℥ss. pulv. calamenth. serpentar. cent. maj. an. ℥i. succ. enul. pulmonar. an. ℥i. oximel. Scillit. syrup. de tarsara an. q. s. M. pro lambitivo; eo singulis utatur horis ad educendam materiam jam emollitam. Ubi satis superque emollita est materia, atque etiam pro majori parte educta, alia conveniunt remedia

quæ humorum reliquias consumant, & pulmones roborent, inter quæ probatissimum est hoc.

Terebinth. venet. lotæ in aq. hyssopi ℥ii. ammoniac. ℥ii. penid. ℥ss. pulm. vulp. præp. ℥i. botryd. pulveris, aristoloch. an. ℥ss. M. omnia & ducta in mortario redigantur in formam elect. dosis est ℥ss. pro vice. Exsiccat simul & detergit; finem imponam proponendo descriptionem Elect. quod habeo in lib. meis manuscriptis, tanquam secretum optimum: Habet enim omnes scopos dilatandi thoracem, emolliendi sputum, attenuandi & incidendi, exsiccandi & corroborandi.

℥i. Butyrum rec. in aq. farfar. decies loti ℥iv. nuclei pini, passul. dactyl. amygd. amar. an. ℥ii. hyssop. ireos, thymi, satireiræ, serpentar. præp. puleg. calament. sem. urtic. an. ℥ss. cinamom. caryophill. zinzib. galang. piperis nigr. anis. cardamom. an. ℥ii. ligni aloes, uncis mosch. an. ℥i. mulsi dilutiv. Infunde passul. & dactil. per triduum in prædicto mulso; deinde coq. lento igne, & exprim. huic expresso succo adde butyr. jam propos. & iterum bulliant in ℔ii. mellis despumat, & in fine adde ipsos nucleos pini, amygd. & ℥i. pulm. vulp. præp. hujus electuarii datur ℥i. ubi maxime urget morbus, in initiori affectu, ℥ss. 4. hor. ante cibum saltem 30. dierum spatio. *Hercules Saxonia, practicæ parte prima, cap. 27.*

## SUBSECTIO SEPTIMA;

### *Pro Asthmate.*

**S**enex septuagenarius, à multis annis asthmaticus, ad eam redactus erat angustiam, ut vix spiritum ducere posset, etiam erecta cervice, & hiant ore continuo sterteteret, neque ullo modo quiescere posset, quin statim suffocari videretur, sequentium remediorum usu stertor desit, facilius respiratio fuit, & æger multum levatus est.

℥i. Aq. Cinamom. ℥ii. oxymel. scillit. ℥i. M. utatur ex cochleari frequenter.

℥i. Rad. enulæ campan. sacchar. conditæ ℥iii. sacchar. cand. ℥ss. Syrup. de hyssop. ℥i. gummi ammoniac. aq. vitæ dissolut. ℥ss. M. F. loch, de quo capiat. Cochlear unum mane



manè & serò, sensim lambendo. *Lazarus Riverius, observ. 21. cent. 3.*

Elixir proprietatis apud *Paracelsum* curat Asthma, Epilepsiam, Apoplexiam, Paralytin, Atrophiam, Tabem. Ita paratur.

℥. Aloes lucidæ, myrrhæ opt. & croci opt. an. ℥i. duo priora terantur accuratè, crocus verò quia non teritur, nisi efficcatus, potius conglobetur tundendo; ponantur in vitro capacissimo & forti, sigilleturque liquato collo vitri, & destilletur moderato colore, ne vas diffiliat, donec videas totam offam in fundo coaluisse, & circulari oleum clarum, cum aqua in parietibus vitri: tum aperiatur collum vitri, & infunde ℔i. aq. cinamom. & destilla per arenam madidam, cui aqua bulliens sensim affundatur, donec non amplius è rostro alembici quicquam stiller. Hoc medicamine tam quartanam, quam continuam statim absolvi, adeo ut qui noctu susceperat sacrosanctum viaticum, & olei extremam unctionem, me in prandio convivam circa lectum habuerit. *Job. Helmontius, Tractat. cui cit. Recepta Injecta.*

Quædam orthopnoica erat, magna copia pituitæ putris in pulmone; purgatione & ventris inferioris, & multa anacatharsi melius habuit: In difficultate spirandi non est formidanda etiam frequens & magna purgatio. *Guil. Ballonius, Epidem. lib. 2.*

In Asthmate a crassa & viscida materia, in duobus expertus sum sequens lambitivum *Gesneri*.

℥. Sulph. pulverisati, & sæpissimè cum aq. tussilag. loti ℥i. diapenid. ℥viii. M. optimè contulit.

Mulieri cuidam sæpius bene profuit sequens apozema, in angustia pectoris & dyspnœa.

℥. Passul. Corinth. ℥iij. dactyl. nu. 12. ficuum nu. 8. jujub. num. 10. sem. scenicul. anis. an. ℥vi. scenugræc. ℥iij. rad. ireos ℥ß. sol. hyssop. prass. capil. ven. an. mj. liquirit. ℥iß. palypod. q. ℥i. coq. s. a. in ℔v i i i. aq. font. ad medias, deinde adde mellis despumat. ℔i. coq. iterum ad consumptionem ℔i. postquam refrigerata fuerit, coletur & servetur in vitro Dosis ℥iij. manè, calidè, quandiu durat. *Achilles Gasserus, observ. 11.*

*Burnet Parte I.*

Asthma diuturnum in Patricio quodam, cum aliis non posset, tandem curatum est aqua salis armoniaci, quæ paratur hoc modo.

℥. Fol. sempervivi 20. aut 30. Contunde in mortario aduso aq. fontanæ momento, col. cum expressione, sicut emulsionem fieri solent, & adde salis armoniaci ℥ij. M. plurimis etiam aliis contulit egregiè.

Idem præstat Spiritus ejus vi scilicet diuretica. *Jeremias Martins, observ. 92.*

Præmisso vino emetico, quod Pulmonum & Pectoris mala mirè sublevar; exhibeatur sequens Pulvis à ℔ß. ad ℥i. per singulos dies, manè ac vespèri, usque ad morbi declinationem cum vino albo; vel jusculo.

℥. Cardui Bened. Sinap. Sylvestr. an. ℥ij. piper. longi ℥i. fol. Sen. mund. ℥ij. anis. ℔ß. f. pulvis subtiliss. hisce paucis per plures prietina, integræque sanitati restituimus. *Martinus Rulandus, curat. 8. cent. 6.*

## SUBSECTIO OCTAVA

### Pro Asthmate raro.

Vivit hic puer quadrimus qui ab incunte ætate pectoris quadam angustia, adeoque gravi asthmate, affligitur statis periodis, mensuris fere, nunc citius, nunc tardius, prout in victu vel excedit, vel modum servat: in paroxismo tam graviter angitur, ut jamjam suffocari, & animam agere videatur, qui paroxismus ante non cessat, quàm materiam crassam viscidam, compactam, gravissimam tussi, & summis conatibus per os excernat, sæpius autem hæcenus excrevit talem materiam, unitam, albidissimam, arboris radices, caudicem & ramos, omni ex parte referentem, quam si *ῥομαχτοποιεῖν* mihi liceret *ῥασημαδεῖν* nuncuparem, ubi autem viscida illa materia coarcevetur, & coaguletur, si dicere, cogar, in ipsa aspera arteria (qua parte ad pulmones pervenit bifida & in minores ramos dispersa quos bronchia pulmonum vocant) sedem reponam; ubi paulatim partim ex naturali pulmonum debilitate, partim à destuxionibus à capite factis colligitur. *Gregorius Horstius, observ. 4. lib. 3. De morbis pectoris.*

Pro Asthmate nunquam fallibile remedium habetur potio sequens.



℥℥. Ammoniac. ℥i℥. aq. hyssop. ℥iv. vini rhenani, ℥ij. M. ut decet. tanta efficacia a suffocatione, liberat, ut præclarius remedium non viderim.

Commendatur etiam in hoc affectu Elixir proprietatis cum aq. tussilag. vel hyssop. exhibitum *Philip. Grulingius, cap. 1. part. 2. lib. 2. Practic.*

Asthmaticus quidam, assumpto alternis diebus hoc Syrupo, & excreto per sputum viscido humore, convalevit.

℥℥. Fol. Nicotian. virid. aut siccor. Mj. Aristol. rot. enul. camp. an. ℥i. hyssop. mont. capill. ven. flor. viol. an. Mj. passul. exacin. ℥iv. liquirit. ras. & contus. ℥i℥. sem. fœnugræ. ℥i. caric. ping. num. 6. dictam. origan. prass. scabios. an. Mj. sem. urtic. aneth. an. ℥ij. anisi. ℥i. ligni guajac. Smilac. asper. rad. Chin. an. ℥i. tussilag. Mi. Strobil. num. 20. dactyl. num. 10. coq. S. A. ad ℥bii. colat. adde succi Scillæ ℥℥. succ. Enul. & hyssop. an. ℥i. bulliant quousque succi absumentur, adde balsami aut olei de liquidamb. ℥i. & cum melle & Saccharo F. Syrupus. *Zacutus Lusitanus, observ. 123. lib. 1. Prax. Admirand.*

Quidam difficulter spirabat, anhelosus erat, macruerat, omnes accusabant pulmones, aperto cadavere, nil memorabile in pulmone repertum est, cor (quod admirabile) maiusculi capitis magnitudinem adæquabat. Adeò increverat, ut omnis sanguinis & spiritus, eo facta sit *σππ'ος* & *σurdουή* *Guil. Ballonius, lib. 2. Epidem. & Ephem. pag. 144.*

## SECTIO XLIII.

### Pro Atrophia.

**Q**uidam Atrophia laborans mala citra summoperè appetens, unum integrum & magnum 4. librarum pondere comedit, quod, ut scimus, commanducatum à quolibet sano difficillimæ concoctionis est; tamen hic æger citro devorato meliuscule habere incepit & convaluit. Indulgeant quandoque Medici ægrorum voluptatibus cum modo & mensura, multoties enim natura a nullo edocta id quod est sibi utile maximoperè appetit. *Dominicus Panarolus, observ. 36. Pentecoste 2.*

Atrophiæ evacuationes acras non tollunt; sed exasperant, si tamen colluvies interiora viscera gravat, præsertim ventriculum, vomitus lenes sunt imperandi, maxime ab aqua benedicta, eius nimirum peculiaris vis hæc est, ut non tantum suburram eliminet, sed etiam ventriculum ad concoquendum instiget. Unde post aquæ benedictæ usum, semper videmus appetitum corroborari, augerique, licet aliquandiu ille sepultus, parum aut nihil omnino effecerit, hoc itaque auxilium moderatè institutum, in principio huius curationis multum prodest.

Deinde humectantia imperanda sunt, sed ita ut viscerum obstructions simul expellantur, inter externa in hoc casu laudabilia, pro pueris est balneum ex decocto capitis & pedum vervecis in aqua tam diu ebulliendo præparatum, ut consumptis omnibus carnibus ossicula tantum possint eximi, hoc atrophiæ puerorum laudabiliter solvit, si septies, octies, novies, in eo laventur, semel atque iterum de novo præparato, a balneo spinae dorsi, vel oleo oliv. aut unguento resumptivo tota inungenda est, in victu dentur humectantia, iuscula & brodia, rarò assa. Emulsio amygd. d. cum aqu. tussilag. & beton. & quandoque cum sem. papav. alb. & melonum maximè utilis est.

Adultis atrophia laborantibus, præter balneum aquæ dulcis, aqua destillata ex sanguine suillo, & plantis refrigerantibus & humectantibus mirificè prodest, aqua ista sic paratur.

℥℥. Sang. suilli ℥bii. frica manibus ut omnes fibræ auferantur, adde fol. beton. tussilag. ros. rubr. malv. an. Mi. fol. Lactuc. M℥. sem. melon. ℥i. aq. tussilag. ℥bii. destilla in B. aromatizetur cum tabul. manus ch. perl. ℥iij. ad singulas libras, de hac aqua bibat sæpius Lac, etiam humanum ex uberibus haustum mirificè prodest, iis qui ex sumpt. philtro atropia laborant, lac equarum auxilium est præstantissimum; semper tamen cum pauxillo sacchari exhibendum. Consumptionem corporis desperatam, nihil proficientibus aliis remediis, hoc modo aliquando curavi.

℥℥. Mellis Virgin. q. f. inunge ollam non vitreatam recentem intrinsecus, postea olla



olla plantetur in acervum formicarum, ita ut officium ollæ tegatur cribro mediocriter laxo, & sic formicæ currunt per cribrum, & cadunt in mel, in eodem hæsitantes, nec recurrentes, atque sic nihil palearum vel impuritatū aliarum intro-mittitur. Supra collectas formicas infunde Spirit. vini; q. s. digere vase clauso in B. per unum atque alterum diem, dein destilla primò lentè, donec nimirum spiritus vini prodeat, quo ablato, reliquum ebulliente B. destilla, & reserva. Hujus aquæ cochlear. i. qualibet septimana ter vel quater jejuno ventriculo, cum pane tosto exhibitum, atrophiam corporis mirabiliter tollit, interim totum corpus, vel tantum partes distantes (manus brachia & pedes) aliquoties eodem liquore inungendæ sunt. *Joh. Hartmannus, Pract. Chimiæ.*

Atrophiam seu extenuationem membrorum in pluribus hoc modo curabat Nobilissima quædam matrona.

℥. Sapon. minutim concisi, & Lumbric. terrest. an. pt. æq. inde in vitrum, deinde adde salis quantitatem alterutri ex prædictis parem, & in sartagine probè calefactam: obturatumque vitrum in massam farinaceam compinge, & ad instar panis in clibano excoque, exempto postmodum ex pane vitro, reperies oleum, seu potius viscum quendam, qui illitus & Atrophiam & contracturas sanat. *Jeremias Martins, observ. 60.*

Vir quidam obesus & pinguis, ex febrili calore, & diuturna hepatis intemperie sicca, conniventibus cutaneis meatibus, non nutritus in atrophiam incidit, cui, non proficientibus aliis remediis, 15. diebus continuè ad normam *Galen*i picationem applicui: cujus usu ita impinguatum est corpus, ut paucis auxiliis adhibitis ad pristinum statum fuerit redactum. Picatores dicuntur illi, qui ferulis pice illitis partem debilem concutiebant & sic motu, & calore, sanguinem & nutrimentum ad partem attrahebant, & hac ratione membrum gracillimum impinguebant. *Zacutus Lusitanus, observ. 236. lib. 1. Prax. Admirand.*

Cum pueri & adultiores cachectici vocantur, ferè pro conclamatis relinquuntur, & quòd ad summum maciei ventum

sit, ne medicamentulo quidem, locum relictum putant, sed sola prognostico: ac longe secus res habet, nec fraudari laude debita debet *Fernelius*, qui meo quidem iudicio, de atrophia aliquid memorabile consignavit. Bilis flavæ & atræ circa iecur profusio atrophie causa sæpius est, vix enim atrophia vera observatur, in qua viscera præter intemperiem, non multorum biliosorum humorum colluvie scaterent, & earum copia distenderentur & cum hæc causa naturalem spiritum & calorem proterat, vix laudabilis sanguis gigni potest; ac in cachexia quidem medicamento locum relictum putant, quod vitiosa sit nutritio in atrophia autem ad solam *ῥιζανὴ ψυχή* confugiunt: at si circum viscera colluvies est istius bilis, quæ fovet intemperiem, frustra alimentis eam tollere nitaris. *Guill. Ballonius. Epidem. lib. 1. pag. 12.*

Passularum usus in atrophia, ad corporis nutritionem & ad impinguandum commendatur, in hunc modum præparantur.

℥. Passul. excinat. in aq. bugl. borrag. & vino albo infusarum lbj. siccantur, deinde disponantur in vase vitreato, Sinapizando saccharo tenuissimè pulverisato, servantur in loco, & utatur iis frequenter. *Gnil. Rondelet cap. 27. lib. 1. Pract.*

Aqua Cochlearum rectè destillata atrophie medetur, valenter nutrit, illa sæpe sæpius felici cum successu semper sumus usi. Proposuimus singulare remedium, & quo aliàs ipse summa cum languentium utilitate, felicissimoque successu sum usus; sed quoniam non fuere cuncta præmanibus, non fuit factum. Remedium hoc singulare ad impinguandum, partim est à *Cardano* desumptum, & partim ex nostro Marte inventum, & a nobis aqua mirabilis dicitur, cuius hæc est descriptio, quæ mihi semper secreta fuit, nunc autem ad Languentium commoditatem & studiosorum curiositatem publicandam esse censui.

℥. Sanguinis porcini juvenis & adulti nuper decollati lbij. terebinth. venet. lbj. liquirit. ras. lbss. passul. Mv. ficuum pingnum. 50. rad. ireos ℥iii. pinear. mundat. Miii. fol. tabacc. Mii. micæ panis. lbss. destillantur in vase vitreo in duplici vase, & in vase vitreo optimè obturato serverur, in loco



loco frigidissimo. Mirabilis est, hæc aqua sumpta ad ℥ii. cum modico saccharo alb. per 15. dies; impinguat valde, & restaurat omnes hæcticos, etiam morituros, sed morituri postea redeunt ad consumptionem statim; est gustui grata, maximæque ac incredibilis efficaciam.

Inter cætera quæ maciem arcent, sunt somnus longus, gaudium, latitia, quies, è contra curæ, sollicitudo, anxietas, & nimia venus, Corpora siccant. Cibi saliti & herbacei fugiantur tanquam parum nutriendi, acetum maxime improbat, nam præterquam quod vitam breuiat, corpora etiam exsiccant, approbamus aquæ dulcis Balnea, inunctiones universales ex ol. amygd. d. rec. & pinguedine gallinæ cum rosaceo, & juscula restaurantia. Si nactus fueris ægrotum aliquem divitem, & supradicta remedia non juverint, tutò confugere poteris ad balneum lactis, quod tanto peius laudat *Avic.* in macilentis, consumptis, hæcticis, arefactis, & marasmo confectis. *Epiphanius Ferdinandus, Histor. 20.*

## S E C T I O XLIV.

### *De Auditus difficultate.*

**A**uditus difficultas (quam Græci *ὑποακοή* & *δυσακοή* dicunt) symptoma est quoddam aures infestans, in quo debiles somni neutiquam, magni verò obscure percipiuntur, qui hoc vitio laborant, surdastri vocantur, easdem sui causas cum surditate, sed leviores agnoscit, de quibus, cum ad caput de surditate ventum fuerit, explicatius dicemus. Impraesentiarum dicimus, hujus symptomatis causam esse posse, aeris ingeni crassitiem, & impuritatem quæ ortum suum debet, tum aeri externo nebuloso, tum etiam crassæ victus rationi. Infarctus etiam nervi auditorii à quolibet humore non minus bilioso; quàm pituitoso, accusari hic jure potest.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Auditus difficultate.*

**O**bservata victus ratione, sæpe corpus infuso Senæ purgetur; cum Senæ

na omoiū sensuum organa præcipue mundet infusum ita fiat.

℥℥. Passul. ℥i. galang. incis. ℥i. decoq. in aq. puræq. s. pro duabus dosibus. Infund. flor. borag. viol. an. pi. fol. Senæ el. ℥i. stent. in infusione per noctem, & mane calefiat, ac pro duabus potionibus exprimatur.

℥℥. Expressionis ℥iv. Syrup. rosat. solut. ℥i. manna Calabrinæ. ℥vi. Ms. sic pro uno & altero haustu. Caput deinde hoc apoplegmatismo expurgetur.

℥℥. Rosmar. organ. salv. rutæ, an. M ℥. ros. rubr. pss. rad. Zinzib. incis. ℥i ss. pyrethr. ℥iii. Coq. in ℔ii. ad medietatis consumptionem. Colat. adde aceti rosac. acerrimi ℥i. detur pro gargarismate quo manè os ablut. Isto modo evacuato capite, decoque in aqua & vino organum, atque in decocto calido, spongia madefacta & expressa auri affectæ adhibeatur. Iniciatur deinceps per calamum una vel altera gutta aq. Cardui hoc modo destillatæ.

℥℥. Fol. Cardui mundator. & siccor. Mi. aspergantur spiritu vini, & in vas vitreum quod bocciam appellant, imponantur; atque aq. Cardui q. s. affundantur; suppositoque alembico vitreo destilletur in arena, destillatum in vitro clauso servetur, cum uti voluerit, parum de eo in argenteo cochleari calefiat, injectum auribus, in adversam partem caput declinet exiguo tempore, deinceps rursus elabi sinat, aurem perpetuo lana Xylina quæ odorem vel ex moscho, vel ambra contraxerit, concerpta muniat: caput, non refrigeret, & ne auribus ventus molestus sic caveat, cum auris mundanda est, non confricet auris scalpio, sed linteolum molle intortum instar turundæ imponat, atque hoc modo mundet. *Ioh. Craton. Consil. 2. lib. 4.*

Commendatur imprimis balsamum purum Orientale, si intincta bombyce auribus imponatur, ego aquam cardui rectè destillatam balsamo præfero. *Io. Craton. Consil. 5. lib. 2.*

Pro auditus difficultate jussi eum aquam ex fellibus auribus indere, eaque interiora madefacere, nec diutius retinere, sed postquam effluxit, aures bombyce moschata obturare. Aqua ex fellibus deterfiva ita paratur.

℥℥. Rad.



24. Rad. raphan. porr. Cœpar. an. ʒi. Cyclamin. ʒß. helleb. alb. ʒi. fol. origan. sicc. ʒiii. rutæ, majoran. an. ʒii. flor. Lavend. ʒi. sem. fœnicul. Cumin. an. ʒi. bacc. Lauri num. 15. contusis adde fellis vaccin. ʒi. (fortè ʒi) vini alb. q. s. ad pultem formand. destillat. in B. M. & servetur aqua. Suffitum etiam excipiat ex decocto bacc. Lauri, sem. Carvi, red. Caryophil. iridis fol. rutæ, Salv. beton. myrrhidis, spondylii, an. cum vino. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 125.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Auditus difficultate.*

**P**RO digerenda pituitosa materia tenaciter in auditus organo impacta, gravis auditionis proxima causa, nullum præstantius remedium occurrit, quàm liquor ex anguilla emanans, dum torretur, cum ol. anisi sensim in aurem affectam hora somni instillatus: ejusdem fere valoris est succus Scyllæ, cum ol. Liliorum. Ego autem sæpius scælici cum successu inveterata etiam surditate expertus sum theriacæ aquam stillatitiam singulis 8. horis in aures instillatam.

Hoc etiam remedium in hoc casu optimum est.

24. Aloes ʒi. Colocynthid. interioris. Euphorbii, an. ʒi. mosch. ambr. an. gr. vii. terantur subtiliss. & cum felle vaccino M. & F. trochisci, qui siccentur, atque usus tempore super cote fricentur, & cum succoraphani in aurem instillentur. *Job. Zechius, consult. 43.*

Anguillæ pinguedo, quæ dum assatur, excidit, infundatur calidè in aures, aliud est, allium frictum & tusum per noctem intra aures apponatur; aliud quod & *Hippocratis* est, Galbanum aceto dissolvatur & addito melle auribus applicetur; aliud. Incavetur Cæpa, & impleatur oleo, ponatur sub cineribus, ut ebulliat: contundatur & exprimatur succus in aures. Per intervalla adhibeantur quæ emolliunt, quale est oleum amygd. d. procuret noctu in auribus gossipium tenere cum pulvere moschi odorati, aliquando etiam Zibethi. *Rodericus à Fonseca. Tom. I. Consult. 13.*

24. Card. bened. asperge aquam cardui & fac. ut denuo destillet, hoc liquore lintecolum imbutum Crato surdastris immittit in aurem, si dolcant, vel non audiant. Nihil ex omnibus medicamentis, quæ expertus est, se conducibiliu comperisse fateatur. *Carolus Olevius, l. 3. pist. Cratonis & aliorum Medicorum a Scholtzio editorum.*

## SECTIO XLV.

*De Auris dolore.*

**S**Olet acutis dolor tantum sæpe facessere negotium, ut mortem nonnunquam solus accersat, vel saltem cerebri affectus magni momenti, veluti delirium, phrenitidem, carum, & apoplexiam. Hic enim dolor, aliter quàm qui oculos molestat, quàm citissimè cerebrum in consensum trahit. Græcis *ἰσχυρὸς* dicitur. Est quidam naturæ tristis perceptio, afflictis partibus sentiendi vi præditis à solutione continui ortum ducens. Partes affectæ sunt membrana & nervus auditorius. Causæ internæ sunt, phlegmone, materia putrida & purulenta, ex mixto in aure abscessu, humores calidi, sed sæpius frigidi, vermes & flatus, externæ sunt, aer ambiens, percussio, animalcula, pulveres, lapilli, & grana quæ intumescunt.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Auris dolore intensissimo in Muliere.*

**C**UM pilulis Cochiis & aureis illam purgassem, & cucurbitulas scapulis cum scarificatione, & ventosam in nucha apposissem; hoc Cataplasmate imposito, miraculi instar ab omni dolore liberata est.

24. Cape numero i. sub cineribus ferventibus decoctum, oleum chamæm. ʒi. butyr. rec. ol. aneth. an. ʒß. croci, ʒi. contusa emplastri modo, auri dolenti appositæ sunt. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 12. De Aurium morbis.*

Auris dolorem ex inflammatione sic curavi.

Præmisso clystere emolliente & refrigerante.



gerante, sanguinem detraxi ex vena cephalica ejusdem lateris: Postea, cum fervens esset inflammatio, ovi candidum tenue cum lacte muliebri tepidum infudi. Aliquando etiam usus sum ol. viol. in quo aselli infusi sunt & expressi, modò etiam rosaceo solo, modo lacte admisto, aut albo ovi.

Similiter extrinsecus lanam jam dictis imbutam imposui, cavendo tamen ne calcifieret.

Pars quoque dolens hoc fotu fovebatur.

24. Malv. bismalv. viol. lactuc. salic. an. Mi. sem. Cydon. malv. an. ʒi. flor. Chamem. melilot. an. p. i. flor. ros. rub. p. ʒ. F. decoctio, qua pars leviter & tepidè cum spongia madafacta & expressa foveatur. Talis fatus optimè conveniebat, ut materia digeratur, & sic paulatim materia fuit resoluta sine abscessu. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 12.*

Quidam autem dolentem ex percussione ita curavit; medullam panis albam calidè tritam cum melle apponebat, quæ frequenter superposita dolorem sedebat; Particula etiam thuris infundatur in lacte donec dissolvatur, & guttatim in aurem mittatur: Hoc enim illicò dolorem tollit ut expertum est. *Petrus Forestus, observ. 7. in Schol. lib. 12.*

Si auris doleat ob granum, lapillum, aut aliud tale corpusculum in aurem immissum, extrahantur hæc hoc modo. Inungatur auris exterius oleis & unguentis calidis, ut martiato Agrippæ, dialthæa, ol. laur. camom. sambucino; petrolæ & similibus. Deinde sternutationes provocentur, & teneant se per nares, ut propter magnum impetum spiritus possint extrahi. Quod si cum hoc non curatur, accipe baculum subtilem & lævem & bene politum, & terebinthina, vel visco, vel gummi pini, vel pice navali liquida, vel aliquo alio simili in capite intingatur, & ponas in aurem, ita quòd talia viscosa supra lapillum vel lignum adhæreant, & sic extrahantur. Quòd si cum hoc extrahi non possit, tunc ventosam sine scarificatione supra auriculam in qua sunt hujusmodi corpuscula sæpè & sæpius appone. Quod si extrahi non possint adhuc, positis prius oleis & unctionibus dictis, apponatur galbanum, supra petiam extendatur, &

supra foramen auris ponatur, & jaciat patiens supra aurem læsam. Expertum est. *Arnoldus Villanovanus, Practic. lib. 1. capit. 32.*

Aselli in oleis anodynis infusi & expressi præstantius faciunt anodynum: hæc enim animalia eximiam habent vim dolorum sedandi, eaque ratione in doloribus dentium, hæmorrhoidum aliisque usurpantur. Vel dicti aselli vivi capiuntur, & in oleis cum aqua decoq. ad aquæ consumptionem. *Lazarus Riverius, Pract. lib. 3. cap. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Auris dolore atroci ab humore bilioso.*

**P**Ræmissis purgatione & venæsectione, ad topica remedia confugiendum est: quorum omnium mox præscribenda efficacissima tutissimaque sunt ad mitigandum dolorem, cui quàm maximè studendum est.

24. Ol. rosac. omphac. nymphaeæ, amygd. d. an. ʒi. succ. solatri depurati ʒi. M. omnia exacte, & in aurem sensim instillantur actu tepida, vel adeps anseris butyro recenti liquatus cum oleo rosac. in aurem pariter instilletur, vel (quod omnium optimum est) ovi nuper nati album, cum lacte muliebri, & ol. rosac. subactum cum opii gr. iiii. & croci tantundem, si tepidum in aurem instilletur, mirificè dolorem omnem mitigabit.

Ubi verò doloris causa frigido morbo accepta fertur, vel inflammatio ad supurationem tendit, *Benedicti Victorii Faventini* emplastrum ex cæpa, foelicissimo cum successu administratur, quod hujusmodi est.

24. Cæpæ sub ignitis cineribus excoctæ nu. i. butyri rec. ʒii. ol. chamæ. & rosac. an. ʒi. croci ʒi. omnia simul confusa & probe subacta ad emplastri formam redigantur, quod temperatè calidum dolenti parti applicetur. *Job. Zecchini, Consult. 62.*



## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Auris dolore, Apostemate  
& Ulcere.*

**H**Uic in consilium post multa frustra tentata Medicamenta, adhibitus, iussi, ut manè ac vespèri in aurem læsam 3. vel 4. guttas olei sulphuris tepidi, priorè rejecto, iniiceret; & postea in sano latere horas aliquot decumberet, quod cum fecisset indies, omnis dolor mitigatus, ulcus absterfum curatumque fuit paucis diebus, cum omnium admiratione. Cum eodem sulphuris Balsamo ad eundem modum administrato, sanavi auris dolorem intensissimum in alio. *Martinus Rulandus, curat. 85. cent. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Auris dolore.*

**D**Ivinus Senex, *lib. 2. epid. sect. 6.* sic præfatur, gravissima aurium dolores affixa cucurbitula tollit. Hæc memoranda sententia summam attulit opem, misero cuidam, qui ex dolore auris atroci malè habens; omnibus præsidis destitutus, vigil, debilis, & amens factus, continuò febriens, in horas moriturus sperabatur. Hic cum ex venæ sectione, cucurbitulis, costis, humeris, collo affixis, revellentibus clysteriis, expurgantibus, cæterisque revulsoriorum auxiliis, sicut & anodynis intra aurem inditis, nullam sentiret utilitatem, cucurbitula scarificata juxta aurium glandulas applicata, levatus est: extracto enim copioso sanguine, inflammatione resoluta, hujus auxilii beneficio omnino, sanus permansit. *Zacutus Lusitanus, observ. 69. lib. 1. prax. admirand.*

In doloribus aurium, folia Nicotianæ viridia, vel etiam exsiccata sed iterum humectata; mirificè profunt. *Job. Hartmannus, pract. Chimiatr.*

Toniori cuidam aurem vehementer dolenti, Pyroticum in saxitia doloris radici auris adhibuit; multò alacrius dolorem tulit. *Gul. Ballonius, lib. 2. epid. pag. 260.*

Oleum è ligno coryli acerbissimos aurium dolores subito sanat.

Si alia non profint, necessarium est, ut ægro hora somni exhibeantur Laudani opiatii gr. iii. *Daniel Sennertus, lib. 1. part. 3. sect. 2. cap. 8.*

## SECTIO XLVI.

*De Auris Sibilo, Sonitu & Tinnitu.*

**H**Æc tria ὠτῶν ἤχοι, aurium sonitus, σιγῆς, sibilus, & βοῦβοι, tinnitus, unum eundemque affectum designant: qui nihil aliud est, quam depravata auditio, ob internum sonum in ipsis auribus præternaturaliter excitatum, & perceptum, etiam cum foris omnia silent. Pars affecta est meatus auditorius, ea maximè sui portione, qua nervum quinti paris expansum excipit, prope cavitates labyrinthū & cochleam dictas: quæ nervi panis portio, vel finis potius pori ἀκυστιῶν, ubi dilatato nervo conjungitur, auris præcipua pars est. Hujus symptomatis causa, (quam aliqui in facultatis audiendi debilitatem malè referunt, quidam etiam in ejusdem sensum nimium exquisitum, qui *Galeno ἀντίβειν τῆς ἀκυστιῆς αἰσθητικῆς* dicitur, levissimam impulsio- nem internam percipiente) alia non est quam vapor aut flatus, qui vel ab aliis partibus transmissus, vel in ipsis auribus genitus, congenitum aurium aerem agitat & impellit; unde sonitus excitatur; prout verò flatus multus est; vel paucus, crassus, vel tenuis, celeriter aut tarde movetur, varios sensoriò sonos representat, variasque appellationes sortitur.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Aurium Sibilo.*

**A**D Aures ut calefierent, & tollerentur vapores ad eas descendentes, & non dimitterem remedium tantopere celebratū in hoc casu à *Scribonio Largo*, in quo accipitur una pars olei de Pice, & duæ partes olei amygd. d. vel olei communis; quod expertus sum cerebro ad aures missis. *Io. Baptist. Montanus. Appendice ad Consil. x.*

SUB.



## SUBSECTIO SECUNDA.

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Aurium sonitu à causa frigida.*

24. **O** L. nardin. ℥iii. ol. de origano, ℥v. Pulp. colocynthid. subtiliter pulver. ℥x. fol. organ. & lign. aloes an. ℥ss. omnia in vase vitreato diligenter commixta bulliant lento igne ad tertiæ partis consumptionem, dein cum expressione decenti colentur bis per pannum spissum, & reponantur in vase vitreo radiis solis exposito. Infundatur una vel duæ guttæ hujus olei auribus affectis bis in die, ante prandium & ante cœnam. Hoc medicamen est sublimè valde: In eius enim laudibus conveniunt omnes illustres viri, quod ipsum est de melioribus medicinis ad omnes ægritudines frigidas materiales, vel immateriales organorum auditus. *Bartolamæus Montagnana. consil. 8.*

24. Mass. pil. coch. i. sine quibus an. ℥i. ol. macis gr. iii. diagridii præp. gr. ii. cum aqu. origani F. Pilulæ numero ix. Sumantur ad tempus singulis septimanis, post modum bis in mense. Ad confortationem cerebri, capitisque, usum ineat istius cucuphæ.

24. Rad. Ireos, cyper. an. ℥ss. angelic. ℥ss. flor. ros. rubr. fol. maioran. lavend. stœchad. arab. gran. tinct. an. ℥i. sem. nigellæ, coriand. præp. an. ℥ss. caryoph. nuc. mosch. an. ℥i. mastich. thuris alb. an. ℥i. styrac. calam. benjoin. an. ℥iii. M. F. Pulvis crassiusculus pro cucuphæ. Externè de liquore sequenti guttæ aliquot auri utrique tepide instillantur, vel cum bombace indantur.

24. Ol. amygd. amar. aneth. rutac. chamæmill. an. ℥ss. bellebor. alb. castor el. an. gr. iii. sem. cumini infusi & expressi ℥ss. M. diligenter pro liquore. Huius liquoris usum præcedat hic fots.

24. Fol. Maioran. rutæ, absint. hyssop. an. Mss. flor. malv. melilot. chamæm. an. M. i. sem. cumini, rutæ, anisi, an. ℥i. in q. aquæ pro fots, cuius vaporem per infundibulum manè auribus excipiat. *Job. Petrus Lotichius, observ. 1. cap. 3. lib. 2.*

*Pro Aurium tinnitu ex spiritu flatulento & crasso humore.*

**H**oc Oleum præstantissimum est. 24. Colocinth. ℥ss. succ. rutæ, & amarac. an. ℥i. cumini, carvi an. ℥ii. F. decoctio in vino & oleo amygd. amar. ad vini consumptionem; Exprimantur omnia & colentur: Utatur: hoc oleo frequenter in aurem injiciendo, & semper habeat aures obturatas bombace moschathelino.

Aliud *Rondeletii* præstantissimum, maxime si cum surditate sit aurium tinnitus.

24. Rad. hellebor. alb. ℥iii. fol. Lauri & Rutæ, an. Mss. fol. fraxini, M. i. F. decoctio in ol. amygd. amar. vel nucum (quod efficacius erat) & vino albo vel malvatico: decoque ad vini consumptionem; Exprimantur fortiter & colentur, iniciatur colatura in aurem. *Petrus Forestus, Schol. observ. 10. lib. 22. De Aurium Morbis.*

24. Millepedum num. 30. laventur & bulliani in ℥ii. olei amygd. amar. & ℥iv. aceti optimi usque ad aceti consumptionem; facta diligenti expressione, colatura fervetur ad usum, vesperi guttam unam tepide auri instillet, deinde bombacem moschum redolentem auri imponat. *Ioh. Baptistæ Montanus. Apendice ad consil. xi.*

Suffumigia hic probantur, quæ quamvis plura esse possunt, ego seligo illud quod fit ex absinthio, in aceto & aqua salita decocto, ea tamen ratione, ut fumus per cannulam in aures excipiat. Aqua theriacalis instillata in usu esse solet, ut & medicamentum quod paratur ex ovis formicarum cum succo cepæ contritis, cum sit unà auditus diminutus. *Iul. Casar Claudinus, consult. 138.*

Hoc medicamentum est præstantissimum.

24. Hellebor. alb. castor. an. ℥ii. costi; ℥ss. rutæ, ℥ii. amygd. amar. ℥i. euphorb. ℥ss. coq. omnia lento igne in duplici vase, colentur, & tepide auri instillantur. *Hellidens de Paduanis, consil. 63. lib. 6. consil. Cratonis & aliorum Medicorum, à Laurentio Scholtzjo editorum.*

In tinnitu, sonitu & sibilo, multum præ-



præstat panis recens coctus, statim ex clibano sumptus, & inferiore crusta ablata: immissoque spiritu vini bono, si ad aurem applicetur, ut vapor ille intro recipi possit. *Ioh. Hartmannus. Prax. Chimiatri.*

In tinnitu aurium sufficit abstinere à cœna & potu serotino, & in lecti introitu cochlear unum carvi aceto decocti & exsiccati, vel ejus defectu tantundem anisi vel coriandri conditi, quibus sumptis, nihil vel parum superbibatur & sit vinum bene lymphatum. *Arnoldus Villanovanus. Practica summaria cap. 2.*

## S E C T I O XLVII.

*Pro Aurium fluxu.*

**I**N fluxu aurium perpetuo, inque colluvie, laudatur urina puerorum destillata immissaque in aurem ad guttas aliquot usque ad x. Relinquitur immissa urina aliquandiu (mane quotidie jejuno ventriculo) postea inclinato capite denuo emittitur. In hoc casu necessariae sunt purgationes capitibus. Detur præterea decoctum Guajaci pro potu. In Pueris, qui propter humiditatem potissimum huic morbo obnoxii, non deproperandum ad curam, sed malum ætati crescenti relinquendum. *Ioh. Hertmannus. Prax. Chimiatri.*

## MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER SECUNDUS.

*De Affectibus à litera B incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

*De Bubone.*

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Bubone pestifero.*

**U**bo in genere est inflammatio glandularum sub axillis, & in inguinibus cum dolore, tumore subduro, calore, rubore & febre. Ortum habet à sanguine in glandulis supra dictis effuso, qui tamen semper humorem aliquem vitiosum, naturam ad excretionem stimulantem, conjunctum habet. Ejus variae sunt differentiae, alius est benignus, cujus causam hactenus recensuimus, alius malignus, qui rursus pro materiae malignae varietate, pestilens vel venereus. De quibus infra.

**I**N Bubonibus pestiferis evapora mādente stupa ex decocto flor. Chamæmill. melilot. fol. malva scabios. morsus diaboli. Tandem opoponax, ex aceto coquatur, ut solvatur, ac setaceo transmittatur, & cum oleo laterino iterum coque ad mellaginem, inde fit Emplastrum, Vel.

℞. Consolidam maj. & scabiosam, adde ficus detractis pelliculis externis, cum rad. Liliorum bis ex aqua coctis ac croco adjecto. F. Emplastrum. Apertum Ulcus purgetur succo nicotianæ & senecionis, card. ben. & pimpinellæ. *Ioh. Heurnius, ad Aphor. Hippocr. 15. sect. 4*

Pro



Pro Bubone pestilentiali juvat hoc Emplastrum.

24. Gum. Galban. aceto dissoluti, empl. diachil. cum gummi & oxycroc. an. ℥ii. M. sepe ab ipso principio usque ad perfectam suppurationem hoc solum Emplastr. imposuimus: quod omnibus intentionibus satisfaciebat, eoque solo tumores non raro ad integram sanationem perveniebant. *Isbrandus Diembroeck lib. 3. De peste cap. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### De Bubone exitiali.

**I**N quodam Peste infecto habebat Bubo in circuitu circulum quendam diversi coloris, ut Iris in cælo spectatur, quod signum evidens erat mortis. Id enim in hac Peste *Delphensi* quotidiana experientia constabat, quibuscunque Bubo vel Anthrax cum tali circulo appareret, tales fere omnes moriebantur. *Petrus Forestus, Observ. 20. lib. 6. De Febris Epidemicis.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Bubone.

**I**Uveni cuidam 15. annorum Bubo & Apostema enatum erat sub alis sine febre. perunxi mane & vesperi oleo nostro Sulphuris; ac desuper applicavi Emplast. Diasulphuris: quibus statim emollicum, maturatum, ruptum mundificatum; & consolidatum, fuit intra decem dies. *Martinus Rulandus, curat. 3. cent. 4.*

Quidam natus annos 9. supra 10. habebat inguinum permagnam inflammationem, cum dolore propter quam ægrè movit pedes, non potuit stare, hunc ita curavi.

24. Pingued. porci lb. i. Absinth. Contus. q. s. m. ac F. pulticula; quam applicabam manè ac vesperi per tres dies, unde tumor emollicus. ac cum dolore diminutus fuit. Post tres dies Bubonem perrupi oleo sulph. & desuper imposui emplastr. diasulphur. ex quorum usu intra quatuor dies rectissime convaluit. Interea dum ambulare cœpit, accepit talem Potionem.

24. Decoct. Senæ ℥iii. Syrup. è Rhabarb.

℥i. M. prò haustu qui magnoperè profuit. *Martinus Rulandus, curat. 23. cent. 8.*

De Sambuco venit in mentem quoddam remedium, quod tibi reticere non debeo, præsertim cum singulari modo aliud agens in scripto libro meo repererim, & certo experimento comprobatum legerim; accipiendi sunt flor. Sambuci, & cum his contundenda eruca, atque fimus columbinus, vel piper. Si Sambucus non sit recens, aliquid aq. Sambuci admiscendum ac fingendum Cataplasma, idque Buboni applicandum, abjiciendum, posteaquam tribus horis jacuerit, in ignem, atque ter repetendum, non ratione carere videtur remedium & autor sanctè affirmat, magno & manifesto successu se eo usum. *Job. Craton. Epistol. ad Camerat. lib. 5. consil. 2. Epist. 2c.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Bubone Pestilenti.

**S**Aphyrus saturato colore cæruleus, & Hyacinthus fulvo colore prægnans, si circum Bubonem pestilentemque escharam in gyrum volvatur per moram, è regione solis vel luminis tractim circumducendo facit, ut idem circulus dein ater fiat, & isthac reliquum virus tanquam per caminum foras exalet. Ego Saphyrum præfero hyacintho, bufones sæpe applicui bubonibus, & escharis tam in pectore, capite, mammillis, quàm alibi, tam in viris quàm mulieribus; & ubique non sine prompto juvamine, & doloris mitigatione, sed nunquam vidi applicatum bufonem tantillum intumuisse. *Job. Helmonitus. Tract. cui titulus, tumulus pestis.*

## SECTIO SECUNDA.

### Pro Bufonibus in ventre genitis.

**F**ilius cujusquam agricolæ ad me consilii causa venit, conquerens de maximis rosionibus & doloribus inferioris ventris, ab aliquo tempore miserè afflictus. Conjeci causam in lumbricos, eaque intentionis, dedi Spec. diaturb. cum rheo div. & ecce à prandio ad me rediens, ranam seu potius



potius bufonem colore subnigro & parvis pustulis refertam ad me tulit: & cum terrena sede, hoc animal simul rejectum & evacuatum esse dixit, verum levamen nullum sentiens, ulteriorem opem imploravit; quare manè rursus sequenti spec. diaturb. cum rheo ðiii. additis troch. alhand. gr. iv. dedi: & adhuc tria non absimilia prioria animalia cum materia foetidissima ejecta fuerunt, patiensque sanitatem recepit pri-

stinam, verisimile videtur rusticum istum vel nescium, seminarium aliquod bufonum aquaticorum hausisse, cujus ratione pedetentim postea principio isto vi caloris actuat, tales species progenitæ fuerunt. *Greg. Horstius, observ. 29. lib. 9.*

*Pinguedine serpentis epota, tres bufones vomitu rejectos fuisse narratur in ephemer. german. curiosis anni 2. observ. 56. pag. 113. cum in cassum cetera exhibita fuissent.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER TERTIUS.

*De Affectibus à litera C incipientibus.*

### SECTIO PRIMA.

*De Cachexia.*



**C**achexia, quæ malus est atque vitiosus corporis habitus, & via quasi ad hydropem, est partium carnosarum, subcutanearumque universi corporis mollior laxiorque constitutio, & quasi inflatio, cum fædo torius cutis colore, vel pallido; vel livido, vel plumbeo. Contrahi solet hoc malum ex alimentis impuris, pravis, & corruptis. Si autem hæc vitio non sunt, ventriculi aut viscerum, vel imbecillitas vel impuritas accusanda. Imbecillitas diminutam concoctionem cruditatemque parit, quæ in habitum corporis, utilioris vice alimentis, delata, quanquam apponi & quandantenus partibus agglutinari potest, tamen iis perfectè non assimilatur, hinc vitiosa, non autem vera & legitima sit nutritio. Impuritas viscerum, vitiosum corruptumque sanguinem, profert, qui demum in singulas partes evehctus, pro dissipata corporis substantia inutiliter reponitur, indebitam sic efficiens nutritionem. Causæ externæ sunt cibi mali succi, crebra belluatio, lucubrationes nimix, nocturnæ vigiliæ, suppressæ evacuationes men-

strum & hæmorrhoidum, nimia sanguinis per vulnera, menses. hæmorrhoides, nares, vel alterius materiæ, ut in diarrhœa & dysenteria longa evacuatio. Carceres & loca subterranea, si quis diu in iis vivere cogatur, veneni haustus & venenati animalis morsus. Ad hunc morbum inducendum faciunt etiam febres diuturnæ, hepatis & Lienis obstructions pertinaces, tumores duri & scirrosi. Corripiuntur maxime hoc malo senes, ob imbecillitatem caloris nativi, & mulieres ob retentionem mensium; sicut & pueri ob ingluviem, ac voracitatem. Cachexia etiam aliquando originem habet ex renum ulcere in calculosis, quando purulenta materia propter ureterum obstructionem, in renes regurgitans, & sanguinem inficiens, totum corporis habitum inquinat.

### SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Cachexia.*

**C**olore ex luteo fusco deformata erat mulier quædam, cum compressionis circa præcordia (ut cachectici solent) dolore.



lore, imprimis verò de summa imbecillitate membrorum conquerebatur, urinæ crudæ & albæ erant cum me consuleret, obstructions in venis mesaraicis adesse judicavi, vinum hoc illi 9. Maji præscripsi.

℞. Rad. aperit. an. ℥iij. rad. raphan. ℥ss. eort. rad. Sambuc. ℥i. absinth. ℥ss. Chamæpit. ℥ii. summit. Cent. min. sem. fœnicul. an. ℥i. sem. petrosel. ℥ii. fol. Sen. ℥i. agar. ℥ss. Zinzib. ℥i. limatur. Chalib. præpar. instar castanæ. Infunde in vini alb. Mens. i. bibat aliquot matutinis, cum ter bibisset, & nullam operationem sentiret, jussi in postremo haustu dissolvere El. de succo ros. ℥ii. diaphœn. ℥i. syrup. ros. solut. ℥i. bibit bonum haustum & admodum purgata fuit.

Reversa 18. Maji, ordinavi sequens.

℞. Conserv. flor. Cichor. flor. bugl. capil. ven. & rad. apii, an. ℥i. pulv. pellic. stomac. & intestin. gallinæ, ℥i. limitatur. Chalib. præp. ℥ii. cum Syr. de c. rad. F. Electuarium, sumat instar castanæ manè alternis diebus superbibendo ad ℥i. aq. sequentis.

℞. Aq. cent. min. ℥iv. aq. Endiv. ℥iii. misce.

Hiscæ continuatis 2. Junii ad me veniens, urinamque salubri similem ostendens, successum medicamentorum laudabat, utpotè quæ nullam amplius in membris sentiret debilitatem cibumque bene appeteret & concoqueret; faciesque melius colorata, genæque parum rubescerent, etsi fusco colore à natura prædita esset. *Felix Platerus, obs. lib. 3. pag. 603.*

Præterire non possum pulverem meum cachecticum, qui ob felices successus imprimis in infantium cachexia febre lenta comitata; usualis in nostris officinis factus est.

℞. Rad. & sem. pœon. excortic. an. ℥i. ros. rubr. ℥ss. nuc. mosch. parum tost. ℥ii. baccarum lauri parum tostatum. ℥ss. spic. Schænanth. Croci. an. ℥i. pellicul. ventriculi & intestin. gallin. præpar. ℥i. Croci martis aperitiv. ℥i. Cinamom. ℥i. f. omnium pul. tenuissimus, *Felix Platerus, Practis. Tom. 3. lib. 1. cap. 2. pag. 119.*

## SUBSECTIO SECUNDA:

### Pro Cachexia.

℞. S Eri caprin. ℥v. succ. Ireos depur. rat. ℥ss. mellis rosat. ℥vi. Zinzib. gr. v. coq. simul & colatura jejuno ventriculo bibatur. Est hoc medicamentum pro purgandis redundantibus succis in cachexia accomodatum, mihi que valde familiare. Cassia etiam interdum cum hieræ simpl. speciebus utiliter datur; licebit quoque frequenter clysteres iterare, ad cruda excrementa congesta evocanda, *Job. Zecchius consult. 21.*

℞. Rad. Cichor. petrosel. Fœnicul. & Capparum polipod. q. Sem. Cartham. an. ℥ss. hyssop. prassii alb. organ. agrimon. Ceterach. cuscut. adiant. an. M. i. sem. anis. fœnicul. endiv. melonum. an. ℥i. f. decoctio ad ℥xv. in colatura infunde per noctem fol. Sen. mundat. ℥iv. agarici alb. ℥ii. epithym. ℥ss. gingib. ℥ii. bulliant parum manè & fiat expressio in qua dissolve sacchar. alb. ℥bi. paretur Syrupus mediocriter coctus, non clarificatus, capiat quinto aut sexto quoque die ℥ii. pro dosi cum pari portione aq. hordei, aut vini albi, huic dosi quandoque utiliter addetur rhei el. ℥i. Si diebus interjectis alvus non facile descendat, moveantur his pilulis.

℞. Aloes opt. pul. hieræ simpl. rhei el. agar. trochisc. an. ℥i. cum Syrup. absinth. malaxentur simul, & f. massa, capiat pilulas duas aut tres pro dosi hora una ante cibum, quum nec Syrup. nec pilulis utitur conferet vinum absinthii pontici, quod etiam dilutum sic decocto cichorii, aut si id forte fastidiat hoc utetur Electuario, quod & roborandi & præparandi vim obtinet.

℞. Pulv. Electuar. aromat. rosar. maj. & diamargar. frigid. an. ℥ii. ras. ebor. & C. Cerv. an. ℥iii. F. Electuarium; per tabellas ponderis ℥iii. capiat unam mane & per horam ante cœnam. Ventriculus & præcordia hoc foveantur unguento.

℞. Ol. nuc. musch. ol. menthæ ol. absinth. & amygd. amar. an. ℥ss. ceræ parum,



parum, fiat linimentum; ungatur manè & ante cenam; & superponatur scutum ex bombace, victus imperetur euchymus attenuans, & moderate calefaciens: isque non admodum plenas; ne vires imbecillæ copia obruantur: quocirca abstinendum à multis forbitionibus, & ab humidis, ut quæ nimium implent, cruditates geminant, obstantque curationi, maxime verò ab immoderato potu abstinendum: atque si sitis premat, arte fallenda est. *Joannes Fernelius. consil. 33.*

Omnia Cachexiæ felicissimum auxilium est pulvis chacecticus, qui sic fit.

℞. Chalib. præp. partem unam. Cassiæ lign. part. 3. Sacch. albi. part. 4. M. F. pulvis. Ejus tantum, quantum mucrone cultri arripi potest (seu ℥i.) detur ter quotidie, mane jejuno ventriculo, hora tertia vespertina, & ituro cubitum, is enim pulvis solus præmis saltem vel vomitoriis vel purgantibus, aliquando sufficit, *Ioh. Hartmanus, Prax. Chimiæ.*

## SECTIO SECUNDA.

### *Pro Cacoehymia à morbo relicta.*

**I**N omni cacoehymia à morbo relicta hoc pharmaco ferè utor, nam variè flecti potest ad naturam ægrorum, & ad variam materiam morbificam.

℞. Rhab. opt. ℥i. vel ℥ii. vel ℥iſs. agar. rec. troch. ℥ſs. vel ℥i. aut ejus loco fol. Sen. ℥ii. vel ℥iii. Cinamom. ℥i. Zinzib. ℥ſs. vel anisi ℥ſs. macera hæc tota nocte in vini albi, & aq. Endiv. an. ℥iſs. Colat. adde mannæ ℥vi. vel ℥i. Syrup. ros. laxat. ℥i. f. potio, *Ioh. Heurnius, ad Aphor. 9. Sect. 2.*

## SECTIO TERTIA.

### *De Calculo.*

**E**Xistunt in corporibus nostris fodine; non ille quidem ad ædificandum instructæ, sed potius ad diruendam totius corporis fabricam. Nulla est corporis nostri pars, in qua lapides generi nequeant, generatur in capite, in lingua in pulmone in corde, ventriculo, jecore, vesica bila-

*Burnet Page 1.*

ria, liene, intestinis, mesenterio, & utero: at per antonomasiam & catexochen calculi cum dicuntur, in renibus aut vesica generati intelliguntur, quia in his partibus frequentius generantur. Si vesicam calculus obsideat, dicitur affectus *λιθιαις*, si verò renes calculo laborent *νεφρις* appellatur. Calculum definimus, quod sit corpus solidum & durum ex humore terrestri & salso, in renibus potissimum & vesica stupore affectis, in lapidis formam concretum, obstructions & distentiones inferens. Causam materialem (rejecta veterum opinione de calore materiam crassam & visidam exsiccente, indurante & in lapidem convertente) statuo succum lapidescentem, i. e. terrestrem materiam iusta proportionem sali mixtam, efficiens verò spiritum lapidificum succo illi insitum. Succum hunc lapidescentem, qui in omni passim terra invenitur, cum alimento attrahimus; si itaque vel ob contricis vel excreticis facultatis debilitatem, vel ob ejus succi in alimento copiam, omnis in ventriculo secerni & inde expelli non possit, per ductum thoracicum una cum chylo transit in cor, inde cum sanguinem in aortam delatus per arteriam tandem emulgentem pellitur in renes; ubi in minutissimis arteriæ ramulis extremis, aut carne iis proxima hæret, ibidemque continuo sanguinis appulsu rotatus, arenularum formam paulatim induit, quod si renum sensus scabritiæ carum irritatus, stimulum sentiat expellit ocus cum seroso humore arenulas, at quibus flaccidi renes; sensusque obtusi, in iis & generantur arenule, & retinentur, donec unitæ demum in calculos concrecant; qui denique naturam magis stimulando, etiam sui excretionem promovent, eodem modo se habet generatio calculi in vesica. Si enim temperies vesicæ non rectè sese habeat, urina, quæ clara fieri debebat, partibus ejus omnibus exactè mixtis, turbida evadit, & partes terreæ & tartareæ aquosis non exactè permixtæ ad fundum vesicæ subsident, atque ibi vel insita ad coagulationem tendentes, in lapidem coeunt. Calculi causæ antecedentes sunt præter partium affectorum stuporem sive ob-



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Præservatione à calculo & Podagra*

tusum sensum, crapula & cruditates, intempestivus mox à sumpto cibo corporis motus, cibi omnes qui crassum, ac lentum succum præbent, vina immatura austera, nigra, crassa, & dulcia, imprimis mustum, cerevisia recens fœculenta & crassa. Diuturna etiam equitatio, saltus & motus omnis qui fit inclinato dorso, veneris item immoderatus usus. Huc etiam pertinet hereditaria ad calculum generandum dispositio. Quod autem lapidosa coagmentatio aliis potius fiat in renibus, aliis in vesica, causa est, robur vel debilitas harum partium, quibus renes debiliores facilius in nephritidem incidunt, quibus hi validiores, potius vesicæ calculo corripuntur, pueri frequentius vesicæ, seniores renum calculo laborant.

Calculi renalis signa sunt 1. dolor circa lumbos fixus 2. urina plerumque cruda tenuis, & aquea ob obstructionem, aliquando cruenta ubi se movere incipit calculus, & angustiam papillarium processum perumpens carnem dilatat 3. torpor cruris è directo 4. dolor testis ejus lateris in quo nephritis, ejusque sursum retractio 5. nausea & tanta ventriculi subversio, ut omnem fastidiant cibum, & injectum statim eructent.

Lapidis vesicæ signa propria sunt 1. Mictio crebra adeo ut tandem assiduò meendum sit, vixque possit urina cohiberi. 2. Urinæ suppressio obviam quidam impulsio calculo 3. tenesmus, quod vesicæ cervici consentiat anus. 4. dolor aliàs universum pudendi ductum, alias glandem solam affligens, isque acerrimus sub emissiones finem, cum calculus urinæ cursu incitatus, quasi proditurus Sphincterem violentius comprimit. 5. Pudendi pruritus & erectio. 6. Sabulosa in urinis subsidencia, per vocem Sabulosa seu *ψαμμοειδὴς* intellige Sabulum crassum, cui veluti terra pinguis sit admixta, hoc est lutosum sive argilosum quid, veluti narium mucus matulæ fundo tenaciter inhærescens, signum sæpè lapidis majoris in vesica concreti pathognomonium.

**T**Oto anno rhabarbari usum familiarem sibi proponat, ita ut saltem ter in mense assumat ex eo ad ℥ij. vel ℥i. sive mandendo & deglutiendo absque alterius rei commistione, sive permiscendo vel cum saccharo rosato vel cum passulis. Assiduus usus sacchari rosati in præservandi ratione præ ceteris omnibus mihi summoperè probatur, vix enim quicquam magis salutare à nobis excogitari potest, & quod sine ullo nocumento, aut perturbatione, omnes corporis partes juvet, præcipuè autem renes. Hoc salutare auxilium ita est temperatum, ut si latiores facti sint renes, ad convenientem naturæ suæ statum illos deducat quod si obstructi sint & pleni, abstergat; si incaluerint, refrigeret, ventriculum autem ab omnibus excrementis, præ ceteris mundum reddit ac roborat; ipsam quoque abigit destillationem, maximè igitur mihi probaretur, si quotidie manè per horam unam ante prandium mediam ejus unciam sumeret. Consultum etiam mihi videtur, si aliquando ut bis aut ter in mense ℥i. aut ℥ss. opt. rhei illi adiungeretur. *Joh. Baptista Montanus, Consil. 267. & 268.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Calculo Renum.*

**S**I pertinax adsit dolor, manè & vespere tribus horis ante cibum hoc decoctum sumet.

℥j. Juris pulli lb. ii. rad. alth. ℥i. fol. malv. M. i. gran alkekengi numero x. Cicer. rubr. gr. xx. Cinam. crass. contusi. ℥ss. M. bulliant ad dimidium & colentur. in colatura dissolve ol. amygd. d. rec. & sacchar. opt. an. ℥i. totum bibat calide. *Joh. Baptista Montanus, Consil. 272.*

Viro quodam sexagenario calculo renum laboranti persuasi, ut Clysterem sumeret quod, nisi doloris vehementia illum urisisset, nunquam fecisset.

℥j. Rad. alth. ℥ii. petrosel. fœnicul. an. ℥i. fol. malv. viol. pariet. an. M. i. flor. Camæm. melilot. Sambuci. an. p. i. sem. Lini, fœnu-  
græc.



græc. an. ʒi. Sem. carvi ʒʒ. f. decoctio. in colat. ʒbi. dissolve bened. Laxat. ʒii. cass. cum Senna ʒiij. ol. Chamæm. ʒiʒ. ol. scorp. ʒʒ. mell. viol. ʒi. f. Clyster.

Hoc injecto melius habuit, eo verò reddito, dolor circa inguina urgebat, è quo calculum descendisse judicavi. Jussi regione inguinum ol. Chamæm. inungere, infessionem postea ordinavi ex decocto malv. viol. & Chamæm. ex quo levamen sensit, versus noctem dedi narcoticum, benè dormivit, manè rediit dolor; jussi repetere balneum post cujus usum calculum ejecit, liberatusque est.

Recidivam passus sequens ordinavi.

ʒʒ. Rad. liquirit. ʒi. rad. ononid. scenic. an. ʒʒ. polipod. ʒvi. sem. anisi ʒii. alkekeng. ʒi. passul. numero x. prunorum vulgar. numero v. Sen. ʒʒ. f. decoctio in colat. ʒiv. dissolv. cass. rec. extract. syr. rosat. solut. cum rheo an. ʒʒ. M. bibat dejecit, non remittente dolore, Clyster, denuo bis est injectus, infessione quoque iterum usus est julepum postea hunc præscripsi.

ʒʒ. Aq. parietar. ʒi. aq. scenic. flor. fabarum, iulepi rosac. an. ʒʒ. capiat una vice, inde convaluit: imperavi postea ut deinceps decoctum cicer. rad. petrosel. cortic. fabarum, & rad. ononid. in jusculo manè frequenter, præservationis gratia biberet. *Felix Platerus. observ. lib. 2. pag. 465.*

Quidam sequentium usu sæpius calculum mictione eiecit, iisque ad præcautionem, ne subsisteret, doloremque nephriticum induceret, utebatur, pulverem sequem bis in septimana cochlearis unius quantitate sumebat.

ʒʒ. Rad. liquirit. ʒʒ. nucleorum persic. sic. ʒi. semin. anis. scenic. an. ʒii. sem. alkekengi. ʒi. sem. milii solis. ʒʒ. lapill. Cancr. ʒii. sacchar. cand. ʒʒ. M. F. pulvis tenuissimus.

Superbibat interdum decoctum cicer. rubr. petroselin. cortic. fabarum addito butyro rec. & paucò sale. Pilulas sequentes deglutivit interdum.

ʒʒ. Resin. laric. vel abicien. limpidæ quæ volens, subigatur pulvere liquirit. & sacch. candi. F. pasta ex qua parvæ formentur pilulæ, capiat ad ʒi. vel plus. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 467.*

Syrupus ad renum calculum frangen-

dum, si tamen non fuerit confirmatus, sed friabilis extiterit, ad arenulas etiam expurgandas, detergendas, detergendos renes & vesicam, & ad suppressam urinam, sic fiat.

ʒʒ. Rad. Saxifrag. rusci, levistici, eryngii, ononid. alth. scenic. petroselin. graminis an. ʒʒ. raphan. sylvestris. ʒii. fol. beton. pimpinell. cumarum absinth. urtic. puleg. nasturt. calamenth. polygoni minor. helxines. an. M. i. halicacab. numero xx. sebesten. numero xv. cortic. rad. Lauri. ʒiii. em. ocymi, bardanæ, petrosel. seseleos, daucimilii solis an. ʒi. uvarum passul. liquirit. an. ʒvi. capill. ven. polytrich. an. M. i coq. in aq. capill. ven. ʒbx. in duplici vase donec viri super sint, & cum Sacch. finis. ʒiiv. & mell. despumati ʒbii. F. Syrupus perfecte coctus & aromatizatus ʒi. Cinamomi, & ʒʒ. nucis mosch. curavi usu huius Syrupi fere sexcentos à calculo renum. Modus utendi est, ut præmissis universalibus, dentur ʒiii. cum ʒvi. decoctionis rad. eryngii & cardui stellati flore purpureo, factæ in duplici vase ex aq. graminis, continuetque diebus 15. hora ante prandium quinta. Hactenus non inveni aliquem, qui ex hoc decocto cum Syrupo superscripto non fuerit præservatus. *Horatius Augenius. Tom. 1. Epist. & cons. lib. 12. Epist. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Calculo Renum.

**N**ihil æque (ut longa experientia experti sumus) in calculosis alvo existente duriore vel obstructa, confert quàm statim Clysterem iniicere. Imò hoc adeo aliquando iuvare comperimus, ut aliis medicamentis non opus sit, quemadmodum, evenit cuidam dominæ Abbatissæ quæ cum frequenter dolore nephritico admodum vehementi ex calculo renum afficeretur, & semel dolore affligenter ex Medici cuiusdam consilio infusum rhei & fol. Sen. accepisset, unde pessime habuit, me tandem dolore supra modum aucto, vocavit, statim proposui ut enema anodynum & emolles iniiceretur, quo injecto, omnis dolor miraculi instar evanuit, talis erat Clyster.



℞. Rad. malv. cum foliis, M. ii. rad. alth. ℥i. fol. mercurial. parietar. betæ, caul. rubr. an. Mj. flor. Chamæm. melilot. sumit. aneth. an. pi. sem. lini, fenugrac. an. ℥ij. sem. anis. fœnic. an. ℥i. F. decoctio in Colat. ℥xii. dissolv. Cassiæ rec. extract. diacathol. an. ℥ß. bened. Kaxat. ℥ij. vitell. unius ovi ol. amygd. d. Chamæm. anæth. an. ℥i. Salis. ℥i. M. F. Clyster. *Petrus Forestus, observ. 22. lib. 24. De Renum morbis.*

Mitigato dolore & repurgatis primis viis, ea quæ calculum protruderent & expellerent dedi hunc modum.

℞. Sem. Milii solis petrosel. macedon. & communis, sem. saxifrag. & chærefol. an. ℥ß. sanguin. hirci præp. ℥i. succ. liquirit. ℥ij. trochisc. alkekeng. sine opio ℥ß. terehinth. lotæ in aq. fœnicul. & apii, deinde parum tostæ ℥ij. F. pilulæ admodum exiguæ ex ℥i. quibus multa fragmenta lapillorum & arenularum expellebat. *Petrus Forestus, observ. 19. lib. 24.*

## SECTIO QUARTA

### *Pro Calculo Renum cum Urina retentione.*

**I**Njectus est Clyster emolliens & dolorem sedans, deinde hic fœtus præscriptus est.

℞. Rad. Alth. mund. ℥iv. fol. malv. parietar. Chærefol. flor. Chamæm. melilot. an. M. iv. sem. lini, ℥i. sem. malvæ Petrosel. an. ℥i. F. decoctio in aqua, incisis prius incidendis; & contusis contundendis pro ℥biiij. pro fœtu. Reliquiæ deinde pistentur, & duobus sacculis quadratis includantur, qui post fœtum calidè alternatim lumbis, inguinibus & pectini applicentur, quibus dolor multum mitigabatur, & lotum fluere cepit. Præscripsi tunc ut ex hoc decocto fumeret ad libitum.

℞. Rad. ononid. fœnicul. petrosel. liquirit. ras. an. ℥ß. sem. alth. malv. an. ℥i. ciciter. rub. ℥i. sem. 4. frigid. maj. an. ℥i. cum ping. numer. 4. Sebest. n. 3. hord. mund. ℥i. gran. alkekeng. num. 7. F. decoctio in colat. ℥bi. dissolv. Syrup. de Limonibus de quinque rad. an. ℥i. F. apozema, cujus usu calculos red-

debat sed exiguos. Deinde ut calculos melius expelleret, & ipsi magis comminuerentur, dedi cochlear unum atque alterum nostræ destillationis contra calculum, quæ fit ex rad. oninod. & raphan. Sylvestris cum vino Rhenano in Bal. M. destillatis. Dabam ℥i. provi- ce cum ℥ß. ocul. cancr. pulveris. & ut adhuc viæ laxiores fierent, imperavi quoque ut renes & oblique ad inguina descendendo pectinem inungeret hoc unguento.

℞. Ol. Lil. alborum, amygd. amar. an. ℥ß. pingued. gallin. capon. an. ℥iij. unguenti de alth. ℥ii. M.

Postea ut renes magis purgarentur, & viæ urinales, exhibui hunc bolum.

℞. Cassiæ rec. extract. ℥i. sem. anis. pulv. ℥i. Sacchar. Candi. asperso. F. bolus.

Si dolor adhuc rediret, iubebam ut flores Chamæm. decoqueret in cerevisia, & ex ea cyatum fumeret.

Deinde uno aut altero interposito die sumpsit & hunc pulverem.

℞. Pulv. spec. iustini ℥ii. ocul. cancr. ℥ß. F. pulvis, detur cum cyatho uno decoct. infra scriptæ, de qua etiam absque pulvere aliquando fumebat.

℞. Rad. alth. ononid. petrosel. fœnicul. lappæ, apii, an. ℥ß. agrimon. parietar. chærefol. capill. ven. polytrich. an. Mj. flor. rosmar. chamæm. an. pi. sem. anis. fœnicul. carvi, ammeos, dauci (nam valde ventositatibus homo crassus & obesus erat obnoxius) an. ℥i. sem. petrosel. ℥i. sem. malv. ℥ß. iuiub. subest. an. num. 4. gran. alkekengi, num. 6. F. decoctio in aq. communi & vin. rhenano, an. p. aq. ad ℥bi. coletur, clarificetur, prius cum saccharo albis. condulcorato ad saporem delectabiliorem, cum ℥ii. cinamom elect. F. claretum. Multos calculos ad magnitudinem parvi pisii, & cicerum modò citrinos, modò subrutos expellebat: iisquæ expulsi eo tempore convaluit. *Petrus Forestus, observ. 23. lib. 24.*

Hedera terrestris infusa in aqua vitæ eam efficacem reddit ad calculos pellendos, estque singulare quorundam experimentum.

Vini acidi largo potu se quidam inebrias urinamque etsi micturiret, quandiu ferre poterat, retinens tandemque impe-



tu quodam reddens, hac ratione calculos retentos in ureteribus, cumque affligentes, propellebat, saepeque emingebat: sic & alius urbis nostræ civis, largiore potu vini diuretici calculos ex ureteribus propellens 3℔. ponderis saepe per urinas reddidit, quorum multos, hoc remedii genere, sine magnis cruciatibus excretos, mihi monstravit. Succus Limonum ad 3i. per se, addito ad gratiam, si quis velit, saccharo, propinatus plurimum efficit, vel si cum vini malvatici aut alterius efficacis haustu ad 3 iij. aliove convenienti bibatur. *Felix Platerus. Prax. Med. tom. 2. cap. 12. pag. 499.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Calculo Renum,*

**Q**Uum calculo renum laboraret mulier quædam dum intolerabili dolore, ob retenta urinam vocatus ego in auxilium, hæc subsequencia remedia adhibeo.

24. Parietar. virid. Miv. cum butyro rerenti & oleo anethino, & exiguo scorpionis adjecto, Cataplasma fiat. Cylstere prius immisso, pectini apponebatur, continuo bibebat ex d. cocto sequenti.

24. Sem. malv. alch. ad 3iij. cicer. rub. 3iij. carie ping. num. 9. subest. num. 8. sem. 4. frig. d. Maj. an. 3ij. hard. mund. 3i. liquirit. ras. 3vi. F. decoctio in aq. pluvialis 3biv. ad 3ij. Colatura ad libitum utebatur; post cujus usum minxit, & lapillos multos eiecit perfectamque valetudinem consequuta est.

Mulieri cuidam cum me ire non posset, Medici adstantes oculos cancerorum pulverisatos dederunt, & hoc modo utinam provocabant *Petrus Forestus, observ. 25. lib. 24.*

Præcedentibus Clysteribus aliisque lenientibus, dolore etiam mitigato, comminuentia lapidem exhibemus, inter quæ commendatur sanguis hircinus, dosis à ʒi. ad 3i. cum vino dulci coquatur, cum aqua apii. & bibatur. Quomodo autem antiqui sanguinem hirci parabant, vide apud *Aerium, cap. 12. Tetrabibl. 3. sermon. 3.*

Inter alia quæ à tota substantia conducere creduntur, est passerulus quidam inter sepes & murum victum quæritans.

*Burnet. Part 1.*

Troglodites appellatus, qui sale conditus, & in cibo crudus acceptus morbum perfectè sanat, in posterumque generari prohibet *Ætius* etiam hoc ex *Martiano Medico* Aphro efficacissimum scribit. Leporis pellem in ollam conjice, & in furnum demitte, atque ubi iusta fuerit, ut probè conteri posset, acceptam tere, & ex ipsa cochlear unum cum vino jejunis in solii calidæ aquæ infusu præbe. Si vero velis experimentum Pharmaci ipsius accipere, ex eo in vinum conjice, & in vinum item lapidem ex flumine acceptum injice, & contentum per paucas horas sine, & in grumos lapis dissolvetur. Alii leporem totum in ollam novam reponunt optimè clausam, quam in furno tamdiu desiccari permittunt, ut inde pulvis fieri possit. Cujus à ʒi. ad 3ij. cum aliquo diuretico præbent. Atii leporem iugulantes in sua pelle sanguinem reponunt, & eam cum sanguine in furno tamdiu desiccari permittunt, quo inde pulvis fieri possit. Hoc pulvere Medicus *Saracenus* apud *Guainerium* dicitur mirabilia præstitisse, pregnantem leporem iugulabat, deinde lepusculos è ventre extractos, & evisceratos sanguine matris implebat, & in furno, eo modo quo supra dictum est desiccari permittebat, & pulvere inde parato utebatur.

In calculosis magnæ cum utilitate sæpe usus sum decocto Rad. Lappæ & Ononidis, sed & sola radice Lappæ in cervisia decocta Calculosus quidam sibi ipsi lotium provocabat. Quidam terna alii capita decocta mane assumebat: eodem disrupto calculo protinus urina ptofluebat, & dolore levabatur. *Manardus* in aureo petasone, ex mulierculæ cuiusdam consilio, cinerem fabarum cum vino Pictaviensi intar lixivii colabat, cujus duo aut tria cochlearia ad summum fimo columbino paucò immixto potabat, cum ex calculo mingere non posset, idque cum in diluculo sumpsisset in continente minxit, & una lapidum fragmenta cum urina exhibant, referebat adeo vehemens esse medicamentum; ut per totum corpus sudor efflueret, tamen arcanum infallibile est, & ex eo semper mingebat: stercore columbino non solum veteres ad minuendam lapidem usi sunt, & Noetici, teste *Guainerio*, qui



commendat pulverem stercoris palumborum rubeorum, qui prius tamen nutriendi sunt semine lini, aut pane in quo semen feniculi coctum sit; deinde hoc stercus per diem & noctem in aceto infusum, & iterum exsiccatum, & in pulverem redactum, cum cinamomo exhibitum ad Zi. egregiè confert; Vel

℥. Hujus fimi columbini sic parati. Zi. origani ℥ss. sacchar. Ziij. F. pulvis. pro una dosi quocunque modo detur mirabiliter operatur.

Nobilis quidam cum calculo laboraret, & dolor in rene & uretere illum lancinaret, post injectum enema sumpsit oleum amygdalarum d. qui succus Limonis immixtus erat, & pectini apponebat sacculum ex cumino, quibus præfidiis calculus expellebatur. Idem alio tempore cum exiguum nostræ destillationis (de qua supradictum est) prægustasset, miraculi instar calculos una cum lotio reddebat, *Petrus Forestus, Schol. observ. 25. l. 24.*

## SVBSECTIO SEXTA.

### *Pro Calculo Renum.*

**S**ævisimo huic morbo per rectam vietus rationem occurrendum est. Removeatur igitur à mensa ciborum varietas, & cruda quæ delectant cum periculo. Uvas passas majores una cum acinibus comminutas, in prima mensa comedat, vel quod tutissimum est, & in multis magno successu approbatum, aliquot nuces avellanas ad 9. vel 10. per purgatas ante prandium vel cenam comedat, compertissimum enim habemus non paucos sævis cruciatibus calculi die affectos, usu avellenarum liberatos. Ab hoc malo præservat radix eryngii, caro Cynobati cum saccharo in modum Electuarii redacta: Item succus veronicæ cum saccharo spissatus, cui semina viol. admisceantur. Hæc tutissima & usu atque experientia comprobata sunt remedia. Consulo etiam usum Rhei cum carne pasfularum per setaceum cribratarum, vel morsulos è Rhabarbaro. Plurimum enim hepar atque renes juvant, & ventriculum tamen non lædunt, ut etiam roborent,

foris multa adhiberi possunt, sed duo mihi maximè probantur. Primum hoc unguentum.

℥. Succum malyarum, & misc. lento igne cum adipe cuniculi præsertim eo quod ad renes reperitur. Hoc sæpe inungantur lumbi.

Secundo misceatur unguentum rosaceum Mesues cum oleo amygd. amar. & utatur ut prius. Addam laudatum à peritissimis Medicis, cujus usus singulis annis in vindemia est. Accipiantur vinacci præio expressi atque adhuc calentes ex uvis maturioribus & matutinis horis, ac ante cenam dimidium horæ renibus quinque diebus apponantur. Hoc remedium excellentem Medicum authorem habet, & rationi maximè consentaneum est: cum enim in renum affectione à calculo, tenuare atque mollire *Hippocr.* jubet, & vinacci moderato suo calore materiam tenuent substantiam etiam renum molliorem reddant, ut calculi per eam facillimè transeant, & robur astringente facultate addant, sane non video qui ad rectam præservandi rationem in isto usu vinaceorum, nisi immodicè fortè renes sint calidi, desiderari queat. Applicetur etiam parti dolenti hoc Cataplasma, quod refrigeratum statim rursus in sartagine calefiat.

℥. Malv. parietar. virid. an. Mij. raphan. sine radícula, petroselin. cum toto. an. Mj. coq. in f. q. aqu. puræ & additis tribus cepis, ac oleo amygd. d. q. f. F. Cataplasma. Deinde contunde cum oleo Scorpionum amygdal. amar. ad formam emplastri extendatur, ac renibus si dolor est renum, vel vesicæ applicetur, nam calculum frangit atque emollit. In gravi renum dolore & calore hoc Emplastrum ut facilius calculum elidat, prodesse sæpe animadverti.

℥. Cancros numero ix. bulliant in q. f. aq. puræ vel lactis & contendantur, ac rursus coquantur, succusque exprimatur. Eo succo imbuatur panis albi medulla, & additis duobus ovorum vitellis, butyr, rec. & ol. viol. q. f. commisce omnia in mortario, & extendantur in panno lineo, & renibus ac uteribus applicentur.

Intra corpus ad viarum lenitionem & calculi attenuationem, prodest decoctum rad. alth. & petrosel. cum herba Veronicæ ad.



addito melle vel Sacch. vel butyro rec. ve l ol. amygd. d. Decoctum etiam hedræ terrestres cum veronica, ononidis etiam radices optimæ sunt, ad Balnea autem & infusus nequaquam deveniendum, nisi ista non contulerint, & corpus fuerit clysteribus vacuatum; tunc enim si graviter in viis impactus calculus hæreat, nec prædictis remediis cedat, iis locus esse posset. *Iob. Crato. Consil. 17. lib. 5.*

## SVBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Calculo Renum ad Marchionem quendam.*

**R**emedia pauca, tuta tamen, & usu in multis salutaria comperta præscripturus sum. Lenita prius decenter alvo, alterius diebus, vel aliquoties tantum singulis septimanis Syrup. de succis 2. vel 3. cochlearia manè assumat. Ita fit.

℥. Succ. Veronic. ℥ss. heder. terrest. portulac. ℥ss. (forte ℥ss.) exprime ex herbis iridibus prius vino lotis, & coque lento igne: ubi resederint post coctionem, adde Sacchar. qu. s. f. Syrupus commiscendo Spec. aromat. rosat. ℥i. quod ad localia attinet, in dolore renali plurimum Emplastrum hoc conferre usu comperi.

℥. Caner. numero XII. Coq. in aq. simplicis, & contunde, postea exprime, imbuatur eo panis albus, adde vitell. ovor. numero v. ol. amygd. d. & scorpion. an. ℥iii. M. & fiat Emplastrum quod regioni renum applicetur.

Cataplasma è parietaria ureteribus & vesicæ apponendum hoc modo facio.

℥. Parietar. M. iv. coq. in f. q. ole. amygd. d. & adde Cepas sub cineribus coctas, numero 3. ol. Scorpion. ℥ss. M. Hoc mirificè dolores sedari & calculum elidi magno (beneficio Dei) successu comperi. Urgentibus doloribus bibat hoc decoctum.

℥. Rad. alth. ℥ii. passul. mij. ℥iii. fol. veronic. heder. terrest. an. pj. f. decoctio in aq. puræ, q. s. & detur bonus haustus cum Saccharo. Solum etiam decoctum rad. alth. ad leniendas vias bibere cum butyro & melle utile est.

Ad subducendam verò materiam valdè probo, usum terebinthinæ Cipriæ coctæ,

sed cum parum aut nihil educat, ad ℥i. ℥i. rhei optimi aqua Cinamomi aliquoties affusi, & pauxillum succi liquirit. admisceri velim, nam quantum rhabarbarum renibus, imprimis verò hepatis & ventriculo in substantia datum prodest, sciunt omnes periti Medici. Exhiberem id ante cœnam. *Iob. Crato. consil. 84. 86. 87. lib. 6.*

Aqua destillata ex urina humana vel tauri, nisi ab hoc abhorreat æger, mirum in modum convenit ad frangendum calculum & ciendas urinas. Ex portulaca succum exprimito, eum resiccatum in catapotia redigito, & ℥i. exhibeto, ad miraculum usque lapidem expellit.

Apozema seu Syrupus ad expurgandas arenulas ex renibus.

℥. Rad. 5. commun. an. ℥ss. rad. Cyper. afar. an. ℥i. rad. bardan. pimpinell. Saxifrag. an. ℥ss. fol. beton. M. j. Agrimon. endiv. Cichor. cum toto an. Mjss. capill. ven. Mss. sem. dauc. ameos, carvi, saxifrag. an. ℥ii. sem. milii folis sem. bardan. & bismalv. an. ℥ss. sem. 4. frigid. maj. an. ℥i. cicer. rubr. pij. flor. genist. pj. flor. cord. an. pij. f. decoctio ad libi. oxymel. scillit. ℥ss. Sacch. q. s. f. Syrupus mediæ decoctionis, aromatizetur cum ℥ii. interioris cinamom. & ℥i. Scænanthi. *Martinum Acacia. consil. 80. lib. 6. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholizio editorum.*

Facta evacuatione statim propinquetur oleum amygd. sic præparatum.

℥. Ol. amygd. d. ℥iii. amar. ℥ii. sacch. alb. duri pulveris ℥ss. M. Si æger propensus esset ad vomitum, oleum minimè exhibeatur: statim enim per vomitum redderatur, sed ejus loco bibantur aquæ è flor. Sambuci ℥iv. aut ℥v. cujus talis est descriptio.

℥. Vini malvat. opt. ac potentis ℥biii. nucleorum perficorum, numero C. cerasorum acerborum, numero CC. flor. Sambuc. rec. albor. sine ramis ℥viii. nuclei crasso modo contundantur; & una cum floribus in vino malvatico infundantur scorsim tamen fiant duæ infusiones, altera cum nucleis, altera cum floribus. Integrum diem duret infusio, deinde S. A. F. destillatio in vitreis organis, aqua collecta in vitro servetur, aut vase vitreato, quod probe obduratum servetur. Hæc aqua repen-



tè diminuit lapillum; ut eum urina excernatur. Præsentaneum etiam remedium est, si in vino malvatico infundantur quatuor aut quinque guttæ ol. vitrioli & bibantur, in iusculo etiam decoctionis petroselinii misceri possunt. Idem præstat raphanus de-  
 rasus in vino albo per aliquot horas infusus, deinde vinum colatum bibatur. Singulare est ad comminuendum lapidem, si radix ononidis pulverisata sumatur. Idem præstat illius aqua destillata, sicut & aqua destillata è floribus fabarum, & agrimonie, & è limonibus incisus. *Hier. Donzelinus. consil. 83. lib. 6. consil. Cratonis & aliorum medicorum à Scholtzio editorum.*

Mulierem curavimus quæ 2. mensium spatio, plusquam 400. calculos excrevit per urinarios meatus, differentis tamen magnitudinis, propinato spiritu vitrioli cum aqua graminis ad aciditatem. *Domitius Panarollus. observ. 34. Pentecoste. 2.*

Nos oleum petroleum naturale non artificiale externè supra renes unctum summopere laudamus, experiantur Medici maximum enim remedium habebunt. *Dom. Panarollus. observ. 2. Pentecoste 2.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### *Pro Calculo Renum ad Abbatem quendam.*

**S**I tibi ætas constans est, & virus firmæ, habitusque corporis non planè longitudine morbi & dolorum acerbitate attritus & dissolutus, omnino tibi autor sum, ut cures internam brachii venam aperiri, ejus nimirum quod è directo respondet magis affecto reni. Eam verò quantitatem demi velim, quæ præsentī medico, consideratis cum judicio rebus omnibus necessaria visa fuerit, paucis deinde intermissis diebus, aperies venam in poplite, aut circa talum alterutrum, si alter ex renibus plus altero laboret; aut venis circa talum in utroque pede apertis, si ex aquo renes sint affecti, sanguinem demes; quarum prior avertit humorem à parte dolente, & evacuat; posterior magis à loco affecto educit: Ex posteriore evacuatione hac, mirum quam soleant morbo hoc laborantes levari, quod ego frequenti experientia cognovi; primumque ex Hippocrate didici:

6. *Epid. Sect. 1. Aphor. 5.* Post hanc sanguinis evacuationem (nisi vehementes dolores præsentēs alia remedia interponere nos cogant) velim corpus evacuari, non una vice, sed reiteratis, idque interpositis diebus, aliquando duobus aut tribus, aut pluribus prout visum fuerit præsentī & curationem administranti, medico, qui hoc ex vitium corporis tui cognitione, & nocentium in corpore humorum multitudine faciliè dignoscet. Præscribo hic in eum usum pulverem solutivum, qui sine detrimento optimè educit eos humores qui solent calculo materiam præbere divertit humores à renibus, eosque expurgat. Estque hic pulvis in Gallia hac multis probatus, qui eo se subindè gravissimis renum item & coli doloribus liberant. Pulvis hic esto.

24. Fol. Sen. ʒij. rhab. opt. ʒʒ. (fortè ʒʒ.) turbith. ʒiʒ. hermodact. ʒij. gr. v. polipod. ʒʒ. cinamom. zinzib. milii folis, saxifr. sem. Genistæ an. ʒi. F. omnium pulv. subtiliss. dof. an. ʒi. ad ʒiʒ in vino albo; etiam in ipsis gravissimis doloribus cum juvamento & tutò exhibui.

Si verò dolor malè & graviter habeat, is hoc modo tolli à me solet, singulis diebus per os velim hanc potionem manè epotari & aliquando vesperi ante cœnam reiterari.

24. Nucleos Persicos num. 14. succ. liquirit. ʒi. lactis sem. frigid. maj. extract. ex aq. malv. vel capill. ven ʒiʒ. vini malvatic. ʒiʒ. mixtis omnibus, contusis nucleis, & dissoluto succo; F. potio, vel hujus loco exhibeatur hic pulvis, quem ego expertissimum habeo.

24. Cineris leporis integri combusti in furno S. A. partem decimam (lepus suffocari debet, ne vel sanguinis gutta ex eo pereat) saxifrag. ʒʒ. bacc. lauri, ʒij. sem. viol. fructus integri lappæ maj. an. ʒi. fol. quercus ʒii. F. pulvis subtiliss. dof. ʒi. in vino albo manè jejuno ventriculo. Verum multo erit efficacior, si sequenti aquarum mistura dissolvatur, quæ hoc modo sit.

24. Aq. ex stercore bovino Majo mense distillatæ, ʒiiv. vini malvatici vel albi potentis, quod per 24. horas raphanos incisos in vase vitreo infuderit ʒii. aq. fragor. destill. ʒi. Succ. aurant. vel limon. ʒiii. M. F. potio aurora.



Ut Palatō gratius sit Medicamentum, admisceri potest paululum Syrup. Capill. ven. Hæc sunt remedia quibus ego in ea dispositione semper sum magno cum successu usus. Exterius applicari debent quæ leniter discutiunt, quæ laxant, quæ dolores mitigant, laudo maximè si dolores vehementes sunt, aliquando balneum aq. dulcis, aliquando infusiones in oleo, aliquando fomenta ex decocto parietar. alth. malv. Chamam. melil. Cap. ven. beton. sem. scœnugræc. lini, Coriandr. scœnicul. & petrosel.

His quædam subiungam paratu facilia, quæ in promptu semper esse possunt, quibus etiam aliàs, hunc morbum perfectè curavi, imprimis maximè laudo usum frequentem nucleorum persicorum, vel si haberi non possunt amygd. amar. Doedendos 10. vel 12. manè in principio prandii, vel paululum ante illud, vinum album imbecille, in exigua quantitate superbibendo. Item probatus est mihi pulvisculus virgæ aureæ vel artemisiæ, vel calam. aromat. ponderè ʒi. in vino albo in aurora exhibitus; sed sit ipsorum frequentior usus. Item accipio radices alth. elotas & exenteratas ut ita dicam, infundo vino albo: deinde stillo, ex aq. destillata propino tempore doloris cyathum dimidium, & iuvantur. Item accipio aliquando columbum iuvenem, de plumo. abscindo caput, pectus integrum cum alis aufero, crura item & coccygis ossa; eiicioque intestina omnia, relinquo solum dorsum ipsum & quod ipsi interius adhæret, & exsicco in furno in cratere ligneo, pulvero, cumque ad ʒi. vel ʒiij. exhibeo in vino albo non sine magna utilitate. Passer troglodites, ferè ab omnibus, licet malè dictus regulus, quocumque modo exhibitus, me experiente, juvat calculosos. *Reinerus Solenander. Conf. 15. Sect. 1.*

ʒi. Liquirit. ras. rec ʒiij. lapid. judaic. ocul. cancr. an. ʒi. sem. milii solis rhab. opt. an. ʒiv. sem. scœnicul. anis. mastich. Cinamom. galang. an. ʒii. Macis, Caryophyll. an. ʒi. gran. junip. ʒii. Mithrid. ʒiij. Conserv. ros. ʒʒ. add. gran. alkekengi deglubator. num. 12. vini malvat. ʒiv. indita in vitrum relinquantur per dies 16. tum coletur, hujus vini capiat manè cochlearia 2. vel 3. aut per se, aut in alio aliquo con-

venienti liquore, ut aqua graminis, alkekengi vel Capill. ven. solet hic liquor calculum à renibus exterminare. *Reinerus Solenander Conf. 11. Sect. 3.*

## SUBSECTIO NONA.

### Pro Calculo Renum.

**P**eracta idonea humorum præparatione, pro arbitrio Medici ordinarii, & secta vena brachii (quod res agatur cum juvene multo sanguine prædito ac succi pleno) ad renum expurgationem paretur sequens medicamentum.

ʒi. 4. Sem. frigid. Mai. an. ʒi. liquirit. ras. ʒi. semen. pimpinell. & ocymin. ʒʒ. petrosel. maced. ʒʒ. nuc. mosch. pulv. aromat. rosat. an. ʒi. Sacchar. albiss. dissolut. in aq. alkekeng. qu. s. f. confectio in tabellulis ponderis ʒij. quarum unam manè capiat tribus horis ante cibum superbibendo aq. ononid. ʒiv. hoc efficacissimum tutissimumque est præsidium ad expurgandos renes, si corpore ante præpurcato tertio quoque die decem dierum spatio, semes in mense ad usum deducatur. Interim hepatis & renum regio extrinsecus hoc fovea refrigerentur.

ʒi. Ol. Viol. rosac. in aceto & aq. rosac. lotorum an. ʒi. mucilag. alth. extractæ in aq. Lactuc. & parietar. ʒvi. ceræ alb. q. s. f. linimentum pro renum & hepatis unctione manè & vesperi.

Licet terebinthinæ usus in hac laborantis constitutione eatenus suspectus sit, quatenus jecoris calore promptè inflammatur, si tamen diureticis minimè calefacientibus misceatur, renes urinarioque meatu expurgat hunc in modum.

ʒi. Cass. cum aq. viol. rec. extract. ʒvi. terebinth. claræ ʒʒ. pul. liquirit. ʒij. M. F. bolus Ex intervallis quibusdam 4. horis ante prandium propinetur. Lenita prius alvo vel pharmaco clementer subducente, vel molli clystere. Clysteriorum enim usus ad supervacanea excrementa à renibus ad alvum detrahenda mirificè confert, quemadmodum & vomitus à coenabis, vel saltem semel in mense, aversionis gratia utilissimus est: sicut & cauterium in altero brachio excitatum.



Ad comminuendum & deturbandum calculum, quæ sequuntur primas obtinent partes.

℥. Lapid. judaic. lyncis an. ℥i. nucl. mespil. ℥β. tragacanth. gummi ceras. & perficor. an. ℥i. terantur omnia & cum terebinth. ℥i. incorporantur, cujus tertiam partem capiat horis 5. ante cibum, deinde statim superbibat ℥vi. jusculi hujus.

℥. Mali citri minutissimas in partes dissecti num. i. sem. bardan. melon. alth. an. ℥β. cicer. rubr. p. iii. rad. liquirit. ℥i. M. & in gallinæ ventrem exenteratum ponantur. Deinde in q. f. aquæ bulliant ad carniū integram cocturnam, & jusculum percolatum sorbendum exhibeatur, ut jam diximus. Omitto nunc Elect. Lythontripum justinum & ducis Nicol. tanquam omnibus nota. Quod si deciduus calculus ut uteribus resisteret, fatus, balnea, secta vena ad malleolos. Sicyæ affixæ à renibus incipiendo, & ad inguina per obliquam illorum positionem procedendo præsentaneo erunt remedio. *Job. Zecchini, consult. 8.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### *Pro Calculo Renum.*

**A**lvum quotidie lubricam natura non operante arte procuret; vel leniente Clystere vel bis nostris usitatis pilulis.

℥. Aloes non lotæ, agar. troch. rei, spec. hieræ an. ℥v. terebinth. igne exsiccant. & in pulv. redactæ ℥iv. cum Syrup. de absinth. pilulæ, ex ejus ℥i. formentur pil. 6. quarum duæ bis vel etiam ter in hebdomada dentur hora una ante cœnam. Omne studium impendat in congrua ciborum & potuum, tum quantitate, tum qualitate, ratione observanda, quod si semel tantum in hebdomada consueti cibi & potus dimidium circumcidere non gravabitur, incredibile auxilium inde sibi comparabit, ut excrementa in renibus aggregata ad intestina invitentur, semel saltem in mense hanc aversionis rationem habebit.

℥. Terebinth. ℥β. pulv. liquirit. q. f. f. bolus quem capiat tribus horis ante cibum.

Ad calculos frangendos & arenulas de-

turbandas non ignobilem locum obtinet nostrum medicamentum pluries felici semper cum successu oblatum & comprobatum quod.

℥. Sem. Melon. mundat. ℥β. ossis dactil. cerasor. mespil. an. ℥i. sem. milii solis, rad. liquirit. gummi cefor. an. ℥β. sem. alth. viol. alb. apii & asparagi an. gr. v. pulv. lepor. Ætii ℥ii. M. omnia & in tenuiss. pulverem redigantur, cujus ℥i. cum juris, cicer. rubr. ℥vi. & butyri rec ℥i. propinetur, horis 5. ante prandium, duobus vel tribus diebus continuis semel in mense, immediatè post ritè præscriptam purgationem. Multa alia in hunc usum administrari solent, nempe oleum amygd. d. & amar. & amygdalæ ipsæ amaræ ante omnem cibum commestæ; aqua etiam ex raphano, limonibus, amygdalis amaris & ononidis radice stillaticia. Nec non etiam limonum succus ad 4 vel 5 uncias cum totidem aquæ ononidis & modico sacchari datus: sed ab hoc medicamento caveant, qui frigido imbecilliorique sunt ventriculo.

Ad refrigerandos & temperandos renes duo remedia efficacissima & tutissima paratuque facillima mihi valde familiaria proponam. Primum frequens usus conserv. ros. & viol. cum santal. rubr. in hunc modum.

℥. Conserv. ros. & viol. an. ℥. iii. santal. rubr. pulv. ℥β. Syrup. viol. ℥ii. M. capiat duabus horis ante cibum, interdum bis in die.

Alterum est aquæ limpidæ, excoctæ, tepidæ 6. vel 7. unciarum mensura ante omnem cibum bis vel saltem semel in die potus, nihil enim adeo renes à recrementis vacuos & temperatos reddit, igneas etenim ipsorum calor aquæ tepore tandem extinguitur, ita ut in posterum calculos procreare non possint. *Job. Zecchini, cons. 17.*

## SECTIO XI.

### *Pro Calculo Renum.*

**T**Oto corpore expurgato sanguineque detracto, medicamenta tum interna, tum externa adhibenda sunt, quæ



quæ meatus laxare, ac renum corpora mollire valent, inter quæ.

24. Ol. amygd. d. rec. ol. amygd. amar. an. ʒiv. vel v. M. & per os jejunio ventriculo exhibeantur vel.

24. Milii folis, saxifrag. Capill. ven. an. Mi. cicer. rubr. contus. pi. rad. erythrodani (i. rubiæ Maj.) & petrosel. an. ʒi. F. decoctio. S. A. in colat. ʒviii. dissolv. terebinth. claræ ʒβ. propinetur horis 4. ante cibum quo etiam tempore, partes dolentes usque ad pectinem oleo Scorpion. & amygd. d. inungantur, dolore adhuc persistente, renum lumborumque regio inungatur infra scripto unguento.

24. Ol. Chamæ. aneth. amygdal. d. & scorpion. an. ʒβ. adip. anser. butyr. rec. an. ʒi. ceræ q. s. f. unguentum. Si adhuc dolor vehementer urgeat ad narcotica veniendum. Clyster quoque utiliter iniicitur tum ad vasa emollienda, tum etiam ad dolores demulcendos; est huiusmodi.

24. Decoctionis rad. & fol. alth. maly. parietar. flor. Chamæ. sem. aneth. apii, petrosel. senecion. ʒix. ol. rutæ. & scorpion. an. ʒiii. butir. ʒii. philon. rom. ʒi. terebinth. eodem decocto calente dissolutæ ʒi. cum vitell. ovi sine sale f. Clister. Post hæc, ut calculus à rene per ureteres in vesicam detrahatur, tota hæc regio calentibus manibus, oleoque Scorpionum inunctis pluries assidue perfricetur; mox Sicyæ sine incisione affigantur sursum à rene affecto incipiendo, & deorsum ad inguina oblique descendendo, quo etiam tempore non quiescere, sed exerceri ex Hippocr. sententia convenit, propterea motus velequo, vel curru, vel quovis alio modo concitator ex usu erit.

Postremò verò danda sunt quæ calculum conterant. Ut.

24. Sem. Bardan. ʒi. fructuum alKeKen gi num. ʒ. rad. scenicul. saxifrag. an. ʒi. bulliant in vini albi ʒviii. ad consumptionem quartæ partis, in colat. adde Sacch. ʒii. Croci gr. v. f. potio summo manè exhibenda simulque illinantur renes sequenti oleo.

24. Parietar. Mii. cepas albas decorticatas num. ʒ. contund. & simul bulliant in ol. Chamæ. Colatum oleum usui

servetur. Ioan. Zecchius, consult. 24.

Vir quidam cum jam duobus pene mensibus renum calculo laboraret, irritis auxiliis, iussit ut inuncta manu cum ol. Liliac. quis secundum ureteres eam deduceret, appositis etiam cucurbitulis supernatem lateris dolentis: intraque tres horas, lapidem satis magnum, ut postmodum apparuit, detrussit in vesicam, sequenti die vino è radice graminis epoto, lapidem eiecit & liberatus est. Hier. Cardanus de curat. admirand. curat. 24.

Hircinum sanguinem frangere in renibus & vesica lapidem tam verum est, quàm meridie solem lucere, quam plurimos enim ejus vi comminimus. Sed & Leporino fit hoc idem Jul. Caesar. Scalliger. Exercit. 344. num. 8.

## SUBSECTIO XII.

### Pro Calculo Renum.

**S** Exagenarius quidam ob reprobum alimentum usum, in calculum renum incidit, hic præter purgationes varias, paratas præsertim ex terebinthina abietina, cujus vi mucilaginosam per alvum pituitam excernebat, usu assiduo aquæ concoctæ cum ligno illo indico, quo aqua cæruleum dilutiorem colorem contrahit, & vocatur à Monardo nephriticum, biennio sanus evasit. Postea exasperato malo, supprimitur omninò urina, adsunt ureterum & renum cruciatus immanes, vocantur de novo Medici: quorum consilio, enematis emollitur alvus, expurgantur excrementa, discutiuntur flatus, ministrantur unguenta, fomenta, & emplastra, superiores & inferiores venæ secantur, ano hirudines admoventur, balneum applicatur oleagineum, lapidem comminuentia auxilia imperantur, omnia licet utilia, citra commodum tamen celebrantur; nam aucta gravitate in lumbis, & per 18. dierum spatium retenta urina, per intervalla jam Epilepsia vexabatur, demum cum nulla essent prætermissa, quæ calculi comminutionem pollicerentur, & æger conclamatus esset, toto corpore tumidus, diroque dolore in illum regione oppressus, ex præ-



Scripto medicorum oleum amygd. d. rec. paratum cum guttulis balsami permixtum lambere cœpit; cujus auxilii ope, aliquantulum recreatus, per sedem viscidum humorem, & per urinam arenulas minutissimas excrevit, & in eodem auxilio persistens, cum urina cruenta, calculum purpureum, oblongum, asperum, durissimum, nucleo dactyli magni similem, excrevit, libereque jam urinam reddens, majorem quantitatem amygdalini usque ad ℥iii. & balsami usque ad ℥ss. assumens. Decem dierum spatio 65. calculos emisit, duos, ciceris forma & magnitudine, tandem restauratis viribus sensim & sine sensu convalescere cœpit. Hujus etiam solius auxilii beneficio in posterum præservatus fuit. Nam jejuno ventriculo amygdalini ℥ss. 6. balsami guttulis permixtam absorbebat; cujus præsidi ope sabulosam urinam excernens in multos annos vitam produxit, magna ergo est balsami pro hoc morbo, & aliis frigidis curandis vitiis vis atque potestas: cujus usu se liberasse virum quendam qui erat in conditione mortis à lapide gloriatur. *Avenzoar. lib. 2. Teizir. Tract. 2. cap. 7.*

Si verum balsamum desit, ejus loco utere stacte, 1. Myrrhæ pretiosissima gutta, vel Orientali, aut eo quod ex Peruvianis insulis afferri solet, quod mirabiles præstare utilitates veterum & juniorum diligentissimi literis commendarunt.

Memini me pluries calculos magnos renum cavo tenaciter impactos: usu stillatitiæ aquæ ex nicotiana viridi extractæ in potum exhibitæ per urinam deturbasse. Si ea desit ejus decocto utere cum utilitate multa. *Zacutus Lusitanus, observ. 66. lib. 2. Prax. Admirand.*

Jam verò summo Dei Opt. Max. beneficio ad nos affertur ex America lapis quidam nobilissimus, & velut gemma, Lapis nephriticus vocatus, qui ita gestatus, ut corpus humanum nudum tangat, tum à paroxismo liberat, tum præservat: quod nos quotidie verissimum esse experimur, quare nephritici, hunc gestabunt, *Hieron. Donzelinus, consil. 83. lib. 6. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Quidam Nobilis Lutetiæ, lapidem

habuit mollem laxum efformatum ad instar mortarii, per quem transcolata aqua & epota mirum in modum juvabat calculosos & urinam suppressam *Jacob. Hollerius. Schol. ad cap. 48. lib. 1. De morbis internis.*

Sexagenarium immunem à renum calculo servavi annos 16 (cui aliqui obnoxius erat largo salis marini usu, quod deinceps in multi confirmavi. *Johan. Helmontius. Tractatu de Lithiasi. cap. 3.*

Consiliarius quidam cum per quindenas singulas soleret miserè calculi dolore decumbere usus deinceps cerevisia dui semen dauci incoctum est, liber à calculo per aliquot annos vixit. Idem *Tractat. de Lithiasi cap. 7.*

In Monasterio prope *Bruxellam* fontes spirant aliquot, qui saxa parieti apponunt, uncinamque & securi frequenter saxa adnata decutiunt. Ibi monachi queruntur se strophas sive tormina pati, nisi semine Dauci cerevisiis in cocto utantur quotidie, odor enim semini dauci, odorem saxatilem dormat & comprimit Idem *Tract. de Lithiasi, cap. 1.*

Baro quidam nostras dum per aliquot anno in sua *Angliæ* Legatione, pluries calculis renum summo cum dolore infestatus fuisset, meque suadente, uteretur bis hebdomadatim liquore Aroph *Paracelsi* (quod sonat Aroma Philosophorum) per 18. deinceps annos à Lithiasi liber. Tandem anno 83. vitæ defungitur, ejusque cadaver dissectum ne arenulam quidem aut Lapillum ostendit. Idem *Tract. de Lithiasi cap. 7.*

Rarissimum diureticum ex lapide cancerorum colligitur etiam vulnerarium ac febrifugum, modo resolvatur in formam pristini lactis: quod quam sit excellens & potens, vix cuiquam quam perito persuaderi potest. *Joh. Helmontius. Tractat. de Lithiasi, cap. 7.*

Calculos imminuunt, frangunt & expellunt quæ sequuntur.

℥℥. Aq. fragar. & Saxifrag. an. ℥vi. vini alb. generosi ℥vi. ol. amygd. d. ℥ii. spirit. vitrioli ℥i. M. pro tribus dosibus. Prima detur calidè quantum ferre potest. Post horas 6. detur secunda pari modo, si etiam hæc inefficax (quod rarò contingit) ter.



tertia propinetur. Paratu facilior sit julepus ex Aqu. Saxifragæ & Syrup. viol. cum spirit. vitrioli gutt. 15. vel 20. Pilulæ sequentes sunt efficacissimæ.

24. Salis prunell. crystal. tartar. salis baccarum hederæ & fol. nasturt. an. pt. æq. cum Syrup. appropriato vel terebinthina F. Massa pilul. de qua capiat ℥i. singulis diebus manè.

Cinis corticum ovorum adustorum à ℥ß. ad ℥i. exhibitus cum vino albo potenter expellit calculum in urinæ meatibus hærentem. Chimici suos sales ad calculorum exclusionem maximè prædicant. Inter quos non infimum locum obtinet sal siliquarum & stipitum fabarum, cujus ℥ß. cum vino albo egregiè operatur. Idem præstat tartarum vitriolatum eadem dosi. Ab iisdem etiam spiritus salis laudatur, illiusque guttas aliquot manè cum jusculo aut alio liquore exhibent. Pro potu utatur æger vino tenui & paucifero, cum decocto rad. Eryngii quod quidem decoctum pro potu ordinario à *Cratone* commendatur, & nos egregios illius vidimus effectus. Sed marinum vulgari multò præstantius est. *Lazarus Riverius, lib. 14. Pract. cap. 1.*

### SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

#### *Pro calculo Renum.*

**I**N Renum obstructione à calculo totali, veletiam ubi ureteres & vesica à calculis in eam regionem detrusis omnino fuerint obstructi, ut ne gutta quidem urinæ prolabi possit, præsentissimum est remedium, si urina hirco recentissima ex vivente adhuc hirco cum vesica extracta potanda detur calidè ad cochlear; unum & omentum cum intestinis statim ventri, pube & peritoneo fuerit applicatum. Sic nimirum calculus repentè confumitur sine læsione vasorum & patiens liberabitur. Convenientius in hoc affectu nihil est, quàm si Mercurius dulcis semel atque iterum iusta dosi exhibeatur; quinimo nephriticus dolor rarò intestare solet eos, qui pilulis mercurialibus singulis mensibus utuntur. Hac nimirum ratione ducus amplificantur, & calculi deinceps

sponte externuntur. Quod si interim specificum ludi humani (i.e. ut opinor calcul. ex humano corpore exsct.) certa sua quantitate assumptum fuerit (quod nempe non tantum calculum renum & vesicæ sed universi corporis tartarum exterminat) minus deinceps nephritici dolores extimescendi fuerint. *Iohann. Hartmanus. Pract. Chimiatri.*

Ad veram duelech. resolutionem liquationemque primatum obtinet ludus *Paracelsi*. Hic nempe est lapis, Saxifragrorum apex & calculosorum desiderium. *Iohann. Helmont. Tract. de Lithiasicap. 7.*

Dissolvitur terebinthina cum vitello ovi, vitello vino *Hispanico* & Syrup. de alth. *Fernelii*, & sic soluta candidat lactis instar, exhibeturque in calculo à Medico quodam percelebri. Sanguis vituli cervini inspissatus & exsiccatus, ℥i. pondere calculum mirificè pellit, experimento certo vel.

24. Malorum Citriorum qu. v. adice quod intus est acidum, reliquum rasum; comminutumque stet in vase vitreo 24. horis.

Postea 24. Expressi ibi. fruct. alkekengi. recent. num. 64. contusa M. & stent iterum 24. horis simul, dein ex vitro distillantur per arenam, ut de ibi. remaneant.

24. Hujus aq. destillat. ℥iii. vini rhenan. Sacchar. cand. pulv. ℥iii. M. hæc est aqua a Lotharingiæ duce missa principi cuidam, tunc secreta & magnantibus in magno usu, & mirabilis in expellendo calculo si corpus prius clystere, vel alio leniente pharmaco purgatum, & ejus 2. vel 3. cochlearia ante prandium & modicam deambulationem sumpta fuerint, *Wolfgangus, Hoeferus. Herc. Med. lib. 3. cap. 4.*

In omnimoda urinæ à calculo suppressione, testæ ovorum calcinatæ ad ℥ii. vel ℥i. assumptæ, omnia reliqua medicamenta præcedunt. Cochenilia tinctorum ex *India Occidentali* in vino *Rhenano* assumpta ad ℥i. mite quidem & suave est medicamentum, sed magnæ efficacæ. *Paulus Barbette. Praxib. libr. 4. capit. 8.*

Post justam emollientium, laxantium, anodynorum, viasque dilatantium tam inter.



internorum quam externorum usurpationem, tum maximè commendatur sequens pulvis cum aqua petroselini aliave specifica exhibitus.

℥. Sem. thlaspi. minim. tartar. vitriol. an. ℥i℥. ocul. cancr. sal stipit. fabarum, genist. ononyd. stercor. Columb. an. ℥℥. M. F. pulvis dosis ad ℥i. imò aliquando ad ℥℥.

℥. Cicer. rubr. hord. mund. an. ℥ii. sem. viol. purpur. papav. alb. urtic. malv. an. ℥℥. ocul. cancr. contus. & in petia ligat. ℥ii. bacc. Junip. ℥i. ficcum ping. numero 9. sebest. numero 7. fruct. alkekeng. numero 4. liquirit. ras. ℥vi. coq. in ℔iii. aqu. communis, in colaturæ ℔ii. dissolve Syrup. papaver. errat de 5. rad. diacnid. an. ℥i℥. Spirit. salis armon. ℥ii. M. de hoc apoze-mate Sexagenarius quidam nephriticus bis terve de die assumens haustulum, instillatis prius guttis ii. balsami sulphuris juniperini, varios excrevit exiguos calculos.

Omni-bus commendamus spirit. salis armoniaci, tanquam specificum cum vino rhenano, spirituvediu-retico: ad præser-vationem, ut & curationem ipsam, uni-versalibus nempe præmissis, usurpatum. *Federicus Deckers. Notis & observ. ad cap. 8. lib. 4. Prax Barbettiana.*

## SUBSECTIO DECIMA QUARTA.

### *Pro Calculo Renum & Vesicæ.*

**I**Nter medicamenta composita lapidem comminuentia, est hoc Electuarium: cujus usus omnem lapidem renum & vesicæ indubitanter frangit, & expellit, imò ab ejus generatione præservat.

℥. Asari polii montani, Chamædr. phu, & mei, rad. asparag. petrosel. apii, dauci, spic. nardi & acori an. ℥i℥. rad. Saxifrag. ℥ii. vitri combust. sang. hirci præpar. lap. Spong. an. ℥℥. cineris leporis totius combusti in olla rudi ℥℥. mellis despumat. ℔ii. Succ. milii solis ℔℥. acet. Scillit. ℥iii. Sacch. rubr. ℔℥. Mell. Sach. Succus & acetum Scillit. omnia simul lento igne coquantur ad succi & aceti consumptionem, & residui inspissationem, & cum infrigidari inceperit, reliqua pulverisata supe-

raddantur, & F. Electuarium, cujus ℥℥. accipiatur diebus continuis manè 5. horis ante cibum. Sumatur cum ℥℥. aq. apii Silvestris, & videbis quod non eris ab ipso deceptus. *Bartholomæus Montagnana. Conf. 182.*

Cum dolor fuerit maximus & intolerabilis multum mitigabitur, si accipiatur duo vel tria cœpæ, & minutim incidantur, & supra tegulam calidam calescant; deinde cum vino albo aspergentur, & supra renes vel peritonæum emplastretur. De virga aurea vidi experimentum in quodam, qui habuit lapidem in vesica, & comedit dictam herbam cum ovis omni mane per 9. dies, & fractus est lapis, & ipse ostendit mihi manum plenam lapillis, & liberatus est. Item nota quod dicit tibi *Theophilus Mercator*, quod habebat in crure ulcus magnum & malignum, & nullo modo curari poterat, & quidam docuit ipsum, ut frondem dictæ herbæ superponeret bis in die manè & serò, & in novem diebus liberatus est. Item nota quod dicit tibi alter, quando intestinum rectum exit, & quis habet dolorem & exitum hæmorrhoidum, quod pulvis virgæ aureæ datus in cibo vel potu citò sanat. Radix linariæ bibita ad ℥i. cum vino & aqua lapidem frangit & expellit. *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 18.*

Quidam calculum confirmatum in renibus habebat, cum intolerabili dolore lumborum, & difficulter mingebat. In hoc curando intentio nostra fuit lapidem fixum, quantum possibile erat, è suo loco movere, viasque emollire & aperire, ac dolorem mitigare. Ideò omnium primo emolliens enema confert, dilatans & dolorem mitigans ac alvum leniens.

℥. Rad. althææ ℥i. fol. alth. viol. parietar. an. M. i. flor. meliloti, chamom. an. p. i. sem. lini, fœnugræc. an. ℥℥. caric. ping. num. 6. sebest. num. 5. sem. 4. frigid. maj. an. ℥i℥. furfur. in linteo ligati p. i. f. decoctio in aqua communi pro ℥x. Adde cassiæ rec. extractæ ℥i. Sacchar. rubr. ℥℥. Butyr. rec. ℥ii. ol. communis & amygdal. d. an. ℥i. salis parum. f. enema; quo clystere duriora excrementa deposuit. Et quia robustus erat, & dolor magnus



vena ex maleolo ut incideretur eodem die post clysteris operationem iussi, & hunc fotum ex anodynis veris, quæ calorem temperatum habent præscripsi.

℥. Rad. alth. cum sol. malv. an. p. r. β. sem. lini & fœnugræc. an. ℥i. decoq. in aq. com. vel melius in hydræleo q. f. & in illo decocto spongia madefacta & expressa regionem renum fovebat. Mox sequenti unguento locus dolens inungatur.

℥. Butyr. rec. ol. amygd. d. axung. gal. lin. anseris an. ℥β. ol. chamomill. anethini an. ℥ii. cæræ parùm. M. dolor parùm mitigabatur. At cum rursus alvum non deponeret, die sequenti clyster denuo injectus est, & dolor nonnihil sedatus est. Tamen lapis adhuc fixus renibus inhærebat: quare cucurbitulas siccas sine scarificatione supra renes affigere iussi, deinde aliam paulò inferius, & rursus aliam atque aliam deinceps, paribus intervallis oblique usque ad inguina, ut sic calculus in vesicam descenderet. Conducunt enim non parùm cucurbitulæ ejusmodi absque incisione adhibitæ, quæ sæpe lapidem celeriter adeò transferunt, ut subitam ejus mali levationem comparare possint, lapide nimirum in locum ampliorem translato, supra à renibus initium facientes, ad inguina per obliquam earundem partium positionem procedentes. Sed prius fotu illo relaxante & emolliente post clysterem tantisper utebamur: & non utebatur cucurbitulis, cum dolor vehementius instaret, sed ipso aliquantulum lenito. Et ita cum fotu continuo dolor mitigatur; tandem etiam, adhibitis cucurbitulis, sentiebat calculos aliquot per ureteres in vesicam descendisse, & cessabat difficultas mingendi. *Petrus Forestus, observ. 21. lib. 24.*

## SUBSECTIO DECIMA QUINTA.

### *Pro Calculo Vesicæ.*

**P**RO atterendo excludendoque calculo.

℥. Decoct. Cicer. rubr. cum rad. Scolopendr. & alth. ℥vi. vini alb. potentis ℥ii. aquæ extillat. ex cepis albis, succi limon. rec. express. an. ℥β. Sacchar. al-

biss. pulv. ℥ii. M. F. potio tribus horis ante cibum exhibenda. Hoc sanè medicamentum nulli fortasse alio in hoc opere cedit, ad idem etiam maximè valet hoc quod.

℥. Terebinth. ignis vel solis vesicataræ & in pulverem redataræ ℥ii. lapid. Judaici, vitri usti sem. genistæ an. ℥i. terebinth. claræ & liquidæ ℥iii. M. F. bolus capiendus 4. horis ante cibum, superbib. ℥iv. aq. Saxifrag. & ℥ii. vini albi cum sacch. albiss. ℥i. Interim illinatur singulis 6. horis pubis & perinæ partes hoc linimento.

℥. Pingued. cunicul. pingued. anser. ol. Scorpion. an. ℥i. succ. parietar. depurat. vini albi potentis an. ℥β. M. F. linimentum, superadditis ℥ii. lapid. Judaici cum prædictis probè subacti.

Sanguis etiam vulpis & hirci calens; tum per fistulam argenteam injectus, tum etiam pubi & peritonæo illitus, maximam vim habet ad calculum atterendum in vesice; modo hic vetustate non obduruerit. Omnium extrinsecus admoventorum efficacissimum erit Lavacrum hujusmodi.

℥. Flor. Chamæ. melilot. aneth. arotan. saxifrag. fol. caulium, senecion. parietar. scolopendr. malvas. alth. rad. petrosel. fœnicul. ononid. viol. an. Miii. sem. lini, milii solis an. ℥ii. fœnugræc. anis. ammeos, an. ℥i. bulliant omnia in q. f. hydrælei, vel aq. dulcis; in qua prius exactè excocta fuerint capita duæ vervecis, & usui servetur pro lavacro; quo cum utitur, si sumpserit hanc positionem mirificè conducturam speramus.

℥. Rad. enul. ℥β. gran. alkekeng ℥ii. Bacc. Juniperin. ℥i. Liquirit. ℥vi. Omnia tusa bulliant in vini alb. ℥ix. ad consumptionem tertiæ partis; colat adde sacchar. finissim. ℥i. F. potio calidè exhibenda. *Johannes Zecchius, consultat. 31.*



## SUBSECTIO DECIMA SEXTA

*Pro Calculo Vesicae.*

**Q**Uoniam Medicamenta lapidem comminuentia, nihil ferme operantur ob lapidis grandioris duritiem, unica Chirurgia superest, quæ cum detrahendo miserum ægotantem à tam gravibus tamque assiduis molestiis à doloribus penè intolerabilibus liberare possit. Sed cum hoc opus maximum sibi junctum habeat periculum, potissimum in fene molliore corpore & Cacoehymia laborante, jure optimo clarissimi viri recusarunt hoc præsidii genus. Sed cum ex gravissimorum virorum decretis, in præcipiti casu magis ex usu sit, ac longe melius, præsidium aliquod generosum, licet anceps, administrare, quàm demittere ægrum mori, omnibus ad ægotantis statum præsentem & futurum attentibus, diligenter summaque opera expensis, in eam venio sententiam, ut ad cervicis vesicæ incisionem deveniretur; parva facta sectione, eo consilio, ut laceratu musculo Sphinctere per vulnus licet parvum admodum, urina perpetuò involuntariè sensim præter laberetur. Hoc enim opere peracto, dolores prorsus cessare solent, ut in nonnullis à me fuit observatum; ac præsertim in Nobilissimo quodam *Savonense*, de *Reariis* annum agente 721. qui deinceps felicem semper duxit vitam. Siquidem in reddenda urina, geminam ob causam, dolores excitabantur, tum quoniam urinae egressuræ impetu calculus quasi proditurus dum dimovetur affectas partes lacerando ingentissimos parit cruciatus; tum etiam quia sub mictionis finem, Sphinctere musculo sese colligente & constringente, in causa est ut subjectæ partes nonnihil ulceratæ à duriore lapide premantur vellicenturque, at nunc utraque doloris causa confertim aperto loco cessat, quando quidem neque urina ibi colligitur, sed sensim continuò educitur, neque commemorati muscoli compressio astrictioque amplius locum habet, modo imposita tenui argentea aut plumbea fistula vulnus apertum asservetur, quasi

in fistulam callosam abeat. Profecto cum ars naturam imitari studet, observaverimque ego non semel in lithiasi affectis, disrupto ea in parte abscessu sponte nato, ob causas jam dictas, dolores molestiasque omnes in urina reddenda cessare, à natura edoctus, opus hoc non potui non semper celebrare: nostrum autem novum hoc consilium, qualecunque fuerit, si apud aliquem authorem modernum hujus ætatis reperias, scias velim id totum à me accepisse. *Johannes Zecchius, consult. 58.*

De ista inventione medicandi calculosis senibus gloriatur *Zecchius* in *consultat.* sed longè antè natum *Zecchium*, tali curatione palliativa utebantur Medici *Parisienses*, jam à centum annis usitata. *Joh. Riolanus. Enchirid. Anatom. lib. 2. cap. 30.*

## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

*Pro Calculo Vesicae incipiente in puero quinque annorum.*

**I**N consilium adhibitus, hoc modo cum ipso processu. 1. Institui optimam victus rationem, nimirum ut aer sit calidus, panis benè fermentatus & coctus, non recens, neque nimis durus. Jusculis utatur carniū castratorum, pullorum, gallinarum, aut caponum, quibus aliquid roris marini, salviæ, & majoran. nonnihilque salis ratione saporis addi poterit, radices fœnicul. petrosel. & quæcunque urinam insigniter movent, cibis minimè addantur, dum enim urinam movent, succum indigestum simul ad venas mesaraicas ac hepar secum ducunt. Ex quibus obstructions viscerum, & materia calculosa augetur. Viscidi glutinosi, crassi, & qui difficilis sunt digestionis cibi nullo modo sunt offerendi, uti nec falsi, & qui pipere, zinzibere, caryophyllis, raphano, cepis & ejusmodi rebus conditi sunt cibi. Legumina quoque oriza, fructus crudi, pisces, caseus, lac & lacte confecta edulia summopere vitanda. Vino utatur albo & tenui decoct. agrimon. & veronicæ diluto. *Postea*



ſtea corpus ſequenti portiuncula expurgavi.

℞. Rad. ſœnic. petroſel. eryng. marin. an. ℥℥. fol. agrimon. veron. cuſcut. an. M℥. ſem. anif. ℥i. coq. in aq. ad conſumptionem tertiæ partis in colat. ℥ii. diſſolv. Syrup. roſ. compoſ. cum rhab. agar. & ſen. ℥℥. electua. diacartham. ℥℥. M. F. potiuncula ſumenda quatuor horis ante prandium.

Purgato corpore ſequentem præſcripti Syrupum magiſtralem, de quo ſingulis diebus duabus horis ante prandium excochleari ſumebat ℥i. obſervata interim optima victus ratione, & per intervalla expurgato corpore, nunc præſcripta potiuncula, nunc pulver. rads mechoac. ℥ii. ſumptis cum juſculo carniū. Syrupi autem hæc eſt deſcriptio.

℞. Rad. ſœnic. petroſel. gramin. ſaxifrag. eryng. marin. an. ℥i. fol. agrimon. veron. herniar. capill. ven. cuſcut. an. Mi. fl. 3. cordial. genift. & fl. chamæm. an. p. i. ſem. milii ſolis biſmalv. anif. & ſem. 4. frigid. mai. an. ℥ii. liquirit. raſ. & uvarum paſſul. exacinat. an. ℥ii. F. decoctio ad conſumpt. tertiæ partis, adde ſacch. miſcellan. lb i℥. mell. puri & deſpumati lb℥. F. S. A. Syrupus, aromatizetur pulv. Cinamom. elect. ℥ii.

Per menses quoque aliquot ſequenti ſemicupio ex rad. herb. & ſem. emollientibus laxantibus, lenientibus & flatus diſcutientibus per intervalla utebatur.

℞. Rad. & fol. alth. rad. & fol. malv. rad. ſœnicul. petroſel. eryng. marin. an. ℥ii. herb. parietar. viol. veronic. flor. chamæm. melil. genift. ſambuc. an. M. i. ſem. ſœnugræc. lini, an. ℥i. ſem. petroſel. anif. ſœnicul. genift. an. ℥ii. coq. in q. ſ. aquæ pro ſemicupio. Ex ſimili quoque decocto, quotieſcunque alvus non reſpondebat, addito vitello ovi, parumque electu bened. laxativ. & ol. rutæ. enemata præparavimus & exhibuimus.

Imum ventris & peritone non ei ſolum balneo egreſſo, verum etiam ſingulis diebus ſemel aut bis ſequenti unguento inunximus.

℞. Ol. Scorpion. amygdal. amar. an. ℥i. ol. Lil. alb. & ung. dialth. an. ℥℥. M. fiat unguentum.

*Burnet Parte I.*

His adhibitis remediis Dei ſingulari beneficio, paulatim convaluit, neque poſt-hac ullum mali hujus veſtigium ſenſit. *Guill. Fabrit. Hildanus, obſerv. 71. cent. 3.*

## SUBSECTIO DECIMA OCTAVA.

### *Pro Calculo Vesicæ.*

**M**ulta uſurpavit remedia toto anno per intervalla, ac tandem calculum excrevit nucis avellanæ magnitudinem æquantem, ſed figuræ oblongæ olivam referentis: at verò tanta difficultate ferebatur per virgæ canalem ut intra 35. tantum horas à veſicæ oriſicio ad balani radicem pervenerit, ubi meatum anguſtiores inveniens, nullo modo eum pervadere potuit, atque adeo neceſſum fuerit balani incifione illum extrahere, quæ in parte inferiori, propè frænū celebrata eſt. Remedia quibus præcipue calculi excluſio adſcribitur, talia fuere.

Post evacuationes univerſales, uſus eſt per mēſe integrum pilulis ex ſalibus bacc. hederæ & naſturt. aquat. cryſtallo, tartari & minerali part. æqualibus cum terebinth. in maſſam pilull. redactis. De qua ſumebat ℥i. manè ſingulis diebus. Poſtea verò per novem dies ſumpſit aquæ ceparum albar. in vino albo deſtillatarum ℥iii. cui addebatur ſal. ex capite mortuo elicited, & nono die prædicti calculi excretio contigit. *Lazarus Riverius. obſerv. 14. cent. 4.*

Puero Mercatoris cujuſdam 7. annorum calculo veſicæ laboranti, Lithotomus *Italus* ſine ſeſtione lapidem eximere volens, digitum ſiniſtræ manus medium butyro inunctum in podicem immiſit (quæ ratio calculum inveniendi omnium eſt optima & tutiſſima) ac dextra manu ventrem inferiorem in regione peſtiniſ premens, digitoque podici intruſo calculum propellens, vi illum ex veſicæ in cervicem illius impulit: ubi cum ob magnitudinem ſubſiſteret, & tactu ſupra podicem deprehenderetur, illic ſeſtione facta ſupra lapidem, cochleari ferro mox exemit, qui ſi minor fuiſſet, per meatum penis facile exprimi vel exugi potuiſſet. *Felix Platerus, obſerv. lib. 3. pag. 894.*



*Barto. Turrianus in Jatro. 6. lib. 4.* Vesicæ calculum jam sectioni destinatum fregit propinato pulvere Cryſtalli, vel potius ſubſtantia ejuſdem reſolubili. Fit autem Cryſtallus ſolubilis, ſi vel minimum novies in fornace figuli calcinetur, tunc abit in friabilem ſubſtantiam, & in cella poſitus liqueſcit, olei tartari inſtar, bel lapis Cryſtalli ignitus ſepties extinguitur in aq. vel ſpiritu urticæ minoris.

Vesicæ calculus comminuitur Emplaſtro excepa alba cocta, peſtini impoſito teſte *Joh. Pravotio Med. Patavino. Schroderus* commendat urinæ ſpiritum, vel è calculo humano factum, quem & ego ſæpius probatum reperi *Vvolfgangus Hoefserus. Herc. Med. lib. 3. cap. 4.*

*Gerardus Goot*, Medicus doctrina & experientia præclarus, *Molinaum* quendam veſicæ calculo laborantem, aqua Perſicariæ deſtillata ad integram ſanitatē perduxit, de ea hauſtum ſingulis matutinis exhibendo. *D. Robertus Boyle*, in aureo ſuo Libro, *De Utilitate Naturalis Philoſophia*, Parte ſecunda, Sectione tertia.

## SECTIO DECIMA NONA.

### Pro Calculo Vesicæ.

**C**Alculum in veſica exiſtente durum & antiquatum, frangere nemo potuit: molliorem, tophaceum, friabilem, recentem cum difficultate frangemus in juvene, non in ſene, ubi aperti ſint meatus, non adſtriſti, ubi vires validæ ſint & ægrotus Medico pareat, medicuſque ſuo munere per fungatur: at etiam ſi conditiones adſint huiusmodi, rarò tamen hoc opus medicamenti abſolvitur. Ego bis in hanc uſque diem fractum vidi, primum caſu, mox deliberatione, atque matura conſultatione addita. Caſus fuit. Filium *Zanetti* Pontificii Typographi *Romæ* expurgandum ſuſceperamus, Doctiſſimus quidam Medicus & ego, ut poſtea tutior ad ipſam ſectionem accederet (jam enim cum *Nurſino* artifice de pretio convenerat) tentaverat ante, omnia remediorum genera tum à Medicis Venetis, tum Florentinis excogitata; cumque nullam conſequeretur utilitatem, ſecari cupidus, ſacerdotem juſſit

acceſſiri, ut ſumptis Eccleſiæ ſacramentis, ſi ex ſectione moreretur, animæ fuiſſet conſultum. Religioſus fuit ex Societate Jeſu, qui audita confeſſione ab ægrotò, & cognito morbo, proponit illi pharmacum ut dicebat magni uſus, de quo & in ſeipſo & in aliis periculum fecit, experiri placuit, neque facti pœnituit, Eodem remedio in renum calculo uſus ſum bono ſemper ſucceſſu. Vidi enim circuitus illos nephriticos fuiſſe, non ſine aſſiſtentium admiratione ſanatos. In affectu veſicæ nunquam ſeſe mihi obtulit occaſio experiendi, niſi ſemel ſed æquali cum ſuperioribus eventu, variatò tamen exhibendi modo. Deſcribam primum pharmacum ab ipſo Jeſuita traditum, mox verò aliud, ſed in primis illud remedium approbo, quia nihil deeſſe video, quod poſſit ad huiusmodi opus perficiendum exoptari: vim agnoſco ſimplicium egregiam, componendi rationem exquisitam conſpicio, ac eo magis probo, quod probaſi continet antidotum in quo ſummavis ineſt ad frangendum calculum, habet autem Jeſuitæ pharmacum ita.

℥. Pulv. millepedum præpar. ℥i. ad ſummum ℥iv. aq. vitæ ℥ſſ. jur. iſcicer. rubr. ℥ix. vel ℥x. capiat calidum horis ante prandium. ꝯ. enemate utebatur emolliente ante medicamenti potum, inſtituebat ſimule mollientem victum, effectus medicamenti fuit: horarum duarum ſpatio, totum corpus incaleſcebat, anguſtiabatur ægrotus ſitiebat, ac ſerè loco ſtare non poterat, aliquando circa pubem dolores urgebant, urinæ hora quinta cœperunt craſſiores reddi, ſed non multæ. Secundo die à pharmacò contingebant eadem, ſed urinæ copioſiores & craſſiores. Tertio ſabulum apparuit multum. Septimo tandem adeo plenæ ſabulo viſæ ſunt, ut rectè quis diceret, eas nihil eſſe quam ſabulum aqua diſſolutum, omnia in meliorem ſtatum redigebantur, ita ut qui proximè incidi debebat, liber ab omni malo nono fuerit die, & hic adhuc vivit, ab eo morbo Dei benignitate liber.

Ego verò juvenem annorum 28. calido & ſicco temperamento curaturus, duxi minuendam quantitatem aq. vitæ, & ubi ſingulis diebus datum alteri fuit antidotum, huic alternis dare juſſi, ac pro refrige-

ratio-



ratione totius corporis, aqua fragariæ, & fabarum ad ℥x. propinabam intermedio die cum gutt. vi. ol. calcanthi & ℥i. julepi violati, hoc autem modo pharmacum indicabam.

℥. Pulv. assellor. præp. ℥i. aq. vitæ ℥ii. decoct. cicer. rubr. ℥viii. Ms. & capiat tepidum 6. horis ante cibum, sed cum excalesciebam igne pharmacum, ibi non erat aqua vitæ, verum ubi ab igne remotum erat, miscebatur. Dedi medicamentum in Balneo decoctionis erbarum emollientium, universalibus præcedentibus, præparantur Millepedes ad renum & vesicæ calculos hoc modo.

℥. Assellorum quam volueris, quantitatem, vinoque albo generoso abluito diligenter, mox in ollam coniecito novam vitreatam, lutoque illam incrustato demum in furno exsiccantur, ita ut possint in tenuem pulverem redigi: tum verò affunde vini ejusdem generosi quantum poterunt imbibere, & rursus exsiccato, ac tertio imbibito & exsiccato ut supra, quarto verò pulverem irrorato hoc qui sequitur liquore.

℥. Aq. fragor. ℥iii. Spirit. vitriol. ℥iβ. iterum pulvis exsicceatur & tenuissime contritus in vase vitreo, aureo, vel argenteo usui servetur. Quod ad ipsam incisionem attinet, si fiat igneis cultris multo scilicet succedet, hanc rationem secandi, mea persuasione, adhibebat Roma quidam ex meis discipulis, ac omnes ferè sanitati restituebat. *Horatius Augenius. Episc. & Consul. Tom. 2. lib. 9. Episc. penult.*

*Wilhelmus Laurembergius* Professor. *Rosochiensis* ut ipse se refert prope jam ætate calculo vesicæ laboravit, qui cum varias molestias exhiberet, & nucem ponticam æquare deprehenderetur, ac citra sectionem exire non posse putaretur: ipse verò periculosissimo huic auxilio sese subicere nollet, de aliis remediis cogitare cepit, primo ergo liquorem illum nephriticum celeberrimum magnoque apud principes in pretio & usu habitum expertus est, qui ita paratur.

℥. Salis tartar. alb. ℥i affund. aq. petroselin. lbi. M. & per chartam bibulam transcoletur, & liquori color croceus corticibus aurantiorum concilietur, usurpa-

vit etiam gemmam illam Indicam, Igiada Hispanis dictam ac calculum frangendum celeberrimam, sed utriusque remedii nullam vim deprehendit, ergò inter reliqua quæ ad calculum comminuendum commendantur, pharmacum ex asellis experiri voluit, ad imitationem Augenii in hunc modum.

℥. Pulv. asell. præp. ℥i. Spir. juniper. ℥ii. juris Cicer. rub. ℥x. M. quo manè assumpto, prima & secunda vice à sumpto medicamento tribus aut 4. horis, quandam pectoris compressionem percepit, & quasi imminens animi deliquium, ut necesse haberet theriacæ ℥i. potioni admiscere, atque ita remedio hoc totos 15. dies usus est. Sed toto hoc spatio ne minimum quidem Sabuli expurgari reperit, itaque alia addenda ratus, sequenti medicamento usus est.

℥. Assel. præp. ℥ii. lepor. præp. sang. hirci præp. Spong. ros. sylvestr. sem. viol. purpur. an. ℥i. Spec. Lithontrib. ℥ij. M. F. antidotum. Hujus antidoti accepit ℥ii. decocti diuretic. ℥x. Spirit. juniper. ℥ii. quod medicamentum ubi manè hora 5. hausisset, secunda vice, post horas plus minus 4. sub pubis osse ad regionem ostii vesicæ, magnos sentire cepit dolores. paulò post parum urinæ profluebat, & cum ea lamellæ exiguæ instar. Squammæ piscis subrubræ quæ licet aliquam visciditatem habere viderentur, ad tactum tamen in sabulum resolvebantur, ita ut manifesto appareret tunicam vel crustam esse à majore calculo solutam. Cujus medicamenti usum cum continuaret, interdum tertio; interdum quarto, nonnunquam quinto die, hujusmodi lamellæ crassiores, & fragmenta sæpè grandiuscula profluxerunt, & præsertim ubi lavacro aquæ dulcis uteretur; cum verò & à calculo, & ab ejus fragmentis, orificium vesicæ esset fauciatum, ad leniendum dolorem medicamenti usus est, atque ita horum medicamentorum usu 17. septimanarum spatio à calculo isto liberatus est. Decoctum diureticum hoc fuit.

℥. Rad. Liquirit. ℥v. alth. graminis, ononid. an. ℥β. baccarum halicacab. num. 20. cicer. rub. ℥iv. uvar. pass. ℥i. sem. 4. frig. Maj. an. ℥i. hord. pij. Coq. in aqu. alkekengi, ononid. fragor. flor. fabarum an. lbiβ.



colatur. adde Syr. de alth. ℥iij. *Daniel Sennertus. Pract. lib. 3. part. 8. sect. 1. c. 2.* Ptisana fructus Cynorrhodi, seu rosæ Sylvestris in furno siccat. & pulverat. multos à calculo liberavit, sed diu ea ptisana utendum est. *Petr. Borell. obs. 22. cent. 3.*

## SUBSECTIO VIGESIMA.

### *Pro Calculo Vesicae.*

**P** Rincipes *Germania* contra Lithiasin quotannis in mayo bibunt quotidie haustum liquoris è cortice vulneratæ betulæ, quem liquorem præservant à corruptione aeris affundendo ol. oliv. Vulneratur cortex betulæ prope terram in trunco mense martio, circa tempus quo solet vulnerata vitis plorare novellum liquorem è terra haustum. Sed is liquor betulæ est pene insipidus.

Si autem ramus aliquis spissitudinis 3. digitorum ad semidiametrum vulneretur, inditaque lana repleatur, statim fiet liquor non ingratus ac subcidum, qui etiam in ipso Lithiasis tormento solatur afflicti ad 3. vel 4. cochlearia assumptus. Tenellos etiam, subnigrigantesque betulæ ramulos (unde Scopæ & virgæ nostratum fiunt) qui tumentes gemmas nondum frondosas habent, malleo super incudem vel lapidem conquassatos iussi concoqui aquæ ad cerevisiam frabricandam destinatæ; cui cerevisiæ si postmodum dauci semen aut beccabugam associaverim, sortitus sum effectus ad Lithiasis præcautionem optabiles, potentioresque adhuc, si isti cerevisiæ liquor iste maritialis è superioribus ramis collectus infusus fuisset, post sedationem maximam ebullitionis suæ quam vina & cerevisiæ in eadisperite tollerant. Comperi namque imprimis quòd ejusmodi potus è betula diureticorum metum tolleret, eo quod dolores Lithiasis atque contractura laxet, tam in Lumbis quam intestinis (hinc namque unica Lithiasis etiam colicos dolores suscitatur, non minus ac si fomes ejus intestinis inesset) prodest etiam dysuriis & stranguuriis senilibus, calorem item jecoris mitigat primum, deinde tollit. *Joh. Helmontius. Tract. de Lithiasi cap. 8.*

*Cardanus* scribit sua ætate, virum *Longobardos* oberrasse, qui paucis diebus, quodam poculo passim securè, certò atque breviter sanabat quotquot calculum in vesica habebant, additque judicium se non dubitare hunc virum in inferis esse, quod moriens artem suam mortalibus inviserit.

Pistor quidam habebat filiolum quæ sæpius cruentum meieret, medioque filo suspendebatur lotium: erat autem pallidum cum multo sedimine ac glutinoso, sicque septimum vix erat annum; villica quædam narrat pistori, idem sibi olim contigisse, jussit adferri vesicam tauri embrionis nondum nati; vesicula ista plerumque repleta est liquore saporis non quidem urinæ, sed alieni; cujus singulo mane bibit ℥ii. cum totidem vini albi. Superstes diu vixit calculi nescia. Idem remedium iuvit aliquot puellas pauperes. Idem ex embrione hirco tentatum ac scilicet adhuc successit. *Joh. Helmontius. Tract. de Lithiasi cap. 7.*

Ad calculum in vesica incidendum magni sunt momenti hæc pilulæ.

℥. Sem. Milii solis petrosel. Saxifrag. & Chærefol. an. ℥ß. Sang. hirci præp. ℥i. succi liquirit. ℥ii. trochisc. ankerengi sine opio ℥ß. terebinthin. lotæ in aq. fenic. & apii, deinde parum tostæ ℥ij. F. pilulæ admodum exiguæ, & singulis diebus capiat ℥ß. aut paulo plus. *Ludovicus Mercatus. Consult. 6.*

## SUBSECTIO VIGESIMA PRIMA.

### *Pro Calculo in penis meatu contento.*

**P** Uer quidam natus annos 10. quum nunquam aliàs mali quicquam perferentisset, ad radicem virgæ duritiem evidentem repente passus est, ex qua ingentem dolorem vel tactu tantum tolerabat, & sæpe sed parum per intervalla mingebat. Ad quem vocatus octavo die, postquam malè habuit, post multa variaque versata, lapillam esse, vias urinæ imò virgæ ipsius colem obstruentem iuveni; nulla ei febris erat, neque quicquam aliud præter dicta patiebatur. Proinde mandato parco victu remedium hoc parandum iussimus, quo lapillus facile



cilè lapsus est. Habet autem remedium sic. Asplenium herbam incisam, & butyro exceptam, apprimè calidam, loco dolenti & malè affecto impone; & vix hora præterierat, cum lapillum illum puer emisit & sanus factus est. Lapillus renum erat figura, magnitudine & colore instar seminis siliquæ *Ægyptiacæ*, quem postea in pulverem redactum, pater vino *Cretico* excepit, & jejuno stomacho per triduum bibendum puero tradidit, persuasus, hoc remedio puerum amplius non lapsurum in hunc exitialem morbum. *Amatus Lusitanus, curat. 91. cent. 6.*

Senex 68. annorum quum vesicæ lapillis gravissimè crutiaretur, & nihil juvamenti ex variis adhibitis medicamentis perciperet imò in urinæ omnimodam suppressionem deveniret, glandem illi secundum longitudinem in parte superiore præscindere feci, & inde tandem 2. lapilli avellanæ magnitudine extracti fuere, & ille liber à tam sævo & crudeli morbo fuit. *Amatus Lusitanus, curat. 42. cent. 1.*

## SECTIO QUARTA.

### *Pro Caloris naturalis debilitate.*

**I**Nter medicamenta, ab omnibus Medicis doctis, ad roborandum calorem naturalem in visceribus, & toto corpore & spirituum generationem maximè commendatur ambra. Ita.

℥i. Ambra ʒβ. Sacch. ʒvi. M. sumatur in jusculo vel quomodocunque: alias commendatur Spiritus vini ex optimo malvatico confectus, si manè aliquot guttæ cum mica panis usurpentur. *Ioh. Crato. conf. 14. lib. 4.*

## SECTIO QUINTA.

### *De Calvitie.*

**C**Alvitie (quæ græcis *Φυλακρυσι* dicitur) defluvium est capillorum, quod à sincipite plerumque incipit ac continuo tractu per medium caput, in occiput vergit, ex defectu alimenti ortum habens; ejus causa est inopia humidi calidi pinguis, senectutis comes est perpetuus, hæreditaria

*Burnet Parte 1.*

rium aliquando est malum: à veneris etiam frequentiori usu producit, fit quoque secundum *Hippocr. 6. Epid. Sect. 3. Aph. 1.* Calvitie ex consumptione ipsius cerebri, procedente nimirum ætate, cerebrum abscedit ab osse cranii, quod privatum humiditate, nequit amplius pilos alere, qui alimento destituti decidunt; quæ hæreditaria est, & senectutis vitio curationem nullam admittit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Calvitie in Adolescente.*

**C**onsulvi ut decocto ulmi ex dulci lixivio caput lavaret, & locum affectum Squilla aut cœpa fricaret, & deinde hac etiam decoctione ablueret quæ ex abrotano & agrimonia paratur, demum verò ut hoc unguento inungeret, quod ex labris vulpis cum pelle in cinerem redactis & ex cinere stercoris capræ, & apum & muscarum, & succis dictarum herbarum & oleo decoctionis muscarum constabat, cera modica adjecta, post succi consumptionem ad formam unguenti paratum. Erat hoc Experimentum *Gisberti Horstii* præceptoris mei. Urina calida per se lota juvat, alteri verò solo lixivio hederæ arboreæ, cum caput lavasset crines restituti sunt. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 8. de vitiis capitis exterioribus.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Calvitie post tinea remanente ad virum excellentem.*

**C**alvitie hæc non ex senio, sed ex ulceribus capitis manantibus ortum ducit vera cute hinc inde exesa, & per dropacum applicationes & detractiones absumpta, in cujus locum cicatricosa & callosa cutis nata est. Cum autem in cicatrice pili vix unquam nasci possint, & jam diu perseveravit malum, difficile erit arte, illic de novo pilos educere. Tamen cum cutis capitis spissa & capillosa sit, in qua semina adhuc fortè pilorum latere subtus possunt, præcipuis expertisque remediis id tentandum esse, ut pili crescant, censerem



omissis multis aliis hoc modo procederem.

Caput manè foveat dominum cum spongia intincta in vino albo, in quo decoctum sit abrotanum cum Chamam. & Salviae floribus; ut sic pori sensim aperiantur; quod & alioquin capiti, tantum abest ut obsit, ut potius profit. Hoc pacto alternis diebus per mensis spatium & ultra caput foveat; fricando & pectinando post fotum. Deinde inungat caput noctu, sequenti urgento.

℥. Ol. Myrtin. amygdal. d. an. ℥i. cortic. rad. Cannar. ustar. verarum. Capill. ven. veri usti & polytrichi an. ℥ii. capil. murium ustor. apum combustarum & Cantharid. rubrar. maculis nigris an. ℥i. ladan. ℥ii. Mell. ℥i. cum cera F. Linimentum. Hoc Linimento nihil est efficacius, quod si non juverit, nihil juvare poterit, uretur illo alternis noctibus, & quando spissè adharet; abluere poterit lixivio, in quo abrotanum decoctum fuerit. Ubi mensis spatium usus fuerit, postea hoc decoctum parati curet.

℥. Cap. ven. polytrich. cortic. rad. cannar. fol. Myrti, fol. Sen. fl. chamam. ros. rubr. fol. Lapathi acuti an. M. lign. guajac. ℔ss. abrotan. M. ii. F. decoctio, qua singulis noctibus caput lavet cubitum iturus, continuando diu; vel saltem cum spongia foveat, atque nisi succedat mensibus aliquot elapsis, rursus unguento priori caput inungat noctu & manè, & hoc decocto abluat, hæc præ cæteris omnibus (si quid effici in hac re potest) efficacissima sunt remedia, quæ fideliter communicare volui, à Deo successum domino optans. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 597.*

## SESTIO SEXTA.

### De Cancro.

**C**ancer (Græcè *Καρκίνος* & *Καρκινώμα*) est tumor durus, rotundus, inæqualis, colore livescens, nigricans, venis circumcirca turgidis & repletis, dolore ac interdum calore gravis, in qualibet corporis parte nasci solet, in facie, labro, ore, oculis, in vulva, cole, & ano; at maximè in seminarum mammis, quæ, quia

fungosæ & inanes, illius materiam promptè excipiunt, ex utero etiam in eas facilis est decursus, causa est bilis adusta & atra in venis hærens, nec ob crassitiem penetrare potest, quæ suppressis menstruis aut hæmorrhoidibus originem suam sæpissimè debet. Ejus signa sunt, tumor in principio ciceris magnitudine, cum dolore & calore, hinc fabæ, deinde juglandis, & ovi magnitudinem æquat, tandem in ampliorem molem attollitur, pars conspicuè livescit aut nigricat, venæ in ambitu crasso nigroque sanguine turgent ita ut cancri fluvialilis pedes referre videantur.

Cancer alius est non ulceratus, à mitiore materia proveniens, qui & occultus dicitur alius est ulceratus & erodens ab acriore materia oriundus, tunc quidem corruptæ carnis speciem tumor exhibet cum fetore, sordida illuvie, horrido aspectu, labris præduris & inversis. Morbus est periculosus & gravis & qui rarò curatur.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Cancro Mamilla.

**U**niversum corpus per medicamenta melancholiam respicientia purgavimus sanguis etiam missus est, quibus peractis hoc topicum adhibitum est.

℥. Succ. plantag. solan. semperviv. an. ℥ij. pulv. plumbi usti & sæde aq. rosac. lavat. ℥i. thuris ℥ss. in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo sæpe omnia tractentur, & ad solis radios quousque optimè incorporentur, exponantur: in quo lini pannus imbutus mamillæ applicabatur & sæpe innovabatur, quo remedio melius se haberet dixit, & meritò sanè, quia medicamentum hoc humoris infringit acutiem & ejus hebetat savitiem: Universus enim noster conatus eo dirigebatur, ut cancer hic remoreretur, in altumque amplius non cresceret, in quem finem prædicti medicaminis vice, laminam plumbi mamillæ figuræ concinne adaptatam imposeret, neque alia remedia supra locum læsum permetteret, consului. Novi enim ipse non nullas mulieres cancos in mamillis habentes, solo bono vitæ ordine, absque ullo medicamentorum topicorum irritamento per lon-



longum vivere tempus, ita incolumiter prosperè & sane, ac si nullum paterentur morbum. *Amatus Lusitanus. Cent. 3. curat. 32.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Cancro Mamma.*

**F**onticuli in utroque crure excitati erunt maximi usus, pro purgatione infusum hellebori nigri & agar. troch. cum Syrup. de polipod. etiam laudo, & quoniam humor hic atrabilarius continuo indiget irritamento, ego maximè hortor nostram patientem ut familiariter aliquo pharmaco dejectorio utatur. In hunc finem pulvis hellebori nigri preparati & succo ros. ter. aspersi ac in umbra exsiccati ex ovo sorbili ad ʒi. datus, & vinum Sena medicatum in prima mensa aliquot interval- lis bibitum, mihi summopere arrident. Quod attinet medicamenta topica, ego omnibus antepono medicamentum Galeni ex fucco Solani & plumbo usto simul in mortario plumbeo agitatissimum, paratum quod copræstantius erit, si addatur oleum rosarum completum, succus virgæ aureæ aut etiam tabaci omnibus pariter in mortario dicto contusis.

Quæ secreta qualitate hinc agunt sunt interna. vel externa, ut lac in quo cancri fluviatiles sunt incocti. Externa sunt primum pulvis Bufonis cum fermento in olla vitreata ex furno siccati. Secundo folia Lili contrita & apposita. Tertio Linimentum ex pulvere cancrorum fluviatilium ac tutia præparatum cum pinguedine gallinæ exceptis. Quarto aqua stillatitia stercoris bubuli mense maio collecti. *Jul. Caesar. Claudinus. Resp. Medicinal. 35.*

Præmissis universalibus, ex topicis ad ablu- tionem ulceris usi sumus aqua destillata *Gulielmi Fabricii*, cujus hæc est descriptio.

ʒi. Rad. scrophular. ʒi. herb. Roberti. M. i. arnogloss. solan. bugl. borrag. pertu- lac. auphras. beton. an. num. 12. sem. cydon. scænugræ. an. ʒi. aq. ros. an. lib. 1. destillat. in alembico plumbeo. Post ablu- tionem imposuimus tale linimentum.

ʒi. Pulv. tenuiss. lithargyr. ceruss. in aq.

solan. lot. an. ʒi. Saccar. Saturn. ʒvi. tutia præp. ʒi. ol. ros. q. s. M. in mortario plumbeo. s. unguentum. Interdum medica- mentosum *Crollis* cum aqua sperniolæ destillatæ applicuimus. Sed nihil æque pro- fuit, ac emplastrum Saturni, quod descri- bitur in Armamentario Medico Chymico *Mynsichti* sect. 26. (mihi p. 449.) hujus namque solius usu, adhibito tamen lava- mento suprâ descripto, ad plures annos vi- tam produxit ægra, donec tandem febre maligna populariter grassante interiret. *Baldassar Timæus Cas. 40. lib. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Cancro labrum superius obsidente.*

**V**ir quidam *Monspelli* degens circa fi- nem hyemis correptus fuit exiguo tuberculo labrum superius obsidente, quod in dies incrementum capiens, in tumorem cancriformem tandem degeneravit, in auxi- lium vocatus curationem sic aggressus sum.

ʒi. Rad. bugl. & cichor. an. ʒi. fol. agri- mon. borrag. ceterach. & veronic. an. Mß. coq. cum pullo gallinaceo, in colat. dissol- crem. tartar. ʒi. F. jusculum quod capiat manè per 12. dies in quarto quoque jusc- ulo dissolv. Syrup. sequentis, ʒii.

ʒi. Succor. rec. espress. & per residen- tiam depurator. borrag. bugl. fumar. ci- chor. ʒi. Succ. veronic. & pomor. redo- lent. an. ʒi. Sen. mund. ʒvi. Epithym. ʒii. rhab. el. & agar. rec. troch. an. ʒi. Zinzib. & Caryophill. an. ʒi. Infund. & decoque ut artis est, donec colaturæ supersint quart. v. fiat Syrupus perfectè coctus, postremæ dosi jusculorum adde extract. hellebor. ni- gr. gr. 1v. capiat cum regimine, hoc medi- camentum summa cum vehementia ægro- tantem expurgavit, non solum per alvum sed etiam per vomitum: verum eodem die tumor valde imminutus apparuit, & do- loris expertus.

Post usum jusculorum, usus est balneo tepido per triduum; hirudines hæmor- rhoidibus admotæ; causticum utrique ti- biæ iniustum; serum lactis cum Epithymo per mensem usurpatum, & balneum ite- ratum singulis septimanis.



Post 15. dies ab assumpto extracto hellebori nigri, idem remedium iteratum est, eadem dosi cum diapruni solutivi ℥iii. cuius operatio fuit priori similis, & eodem die tumor imminutus apparuit.

Topica omnia tumorem exasperabant, excepto unguento ex ranis viridibus quod maximè laudatur ab Aquapendente, Chalmetæo & aliis & in hoc affectu plurimum præstitit: ita ut illius curationem duobus præsertim remediis tribuendam esse existimen extracto Scil. hellebori nigri, & unguento de ranis viridibus. Non parum tamen contulit Syrupus Magistralis quo bis in septimana utebatur.

Intra mensem à curationis principio tumoris portio suppurata est, & spontè aperta cum pure satis laudabili; ulceri & tumori universo admovebatur continuò unguentum prædictum, & sensim tumor imminutus ac tandem sensim resolutus est, & ulcus ad cicatricem perductum. Unguenti de ranis compositio hæc est.

℥. Ranas virides in aquis puris degentes, q. v. in vas fictile vitreatum, multifque exiguis foraminibus in fundo pertusum conjicito, earumque ora butyro impleto; vas ne quid exhalet luto diligenter oblinito, & cooperito, cui alterum effossa terra conclusum superponito, ignem in ambitu ad destillandum accendito, oleum seu liquorem illum stillatitium colligito, & cum pulvere ranarum misceto, ut fiat linimentum. *Lazarus Riverius, observ. 97. cent. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *Pro Cancro ulcerato.*

**I**Nter cætera præstantissimum ac tutissimum auxilium in hoc affectu *Guidoni à Canliaco* prædicatur arsenicum sublimatum. Hoc (inquit *Theodorinus*) cancerum lupum est iomenon, noli me tangere, fistulam, & tales omnes pessimos morbos primo die occidit & extirpat, quin & ipse *Valescus* refert de quodam Medico & Chirurgo qui cancerum & ulcera tibiæ antiqua succo Solani vel plantag. fovebat, in eo posito pulvere arsenici, pannumque in eo madefactum superponebat, & sanabat.

tur multi Cæterum magna locorum circumstantium interim dum hæc admoveatur, cura semper habenda est, ne scilicet ea inflammatione occupentur; quod incommodum facile evitabis, ipsum arsenicum iusta quantitate & legitimo modo adhibendo, partesque vicinas & carcinomacingentes unguento de bolo & succo solani illinendo ubi autem arsenicum effectum quem desideras, præstiterit (quod ex loci inflammatione sine tumore & mora tri-duana deprehendes) dolor mitigandus erit, & crustæ casus procurandus hoc Emplastro.

℥. Decoct. alth. malv. viol. ℥bi. farin. hord. q. sem. bulliant ad spissitudinem, quibus adde ol. ros. viol. an. ℥i. lutea ovorum 2. Cruci parum.

Hoc unguentum ad canculos ulceratos magnopere probo.

℥. Plumbi usti & loti pompholig. thür. an. ℥v. absinth. ℥i. ol. ros. ℥ss. ceræ ℥i. succ. Solan. q. s. ad unguenti crassitudinem.

Confert etiam unguentum Diapompholigos à *Galeno* maximè commendatum. *Petrus Forestus, Schol. observ. 6. lib. 4. observ. Chirurg.*

Cancrum pectoris per appositum causticum arsenicale feliciter, manum admovente Chirurgo nostro *Baulero*, radicitus extirpavimus, & locum ex voto vicissim consolidavimus. *Gregor. Horstius*, in Epistola annexa observationi 35. lib. 7. *De Morbis Contagiosis.*

Mortificatus arsenico cancer facilè sanatur, etiam solo herbarum (agrimoniæ & aliarum) fotu. Defensivum doloris est, solum sulphuris, & simul sanativum: in huiusmodi morbis sulphur solvimus spiritu terebinthinæ, & in solum aliquoties deijcimus hydrargyrum ferventem, vel reductum sublimati liquorem ei jungimus. Nobile evadit medicamentum, qui laborem & periculum fugiant, incoquant sulphur unà cum arsenico, vel hydrargyro sublimato, & eadem opera prodit Medicina. *Andreas Libavius*, in Epistola ad quendam annexa observ. 2. lib. 9. observ. *Gregor. Horstii de Chirurg. Casibus.*



## SUBSECTIO QUINTA.

## Pro Cancro.

**C**uratio Canceri, qua quidem feliciter ususest à magno quodam viro mihi communicata, talis est.

24. Rad. Serpentar. mai. mense Junio collectæ, transversim incisæ, & filio lineo trajectæ, & ad umbram exsiccatæ, suspensæ ne parietem attingat, in subtilem pulverem redactæ quantum volueris, cui adde arsenici non splendentis tertiam partem, fulignis camini parum, omnia benè commisc. & subtilissimè pulverisentur, & servantur in pixide lignea. Si ulcus sit valde putridum, arudinaceo cultro scalpendum est, ut parum sanguinis exeat, & pulvis subtiliter inspergendus, atque gossipium saliva madefactum, superponendum, protestandumque est, quod per diem & noctem unam, dolorem molestum excitabit, atque pars intumescet, sed quanto tumidior evadet eo melius, non est removendum medicamentum sed faciat escharam, quæ sponte per se post octavum diem cadet; si post Escharam elapsam, immundum remanebit; ulcus mundifica cum melle rosato, succo apii, & parum farinæ hordei, vel unguento isidis, & superponatur unguentum de tutia. Si verò aliqua radix remaneret; rursus appone pulverem prædictum; & pro removenda Eschara nihil addes, sed naturæ permittes. Sed antequam egrediaris curam, purga corpus competenti purgatione & rectam victus rationem præscribe. *Carolus Oslevius*, in Epistola ad *Laurent. Scholtzium*, lib. 3. Epist. *Cratonis* & aliorum Med. à *Scholtzio* Edit.

Placet hic cancri ablationem & curam, ab amico mihi communicatam, subungere.

24. Arsenic. alb. subtiliss. pulverati pt. i. rad. ari pulveratæ part. iv. fuligin. parum, ut in trium horum mistione, pulvis modice cinereus, vulgò griseus fiat, qui ad usum servandus, & quo vetustior eo melior evadit, ac in quintum usque annum durat. Hic pulvis exulcerato cancro ad crassitiem dorsi cultri, cavendo ne bonam carnem tangat, inspergatur, in medio tamen paulò spissius, ob mediam cancri

radicem. communiter reliquis majorem, huic asperso pulveri gossipium extensum, & saliva bene madidum, ut cum pulvere eo melius adhæreat, alias nihil operabitur; imponatur: inspergendus autem pulvis postquam æger jam passus fuerit, & exulceratus cancer, nullis aliis quam ligneis instrumentis tangendus. In adhibitione hujus pulveris cautelæ aliquot notandæ veniunt, ob diversos effectus ejusdem, aliis enim dolorem creat, aliis non item, penetrat usque ad venas seu radices cancri, iisque firmiter adhæret, ut sine ruptione harum adimi amplius nequeat; quare semel tantum inspergendus, quia ejus vis, donec omnia secum auferat, durat interea nulla alia medicamenta imponenda, quia hoc sine noxa fieri non posset, nisi in ambitu circum circa, ad latitudinem 2. digitorum transversorum, defensiva, seu potius repellentia & inflammationem impediencia quale hoc esse potest.

24. Boli armen. ol. ros. an. q. s. aceti ros. parum Misce. Solet quandoque ob penetrationem & vim medicamenti, ruptio venarum, eamque effusio magnæ sanguinis copiæ, & simul materiæ flavæ & acris, subsequi; quæ ubi contigerit, nullum medicamentum, præter lintea duplicata imponenda, & quoties madida, renovanda: fluxio enim hæc ultra unum aut alterum diem non extenditur, hacque omnis auferitur dolor, his factis expectanda cancri sua sponte cadentis, à sana carne separatio, quæ continget intra 18. aut 20. dierum spatium: minima namque rupta radix ante hoc tempus, vi illata, totius curæ reiterationem minatur, separatione hac secuta ulceri sequens pulvis inspergendus.

24. Thuris puriss. mummiæ, mastich. myrrh. aloes Sarcocoll. an. ʒi. opopan. opt. ʒss. laventur omnia aq. plantag. & ros. fiat pulv. tenuiss. qui acrior reddi poterit, aucta thur. mastich. myrrh. & Sarcocoll. quantitate, pulvere crassè insperso ulceri, tale unguentum supratelam extensum imponatur.

24. Lithargyr. auri ʒii. mummi. ʒi. ol. ros. ʒi. aceti ros. parum: pulverata in mortario plumbeo agitata incorporentur, & si diutiusculum adhuc sit unguentum, addito



dito ol. rosae. mollius reddatur. Hæc 2. semel in die applicare usque ad plenam ulceris con soliditatem sufficiat, emanabit ex eorum usu, primis diebus, materia viscosa, tenax & alba, quæ in dies optimè extergenda, usque ab absolutam curam, quæ auxiliante deo, his omnibus ritè administratis promittitur. *Felin. Platerus. Practic. tom. 2. cap. 17. pag. 751.*

Hic est pulvis quo *Antonius Euchius Italus* multos cancos per *Germaniam, Poloniam & Angliam* non sine admiratione curavit, atque inde non exiguum lucrum fecit, & ob id Medicus cancrorum vulgo nominatus fuit: *Rodericus à Castro, lib. 1. De Morbis mulierum, cap. 21. & 22. & Daniel Sennertus. Practic. lib. 4. part. 3. sect. 1. cap. 7.*

Vir quidam meis diebus in tractu Julia-censi cancrum quemlibet sanabat insperso pulvere indolente, atque tum demum Emplastro incarnante solidabat, cujus ars secum sepulta est. *Ioh. Helmont. tract. de Ideis Morbofis.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Canero Ulcerato.

**F**ilia *Geropii Becani*, Medici *Antverpiensis* tulit in sinistris temporibus, 50 amplius annos, durum ac inæquale cacinoma; sed sine ulcere, ullave gravi noxa, verum incremente paulatim, post tot annos, tum dolore, tum pruritu, sive ex adversa mariti sui fortuna, sive ab atra bile eò uberius effusa, imposuit tumori improvide, ex consilio Empirici, nescio quæ adurentia medicamenta, quibus cutem erodentibus, concitabatur non modò malum hæcenus quietum, sed degenerabat brevi in carcinoma ulceratum, cum Labiis inversis, crusta cinerea, sinu deformi tubere inæquali, colore livido, sanie cadaverosa, dolore, vigiliis, animi deliquiis, ardore, pruritu, aliisque conclamati cancri notis, cui nulla cum prodesset Medicina, applicuit tandem blandiens hoc ceratum, quod usus comprobavit, qualicunque carcinomati summè utile.

℞. Ol. rosæ ℥ii. ceræ alb. ℥vi. plumb. usti, ac loti. ℥ss. oleum cum cera lique.

fiat, & addito plumbæ, agitentur 6. horas in mortario plumbeo, ut fiat ceratum. Præter quod vidimus ulceratis cancris ab aliis sceleriter ad moveri pulverem concinnatum ex plumbo liquefacto cum mercurio vivo, cui siquidem tantillum Mercurii vitæ insperferis, rediges omnia in pulverem friabilem ulcerato cancro apptimè utilem. *Nicolaus Tulpius, cap. 47. lib. 1.*

Famula quædam compescuit malignum carcinoma in femore, ingentis molis, ultra annum 17. solo plumbi unguento, cuius litu, nihil simili tumoris utilis. *Nicolaus Tulpius, cap. 51. lib. 3.*

Nobili cuidam & electæ mulieri prope cabstellum *Neuveum* degenti tota pars faciei dextra, cancro eoque ulceroso obsessa fuit diutissimè, & sævis exagitata cruciatibus, à Medicis frustra petitis auxiliis, tum *Gallis & Italis*, tum etiam *Germanis & Hispanis*, exterisque aliisque aliis quibusque: vulgaris cujusdam barbitonforis remedio hoc sequenti & Euporisto persanata fuit. Pullos illa *Gallinaceos* in partes tenues & latas concidebat, quas sæpiusculè computando, interdiu admovebat affectæ parti. Ab unico tandem eoque præstanti remedio, reliquis quibus libet frustra (ut diximus) tentatis, curationem recipiens, pristinam valetudinem recuperavit. *Mauritius Cordus comment. 7. in lib. 1. Hippocr. De morbis Mulierum.*

Alii admovent carnes pullorum columbinorum sectas & adhuc tepidas. *Lazarus Riverius, cap. 12. lib. 2. prax. Medic.*

Vetula quedam mulier cancrum habebat in mamma sinistra, quem per 13. annos gestaxerat, in quo exigui tumores cancriformes adnascebantur, qui multò acerbiores dolores excitabant, propterea quod exulcerati fuerant, quam tota cancri ipsius moles, qui tamen exigui tumores sublatis sunt frequenti applicatione aquar. pap. rhæad. plantag. & rosar. cum melle ros. permixt. ab initio, deinde solis aquis admotis.

In alia etiam muliere ulcus cancriforme in mamma patiente, idem remedium ulcus protinus sustulit, & ad cicatricem perduxit. *Samuel Formius, observ. 21.*

Quædam mulier quinquagenario laborabat cancro in mamma sinistra, ulcerari incipiente. *Juvenis Chirurgus extraneus.*



sequens remedium admovit .

24. Aq. fortis ℥i. sublimati crudi, ℥iv. sal. ammoniac. ℥ii. arsenic. ℥i. ponantur omnia in alembico & destillentur ad siccitatem, addendo aceti destilletur iterum acetum, donec materia ad pastæ consistentiam redeat: primò cancerum diligenter abluebat vino calente, cum linteis eo imbutis, & fortiter fricabat, ut pars irritaretur. Deinde extendebat pastam supra pulmaceolum sexuplo minorem ipso tumore, quod remedium supra partem relinquebat, per 24. horas, & fiebat eschara plumaceolo sextuplo major, ita ut cancerum omnino absumeret, & decisa eschara, ulcus carne implebatur, & ad cicatricem perducebatur. Quod si dicta eschara tumorem universum non abstulisset, sed quædam illius radices subsisterent, illas absumeabat pulvere præcipitati rubri, cum alumine usto permixti: ad ulcus verò carne implendum, linteis tantum detriti utebatur. Hoc notatu dignissimum est, quod admoto parti medicamento, febris accendebatur, vomitus & alvi fluxus excitabatur, & urinæ fluxus provocabatur, quæ Symptomata per biduum, aut triduum perseverabant, natura irritata à venenata medicamenti deleteria qualitate.

Eodem remedio cancer in nasi extremitate obortus, qui nasi apicem exederat, in quodam milite curatus fuit, *Samuel Formius, observ. 20.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Cancro mamma sinistra.*

**V**ena aliquoties in anno, prout plenitudo adfuerit, præcipuè autem vere & autumnò, incidenda est: non autem in brachio, sed in pede sinistro, ut sanguis deorsum trahatur, præstat tamen sanguisugis aperire venas hæmorrhoidales, facile enim per hanc viam sanguinem atrabilem & humores adustos evacuari posse, Medici notissimum est, fonticulos etiam suadeo unum in crure dextro, alterum in brachio sinistro: non est quod de topicis multum sit sollicitus: quod si tamen dolor supervenerit sequens adhibeatur linimentum:

24. Ol. rosac. amygd. d. de vitell. ovor. sine magna affatione vitell. extract. an. ℥ii. rad. Scrophul. herb. robert. an. M℥. ranarum, gamarorum an. num. 6. incidantur & conquassentur in mortario postea cum prædictis oleis coquantur lentissimo igne ad humiditatis ferè consumptionem, colatura agitetur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo per aliquot horas, serveatur in vase vitreo ad usum, inuncto loco affecto, sequens applicetur unguentum supra alutam extensum.

24. Gummi elemi, ceræ novæ an. ℥i. ol. rosac. de vitell. ovor. amygd. d. an. ℥ii. M. simul lento igne & percolentur, deinde in mortario plumbeo admisceantur sequentia, tutiæ præp. plumb. squamos. c. Cerviusti & præp. gammaror. ranar. calcinat. an. ℥ii. Lithargyr. auril. ot. & subtiliss. pulveris. ℥i℥. M. & agitentur cum pistillo plumbeo ad minimum per horas 6. admiscendo paulatim succ. sequentium, quantum suscipere poterit unguentum.

24. Rad. Scrophul. maj. Mii. ari. Mii. herb. roberti, Solani. an. Mii. incidantur & contund. in mortario, extrahaturque succus per prælum ad usum prædictum, hoc habe pro secreto: est enim præstantissimum in hujusmodi affectibus, hac methodo, si non sanabis affectum, ferocitatem tamen ipsius adeò refrænabis ac edomabis, ut ægram sine magno incommodo cum ipso senescere posse non dubitem.

Quam infestus & periculosus in affectibus cancerosis sit mercurius sublimatus & arsenicum, non rarò in praxi observavi: quadragenario cuidam viro robustissimo tumore cancroso ad carpum laboranti, cum pulvis ille ad cancerum arsenici tantillum admittens tantopere à Penoto celebratus fuisset, supervenientibus sævissimis symptomatis, intra paucos dies extinctus fuit. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 22. cent. 6.*

In mamma cancro arsenicum & sublimatum mulierem diebus 6. sustulisse notavi, perinde ac si id hausisset, horis circiter tribus ab insperato pulvere, vehementi rigore concussa, vomitione mortentari cœpit, & crebris animi defectio- nibus corripì cum pulsu languido; quæ dein sensim aucta, abortu partium extre-



marum frigore, & facie reliquoque corpore supra modum intumefcente, miserè illam jugularunt. Periculofus omnino istorum ufus, nec certe ad Chirurgiam necessarius, cum sine, fructu ullo perniciofa sint. *Job. Fernelius. Method. medendi. lib.6. cap.18.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### *Pro cancro.*

**N**on contemnendum auxilium cancris non ulceratis venit ex lamina plumbea argento vivo oblita: nam & testatur *Galenus* plumbum ulceribus malignis & inveteratis esse utile remedium: quin & ejusmodi laminas plumbeas Hydrargyro oblitas malignis ulceribus, quæ reliquorum remediorum vires eludunt, velut quoddam alexipharmacum esse, quo ipsorum cacoethia dometur & absumatur antiqua fide & doctrina testis est *Cauliacensis Guido. Ambros. Paraus lib.7. cap.32.*

Unguentum tale fieri potest.

24. Ceruss. lotæ, plumbi usti loti. an. 3ß. Lithargir. tutiæ præp. an. 3iii. Succ. Solan. Scabios. tapfi barbat. an. 3i. ol. ros. de ranis, ceræ, an. q. l.

Vel folia orticæ recent. contuf. impo-  
nantur; ut ex urtica succus exprimatur, & cum pompholige mixtus applicetur. Vel.

24. Ol. ros. 3iii. Succ. Solan. 3ii. succ. urtic. 3i. Sacch. Saturni, 3ß. agitentur in mortario plumbeo, pistillo ligneo donec nigrescant, F. unguentum, probatissimum, tibi hoc semper fuisse. Fr. Arceus scribit.

24. Ol. rosac. omphac. an. 1ßß. sævi hircin. vitulin. ung. rosat. populeon. an. 3iiß. Succin. Solan. plantag. acetos. an. 3ß. vin. granat. 3iiß. bulliant omnia lento igne ad consumptionem Succorum & vini postea colentur, add. Ceruss. 3iiß. Lithargy. 3v. plumbi usti, antimon. an. 3x. tutiæ Alexand. 3iß. Camphoræ S. A. trituratæ. 3i. ceræ alb. q. l. fiat unguentum molle, videlicet liquefacta cera cum oleis, & in colatura ponantur reliqua mineralia ducendo corpus ipsum unguenti per horas duas cum pistillo in mortario plumbeo, atque hoc optimum omnium in hoc genere medicamentorum est. *Daniel Sennertus pract.*

*lib. 4. part. 3. sect. 1. cap. 7.*

Ego habui à quodam Monacho Medicamentum mira faciens ad Cancrum, ex duobus tantum constans medicamentis; quorum alterum est arsenicum crystallinum sublimatum, cujus Natura hæc est, ut applicitum parti si ipsum linteolo applicetis, ita cuti adhæret, ut amplius auferri non possit, nisi simul etiam carnem à medicamento victam suppositam auferas. Alterum ingrediens est radix dracunculi siccata & in pulverem redacta, & cum arsenico mixta: & hoc pro maximo secreto vobis patefacio, atque experientia a me pluries comprobato. *Gabriel Fallopius cap. 5. lib. de Tumor.*

Hoc habeo in usu ad Cancros, & ad omnes carnes superfluas.

24. Arsenic. crystallini & citrini, an. 3ß. aristol. ærugin. æris, an. 3iii. opii 3ii. axung. q. l. (scil. 3iß.) tritis terendis, F. Unguentum. *Gabriel Fallopius cap. 18. Tratt. De Ulceribus.*

24. Theriac. veter. 3i. succ. Cancror. 3ß. succ. lactuc. plantag. Solan. & col. Ros. an. 3iß. fugitiv. extinct. cum terebinth. 3i. vitell. ovor. sub ciner. coctor. n. 4. camphor. 3ß. Pistentur omnia in mortario plumbeo & F. unguentum. *Ambr. Paraus, lib.7. c.32.*

*Bart. Turrianus* in *Jatrobo*. discurrens pulchrè de Cancri generatione, cognitione & curatione, tandem subiungit omnibus topicis præponendum oleum vel aquam ex cancris fluviatilibus, tanquam appropriatum remedium. *Wolfgangus Hæserus, cap. 1. lib. 5. Hercul. Medic.*

Mortificat cancerum certo experimento aqua ex cochleis hoc modo destillata. Co-  
cleæ quæ in vineis reperiuntur in vase terreo adperguntur sale, ita spumantes moriuntur. Mortuæ cum testis, spuma & tota substantia, S. a. destillantur in aquam, quæ duodecim diebus soli exponitur, ut mutetur in oleum id Cosmeticum est insignne, & ter applicitum mortificat cancerum. *Hieron. Reusnerus observ. 132.*

Serum caprinum destillatum summo-  
perè commendo, cum quo matutinis horis quotidie præbendam censeo 3i. cineris cancrorum fluviatilium, cujus familiaris usus est *Florentia. Benedictus Silvaticus. observ. 31. cent. 2.*



## SECTIO SEPTIMA.

*De Canis Rabidi morfu.*

**I**Nter omnia bruta animantia canes frequentius in rabiem efferuntur; non ob temperamentum calidum & sicuum, ut vulgò asseritur; sed potius ob peculiarem proprietatem & inclinationem qua præ cæteris præditi sunt, ad hoc malum contrahendum. In furorem acti à veneno intus genito in quosvis notos sive ignotos, profiliunt, & dentibus mordent; qui communicato per morsum veneno, consimili rabie tentantur, & lava patiuntur symptomata. Ubi quis à cane rabido demorsus est, nihil molestiæ sentit præterquam ex vulnere dolorem, interim vis veneni intro subiens, spiritus, sanguinem, humores, partisque substantiam contagione labefactæ: hinc sensim serpit longius in partes principes, sed tam segniter, ut raro ante diem vigesimum, interdum post quatuor, sex aut octo menses, aliquando non nisi anno symptomatis se prodatur. Post quinquennium etiam erupisse scribit *Fracastorius lib. 2. De Morbis contagiosis cap. 10* Per has moras, nec febris, nec ullum aliud malum sentitur, nesciente ægro, quanta intus perniciēs lateat, quam mox tum ferè percipit, quum ea ad cor pertingit, quo ubi pervenit, incredibili cruciatu hominem affligit; cor & præcordia vellicantur, mœror, metus & tristitia iræ conjuncta apparere incipiunt, cogitationes corrumpuntur, secum loquitur & murmurat, nec stare nec quiescere potest, sed more furentis huc illuc agitur, manibus corpus dilacerat, sicut immensè, sed illud maximum incommodum accedit, quod aquam & liquida omnia adeo reformidat æger, ut potius emori eligat, quam bibere, aut ad aquam deduci. Oculi & facies plerumque rubent, raucescit vox, spumat aliquando, oculi torvi aspectu sunt, alios dente petit, ac demum vitam miserabiliter efflat.

Ob aquæ metum, qui hoc malum semper comitatur, dicitur affectus Græcis *ὀδονόσκις*, non solum per morsum communicatur canis rabidi venenum, sed etiam aliquando per solius salivæ conta-

ctum, per canis item habitum & osculum ipsi illatum. His signis rabiosus canis apprehenditur. Est corpore gracilis & macilentus, cauda demissa, oculis rubentibus, spuma ex ore fluente, lingua foras exerta, & tanquam bile colorata, cibum & potum averfatur, in omnes notos pariter & ignotos sine latratu irruit, eosque mordet, sæpe velociter currit, mox subito subsistit, non solum maximo æstu, sed etiam per maxima frigora canes in rabiem agi solent.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro canis rabidi morfu in puero duorum annorum.*

**C**UM extra urbem in prædio vicino caesus hic accideret, protinus puerum parens rusticus adduxit, medicam opem implorans, ne gravius quid innocenti filio sit expectandum. Mox enim à principio laborandum in hoc malo, quo malignitas morfu venenato inflicta funditus extirpetur, & ne serpat interius, antidotis appropriatis prohibeatur. Idcirco indicationē utramque respiciendo primum exterius ordinavimus collutionem mundificantem & extrahentem. Sic.

24. Theriace veter. ℥ii. sol. rutæ, Mss. Syrup. acetos. citri ℥i. cum hydromel. q. s. leviter bulliant, & per expressionem colentur, cum colatura vulneratæ partes durius fricentur & eleventur.

Mox apponatur cataplasma ex allio, sale & terebinthina subactum.

Ast interius quoque cito remedio opus esse statuebam, quam ob causam canis rabidi jecur coctum ad ℥i. in particulas dissectum puello dedimus, experimento confirmati, quod primis 24. horis post morsum nondum absolutis, antidotum sit præstantissimum. Ne quid verò ad miserabilem Hydrophobiæ morbum præcavendum, intermitteretur, mox in officina parabatur pulvis alexipharmacus contra rabiem caninam quem habet Palmarius: qui.

24. Fol. rutæ, verben. salv. min. plantag. polipod. absinth. vulgar. menth. artemis. melissophyl. beton. hyperic. cent. min. an. q. s. Legantur omnia ubi sunt efficacissima. Siccentur in umbra: hujus pulveris extir-



ternus & internus usus fuit, juxta præscriptum authoris. Exterioris Ziſs. pulveris cum hydromelite coquebatur pro vulneris deterſione. Interius quotidie Zi. cum ſaccharo permixtus in juſculo vel ſolitariè cum hydromelite, vel Syrup. de ſucco citri dabatur, non neglecta interim in aquam quotidiana læſi puelli immerſione.

His remediis Dei gratia liber fuit æger ab ulterioribus gravioribus ſymptomatis.

Sicut & alius ſeptem annorum puer, qui ſimiliter à cane rabido demorſus, meam opem primo ſtatim die implorabat; at neglectis vulneribus hiſce per caninam rabiem inſectis, Nobilis cujuſdam miniſtrum, necnon alium Baronis in vicinia Sartorem, hydrophobia ſuccedente, miſerabilis delirio vitam cum morte commutaſſe recordor. Quare ſi unquam, ſanè verum hic illud principis obſta. *Gregorius Horſtius, obſerv. 23. lib. 7. De morbis malignis.*

Puer natus annos 12. à cane plaſtrum continuò comitante in crure demorſus fuit ſequenti verò die, eadem hora, puer rigore, ſuccedente poſtea febre, correptus eſt. Ad quem vocatus, & acceſſito Chirurgo, locum demorſum ſcarificare jubeo, non ſine profundioribus quibuſdam vulnuſculis, & calido vino lavare: poſtea verò crure optime abſterſo, loco affecto hoc emplaſtrum admoveſſe jubeo, quo brevi melius habuit, & intra paucos dies ex toto ſanitatē adeptus eſt. Sic autem emplaſtrum habet.

℞. Cepam unam aerem, alliorum caput, ſive radicem mediam, theriac. opt. ℥ſs. fol. marrub. fœtidi, meliſſ. an. p. ſs. rubiæ min. ℥ſs. fermenti ℥iii. Omnia piſtentur, & loco affecto applicentur. *Amatus Luſitanus, curat. 85. cent. 5.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Canis Rabidi morſu probe curbitum in Adoleſcente.*

**P**rimò morſum ſcarificavi ſcalpello, cucurbitulamque cum largiore flam-

ma appoſui, & quantum fieri potuit, ſanguinem extraxi. Deinde totum brachium poſca in qua diſſoluta erat theriaca, parumque ſalis marini ablui; ſaliva enim canis rabidi in parte aliqua cutis exſiccata, niſi maturè & diligenter abluta & abſterſa fuerit, rabiem excitare poteſt. Poſtea cauterio actuali morſum undique ac ptofundè inuſſi. Hic monitos velim Chirurgoſ Tyrones, ut diligenter proſpiciant, ne nimis leviter & ſuperſicialiter inurant. huiuſmodi morſus, ſed ut potius in exceſſu, quam in defectu peccent. Quum enim morbus ſit extremus, extremum quoque requirit remedium, expertus loquor. Poſt inuſtionem, non uſque adeo ſolicitus fui de leniendo dolore, quia enim omnis dolor ad ſe attrahit ſanguinem & humores ex corpore, veriſimile eſt dolorem prodeſſe huiuſmodi ulceribus, dummodo levis fuerit. Itaque poſt uſtionem vulneri impoſui goſſipium madefactum aq. vitæ in qua diſſoluta erat theriaca: poſtea ſequens emplaſtr. ſupra linteum extenſum applicui.

℞. Cæpæ aliquantum ſub prunis coctæ, fermenti, farinæ, ſinapis, an. Zi. theriac. ℥ſs. fol. rutæ & ſcord. ana. M. ſs. M. in mortario addendo parum meliſſ.

Sequenti die ſcalpello eſcharam, undique quantum fieri potuit incidi, deinde jam memorata medicamenta applicui, atque ſic uſque ad caſum eſcharæ proceſſi.

Poſtea ne labia ulceris coaleſcent bis in die piſum impoſui, quemadmodum ſit in forniculis, & præſcriptum emplaſtrum applicui; atque hoc modo ulcer ad tres meſes apertum retinui. Interim tamen per intervalla ſingulis ſcilicet hebdomadibus bis terve ulceri ſequentem inſperſi pulverem.

℞. Pulv. præcipitati lapid. bezoard. pulv. rad. angelic. an. Zi. M. Mirificè enim malignitatem ad ſe ex profundo attrahit, & veneno adverſatur pulvis ille.

Per os lexiſpharmaca veluti theriacam, mithridatum C. C. uſtum & præparatum, & lapidem bezoardicum. Propinavi. Sequens quoque pulvis ad Zi. cum aq.



aq. bugloss. aut borrag. exhibitus sum-  
mopere laudatur à veteribus & moder-  
nis Medicis.

℥. Ciner. canceror. fluviatil. ℥x. rad.  
gentian. ℥v. olibani. ℥i. M. F. pulv. tenuiss.  
venam non incidi, neque pharmacum so-  
lutivum exhibui, ne venenum ab exter-  
nis ad interiora traherem. Et sic divino  
numine curatus fuit. *Guil. Fabrit. Hil-  
danus, observ. 87. cent. 1.*

Potionem hanc hydroticam contra mor-  
sum canis rabidi expertam pro tribus vi-  
cibus propinavi.

℥. Myrrh. gentian. an. ℥i. theriac. ℥β.  
ocul. canceror. ult. ℥i. aq. gentian. & Sca-  
bios. an. ℥iβ. M. F. haustulus hydroticus.

Externè vulneri applicet rutam cum  
allio & pauca theriaca mixtam. *Joh. Pe-  
trus Lotichius, observ. 1. cap. 5. lib. 6.*

Matrona quædam Nobilis pluries à ca-  
ne rabido demorsos curabat, urendo vul-  
nus clavicula ignita, & exhibito hoc pul-  
vere.

℥. Rutæ veronic. plantag. latifol. rad.  
gentian. an. pt. aq. F. pulvis dabat quan-  
tum nux juglas dimidiata caperet mane  
per quinque dies continuos. *Jer. Mar-  
sius, observ. 37.*

Nuper cujusdam militantis in Præto-  
rio mater vidit inquiete, ut radicem Syl-  
vestris rosæ, quam Cynorrhodon vocant,  
blanditam sibi aspectu pridie in fructe-  
to mitteret filio bibendam: in *Lacetania*  
res gerebatur, *Hispania* proxima parte:  
casuque accidit, ut millite à morfu ca-  
nis incipiente aquas expavescere, super-  
veniret Epistola ornatis ut pareret reli-  
gioni: servatusque est ex insperato, &  
postea quisquis auxilium simile tentavit.  
*Plinius, Nat. hist. lib. 25. cap. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Canis Rabidi morfu.

**H**Ujus curationis exemplum habes  
apud *Amatum Lusitanum, cent. 5.*  
*curat. 45.* de puero annos 12. nato, à cane  
demorso in crure. Sequenti enim die puer  
eadem hora rigore, succedente ingenti  
postea febre correptus est, ad quem vo-  
catus *Amatus*, & accito Chirurgo locum

demorsum sacrificare jussit, non sine pro-  
fundioribus incisuris, & calido vino la-  
vare: optimè absterfo loco affecto, hoc  
emplastrum admovit: capam unam a-  
crem accipiebat, aliorum caput sive ra-  
dicem mediam, theriacæ opt. ℥β. fol.  
Marrhubi foetid. meliss. an. p. β. rubiæ  
min. ℥β. fermenti ℥β. omnia pistentur,  
& loco affecto superponantur, quibus  
puer sanitatem brevi obtinuit. Nostri  
verò demorsos à cane rabido ad Oceanum  
mittunt, ut ibi ter aqua marina immer-  
gantur, idque in principio vulnere infli-  
cto, antequam in hydrophobiam inci-  
dant. Novum hoc non est remedium.  
Ejus enim meminit *Celsus lib. 5. cap. 27.*  
Puero 10. annorum *Delphensi*, cum à ca-  
ne rabido morsus esset, ne in hydropho-  
biam incideret, consului, ut in mari im-  
mergeretur, & cum ab immersione do-  
mum rediisset, mandavi, ut decoctionis  
radic. Gentian. in vino ℥iijβ. adjectis ℥ii.  
theriac. opt. ebiberet, & nihil mali am-  
plius sensit. Chirurgo imperavimus ut  
vulnus probè tractaret, neque subito oc-  
cluderet. Imò multis postquam mari im-  
mersi essent, solam theriacam exhibui.  
*Petrus Forestus, Schol. ad observ. 28. lib. 20.*  
*de Cerebri Morbis.*

Vidi non procul *Gandavo* transnatan-  
tem navem & in ea senem nudum funi-  
bus vinctum, habentem pondus in pe-  
dibus: subter axillas zona cingebatur,  
qua ad antennam ligatus erat. Rogavi  
quid sibi vellet illud spectaculum: Unus  
è Nautis dixit, senem illum jam hydro-  
phobum, & à rabiente cane demorsum  
fuisse pridem, Petivi quorsum illum ad  
mare veherent, ne necem ejus intende-  
rent? Quinimo (ait Nauta) mox sanus  
rediturus; illamque esse maris benedictio-  
nem, quod ejusmodi rabiem extemplo sa-  
naret: Arrham obtuli ut me socium & te-  
stem assumerent. Cum navigatum fuisset  
per miliare *Italicum*, duo viri subducta  
cauda antennæ elevarunt ejus cuspidem,  
& senem in altum sustulerunt, inde verò  
in mare præcipitem dedere, eratque sub-  
ter aquas ad spatium miserere, quem de-  
in adhuc binies submerferunt ad spatium  
salutationis angelicæ, tum collocarunt il-  
lum super vas teres supino dorso chlamy-  
de



delectum. Ego suspicabar illum obiisse, sed metum risit Nauta. Nam solutis vinculis cœpit omnem muriam reiicere quam inspiraverat; & mox revixit, qui dein rabie liberatus, sospes vixit. Referebat Nauta *Batavos* cruda halece falsa triduo renovata, & ad morsum rabientis applicata, omnem auferre metum rabiei. Ubi vero id negligentia impedivisset, spectato saltem submersionis modo omnes sanari. Mansit id mihi alta mente repositum, persuadens id in aliis amentis non fore inutile. *Job. Helmontius. tract. cui Titulus, Demens Idea.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *De Canis rabidi morfu & Saliva.*

**B**aldus eximius ille Jurisconsultus, à caniculo suo in labiis morsus, neglecto morfu post quatuor menses rabidus periit.

Matronæ cuidam obviam venit canis rabiosus, qui vestem ejus dentibus arripiens, huc & illuc trahebat, donec tandem veste lacerata, cute tamen mulieris illæsa & intacta, canis aufugit. Illa verò nescia canem rabiosum fuisse, laceratam vestem filo (prout Sarcinatrices facere solent) dentibus abscisso, refarcire cœpit: unde nullum quidem per tres menses sensit incommodum, postea verò sensim melancholica facta, imaginationibus, visionibus horribilibus, & pavoribus agitari cœpit, & paulo post aquam & vinum odisse; & quod pejus est, instar canum latrare domesticos non agnoscere, dentibus arripere, donec tandem in ea miseria animam efflaret. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 31. cent. 1.*

Honestæ cuidam fœminæ in forum eunti, canis rabiosus obviam venit, illiusque pedes furenter ac violenter petit, ipsa periculum hoc ut evitet, inclinat sese, & genua paululum flectit, unde canis vestem, & quidem hujus potissimum fimbriam mordicus arriperet, aliquantum latrare, & statim aufugere. Quo facto, fœmina adhuc perterrita, hæret primo, an canis rabidus fuerit: collecta autem mente, de rabie ejus suspicatur, cum ipsi

antea familiaris admodum, imò domesticus ferè extitisset. Domum igitur se confert, subque tecto vestem laceram ligno suspendit. Postquam verò eam quarto die repetit, atque refarcire cogitat, res mira! vermes capite catulis prorsus similes, iis in fimbriæ locis, quibus canis dentes infixerat, enatos reperit, eosque ceu miraculum novum, vicinis quibusdam convocatis conspiciendos præbet. *Phil. Salmuth. observ. 83. cent. 2.*

## SECTIO OCTAVA.

### *Pro Canitie*

**A**Ulicus quidam 30. circiter annorum cum immaturiùs canesceret, & ob id in contrahendo cum Virgine prænobili & formosa matrimonio repulsam metueret, consilium meum implorabat. Præmissis universalibus, balsamum meum ex succino usto, cujus hæc est descriptio, commendavi.

℥. Succini usti, & in pollinem subtiliss. redact. ℥ii. ambr. gris. mosch. zibeth. an. ℥β. ol. stillat. lign. Rhod. lavend. salv. majoran. rutæ, an. gr. xi. cariophyll. gt. xv. ol. nuc. express. q. s. ad incorporandum. M. f. balsamum. Asumit nimias cerebri humiditates, & inde nascentes catarrhos, caput roborat, & pilos nigredine tingit. Egregium canitiei remedium, sed palliativum solummodo, & sæpe repetendum; præsertim à balneo & sudoribus. *Baldassar Timæus Cas. 35. lib. 6.*

## SECTIO NONA.

### *De Cantharidum preparatione tutissima.*

**T**utissimum per infusionem modum aperiam. Scrupulus Cantharidum in pulverem redactus infundatur in ℥iii. vel 4. vini rhenani, vel spiritus vini, stetque in infusione per aliquot dies, deinde per chartam bibulam filtretur, ut ex substantia Cantharidum nihil admisceatur, ex colato liquore cochlear unum, septem aliis seu vini seu cerevisiæ admisceatur, & ex hoc mixto primo die unum, altero 2. cochlearia, & sic deinceps propinentur, in



in Gonorrhæa virulenta, lotii suppressio-  
ne, & calculo, foelicem hujus præparatæ  
portionis eventum expertus est. *D. Jac.  
Kotzbue* Medicus experientissimus, *Tho-  
mas Bartolinus*, hist. 82. cent. 5.

## SECTIO DECIMA.

*Pro Cantharidum veneno ad virum  
quendam.*

**P**ost assumptum venenum, ab ore ad  
vesicam usque cuncta erodi sentiebantur,  
picem ore expirabat, præcordia in-  
flamabantur, urinam ægrè reddere po-  
terat, sanguinem cum lotio subinde emit-  
tebat, & animo deficiebat, & mente aba-  
lienabatur, huic ol. amygd. d. rec. extra-  
ctum cum butyro ut vomeret, dedi. Mox  
Pisanae cremorem, & malv. sem. lini,  
scenugræc. & rad. alth. decoctum per cly-  
sterem infundi, mandabam. Deinde emul-  
sionem sem. 4. frigid. maj. cum lacte dedi.  
Paulo post etiam mulsam, jus gallina-  
ceum pingue exhibui; donec acrimonia  
mitigata melius habere cœpit. Alteri co-  
piose lac dedimus. *Langius* cuidam impe-  
ravit, ut post vomitum & clysterem,  
singulis horis plenum lactis caprini aut  
bubuli cyathum biberet, & ita curatus  
fuit. *Petrus Forestus*, observ. 6. lib. 30. *De  
Venenis*, & observ. 7. & Schol. lib. 24. *De  
renum Morbis*.

## SECTIO UNDECIMA.

*Pro Capillorum casu à relaxatione  
meatum cutis.*

**C**um hic affectus à nullius materiæ vi-  
tio, sed à sola cutis relaxatione &  
meatuum amplitudine proveniat, sola  
adstringentium admotione curandus ve-  
nit.

Hoc quod sequitur singulare remedium  
ad hoc vitium deputatum est.

℥. Polytrich. capill. ven. an. Mß. fol.  
myrti. ros. absinth. an. Mi. coq. in olei dul-  
cis & vini rubri austeri an. quart. iii. donec  
vinum consumptum sit: colatum & ex-  
pressum oleum reponatur.

℥. Hujus oleis ℥i. ladan. ℥i. mastich. ℥i.  
*Burnet Parte I.*

ladanum & mastich. subigantur in mortario  
pistillo calido, paulatim oleum in-  
fundendo. Deinde consperge & probè mi-  
sce pulveris capill. veneris ℥iv. ut fiat Li-  
nimentum, Quo illinantur loca depilata.  
Nigellam etiam urito, aquaque subacta  
illinito, hujus enim usus ad eliciendos pi-  
los mirificè probatur, sive capiti, sive  
mento, imprimis autem si superciliis ad-  
hibeas: his remediis pili egregiè restitun-  
tur. *Petrus Forestus*, observ. 7. lib. 8.

Vidi, cui mentum calvum erat, hirsu-  
tum factum ex crebro fotu decocti capill.  
veneris, quos nonnulli idcirco polytrichon  
vocant, quod multitudinem pylorum pro-  
ducant. Facies autem sic, radi curabis  
mentum novacula, & sequentibus diebus  
fricabis nonnihil cum panno aspero, po-  
stea lavabis sæpius decocto capill. ven. in  
aq. fluviali facto. *Hieron. Reusner. obs.* 22.

## SECTIO DUODECIMA.

*Pro Capillorum defluvio.*

**A**d firmandus radices capillorum &  
humores contemperandos, utile erit  
hoc unguentum.

℥. Ol. ovor. ℥ß. ladan. ℥vi. pingued. urfi  
℥ii. chartæ ustæ, nuc. avellan. ust. an. ℥ß.  
pulv. gran. myrthi. ℥i. M. F. unguentum;  
eo ungatur manè, postea vesperi ante cœ-  
nam abluatur caput lixivio in quo abrotan.  
& capillis ven. decoquantur. Ad eandem  
intentionem stercus capræ in cinerem redi-  
gatur, & misceatur cum oleo ovorum,  
addaturque guttula una olei Caryoph. vel  
pulvis ejusdem propter majorem effica-  
ciam & odoris gratiam. *Ioh. Crato consil.* 8.  
lib. 4.

En εὐτοπσοῖ quoddam singulare in pro-  
ducendis capillis, ubi illi deciderint.

℥. Spumam carnis bubulæ, potius ma-  
cræ quam valde pinguis in aqua decoctæ,  
& illam collige in ollulam mundam, & ea  
locum depilem inunge. Ego nuper admo-  
dum in quodam cui supercilliorum pili ex  
morbo omnino deciderant, feliciter usus  
sum. *Petrus Monavius*, Epist. 34. lib. 2.  
consil. & Epist. Cratonis & aliorum à Schol-  
tizio editorum.



## SECTIO DECIMA TERTIA.

*Pro Capillorum in fronte proventu  
in Virgine.*

**D**Ropacem talem præscripsi.  
 ʒ. Resin. latic. vulgar. circiter 4.  
 Cochlearia, adde mastichis. subtiliss. tri-  
 ta instar avellanæ dissolv. ad ignem, & pa-  
 rum coqua continuò agitando. Postea ef-  
 funde in lebetem aqua frigidissima plenum,  
 deinde manibus malaxentur & in magda-  
 leonem rotundum formentur, qui in aqua,  
 ne adhæreat, conservetur, hujus porti-  
 uncula dilatata supra cutem pilosam ap-  
 plicata, ubi adhæserit, iterum detraha-  
 tur, pilique in Emplastro evulsi hærebunt.  
 Et si quid de Emplastro in cute remaneant,  
 ol. amygd. d. perfricatione, recedet, con-  
 sumptum est remedium Venetis matronis,  
 quo pilos evellunt.

Sequens etiam pilothrum ordinavi.

ʒ. Calcis vivæ ʒi. auri pigmenti, ʒi.  
 pulverisatis subtiliss. adde album ov. nu-  
 mero 1. & lixivii tonsorum parum, incor-  
 porentur in formam linimenti, coque cum  
 digito intincto ungantur pars cutis pilosa  
 & in quarta horæ parte abluatur lixivio &  
 fricetur, cujus vires cum puer Pharmacopæi  
 experiretur, pili recesserunt: sed do-  
 lor aliquis inde subortus, & rubedo, quæ  
 tamen diu non remanserunt. *Felix Plate-  
 rus. observ. lib. 3. pag. 591.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

*Pro Capitis contusione ex casu.*

**P**uer quidam ex altissimo gradu cubi-  
 culi cecidit, ita ut os cranii apertum  
 esset, & sentiretur motio cerebri, non e-  
 rat tamen ruptio in cute contusa.

Ad hunc casum mirabilem accitus *M. Jo-  
 docus Bruyellensis*. Chirurgus. Primò in-  
 unxit totum caput ol. ros. calido, & de-  
 super asperfit pulverem myrtillorum &  
 super pulverem posuit pannum lineum  
 simplicem intinctum dicto oleo calido. De-  
 inde super hæc omnia, compressam (ut vo-  
 cant) quadruplicem calefactam, & sic om-  
 ni die fiebat apparatus, sic continuando per  
 14. dies, tandem cum his remediis, nullis

aliis adhibitis cœpit convalescere: post-  
 quam totum caput rectificatum videbatur  
 præcepit matri ut acciperet tortellam ro-  
 faceam vino albo aspersam, capitique ca-  
 lide imponeret ad resolutionem & robor-  
 ationem. Et ita infans hic factus est sanus.  
 In hunc modum & alii etiam curati sunt  
 sine incisione & trepano. *Petrus Fore-  
 stus observ. 42. lib. 6. Observ. Chirurg.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

*Pro Capitem puerorum crustis.*

**S**I contingat aliquibus infantibus, fieri  
 crustas vel rupturas in capite, in fa-  
 cie, vel alia quacunque corporis parte,  
 tunc fiat remedium hoc in fallibile.

ʒ. Vitell. ovor. elixatos usque ad duri-  
 tiem numero xvi. myrrh. ʒi. rad. aronis ʒss.  
 hellebor. nigr. gr. iv. comminuantur, vel  
 digitis ovorum vitelli frangantur. Deinde  
 in ferrea sartagine ponantur, & commi-  
 sceantur cum prædictis pulv. & coq. super  
 carbonibus ignitis absque flamma, usque  
 quo incipiant spumæ fieri, tunc exprima-  
 tur oleum, seu liquor, & colligatur, id-  
 que toties coquendo & exprimendo, quo-  
 ties spumam emittat, tunc demum abji-  
 ciantur fæces. Et collectum oleum in vase  
 stricti orifici, & clauso ore servetur, cum  
 hoc oleo omnes corporis partes affectæ li-  
 niantur sæpius in die: cadet enim crusta &  
 removebitur, & sanabitur infans. *Barthol.  
 Montagnana. consil. 298.*

## SUBSECTIO DECIMA SEXTA.

*Pro Capitis & Ventriculi debilitate.*

**S**Uadeo has pilulas ad capitis & ventri-  
 culi evacuationem.

ʒ. Pil. Mastich. ʒii. aloes rosat. ʒi. cum  
 Syrup. ros. F. pil. ix. quas ante cœnam  
 quadrante horæ deglutiat, sequente cœ-  
 na moderatissima. *Ioh. Crato. Consil. 1.  
 lib. 4.*



## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

*De Capitis dolore.*

**D**olor capitis Symptoma est terrificum propter excellentiam & dignitatem partis affectæ, cujus officio vita carere nequit: pro omnibus aliis corporis partibus, caput maximè doloribus expositum est, cucurbitæ enim instar cuncti superpositum, passim in se rapit, viscerum subjectorum inquinamenta.

Est verò dolor capitis molesta quædam & tristis sensatio partium capitis membranosarum, à solutione continui producta. Partes affectæ sunt, cutis capillosa, pericranium, diploe. i.e. duplicatura illa medulosa ossis cranii, ut in lue venerea inveterata, meninges, nervi, venæ, & arteriæ.

Causa proxima & conjuncta, ut aliorum dolorum omnium, est solutio continui antecedentes sunt, quæcunque continuum solvunt, ut intemperies nuda calida, frigida, & sicca, plethora, bilis, pituita, melancholia, flatus, vapor & aliquando vermis. Causæ externæ sunt, aer calidus ambiens, frigiditas nimia, ventus, odor gravis, percussio, ictus, & casus. Doler caput vel per *ἰδιόθεν*, vel per *συμπύθεν*; *ἰδιόθεν* seu propria ipsius affectio, sit quando causa morbifica continuum solvens, doloremque creans, in ipso capite consistit, ibidem genita & cumulata ex vitiosa alimenti concoctione; *συμπύθεν* sit quando aliunde materia morbifica ad caput fertur:

toto corpore nimirum ut in febribus, à ventriculo, ab hepate, liene, utero, renibus intestinis, & genitis in his vermibus, per arterias & cæca corporis spiracula. Dolor capitis alius est pungitivus, ab acri & bilioso humore; alius gravativus à pituita multa & melancholia; tensivus alius à flatibus; alius denique pulsatorius, à tenui biliosoque sanguine, vel à spiritu redundante arterias distendente. Rursus dolor alius est externus, alius internus; externus cutem pilosam & pericranium obsidet, manusque pressu exacerbat. Internus meninges afficit, & ad radices usque oculorum pertingit. Denique alius est, re-

dicatur, alius verò inveteratus & contumax est, qui levibus de causis suscitatur, & *ἡμικρανία* vocatur. Si partem capitis dimidiam occupet dolor, *ἡμικρανία* nuncupatur.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Capitis dolore cum contusione.*

**U**nguentum Alabastrinum valet in omni dolore capitis, & resolvit mirabiliter omnes contusiones, hujus multæ sunt descriptiones. Nostra qua nos utimur ita se habet.

*℞.* Cimarum rubi, Mil. fol. rutæ, p. i. flor. Chamæm.  $\mathfrak{z}$ iv. lapid. Alabastr. subtiliss. pulveris.  $\mathfrak{ss}$ . ol. ros.  $\mathfrak{ss}$ . ceræ alb.  $\mathfrak{z}$ iss. vini alb.  $\mathfrak{ss}$ . ponantur simul in olla nova vitreata, stent per dies tres, & postea bulliant ad vini consumptionem, ponatur ab igne, & sine infrigerari tunc adde albumina ovorum num. 4. conqussentur, & benè misceantur; deinde cola per pannum lineum rarum mulcendo manibus, & exhibet unguentum quod valde pretiosum est. Utor eo in omnibus capitis doloribus, & in omnibus contusionibus, & dentium doloribus, adeò efficax est, ut omnes dolores à contusione mitiget: habeo quidem hoc unguentum pro arcano non solum ad quosvis capitis dolores, sed & dentium, ut sibi par non habeat: verum etiam in omnibus mitigandis & resolvendis, præcipuè verò à contusionibus, vel casu, aut compressione abortis. *Petrus Forestus, Schol. observ. 33. lib. 9. De Capitis doloribus.*

Testudinis palustris sanguis sincipiti instillatus capitis dolorem juvat. Plantaginis radix in collo suspensa capitis dolorem mirificè tollit. Turturis aquatici sanguis fronti ac temporibus illitus quemlibet capitis dolorem sedat: Intelligunt testudinem palustrem. Annulus in quo parum umbilici infantis nati recenter includitur, gestatus in digito, ab omni dolore capitis hominem præservat. Sed hoc superstitiosum esse videtur, quemadmodum & hoc quod sequitur Caput muris in linea pecia involutum, & continuo super se portatum. Aqua, *Plinio* authore, quæ post potum bovis vel asini remansit, ab infirme



pota dolorem capitis illico sedat. Pectinatio capitis, teste *Gilberto Anglico*, pectine eburneo, valet in omni capitis dolore. *Petrus Forestus, observ. 52. Schol. lib. 4.*

Ad capitis dolorem ab ebrietate præstantissimum medicamentum est oleum rosaceum per se, aut cum aceto & succo hederæ vel brassicæ, quæ etiam naturaliter ebrietati adversatur etiam comesta, vel ejus folia capiti admota. *Petrus Forestus, observ. 28. lib. 9.*

At capitis dolorem ex fletu egregiè discutunt sacculi ex milio, sale, anetho, chamamel, meliloto, pulegio. Ut

℞. Flor. Chamamel melilot. rorismar. stœchad. an. p. i. milii torrefact. M. β. sem. fœsel. cumin. aneth. an. ℥i. puleg. nepet. an. M. β. f. Sacculus. Illinatur etiam frons oleo chamamel. anethino, aceti momento addito. *Petrus Forestus, observ. 26. & Schol. lib. 9.*

Ad dolorem capitis à flatu, vulgus hic remedium quoddam habet vile latis, non sine ratione tamen inventum, & cum felici successu sæpius comprobatum, quod in gratiam studiosorum hic libuit adjungere. Rapum sub cineribus coquitur, à quo cocto aufertur ea pars, cui herba ipsa implantata erat, & calidissimè pro ægri tolerantia post aures applicatur; qua tepescente, altera ut priùs calens substituitur, reiteraturque hæc actio, donec flatus discussus est, & ablatus dolor: solet enim brevi tempore id fieri. Quod autem dolenti lateri applicari debeat, aut utrique, si totum caput doleat, doleat, omnibus puto notissimum. In dentium doloribus à flatu excitatis eodem modo usurpatum convenit, *Joh. Fienus lib. de flatibus, cap. 14.*

In dolore diuturno plus præstat caput frequentius roborare, quàm pertinaciter vacationibus insistere. Ideò conferunt pulveres & cucuphar magis tamen probantur pulveres, quia virtus pilei non ita communicatur cerebro, & ex ejusdem sorditie dolor excitari potest. Ab ipso curationis initio specifica remedia usurpari poterunt quale est hoc epithema.

℞. Pulv. Zedoar. ℥i. aq. bezon. ver-

ben. & sambuc. an. ℥i. M. Applicetur calidè parti dolenti cum pannis scarlatinis. *Lazarus Riverius. Practic. lib. 1. cap. 16.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Capitis dolore.

**F**Amulus quidam capite supra modum dolebat, cum nulla remedia juverent, tandem ad collum, verbenam viridem aliquo modo tritam, ut ab adstantibus non cognosceretur, appendebam, idque nocte, dormiente & inscio, antequam malum invaderet, & astantibus mandabam, ne æger à somno solutus herbam collo suspensam dimoveret: qua cujus herbæ folius suspensione, miraculi instar, hic æger curatus est. *Verbena à collo suspensa amoveri non debet, nisi exsiccata tandem per se cadat. Petrus Forestus, observat. 52. & Scholast. lib. 9.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Capitis dolore.

**P**ro externo remedio laudo unum, quod & magis viri est, & ipsa etiam experientia comprobatum.

℞. Serpill. verben. ros. an. ℥ii. decoque in oleo communi in duplici vase, & hoc oleo inungat sibi caput ante & retro. Consilium etiam do, ut agrotæ caput ungatur spuma decocti primi ligni sancti. *Johann. Baptista Montanus. Consil. 20.*

Ob figuram capiti cerebroque æmulam, nux juglans capitis affectibus confert. Singulare inde ad dolores capitis remedium nuper in *Anglia* detectum, primo vero antequam folia in nuce juglande prorumpant, terram circa radices fodiunt, & ex radicibus incisis emanantem liquorem extrahunt, cujus aliquot guttas propinant magno cum successu, in doloribus capitis. *Thomas Bartholinus. Histor. 97. cent. 3.*



*Fernelius* affirmat se sequentium pilularum tantam vim experiendo cognovisse, ut nullam Cephalalgiam vel Hemieraniam offenderit, quam non curarit.

℞. Aloes opt. ℥℥. pulv. elect. de gemmis, trium santal. ros. rubr. an. gr. vi. cum Syrup. absinthii, & viol. f. Massa datur ℥i. bis in hebdomada, hora una vel duabus ante coenam, *Job. Crato. Epist. 14. lib. 5. conf. & Epist. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio Editorum.*

Agricola quidam cruciabatur sævissimo capitis dolore, contra quem atrocem morbum ego pauca hæc remedia adhibui.

℞. Aq. benedictæ. aq. fontan. an. ℥i. commixtas bibit, recteque ore atque alvo purgatus fuit, ac indies convaluit, sequenti die Cephalicam venam secui.

℞. Cancror. vivor. num. 20. aceti ros. ℥v. contundantur in mortario ut fiat Epithema: quod tepidè admovebatur sæpius affecto capiti statim ab initio curationis, ac ad relevandum cruciatum plurimum proficiebat. *Martinus Rulandus Curat. 73. cent. 1.*

In doloribus capitis quibuscunque imprimis usus aq. benedictæ ventriculo jejuno stata dosi exhibitæ multum prodest: purgatio fiat per diasenam laxativam, & mercur. dulcem.

In omni dolore capitis tanquam arcanum appropriatum aqua verbenæ destillata commendatur, sæpe assumpta, ad ℥iv. cum gutt. iv. Spiritus vitrioli.

Juvat etiam verberna tota contusa & capiti imposita, radix plantag. colle suspensa dolori capitis à proprietate medetur. Cæteris non proficientibus ad laudandum opiatum recurrendum est. *Io. Hartmannus. Pract. Chimiatri.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Capitis Doloze.

**I**llustrissimus princeps *Ianethinus Doria* Classis Hispanicæ præfectus afflictus est, in arce *Monspeliensi*, ubi bello captus detinebatur, febre hæmitrifæ, quæ inter cætera Symptomata, capitis dolorem gravissimum inferebat eumque

*Burnet Parte 1.*

continuum; & extra accessionem æquæ molestum, qui tamen post 4. phlebotomias in brachiis celebratas, eodem vigore perseverans, intra horam sublatus est sanguinis missione ex mallecolo dextro, tam promptus effectus observatione dignus fuit; ut tyrones videant, quam bona fiat revulsio à capite per Saphenæ apertionem. *Lazarus Riverius, observ. 40. cent. 3.*

Mulier quædam Fontinianensis atrabilario temperamento donata, annorum 40. post abortum non amplius passa est purgationes menstruas, indè gravissimus capitis dolor per 4. menses eam afflixit, nihil conferentibus venæsectionibus, hirundinibus fronti & temporibus admotis, aliisque remediis, vocatus ego præscribo apertionem arteriæ temporalis, quæ optimè celebrata fuit, neque sanguis saltu egrediebatur ob exilitatem arteriæ, & sanguinis crassitiem, sed guttatim; extractus fuit ad ℥v. ruber & floridus: tùm vulnus occlusum fuit emplastro ex sola mastiche, cum Ligatura simplici; postquam alia ligatura, quæ in vulneribus capitis solet fieri, per 5. horas adhæssisset; liberata est à dolore capitis sine recidiva. *Lazarus Riverius, observatio 56. cent. 2.*

Patronus quidam celeberrimus cùm circa merid. sese soli nimium exposuisset, correptus est paroxysmis febris tertianæ duplicis satis levibus, & circa vespèram recurrentibus; hoc tamen Symptoma in paroxysmo urgebat, nempe capitis dolor intensus, qui tribus primis diebus cum febre cessabat, matutinis horis. Interim secta fuit vena bis, & purgans medicamentum semel exhibitum, quibus non obstantibus dolor capitis & æstu plurimum increvit, & continuus factus est post quartam accessionem, ut aut grave hoc Symptomata tolleretur, venam frontis aperiendam consului: ex eaque sanguinis ℥vii. eductæ sunt, à qua venæsectione dolor capitis statim valde remissus est, & sequens paroxysmus multò levior rediit, cùm exiguo capitis dolore, at postero die manè doloris omnino expers fuit: *Lazarus Riverius, observ. 211. cent. 2.*

Conferunt hic plurimum pilulæ *Enstachii Rudii*, quæ in Italia olim magno in præ-



pratio habitæ sunt dof. *Ji. Lazarus Riverius, cap. 16. lib. 1. Prax. Medic.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *De Capitis dolore Lethalis.*

**C**Um essem *Lodovæ* invisi filiam Mercatoris 7. annos natam, quæ a duobus mensibus affligebatur gravissimo capitis dolore circa frontem & supercilia, qui singulis propemodum horis recurrebat, ita acutus, ut illa sibi cultro caput aperiri frequenter postularet. Jam verò à duobus diebus inciderat ter aut quater in paroxifimos Epilepticos cum spuma in ore, à Medico ordinario, præscripta fuere multa remedia, præsertim purgationes per apoze-mata, cucurbitulæ, & vesicatorium cervici, sed omnia frustra.

Cum essemus de hoc casu consilium inituri, relatum nobis fuit, eam novo paroxifmo fuisse è vivis ereptam, & post mortem puris aliquid per nares effluxisse. Inde conjiciendum fuit in cerebro abscessum latitare, sed eo aperto nihil inventum fuit, præter ferofum humorem in cerebri substantiam & ventriculos effusum.

Hic casus mihi in memoriam revocavit historiam cujusdam virginis quæ cum simili dolore per multos menses cruciata fuisset, multa remedia frustra tentasset, à quodam Chirurgo totum caput derafo capillitio, vesicatorio contectum est, instar Cucuphæ, & vesiculis excitatis, magna ferofi humoris copia effluxit, & ita liberata est, quod remedium huic etiam prodesse potuisset. *Lazarus Riverius, observ. 37. cent. 1.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### *Pro Capitis dolore.*

**V**ir quidam *Coloniensis* dolore capitis tam acerbo tamque immani laboraverat, ut domesticorum suorum per cubiculum gressus & passus ( quantumvis exuris calceis, & substrata arena per pavimentum cubiculi incessissent ) sufferre non

potuerit, videbantur enim sibi, quotiescunque ingredientium in cubiculum gressus perciperet, cultelli cerebro infigi. Post multa frustra adhibita remedia, ego in consilium adhibitus, ei setaceum suasi & applicui: hoc adeò feliciter successit, ut in dies manifestam doloris mitigationem persenserit. *Giul. Fabr. Hildanus, obser. 7. cent. 4.*

Chirurgus quidam *Ultrajectinus* implacabili dolore particulæ capitis laborabat, à nullis remediis juvabatur: tandem jussi cauterium potentiale admove-ri, curatus fuit citra aspectabilis mali aliquam effusionem, indicibili quadam qualitate vel aura sine dubio fatigatus is fuerat, in ea parte. *Johannes Heurnius, ad Aphor. Hippoc. 38. Sect. 4.*

Ego per terebrationem in plerisque cephalicam curavi.

Cum vir quidam nobilis annum egisset in summa doloris capitis acerbitate, me tandem ad se vocavit, ut sibi opem ferrem, ibi cum diffuso per totum caput dolore, certo dignoscere non possem; in quonam loco stabularetur humor mor-bificus, ut conjectura id investigarem, derafo capillitio, toti capiti cataplasma curavi admovendum: hinc post aliquod tempus, motum Cataplasma, in una parte magis desiccatum apparuit; unde facile deprehendi, in ea capitis parte latitare causam dolorificam, quam pars Cataplasmatidis magis exsiccata contegerat, tum terebra caput perforari præcepi. Sed postquam ad diploem usque, excisa scilicet superiore cranii lamina, perventum est, magna statim humoris, colore atque consistentia, mellei copia foras erupit, indeque dolor quievit, & per Dei Misericordiam sanatus homo, adhuc usque diem aura & luce vitali fruitur. Erat autem abscessus ille intra utrumque os calvaria consistentens, vera μέλις, quæ à melle nomen habet. *Ludovicus Duretus in Annotat. ad cap. 2. lib. 1. Jac. Hollerii. De morbis internis.*

Nobilis juvencula Patavii ultra annum dolore capitis veluti perforante ac fixo mirè cruciabatur. Medicus, quod erat suspicatus aliquid membranæ incumbere, bono eventu cranium terebra tentandum



cessit, ipso enim aperto, puris foetidi guttula vix æquans milii granum excidit, neque ex eo dolor unquam molestus fuit. *Joh. Rhodius. observ. 69. cent. 1.*

Illustris quædam domina implacabilibus capitis doloribus tenebatur; suspicabatur humorem esse frigidum, rebellem, efferatum tamen, & jam in flatulentam naturam versum. Sectæ sunt venæ brachiorum, purgatum corpus, vesicæ scillæ admotæ lacte plenæ, nil proficitur: tandem interbastantur Sacculi semine lini pleni, vino & aqua incoquantur, applicantur, dolores cessant, non longè post repetunt, eadem usurpantur: tandem cum nil proficeretur, sæpè adhibentur galli extenterati, miraculo convalescit. *Guil. Ballonius. lib. 1. Epidem. & Ephemerid.*

### SUBSECTIO SEPTIMA.

#### *Pro Capitis dolore à verme.*

CUM multi ignoto morbo vita decederent, tandem Medici unum hoc morbo interemptum inciderunt, & in ejus cerebro invenerunt, vermem rubrum brevem, quem cum multis medicamentis vermes occidendi vim habentibus occidere non possent, tandem frustra raphani incisa in vino malvatico ebulliebant, quo vermis occidebatur, atque hoc eodem remedio deinde simili morbo quasi epidemico affectos omnes curabant. *Petrus Forestus, Schol. observat. 2. libr. 9. De variis capitis doloribus.*

Excipiatur naribus & ore hiantes talis fumus.

℞. Cent. min. marrub. beton. an. ℥ii. zedoar. ℥ss. angelic. Succin. an. ℥ii. antim. crud. ℥i. minit. ℥ss. boli armen. ℥i. Aristol. rot. ℥ii. absinth. ℥iii. M. F. pulvis carbonibus inspergendus. Loco dolenti applicetur hoc Emplastrum.

℞. Aloes, pulv. lumbric. cujuscunque descript. an. ℥ii. fell. taurin. ℥i. absinth. ceræ, an. q. s. f. Ceratum, quod Emplastrum cum applicuisset, & fumum naribus ter quaterve excepisset, servus ille apud *Hildesheimium*, vermes lanuginosi vivi 13. per fauces, nares, & aures prodierunt, at-

que dolores remiserunt. Per nares etiam excipiatur vapore lacte ut ita vermes exeant, commendatur & tabaci succus, & fumus naribus attractus ad vermes in capite occidendos. Cognoscuntur vermes ex dolore diuturno nullius remediis cedente, maximo præsertim cum caput movetur, & lancinante: foetore, qui per nares & os exhalat, sternutatione, sequenti vertigine. *Daniel Sennertus. cap. 18. p. 1. lib. 1. pract.*

### SUBSECTIO OCTAVA.

#### *Pro Capitis & Brachii dolore ab humore pituitoso, in Comitissa quadam.*

PRO potu utatur hydromelite, fiat ex 12. partibus aquæ & una mellis optimi, coquatur ad consumptionem quartæ partis; decocto adhuc calido existente, infundatur hyssopus, Salvia, coriandrum, cinamomum & id genus alia, contusa vel concisa & tenui Syndone involuta. Statim à cibo hujus pulveris capiat cochlear unum, & non superbiat,

℞. Coriandr. præpar. ℥ii. sem. fœnicul. anis. mastich. an. ℥ss. menth. hortens. cinamom. gran. myrti, liquirit. an. ℥ii. cortic. citri ℥iv. sacchar. ros. tabul. ℥x. pulveris subtiliss. & misceantur. Hic pulvis concoctionem adjuvat, stomachum roborat, & flatu discutit, caput exsiccatur, cerebrum confortat, & catarrhos sistit.

Purgato, ut decet, corpore, summo perè laudarem, ut per aliquot dies decocto ligni guaiaci uteretur in hunc modum.

℞. Ligni guaiac. lima attriti ℔i. aq. ℔xii. Infunde per 24. horas. Deinde coque lento igne ad mediæ serè partis consumptionem; sub finem coctionis adde uvarum Corinthiac. ℥ii. liquirit. ras. ℥ss. Hujus decocti colati accipiat manè hora quinta ℔ss. & cooperta sollicitet sudorem, somno maximè si potest. Absterge diligenter manè circa 8. vel 9. horas, fricetur, & deinde surgat. Hora decima prandium sumat, quod velim esse parvissimum, nimirum ex unica aut altera



avicula assa, vel ex paucis bucciscarnis alicujus assæ, cum paucis uvis passis, & modico vino egregiè diluto à prandio prospiciendum ne somnus obrepat. Hora deinde quarta decumbat, assumat eandem quantitatem decocti, sollicitet sudorem; post sextam si placet exurgat è lecto, & paulò post cœnet, sed multò minus quàm in prandio; quare carnibus abstineat, & assumat solum aliquot amygd. vel uvas passas, cum paucobiscocto pane, & vice potus, bibat secundum decoctum. Tempus determinatum quo fieri velim hanc curationem, & diatam fervari, nullum præscribo; sed si solum in dies 3. vel 4. fiat, non poterit non egregiè prodesse, & quo longius protrahatur, eo fuerit consultam magis: interrim ad roboranda membra, utatur hoc electuario nucis magnitudine summo manè superdormiendo.

℥. Theriac. bonæ vel mithridat. vel aureæ alexandr. ℥i. conserv. ros. ℥iv. conf. flor. salv. ℥ii. M. mirum quam hoc omnibus membris conferat, caput exsiccat & roborat, ventriculum & hepar confortat, uteri etiam lætæ affectibus utilissimum est. *Reinerus Solenander. consil. 56. sect. I.*

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

### *Pro Capitis fluxione.*

**P**urgato evacuatoque toto corpore, & aliqua ex parte capite ipso, ad peculiarem cerebri purgationem per masticatoria & errhina proprius accedendum.

℥. Sem. nigell. rom. sem. anis. coriandr. an. ℥i. pyrethr. cariophyll. an. ℥ss. mastich. ℥ii. M. pulveris. omnia, & cum cera F. Masticatorium. vel

℥. Agar. ℥ss. pulv. diamb. gr. vr. cubeb. lign. aloes, an. ℥i. M. & cum aq. Iridis. F. trochisci siccati in sole, commansi jejuno ventriculo.

Caput purgant & roborant simul. Purgant etiam cerebrum errhina in hunc modum.

℥. Aq. Majoran. ℥iii. pulv. mosch. gr. ii. F. errhinum, vel majoranæ succus depuratus per pares è vela manu stepidus deducatur.

Ad firmandam capitis fluxionem his utere.

℥. Diatraghacanth. frigid. ℥ii. boli arm. imparatæ ℥i. terr. sigillat. ℥i. cum Syrup. papav. vel myrtino. F. pilulæ parvæ in ore continendæ hora somni. vel

℥. Boli armen. lotæ cum aq. ros. terr. sigillat. lotæ cum decocto papav. an. ℥i. diatragacanth. frigid. cum ovi album dissolut. ℥ss. M. & cum Syr. de rosis rub. sicc. q. s. F. pilulæ, quarum unam vel duas dormiturus ore contineat. *Joh. Zecchius, consult. 72.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### *Pro capitis gravedine, à fluctuatione in eo à pituita & serosi humoris copia.*

**N**obilis quidam strenuus & robustus, lautè vivens, & intemperanter, de capitis gravedine conquerebatur, apoplexiamque ne perveniret, admodum metuebat, utque eam præveniret, ad me consilii causa venit. Narrabat jam diu se in capite pondus aliquod sentire, & veluti fluctuationem, sensumque aliquem, atque si caput magnum, & cavum esset, & se nonnunquam aperiret, rursumque marsupii alicujus instar, constringeret, remittere interdum malum, aliàs exacerbari; per cætera bene se habere, nisi quod totus esset melancholicus, & ad omnia munia obeunda, segnis & tardus; à pituita & serosi humoris copia, intra calvariam collecta, hæc proveniret. de multis circumstantiis interrogans, deprehendi & judicavi. Cum itaque in omnibus se obtemperaturum pollicitus esset, statim curam aggressi sumus.

Primum hoc minorativum propinavimus.

℥. Diaphan. ℥ii. diacathol. ℥ss. syrup. ros. solut. ℥i. aq. cinamom. parum F. potio; deiecit aliquoties. Sequenti die vena aperta fuit brachii, erat enim corpore quadrato, & plethoricus. Diebus sequentibus hoc apozemate usus est.

℥. Rad. fœnic. ℥i. rad. Ircos, ℥ss. aconii veri, Cyperi, enulæ, an. ℥ii. liquirit. ℥vi. fol. fœnic. verben. beton. fumar. euphras. an.



an. Mi. thymi, hyssopi, an. Miß. flor. stœchad. anthos, borrag. an. pi. sem. fœnic. ℥ii. sem. carvi, anis. fœsel. filer. montan. rutæ, an. ℥i. passul. par. x. Sen. ℥ii. polipod. sem. cartham. an. ℥i. F. decoctio in colat. q. s. pro iv. dosib. infunde agaric. trochis. ℥ß. turbith. ℥ii. rhei ℥iß. cinamom. ℥ii. spicæ ℥ß. in express. add. sacchar. q. s. aromat. cinamomo. F. Apozema bibat 4. matutinis. Singulis vicibus admodum deiecit.

Interea cucurbitulas in utroque latere ternas in collo & Scapulis cum flamma, matutino tempore apposuit, tribus vicibus & quartam scarificationem simul adhibuit ut hæ naturam quoque unâ cum purgantibus, ad revulsionem materiei à capite sollicitarent & adjuvarent, absolutis hisce sic purgatus fuit.

℥. Rad. Ireos ℥ß. rad. liquirit. ℥i. fol. salv. majoran. an. Mi. flor. lavendul. anth. an. passul. enucl. ℥i. sen. ℥ß. sem. anis. ℥i. sem. cartham. ℥ii. F. decoctio in colat. ℥v. dissolv. el. de succo ros. & diaphæn. an. ℥iß. syrup. ros. solut. ℥i. F. potio. addendo parum aq. cinam. egregiè rursus purgatus fuit, & levamen in capite sentire cepit.

Errhinum deinceps aliquandiu è manu naribus attraxit.

℥. Succ. majoran. rad. betæ, fol. anagallid. an. ℥ß. pulv. rad. pyrethr. ℥i. vini albi ℥ij. Misce.

Tabulas sequentes de nuce moschata ℥iß. quantitate matutinis aliquibus sumpsit & aqua majoranæ & menthæ, vino permixtas, superbibit.

℥. Nuc. mosch. numero 3. vel ℥ß. rad. pyrethr. ℥i. fol. majoran. salv. flor. Lavend. anthos an. ℥ß. sem. nigell. ℥i. Cinamom. ℥iß. Cariophyl. galang. an. ℥ß. sacch. in aq. salv. solut. q. s. F. Tabellæ ad cerebri & nervorum corroboracionem, & frigida intemperiei eorum correctionem utilisimæ.

Finito prandio pulvere digestivo usus est. Cucupham noctu capiti imposuit sequentem.

℥. Rad. Ireos. angelic. an. ℥ii. acori veri, cyperi, an. ℥i. fol. maior. rorismar. flor. ros. lavend. an. ℥ß. nuc. mosch. Caryophil. an. ℥i. sem. coriand. præp. ℥iß. sem. nigell. ℥ß. F. pulvis pro cucupha. Cum

iam omnia salva essent, discedenti ut elect. hoc alternis diebus manè uteretur, consulvimus.

℥. Conserv. maioran. flor. stœchad. an. ℥iß. ros. ℥i. anthos ℥vi. cort. citri condit. zinzib. condit. an. ℥ß. pulv. rosat. novell. pliris archont. an. ℥ß. cinamom. ℥ii. cum syrup. de beton. F. electuarium. Per vices purgetur ut ante. Interea ut laudata victus ratione uteretur, decenter se exerceret, imperatum: & in balneo sicco hebdomadatim ieiunus sumpto prius rob de Samabuco, sudaret. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 363.*

## SECTIO VIGESIMA.

### Pro Capite tuberoso.

**V**Idi cui erat totum caput tuberosum, cauterio id ad os usque aperuimus: quod exsumerat, ferè usque ad diploen abrasimus sensim: iterumque aliam partem aperiebamus ad os, ita sensim totum ferè caput eius abrasimus, evasit: huiusmodi ossis caries in lue venerea sæpe evenit. *Job. Heurnius, ad Alpor. 2. Section. 7.*

## SECTIO VIGESIMA PRIMA.

### De Carbunculo.

**C**arbunculus (καρβυκλή; Græce dictus, quo accensi instar carbonis nos adurat) est tumor inflammationi affinis cum vel sine pustulis ex sanguine adusto ferventissimo partem corrumpente ortum habens. Causa coniuncta est atra bilis malignitatis particeps. Generatur in corpore à prava victus ratione, succedente venenata acris constitutione, quæ preparatum iam corpus attingens, contractæ prius cladis hunc quasi characterem inurit.

Alius est pestilens, alius non, omnis tamen malignus; qui sine pulus oritur, pruna: qui cum iisdem, ignis Persicus dicitur. Dignoscitur quod non semper eandem occupet sed modo hanc, modo aliam partem obsideat: ut plurimum oritur à pustula exili, seminis mili-



magnitudine præcedentibus pruritu, ardore, & dolore vehementi, ægrum ita, & præcipuè circa vesperam vexantibus, ut à frictione partis vix manus continere queat, ardoris vi sensim incrementum, crusta aliquando nigra, aliquando cinerea, quasi ab ardente ferro obducitur; caro etiam circumvicina ipsi consentiens summè inflammatur. Valida adest febris, adfunt & nausea, vomitus, appetitus dejectio, tremor, cordis palpitatio, & animi deliquia. In pestilenti carbunculo adfunt omnia hæc symptomata, sed quàm in alio, multò graviora.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Carbunculo Benigniore.*

**P**rimò secetur vena è directo partem affectam respiciens. Deinde supra locum affectum scarificatio rectè accommodatur, plagis ob succi crassitiem altioribus. Sunt qui præcipiant ipsos scarificatus in crustaceo ulcere duntaxat esse faciendos: ipsas verò incisiones aqua falsa calente statim perfundunt, ne in illis sanguis coeat & concreseat, sed foras egrediatur. Interdum etiam erodens medicamentum imponunt, cujusmodi est. Arsenicum, quod ea in re inter cætera principatum obtinet. Caterum laboranti particula valde repetentia haud quaquam admoveri debent. Adhibenda quidem sunt remedia, quæ modicè reprimendo, etiam dissipare & digerere possint; cujusmodi est cataplasma ex arnoglōsa, quod sic paratur.

℥. Arnoglōss. lentium, panis furnacei an. part. æq. coq. in aqua, his gallas *Avien.* addit. Alii ex foliis plantag. coctis, lentè cocta, pane clibanite, & oleo rosac. conficiunt. (Panis clibanites ex *Galeno* erat valde laudatus; quoniam summa coctus diligentia, ita ut omni sui parte crustam referret) ut verò radicitus carbunculus divellatur ab adjacentium commercio hoc sequens probatur.

℥. Malum punicum acidum, malum punicum dulce, hordei Mj. fol. plantag. Mj. coq. in posca donec rumpatur hordeum: & contundantur. Postea adde pulv. mali cydonii sub prunis cocti, vel al-

terius mali acidi, & F. Emplast. Item nucis avellanæ veteris vel etiam non veteris medulla carbunculos maturat & rumpit. Alii nucleos juglandis viridis idem posse contusos cum carnibus cydoniorum vel aliorum malorum acidorum contédunt. Optimum autem fuerit perpetuò circumjacentibus partibus unguentum ex bolo armen. rosaceo vel myrtaceo oleo & acetu confectum inducere, ne scilicet intro, qui jam fluxit humor recurrat. Supra verò ipsum ulcus crustosum valens aliquod medicamentum & quod vehementer exsiccat imponendum est. In communi usu est unguentum *Ægyptiacum*, si hoc parum proficiat, ad acriora & quæ ignis vires habeant deveniendum erit; cujus generis sunt radix dracunculi vel aristolochiæ ex aceto trita & imposita, calx, arsenicum, & Sandaracha. Hæc proficiunt satis, si protinus à viva corrupta partem resolvant: quo facto quid corruptum est & emortuum, quamprimum avellere & radicitus extirpare oportet. Caterum cogimur aliquando (victis scilicet malo medicamentis) malignum carbunculum cauterio actuali extirpare: finis adurendi est, dum ex omni parte sensus doloris est, post hæc crusta ulceribus inducta auxiliis ad id accommodis resolvenda est, ut hoc Emplastro.

℥. Farin. hord. frumenti an. ℥ij. decoct. malv. viol. rad. alth. an. q. s. butyr. rec. a-xung. suill. liquefact. an. ℥ij. F. Emplastrum cui ab ebullitione remoto addantur duo ovorum lutea. Post Crustæ ablationem, locus mundetur & detergatur hoc medicamento.

℥. Terebinth. ℥iii. syrup. ros. solut. ℥i. mellis ros. ℥v. bulliant simul q. s. & ab igne ablatis addatur ovi luteum, farin. hord. & frumenti, an. ℥vi. M. purus factus locus implentibus medicamentis curari debet. Consolidamā majorem inter duos lapides contrita, divino quodam (ut referunt) miraculo anthracem sanat, & ex toto intra diem unum interimit. *Petrus Forestus. Schol. observat. 11. libr. 1. Observat. Chirurg.*

Monialis quædam passa est Carbunculum in pede malignum & sævum. Post multa frustra ab aliis tentata remedia, hanc ita sanavimus.

℥. Stercor. vaccin. lbj. aceti ℥ij. ol. ros. fat.



fat. ℥iv. croci ℥ss. M. pro Emplastr. quod singulis tribus horis applicabatur tepidè, hoc mitigatus dolor, extractus calor, remotus tumor, & morbus extirpatus est. *Martinus Rulandus, curat. 85. cent. 10.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Carbunculo in Muliere in inferiori labri dextri parte.*

**A**D eam secundo die vocatus, venam tundere jubeo è directo partibus qua malum infestabat, plurimumque sanguinis detraho, quod & bene habita & ætate florens, & viribus pollens ægra erat loco deinde in quo carbo infidebat prius scarificato, tale imposui medicamentum.

℥. Vitel. ovor. numero 2. rutæ virid. & Scabios. (à proprietate namque carbonibus prodesse omnes volunt) an. Mj. ficuum sic. numero 6. fermenti acris, ℥j. piper. ℥j. Pistentur omnia, & informam Cataplasma. reducantur: admoveri jubebam pustulæ: quod biduo carnem putrem à sana diduxit. Item hoc altero usus sum.

℥. Succor. Symphit. maj. scabios. & calendul. an. ℥i. theriac. el. & veteris ℥iv. (venenum namque ad se trahit) sal. ℥i. ovi vitell. duo incorporentur simul & applicentur. Hoc apud me arcanum est, nec me unquam fefellit.

Calendulæ namque succus mira proprietate ad carbonem pestilentemque bubones valet, ut *Alex. Benedictus* de peste testatur. Escharam poro ex adipe suillo, butyro loto, farina triticea, cum basilicone unguento decidere feci.

Postea verò amota escharam, ulcus detergi hoc unguento.

℥. Succ. Calendul. absinth. scabios. & apii, an. ℥i. myrrh. el. rad. Irid. flor. aloes, sarcocol. an. ℥i. (vel potius ℥i.) mellis rosac. ℥ij. F. Linimentum. Optime detergit, & carnem generat. Locis circumjacentibus repellens adhibui.

℥. Unguenti de bolo, ℥vi. omnium Santal. ℥ss. pulv. myrtill. & ros. an. ℥ij. ol. ros. & myrtin. an. ℥ss. aceti ro-

fac. ℥ij. album. ov. num. i. agitentur simul. F. Linimentum, Hisce integre sanata fuit, sed deformis remansit contorto ore. *Franciscus Valeriola observ. 3. lib. 6.*

Tangere sæpe anthracem in die cum sapphiro, & tenere sapphirum supra locum an thrace affectum plurimum confert. *Arnoldus Villanovanus, Practica lib. 3. cap. 22.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Carbunculo Pestilentiali.*

**A**T virulenta materia tuto & citò suppuretur, necessarium erit, ut Angeli Salæ emplastrum attractivum ruptorium pestilentiale sit in promptu, quod ita fit.

℥. Gummi Sagapen. ammoniac. Galban. an. ℥ij. terebinth. coctæ, ceræ virgin. an. ℥iv. magnetis arsenical. subtil. pulver. ℥i. rad. aronis pulv. ℥i. gummi depurentur cum aceto Scyllitico & ad consistentiam emplastri coquantur; & postea ponderentur; deinde cum rebus aliis F. S. A. Emplastr. quod excellentissimum & specificum est ad extrahendum virus pestiferum ex profunditate ad extra, præcavendo ne vicissim ad interiora regurgitet, & cor ipsum suffocet, ut credam inter omnia topica simile remedium non inveniri.

Hoc emplastro Carbunculus obducatur quod paucis horis venenum extrahet. Præparatio magnetis arsenicalis antea dicti talis est.

℥. Arsenic. cristallin. sulphur. vivi, antimon. crudi. an. part. æq. hæc tria in mortario ferreo pul. dein in vase fortissimo vitreo ponantur ad ignem arenæ, donec vitrum optimè incalescat, & prædicta solvantur, atque liquentur instar picis; quod observabitur, quando filum quoddam immittatur ad fundum, quod extractum postea instar tereb. trahetur, ubi satis coctum erit. Postea remove vitrum ab igne, & ubi refrigeratum est, rumpe, & subtiliter petram istam rubicundam, quam invenis, pulverisa, quam ad usum serva ut supra. *Greg. Hor-*



*Horstius, observatio 32. lib. 7.*

## SECTIO XXII.

*Pro Cardialgia cum impedimento veluti bolo in faucibus.*

**C**UIdam sc̃eminæ, de dolore stomachi cum nausea, ac difficultate aliqua deglutiendi, ac si buccella in faucibus hareret, jam longo tempore conquerenti, cum sæpe varia ac inter reliqua etiam vomitoria exhibita, nihil affecissent, illaque unicè vomere cuperet, & adhuc robusta esset, dedi aquam destillatam ex nucibus viridibus, cum raphano prius in aceto maceratis, qua alias vomitum movere solutus eram sed in illa nihil effecerat, itaque addidi vini albi, in cujus ℥ij. stibii vitreati pulv. gr. iij. macerata per noctem fuerant, ℥iſs. ut biberet, quo facto copiosissimam materiam quinques evomit, & postea ab ejusmodi cardialgia & impedimento in faucibus, penitus liberata est. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 438.*

Matrona quadam honesta ac pia, cum ultra annos duos de dolore ventriculi conquesta fuisset, nec ullis remediis ventriculum roborantibus, aut per inferiora purgantibus sanari potuisset: tandemque ex consilio Medici cujusdam celeberrimi, vomitivum acceperat, frustum corii laridi fumo exsiccati, quod ante duos annos in opinanter cum difficultate tamen deglutierat, maxima cum admiratione adstantium evomit, & brevi plenissimè convaluit utinam semper causæ morborum tam faciliè debellari possent. *Guil. Fabricius Hildanus. observatio 33. cent. 4.*

Filiolus meus Cardialgia seu passione cardiaca, infantibus familiari malo, affligebatur; illi secretum experimentum nostrum magno cum fructu applicatum est.

Mucago. sem. Cydonior. misceatur cum pingued. Gallinæ, atque hoc linimento ter in die ungatur orificium stomachi, deorsum versus costas spurias. In plerisque sequitur hanc unctionem dejectio excrementorum virescentium &

foetidorum quæ Cardialgia cessat. *Her. Reusnerus, observ. 71.*

Quidam Cardialgia laborans; infumpto sequenti haustulo, statim sanus factus est, nam multo acres, mordaces, & virulentos humores, qui juxta os ventriculi obhærebant, vomitu projiciebat.

℥. Aq. benedict. nostr. ℥iſs. vini absinth. ℥iſs. M. F. haustulus, quo solo sanitatem recuperavit. *Martinus Rulandus, curat. 50. cent. 5.*

## SECTIO VIGESIMA TERTIA.

### De Carie Ossium.

**C**ARIES Græce *τερυδω*, est solutionis continui in osse species ab erosione facta. Causa est humor acris & erodens.

### SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Carie ossium, ubi de Euphorbii usa.*

**I**N Ulcerum curatione nihil fermè occurrat quod Chirurgo majorem pariat molestiam, atque plus negotii facessat, quàm si ulcus cariem in osse sibi adjunctam habeat, præcipue si profunda fuerit; propter humorem ossi imbutum, ad hujus autem humoris exsiccationem & ossis decidentiam tum ab antiquis, tum neotericis. Medicis, ac Chirurgis præstantius cauterio actuali nihil excoGITatum est, quo & ego non rarò maximo cum fructu, usus sum. Post cauterium actuale euphorbium hoc in casu secundum sibi locum vindicare faciliè concedo quandoquidem non solum quia acre est & calidum in quarto gradu, humores ossi imbutos exsiccat sed videtur occulta quadam facultate hic convenire, non immeritò itaque à *Dioscoride*, *Avic.* & recentioribus Medicis in cariosis ossibus præ aliis medicamentis celebratur. Ego etsi hætenus in cariosis ossibus euphorbio maximo cum fructu usus fui; una tamen mihi occurrit difficultas, nimirum an verum euphorbium, cuius *Dioscor.* mentionem facit, ho-



hodie ad nos advehatur ? Scribunt enim *Dioscor.* & *Avic.* beneficio euphorbii cariem uno die abscedere, id quod nostrum vix spatio 40. dierum præstat, neque proximam carnem adurit, quemadmodum *Dioscor.* & *Avic.* de suo euphorbio scribunt. Hinc verisimile est, aut textum *Dioscor.* adulteratum esse, aut euphorbium antiquorum apud nos non extare. Cæterum *Dioscor.* & *Avic.* monent, ut si quando quis euphorbio uti voluerit, propter ejus summam acrediem atque caliditatem, os circumjacentem carnem linimentis aut ceratis diligenter ac probè communiat, ne contactu carnis inflammationem excitet.

*Vesalius* in sua Chirurgia, & *Fallop.* in tractatu de ulceribus non minus hac de re solliciti sunt. Hinc factum ut à multis annis Euphorbio uti non ausus fuërim propter metum inflammationis aut doloris; deinde non exigua erat molestia, circumjacentem carnem, quotiescunque ulcus curare necesse fuit, ita diligenter munire. Paulatim tamen experientia, contrarium me docuit, nimirum Euphorbium nostrum etsi linguam & nares vehementer vellicet, in ulceribus tamen etiam si copiosè eis inspergatur nullam inflammationem aut dolorem excitare; scilicet itaque cum successu in ossa cariota carne denudata, etiam imminutis ulcerum labris, quotidie aut alternis diebus eò insperso utor. Ante aliquot annos cum hæc coram Dom. *Abele Rescio* Medico doctissimo narrarem, miratus fuit. Quapropter petii, utile ipsemet Euphorbium ex officina pharmaceutica sibi eligeret, & in pulverem redigi curaret, quo facto puerum 14. annorum natum, & ulcere in anteriore parte cruris (in quo anterior pars ossis tibiæ longitudine spithamæ denudata erat) laborantem accessimus, tum temporis ulcus implevi pulvere Euphorbii, deinde filamentis siccis & emplastro diapalmatis superimpositis; in alterum usque diem reliqui, quo denuo Medicum ad agrum duxi, qui dum nullam, neque pulsus neque urinae mutationem perciperet, multo minus dolorem aut inflammationem aliquam adesse videret, rei novitate obstu-

puit, quod oculari demonstratione viderit, Euphorbii sævitiam atque acrimoniam in ulceribus tantam non esse, sicuti à doctissimis Medicis divulgatum atque proclamatum. *Guil. Fabricius Hildanus, obser. 92. cent. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Carie ossis cum ulcere.*

**P**uer 15. annorum vlcus habebat vetustum in metapedio, quod a perito Chirurgo per annum integrum curari non potuit, alter Chirurgus junior, qui postmodum æger commissus fuit, dilatato ulcere cariem percipit, pulverem Catagmaticum imponit ad tollendam cariem, sed frustra. Postea oleum Sulphuris, admovet, & frustra, postea me consulit, jubeo imponi prima applicatione pulverem Euphorbii cum plumaceolo ex linteolo detrito facto, multæ educuntur exiguæ ossium Squillæ Secundo die Plumaceolum nudum admovet, tertio die eundem pulverem denuo applicat, & plures iterum Squillæ egressæ sunt, ut deinde os mundum & à carie repurgatum apparuerit, atque ulcus post modum intra breve tempus curatum fuerit. *Lazarus Riverius. observ. 76. cent. 2.*

Ossibus cariosis mandibularum ut ignis & ferrum, item oleum vitrioli, & aqua fortis adhibeantur, non suadeo, idque propter gravissimas causas; sed inspergantur pulveres radic. Aristoloch. rot. Irid. flor. angelic. thuris, corticum pini & similium, quæ separationem ossium cariosorum accelerant, aut misceantur cum succis prædictis & melle rosæ. ad formam linimenti, quod si mandibula aliquo loco extra os deundata fuerit, applicarem pulverem Euphorbii quod mirandas habet proprietates in hoc casu. Ulceribus tamen in ipso ore existentibus; quia inde ad linguam & fauces facile pervenire potest, ut inspergatur non suadeo. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 21. cent. 4.*

Commendatur in hoc affectu *Benedicti Bolo-*



*Bolognini*, unguentum ex agarico in hunc modum.

℥. Salis, agaric. tartar. an. pt. xq. f. pulvis & cum melle unguentum. Si ita non possit os desquamari, cariesque tolli, ferrum candens (quod quamvis ipsa bile amarius videatur medicamentum, ipso tamen sanguine dulcius ob commodum quod insequitur existit) sine cunctatione adhibendum. Extremis namque morbis extrema secundum *Hippocr.* appropriata conveniunt remedia. *Matthias Glandorp. cap. 25. lib. de Paronychia.*

## SECTIO XXIV.

### De Carie Gallica.

**C**aries Gallica ulcus est in pudendo malignum, ex scedo concubitu contractum.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Carie Gallica in pudendo.

℥. **A**Q. plantag. ℥v. pulv. Squammæ aris adustæ & lotæ ℥i. M. F. injectiones in virgam per Syringam tepidè. Hoc medicamentum facultatem habet exsiccandi sine morfu, eo melius habere cepit, & cum minore dolore & ardore mingebat, quia tamen perseverabat sanies & ardoris sensus, recurrimus ad præcipitatum quod omnium medicamentorum optimum pro sananda carie-gallica jure merito censeri debet, & ut moderatius fieret medicamentum, cum butyro recenti miscuimus in hanc formam.

℥. Præcipitati correcti & præpar. ℥i. butyr. rec. ℥i. M. quo intingebat linteolum angustum & stylo obvolutum intra virgam mittebat, & ad partem affectam applicabat, extrahendo stylum & relinquendo linteolum, ita tamen ut pars linteoli foras penderet ut extraheretur. *Rodericus à Fonseca. Tom. 5. Consult. 39.*

*Fernelius* describit aquam mirabilem, ad cariem malignam, quam vocat divinam. *Etica.*

℥. Sublimati opt. gr. xii. aqu. plantag. ℥vi. recoque supra cineres calidos in phiala

vitrea ad dimidias. Hoc liquore styli acumen illinatur, ut postmodum attingantur ulcera bis vel ter indie supra posito unguento de tutia. *Rodericus à Fonseca. Tom. 1. Consult. 59.*

Vidi quendam patientem Carolos (i. Cariem) in virga; accepi lac mulieris tepidum & ablui membrum & sanatus est, aliquando etiam curavi ulceram virgæ cum succo millefolii, & aliquando cum succo summitatum Sambuci, pulvis cariei ligni multum etiam prodest, maximè verò salicis. Ego *Marcellus* curavi multos patientes Carolos & ulcera virgæ cum tumefactione præputii, & dolore vehementissimo, primò facta purgatione, & diæta, & defensivo supra posito, & cum oleo rosato ungendo. Cum Syringa injicio intra præputium lac vaccæ, capræ, vel si habeam, mulieris ab uberibus multum, tepidum. *Marcellus Cumanus, observ. 20. & 21.*

In hospitali *Pisaurensi* mulier quadam carnosam quandam excrecentiam ab inguinibus nascentem, pondere ferè viginti quinque librarum, patiebatur: quæ non minus illi inter crura pendebat, ac rames intestinalis, qui viris sæpe evenire contingit, & sacci instar inter crura pendet. Hæc cum à me visa esset, paucis interjectis diebus diem suum obiit; quam mihi cō, convocatis undique Medicis & Chirurgis, dissecuimus, & prominentem carnositatem dictam per medium scivimus, in qua nec intestina asservabantur, ut nonnulli putabant; nec intus uterus continebatur, ut alii credebant, sed nec in ea aquo sitas aliqua erat: sed tota ipsa caro, pendula erat, alba, pituitosa, ubera carnem præ se ferens. Intra annum pendula hæc admirandam magnitudinem accepit. Hujus jecur ita magnum & crassum videbatur, ut sex æquaret libras, nulla in eodivisione conspecta. *Amatus Lusitanus, curat. 88. cent. 5.*

## SECTIO VIGESIMA QUINTA.

### Pro Carne superflua.

**E**Go uti soleo linamentis excerptis ita paratis.

℥. Aq. plantag. ros. Solan. an. ℥iv. opit. ℥i. medullæ panis, ℥ii. Mercurii sublimat.



Div. sublimatum supra porphyritem teratur: deinde M. & bulliant ad medietatis consumptionem, & colentur per pannum crassiusculum. Fila excerpta bulliant aliquandiu in hoc liquore, postea eximantur, exprimantur, siccantur ac servantur ad usum. Sepiasarii nostri in officinis ad manus habent alumen nistum quod optimum est, Squammam æris, æruginem æris, pulverem Hermodactylorum, pulverem Asphodelorum, præcipitatum omnium optimum, quia agit sine dolore. Ex compositis unguentum Ægyptiacum, Apostolorum & isidis, quæ omnia carnes superfluas exedere solent. *Gabriel Fallopius, cap. 18. Tract. de Ulceribus.*

## SECTIO VIGESIMA SEXTA.

### *De Carne Latris ablata, & restituta.*

**A** Bitinere *Brasilienſi* ad nos redux Chirurgus haud vulgaris experientiæ; & juſſu regio à nobis examinatus, sancta fide asseveravit, ictu tormenti ablatam esse, nauclero in navi, qua vehebatur, magnam carnis portionem in sinistro hypochondrio, ut hiatus manifesto viscera interiora illa se paterent; se verò carne vervecina, quæ fortè ad manuserat, læsum locum replevisse, & hac Chirurgia Sanitati hominem restituisse. *Thomas Bartholinus. Hist. 53. cent. 6.*

## SECTIO VIGESIMA SEPTIMA.

### *De Carunculis in meatu urinario.*

**Q**Uæ Gonorrhæa laborant ulcera patiuntur in meatu urinario, quæ si negligenter tractentur, caruncula, seu ex crescentia quædam carnea ex iis exiit, difficultatem inferens urinæ. Dignoscitur malum, quod tenuem Urinæ cursum effici, nec ut in sanis urina pleno foramine ac fluore prorumpit, sed quodam quasi filo, exit, adhuc dolor inmiſſionis finem crudelius quam dum urina profluit discutiatur. Exploratur etiam Cathetere immisso.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Carunculis in collo vesicae.*

**24. V** Iridis æris, auripigmenti, vitrioli, alumin. roch. an. ℥ii. omnia hæc aceto acerrimo pertusa inter duos porphyrites lapides, quàm accuratissimè ducantur, in lævoremque tenuissimum redantur, & soli æstivali exponantur. Hæc rursus sic exsiccata aceto affuso ducenda sunt & læviganda solique exponenda, quousque pulvis subtilissimus evadat, & ab iis omnis prorsus acrimonia extincta sit, quod opus 8. dierum spatio conficies, hoc parato pulvere.

24. Ol. rosac. ℥iv. Litharg. ℥ij. ad ignem f. coctura quousque Emplastri acquirat consistentiam, tunc ab igne deposito, adde prædicti pulveris. ℥ij. & spatula M. & ad ignem omnia tractato, quousque medicamentum duriusculum evadat, ita ut si candelæ cereæ vel plumbeæ virgulæ hæreat, non diffluet etiam si dignus tractetur. Hoc enim Emplastrum hujus Lernæi & Herculei morbi clava existit, quod hymnis multis & laudibus variis decantari meretur. Nec solum huic morbo prodest, sed varios alios arcet & explodit, nam polipos unice curat, & extuberantes carnes in aurium meatibus & aliis locis repertas unice extirpat & resecat.

Præter hoc emplastrum cereæ candelæ numero 20. in promptu erant, quæ ex alba cera paucula resina terebinthina adjecta parabantur longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis verò prout nobis meatus urinaris ferre videbatur. Nec minus ex plumbo, 3. vel 4. plumbeas virgulas paratas habuimus, quibus quando carunculæ refractariæ & difficiles sunt, candelarum vice utimur: iis sic in ordinem dispositis candelam ceream unam vel alteram per circuitum excavatam eo modo quo fusi in cuspide, ne fila decidunt excavari soleat ex prædicto Emplastro inunctam per urinarium meatum agrotante optimè sedente immittimus, ac per 6. vel 8. dies singulis diebus unam vel alteram ut decet innovatam candelam continuò æger in urinario meatu insertam habeat, neque absque ea nisi meiendi tempore agat necesse



cesse est. Septimo die in ægrotō nostro carunculas defecisse manifestissimè deprehendimus ex his signis : primò quod candela jam facile penetrabat. Secundò ex multitudine caruncularum putridarum extra emissarum & humoris purulenti effluētis. Tertiò ex urinæ expedita ejaculatione : extirpatis igitur ac ex toto eradicatorum carunculis per 8. sequentes dies nihil per Syphonem injecimus, sola candela crassiuscula sicca absque alicujus rei inunctione immissa contenti. Nam etsi carunculo extirpatæ sint, non tamen ex toto portiuncula quæ Emplastrum subterfugiunt, brevi illo tempore reponi potuerunt, sed ut magis exactè excernantur longiori indigent tempore; quas ad fundum vesicæ non sine ulcerum vellicatione & ægrotantis detrimento, si per Syphonem quid injecerimus, retrocedere faciemus, reliquis igitur 7. diebus urinarium meatum per candelam ceream crassiusculam patefactum servavimus, per quem urina abstergerendi exsiccandique vim habens libere & expedite exeat secum caruncularum reliquias nonnullas excernens. Quod unum hac in curatione tanquam præcipuum adnotandum decrevi. Elapso igitur hoc tempore quo & caruncularum & crassioris puris effluxus cessavit, ad nonnullorum liquidorum abstergerendi vires habentium injectionem per Syphonem devenimus in hunc modum.

℞. Hordei integr. ꝑii. rad. aristol. rot. ℥i. fol. plantag. ꝑ. j. f. decoctio in aq. ℔ij. ad medias. Colaturæ adde mell. rosac. colatitii ℥ij. M. & cum Syphone per fistulam urinariam injice bis vel ter in die, & virgulam plumbeam aut candelam ceream remittat. Hoc decocto abstersorio nos utimur continuò & in nostro hoc ægrotante intra 6. dies opus peregit, quod si fortiori opus fuerit, ad aquam Lanfranci viridem pro ulceribus exactè abstergentis pervenimus; quæ ita habet.

℞. Alumin. roch. virid. æris an. ℥ß. auripigmenti. ℥i. f. decoctio in aq. fontis vel plantag. ℔ij. quousque ℔ß. absumatur; per saccum laneum coletur. Hanc aquam camphora salteratam per Syphonem in meatum injicimus, deinde post plures elapsos dies hoc cicatrizans medicamentum injicimus.

℞. Ceruss. ℥i. alum. roch. lithargyr. an. ℥ij. F. decoctio in aq. caudæ equinæ. ℔ij. ad medias, colatura per manicam laneam trajecta injiciatur. Iis medicamentis hic vir intra mensem ex toto sanus evasit. Si autem aliquando dolor superveniat, urinarius meatus colluatur lacte aut aqua rosacea camphora admixta, aut decocto sem. lini & fœnugræci, quod si acerrimus dolor sit, ut cum æger pati nequeat, ad opii unum aut alterum granum devenimus dissolutum in aqua ros. *Amatus Lusitanus, cent. 4. curat. 19.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Carunculis in meatu urinario.*

Post celebratas universales evacuationes, partes urinæ famulantes fomentis, balneis, ac unguentis relaxantibus solæ sunt, deinde ad opus Chirurgicum accessimus hoc modo. Candelas cereas albas quibus parum terebinthinæ immixtum erat, paratas habebat Chirurgus longitudinis 12. digitorum transversorum, crassitudinis verò prout meatus urinarius ferre posse videbatur. Eas Chirurgus sequenti unguento oblinebat & bis in die inponebat, unguentum illud erat ex lib. 1. pag. 20. *De secretis Alexii Pademontani* ad ulcus sanandum carnosum etiamsi fuerit inveteratum, cujus hæc erat descriptio.

℞. Fæces ex melle destillato, vel his deficientibus sumito mellis ad justam crassitudinem cocti. Deinde ponito in ollam ad cremandum vel vitrarii fornace, donec auri calorem assumat, hæc materia valet ad omnes plagas, nam carnem putridam atque mortuam consumit, postea mundificat, & absque ullo dolore per sanat.

℞. Hujus pulveris ℥i. stercoris canin. ℥ij. tartar. alb. ℥ß. Sacchar. albiss. aluminis usti, tutiæ an. ℥i. terantur omnia atque cribentur. Deinde.

℞. Fol. olivæ rec. contund. in mortario lapideo optimè, adiiciendo parum vini albi, postea benè expressio succo, addatur tantundem succi plantag. ponanturque ad ignem infundendo paulatim



tim prædictos pulveres & continuò miscendo, postremò parum ceræ viridis adjungatur & parum mellis rosac. f. unguentum molle atque in usum servetur. Est autem valde pretiosum ad carnem consumendam consistentem præsertim in locis valde sensibilibus, quæ fortia medicamenta respuunt propter dolorem. Modus verò utendi est hujusmodi. Syringa parva vino albo impleatur in quo rosæ siccæ & fol. plantag. cocta, deinde parum lactis muliebris vel caprini adjectum fuerit, ponatur in virgam quæ vino optimè lavetur, deinde candelam ceream parvam sumito, & in ejus mucrone prædicti unguenti parum affigito atque sic in virgam immittito quousque ulcus pertingat, & unguentum ibi relinquat, hoc bis in die faciendum, manè scilicet & vesperi, & sic admirabilem effectum videre licebit: nam paucis diebus absque ullo periculo æger sanabitur. Hoc tamen non juvante usi sumus experimento *Amati Lusitani* descripto cent. 4. curat. 19. quo feliciter curatus fuit æger noster. *Petrus Forestus, observ. 10. lib. 25. De Vesica Morbis.*

Sequentia remedia transcripta sunt in camera computorum *Monspeliensi*, quibus *Geofroy Giennatus* curatum Carolum IX. Galliarum Regem anno 1584. & donatus fuit duobus milibus aureorum.

Primò ʒi. Cassiæ rec. extract. ʒss. succi liquir. ʒi. el. de succo ros. ʒii. ad lupur. ʒiv. f. potio exhibenda manè. Postea per 10. dies bibat sequentis decocto ʒvi. tepidas.

ʒi. Rad. liquir. ras. althææ, sebest. paf. sul. an. M. i. sem. althææ, malv. apii, petrosel. an. ʒss. ad font. lbii. bulliant ad medias, de quaumat ʒvi. per x. dies præcedente potione vel bolo ex cassia.

Modus primum unguentum conficiendi.

ʒi. Ol. rosac. lb. i. ceruss. Venet. ʒiv. capphuræ ʒss. tutiæ aqua ros. præp. ʒss. lichargyr. aur. præp. ʒiii. antimon. opt. pulver. ʒss. opii, thur. masculi, mastich. aloes hepatic. an. ʒi. M. omnia, & in pyxide plumbea servantur.

Modus secundum unguentum parandi ad consolidandum.

ʒi. Unguenti ros. Gal. rec. parati & loti aq. ros. ung. alb. Rhasis camphorati, an. ʒi. *Burnet Parte I.*

pomatæ finæ speciebus paratæ ʒss. M. simul, & in pyxide plumbeam reponantur ad usum.

In applicatione unguenti sic tegere.

ʒi. Candelam tenuiss. ex cera alba, tela vetustissima & tenuissima involutam. Ut autem appareat locus carnositatis.

R. Candelam prædicta crassiorem ol. amygdal. d. illitam, & in virgæ canalem intromittatur. Quod si obstaculum appareat, impediens ne candela possit ulterius progredi, nota locum in candela, & mensura longitudinem candelæ intrantis; deinde involve candelam linteolo, eamque illic in extremitate unguento, & tunc immitte candelam in virgam, quousque carnositatem attingat. Quod si duplex carnositas appareat, tunc ita primum unguentum aptandum, ut utramque attingat, continuando per 15. 18. aut 20. dies juxta mali magnitudinem, & prout carnositas videbitur aperiri, ac in pus dissolvi. Cum autem videbis urinam liberè & facilè reddi, paucopure turbatam, tunc oportebit primum unguentum griseum à candela tollere, sed illines candelam totam secundo unguento, continuando 8. aut 10. dies, quousque pus non ampliùs effluat cum candela, nec ullus dolor inter meiendum percipiatur, quo tempore abstinendum erit à remediis. *Lazarus Riverius, observ. 14. cent. 2.*

### SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Carunculis urinam supprimentibus.*

**C**aruncula, quia pepasmi experta est; si impedimentum fecerit, consumi debet, abstergi ulcus & claudi, ne moriatur æger (inquit *Hollerius*) cogimur carunculam illam absumere & rumpere: remediò carunculis est oleum cucumeris afinini, remixtum cum unguento rosato, cui pauca grana sublimati vel præcipitati adduntur; candela cerea immittetur docta manu; vel hæc adduntur unguento de tutia: quidam 30. ferè annis ita laboraverat, urina semper tenui filo fluente, his recreatus fuit. *Ioh. Heurnius ad Aphor. Hippocr. 82. Sect. 4.*

Pro caruncula in meatu urinario inter  
I alia



alia unum familiare habeo secretum, arsenicum nimirum, quo utor hoc modo. Emollio optimè ipsum super lapide pictorio cum succo limonum, postea soli, donec siccetur, expono, deinde ipsum diluo aceto stillatitio, & iterum sub sole sicco, & hoc quater facio. Ultima vice abluo aq. rosæ. deinde cum aliquo cerato misceo ut cum diapalma vel diachylone, vel cum ol. ros. & cera, & facio Emplastrum pro ratione duritiei carunculæ, & minimam portiunculam hujus medicamenti pono in extremitate candelæ & quotidie semel aut bis in meatum urinarium felicissimè intromitto. *Gabriel Fallopius. lib. De Tumoribus cap. 38.*

Carunculam meatus urinarii certissimo experimento in pluribus sustulit *Antonius Fuchsius Medicus Norimbergensis*, oleum succini cum vitello ovi mixtum applicabat candela cerea, & meatui immittebat, securum sanè remedium, & reliquis omnibus præferendum, si respondeat eventus. *Hieronymus Reusnerus. observ. 91.*

## SECTIO XXVIII.

### De Caro.

**C**arus Græcè Κερός à toto capite nomen habet, Κεφα enim caput dicitur. Definitur quod sit sopor longus profundus & inexpugnabilis cum sensus & motus & imaginationis ablatione, servata tamen spirandi libertate, In hoc affectu læditur cerebrum secundum partem anteriorem, & magis secundum ventriculos quàm secundum substantiam. Causa est spirituum animalium in organa sensus & motus prohibitum exercitium ob angustiam meatuum cerebri. Arctantur vero cerebri sinus multis de causis; primo ob confidentiam, cum nimirum vi morbi animales spiritus exhauriuntur, quod non sine calamitosa vi evenire solet, atrocitati etiam dolorum ascribitur per morbos acutos, quorum potentia disiectis spiritibus conjectaria inferitur sinus conniventia. Secundò ob obstructionem ab humore pituitoso frigido & crasso. Tertiò ob compressionem ab ictu vehemente, & importuna cranii perforatione: fit etiam Carus arteriis Carotidibus

& musculis temporalibus affectis, sæpe quoque ex intus genitis malignis humoribus in malignis febribus accidit, à vaporibus etiam ex intestinis à vermibus elevatis, ut & ex utero, oritur. Distinguitur Carus (quem Latini saporem, Arabes *Subeth* vocant) à Lethargo, quod confectarius sit vehementiori parti, at febris Lethargo confectaria fit. Præterea Lethargici, si stimulentur à somno excitantur, excitati respondent, contra Carotici quantumvis pungantur, aut non excitantur aut nihil respondent. Ab apoplexia differt, quod illæsa sit respiratio, in apoplexia autem semper lædatur. Discriminatur ab Epilepsia quod nullus adsit motus nec spuma in ore unquam appareat; à Syncope verò quod pulsus magnus & validus sit, & color quandoque floridus, quum in Syncope sit pulsus languidus & facies cadaverosa. Distinguitur etiam ab uteri suffocatione, quod præfocata mulieres intelligunt, recordantur, & sine omni respiratione subsistunt, in Caroticis contrario modo se habet.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Caro in quinquagenario.

**Q**uia conatus aderat vomendi vomitorium illi sequens exhibui.

℞ Syrup. acetos. simpl. oxymel. simpl. ole amygd. d. an. ℥i. aqu. nucum & raphani an. ℥ii. bibit & multum pituitæ vomuit.

Tempora iungere jussi sequentibus oleis.

℞ Ol. nuc. mosch. ℥i℥. ol. salv. majoran. an. gutt. iii. M.

Hisce factis cum jam esset vestimentis exutus & in lectum positus, admonui de Clysmate verum cum nollet uxor admittere: suppositorium hoc illi imperavi.

℞ Mell. q. s. pro duobus suppositoriis coquatur addendo Salis ℥i. rad. pyrethi, tronch. alhand. an. ℥℥. f. 2. suppositoria; quorum unum mox indatur, aliud sub vesperam.

Naribus intrusi pennam succo sequenti intinctam.

℞ Succ. rutæ majoran. an. ℥i. castor. ℥℥. aceti ℥i. M. utatur frequenter.

Ad materiam à capite revelendam, non me-



metuensillius prolapsus in nervos, modo à cerebro descenderet (satiùs enim duxi paralytin sequi quàm apoplexiam in quam facile abire potuisset) spinam dorsì inunxi sequenti linimento.

℞. Ol. de castor. de Euphorb. & de piperib. an. ℥ii. ol. costini. ℥ss. ceræ parum, f. linimentum. Cum alto sopore premere-  
tur & continuo, concesserunt tandem ut hic Clyster injiceretur.

℞. Rad. Irid. rec. ℥ii. enul. angelic. an. ℥ss. galang. ℥ii. fol. Salv. rutæ, beton. origan. an. Mi. flor. anthos. stœcad. primulæ veris, an. pl. Bacc. Lauri ℥ss. Sem. erucæ, Sinapi, an. ℥ii. sem. fœnic. ℥iii. agar. ℥ss. rad. esulæ ℥ii. furfur. pi. f. decoctio. in colat. ibi. dissolv. Succ. rutæ ℥ss. succ. mercurial. ℥i. bened. Laxat. hier. Logad. an. ℥ii. castor. troch. alhand. an. ℥ss. mell. anthos ol. rutæ an. ℥i. Sal. gemmæ ℥i. f. Clyster.

Alternis diebus uno Clystere; altero suppositorio utebatur: quibus adhibitis commovebatur; nam aliàs semper nisi excitaretur; dormiebat: excitatus, juscula in os infusa, deglutiebat, nec cibum nec potum aliàs expetebat. Vescicatorium nuchæ apposuissem, sed non concedebat uxor: idè cucurbitulas 6. cum scarificatione, collo, humoris, & scapulis affixi. Interim spinam in dies inungebat; & sequens aqua illi aliquoties cum cochleari infundebatur.

℞. Aq. Lilii Convall. rosmar. Cinam. an. ℥i. pulv. pliris arch. dianth. an. ℥ss. castor. ℥ss. ol. majoran. gutt. ii. agitentur, capiat cochlear unum vel 2. Diebus aliquot elapsis, ut materia a capite deturbaretur, cum per os melius res admitteret, ordinavi positionem sequentem.

℞. Tabell. diacartham. ℥ii. diagnidii, gr. vi. Syrup. rosat. solut. ℥i. aq. Cinam. q. f. f. parva potio: Purgatus hoc medicamento, cœpit minus torpore premi, meliusque quæ offerebantur admittere, adstantesque cognoscere, quare mox iterum hoc modo illum pervices purgavi.

℞. Rad. Ireos ℥ss. rad. angelic. imperator. galang. an. ℥ii. fol. major. salv. spicæ celt. beton. an. Mi. flor. anthos. stœcad. an. p. i. sem. fœnicul. ℥ii. carvi ℥i. fol. Sen. ℥i. sem. cartham. ℥i. F. decoctio in colat. ibi. calente adhuc infunde turbinth. ℥iii. agar. ℥ss. zinzib. ℥i. sal. gemmæ ℥ss. stent per noctem.

F. expressio, dissolve sacchar. q. f. F. potio pro tribus parvis dosibus, aromat. cinamom. ℥ii. bibit per triduum & bene purgatus fuit.

Cucupham capiti apposui.

℞. Rad. reos. angelic. an. ℥ii. fol. majoran. flor. anthos. stœcad. lavend. an. ℥i. sem. coriandr. ℥ss. nuc. mosch. ℥ii. stircacalamic. ℥iii. F. pulvis, insuatur pileolo nocturno.

Cum Jam os colluere posset, gargarismum hunc præscripsi.

℞. Rad. Pyrethri. ℥i. Angelic. ℥ss. rad. Ireos rec. ℥ii. sem. Staphysagr. ℥ii. fol. salv. rosmar. an. mi. nuc. mosch. ℥iii. cario-  
phyll. ℥ii. piper. ℥ss. coq. in vini mensura i. pro caput purgatio.

Comedebat etiam manè tabell. dianthos, gutta. ol. cinam. singulis tabellis prius affusa.

Cum in melius omnia vergerent, & jam sedere posset, denuo illum purgavi pilulis quas jam deglutiret poterat.

℞. Pil. coch. & aurear. an. ℥i. cum aq. Salviæ, F. pilulæ. Egregiè hoc medicamento purgatus est. Videbanturque jam omnia in declinatione esse; verùm subito in convulsione incidit: quas tamen, etsi omnes eum deploratum censerent, non lethales, nec aliquid mali portendere, dixi, materiam enim à cerebro in nervorum principium descendisse, & cum acris fuerit, convulsiones potius quàm paralytin excitasse. Pulsibus sequens applicui.

℞. Aq. ros. ℥ii. aceti rosac. ℥ss. cario-  
phyll. ℥ss. spec. cordial. ℥i. M. irrorati panni applicentur. Julepo quoque sequenti usus est.

℞. Julep. rosac. ℥i. aqu. cinamom. ℥i. aqu. borrag. bugl. pœon. Lil. conval. aqu. epilep. compos. an. ℥ss. manus Christi. ℥vi. M. capiat frequenter.

Alterum paroxysmum habuit, sed pergens in usu Julepi, denuoque purgatus, exhibitis etiam iis quæ Epilepsiæ resistunt, convulsiones non amplius supervenerunt, & benè deinceps se habuit; hac ratione restitutus Carus ab eo tempore nunquam amplius illum invasit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 7.*



## SECTIO XXIX.

*De Castorii mira vi.*

**N**Ota vis Castorii in histericis affectibus & pellendo fœtu. Singularis alia innotuit mercatoribus nostris in Insulis *Ferroensibus* Sereniss. Regi *Danarum* subiectis. Noxium Cetæ genus à navigiis suis ut arceant piscatores *Ferroenses*, injecto castorio aquam marinam inficiunt, quæ turbata dictum factum, quasi castorium averfaretur, Cete fundum petit. Eadem vis & homines apta est profundo maris submergere. Egregius Urinator quidam in iisdem Insulis Castorium fortè secum portans navigio ad res suas curandas se commisit. Naufragium mox passus cum sociis, præter expectationem, subito abyssum maris petit, alias natare doctissimus; reliquis comitibus salvis, sine castorio navigantibus, ut fortissimam pellendi vim habere videatur. Bona fide mihi hæc retulit amplifs. urbis nostræ consul *Christoph. Johanneus* istarum Insularum peritissimus. *Thomas Bartholinus, hist. 17. cent. 2.*

## SECTIO XXX.

*De Casu.*

**C**Asus Græcè *πτῶσις*, ubi corpus ob gravitatem ab altiori loco deorsum cadit & collabitur. Causæ sunt improvidentia, imbecilitas potentiae loco motivæ & spirituum in cerebro perturbatio. Proximate seu externæ causæ sunt impulsus violentus, constitutio in loco præcipiti, &c. In casu violento non una, sed plures corporis partes afficiuntur, Symptomata quæ subsequi solent, sunt vasorum ruptiones, sanguinis extravasati in aliqua corporis parte concretio, ibidemque doloris sensus, difficultas respirationis, articulorum luxatio, & ossium fractio, foris autem partium collapsarum tumor & lividitas, ad casum præcipitem referendæ sunt plagæ & verberationes violentæ sub quibus illatæ.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Casu ad puerum quendam.*

**V**ini rubri lbix. cui superadde ros. rubr. sicc. rorisism. summitat. myrti, an. Mii. in cacabo ad ignem fiat decoctio: in hoc vinum stipticum Syndon immergatur; & parum manibus exprimatur, & eo calido optimè ager involvatur, & in lecto optimè cooperiatur? quo remedio copiosissimè sudavit, & sanus factus fuit. Est autem hujus generis remedium apud *Hispanos* in omni lapsu admodum frequens & usitatum, à scribentibus de casu & offensione prætermisum, quum tamen potissimum sit. *Amatus Lusitanus, cent. 3. curat. 9.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Casu.*

**J**Uvenis quidam 20. annorum cum per vimineum septum instar cancellorum tortum saltaret, cecidit supra palum circa dorsum, sine cutis tamen læsione: unde sequutos est dolor ingens circa renes, & spinam inferiorem. ut incedere non posset. Ideo locum dolentem inunximus oleo ros. insperso pulvere myrtillorum, & sanguinem ex Basilica, quia juvenis erat, ne febris aut inflammatio supervenirent, de trahere emandavimus. Deinde statim mummiæ & spermatis ceti, an. ʒß. cum cerevisia butyrata calida propinavimus. Mox ut sequentem potionem sumeret, jussimus.

ʒi. Fœnic. cum toto Scabios. rubiæ tinct. caulium rub. parietar. malv. cum rad. chærefol. petrosel. sanicul. valerian. agrimon. bugl. & borrag. an. Mi. sem. nigell. (unicè confert ad casum ut experti sumus) sem. anis. an. ʒi. concisa & conquassata, coq. in cerevisia communi pro lbii. colatura saccharo dulcoretur, in qua puppa sequens pendeat.

ʒi. Mummiæ, spermatis ceti, an. ʒi. nuc. mosch. troch. alkekeng. sine opio, an. ʒß. F. Pupa exprimenda dum potio sumitur. Decoctum aromatizetur cum ʒiii. cinamom. bibat de eo bis in die hora sexta matutina, & hora quarta à meridie.



die. Quarto die ita eundem purgavimus.

℥. Fol. sen. ℥iii. infund. in decoct. pectoral. ℥v. adde elect. è succo ros. post fortem expressionem ℥iiss. oxymel. simpl. ℥v. mum. nuc. mosc. an. ℥ss. F. potio. Deinde ad maiorem resolutionem inunximus hoc unguento.

℥. Unguenti de althæa. ℥ss. ol. chamæm. aneth. an. ℥ii. M. quibus dolor sedatus est, & perfectè curatus fuit. *Petrus Forestus observ. 29. lib. 6. observ. Chirurg.*

Mulier quædam 50. annos nata ab equo sternace sub bigas lapsa, rotis caput, pectus totumque corpus miserè contundentibus, deplorata videbatur. Ego advocatus devotè *Deum* implorans talem medendi curam instituto. Primò, posthabitis omnibus, saphænam secandam suasi; deinde sudorem hoc modo provocandum curavi.

℥. Vini rubr. stiptici lb. x. ros. rubr. siccoris mar. summitat. myrti. an. M. ii. f. decoctio in cacabo ad ignem. In hanc postea Syndonem vel linteolum immergebam, coque leviter expresso agram undiquaque calidè & optimè involvebam: atque sic in lecto artè contacta diu multumque sudavit. Continuabat hoc donec revalesceret. In prandio & cœna potus erat decoctum chærefolii cum saccharo. *Martinus Rulandus. Cur. 74. cent. 6.*

### SUBSECTIO TERTIA.

*Pro casu ab alto in quodam.*

**H**Æc quæ sequuntur ex præscriptione *Florentiæ* egregiè contulerunt.

℥. Rhab. ℥ii. rub. tinct. gr. xv. cum vino stiptico. F. Pilulæ, quibus utebatur in principio; postea in processu exhibeatur illi medicamentum sequens.

℥. Cassiæ rec. extract. ℥vi. mummiæ, ℥i. rub. tinct. ℥iss. rhab. el. ℥i. pulverisanda pulverisentur & dissolvantur cum cassiâ in decocto cicerum rubr. & fiat potus.

Hic pulvis contra casum in usu est apud *Colonienses*, cujus autor fuit *Zittardus* Medicus insignis.

℥. Mummiæ, scabios. pilosel. hyperic. an. ℥ss. costi dulcis & amari nuc. mosch. an. ℥iss. terræ sigillat. bol. armen. an. ℥iv. rub. *Burnet Parte I.*

tinct. rhab. pent. som. nigell. an. ℥vi. spermaceti, rhab. an. ℥ii. agar. troch. cumini præp. an. ℥i. M. F. Pulvis. Dosis est ℥i.

*Elidæus* præceptor meus pro sanguine coagulato è corpore hominis expellendo, tum à casu, tum à percussione & concussione sequenti remedio utebatur.

℥. Mummiæ, rhab. el. an. ℥i. rubiæ tinct. ℥ii. M. cum decocti pulli nigri ℥iii. vel capiat cum aliqua aqua convenienti: at pulla nigra coqui debet cum pennis & visceribus, eadem prius strangulata, nec aliter occidi debet. Nam ita decocta plurimum præstat in hoc affectu proprietate quadam occulta. *Petrus Forestus, observ. 31. & Schol. lib. 6. observ. Chirurg.*

### SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Casu ex Fenestra ad somnambulationem quendam.*

**P**Ræmissa venæsectione & injecto Clystere, ad sanguinem collectum dissolvendum & expectorandum, exterius adhibui decoctum lactis cum meliloto, flor. chamæm. an. M. iii. marrhub. anthos, an. Mii. quod comprehensum aliquot vesicis bubulis, per vices calidum epithematis loco partibus dolentibus applicare iussi interius diebus aliquot matutino tempore pinguedinem humanam (quam tum temporis à recenti corporis humani sectione copiosam in promptu habui) in jusculo cerevisiæ ad ℥ss. exhibendam dedi, quo remedio dolores & punctiones internæ leniebatur & sanguis concretus ad exitum præparabatur, ita ut consequenter per tussim & sreatum concreti sanguinis frustra copiosè satis, & cum facilitate reiicerentur. Post octiduum cum adhuc suspicio aderat de sanguine concreto, aliquot ies pulverem ex iis quæ sanguinis grumos dissolvunt, ut sunt oculi canceri præp. rad. rub. tinct. spermaceti, & similia, exhibui, & sudorem provocavi, & sic præter spem multorum intra 14. dies Juvenis hic perfectè convaleuit.

In hoc Juvene observatione dignum quod licet ex contignatione domus tertia ad altitudinem 14. ulnarum deciderit, inventus tamen fuerit, quo ad membra  
I 3 exter-



externa omni ex parte illæsus, capite excepto, cui vulnus inflictum erat ad os usque bregmatis sine ossis & periostii lésione. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 84. cent. 2. ex Epist. Gregor. Horstii ad Hildanum.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Casu.

**M**ulier quædam ex altiori delapsa loco diu jacuit semimortua, tandem cum ad se redisset, exhibui ante omnia contra sanguinem coagulatum hunc potum.

℥℥. Succ. cancri vivi contusi ℥℥. vini albi, ℥iv. M. hæc Potio expulit sanguinem coagulatum. Postero die ab assumpto potu venam medianam me jubente secuit. Quarto à venæsectione die balneo aquæ dulcis chalibeatæ usa fuit, atque his paucis mox valere rectè cœpit. *Martinus Rulandus, cent. 5. curat. 12.*

Mulier quædam quinquagenaria ab equo sternace sub bigas lapsa, rotis caput, pectus totumque corpus misere contudentibus deplorata videbatur. Ego advocatus, devotè Deum implorans, talem medendi curam instituo.

Primo post habitis omnibus saphenam secandam suasi: mane dein sudorem hoc modo provocandum curavi.

℥℥. Vini rubri stiptici; ℔. x. ros. rubr. ficc. rosmar. sumitat myrti, an. M. ii. F. decoctio in cacabo ad ignem: in hanc postea sindonem vel linteolum immergebam; eoque extremitate digitorum leviter expresso, ægram undequaque calidè & optimè involvebam; atque sic in lecto arctè contacta, diu multumque sudavit. Continuabat hoc donec revalesceret. In prandio & cœna Potus erat decoctum Chærefolii cum saccharo. *Martinus Rulandus, curat. 74. cent. 6.*

Pro casu & contusione commune remedium est, si ovi vetellum crudum cum aceto contusum ebibendum detur, prohibet enim concretionem sanguinis.

Rustici Buphthalmi herbam cum floribus luteis instar calendulæ, in cerevisia incoquunt, & tepidum haustum ejus decocti exhibent, qui omnes obstructions & sanguinis concretionem ex lapsu dissolvit,

vasorumque ruptiones persanat. Idem præstat pilosella herba cum rad. in cerevisia cocta & bibita. Nautæ in præcipiti casu tanquam præsentissimo remedio utuntur ℥i. olei salismarini & calida cerevisia soluta & bibita. Quomodo autem hoc oleum ex sale conficiatur, nondum explorare potui. Milites in castris ad violentas plagas casusque præcipientes exhibent ℥i. aut ℥℥. pulveris nitrati bombardici cum haustulo vini, aceti, aut cerevisiæ qui tum ratione nitri, tum carbonis salicis, discutit omnem concretum cruorem & colluviem. Nam & carbo tiliæ, in pulverem redactus, & per se exhibitus in casu præcipitii mirum in modum confert: usitatum etiam remedium est quod sequitur.

℥℥. Unguenti rubei potabilis ℥i. aut ℥℥. in aceto calido dissolvatur, & ebibendum proponetur. *Franciscus Ioel. Practica, lib. 10. sect. 5.*

## SECTIO TRIGESIMA PRIMA.

### De Catalepsi.

**C**atalepsis & Cotoche vocabula sunt synonyma, effectum designantia qui Latinis vulgò congelatio dicitur *καταληψις* vocatur à *καταλαμβάνειν* e. prehendi: *κατοχή* verò seu *κατοχή* à *κατέλκειν* e. detinere: quod æger hoc malo repente corripitur; correptusque eo situ permaneat.

Definitur quod sit subita sensuum omnium motus & mentis prehensio, qua qui corripuntur, rigidi in eo statu, in quo prehensi fuerunt, apertis ac immotis oculis, statux alicuius instar, permanent, & nec sentiunt, nec vident, nec audiunt, respiratione & pulsu salvis manentibus. Causa est spiritum animalium congelatio seu immobilitas, à vapore congelante & figente ortum habens; vapor hic fixativus similis est naturæ fulminis & spirituum illorum qui in terræ motibus, aliàs etiam è terræ cavernis erumpentes, homines & bruta repente rigida reddunt. Rarus effectus hic, & admiratione dignus, hinc est quod vulgus eo detentos in extasin à Deo raptos existimant.



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Catalepsi.*

**V**Ir annorum 50. asperrima hyeme cum diu in parte capitis posteriori dolore persensisset, neque medicum tamen in consilium adhibuisset; sedens in cella, in eodem statu permanens, subito Catalepsi correptus est, & mente detentus, & veluti fixos oculos in astantes ac palpebras veluti immobiles penitus habebat, voce insuper ac sensu privatus, nihil audiebat neque respondebat. Mandavi illico ut Clyster actutum fieret.

℞. Fol. mercurial. betæ, salv. rutæ, puleg. an. M. i. flor. stæch. chamæm. melilot. an. pi. polipod. q. fol. sen. an. ℥ss. cent. min. Mss. rad. alth. ℥i sem. cartham. ℥ss. (aliqui addunt colocynthid. vel hellebor. nigr. ℥i.) F. decoctio in aqua (alii decoquunt cum gallo veteri) colaturæ adde confect. hamec. ℥ss. hier. Logad. ℥vi. troch. alhand. ℥i. mellis anthos ℥i. ol. rutæ. chamæm. aneth. an. ℥i. sal. communis, ℥iss. M. F. Clyster. Mox suppositorium præscripsimus, quod filo alligato immitteretur, si clyster non retineretur, aut præter expectationem in corpore obhæreret.

℞. Pulv. hier. Logad. ℥ii. trochisc. alhand. ℥i. diagrid. gr. numero iii. salis communis & gemmæ, an. ℥ss. mellis q. s. F. suppositorium.

Statim ab alvi eductione exhibui ℥i. theriacæ præstantissimæ, & ℥i. mithrid. cum aq. Card. bened. & beton. an. ℥iss. ultro inos ingerendo, frictionibus etiam utebar, ut & ligaturis fortibus brachiorum, pedum & crurum. Partem quoque capitis posteriorem inungi mandabam unguento infra scripto.

℞. Ol. aneth. chamæm. lilior. an. ℥iss. adice hyssopi, thymi & serpilli, parum & coquantur in duplici vase deinde fortiter colentur. Colaturæ adde castor. ℥iss. ceræ modicum. F. unguentum molle. Nonnulli totum corpus anethino oleo inungunt maximè in hyeme, & castor. ℥i. cum aqua mulsa ori infundunt: cum hisce nonnihil ad se rediisset, & melius quid sumere posset, ne iterum rediret malum, & ut ex toto convalesceret, præscripsi decoctum

præparans apii, fœnicul. calamenth. aneth. fumar. bugl. borrag. meliss. Syrupis de epithymo, de stæchade, & de succo fumarie adjectis. Postea huic decocto adicientes senam, epithymum, polipodium, ut similiter purgaret: & ad roborationem capitis consulvi, ut acciperet Diambram pliris archonticum, conservam rorismarini, & similia; quibustandem bene habuit. *Petrus Forestus, observ. 42. lib. 10. De Cerebri Morbis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Catalepsi.*

**A**D Fratrem Capucinum catalepticum factum vocatus, invenio illum aphronon, uvo genu terræ innitebatur, alterum ceu flexurus curvabat; brachium sinistrum pendebat ad genu, dextrum in aerem elevatum diductis digitis, viam prætereuntibus ut olim *Mercurii* statua, ostentare videbatur; utrumque omni gelato marmore frigidius; patebant oculi, sed irretorti, & quicquid sudario illos perstringerem inconnivi. Os hiabat cum respiratione satis libera, pulsus in utroque brachio sat magni. Cum ad satietatem spectasset, dixi accerferent alios Medicos, meque cum statuam exuisset æger, tum illic revocarent, in casu ad hunc mihi diem inviso nihil tentaturum nisi consultis senioribus. Volebam tamen iniici interim validissimum clysterem, sed Apothecarius negabat se ulla ratione, ob strictas nimium nates iniicere posse, glandem ergo præscripsi ex speciebus hieræ colocynth. sale gemmeo & muscerda; jussique excipi felle, loco mellis, ut acrius pungeret: egre immisit, sed cum bonis ægri rebus, validè enim soluta alvo, multisque bombis emissis, degelatus membra movit, surrexit, ambulavit, omnium præteritorum ignarissimus, tum fricatis naribus (ptarmicum enim potentissimum insuflaveram ante horas aliquot, sed sine effectum) iisque motu calefacti saepe sternuit; multumque pituitæ vitreæ aut glaciei, ut verius loquar, excussit. Cum sub vicesimam horam ad se rediisset, laconiam seu stupham *Germanicam* paucis horis struendam procuravi, credebam enim



enim algidissimum hoc corpus non nisi in aere perpetuò æqualiter calido servari & curari posse. Cùm illud ingressus esset, flatibus in cerebrum delatis discutiendis incumbendum duxi, unaque novorum generationem impediendam statui. Injuncto ergo sub vesperam validissimo clystere, qui præter calida quæque recipiebat etiam helleborum, turbith. trochisc. alhand. omnibus in jure veteris galli decoctis, colaturæ remiscebam hieram, colocynth. confect. hamec. elect. de baccis Lauri, theriacam, & aquam vitæ rectificatissimam; postridie eccoproto commode purgato cerebelli regionem radi jussi, totamque cum tota spina decocto lavendul. lauri, stæchad. ex malvatico incoctarum, inungebam primum castoreo, aurea alexandrina, melle anacardino, theriaca, oleo petroleo & succini solutis. Huic inguini superponebam emplastrum Paracelsi iisdem oleis recens subactum, dabam cibos convenientes, bibebat hydromel dilutissimum, cui sassaphras, fœniculum & anisum incoxerat, miscebatque vinum sulvum. In dies sumebat conditum ex conserv. acori, stæchad. nuc. mosch. Zinzib. Chinensis theriaca cum conserv. pleres arch. Sicque cum Deo toto biennio liberrimus à congelatione fuit, sæpe tamen postea hic frater Catochomenos factus est, sed tandem ita convaluit, ut duodecim annis mali nihil senserit, quoties enim rigente parum collo; malum secuturum præfagit, statim oleo calido nucham totamque spinam inungi curat, & ita malum avertit. Miror itaque *Dodonaum* & ex illo *Heurnium* scripsisse neminem secundo sine perniciæ certa hoc morbo corripì posse. *Henricus ab Heers, observ. 3.*

## SECTIO XXXII.

### De Cataracta.

**I**Nter oculorum affectus, qui plurimè sanè sunt, non infimum tenet locum suffusio, quæ Græcis *μυωσις* & *μυωσις*, Barbaris aqua, vulgò Cataracta dicitur. Est humoris præter naturam juxta pupillam, inter corneam tunicam, & crystallinum humorem concretio, visum impediens, in-

cipiente malo, morbus est in via, cum antiquatum est, ad morbos in num. refertur. Causa suffusionis incipientis est humor tenuis & serosus, confirmatæ verò humor crassus & lentus, humor qui maxime hic peccat est pituita; interdum tamen & alii miscentur humores, viæ per quas humores in oculum decurrunt, sunt nervi optici, vasa omnium tunicarum & uvea tunica à qua transfudat aliquando aliquid; locus affectus est totum illud spatium quod intercedit inter corneam & chrySTALLINUM, quia in toto illo spatio concreescere potest suffusionis materia. Suffusio verò alia est vera, alia notha, vera est quam hætenus descripsimus, ab humore in ea oculi parte, ob vitiatam ipsius nutritionem collecto, ortum ducens, vel aliunde per vias ante dictas à cerebro defluens. Spuria seu notha dicitur, quæ fit à vaporibus à ventriculo, aliisque partibus inferioribus, vel à toto corpore, ut in febribus in oculos per consensum translatis: quæ vera est suas habet ætates: incipiente malo humor tenuior adhuc, intuentium aciem fugit, sed culices, fumi, & corpuscula quadam pilorum aut lanarum, vel araneorum texturis similia oculis observari videntur: Hic gradus appellari solet Imaginatio; procedente & augescente suffusione pupillæ color marinus apparet, aut ipsa similis est vitro contaminato, vel aeri nebulis repleto, & tunc aqua & aquæ descensus dicitur: cum verò malum est perfectum, & materia in pupilla omnimodè concreta, ægerque amplius non cernit, & pupillæ color albus aut alterius coloris apparet non translucens amplius; cataracta vocatur. Fit hic affectus aliquando sed rarò ab humoris aquei condensatione, & tunc incurabilis prorsus est. Causæ externæ sunt aurinæ & pluviosa constitutio, insolatio, fumus, ictus, contusio, intempestivæ lucubrationes, balneum, cibi evaporantes, immodica venus, & alia hujusmodi. Oculorum etiam prominentia ad hunc affectum producendum non parum conducit.



## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Cataracta.

**R**etulit mihi Medicus quidam ingeniosus, se in *Hollandia* vidisse mulierem quandam, vera suffusione laborante, ex consilio cuiusdam Empirici, succo millepedum brevi sanatam, incipiendo scilicet à tribus provice, augendo in dies usque ad ix. tum iterum gradatim numerum diminuendo usque ad 3. & rursus augendo ante, & sic vicissim.

Alia item mulier ab imminente & minitante suffusione ejusdem medicamenti ope prorsus liberata est. Contundebat quidem illa primum 5. millepedes, postea 10. tum 15. dein 20. (quotidie augendo numerum per quinque donec ventum, fuerat ad 50.) in vino albo vel tenni cerevisia, fortemque expressionem jejuno ventriculo bibebat. Honoratissimus *Dom. Robertus Boyle*, in nunquam satis laudato libro de utilitate naturalis Philosophiæ, capitul. 5. sect. 5. part. 2.

*Quercetanus* aquam præscribit quæ (ut experientia comperi) efficacissima est in hoc affectu, habet autem sic.

℞. Croci metall. ʒi. aq. Chelidon. ʒv. M. hujus aquæ tepidæ 3. vel 4. guttas homine supino jacente intra oculos infunde, & hoc fiat ter aut quater in die continuando per multos dies hanc aquam expertus sum ego visionem restituisse cuidam qui eam offuscata habebat per plures menses, habet autem hoc egregium ut sine morfu validissime abstergat, quod vix in alio medicamento reperies.

Aliquando cogitavi inunctionem argenti vivi, ea ratione, qua adhibetur in morbo gallico, magna efficacia posse extirpare cataractas incipientes & incrementales: & aliquando experiri decrevi. *Rodericus à Fonseca*, Tom. 1. Consult. 19.

## SECTIO XXXIII.

## De Catarrho.

**O**mnium ferè malorum quæ corpori succrescunt, caput radicem ac fontem dici debere ab *Hippocrate* & veteribus

haud immeritò proclatum est, cum Catarrhus ab eo defluens tam multorum sit causa. Paucæ enim sunt corporis partes, tutæ ab ejus incurfu; aures, oculos, nares, os, fauces, pulmones, latera, brachia, humores, lumbos, glandulas, coxendicem, crura, & quas non partes invadit. Hinc fiunt Apoplexiæ, cæcitates, pleuritides, phthises, paralyse, surditates, angina, orthopnoia, tuiles, raucedines, vomitus, inappetentiæ, jecoris, vesicæ, & renum phlegmones, dolores colici & iliaci, alvi profluvia, & arthritides. Itaque Catarrho quæque ægritudo nasci potest; adeo utilis morborum & uberrimus omnium ferè querelarum fons dici mereatur. Latinis dicitur distillatio, græcis verò *καταρροή*. Latissime sumptum catarrhi nomen, omnem significat e capite versus inferiora fluxionem: Cum autem strictius sumitur, definitur quòd sit humoris extrementitii à capite defluxio in palatum, os, ac pulmones, ab expultrice cerebri stimolata ortum ducens.

Causa materialis est, humor pituitosus, interdum insipidus, nonnunquam acidus, salus & acris, aliquando etiam corruptus & substantia peccans, ut in Catarrho contagioso & maligno, gignitur & colligitur hæc materia in capite, vel labefactata facultate alteratrice ipsius cerebri ob intemperiem præcipuè humidam & frigidam ratione cujus non potest caput alimentum cerebro destinatum concoquere, nec rursus superflua inde nata, dissipare, vel partium inferiorum vitio; plerumque enim ex partibus infernis exhalant, & per studia & negotia statim a cibo suscepta attrahuntur ad caput vapores & fumi crassi, quos cerebrum, quia nec arcere adventantes, nec dissipare receptos, potest, jure hospitii retinet: Capite in hunc modum plurima pituita vel vaporibus in aqueum demum humorem condensatis; repleto, insurgit tandem expultrix cerebri aggravata, quæ se exonerare cupiens, onus quo nimium premitur, confertim ad partes subjectas protrudit. Externæ causæ quæ excrementitium hunc humorem aut multiplicant, aut exprimunt, ac defluxionem excitant, sunt aer frigidior, venti boreales, medicamenta frigida capiti applicata,



ta, aeris repentina ex calido in frigidum, vel contra mutatio, vini meracioris immoderatus usus, aer item calidus humores fundendo; hinc est quod tempore verno catarrhi frequentiores sunt, Calor etiam Balnei, frictiones capitis intempestivæ cum pannis calidis, motus animi & corporis vehementes, calor solaris caput feriens, somnus diurnus, nimix vigilix, & lucubrationes nocturnæ Catarrhus alius est frigidus, alius Calidus, alius subdulcis, alius salsus: est alius suffocativus, quando tanto impetu in pulmones irruit, ut suffocationis maximum impendeat periculum, alius denique contagiosus.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### *Pro Catarrho.*

24. **L** Adani, gummi elemi Sandarach. oliban. styrac. liquid. & sic. resinæ an. q. f. & part. æq. M. F. Ceratum S. A. capiti prius raso applicandum.

Valet contra decursum Catarrhi mirabiliter, si supra commissuram coronalem ponatur, Vel aliud ita.

24. aloes, puleg. Calament. montan. cort. citri an. pt. æq. f. pulvis incorporetur cum Ladano & modico acaciæ ut F. ceratum, & est expertissimum, & longè præstantius priore *Barth. Montagn. cap. 3. Antidotarii.*

Catarrhus multis nunc familiaris est, ac sola victus ratione, quem *Hippocrates* tutissimam medicinam appellavit, curari potest. Decoctum raparum cum butyro & Saccharo multum juvat, ac si quid flatulenti est in rapis, id aniso adjecto, vel guttula una olei anisi corrigi potest. Thuris etiam granum unum sub noctem assumptum roborat & exsiccat: inunctiones pectorales non satis probo; nam etsi ad expectorandam materiam, quæ in præsens adest, faciant, tamen laxiores partes & magis fluxionibus obnoxias efficiunt. *Ioh. Crato. consil. 3. & 4. lib. 4.*

Si tota causarum vix ex subjectis partibus pendet, illarum intemperies mutanda. Si quod magis existimo, caput infirmum est, illud roborandum, à cibo sumantur, ea quæ ascensum vaporum remora n-  
tur, est pulvis pepticus Sylvii. Sunt cori-

andri præparata semina, est confectio diacydonites sine speciebus, huic potest Saccharum rosatum cum bolo armena admisceri. Vacuationes in morbis pectoralibus à catarrho non probo, & mediocri doctrina præditi, atque usu artis præstantes Medici causas intelligunt, quid enim faciunt ad coctionem; quid ad vacuationem materiæ in pectore? quid ad derivationem cum magis commoveant: quid ad capitis & ventriculi robur? quid ad hepatis temperiem corrigendam? posse quædam contradi-  
ci scio, verum in morbis pectoralibus, tutissimum esse abstinere à medicamentis purgantibus reipsa comperi. Ad Catharum sedandum hora decubitus sumat de sequenti Electuario ad magnitudinem castaneæ.

24. Conserv. ros. ʒi. thuris masculi ʒij. nucis condit. tostæ, ʒi. Syrup. aromatici rosat. ʒss. M. F. Electuarium. *Ioh. Crato. consil. 1. & 2. lib. 2.*

### SUBSECTIO SECUNDA.

#### *Pro Catarrho.*

**Q** Vantum ad medicinalia, jubebit sibi parari ʒxx. vel xii. Sacch. rosat. & hoc singulis diebus utatur ante cibum manè ad ʒss. nihil enim ad catarrhum convenientius, confortat caput & ventriculum, & hepar refrigerat. Semeletiam in hebdomada accipiat ejusdem sacchar. rosati ʒss. cum ʒij. rhab. tribus horis ante prandium, pro pectore doloris utatur oleo terebinthinæ. *Iohann. Baptista Montanus, consiliorum appendice ad consil. 15.*

Ut impediatur evaporationes ad caput ascendentes utiles sunt hæ pilulæ de succino. *D. Cratonis.*

24. pulv. succini, mastich. an. ʒij aloes succotrin. ʒv. agar. albiss. ʒss. Aristol. rotund. veræ, ʒss. cum Syrup. de succo beton. q. f. f. massa pil. utatur ʒi bis in mense, & sumat eas post primum somnum. *Petrus Monavius, Epistol. 27. lib. 2. consil. & Epistol. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

24. Pulv. ossium humanorum combustorum ʒi. Cinamom. el. contus. ʒi. Sacchar. albiss. q. f. Ms. fiat pulvis, dosis ʒi. ante som-



somnum in vino albo exhibenda, aut manè in juseulo calido, augeri etiam potest dosis ad libitum. Ossa ad albedinem comburantur in fornace, & postea in pollinem redigantur, & in porphyreo lapide cum tantilla aq. rosar. confricentur. Si humana ossa non placet, fumantur bubula, horum ego usum in catarrhis, a omnibus fluxionibus quotidie saluberrimum deprehendo. Thus item hora somni integrum deglutitum optimum, proficuum etiam hic est vinum absinthites, *Hieronymus Donzellius, cons. Craton. & als med. à Scholtzio editorum.*

Dum fluxio urget & copiosa est, probarem hoc Emplastrum, si capite raso in loco commissura coronalis apponeretur.

℥. Mastich. gummi Juniperi, nuc. mosch. an. ℥i. Cariophyll. subtiliss. pulv. ℥ss. ladanii puriss. ℥vi. diducantur in mortario cum pistillo calido incorporentur pulveres, addito oleo mastichino, fiatque massa pro usu, inter edendum removeatur. *Gaspar. Nevius, consil. 12. lib. 6. Consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Catarrho.

**N**E materia quæ in thoracem præceps delabitur, spiritum intercludendo suffocet, fluxio quam primum inhibenda, medicamentis partim revellentibus, partim sistentibus, quæ revellunt & aliò deflectunt sunt Clysteres acrioris, extremorum frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ, cruribus, coxis, & natibus affixæ, vesicantia duo, unum in interna dextri cruris paulò subtus genu parte, alterum in brachio sinistro. Sed præ cæteris ad præcipitem fluxionem firmandam, vesicantia aut Sinapismos commissuræ coronali sine mora applicarem. Inter ea quæ fluxionem sistunt incrassando & torpidam reddendo, primum locum tenent hæc rotulæ.

℥. Diatragac. frigid. ℥ij. boli armen. imparati ℥i. terræ sigillat. ℥i. Syrup. de papav. qu. s. f. f. massa ex qua formentur parvæ rotulæ ore detinendæ. *Joh. Zechinus, consult. 26.*

Spiritus sulphuris & vitrioli ad guttas 3. vel 4. exhibitus manè & serò cum liquore idoneo contra omnes fluxiones magnas vires habet, præsertim vero eas quæ a calida viscerum in temperie ducunt originem. Potest etiam in minori dosi potui permisceri, quia cum eo venas omnes pervadit, & motum humorum cohibet.

*Benedictus Faventinus* sequentibus pilulis usus est in Catarrho salso, felicissimo cum successu.

℥. Succiliquirit. ℥ij. Aloes lot. ℥i. pil. de Cynogloss. ℥ss. Cum Syrup. viol. f. Massa pilularum de qua capiat ℥i. hora somni. *Lazarus Riverius Prax. lib. 1. cap. 15.*

In omnibus catarrhis & defluxionibus tum prohibendis, tum etiam caput ab iisdem præservandis, prodest aqua Serpilli, cum vino generoso albo destilata, quotidie sumpta ad cochlear unum, vel 2. pro ratione ægri. Catarrhum quemvis sistit Sacculus ex Succino & spiritu vini paratus, si Epithematis instar, decenti ligatura futuræ coronali imponatur. Hujus usus magni est momenti in catarrho suffocativo. Item ex Chamæpit. puvlerisato, ol. succini asperso. *Joh. Hartmannus. Pract. Chimiatri. pag. 92.*

Cum perenniter illabatur Catarrhus à materia effera, qui tabem tandem afferat, ille qui sequitur Syrupus miraculosè dicitur prodesse.

℥. Flor. & Germin. Salicis, urticæ, mortuæ, an. M. iv. summit. vimin. rubr. fol. bursæ pastoris, an. M. ij. decoctio in ℔iij. aq. ros. tussilag. & burs. pastor. cum. Sacchar. ℔iij. ad medietatem. Sumat, ℥iij. cum aqua viminis rubr. destillat. *Guil. Ballonius, consil. 22. lib. 1.*

℥. Oliban. partem 1. myrrhæ, croci, spicæ storacis, an. part. ss. opii partis unius tertiam. f. pilulæ sicut fabæ, & una ex iis teneatur in ore per noctem, donec deglutiat paulatim cum saliva. Mirabiliter prodest ad catarrhum: sistunt enim, & sunt expertæ. Item sola spica retenta in ore per noctem, aut per diem & noctem, catarrhum sistit.

Pilulæ quibus utebatur Papa *Alexander* & Rex ante cibum & post cibum quolibet die, quæ miro modo valent ad catarrhum, visum clarificat, auditum corrobora-

rant,



rant, superfluitates à corpore expellunt, & sine immutatione diætæ accipi possunt.

℥. Cal. arom. cubeb. nuc. mosc. spicæ, epithym. carpobalsam. schœnanth. mastich. asar. cariophyll. an. ℥ii interior. colocynthid. ℥iii myrobalan. citrin. chebul. emblic. Indor. belleric. Rhei. an. ℥ii. agar. turbith. an. ℥ss Aloes hepat. ad pondus omnium, cum succo scenic. f. pilulæ in modum orobi, v. vel vi in sero dato. *Arnoldus. Villanovanus. Practic. lib. 1. cap. 29.*

Colocynthis ad cerebrum potenter expurgandum efficacissima est, sed summo amarore in sensa est, vehemensque illius est operatio. Corrigitur utrumque infusione in urina: sic enim amaritudinem deponit, & ferè insipidum remedium evadit: tum vehementia illius ita infringitur, ut ad ℥i. tutò exhiberi valeat; sitque excellens ad omnes capitis morbos à causâ frigida oriundos remedium. Cauteria brachiis, occipiti & pone aures inusta plurimum conferunt: quod etiam efficaciter præstant posteriori parti cervicis & inter scapulas admota; quæ hodie in maximo usu sunt, & à Practicis nostris passim usurpantur. Novus etiam locus à quibusdam inventus est, nempe in cervice prope venas iugulares in musculorum interstitio & hujus cauterii beneficio catarrhus inveteratus raucedinem efficiens in duobus curatus est. In recenti catarrho aqua nucum cum hydromalite exhibita hora somni per triiduum eum valde imminuit. *Lazarus Riverius, lib. 1. Prax. Med. cap. 15.*

## SUBSECTIO QVARTA.

### *Pro Catarrho & Capitis dolore.*

**I**N cibo cavenda veritas, à piscibus & omnibus fumosis, ut oleribus crudis, allio ac cœpis præparatis, fumo maceratis, sale conditis, leguminibus & lacticiiniis abstinentum. Potus sit cerevisia, bene maturè defæcata singula cavenda in cibo & potu præscribere difficile est. Prudentes & suæ valetudinis diligentes custodes facile observare possunt, à quibus cibis offendantur, quibus juventur, quæ errata in victu bonæ valetudini noceant, quæ non admis-

sa prosint. Dolendum est homines plerumque ita vivere, ut jumentis, imprimis equis ac canibus, plus quàm sibi ipsis parcant. Proinde vera est admonitio *Arabie* illius, quàm in consilio regi suo præscripsit, homines, si sic seipsos gubernarent, ut suorum equorum curam habent minores egrotaturos, affectiones animi & cerebri labores, imprimis cavende, maxime à cibo, hinc Celsus præcepit: quibus caput infirmum est, iis ne cogitationem quidem à cibo tutam, maxime autem à coena ab iis temperandum, nec in multam noctem lucubrandum, multo minus inter commestationes sedendum.

Interdum matutinis horis pedes abluat decocto beton. & roris. & vino cui parum aceti affundatur, atque saleas pedum confricat. Nam hoc modo & tumor sinistri pedis minus molestus erit, & caput etiam juvabitur, manè autem cum lecto surgit, eluat os aqua salviæ, & interdum hoc gargarisma adhibeat.

℥. Fol. Origan. Salv. rosmarin. an. M. j. ros. rubr. pj. pyrethri, Zinzib. an. ℥ss. F. decoctio. in colatur. adde aceti acerrimi ℥i. M. hoc gargarisma pituitam per eos extrahet, & cerebrum roborabit.

Cum autem rectissimè cerebrum per nares evacuetur, manè per nares, hanc aquam attrahat.

℥. Guaiac. comminut. ℥i aq. puræ lb. xv. affundatur aqua calida & per noctem macerentur deinde coque ad medietatis consumptionem sub finem injiciendo majoran. ros. rubr. an. pj. colentur & F. errhinon. Si hoc non satis per nares evacuat, hoc quod sequitur magis evacuabit.

℥. Majoran. pj Zinzib. sem. nigell. an. ℥i. agar. albiss. ℥ss. F. decoctio, in aq. lb. ad tertie partis consumptionem, & naribus infundatur, vel vola manus attrahatur. mundatis sic ore, plato & naribus caput quoque mundandum, & leviter confricandum pectine humectato isto oleo.

℥. Ol. amygd. d. rec. in quo folia rosar. ebullierint ℥i. ol. Caryophyll. gutt. iij. macis ℥ss. M. sic (ut spero) caput & vacuabitur roborabitur.

Cum autem generale sit medicorum præceptum, ne partis alicujus evacuationem, priusquam totum corpus purgatum sit,



fit, tentemus, & cōmpertissimum sit renam omnia sensuum instrumenta atque caput etiam vacuare, velim dominium jam & deinceps in autumnō isto infuso Senz uti.

℞. Passul. ℥vi. beton. meliss. majoran. flor. viol. borrag. an. pj. galang. ℥℔. fol. Sen. ℥v. f. omnium infusio f. a. inq. f. aquæ, postea decoq. in colatur. ℥iv. dissolv. Syrup. ros. solut. mannæ calabrinæ an. ℥i M. F. potio. hoc infuso utatur bis in anno. Si forte alias alvus adstrictior. summat hora dimidia ante cœnam ℥i. pilul. mastichin. Ad roborandum autem caput de sequenti Electuario singulis diebus accipiat ad castanæ magnitudinem.

℞. Conserv. ros. ℔℔. flor. anthos, & borrag. an. ℥i. Spe. aromat. rosat. ℥ii. ambr. mosch. an. gr. vi. Succini albi pulv. ℥i. M. Job. Crato. consil. i. lib. 6.

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Catarrho.

**P**rimo usus sum pilulis ex succino *Cratonis*, vel solis ad ℥ii. vel adjectis ad ℥i. vel ℥i℔. pilul. de aloe rosat. hujus quæ sequitur descriptionis.

℞. Aloes ros. ℥i℔. mastich. Xyloaloes, liquirit. ras. ros. rub. an. ℥i Cinam. ℥ii. rhab. ℥i℔. spic. ℥℔. cum succo ros. F. Massa; modum exhibendi talem observavimus, ut vid. una dosis manè hora septima altera à meridie hora tertia, & sequente die hora septima matutina tertia absorbeatur, hunc ipsum modum etiam nunc observo in meo principe, qui singulis mensibus supradictis pilulis utitur maximo cum juvamento. Ad suffitum deinde linteorum quibus caput exsiccat, hunc pulverem præscripsi.

℞. Mastich. ℥ii Sandarach. styrac. succin. citrin. benjoin. thuris an. ℥i. F. pulvis grossus carbonibus inspergendus. Job. Bilgerus in Epist. ad Gregor. Horstium ad observ. 12. lib. 2. observ. Gregorii Horstii.

Utimur percommode pilulis aloeticis in catarrho sive Francofurt. sive alius; sed præstat, ut tres doses, tribus vicibus ita sumantur: prima scilicet ante vel à parca cœna, altera subsequente die manè,

tertia eodem die vesperi. Sic ut expertus sum ego, non possunt non copiose & suaviter evacuare, cum una dosis, alteram quasi pellat. Si catarrhi nimis tenues sint, post pilulas aloeticas præscripto modo sumptas, tertio die sumantur ℥℔. pilul. *Faventini* ante somnum, *Wolfgangus Hæferus* cap. 5. lib. 1. *Herc. Medici*.

Nihil magis sistit catarrhum immoderatissimum, quàm sequens *Rulan*. Cataplas.

℞. Fermenti acrioris ℥ii. Carabes pulverate ℥ii F. Cataplasma quod vertici, raso capillitio admoveatur. *Petrus Pachecus* obser. 60.

Flante austro hiemali tempore correptus sum catarrho cum raucedine, tertio die sumpsi ptisanam laxantem cum mannæ ℥i quarto quievi & raucedo valde imminuta erat, quinto, tussis sicca aderat, ratione cujus venam aperui: Sexto tussis perseverabat: Ideo sumpsi calome angr. xx. cum resin. jalapæ g. viii. medicamentum toto die nihil præstitit, sed tantum circa vesperam duas sedes movit perexiguas, tussis tamen omnino discussa est. *Lazarus Riverius*, observ. 46. cent. 3.

Cum ex catarrho satis diuturno, molesta tussi laborarem, quæ noctu potissimum ingravescebat, & aliquot purgationibus non cessaret sumpsi laudan. opiat. gr. iii. quibus tussis sedata est, illa tamen rediit post biduum, quare iterum sumpsi ejusdem laudani gr. ii. & tussis omnino sedata est. *Lazarus*, observ. 69. cent. 3.

Inter medicamenta cerebrum per nares evacuantia, apud me præsentissimum remedium habetur oleum nigelle, si eo interiora narium illinantur. *Petrus Forestus*, observ. 129. lib. 10. *De Cerebri Morbis*.

## SVBSECTIO SEXTA.

### Pro Catarrho serino ad mulierem quandam.

**E**X omnibus remediis, unum maximè profuit, nempe bolus ex laudani gr. iij. cum conserv. ros. à quo per 12. horas tussis & catarrhus omnino sedabantur, & ægra se curatam prædicabat ob summum levamen, quod ex eo remedio percipiebat. Idem bolus postea per morbi decursum ter sed dimidiata doss, est exhibitus, & sem.



semper cum insigni iuvenamine, tandem per plures dies consequentes, sumpsit dimidiati prædicti boli partem quartam, cuius unius ope, omnia Syptomata sedata sunt. *Lazarus Riverius, observ. 74. cent. 13.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Catarrho ad pectus delabente.*

**U**T Catarrhus magno cum impetu ruens intercipiatur.

℥. Spec. diatragacanth. frigid. Sacchar. albiss. an. ℥ss. bol. armen. ℥ss. cum mucilag. tragacanth. ex aq. ros. f. trochisci bechiarum instar, aut pilulæ hæ fortiores parentur.

℥. Boli armen. cum aq. ros. ablutæ ℥ii. amyli ℥iv. tragacanth. gummi Arabic. an. ℥i. Sacchar. Cand. ℥vi. Syrup. viol. q. s. f. pilulæ.

Materia verò viscida pulmonibus impacta & imbibita, abstergetur, incidatur, & expectoretur.

℥. Spec. diatr. simpl. diapenid. an. ℥iv. Rad. Ireos, pæon. enul. an. ℥i. pulmon. vulp. præpar. ℥ii. liquirit. ℥i. Sacch. cand. ℥iii. Sacch. albiss. ℥v. in aqu. hyssop. dissolut. F. confectio in tabulis, aut si quid fortius requiratur, substituat. Lohoch.

℥. Lohoch. de pulmon. vulp. ℥i. sani & experti, de pino; an. ℥ss. spec. diapenid. ℥iv. diatr. Solomon. ℥ii. pulv. liquirit. sem. ustic. rom. rad. enul. camp. pulmon. vulp. præp. an. ℥ss. succ. liquirit. myrrh. an. ℥ss. cum Syrup. de liquirit. vel hyssopo F. Lohoch *Gaspar Hoffmanus consil. 29. pag. 105. lib. 6. consil. Craton. & aliorum Medicorum à Scoltzio editorum.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### *Pro Catharro præcipiti.*

**L**Audo injecta Clysmata in initio mitiora, pedetentim ad paulo aciora progrediendo, utatur frictionibus dorso, scapularum, brachiorum & crurum. Insuper gatur capiti pulvisculus ex Caryophyllis & Sandaracha *Arabum*. Si vehementior urget destillatio, vesperi exhibe-

rem ℥i. ℥ss. vel ℥ii. plus minus philonii cum conserva ros. vel pilulam i. vel is. vel ii. minutim concisas, cum conserv. ros. ex his quarum descriptio nunc sequitur.

℥. Thurismaicul. succi liquirit. an. ℥i. opii, croci, myrrh. an. ℥i. M. cum syrup. papaver. albi F. pilulæ parvæ; ex unaquaque ℥i. ix. istis in pervicaci destillatione à capite atque irrita tussi, sæpe numero cum juvamento singulari sum usus & utor quotidie. Sed solum darem cum catarrhus urgere videtur, recens theriaca, si ad manus esset, vel recens Mithridatium in hunc finem exhiberi potest. Vidi in urgente catarrho, cum viderentur suffocari egri, quod acetum infusum vel assumptum fluxus impetum retinuerit, & respiratione m. reddiderit liberiores. *Reinerus Solenander consil. 4 sect. 2.*

## SUBSECTIO NONA.

### *Pro Catarrho ad pulmones decumbente cum tussi diuturna.*

℥. **G**ummi gutt. gr. viii. tartar. vitriol. gr. iv. ol. succini, gutt. iii. cum syrup. ros. solut. F. pil. 5. in aurentur. Serosos & catarrhosos humores utiliter evacuant.

Pro materiæ pulmonibus jam impactæ attenuatione & expectoratione, & thoracis dilatatione singulis matutinis utatur hac tragea.

℥. Spec. plin. arch. diacumin. an. ℥iss. diatr. Solom. diapenid. an. ℥i. pulm. vulp. præp. flor. sulphuris, an. ℥ss. spermat. ceti ℥i. sacch. cand. alb. ℥iss. vel q. s. ad gratiam F. Tragea vel Pulvis: assumatur cum his Syrupis.

℥. Syrup. de veronic. de scabios. an. ℥i. loch. de farfara, ℥iss. julep. viol. ℥i. ol. fœnic. gr. ii. M. singulis noctibus sumat de pulv. *Halyà* veteribus tam decantato recens vero à Domino *Foresto* emendato, & à me quoque cum fructu ægrotorum experto, qui.

℥. Sem. papaver. alb. ℥iss. gummi tragacanth. arabic. farin. orob. an. ℥iss. f. m. alth. portulac. cucum. melon. citrull. bombac. an. ℥iiss. ciner. cancr. fluviatil. corall. alb. usli, succin. liquirit. an. ℥iss. sacch. penid.



penid. ad pondus omnium M. F. pulvis as-  
sumat cum Syrup. jujubino & de papav.  
an. ℥i℥. julep. viol. ℥x.

Alcarnis diebus utatur manè his rotulis  
contra tabem præservantibus.

℥. Pulm. vulp. præp. flor. sulphur.  
præp. an. ℥℥. sacchar. ros. vet. ℥i℥. pincar.  
rec. amygd. d. excorticat. an. ℥i. sacch. pe-  
nid. dissolut. in aq. veronic. & scabios. an. q.  
s. rotulæ.

Ad eandem intentionem facit, sequens  
linimentum.

℥. Unguenti resumptivi, ℥iii. ol. amy-  
gdal. dul. rec. express. ol. viol. an. ℥ii. mucil-  
lag. sem. alth. tragacanth. extract. cum aq.  
viol. an. ℥i. croci tuss. ℥℥. mosch. gr. iii. ce-  
ræ, q. s. linimentum.

Si tussis valde sit molesta, sumat cochl.  
ii. de hac mistura, manè & vesperti calidè.

℥. Oxymel. scillit. ℥iii. aq. vitæ optimè  
rectificat. aqu. anisi spirit. Juniper. an. ℥i.  
spec. diam. Solom. ℥℥. ol. anis. gutt. v. lau-  
dan. opiat. gr. iii. mosch. el. gr. ii. sacch.  
cand. albi℥. ℥iii. M. diligenter, colatura  
detur ad vitrum. Superassumat tabul. i.  
spec. diatragac. frigidi, *Johann. Petrus Lo-  
tichius, observ. i. cap. i. lib. 3.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### *Pro Catarrho falso.*

**D**Uo potissimum remedia puto fore  
efficacissima, quæ in me ipso ac mul-  
tis aliis fuerunt (ut dixit *Asclepiades*) ἄρ-  
πες τῶν ὀφθαλμῶν. Primum est bolus armena o-  
rientalis rubra, quæ sola & simplex in lin-  
gua posita & palato admota, nocte præ-  
sertim, quo tempore solet fieri distillatio,  
sistit ac siccat catarrhum, & capiti robur  
addit mirum in modum, ut videatur γο-  
ργῆς, incantamentum, vim habet the-  
riacalem admirabilem. Alterum est the-  
riaca recens optima, qui vires habet insi-  
gnes ad acres destillationes. Tertium addo  
ossa humana combusta. Cranium tamen  
est præstantius.

℥. Pulv. ossium humanorum comb.  
un. 2. corall. alb. ros. ebor. an. ℥i. cam-  
phor. ℥i. M. f. pulvis subtiliss. dosis ℥i.  
in vino aut jure *Hieronymus Donzelli-  
nus, consil. 15. pag. 43. lib. 6. consil. Cra-*

*tonis & aliorum Medicorum à Scholizio  
editorum.*

Ex his quæ mihi innotuerunt per infor-  
mationem datam, apparet hunc nobilem  
Dominum laborare Catarrho difficili &  
falso, qui destillat ad thoracem & pulmo-  
nem; & est causa ulceris pulmonis, quod  
comitari solent febres lentæ, cum maxima  
totius corporis macie. Ad profligendum  
hunc affectum triplici utor instrumento,  
Diæta | Pharmacia, & Chirurgia. Eliga-  
tur itaque aer in activis temperatus, vel  
saltem ad modicam frigiditatem inclinans,  
in passivis ad siccum. Evitetur aer vento-  
sus, pluviosus valdè frigidus & calidus.  
Caveat Salis & Lunæ radios, hi enim Ca-  
tarrhum multiplicant. Caput & thorax  
diligenter pannis muniatur, ut tamen non  
æstuet, neque frigeat nimium; exercitium  
sit moderatum. Singulis diebus studeat  
excernere superfluitates fæcum & urinæ:  
Somnus sit nocturnus, diuturnus enim  
pessimus; fugiat coitum & animi acciden-  
tia; panis sit ex optimo frumento, bene  
fermentatus, sed sine sale; carnes sint fa-  
cilis digestionis, boni nutrimenti, & pau-  
carum superfluitatem. Evitetur Caseus  
antiquus, sed novus convenit, & lac quo-  
vis modo assumptum sic oryza cum lacte  
cocta, & ova sorbilia, pisces conveniunt  
faxatiles; evitentur allia, cape, porrum,  
raphanus, aromata falsa & acetum. Po-  
tus sit aqua cum saccharo & sem. corian-  
dri decocta, quantum ad medicamenta,  
vere & autumno capiat hoc digestivum  
calidè in aurora per decem dies.

℥. Aq. viol. farfar. & tussilag. an. ℥ii. Sy-  
rup. viol. papav. an. ℥ii. M.

Postea purgetur corpus hoc medica-  
mento.

℥. Mannæ, el. ℥iii. dissol. in decocto pe-  
ctorali; in quo bullierint agas. troch. ℥ii.  
F. Potio.

Quod si sanguinem expueret, vel etiam  
non expueret, laudarem in eunte vere san-  
guinis missionem è basilica dextra: hæc  
enim à sputo sanguinis præservat, manè  
& vesperti si sanguinem expueret, capiat  
℥i. Philonii persici, aut tantundem no-  
stri Electuarii ad sputum sanguinis quod  
est mirabile.

℥. Sem. Hyosciami alb. papav. alb. an.  
℥x.



℞. terræ sigill. corall. rubr. an. ℥v. sacch. ros. antiquiss. q. F. Electuarium.

Divertatur Catarrhus cum ligatura & frictionibus brachiorum & tibiærum, & cucurbitulis sine scarificatione ad coxas; & lavando crura tali lavacro.

℥. Ros. rubr. flor. nymphæ viol. beton. Chamem. an. Mi. coq. in s. q. aq. pluvialis & abluantur crura. Revellatur etiam Catarrhus ad cutis capitis superficiem, sicut fecit *Galenus* in illa Nobili Romana quinto methodi, hoc medicamento securo & tuto.

℥. Cantharid. abscissis alis & capitibus ℥i. caricar. ping. numero 1. fermenti parum, cum aceto scillitico F. pasta. Manè abrafo capite super futura coronali imponatur, dimittatur per horas octo, ubi excitaverit vesicam, acu rumpatur, & locus inungatur butyro, superposito folio caulis supra cineres calefacto, manè & vesperi ne fiat unio partium. Si hoc non suffecerit, fiat cauterium actuale in futura coronali candente ferro, & decisa eschara imposito grano ciceris diu detineatur locus apertus, hoc remedio multos actu Phthificos pristinæ sanitati restitui; etsi autem videri possit abominandum medicamentum, tutissimum tamen est, & sine aliqua noxa adhibetur; cum quo etiam plurimos Catarrhos ad thoracem delabentes compescui.

Consulo etiam ut in Majo bibat lac asinum vel caprinum cum saccharo (nihil enim melius in talibus pulmonum dispositionibus, & catarrho calido & acri) inchoando ab ℥iv. & paulatim ascendendo ad lbi. cum modico Saccharo ne acescat in ventriculo, & capra in thalamum introducenda est, ne lac corrumpatur. Epoto lacte non est indormiendum, neque exercendum corpus. Manè & vesperi capiat de elect. sequenti, quod pulmones confortat, ne recipiant catarrhos exulcerantes.

℥. Pulmon. vulp. præp. & exsiccat. ℥iii. succi liquirit. capill. ven. an. ℥ß. diapenid. cum sacchar. sine speciebus calidis diatraganth. frigid. an. ℥i. cum syrup. myrtino, q. s. F. Electuar. & ict. D. *Mesue*. Vesperi inspergatur synciput isto pulvere.

℥. Gummi Juniper. ros. rub. myrtill. thuris mastich. corall. rub. santal. omnium, an. ℥ß. F. pulvis, *Helideus de Faduaniis*, consil. 7. lib. 3. consil. *Cratonis* & aliorum Medicorum à *Scholtzio* editorum.

Præferimus reliquis omnibus remediis in Catarrho falso diacodium liquidum. Capiat verò cochlear. 1. hora decubitus, & si necesse sit etiam manè. Sed non sumat nisi falsedo vel tenuitas Catarrhi postulet. In continuo etiam usu præcipue matutinis horis esse debet saccharum rosatum ad ℥ß. cui plurimum confidimus: idque magnoperè commendamus. Ad hæc bis vel ter in septimana hora decubitus, ad magnitudinem ceræsi rubri boli armeni optimi accipiat. Plurimum enim ad descensum Catarrhi conducit. *Joh. Baptista Montanus*, consil. 156.

## SUBSECTIO UNDECIMA.

### Pro Catarrho & Tussi infantis.

**I**Nfans quidam undecimestris tentabatur Catarrho cum tussi assidua & febre, pituitam frequenter evomebat, multum lac sugebat, & parum mingebat. Post multa remedia cum perexiguo fructu usurpata, jussi ut inungeretur regio renum oleo scorpionum *Matthioli* ter in die, unde urinæ copiosiores redditæ, & catarrhus imminutus. Dicit enim *Mercatus lib. De morbis Puerorum*, cap. 8. in pueris contingere catarrhum aliquando ex vitio & imbecillitate renum non trahentium, serosum humorem, unde sit ut ille sursum translatus, fiat materia Catarrhi, *Lazarus Riverius*, observ. 55. cent. 1.

## SUBSECTIO DUODECIMA.

### Pro Catarrhis puerorum strangulationem minitantibus cum Epilepsia.

**Q**Uando ad statum vel vigorem morbi ventum est, soleo ego exhibere spermaceti quantitate pisi in lacte muliebri dissolutum, & jubeo instillare in os pueri; postea: moneo sicut somno committatur, hoc remedio multis profui, quos etiam ferè



ferè pro deploratis habuerunt mulieres, nam fluxiones intercipit, & suffocationis paroxysmos mitigat. Sed tamen exhibere non soleo, nisi cæteris non juvantibus. Epilepsiæ accessum sequentibus remediis arcere solemus. Appendimus juxta *Galeni* & Medicorum consilia grana Pœoniæ excorticata collo & brachiis puerorum. Smaragdum etiam integrum & minime læsum cordi applicare solemus. Quidam etiam coralia rubra & alcis ungulam ita usurpare solent; ad intra verò conservam pœoniæ aut beton. exhibemus; aut facimus destillationem, harum conservarum in aqua flor. tilix, & de ea nonnunquam unam atque alteram guttam instillamus, aversiones fiant frictionibus & ligaturis, si ætas permiserit. Vide apud *Italos* cauteria actualia ad coronalem futuram capitis applicata fuisse bimulis & trimulis, atque contulisse. *Ioh. Navius, consil. 24. lib. 3. consil. Cratonis* & aliorum Medicorum à *Scholtzio* editorum.

## SUBSECTIO XIII.

*Pro Catarrho suffocante ad fauces labente.*

**S**uasi ut venam semel in anno aperiret veris tempore. Et ut scarificatione utereretur in scapulis ter vel quater in anno. Pedes item frequenter noctu cubitum iturus calido decocto Salviæ & Chamæmillæ foveret, vel in illud imponderet. Purgaret corpus bis in an. pil. sine quibus ad *Hii.* pro vice.

In ipso paroxysmo utilis est aqua, quæ fit ex aqua vitæ bene præparata cui saccharum candidum tanta quantitate ut parum dulcescat, additum sit, & parum aq. Cinnamon. cum pauca aq. ros. & cochl. i. vel ii. mox sumat: Postea lac caprinum tepidum, in quo semper vivum majus decoctum sit, & radix altheæ, ore & faucibus contineat. Extrinsecus collo commodè circumdaretur lana nigra succida oleo liliorum inuncta, calefacta panno cannabino involuta; vel si perseveret malum, poterit tale Emplastrum collo circumdari.

℞. Nidi hirundin. ℥vi. pulverifetur, & coq. in vino albo, addendo pulv. bacc. lauri, ℥i. mellis ℥ii. ol. lilior. ℥iii. F. instar  
*Burnet Parte I.*

Emplastri quod supra pannum extensum tepide collo circumdetur. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 185.*

Ad diversionem Catarrhi suffocativi fortissimo lixivio & panno asperiore cubitum confricarem, atque hoc modo exulcerarem istas partes, quæ ne consolidentur, sed plurimum materiæ efflueret, operam darem non absque dolore fit, sed ob utilitatem æquo animo ferat. *Ioh. Crato. consil. 20. lib. 6. pag. 61.*

Vir quidam cephalæa sive diuturno capitis dolore lancinabatur: cui cum varia remedia adhibuissimus, post phlebotomiam venæ cephalicæ, decocto longa digereantia, pilulas coch. & aureas, cucurbitulas etiam cum scarificatione scapulis admotas, deinde post purgationes cerebri particulares, nempe apophlegmatismos, errhina & alia topica remedia convenientia, quibus omnibus administratis dolor non sedaretur, tandem venam in fronte secari iussimus: ex qua cum sanguis mediocriter fluxisset, à dolore admodum diuturno liberatus est. Quemadmodum & alius zythepsa, qui cum in occipitio longo tempore insigni ac diuturno dolore conflictatus esset, eodem modo tandem curatus fuit. *Petrus Forestus, observ. 54. lib. 9.*

Ubi hoc malum inveteratum aliis remediis non cedit, commodè in multis decocto sarsæ usi sumus; quo & *Garcialopius Lustitanus* matronam per duos annos dolore capitis diuturno vexatam curavit. Idem. *Observ. 56. lib. 9.*

Lectissima quædam virgo 20. annos nata capitis dolore acerrimo laboravit, cum dextri hypocondri tensione, ventris doloribus & aliis symptomatis. Multa quotannis usurpabat remedia, potiones, apozemata, pilulas, balnea, vesicatoria, & alia quamplurima, quæ parùm proficiebant. Usu chalybis etiam parùm adjuncta est, quamvis hæc omnia ab obstructionibus dependere, & pravis humoribus in hypocondriis stabulantibus, iisque adustis, vapores acerrimos ad caput transmittentibus. Tandem vere ineunte sequentia remedia illi præscripti.

℞. Conserv. fol. absinth. & capill. Ven. an. ℥i. conserv. radic. enulæ camp. ℥℞. sal. tamarisc. magisterii tartari, & pulveris  
K ape-



aperientis specifici; an. ℥ss. cum syrup. capill. Ven. f. opiata, de qua capiat ℥ij. singulis diebus manè duabus horis ante pastum. Quinto quoque die purgabatur pilulis catholicis ad ℥ij. & infra 15. dies perfectè curata est. *Lazarus Riverius, observ. 11. cen. 1.*

Alteri mulieri cephalæa gravissima à multis annis laboranti, post infinita penè remedia in cassum usurpata, sequentia à me præscripta feliciter cesserunt.

℥. Conserv. fol. absinth. capil. Ven. & rad. cnulæ camp. an. ℥i. sal. absinth. & tamarisci, an. ℥i. cum syrup. capill. Ven. f. opiata, fumendo ℥ij singulo manè duabus horis ante pastum. Quinto quoque die capiat pilulas catholicas ad ℥ij. His remediis per decem dies usurpatis dolor ille acerbus & chronicus evanuit. *Lazarus Riverius, observ. 14. cen. 1.*

Pro cephalæa cum crustis in capite erum. pentibus primò rubificante hoc remedio usus sum.

℥. Sem. sinapi part. ij. fimi columbini part. β. flor. rorismar. fol. major. an. ℥i. M. applicentur capiti instar emplastri, non derasis capillis, quia nolebat concedere. Verùm etsi ruberet caput & arderet, tamen non fluebat materia; & cum dolor ingravesceret, vesicatorium ex flammulâ contusâ in medio capitis apposui, quod vesicam latam fecit, è quâ ruptâ aperta que butyro, cum fol. brassicæ retentâ, maxima humoris copia effluxit, subitoque capitis dolor inde cessavit, nec amplius reddiit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. p. 367.*

Succus hedere terrestris naribus attractus cephalæam etiam vehementissimam & inveteratam non lenit tantum, sed & penitus aufert. Medicamentum hoc (inquit autor meus *Joh. Oldacres*) quamvis facile parabile & ubique obium sit, non satis potest laudari, si res ex usu æstimentur, auro æquiparandum. Novi quippe qui per decennium & amplius acerrimis doloribus conflictari, statim ab ejus usu recreari sunt, nec numquam postea paroxysmum senserunt. *Joh. Rayus. Catalog. Plantar. Anglia.*

Succus expressus fol. & flor. primulæ veris cum pari quantitate lactis vaccini naribus frequenter haustus cephalæam

inveteratum perfectè curavit; cum alia medicamenta nequicquam tentata fuissent. *Idem ibidem.*

## SECTIO XXXIV.

### Pro Cephalæa antiqua.

**P**RO Cephalæa illa antiqua, Emplastrum sequens raso capiti, pileoli instar in verticis regione tota & occipiti appositum, continuo gestabat, parabatur illud ex una parte Emplastri de ranis (quod mirè efficax in Cephalæa sananda) & media parte Emplastri de betonica & de alabaastro. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 368.*

## SECTIO XXXV.

### Pro Cephalæa biliosa.

**V**ictus ratio sit tenuis & qualitate frigida: mox antecedens causa revellatur clystere refrigerante in quo Cholagoga sint dissoluta, vel potione paulo valentior, quoniam bilis hic quasi turgens est & furiosa. Deinde secta vena brachii sanguis adimendus ad calorem eventandum, simulque ad sedandum dolorem, ejus causa non nihil imminuta: parcè tamen detrahatur, quod eo vacuato, laxatis veluti habenis, bilis exandescat. Interim topica etiam ab initio non sunt omittenda, à mitioribus ad valentiora fiat progressus, Ut.

℥. Ol. viol. nymphææ, an. ℥i. aq. plantag. viol. aceti albi, an. ℥ij. M. pro litu frontis & temporum. Vel.

℥. Ung. popul. infrigid. *Gal.* an. ℥ij. ol. nymph. ℥i. aq. ros. plantag. an. ℥ss. aceti albi. ℥ij. M. pro linimento.

Quod si dolor non cedat, ad narcotica parcè sumenda admovendaque confugiendum; reiterandaque erit purgatio cholagogis, apparatus prius humoribus biliosis syrupis & aquis convenientibus. Cæterum quoniam vigiliæ laborantem hunc magnopere torquent pro conciliando somno.

℥. Unguent. popul. ℥ss. opii, croci an. gr. iij. cum oleo nymph. F. linimentum pro pulsibus.

Illud unum quod numquam fallit, hic addere



addere placet præsidium ad biliosam Cephalamedomandam.

24. Fol. mollium hederæ, fol. plantag. viol. an. pt. æq. & cum oxyrrhodino terantur, & fronti temporibusque imponantur, quod si his non cedat malum, caput stillicidio ex lacte vaccino tepido subjiçiat; vel ex hydrolæo parato ex oleo viol. & rosac. nec non ex aqua in qua præbullierint flores Chamæmill. melilot. aneth. fen. fœnugræc. lini & hujusmodi alia anodyna temperataq; medicamenta simplicia. Quibus addenda sunt aliqua adstringentia & roborantia ut rosæ & plantag. folia. *Joh. Zechius, consult. 56.*

## SECTIO TRIGESIMA SEXTA.

### Pro Cerebri Commotione.

**S**Tatim vena in brachio aperienda, simulque caput crinibus abasis oleo ros. vel myrtino inungendum, aut tale cataplasma capiti imponendum.

24. Farin. hordei, fabarum an. ʒvi. ol. rosac. ʒiii. aceti q. s. F. Cataplasma quod capiti applicetur, & sæpius renovetur. Clysteres injiciendi & repetendi, atque aliæ revulsiones per frictiones partium extremarum, cucurbitulas scapulis appositæ instituendæ. Post quartum diem repellentibus discutientia admiscenda sunt, quale est hoc Cataplasma.

24. Abstinch. Mi. florum ros. rubr. chamem. an. pp. farin. fabar. an. ʒi. sang. dracon. ʒii. mummiæ, ʒiii. cum ol. ros. q. s. F. Cataplasma. Tandem sola discutienda usurpanda; ex rad. alth. cyperi, cal. aromac. fol. salv. majoran. beton. flor. stœchad. chamæm. quibus ad caput roborandum, flor. ros. rub. addantur. *Alexander Benedictus* Emplastrum ex gummi hederæ valde commendat, eoque senem decrepitem octogenarium, qui ex capitis percussione obmutetur, præter omnem opinionem se sanasse refert: idque etiam fracta calvaria ossa, quod vix credibile est, ferruminare scribit. Paratur hoc modo.

24. Gummi hederæ ʒiii. resinæ puræ, ʒß. ceræ, ʒiii. ol. ros. ʒiiß. ammoniac. ʒii. terebinth. ʒiii. succi corymb. hederæ ʒiv. farin. fabarum, q. s. M. Pulli quoque

columbini vel gallinacei, vel catuli per medium dissecti, vel pulmones animalium calidi capiti admoti insignem discutiendi vim habent. *Daniel Sennertus, cap. 20. sect. 1. lib. 1. Prax. Medic.*

## SECTIO TRIGESIMA SEPTIMA.

### De Cerebri fungo.

**Q**uemadmodum in stirpibus arborum humores semiputridi per corticem extuberantes in fungos coalescunt, sic fracta exemptaque portione aliqua cranii, ac dura matre læsa, statim humores cerebri circa plagam affluunt, qui sive ossis, sive aeris frigiditate condensati instar fungi concrescunt, atque interdum adeo intumescunt, ut extra cranium emineant. Affectus autem ille *Galeno* <sup>vulgaris</sup> fungus à similitudine appellatur. Est verò caro mollis, levis, pallida, & spongiosa, quæ quidem cito excresecit, lento vero pede retrocedit. Potest etiam ex flatu procreari.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Cerebri fungo Cranii fractura succedente.

**F**ungus hic intra 24. horas ita excrevit, ut magnitudine ovi gallinacci extra cranium emeretur: illum tamen infra scriptis medicamentis sæliciter divino favore persanavi.

In principio singulis, deinde alternis, ac tandem tertio quoque die sequens enema injeci.

24. Rad. & fol. alth. malv. parietar. mercurial. flor. chamæm. melil. flor. & fol. beton. an. Mß. sem. fœnugræc. lini, anis. an. ʒß. coqu. in aqua ad consumptionem tertiæ partis, in colat. lb. i. dissolv. bened. laxativ. hieræ pier. compos. an. ʒiii. vitellum ovi, salis, p. i. ol. chamæm. ʒi. M. F. Enema.

Bis verò in die fomentationem sequentem vulneri applicui.

24. Fol. & flor. beton. salv. chamæm. melil. ros. sumitar. majoran. rosmar. an. Mi. sem. anis. fœnugræc. an. ʒi. incid. & contundantur pro fotu, harum herbarum, q. s.



indatur sacculo ejus magnitudinis, ut mediam ferè partem capitis cooperiat, qui filo intertextus; coquatur in vini, & aquæ, an. pt. æqu. & applicetur calidè. Post forum diligenter abstergendum est caput linteis calidis, deinde sequentem pulverem inspersi fungo atque toti vulnèri.

℞. Rad. caryophyllat. angel. calam. aromat. an. ℥ss. rad. aristol. rot. irid. flor. ligni guajac. an. ℥ii. flor. Salv. sumitat. majoran. rosmar. an. pi. F. omnium pulvis tenuissimus. Deinde sequens Emplastrum applicui.

℞. Emplast. debeton. ℥iv. gummi elemi dissol. in ol. rosac. ℥i. pulv. ros. myrtill. an. ℥i. mastich. calam. arom. an. ℥ss. ol. rosac. q. s. F. Emplastrum. His fungus paulatim & intra 14. dies subsidit. *Gul. Fabricius Hildanus observ. 15. cent. 1.*

Consului ut inspergerent pulveres ex Spica & Scarnantho, quorum usu attritus est. Hoc remedio sæpius fungos sanavi, ac proinde tanquam arcanum vobis propono. *Petrus de Marchettis. observ. 6.*

## SECTIO TRIGESIMA OCTAVA.

### *Pro Cerebri inflammatione & Sphacelo.*

**H**Ujus morbi tanta est sævities, ut intra quaternionem primùm plerumque enecet, illico incumbit sæva cum Cephalalgia, cujus dolor spinam ac occiput etiam occupat; illicoque dejicit sensus cunctos, ægri tamen exiliunt ac se jactant pedibus, manibus, totoque corpore, maximè cuncta involant manibus, ita ut quædam mulieres ne propriis quidem capillis parcant, imò unguibus propriam faciem defœdant, mox productione morbo movendi vis in languorem abit. In silentio perenni perseverant, vixque puncti respondent. Febris acerrima comitatur, nec cibum nec potum admittunt: ortum ducit, à retorrído sanguine in cerebrum translato: unde ineunte morbo facies cum tumore rubet, oculi cum rubore fixi videntur. Nam in hoc malo ipse cerebri substantia inflammatur, unde tandem gangræna, quæ dum absoluta constitit, redintegrari cerebrum nequit, quæ in procipectu est, &

in *viuentiu*, ob vim phlagmones, præcipiti calamitate trahit ægrotum, ob morbi potentiam & partis occupatæ principatum, quod si ad quartum pervenerit diem, spes est morbum posse domari: nam virium id robur denunciat. Curatio erit materiæ ex cerebro evacuatio, utque algiosum evadat cerebrum: habita provisione totius corporis, materia à capite repellatur; dein discute eam; dein flectatur ad algorem cerebrum. Verum tanta mali hujus est calamitas, ut vix hæc perficias, antequam in gangrænam cerebrum trahatur: accedit quod vix intro remedia ac alimenta admittant quare viribus adnitentibus, seca internam in brachio venam, à leni clystere, abstine ab acri glande in tam feroci febre. Capiti actû frigida deinde admove, ut oleum ros. completum cum pauco aceto, vel potius rigeretur caput decocto actû frigido, endiv. lactu. vel portulac. parietar. velex his fiat cataplasma cum oleo nymphææ, & pauco aceto rosaceo, frigida admove, æstuantia remove, ita agatur ineunte morbo, si æstivum fuerit tempus, fiant etiam revulsiones per cucurbitulas: ac fôtus, fiat ex decocto salicis viol. nymph. lactuæ, malv. parietar. & flor. melilot. cervici & humeris admove Cantharides; & hirudines pone ad aures. Sece venam in fronte, narium venæ recludantur, ut copiosè sanguis efluat; tunc junge oxyrhodino oleum chamæm. & fove decocto malv. flor. chamæm. melil. sem. fœnugræc. & lini rad. alth. inclinato malo admove sternutatoria, alvus mollescat enemate. Si urina detenta fuerit, illinc oleo Scorpionum pubem, & admove parietariam coctam, post quartum diem redeant ad paucam cibi copiam, jus pulli laudatum cum sem. melonum; absit vinum: tandem validius purgentur jam recreatis viribus. *lob. Heurnius, ad Aphor. Hippocr. 50. sect. 7.*

## SECTIO TRIGESIMA NONA.

### *De Cervi Lachryma.*

**T**Antæ creditur esse efficacitæ Cervi lachryma in sudore eiendo ut si gr. v. vel vi. potui dentur, totum corpus ferè solvi judicemus. De hac loquens *Abinzoar lib. 1. tra. l.*



*tract. 13. cap. 6.* Se tria grana Azir filio Regii magistri equitum, in lacte vel aqu. cucurbitæ vel rosæ exhibuisse retulit: illumque à virulento ictero liberasse. Hæc autem in cervis ante centesimum annum, (testimonio *Scaligeri*) nulla est, temporis vero progressu generatur, & in juglandis molem accrescit. Dicitur magnam habere ad venenum efficaciam, ut in *Asia* felicissimo successu sæpe experiuntur. *Iulius Cæsar Burecellus*, hortul. genial.

## SECTIO QUADRAGESIMA.

### De Chalybis preparatione.

**H**oc modo tutissimè sumatur Chalybs. 24. Limaturæ Chalybis q. s. pone in Crucibulo donec excanduerit, sed citra fusionem, aufer ab igne, & limaturam in vase vino albo repleto extingue, & ablue, abluta limatura ponatur in umbra supra petriam lineam novam ad exsiccandum, quo facto.

24. Istius limaturæ Chalybis hoc modo præpar. 3i. vini albi lbx. ponatur limatura in parvo sacculo lineo in vas vini quod recipit ipsius lbx. vas diligentissimè obturatur, ne exhalet aliquid, & relinquatur per 24. horas, quo tempore elapso utere hoc vino chalybeato in prandio, ante prandium, in cœna, vel quomodolibet, & excellentissimè paulatim operationes suas perficiet, si saltem per mensem integrum ipsius usus prorogetur, & in hoc nulla convenit regula in faciendo vel non faciendo exercitio. Solum ægrotus eo tempore ab aceto & acidis abstinere debet, acetum enim & Chalybs, intensissimi sunt hostes, & existis duobus potius venenum quam medicamentum præparatur, quoniam verò aliquando limatura temporis mora, nigredinem contrahit, & sacculum inficit, ideo debemus singulis 8. vel 10. diebus eam extrahere, cum vino albo abluere, sacculum novum conficere, & de novo ut prius reaptare. Notandum est ægrotantem eo tempore quo vino utitur Chalybeato, debere nullum aliud vel in prandio, vel in cœna sumere vinum, graviter enim erraret: eo solo debet, uti, quandoquidem ut sæpius observavi, nec

colorem, nec saporem variat, nec odorem; hæc recepta ut audivi à fide dignis à Serenissimo *Heiruria* Duce emanavit; quicquid sit optima est ratione & experimento confirmata. *Dominicus Panarolus, obs. 32. Pent. 5.*

## S E C T I O X L I.

### Pro Chlorosi.

**A** Urifabri filia annos duo de viginti nata sexennio ferè fædos colore patiebatur, nil artis remediis contra contumax malum proficitur. Dum peregrè profectura curru succussorio devehitur, nausea-bunda tandem vomuit incredibilem humorum variegatorum copiam, animam agere videtur: intra 4. vel 5. dies deperditus faciei color recuperatur, nulla ope Medica, sed solo vomitu spontaneo revocatus, ut mirum non sit si tantopere in omni repletionis specie vomitiones *Hippocrates* commendaverit. Itaque credibile est à variis humoribus iisdem corruptis malum hoc aliac foveri. *Guil. Ballonius, lib. De Virginum & Mulierum morbis.*

Inter cetera in antiquis obstructionibus in usum vocetur radix Enul. camp. in taleolas secta & in vino albo macerata, miraculo enim creditur fædos virginum colores tollere. Idem ibidem.

Vocatus ad virginem nobilem ictericam, cachecticam, verminosam, Catamenitis olim fluere solitis destitutam, præmissis purgationibus, decocto quoque tartari, rubiæ tinct. mercurial. &c. Saphenam aperui, tandem exhibita *Monspeliensium* ad pallidos colores pulvere, quem Schyronius vocant, menses copiosè provocavi, quibus fluentibus, icterus, & cachexia brevi cessere. Formula pulveris quem sæpe fidum expertus sum est hæc.

24. Rubiæ 3i. Sabinæ, muscerdæ an ʒi. Croci ʒß. lumbricor. vino lotor. & ustor. 3i. (ego vermibus illis quos suspectos jam tum habebam boracem substitui) macis. fol. Lauri, an. 3ß. spec. aromat. rosar. ʒi. limaturæ chalybis ʒiii. rad. Enul. 3i. Sacchar. duplum omnium Dosis 3i. cum vino albo dulci. *Henricus ab Heers, observ. 6. lib. 1.*



## SECTIO XXXII.

## SUBSECTIO PRIMA.

## De Cholera Morbo.

**C**holera Morbus ( quæ ἐπὶ τῆς Χολῆς potius quam ἐπὶ τῶν Χολαδῶν i.e. intestinis nomen suum mutuatur) nihil aliud est, quam assidua & violentissima humoris pravi, vehementi cum perturbatione, per superiora & inferiora rejectio, à facultate ventriculi expultrice nimium irritata originem trahens. Causa hujus mali proxima est humor acris & biliosus exustus & corruptus; qui in ventriculo genitus vel aliunde accedens, sua acrimonia & malignitate, expultricem ita stimulat, ut tandem sine mora intentis viribus conetur, retentrice facultate debili non resistente, per utrumque ductum tam molestantam sarcinam deponere. Causæ προκταρατιναι sunt alimenta prava substantia prædito copiosius assumpta, qualia sunt, carnes porcinae, anguillæ, allia, cæpe, fungi, melones, cucumeres, mala persica, & precocia, cerasa & alii fructus fugaces, præsertim si jejuno ventriculo, aut eo cibo repleto sumantur, & assatim illis sumptis bibatur. In vitio etiam sunt cibi pingues & acres, venenata item & venenata medicamenta, tribuitur hic affectus ventriculo potius quam intestinis, quia causa morbifica magis in ventriculo quam intestinis continetur. Duplex statuitur Cholera, humida quam hætenus descripsimus, & arida, quæ est Spiritus flatulenti sursum deorsumque excretio cum ventris inflatione ac strepitu, & lumborum ac laterum dolore, cujus causa non solum in calorem ventriculi nimium, & alimenta prava referenda est, sed etiam in bilem atram pravosque humores ventriculo substratos, recensetur Cholera humida inter peracutos morbos, utpote quæ doloris atrocitate & excretionis vehementia, subitam inferre soleat mortem, ac intra 24. horarum spatium hominem è medio tollere: à Sicca non tantum imminet periculum.

## Pro Cholera acutissima cum Syncope in Muliere.

**S**tatim accitus, frictions adhibui & ligaturam brachiorum, mox à Syncope relevata hoc sequens medicamentum propinavi.

℞. Decoct. hord. non excortic. ℥ iii. Syrup. ex infus. ros. rub. ℥i. M. quo facile vomuit, & secessum habuit, nolimus enim in principio ea, quæ efferebantur cohibere, quinimò cum adhuc nausea bunda esset, hoc tepidè propinavimus & evomuit. Nam sola aqua tepida cum Syrup. acetos. simplic. satis officium suum in tali casu præstitit. Postea hunc Syrupum dedi.

℞. Aq. decoct. hord. Mund. ℥iii. Syrup. de ribes. Syrup. Cydonior. an. ℥β. Syrup. ros. rub. ℥β. M. F. Juleb. Jussi etiam ut ad majorem roborationem & constrictionem ventriculi, frequenter sumeret ex condito sequenti.

℞. Conserv. ros. antiq. conserv. acetos. rob. de ribes an. ℥β. diacydoni sine speciebus. ℥vi. sem. acetos. sem. citri pulv. an. ℥i. manus ch. perlat. ℥ii. 1 pec. trionsantal. ℥ii. cum Syrup. conserv. myrobal. emblic. & Syr. menth. F. conditum mediocriter molle, de quo sumebat instar dimidiæ casteneæ per horam ante pastum manè & vespèri. Etiam extrinsecus hoc unguento ventriculo roborato ac temperate calido inuncto manè & vespèri ante pastum.

℞. Ol. myrtill. cotoneor. an. ℥β. ol. mastich. ℥ii. corall. rubr. ros. rubr. hypocist. acaciæ, an. ℥i. Santal. citrin. ℥β. ceræ exiguum F. unguentum, & sic tandem curata est. *Petrus Forestus, observ. 47. lib. 18. De Stomach. Affectibus.*

Probatissimum, & præsentissimum in Cholera humida remedium est Crystal- lus, ut testatur *Langius, lib. 3. Epistol.* cujus ℥β. vel per se exhiberi potest, vel cum Electuariis appropriatis aliisque medicamentis. *Daniel Sennertus. Pract. lib. 3. p. 1. Sect. 2. cap. 13.*



## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Cholera Morbo.*

**J**uvenis quidam bilioso temperamento præditus, incidit æstate media in febrem tertianam, quæ duabus primis accessionibus satis mite apparuit, sed in tertia accessione, tanta fuit humoris biliosi malignitas, & ferocia; ut concitato vomitu, atque alvi fluxu frequenti, cum maxima virium jactura, summum ægro periculum immineret, vocatus ad eum præscribo clysterem ex jusclo cum confect. alchem. ℥iii. theriac. rec. ℥i. quo statim vomitus & alvi fluxus sedatus est, quia verò in hujusmodi febribus malignis sæva illa Symptomata in singulis paroxysmis redire solent, & ægrum secunda, vel tertia invasione de medio tollere; ad præcautionem præscripsi victum incrassantem, & laudani gr. iv. duabus horis ante paroxysmum sumenda, sicque symptomata prædicta non rediere, levis accessio fuit, & Julepis refrigerantibus, incrassantibus, atque alexipharmacis curatio absoluta est. *Lazarus Riverius, cent. 3. observ. 78.*

Mulier quædam correpta est Cholera morbo 23. die Julii, circa meridiem, & ad vesperam usque vigesies alvum deposuit, cum gravissimis doloribus, non solum intestinalibus, sed etiam ventriculum infestantibus, ita ut sequenti die, etiam vomitu premeretur, multosque humores acres & biliosos excerneret. Maritus à me consilium petiit, dum alia remedia pararentur, consulo ut ægra oxycrati cyathum assumeret, cujus adeo efficax fuit operatio, ut vomitus & alvi fluxus statim cohibiti fuerint, & alia remedia omissa, dictitante ægra, se à morbo liberatam & pristina valetudini restitutam. *Lazarus Riverius, cent. 4. observ. 8.*

Mercator quidam *Monspeliensis* septuagenarius, gravi cholera morbo correptus 4. præcipue remediis intra 7. dies liberatus est. Clystere ex lacte confect. de hyacintho, conserv. ros. & vitell. ovor. fotu ventriculi adstringente & roborante, cum sacculis in vino rubro maceratis, Julepo ex decocto plantag. & porculac. cum Syrup. Cydonigr. & confect. de hyacintho manè & se-

rò exhibitio; & laudano ejus gr. i. singulis noctibus in Julepo dissolvebatur. Pro miraculo habita est hæc curatio in tam proventa ætate. *Lazarus Riverius, cent. 4. observ. 53.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Cholera Sanguinea.*

**L**aterarius quidam media dum æstate uxorem suam formosam noviter nuptam, nimio libidinis ardore accensus aliquando cognosceret, valde periclitatus est: nam copiosissime per vomitum & secessum sanguis excernebatur, cum calor & motus ora venarum aperuissent, istum morbum Cholera sanguineam appellavi. Sanguine ad 12. circiter libras ejecto maxima aderant Symptomata, nempe pulsus deperditio, cum dejectione virium, facies *Hippocratica* sudor frigidus, & jam desperatus erat, tamen propinatis cum vino granator. Lapid. Hæmatitis ꝑ iv. statim sanatus est, magna omnium admiratione. *Dominicus Panarolus, observatio 11. Penitentie 1.*

## S E C T I O XLIII.

*Pro Cicatrice in facie auferenda.*

**I**mperavi uxori meæ ut sudore vel mado-re effluente ex ovo dum assatur cicatricem suam sæpius liniret, quæ valde dealbata & rectificata est, hoc erat *Nicoli* secretum, quod tamen hoc tempore valde commune & vulgare factum est nostra & aliorum Medicorum opera, qui sæpius eo usi sumus, expertum hoc (ait *Rondeletius*) à Dominis *Tochano* & *Fabra* Medicis, sed nos usi sumus in uxore antequam *Rondel.* legissemus, oleum etiam de myrrha optimè cicatrices dealbat. *Forestus observ. 4. & Schol. lib. 31.*

## S E C T I O XLIV.

*De Cicuta Veneno.*

**N**on est hoc venenum quod *Athenienses* *Socrat.* tribuerunt, ut ponit



Conciliator sed fuit quoddam venenum compositum, quod cicutam vocarunt; ut in historiis legi Romanorum, nam & de hoc *Valerius Maximus* mentionem facit. Cicutæ Bezoar est pulvis gentianæ cum vino datus, theriaca verò est ex conferentibus. Per initia autem per vomitum excutere oportet, & quod ad intestina prolapsum est, expurgabimus, tum ad vini meraci potionem veluti præsentissimum remedium transibimus, per intervalla illud exhibentes.

In quibus intervallis lac vaccinum, aut asininum, aut absinthium cum pipere communi & castoreo, rutamque cum mentha in vino exhibebimus, totum præterea corpus calefacere conducit, & præsertim præcordia, ad vehementiorem item motum ac cursum ager cogatur. *Petrus Forestus. Schol. observ. 10. lib. 30. De venenis.*

Cum Rusticus quidam vinitor suas coleret vineas, ligone fortè fortuna erutis cicutæ radicibus, secumque domum delatis, pastinacæ radicis loco decoxit, comeditque in cœna unà cum uxore, mox statim ambo ivere cubitum. Media autem nocte, e somno expergefacti, omni penitus amissa ratione, huc atque illuc per domum in tenebris vagabantur, amentia & furore ducti: unde caput, faciem, & oculos, in parietes percusserunt, ut manè accurrentibus vicinis, partim percussionebus tumidi, partimque effuso sub cute sanguine liventes, tumentibus admodum oculorum palpebris, horrendam ac monstruosam ostenderint faciem: Vocorego statim ad curam, percontatisque domesticis, quibus eduliis in cœna victitassent, reperi hos cicutæ edisse radices, quas pastinacæ esse crediderant, quandoquidem mihi in propinquam vineam abeunti, ostenderunt illi locum ubi rusticus ille radices effoderat, ibique inveni alias cicutæ radices, quæ jam folia emittere incipiebant, quare re perspecta celeriter ad ægros redii quos quidem non multo post tempore Deo adjuvante, in pristinam mentem & sanitatem restitui.

Decepta quoque his radicibus est, superioribus annis quædam nobilis Matrona, quæ radices proprio in horto effossas totius familiæ decoxit, ac præbuit edendas carotarum loco.

Quinetiam Monachum *Franciscanum* curavimus, qui plurimis mensibus modò amentia modò furore agebatur, quod cicutæ folia, hortensis petroselini vice, piscium quorundam jusculis imposita, comedisset. Caveant igitur omnes, ne in hac veniant discrimina. *Petrus Andreas Matthiolus, comment. ad cap. 11. lib. 6. Dioscorid.*

Cicutæ folia necarunt *Franciscum Trapolinum*, Præceptoris mei Pomponatii præceptorem, virum sui sæculi phœnicem; loco petroselini hausit in jusculo posito ab ancilla, itaque amens, sine sopore, discipulis suis sui triste desiderium reliquit *Jul. Casar Scaliger exercitatione 152.*

Anno Christi 1665. Generosa & nobilis Domina de *Alva*, socrus mea plurimum colenda, in oppidulo ad *Fortham* sito quod *Cul.ros*, dicitur cum familia degens; fortè per famulæ, imprudentiam, ipsa cum omnibus domesticis jusculum in prandium sorbendo hauserat, in quo coctæ fuerint (pastinacæ loco) cicutæ radices.

Infelicis hujus infortunii hæc dicebatur causa, quod nimirum depositas in horto domui adjacente non ita pridem effossas pastinacæ, & cicutæ radices, sed locis satis distitas, pueruli postea illic colludentes confuderint & unà miscuerint; ac famula tandem reiculinariæ præposita, speciei similitudine decepta, vice pastinacæ cicutas collegerit, & in prandium destina-verit, innocentissimè quidem illa, sed periculossimo sanè errore: vix enim absol-verant perniciosum illud ferculum, cum ecce suas vires, virulentum venenum exere-re cœpit; omnes quippe plurimum exag-itavit tenebricosa vertigo, guttur malè habuit, ariditas & constrictio difficilis, cum quasi strangulatione ex suppresso mirmirum spiritu & suffocatione; adfuit etiam mentis perturbatio & alienatio, ita ut absurda plurima quorum postea ad se rever-sineutiquam meminerant, rum quidem verborum nimium prodigi affatim effutiebant. Miseranda prorsus fuit tunc temporis totius familiæ conditio, vix enim se invicem agnoscebant, nec quid dicerent, vel facerent satis noverant. Vocatus ego in auxilium *Edenburgo*, quod circiter 14. millia passuum à *Cul.ros* distat, quam primum potui



potui advolavi, totis viribus omnibusque affectibus secundum artis præscripta, sublevaturus (sub Deo) tam charæ familiæ, cui me natura prius, nunc verò Sors melior tam arctè ligaverat. Ut eo circa nonam matutinam dici sequentis perveni, omnes deprehendi non sine maxima letitia prope modum reſtitutos inciderant quippe ante noſtrum adventum, licet non in medicum, in medicinam. Singulis enim (conſulente potiſſimum nobiliſſimo illuſtriſſimo-que Domino Comite de *Rinhairne*, cui ob egregiam tum præſtitam operam multum ſe debere haud inviti fatentur) propinata eſt potio emetica ex infuſione croci Metall. injecti ſunt etiam Clyſteres purgantes: poſt ſic probe tam per vomitum quàm ſecceſſum evacuatam materiã cicutæ venenatam, de vino *Hiſpanico* magnis repetitiſque hauſtibus biberunt omnes cum corporis exercitio ad caloris excitationem, quia in ſomnum aderat ſumma propenſio; theriaca tandem exhibita eſt: tantum habuere hæc præſidia ſueceſſum, ut ante diem craſtinum ceſſarint omnia recensita Symptomata, & ad ſe paulatim redierint, ſine ulla noſtra opera, niſi quod illis ad recuperatam ſanitatẽ ulterius confirmandam, vinum medicatum bibendum præbui, in quo infuderint rutæ & abſinthii ſummitates cum pulvere radicis Gentianæ.

Cicutam intro aſſumptam venenum eſſe idque aliquando letiferum, ſancivit jam olim *Galenus lib. 3. de Simp. I Medic. facultat. cap. 18. & lib. 5. c. 14*. Primo item cap. lib. de ſuccor. bonitate & vitio:

Conſentiunt *Paulus Aegineta, lib. 5. cap. 41. Aetius Terrabibl. 4. Sermon. cap. 63. Aetnar. Method. Med. lib. 4. c. 12. Scribon. Largus, lib. de Compos. Med. c. 47. Dioſcor. lib. 4. de Materia Medica, cap. 79. & lib. 6. cap. 11. Plutarch. Sympoſiac. lib. 3. quaſt. 5. circa finem Cælius Rhodigin. lib. 23. Lect. Antiq. c. 10. lib. item. 28. cap. 31. & 35. Jul. Scaliger. exercit. 152. Santes Ardoynus, lib. 3. de Venenis cap. 62. Gaſpar. Hoffmannus, lib. 2. de Medicam. Officin. cap. 67 Matthiæus, in lib. Dioſcorid. cap. 11. Daniel Sennerius, lib. 6. Præct. part. 7. cap. 6.*

Filius Mercatoris Piſaurenſis annos natus undecim, cum extra urbem cicutæ ſum-

mitates jejuno ſtomaco concederet, & ad torridum ſolem illic dormiret, brevi mortuus eſt. Nam cum à ſomno expergiſcetur, non videbat, nec mente conſtabat. Ad domum igitur portatus brevi diem ſuum obiit. Ut Puer hic mortem evaderet, meracioris vini copioſi potu opus habebat. *Amatus Luſitanus, curat. 68. cent. 5.*

## SECTIO XLV.

### De Cingulo Mercuriali.

**C**inguli Mercurialis uſus frequentior multis eſt juſtis de cauſis ſuſpectus, inimicus enim pleriſque eſt Mercurius, imprimis imbecillioribus & convulſionibus obnoxiiſ. Scabioſis tamen & cutis prurigine laborantibus audaſter Empirici applicant, quos eo nomine caſtigat. *Mindererus Threnod. Med. cap. 14. P. Hechſteterus dec. 3. obſerv. Medic. caſ. 7.* damna recenſet illorum qui cingulo iſto ad ſcabiem temere uſi ſunt. Ruſticus in urbe noſtra cingulo mercuriali ſanitati quosdam reſtituit feliciter, qui pura corpora crebro medicamentorum à Medicis præſcriptorum uſu obtinebant. Filiam Civis *Hafnienſis* totius capitis ſcabie diu deturbatam cingulo perſanavit. Eodem cingulo integræ ſanitati reſtituit generoſum quendam virum qui ex male curata Pedis fractura per pluſculos annos intollerabiles dolores expertus fuerat, & inveterata ulcuſcula in parte affecta:

Mercurii cingulum alii ita faciunt, Mercurium ſaliva aut Sevo extinctum albumine ovi excipiunt, illinuntque ſupra goſſipium, quod in cinguli modum conſuunt: Noſter verò mercurium cum oleo juniperino ſubigit, & in maſſam compingit, corioque in cinguli formam reſecto illinit, quo mediũ corpus conſtringit: commen- datque ad omnes affectus malignos, can- cros, ulcere mali moris & antiqua, ita audaces ſape fortuna juvat. *Thomas Bartholinus, Hiſt. 79. cent. 3.*

Inter medicamenta monſtroſa, quibus Empirici moderni nobiliſſimam artem Chirurgicam, maximo mortalium damno deſcedarunt, Zona mercurii non infimum locum apud vulgum obtinuit, & præcipuè in ſcabie, & iis, qui in peregrinationibus à pedi-



à pediculis immunes esse cupiunt. Cingulum hoc duorum, transversorum digitorum latum, & ex limbo panni adaptatum, mercurio crudo, axungia porcina vulgari modo extincto, imbuatur, nudisque lumbis induitur: infelicitè cessit honestæ cuidam matronæ illius usus. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 23. cent. 5.*

## SECTIO XLVI.

### *Pro Clavis pedum.*

**A**bscindantur Clavi decrecente Luna, pedibus aliquandiu primum aqua calida lotis, deinde admoveantur folia hederæ contusa, & singulis diebus iteretur remedium mane & serò, intra 14. dies clavus extrahitur. Unde colligere est attractivam vim hederæ inesse potentissimam. *Samuel Formius, observ. 35.*

Succus hederæ terrestris superpositus clavum curare dicitur: idem præstat & succus Chelidon. & habetur quo præsentaneo remedio, vel ammoniaco & galbano in aceto dissolutis instar cerati appositis utere, vel succum tithymali pluma instillato sic enim plurimos curavi. *Petrus Forestus, observ. 12. & Schol. lib. 4. observ. Chirurg.*

## SECTIO XLVII.

### *De quadam gravida Clysterum usque nutrita.*

**N**obilis quadam ac pia Matrona cum utero gestaret, febre corripitur, ex qua cum restituta esset, ab omni cibo & potu ita abhorruit, ut spatiosæ hebdomadum nihil ferè per os assumere posset, quapropter *Dom. Auberius* Medicus doctissimus iussit, ut singulis diebus jusculum carnis castratorum, caponum, gallinarum, & similium in quibus vitella ovorum dissoluta erant per alvum injiceretur, quorum beneficio ita fuit nutrita, ut foetum ad constitutum tempus usque gestarit, foeliciterque peperit. Absurdum itaque est, quod multi ab hoc remedio tantopere abhorrent, ac plerumque potius mori cupiunt, quam Clysteres admit-

tere: foeliciter peperit puellam, cui ego cum decimum circiter annum attigisset, & Catarrho ad oculos post variolas affecta fuisset, setaceum applicui unde convaluit. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 3. cent. 4.*

## SECTIO XLVIII.

### *De Cœliaco Morbo.*

**K** *Κελιακή, όστος & χηστερί* affectus sunt cognati, secundum magis & minus duntaxat differentes. In hoc conveniunt, quod in utroque sit ciborum inconcoctorum excretio. Distinguuntur verò per hoc, quod Lienteria (*i. e.* Lavitas intestinorum) sit præpropèra & cità cibi nullo modo modificati nullamque alterationem, nec in substantia, nec in colore adepti per alvum excretio. Cœliaca verò passio assumptorum aliquo modo sed leviter tantum transmutatorum è ventriculo per intestina transitus. Causa utriusque est, retentrix ventriculi & intestinorum facultas læsa, in Lienteria quidem penitus abolita, in cœliaco morbo solum diminuta, aboletur vel imminuitur retentrix ventriculi facultas ab iisdem causis, prout vel graviores sunt vel læviores. Frequentissima est intemperies frigida & humida, cum humore pituitoso conjuncta ventriculum relaxante, ejusque internam superficiem rugosam oblinente, ita ut alimenta in eo retineri nequeant, sed in concocta per intestina præterlabantur; fit etiam ob ex pultricum ventriculi & intestinorum à mordacibus humoribus irritatam qui vellicando ad præmaturam excretionem excitant. Hanc facultatem, pariter stimulat inflammatio & ulcus ventriculi, venenum item assumptum, aut maligna qualitas ventriculum obsidens. Cœliaca passio quandoque pro causâ agnoscit, læsam Chyli per spongiosam intestinorum crustam in lacteas venas transcolationem. Gravibus quoniam etiam & lethalibus morbis sæpe succedit Lienteria, ut videre est in dysenteria, & febribus malignis ob nimirum summam retentricis imbecillitatem. Mala sunt hæc non contemnenda, quod universo corpori nutrimento subtrahant.



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Cæliaco Morbo.*

**P**ost vomitum & purgationem stomachale scutum ita paravimus.

℥. Ladani puri & bene olentis, ℥i ss. lign. aloes ℥ss. mastich. thuris, an. ℥ii. nuc. mosch. macis, piper. longi, cariophyll. cal. arom. menth. an. ℥i. cum cera & resina. q. s. ad ignem. M. F. ceratum stomachale, quod in panno scarlatino ad scuti figuram extendatur adjecta ℥ss. Gallia mosch. & ventriculo admoveatur. Hoc enim ad ventriculi malam intemperiem propulsandam multum conducit, veluti ad concoctricem & retentricem facultates ipsius ventriculi malè affectas roborandas & instaurandas, quod unum nobis præcipuum in hac curatione propositum est. Deinde hoc condito usi sumus.

℥. Diacydon. cum speciebus, ℥bi. theriac. opt. ℥i. diacinnamom. ℥ii. in mortario marmoreo omnia rectè pistentur, & cum aromatica Cydonior. miva. F. conditum, de quo singulis diebus ℥i. jejuno stomacho comedebat, & desuper pro posse dormiebat, & ad quatuor sequentes horas cibum non capiebat, iis autem & optimo victu intra viginti dies melius de ventriculo habere cœpit. Victum talem institui, capi aut gallinæ vel perdicis succum bibebat, quem sic extrahere mandabamus. Alitem exenteratam accipe, & ipsam optima & pura mastiche cum cinamomo el. & pauculo pane refarci, & ad ignem in veru coque, quam sic non exactè assam torculari exprimes, & succum multum inde extractum, ægro potandum dabis, non nisi pulvisculo spec. diamosch. dulcis & diambrae adjecto. Est sanè succus hic optimus, quia concoctu facilis, ventriculum minimè gravans, & paucas vel nullas gignens superfluitates. Mastiches etiam & cinnamomi ratione ventriculi malas qualitates emendat, & ejus facultates viatatas ac debiliores redditas roborat & instaurat. Post hunc verò succum ebibitum parum pulli aut alterius alitis, benè elixæ comedebat, ac tandem parum vini rubri generosi adstringentis bibebat, initio etiam cibi semper parum diacydon. prægustabat,

ut ventriculum ad ea quæ postea comedere debebat, stabiliret. *Amatus Lusitanus. cent. 3. curat. 87.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Cæliaca Affectione in Infante.*

**P**uer quidam Princeps annum natus, post ablactationem mense uno cum dentire inciperet, alvi fluore cepit corripitur; dejiciebat quater vel quinques in die materiam pulvis instar huic qua pasci solebat, ex farina & lacte coctæ, non admodum dissimilem, & veluti chylosam, bile tamentinctam, admodumque acrem, & foetidum odorem spirantem. Cum non cessaret hic fluxus diebus tribus sequentibus, sed auferetur potius, infansque non nihil calere & sitire inciperet; vocatus ego vitio ventriculi hoc accidere, quod singultus diu perseverans sæpe comprobabat, & quandam Lienteriam cum cæliaco morbo subesse judicavi.

Primum Syrup. Cydonior. ex cochl. exhibui, cui interdum pulverem corall. rub. & tantillum pulv. rad. tormentillæ permiscui, eundemque syrup. cum aq. ros. rec. stillata alioquin, propinavi, ventriculi & ventris regionem oleo mastichino in dies bis inungere jussi, terque tantum in die pulvem exhibere, cujus portioni interdum corallo miscui, aquam quam bibebat, prius in vitro decoquere jussi, posteaque panem tostum huic indere, eamque, sed si fieri posset, rarius exhibere. Adhuc non cessante fluxu, jussi orizam cum lacte decoquere, verum cum respueret, pulvem cum lacte in quo silices albi extincti essent, coquere jussi. Lac amygdalinum interdum loco aquæ propinavi: & cum admodum singultiret, Syrup. cydon. quo delectabatur, exhibui, statimque singultus cessavit. Cataplasma ex illis quæ ad manum habere poteram sic paravi.

℥. Cydonia, & pyra sicca, p. ii. panis parum tosti ablata circumferentia nimium usta; laminas ii. decoq. in vino rubro, donec mollescant, contund. addendo pulv. ros. rubr. absint. an. ℥ii. mastich. boli armen. an. ℥ii. ol. mastich. ℥i. M. & extend. super pannum, & ventriculi ac ventris regioni ap-



apponantur; repetantur quater in die, quando ad dormiendum fasciis involvitur, repetitum altero die fuit, additis ol. mastich. ℥i. ol. cydon. nardin. an. ℥ss. pulv. mastic. ℥i. sicque mox postea expurgata omni illuvie malum cessavit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. par. 855.*

## SECTIO XXXXIX.

### De Colica.

**C**olica ab intestino colo nomen habet, quod in eo maxime crudelitatem suam exerceat: ejus sæpe tanta est atrocitas, ut multi immisericorditer ab ea tractati, levandi doloris causa se confederint. Est tristis sensatio intestinorum præcipue colicum facum retentione, à solutione continui oriunda.

Causa proxima est solutio continui; vix enim potest tantus dolor ab intemperie originem suam trahere. Causæ materiales sunt, flatus, excrementa indurata in intestinis coercita, humores præsertim biliosi, ac pituitosi, interdum inflammatio, quandoque vermens, & alia quævis materia seu frigida seu calida; quæcunque etiam intestina violenter comprimere, vel obstruere, vel erodere potis est, aut impense alterare; quod materiæ malignæ denegandum non est: cum hæc interdum dolorem colicum accersere possit. Materia verò ipsum faciens, alias in civitate, alias intra intestinorum tunicas continetur, quandoque in utroque ex dictis locis.

De triplici potissimum colica mentio fit apud Medicos; de flatulenta nimirum, pituitosa & biliosa, quæ à flatibus oritur, dolorem habet maxime vagum, qui non diu in eodem loco persistit, sed modò sursum, modò deorsum, modò ab uno latere in oppositum divagatur & distendendo exoruciat. Bilis rursus colicam cum mordacitatis sensu inducit, plerumque sitim & oris amaritudinem comitem habet, inter pituitosas, ut crudelissimam eam refert *Galenus*, quæ à pituita vitrea intestinis tenaciter impacta, ortum ducit, quæ pali infixi vel tenebræ perforantis speciem exhibet, hunc comitatur affectum frequens nausea & vomitus, excrementorum retentio, ita

ut interdum ne flatum quidem supra vel infra excernere possunt; & sæpe dolor modo in una parte, modo in alia vehementius infestat: per quæ signa non inepte è dolore nephritico distinguitur; sed manifestius multo, si dolor locum renibus altiore occuparit, & rejecta per sedem pituita vitrea, vel sæcibus induratis, aut alia materia, dolor quieverit: hæc enim Colicam satis manifestant, ut alia, & præcipue doloris situs & stabilitas, cruris stupor è directo, & arenularum vel calculi exclusio nephriticum indignant.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Colico dolore ex pituita crassa.

**U**T hic Clyster injiceretur mandavi. ℥℥. Rad. alth. ℥i. fol. malv. mercurial. an. Mj. fol. rutæ, flor. Chamæm. & melilot. an. Mss. sem. anis. fœnic. carvi. an. ℥ij. F. decoctio in jure pulli pingui, in colat. ℔i. dissolv. Cass. hieræ picræ, an. ℥ss. bened. Laxat. ℥ij. ol. amygd. d. ol. aneth. & Chamæm. an. ℥i. salis gemme, ℥i. salis communis, ℥ss. M. F. Enema nihil effecit, glandem adhibuimus, sed frustra.

Ad ructus verò expellendos sumebat ex decocto flor. Chamæm. in cerevisia, nihil juvabat. Ideo ad Clysteres fortiores transivimus, non tamen unum Clysteram super alium statim immittendo, ut stolidi facere solent; qui singulis horis ferè indifferenter enema injiciunt; quod minime fieri debet. Ideo expectavimus in alterum diem, & tunc decocto superiori addentes, ficus pinguens & passulas, & ℥i. fol. Senæ, & post colaturam eadem lenientia & laxantia, addendo butyri ℥i. & loco ol. aneth. rutaceum, clysterem denuo injecimus, qui tamen nihil effecit. Ideo sex vel pluribus horis intermissis, in eodem decocto decoximus pulp. colocynth. in nodulo raro ligatæ ℥i. agar. el. ℥ss. & hujus decocti accepimus ℔j. addendo bened. laxat. ℥i. cass. ℥ss. hier. picr. ℥ij. philon. Roman. (ob ingentem dolorem) ℥ss. ol. chamæm. aneth. amygdal. d. an. ℥i. salis communis, ℥ss. salis gemmæ, ℥i. F. Clyster. injiciatur.



tur moderatè calidè, quò quinquies egressit valde pituitosa cum flatibus multis, & dolor ex parte sedatus est. Die vero sequenti in diluculo exhibui ℥ij. theriac. opt. & spes. diagar. ℥ss. cum ℥ij. aq. hyssop. idque calidè, egregiè dolorem sedabat sudore subsequente, sed hora sexta post meridiem cum dolor iterum rediret, hoc fortu rursus cessavit, nec amplius rediit.

℥. Flor. chamæm. & melilot. an. Mj. sem. malv. lini, carvi, aneth. an. ℥ij. coq. in aq. pro fotu cum spongia. Dolore non redeunte, ad reliquias ventositatum depellendas, tum ructus auferendos, ad ventriculi & intestinorum roborationem, ex electu. sequenti sumebat omni manè, ad magnitudinem castaneæ.

℥. Conserv. flor. anthos ℥ii. conf. ros. spec. diacumini, & diagalang. an. ℥ii. cum syrup. menthac. fiat ad modum conditi. Hisce præsidiiis in longum tempus sanatus est. Salgemmæ proprietate quadam, ut sæpe experti sumus Scybalas emollit. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 21. De Mesenterii & Intestinorum affectibus.*

Si ex pituita crassa malum originem habeat, & dolor vehementissimus fuerit, præstat initio uti clystere ex oleo communi *Paulo Authore*. Sæpe enim vitream simul cum facibus pituitam expulit, ac dolorem subito finivit talis Clyster, vel uti licet eodem oleo, in quo prius decocta fuerit ruta, seu semen aliquod quod flatum dissipet; liquato prius in prædicto oleo, adipe anserino vel gallinaceo. Fetus etiam in hunc modum præscribatur.

℥. Rad. alch. ℥i. fol. malv. alch. an. Mj. flor. chamæm. melilot. summitat. aneth. an. Mss. sem. scænuagræ. lini, an. ℥ss. sem. anis. cumin. fænic. an. ℥ji. bulliant in hydræleo, & cum spongiis duabus alternatim, partibus dolentibus applicentur. Detur quoque postea medicamentum diatrion pipercon & theriaca. Ubi verò pituita satis est extenuata, purgans medicamentum exhibeatur, ut hiera. *Petrus Forestus, obs. 7. l. 21.*

*Rondeletius* nobilem Matronam curavit, cum gravissimo dolore coli detineretur ex pituita, & nihil ad manum esset, solo vino hypocratio injecto, eodem modo & rusticus quidam curatus fuit. *Petrus Forestus, in Schol. observ. 7. lib. 21.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Colica Biliosa.*

**F** Rigida aqua usus sum in iis quorum vires robustas & partes principes illasas deprehendi: ac scio me levasse omnino dolorem & totum morbum, ne reverteretur amplius, prohibuisse.

*Amatus, cent. 1. curat. 2.* Historiam habet de Muliere colica ex calida causa laborante, quæ ex potu aquæ frigidæ, subito incantamenti instar dolore lævata est, non amplius redeunte.

Idem quoque in filio Falconis colica à causa calida laborante, gelidam dedit, & insuper pannum lineum frigida aqua immersum, ac manu pressum umbilico admoveri iussit: nec non diapapav. in rotulis dabat, ac desuper aquam Endiviæ, quibus paucis intra triduum sanus factus est, non sine multorum admiratione, & artis Medicæ decore. *Petrus Forestus Schol. observ. 12. lib. 21.*

Religiosus quidam obnoxius erat colicæ biliosæ diuturnæ & contumaci, quæ sæpe recurrebat, cujusdam consilio, sumpsit manè frustum butyri recentis superbibendo parum vini; hoc remedio per longum tempus continuato, ab affectu liber & immunis evasit. *Lazarus Riverius, observ. 71. cent. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Colico Dolore.*

**I** Nter alia decoctum flor. chamæm. commodè exhibui, quod quidem si quid aliud hypochondriis ac reliquis visceribus quæ circa hypochondria sunt, gratum existit. Condensata corpora rarefaciens, indurata emolliens ac tensa relaxans, doloresque sedat ac mitigat. Decoquatur cum cerevisia. Hoc decocto sæpius nos dolorem mitigavimus, præsertim si cum pituita etiam flatu adessent. *Petrus Forestus, observ. 16. lib. 21.*

Dedi usitatum meum ad dolores colicos sedandos remedium.

℥. Ol. amygd. d. rec. expr. ℥i. vini malvar.



vat. ꝑ. syrup. papav. ꝑ. ij pro uno haustu.  
*Felix Platerus, observ. 2. pag. 450.*

24. Cassia rec. extr. ꝑ. spe. hier. ꝑ. ol. amygd. d. rec. q. s. M. F. bolus, Egregium est hoc medicamentum ad pituitæ educationem, nec sinit post ejus usum alvum indurascere. Quidam redactus erat ad extremam maciem ut <sup>scilicet</sup> hominis esse videtur, & laborabat simul perpetua obstructione & duritie alvi, & colica subinde recurrente cum hoc aliquoties usus esset, redierunt intestina ad officium suum. *Gaspar Hoffmannus consil. 11. lib. 3. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scolitzio editorum.*

Si adest dolor colicus, injiciatur per Enema oleum amygd. d. cum vino malvatico, apponatur ventri rete castrati coctum in oleo adjecto chelidon. maj. contuso cum rad. si haberi possunt. Profunt etiam Catuli lactantes ventri apppositi, qui si veteribus Latinis Medicis fides est adhibenda, malum ad se trahunt, atque ipsi deinceps colicis doloribus moriuntur. Ventrem etiam Anatis vivæ deplumatum malum ad se trahere, si ventri apponatur, experientia constat. Idem præstat rana viva apposita. Magni etiam Medici aquam frigidissimam apponunt, nolim tamen ullum temerè ad hoc remedii genus pervenire. Per os magno cum adjuncto datur album quod infimo gallinaceo reperitur ex optimo vino. Quidam adjiciunt membranas intersepientes nucleum in juglande. *Joan. Crato. consil. 13. lib. 3.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Colico Doloze.

**J**acobus Finkius avunculus meus suscipiendus colico dolore torquebatur, canis milesius ventri impositus, qui cum incaluisse, urgebat exitum, vomuit vehementer, & tormina avunculi remiserunt.

Ancilla ejusdem in dolore dentium, eundem canem genis apposuit sensitque levamen, sed canis dolorum impatientia hinc inde curitare & latrare cœpit. *Thomas Bartholinus, hist. 53. cent. 6.*

Colica oritur ex flatibus verum est, sed hic protinus aliqui festinant ad flatus discutandos, adhibent fomenta, illinunt un-

guenta, dant per os flatus discutientia, &c. quæ sane in colica leviori faciunt quod debent; hoc est, discutunt flatus: sed in vehementi tantum abest, ut profint primùm administrata, ut plurimum etiam noceant, quandoquidem pituitam in intestinis contentam in flatus dissolvunt, & morbum augent. Sicut memini accidisse Doctori cuidam, quem remedia contra Colicam apta, non apto tempore usurpata pene enecarunt: habent flatus discutientia suum locum, & iis omnino opus est, sed antequam ea adhibeantur, necesse est vias inferiores aperiri, stercora arida obstructionem facientia educi, & siccitatem intestinorum emendari. Ad hoc medicamentum nullum magis idoneum est quam Clysteres lenientes, mollientes, & si viscida materia adsit, etiam incidentes, & abstergentes, neque protinu. si unum Enema successu caruerit, desistendum est ab ulteriore usu illorum, sed insiltere oportet, donec obstructio à retentione fecum exorta tollatur, cur autem non recipienda sint olea in Clysteres non video, cum lubricent intestina eaque molliant, multò magis meruo siccitatem, quæ non usurpatis oleis relinquitur. *Galenus* certè cum ex phlegmate vitreo intestina ipsi veluti terebra perforarentur, fatetur in illa sua colica injecto per Clysterem oleo rutaceo, magnam frigidissimæ pituitæ, i. e. vitreæ copiam excrevisse & convaluisse, Adscribam verba *Longi* popularis mei Medici expertissimi ex epitolis ejus:

Si Colon (inquit) flatu grosso aut phlegmatis vitrei frigore & cruciatu intollerabili divellitur, si oleo subtilioris substantiæ, quale est Sabinum (in quo ruta aut semina cumini, dauci, anisi, decocta fuerint) cum Clystere infuderis patientem confestim ab hujus doloris colici carnificina liberabis. Avena in sartagine frixa, & sacculò indita, egregium est fomentum in doloribus Colicis. Marchionem quendam ex magnis doloribus relèvavi hoc uno, cum nihil reliquorum adesset ad manum. Attenuat flatus & vim habet etiam laxandi. *Gaspar Hoffmannus, consil. 14. lib. 3. consil. Cratonis, &c.*



## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Colico dolore.*

**O**leum amygdalinum cum vino malvatico haustum, pervulgatum est remedium verum ego ꝑ. spermatis ceti addo, atque hoc inter efficacia & secreta remedia habeo, sed videndum ne sperma vetus sit & rancidum.

*Galenus* in dolore à ventositate orto, curcubitam magnam cum multa flamma ventri ad umbilicum admovet, & ita subito auxilium ferre affirmat; ut incantamenti simile videatur. In pauperibus allium cum sale contusum sæpe magno successu ventri apponitur. In colica & iliaca plurimum valet extractum Calam. arom. ad ꝑ. i. cum syrup. aliquo sumptum. Item Mithridatica Antidotus, cum succo Cytoniorum in Lienteria. *Joh. Craton. consil. 21. lib. 5.*

Ad colicum dolorem prodest pro præservatione Zona ex intestino Lupi exsiccat, ea cingatur die ac noctu. Si verò infestat colicus dolor.

Ꝑ. Succ. parietar. urin. pueri, an. ꝑ. v. ol. rutac. vini cocti an. ꝑ. iij. ovorum lutea ii. sal. ꝑ. i. F. Clyster. *Helideus de Paduanis, consil. 63. lib. 6. pag. 365. consil. Craton. &c.*

Per superiora multa dari medicamenta in colicis non ita semper convenit, salubrior multò est crebrior Clysterum usus. Utatur aliquot diebus ante cœnam & prandium ꝑ. i. sequentis pulver. sæpissimè à me in colica experti cum vino albo.

Ꝑ. Cinamom. integ. opt. ꝑ. iij. galang. cal. aromat. an. ꝑ. i. bacc. lauri, ꝑ. i. cumini, ꝑ. ii. C. C. usti, ꝑ. i. sem. rutæ. ꝑ. i. anis. scenicul. an. ꝑ. iv. caryoph. ꝑ. i. pulverisatis singulis subtilissimè & mistis adde spec. dianis. ꝑ. i. sacchar. albiss. ꝑ. ii. F. pulvis.

Emplastrum denique in torminibus celebre sequens est.

Ꝑ. Emplast. de baccis Lauri. ꝑ. iv. de melilot. ꝑ. i. M. malax. cum modico ol. chamæmel. & rutac. ut fiat massa. *Joh. Nevius consil. 89. p. 649. lib. 6. consil. Cratonis, &c.*

Urgentibus doloribus, injiciatur Clyster ex decocto veronicæ hoc modo.

Ꝑ. Veronicæ, Miii. flor. Sambuci, Mj. absinth. p. i. coq. in lacte, vel quod melius

est, in jure cap. in colat. ꝑ. i. dissolv. sacchar. ꝑ. iij. Aloes. in colat. ꝑ. i. dissolv. myrrh. ꝑ. i. M. F. Clyster. *Joh. Crato. consil. pag. 652. lib. 6.*

Imprimis commendat decoctum veronicæ, quæ à proprietate decoctum veronica coquitur in jussulo gallinæ medetur; ris decocti adjiciatur vini malvatici libræ j. myrrh. ꝑ. i. & tanquam Clyster injicitur, rectè etiam decoctum veronicæ ex vitur, bo cum ꝑ. i. myrrhæ, per os inchoant. al. & urgentibus doloribus datur. *Joh. Craton. consil. 10. lib. 1.*

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Colico dolore.*

**N**ullum præstantius aut divinius remedium pro eo propulsando invenimus quàm lupi intestinum; in pollinem enim redactam & vino generoso exceptum ac calidè epotum, brevi opus suum conficit, & ipse æger sanus evasis. *Amatus Lusitanus, cent. 3. curat. 12.*

Plurima sunt quæ pro præservatione & curatione doloris colici; ab occulta proprietate operantia, à medicis præscribuntur auxilia. Lupinum stercus summè laudat *Galenus* & appposito exemplo confirmat. *lib. 10. de simpl. med. facult. titul. Stercus Lupinum.* Sic pudendum tauri specifica virtute mirificè juvat. Plurimos notavi miserrimè hoc tormento concussos, qui solum hoc auxilio sanitati sunt restituti. Alii ab eo hujus vi sunt præservati: utere eo in pulverem redactò ꝑ. i. quantitate in malvatico dissoluto. *Zacutus Lusitanus observ. 26. lib. 2. Prax. admirandi.*

Propinetur cum vino vel liquore convenienti, stercus lupinum in subtilissimum pulverem redactum ad ꝑ. i. pondus, mirandum dictu acerbissimos dolores citò hoc pulvere evanuisse vidimus, qui in colicis omnibus doloribus tam à frigida quàm calida causa ortis summopere auxiliatur: non operatur qualitate manifesta, sed tantum occulta, ut pluries experti fuimus. *Dominicus Panarolus obser. 36. Pentecost. 3.*

Si dolor Colicus urgeat, fotu ex Chamæmelo & seminibus Lini & fœnugræ. utatur: valet quoque equinum stercus. *Guill. Ballorinus consil. 117. lib. 1.*



Urinæ potum ad gravissimos morbos frigidus propulsando confirmarunt, hanc unanimiter autho<sup>r</sup> extractam sæpe ℥viij. ego à puero immelle despumato permixtione salidam patientibus dolorem tam, ac ceteris non conferentibus auxiliis colicis, omnes excretis flatibus per inferi<sup>or</sup> & superiorem ventrem, ruptaque risosè alvo superstites evasere. *Zacutus Lusitanus, obs. 27. lib. 2. Prax. Admirand.*

Adolescens biliosissimus vigente hyeme in Colicum dolorem incidit ita atrocem, ut ingenti dolore sitique oppressus velut amens, tres dies in somnis duceret, vocatus usus sum sectione venæ, refrigerantibus Clysmis, frigidis Julapiis, & aliis quæ furentem & acrem bilem mulcerent, ac lenirent; sed cum dolor ingravesceret, sitis urgeret, ex nive Emplastrum parti dolenti impono, & aquam gelidissimam cum saccharo ad satietatem bibendam offero; non transierat hora, quin se sanum repente exclamaret, ita ut eodem victu frigidus nutritus, à dolore securus evaserit. *Zacutus Lusitanus, observ. 25. lib. 2. Prax. Admirand.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Colico Dolore.

24. Testicul. equor. vino generoso optimè laventur. Deinde in taleolas incidantur, & in furno exsiccentur sensim non multum calido, ne comburantur, usus tempore.

24. Testium sic siccatorum ℥j. in pulverem reducat cum ℥ss. sem. anis. contus. & in vino vel jure exhibe, quod debet fieri post aliquam evacuationem per Clysteres.

Hoc est singulare quoddam remedium ad dolores colicos, tum curandos, tum præcavendos, à proprietate substantiæ operatur; & illud expertus fui in meipso, & in multis aliis, & tanquam secretum inter mea secreta præcipue habeo.

In eandem intentionem exhibetur etiam pulvis jecoris lupi exsiccati cum magna utilitate. *Rodericus à Fonseca. Tom. 1. consult. 57.*

Ubi morbus non cedit, quidam exhibent ℥iii. ol. rec. amygd. d. cum vino albo & aq. parietar. Deinde exhibent glandem plumbeam argento vivo illitam in formam pilulæ; quæ ratione quidam liberatus est, in summa desperatione. Sed ut arbitror fuisset convenientius exhibere ℥ss. argenti vivi crudi. *Rodericus à Fonseca. Tom. 2. consult. 81.*

Hic Venetiis, maximè celebre proleniendis doloribus colicis est placenta ex pluribus ovis contusis, cum pulvere cumini in sartagine cum ol. Chamæ. confecta, quæ ad locum dolentem apponitur. Balneum etiam universi corporis ex oleo, cæterorum omnium mea sententia est præstantissimum. *Lelius à Fonte consult. 146.*

Nescio qua bona fortuna in radicem imperatoriam, quæ species est chamæleontis albi, & vulgò Cardopatia appellatur, incidi: eam Cyatho vini imposui, & singulis diebus ante cœnam haustum dedi, & cœperunt dolores conquiescere. Cum autem radix illa aliquid malignitatis, præsertim cum est humidior, haberet, itaque cum triduo sumpsisset, & dolores jam remitterent, ℥ss. Myrrh. in vino exhibui. Dedi etiam theriacam cum cal. aromat. extracto, & secundum divinam benignitatem contulerunt hæc remedia. *Ioh. Nevius, consil. 100. lib. 6. Cratonis, &c.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Colico dolore.

**A**Ulicus quidam incidit in dolorem colicum gravissimum: ad cujus sublationem, primò injectus est Clyster emolliens & purgans, postea carminans & evacuans, cum terebintina à quo levatus est, sed brevi dolor rediit, tandem in decocto carminante dissolvi jubeo aq. benedict. ℥iv. diaphan. ℥i. à quo quater dejecit pituitosa multa, & omnino liberatus est.

Eodem Clystere & alter à simili dolore sanus evasit. *Lazarus Riverius, observ. 67. cent. 1.*

Vir quidam quadragenarius gravissimè dolore colico correptus est, qui neque Clysteribus laxantibus, & carminantibus, etiam cum aq. benedicta; neque fomentis



ac semicupiis intra 24. horas usurpatis sedari potuit: eoque continuo saviente sequentes pilulas præscripsi.

24. Aloes opt. ʒi. diagrid. gr. viii. laudan. opiat. gr. v. F. pil. vi. deaurata, has sumpsit media nocte, manè hora quarta dolor protinus quievit, & per diei decursum purgatus est quinquies, sicque omninò liberatus. *Lazarus Riverius, observ. 1. cent. 2.*

Juvenem quendam 18. annos natum colico dolore acerbissimo laborantem invifens, statim præscribo adimmanem dolorem coercendum, quem vix sustinere poterat, laudan. opiat. gr. vi. quibus intra duas horas dolor omninò sedatus est, nec in posterum rediit. *Lazarus Riverius, observ. 12. cent. 1.*

Mulier quædam subitò correpta est doloribus vehementissimis ventriculi & lienis regionem occupantibus, qui neque fomentis, neque purgatione, sedari potuerunt: sed phlebotomia celebrata, satis larga manu è brachio sinistro statim evanuerunt. *Lazarus Riverius, obs. 44. cent. 1.*

Mulier quædam sexagenaria doloribus colicis acerbissimis conflictata, post duos Clysteres frustrà injectos, sumpsit intestini lupi pulverat. ʒi. cum vino, & statim dolor evanuit. Post 10. vel 12. dies, licet per apozemata purgata fuisset, dolor rediit acerbior quam antea, ac licet in Clystere philonii ʒii. dissoluta fuissent, dolor non quievit, prædictus pulvis iterum fuit exhibitus, & dolor imminutus est, ac post trium horarum spatium omninò ferè sublatus. Sed postridie rediit acerbior quam antea; exhibita fuerunt laudan. gr. v. & dolor omninò sublatus est, nec amplius rediit. *Lazarus Riverius, obs. 86. cent. 1.*

Si Clysteres dolorem non solvant, in iis pertinaciter insistendum non est, sed satius est leni aliquo medicamento uti, observatum est, cum æger quidam triginta Clysteres sine fructu accepisset, alium Medicum mannæ ʒi. cum ol. amygd. d. ʒii. in jusculo gallinæ pingui exhibuisse, & ægrum à dolore liberasse, in dolore tamen qui fit à pituita crassa fortiora medicamenta exhibenda. *Galbanetum Paracelsi* humori discutiendo idoneum est, si totus venter eo illinatur. Illius descriptio à *Cratone* talis proponitur.

*Burnet Parte I.*

24. Gummi elemi, hederæ, galbani, ol. laurin. an. part. æquales, distillantur in arena per retortam; servantur seorsim, primum aqua, exinde oleum clarum, tertio oleum crassum instar mellis, quo imprimis utendum est.

Ad Colici doloris qui in paralyin degenerat, curationem, alvo variis Clysteribus soluta, primisque viis cathartico aperitis, demittatur æger in balneum tepidum, ex decocto emollientium paratum, bis, ter, quater, quinquies in die, ut acrimonia humoris temperetur, postero die cathartico accommodato humor ille purgetur. Deinde repetatur balneum, si idque alternis diebus faciendum, vires ægri ferre queant, donec expurgatis humoribus, & sedato dolore, æger in tuto sit, interim Clysteres continuentur, ad dolorem demulcendum, quibus cassia, oleum violac. & Lilior. admisceri poterunt, venter ol. Chamæ. aneth. amygd. d. lilior. cum butyro frequenter inungatur, neque omittenda est, ab ipso morbi initio, phlebotomia, eaque purgationi præmittenda, ac sæpe iteranda, si sanguis prava qualitate infectus appareat, aut si dolor rheumatismi particeps esse videatur. Denique omnia remedia quæ in colica biliosa proposita sunt, hic etiam aptari poterunt, quibus non conferentibus; nonnulli Medici confugiunt ad potionem sequentem, quam licet sordidam & delicatorum hominum ore indignam exhibent, & dolorem statim mitigare affirmant.

24. Stercoris equini ʒi. minutim dividatur & infundatur in aq. papav. rhœad. ibi. in qua guttulæ 8. vel 10. spiritus vini dissolutæ fuerint, fiat colatura cum expressione levi, & parentur potiones tres satis amplæ sumendæ horis exacerbationis doloris. Si verò affectus in paralyin degeneret, lenienda est spina dorsi & partes paralyticæ, balsamo resolvente & nervos roborante. *Galbanetum Paracelsi* hic præcipuè confert, si partibus prædictis, tum etiam umbilico admoveatur. *Lazarus Riverius, lib. 10. Prax. Medic. c. 1.*



## SUBSECTIO NONA.

*Pro Colico dolore.*

**F**iliolus meus *Carolus* in ætate 4. mensium correptus fuit colico dolore sævissimo, qui clamores & ejulatus continuos ab eo extorquebat. Exhibui pulv. el. diamosch. d.  $\mathfrak{ss}$ . cum lacte, quo dolor quievit per horæ quadrantem, & iterum rediit cum pari sævitia; injectus fuit Clyster ex decocto anisi & Chamam. cum vitello ovi, & saccharo, eoque dolor omnino sublatus est.

Post octiduum eodem dolore affectus est, ita acerbo, ut priori deterior appareret, sumpsit vulverem sed frustra: injectus fuit Clyster prædictus etiam frustra, tandem admoveo fotum toti ventri ex decocto anisi & Chamam. in aq. vitæ, prima applicatione dolor omnino desit, sequenti iterum rediit dolor, eoque aliquantulum prædictis remediis mitigato, postero die manè exhibita fuit Syrup. ros.  $\mathfrak{zj}$ . quem assumendo, vomuit pituitam instar albuminis ovi, sed nihil ferè rejecit tormina recurrebant, iteratus Syrupus cum  $\mathfrak{zj}$ . infus. Senæ, etiam parum præstitit, tandem exhibui pulverem comitis. ad  $\mathfrak{ss}$ . cum lacte, eoque blandè ac copiosè purgatus est, & ab hoc affectu omnino liberatus. *Lazarus Riverius, observat. 27. cent. 2.*

Quidam gravissimo colico dolore excarnificatus triduum integrum, cum nullis anodynis levaretur, sumpta  $\mathfrak{zj}$ . pulv. intestini lupi cum paucò vino generoso, incantamenti instar in pristinam valetudinem erectus fuit. Mille alios colica laborantes hoc unico medicamento restitui, nullo injecto Clystere, aut catarthico sumpto; quod admirationem fovet. *Petrus Pachecus observ. 2.*

Quidam retulit mihi se colico dolori obnoxium fuisse per multos annos, quo frequenter affligi solebat, ab eoque liberatum sequenti remedio, una tantum vice assumpto, ita ut nunquam deinceps in eum inciderit, & plurimos alios, quibus idem remedium communicavit, fuisse etiam liberatos.

Hoc remedium est dolii obturamentum,

ex subere confectum quòd per plures annos huic usui inservierit, atque adeo probè vino imbutum sit, illud autem subere igne comburendum est, ejusque cinis exhibendus cum vino albo  $\mathfrak{zj}$ . pondere, urgente dolore, *observ. 7. observationum à Riverio hinc inde decerptarum.*

Nobilis quidam 40. annorum tam sævissimis coli, & ilei intestinorum doloribus torquebatur, ut mortem sibi ipsi consciscendi omnem captaret occasionem. Ego acutus dolorem hunc immanem multis ritè adhibitis pharmacis demulcere sedulò dedi operam, sed frustra, tandem tale decerno Enema.

$\mathfrak{zj}$ . Juris pisorum  $\mathfrak{zj}$  viii. aq. nostræ benedict.  $\mathfrak{zj}$  iij. Sacchar.  $\mathfrak{zj}$ . ol. communis  $\mathfrak{zj}$  iv. M. simul. S. A. & injiciatur quavis hora recrudescentiæ doloris calidè. Ex hujus Clysteris repetitione miraculosè omni sopito dolore, & causa doloris noxia exclusa convaluit. *Martinus Rulandus cur. 22. cent. 6.*

Vir quidam coli dolore infestè cruciatus, liber & sanus illico evasit per sequens infusum catharticum.

$\mathfrak{zj}$ . Troschisch. alhan. pulv.  $\mathfrak{zj}$ . feri lactis  $\mathfrak{zj}$  x. macerentur per noctem in loco calido, fiatque infusio: de qua colata bibit calidè  $\mathfrak{zj}$  v. sedens in balneo aq. dulcis, tandem bibit & fecit sequenti die; & statim sanatus est. *Martinus Rulandus cura. 61. cent. 10.*

## SUBSECTIO DECIMA.

*Pro colico dolore.*

**I**N Colica, & Iliaca flatulenta, remedium specificum est mixtura spiritus vini & spiritus salis an.  $\mathfrak{zj}$ . vel  $\mathfrak{zj}$  ii. in aq. communi tepida sudoribus exinde provocandis data. Illicò nimirum sitientes spiritus colicæ administros potat, ac in vapores resolvit. Patiens quiescat, licet id ei difficile; motu enim crescit malum. In Colica ponatur magnæ super umbilicum & statim cessabit dolor. *Joh. Hartmanus. Pract. Chimiatri.*

Vir quidam patiebatur sævissimum & crudelissimum dolorem colicum, cum cibi potusque vomitu hunc ita sanabam.

$\mathfrak{zj}$ . Spi-



24. Spiritus vitæ auri ʒi. hoc valdè est expurgatus, atque inde quievit dolor. *Martinus Rulandus, curat. 5. cent. 3.*

Studiosus quidam 18. annorum affligitur colico dolore. Sanatur à me unico die hoc modo.

24. Extract. Esulæ ʒß. aq. font. claræ. ʒiv. M. Fiat haustus colandus colaturam bibit calidam, qua probè expurgatus est cum colici doloris remissione, altero die iteravit hunc haustum, & integram obtinuit sanitatem. *Martinus Rulandus, curat. 45. cent. 7.*

Aurifaber quidam colica & diarrhæa subinde corripitur solitus, hoc facili remedio illico se curat, sedendo nimirum per satis longum tempus super incudem probè calidam. *Honoratiss. D. Robertus Boyle* libro de utilitate naturalis Philosoph. Part. 2. Sect. 5. cap. 14.

24. Jusculum cum allio & oleo olivarum, & calidè hauriatur cum vini opt. dimidia parte sæpè enim expertum est. *Petrus Borellus, obs. 92. cent. 4.*

Multos qui colica graviter afflicti essent, curabat medicus quidam experientissimus facillimo hoc remedio. Stercoris ovilli globulos vi. vii. aut ix solvebat in vino opt. colabat, & fortiter expressum infusum propinabat, quibusdam præterea exhibebat magno emolumento pulv. compositum ex part. ii. rasuræ ossium dactylorum, & part. j. pulv. ovorum ex quibus pulli fuerint exclusi. *Hieronymus Reusnerus observatio 178.*

Syrupus ex aqua vitæ paratus cum saccharo in crudis humoribus tormina excitantibus mirificè contulit. In Colico dolore præsertim circa ventriculum vexante, conferre dicunt jusculum ex succo amygd. d. cum granis aliquot piperis longi ex vino *Hipocratico* pauco.

An in Colicis doloribus sectio venæ? Imò præsens remedium si à bile esse videretur, cavendum à medicamentis validis, & usu linteorum impensè calidorum tepore juvantur & thermasmate. Syrupus violatus confert, imò & usus lactis recens multæ aut calidi. *Guil. Ballonius lib. 1. Epidem. & Ephemer.*

Vidimus cuidam acerbitate doloris colici detento placatos esse dolores adhibito umbilico modico Emplastro caustico, & ve-

luti escharam faciente, & intus foras evocante, quomodo etiam in doloribus dentium de foris extremo maxillæ inferioris Escharoticon miro profectu applicant quidam. Pericula ista nos debent cautiore & scientiores reddere ad excogitanda affinia remedia, sed illi aliquanto tutiora. *Idem ibidem.*

Efficax ad Colicam est oleum Saponis. Quod sic paratur.

24. Saponis hispan. part. j. calcis vivæ part. ii. distillantur per alembicum vel retortam, oleum ab aqua separetur, cujus guttæ vi. vel vii. umbilico cum gossipio imponantur. *Sennertus Pract. lib. 3. part. 2. sect. 2. cap. 2. & instit. lib. 5. part. 3. sect. 3. cap. 6.*

Venerabilis quidam Pastor torquebatur dies noctesque continuo & acerbò cruciatu, ac vomitu crebro varia rejiciebat. Ego accersitus ad hunc mox per *Deigratiam* sanum reddo ad hunc modum. Primò rutam contundebam cum aceto, & post coctionem imponebam in duobus sacculis, quorum unum calidè admodum applicabam ventri toti dolenti, alterum ad anum. Et ex hoc fomento spatio unius horæ frænatus fuit dolor cum symptomatis non sine stupefactione astantium amicorum. *Martinus Rulandus curat. 13. cent. 9.*

Celebris Medicus *Augustanus D. Minderer* scribit se multis risui fuisse, quod vinum Colicalaborantibus interdixerit, cum tamen ipse expertus sit, omnes tales spuria paralyfi immunes evasisse. Id quod ego in mea praxi diligenter & non sine magno fructu observavi. Quia autem agri de ventriculi imbecillitate conqueruntur; soleo ipsis *Hispanicum* vel generosum aliud præm. concedere, non tamen pro potu ordinario, sed tantum confortationis gratia. Clyster ipsi in colica familiaris fuit simplicissimus, ex lacte, melle & oleo; eumque mirè commendat. Hunc & ego quoque commendatione dignum experior, & vivunt etiamnum aliquot talibus Clysteribus familiariter usi: præterquam enim quod alvum subducant, etiam dolorem leniunt, & intestina minimè offendunt. *Vvolfgangus Hæferus. lib. 3. Herculis Medici, cap. 5.*

24. Stercor. suill. rec. q. s. applicetur calidè



lidè dolenti ventri in forma emplastri. Hoc solo topico confestim convaluit Dux quidam. *Martinus Rulandus cur. 21. cent. 6.*

Aliquando confugiendum est ad mercurium d. qui aliquoties exhibitus cum purgantibus diagrydiatis curationem absolvit. Quibus suspectum est diagrydium, solus exhibetur mercurius d. in pil. efformatus cum conserva ros. superhausta infusione senæ & rhei, addita manna & syrup. rosac. postea utiliter usurpantur aquæ acidulæ & vitriolatæ. *Lazarus Riverius prax. Medic. lib. 10. cap. 1.*

Zythogalum factum ex cerevisia & lacte, in quo decocti sunt aculei foliorum agrifolii, mirè conducit ad dolorem colicum & tormina intestinorum, ut in semetipfa aliisque nuperrimè experta est matrona quædam post alia remedia frustra tentata. Idem procul dubio efficiet foliorum decoctum. *Joh. Rajus Catal. plantar. Anglie.*

℥. Cort. aurant. sic. ℥vi. coq. in lb. β. vini albi generosi. Colatura bibatur calidè.

Litus loci dolentis ex solo Zibetho mirum in modum prodest. Folia quoque liliorum cum oleo lauri in sartagine frixa, & cataplasmatibus instar admota, stupendæ est virtutis. Agaricum in Clysteribus decoctum statim liberat à dolore colico.

℥. Fol. taurini, sal. gemm. aloes, ol. com. an. part. æq. M. F. unguentum, quo illinatur orificium ani. Facies durissimas educit.

℥. Ovum gallinaceum, abjiciatur albumen, vitello in putamine relicto: adde gr. piper. num. 6. vel 7. aq. vitæ quantum putamen continere potest. Calefiant, & capiat. Certissimum est ad Colicum dolorem remedium, à Regina Maria de Medicis cuidam nobili datum. *D. Robertus Cunninghamo in M. S.*

## SECTIO L.

### De Columella inflammatione.

**G**urgulio quod figura columnam referat Græce dicitur *Κόρυς*, Latinis Columella: sæpe hæc pars inflammatione laborat, figura duntaxat secundum longitudinem & magnitudinem mutata, si

enim inferior ejus pars crassa & orbicularis ad uvæ similitudinem evadat, non amplius columella sed uvula dicitur. Inflammatum columella ob effusos copiosius in partem humores: qui effunditur humor sanguis est imprimis tenuis, aut pituita sanguine mixta. Adest tumor, dolor, ardor, & rubor, cum deglutiendi difficultate, & suffocationis quodam periculo, interdum & cum febre.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Columella inflammatione.

**P**remissis Clystere & venæsectione, hoc gargarisma (cùm essemus in principio) ad fluxionem reprimendam prescripsi.

℥. Aq. plantag. lb. β. aq. Equiseti lb. flor. ros. rubr. p. i. β. gallarum contritarum num. 3. ebulliant unica forti ebullitione colat. addedi amori ℥iii. M. Postea venas sub lingua secari feci, & uvulam etiamnum inflamatam, & propendentem pulvere aluminis usti & boli armeni simul mixtis sublevavi. Hoc deinde gargarismo utens convaluit.

℥. Plantag. bellid. min. flor. ros. rubr. an. p. i. balauft. ℥iii. coq. in aqua ad lb. i. adde aq. plantag. lb. i. sem. Cydon. ℥ii. sem. malv. ℥β. rursus bulliant addendo diamori ℥iib. Mell. rosat. colat. ℥β. M. pro gargarismo, jubebam quoque ut ex dianuco lambere, quo utebatur *Galenus* in Hortulano. *Petrus Forest. obs. 1. lib. 15. de faucium, guttur. gulæ, & asperæ arteriæ affectibus.*

Mulieri cuidam tonsillæ vehementer tumebant, columella inflammata & valde laxata erat, ut vix deglutire & respirare posset, illam curavi in hunc modum.

℥. Aq. font. ℥ii. olæi vitrioli tot guttas quot acidam multum reddant. In hac aqua intinctam pennam ad fauces tumentes immittebat aliquoties in horas singulas: cujus usu ore per multa phlegmata continuo emittebat & expuebat. Post aquæ immisionem ex præcepto meo Succinum album carbonibus imposuit, & per infundibulum ore fumum excepit, & sic cum multorum stupore intra diei spatium sanitatem obtinuit. Nam mox sine molestia deglutivit, facile respiravit, benè dormivit, tumor & inflam-



inflammatio protinus sublata fuit. *Mart. Rulandus, cent. 2. cur. 97.*

## S E C T I O L I.

## De Comate.

**K**ΩΜΑ (quasi per Syncopen pro Κοίμωμαι à Κοιμέω dormio) & Κατάδωξ i. e. in somnum propensio & inclinatio; pro eodem accipiuntur; & nihil aliud sunt quam profunda & nimia in somnum delatio & propensio, somno subsequente vel non. Si sequatur somnus dicitur coma somnolentum, in hoc ægri aperire oculos nequeunt, & non solum in somnum inclinationem perpetuam habent, sed & profundius dormiunt, difficulter etiam excitantur, si nequeunt dormire, vocatur affectus Coma ἐγρηγνισμὸς seu vigil; quod est cum ægri clausos habent oculos ut dormire videantur, cum tamen vigilent. Causa Comatis somnolenti est quicquid spiritum animalium ad sensus organa influxum prohibet, ut sunt intemperies cerebri frigida & humida præsertim cum materia, quæ vapor est sæpius, quam humor: copia etiam calidorum & putridorum vaporum ad caput exhalantium, vel à toto, ut in febribus, vel à parte aliqua, ut ventriculo, intestinis & vermibus in iis. Hæc enim cerebrum replent, canales spirituum animalium ad sensum organa obstruunt, & spiritus ipsos torpidos reddunt, unde faciliè obrepit somnus hic præter naturam. Probabilis etiam est, nec improbanda eorum opinio, qui hujus mali causam vaporibus adscribunt narcoticis; spiritibus animalibus torporem inducentibus.

Differt hic affectus à Caro, quòd in Comate interrogati respondent, in Caro vero nequaquam. Coma vigil fit ex certamine biliosi & pituitosi humoris in cerebro, unde soporis & vigiliarum est mixto, bilis enim vigilias, pituita vero soporem inducit: Potest quoque hujus Comatis causa assignari vapor narcoticus simul & mentem turbans. Sunt enim plurima narcotica, quæ & somnum inducunt, & deliria excitant; Qui comate vigili laborant, oculis conniventibus somnum captant, dormire tamen non possunt, aut si dor-

*Burnet Parte I.*

miant, mox excitantur, delirant, corpus varie movent, temerè è lecto surgunt moxque iterum decumbunt, aliquando adstantes invadunt.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Comate seu Subeth puerorum.

**P**uer quidam 5. annos natus, crassus & obæsus, subito incidit in comatosum affectum, cui convulsionibus interdum superveniebant. Vocatus statim præscribo clysterem ex hiera diaphœnicone & aqua benedicta. Quo multum purgatus est. Reiecto Clystere, exhibeo salis vitrioli ʒß. & provocato cum penna vomitu, multam pituitam excrevit, ac paucis post horis liberatus est. *Lazarus Riverius, observ. 28. cent. 4.*

Puella quædam 8. annorum comate detinebatur cum convulsionibus frequentibus, cui Medici multa remedia adhibuerunt, clysteres nempe, frictiones, cucurbitulas, vesicatoria, sternutatoria, & similia, ego vitrioli albi ʒi. cum jusculò exhibui, & vomitu excitato illico liberata est.

Filius cujusdam hortulani 5. vel 6. annos natus, eodem affectu cum convulsionibus detinebatur, cui exhibui aq. bened. *Rulandi ʒß.* unde supra & infra purgatus est, & ab affectu liberatus. *Samuel Formius, observ. 11.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Comate.

**S**acerdotem juvenem robustum comate vidi correptum à recediva febris, clystere accerrimo cum Colocynthidis ʒiii. Mell. ros. ʒii. & sale, sine efficacia indito, Prævotius 7. Vesicantia imperavit, quibus parum proficientibus, ad occipitis inustionem ventum; à qua melius habuit. *Job. Rhodius, observ. 36. cent. 1.*

Commune est omnibus Cataphoris remedium aceti acerrimi perfusio super laminam ferream ignitam, quæ multos fumos acres excitat: qui naribus attracti, cerebrum exsiccant, somnumque expellunt, efficacius erit si addatur semen nigellæ



vel ruta aut castoreum, *Guil. Rondeletius, pract. lib. 1. cap. 19.*

Qui in somnum profundissimum cadebat, pro apoplectico falsè habebatur, hunc autem difficulter ligaturis fortibus ac vinctulis injectis, ac demum solutis, tum frictionibus excitare potuimus. Sed injecto acriclystere cum multis molestiis & vellationibus excitatus est, frigidum & humidum habebat cerebrum, pituita repletum. Post exhibitum oxymel Scyllinum, & Syrupum è Stœchade, has pilulas commode devoravit.

24. Pil. Coch. ʒii ʒ. Castor. ʒss. cum Syrup. è Stœchade F. pilulæ v. quibus alvus egregie turbata est, demum adhibita theriaca ad ʒi. vigil factus est, & à somno excitatus ad mentem rediit. *Petrus Forestus observ. 33. lib. 10. De Cerebri Morbis.*

### SUBSECTIO TERTIA.

*De Comate somnolento ex vini nimio usu.*

**S**acerdos quidam si apud Convivas paulo largius vinum hausisset, comate soporifero detinebatur, adeo ut neque tympanis valde sonantibus, nec quovis horribili strepitu aut sonitu, vel exclamantibus à somno expergisceretur: imò in mensa sedens, somniculosus, stupidus & immotus manebat: & si annuli à digitis detraherentur, & modò in hanc, modò in aliam partem propulsus, & si in domum ab aliis ferebatur nullo modo excitabatur, Huic viro ego Apoplexiam, aut aliud gravius malum ob hoc accidens prædixi: nec me fefellit prognosticum, postea enim ab apoplexia extinctus est. Alios etiam novi, qui ubi largiter potassent, illicò Coma soporiferum incurrebant. *Petrus Forestus, Schol. observ. 34. lib. 10.*

### SECTIO LII.

*Pro Condiendo Funere Magnatum.*

**I**n Italia hic ordo servatur, primùm Pharmacopolam jubent, ut hæc simplicia adornet, quorum postea in conditura usus erit.

24. Ros. rubr. absinth. sicc. lavend. nuc.

cupress. salv. an. Mij. cal. aromat. spic. nard. an. Mj. myrrh. mastich. aloes an. ʒi. cinnamom. macis, nuc. mosch. cariophyl. croci, an. ʒi. alumin. roch. acacia, an. ʒii. sal. communis, lb 1. cumini fursur. torrefact. an. lb. 1. Contusa omnia grosso modo ferventur ad Condituram. Item.

24. Aq. vitæ, lb x. aceti acerrimi, lb xv. stup. canabin. vel cotti, lb viii. Spongiæ magnas numero 4. ista omnia appparata habere decet.

Administratio autem condituræ hac ratione perficitur.

Inciso ventre longitudinaliter, & latitudinaliter detracto etiam sterno, & serra ablato Cranio, auferuntur omnia interanea omnium trium cavitatum. Postea totum corpus intus aqua frigida primò eluitur, ac spongiis abstergitur. Secundò, aceto acerrimo. Tertiò aqua vitæ diligentissimè. Deinde facta cum sicca spongia abstersione, pulvis inspersus infricatur ea ratione quæ suillam carnem sale condimus. Tandem faldellæ ex stupa, aut cotto, aqua vitæ immersæ, & rursus manu expressæ undequaq; carni applicantur, insperso una pulvere, quibus cavitas ventris, pectoris & capitis tota adimpletur; ac demum consuitur cutis. Postremò omnium linteo incerato calente adhuc, cadaver obvolvitur, ita tamen, ut digitus à digito sit separatus. Deniq; cadaver linteo incerato involutum, pro Colophone pici navali illinitur. Conservatur cadaver hac ratione conditum ad decem vel duodecim annos, quod si diutius adservari velis, omnes muscoli totius corporis longitudinaliter incisi & præscripto modo eloti, pulvere erunt aspergendi & apprimendi.

Ita paratur Linteamen inceratum.

24. Cera novæ lbii. resin. pini, terebinth. an. lbj. gummi arabi. ʒvi. colliquatis omnibus immerge linteamen, vel tantum telæ lineæ quantum sufficit ad involutionem totius corporis, quo extracto insperge cumini pulverati, ʒ viij. (potius ʒ viij.) salis communis ʒ iv.

24. Pici nigr. resin. pini, an. lb. iv. styrac. liquid. ʒ ij. solutis omnibus ad ignem illinatur totum corpus linteamini incerato jam involutum: hac ratione & hoc modo ipse aliquoties & vidi in Italia, & feci nostro-



Strorum Principum corpora condiri. *Rei-  
nerus Selenander consil. 14. sect. 4.*

### SECTIO LIII.

*Pro Conditura corporis Nobilis Viri.*

24. **V**ini sublimati mensur. ij. pro abluenda post exenterationem tota cavitate interiore pectoris & abdominis, quæ statim post factam abluitionem terebinth. undique aspergatur, ut pulveres & herbarum injiciendæ melius adhæreant. Postea sequentibus impleatur.

24. Fol. rorismar. lauri hyssop. absinth. menth. rutæ, salviæ, serpill. puleg. origan. Scordii, flor. rorismar. ros. lavendul. chamæm. stæchad. spicæ communis an. M ij. sem. carvi, fœnicul. an. lbj. rad. Gentian. cariophyllat. angel. valerian. an. lbj. incendantur crassiusculè.

24. Aloes lotæ lbj. myrrh. lbj. mastich. thur. an. ʒij. benzoin. styrac. calamit. ladan. cinnam. carioph. nuc. mosch. macis, croci, an. ʒj. mummiæ, ʒiij. crasso modo contusa M. cum præcedentibus. Hæc omnia capacitati injiciantur, corpusque futuris occludatur, ac sequentibus oleis totum corpus inungatur.

24. Ol. absinth. rutæ, spicæ, chamæm. an. ʒiv. ol. juniperi, laurin. an. ʒij. ol. petrol. ʒij. ol. terebinth. ʒj. M.

Ad incerationem indusii, quo corpus post inunctionem induatur.

24. Terebinth. lbj. ceræ lbxv. dissolve cum oleo procerato.

Pro replenda capacitate Narium & Aurium.

24. Ol. nuc. mosch. express. ʒß. ol. caryop. destil. ʒij. M. *Gregorius Horstius. Appendice ad observ. 9. lib. 3. de Morbis pectoris.*

### SECTIO LIV.

*De Contusione.*

**C**ontusio in quacunque corporis parte sit, nihil aliud est quam interna membri continui solutio & collisio, extrinseco plerumq; integro apparente. Fit à re gravi, dura & obtusa, ea sequitur aliquando ex hæmorrhæ sanguinis scilicet subter cutem effusio.

### SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Contusione sine Vulnere.*

**V**ir quidam dum carnem fortiter percuteret, ex improvviso cecidit super coxam; insignem dolorem ex contusione cum pateretur, oleo rosaceo & myrtino imprimis locum affectum ut inungeret mandavimus: quo dolor omnis tandem cessavit, nulla subsequente inflammatione, aut partis collisæ nigritie. Soleo enim in Contusione ex casu aut collisione, ne fiat inflammatio, echymosis, seu sanguinis sub cutem aggregatio, modò nulla sit carnis ruptio, uti ab initio sola olei rosac. inunctione cum myrtino, quæ multis ita profuerunt, ut non opus fuerit aliis remediis, alioquin postea inungere soleo unguento Alabastrino.

Doctor Jason qui de uteris Librum edidit, in offensione & contusione absque vulnere, & casu, nautis in mari degentibus, quibus remedia ad manus non essent, imperabat, ut peplum in muria (vulgo pickle) calida immersum & expressum apponerent, nec alio remedio quam hoc ad contusionem, offensionem & casum utebatur.

Quidam contusionem pedis hoc Emplastro curavit.

24. Stercoris vaccin. absinth. an. Mj. furfur. Mß. fl. chamæm. ʒij. cum ol. chamæm. F. Emplastrum. *Petrus Forestus observ. 28. lib. 6. observ. Chirurg.*

### SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Contusione.*

**A**dolescens quidam ex alto ceciderat, ita ut omnia membra admodum contusa fuerint, & brevi moriturus videretur, pater ipsius accepit favos cum melle & coxit in vino ad consistentiam unguenti, quod extendit super corium vervecis recenter mactati, eoque ægrum involvis reiterata per triduum operatione, æger omninò curatus est. In contusionibus particularibus, extenditur unguentum super linteam, & applicatur, statim curat. *Lazarus Riverius observ. 29. cent. 3.*



## SECTIO LV.

## SUBSECTIO PRIMA.

## De Convulsione.

## Pro Convulsione.

**C**onvulsio (Græcè *σπασμός*, Celso Distentio nervorum) est partium quæ sponte nostra (non sua) moventur, præter voluntatem sursum ad principium suum contractio, quam rigor, figuræ depravatio & acerbissimus dolor consequitur, pars affecta est Musculus, qui proprium est voluntarii motus instrumentum mediantibus tamen nervis & musculorum fibris. Causa proxima (rejecta per celebri veterum opinione de repletionem & inanitionem, quæ tot difficultatibus involuta, animum veritatis avidum satiare nequit) est expultricis facultatis partium in musculo nervosarum à re quapiam molestante irritatio, animali ibidem facultate in consensum tracta & motum perficiente. Causæ materiales sunt quivis humores, ne ipsa quidem pituita excepta, dum modo occultam aliquam & nervis inimicam dispositionem acquisiverint, vapores etiam & humores maligni ut in febribus sæpe, & cholera, morbo quæcunque tandem nervos vellicare possunt, convulsionis causa rectè statuuntur. Convulsio autem est totius corporis, aut est partium plurium vel pauciorum, quæ totius est corporis, tres constituit species: prima dicitur *ἐμπροσθεν*, quando caput, cervix & spina dorsii in anteriora convellitur. Secunda *ὀπίσθεν*, quando eadem partes in posteriora contorquentur. Tertia est *τετάνος*, in qua cervix & reliquum corpus rigidum ac in neutram partem flexile apparet, hæc species Spasmi ut sunt rarissimæ, ita etiam periculossimæ. Est præterea alia species convulsionis quæ flatulenta vocari solet; *Italica* verò Crampa; vulgò etiam *Kramp*. Accidit plerumque musculis humerorum & tibiarum digitisque manum & pedum, & cum maximo sit dolore: excitatur à flatu: non tam periculosa est facillè enim imo sola frictione tollitur.

**P**ro purgatione exhibuimus has Pilulas.

24. Pil. Coch. & fœtid. an. ʒss. castor. gr. iij. fiant pil. vii. Pro divisione Clysteribus fortibus uti mandaveram, sed non admittebat. Interea & ventosis siccis, etiam cum scarificatione in spatulis & natibus cum usus essem, ad masticatoria & apophlematismos accessimus. Hæc non solum divertunt, verum etiam propriam materiam è capite educunt. Deinde reliquias materiæ remanentis dissolvimus atque consumpsimus, intus & extra membra convulsa roborando, theriaca assumpta & mithridatio, diamoschio & conserv. flor. salviæ & rorismar. & exterius spinam dorsii tum membra convulsione laborantia, inungendo oleo vulpino, vermium terrestrium, atque pelle arietis calente contracta membra involvendo. Membra quoque detinendo in decoctione catellorum in vino & oleo decoctis, neque experimento *Nicoll* neglecto quod resolvit & dolorem remittit. Anser pinguis evisceratur, in quo minutim incisus positus felis, cum lardo, myrrha, & thure confusus, in veru rotetur vase aceto repleto supposito, in quo prima pinguedo destillans abjiciatur, sed quæ paulò post extillat, usui reservetur. Postea anser bulliat in dicto aceto & maxima pinguedo, inde separabitur, & aceto supernatabit, quæ miscenda cum prima, quæ convulsa membra inungantur. Refert *Gatinaria* se ea quendam curasse, cui pedes convellebantur, & in plurimis aliis usum fuisse. Novimus qui solo balneo ol. communis cum decoct. vermium terrestrium à dolore liberati fuerint. *Petrus Forestus*, ob. 104. l. 10. De Cerebri morbis.

Mercator quidam robustus 36. annos natus, aliàs rheumatismo obnoxius, ob hanc quoque causam venæ sectioni ac purgationi assuetus, quas tamen per biennium intermisit: dum interim genio nimis & vino indulgeret, ingens eum dolor prehendit, quem quidem per integram septimanam neglexit. Tandem ex consilio Chirurgi consanguinei purgavit, & venam



nam pertudit. Sed non dempta plethora in terribiles incidit & frequentes convulsiones, cum sanguinis ex ore spuma, vocis defectu & aphonia. Illicò vocatus, venæ sectionem statim impero ad 3x. & à meridie rursus ad 3v r r r. Clysteres acres injecti & suppositoria indita. Dentes aperire nequibat, ea nocte loqui cœpit; sed convulsiones licet rariùs rediere. Sequenti die Cucurbitulæ scapulis cum scarificatione affixæ, distinctè loqui & os aperire cœpit. Resinam jalapii ad ʒi. cum Castor. gr. iv. in aqua theriacali exhibui, & exinde probè purgatus, nec posthac rediere convulsiones. Sed incidit in levem phrenitidem, quæ statim sectione venarum brachii & temporum fugata est, & sic Dei opt. Max. beneficio sanitatem integram recuperavit. *D. Robertus Cuninghame in M. S.*

Quidam cum in flexura brachii in parte exteriori vulneratus esset, totius brachii usque ad axillas convulsione satis continua cum maximo dolore corripiebatur: sed continua frictione ex oleo vermium terrestrium hic probè curatus fuit nostra industria, quem etiam alii Chirurgi duo tractabant. Pinguiter aliquando per integram noctem inungebatur, & quando à lenitione Chirurgi cessarent, ingenti dolore denovo torquebatur, donec ista sola lenitione ab omni convulsione fuerit liberatus. *Petrus Forestus, observ. 120. lib. 10.*

Matrona quædam convulsionibus brachii sinistri cum maximis doloribus correpta fuit, & per dies aliquot laboravit. Ego tandem vocatus brachium & nucham sequentibus oleis inunxi.

24. Ol. Lumbric. vulpin. lilior. an. ʒii. ol. philosoph. & terebinth. an. ʒß. pingued. human. ʒi. M. circa carpum cingulum, ex corio humano applicui, his convulsiones cessarunt. *Fabriz. Hildanus, observ. 9. cent. 3.*

Si ex repletionem fuerit convulsio, evacuationem requirit, quapropter victus tenuis instituendus, corpus expurgandum, & vena secanda, parsque affecta, totaque spina dorsii sequenti linimento inungenda est.

24. Ol. lumbric. vulpin. an. ʒii. ol. terebin. ceræ, de castoreo an. ʒj. axung. human. ʒiii. succi lumbricor. ʒi. M. applicetur calidè.

*Guil. Fab. Hildanus, lib. de Gangrana, cap. 26.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro convulsione.

**J**Uvenis toto corpore convulsus erat, ita ut spina dorsii non posset inflecti. Sequenti remedio statim expedite ambulavit.

24. Butyri rancidi, laridi veteris, an. ʒiii. bdellij, ammoniac. an. ʒi. myrrh. castor. an. ʒiii. flor. stœchad. anthos. an. p. i. nuc. mosch. cariophyll. an. ʒi. cæctum parvum exenteratum, excoriatum, & in frustra concisum. His inferciatur anser, & consuatur, & torreatur in veru, primus qui defluet succus abjiciatur. Secundus colligatur in vase aceto semipieno, pro litu spinæ convulsæ. Remedium est divinum. *Petrus Pachecus, observ. 8.*

Ab inanitione cum Nobilis vir acerbissimis doloribus, à convulsionis vi natis, ferè necaretur. *D. Gaillardinus* eum iussit totum caldo olei immergi, unde præclare recreatus fuit. Corallum proprietate juvat convulsionem ab inanitione. *Joh. Heurnius ad Hipp. aph. 26. sect. 2.*

In convulsione à repletionem, utiliter calida & sicca in usum duces, ut decoctum pœonia, ligni guajacini, sarsaparillæ, lign. saffras, theriacam, mithridatium, castoreum, & talia cetera. *Joh. Heurnius, ad aphor. 57. sect. 4.*

Ubi à plethora nata est convulsio, venæsectio solatio est: ubi ab exhaustu balneum tepidi olei convenit. *Io. Heurnius ad aph. 39. sect. 6.*

Puerum quendam 17. menses natum convulsione opisthotono laborantem tribus auxiliis brevi sanavi; abstinencia à carnibus, vino, & ovis, linteis in oleo chamæm. & liliceo madefactis perpetuò impositis cervici, partibusque quæ contrahebantur; & medicamento, quod constabat ex mithridatio triplo sacchar. rosaceo, & electuario de moscho cum margaritis, hyacinthis, smaragdisque orientalibus. *Hieron. Cardanus, cur. 15. De admirand curationib.*

Nullum remedium utilius est, quàm Embrocatio partis posterioris capitis, nuchæ, & colli, cum oleo violac. decenter ca-



calido; sicut ego feci, dum essem in servitiis Illustrissimi Domini mei, Domini Caroli Secundi, Sabaudia Ducis, in Illustrissimo Ludovico Principe Pedemontij, Illustr. Ducis filio, qui dum esset in cunabulis passus est Erysipelas in tota tibia cum bubone in coxa, & febre valde intensa, à quibus cum convalesceret, incurrit statim in Spasmodum à siccitate causatum, cum continuis maximisque clamoribus, torquendo caput ad posteriora, & nullo modo poterat fugere lac. Ego igitur perfudi nucham, & totam partem capitis posteriorem, & collum cum oleo violato decenter calido, permittendo cadere oleum ab alto, manu exprimente petiam in eo infusam, per spatium quartæ partis unius horæ, & sic embrocando dormire cepit. Mox pannis decenter calidis absterse caput leviter fricando, & cum dormire permisit: qui post tres aut quatuor horas per se excitatus, fugit lac absque ulla difficultate redeuntibus iisdem symptomatibus semel aut bis, eodemmet remedio iterato, cura gratia Dei sanus factus est. *Petrus Bayrus, practic. lib. 2. cap. 20.*

Cum Medicinam discebam Patavii vidi adolescentem, cujus intestina totumque abdomen convellebantur, testes & vasa spermatica sub osse pubis abscondebantur, rugitus aderat, & tensio hypochondriorum. Frigida huic erat temperies, & ventriculus frigidus cum madore. Anhelosus erat oppresso à diaphragmate, ac mente in paroxysmo exuebatur. Præceptores mei adhibebant flatum discutientia, & attenuantia; ac ea quæ evincere possunt materiam frigidam coquendo ac purgando, & roborabant tandem intestina. Primum in jectus Clyster ex decocto anethi; cum hiera, melle rosac. & ol. Chamæmel. Dein decocto agrimonie, petro sel. præparabatur. Postea pilulis aureis ac alephanginis purgabatur, alternis diebus Clyster repetebatur: foris oleo rutæ & castor. ungebatur. Interdum accipiebat unam pilulam ex Castorio cum Syrup. beton. hæc inaurata erat, Bibebat vinum Salviatum & ex betonica, dianisum illi in deliciis erat: fricabantur crura. *Joh. Heurnius, cap. 26. De Morbi Capitis.*

Quadam mulier passa dolores brachio-

rum, genuum cum contractione, cum non posset ullis remediis sanari, tandem vetula asperso malvatico ignito lateri, & adjectis foliis lauri, nepitæ, stæchad. majoran. rorismarin. organ. salv. Jubebat exciperet fumum; & excitato sudore, convaleuit, *Solenander. consil. 15. sect. 5.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### *Pro Convulsione flatulenta.*

**H**oc Linimentum optimum est. Accipiatu omnis pinguedo caniculæ prius mactatæ: cui adde flor. chamæm. lavend. an. Mii. chamæpit. rorismar. hyssop. an. p. i. lumbric. vino lot. numero 7. castor. Zii. terebinth. & mellis an. Zi. istis simul concisis & tuis suffarciendus anser subpinguis deplumatus & exenteratus, elotusque vino, qui diende suffixus veru affertur ad ignem, atque inde extillans pinguedo in suppositum vas quod generosum vinum admixta pauca aqua vitæ contineat; excipienda, postea auferenda, diligenterque asservanda pro usu. Paratu & hoc facile est ad hujusmodi spasmodum juvenisque subinde compertum.

24. Axungiam seu pinguedinem vulpina (defectu ipsius caninam substitue) immisce grana aliquot piperis crasse tusa & cum tantillo generosi vini, vel aquæ vitæ coque ad vini exhalationem lento igne, pinguedinem per lineum pannum expressam adserva, ista illita confricentur spasmo convulsa membra manibus calentibus. *Reimerus Solenander, consil. 23. sect. 2.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### *Pro Convulsionibus in Puero.*

**P**uer quidam decem annos natus correptus est convulsionibus Epilepticis gravissimis, ut omnes corporis parte atrociter convellerentur, & paroxysmi identidem recurrerent nullaque propemodum adesset intermissio. In tanto periculo & tam præcipiti affectu, exhibeo salis vitrioli 3ß. in aq. beton. dissolutam, qua vomitus statim concitatus est, ægerque multam rejecit pituitam, & statim convulsionibus co-



hibita sunt. Attamen post aliquot horas redierunt sed longè breviores ac leviores, ideo purgatio instituta est ex diacarthami ꝑ. Syr. ros. ꝑ. i. cum aq. beton. eaque exhibita est sub vespere, cum mane affectus cum corripisset. Per noctem bene purgatus est. Postea ei exhibita sunt ol. succini & spiritus vitrioli, an. gr. ʒ. in aq. beton. remissiores fuere paroxysmi, sed nocte insequente aliquantum frequentiores rediere. Postridie mane exhibetur posio ex aq. Card. bened. & scord. an. ꝑ. i. aq. theriac. Bauderon. ꝑ. i. sal. Card. bened. ꝑ. i. Confect. alkerm. ꝑ. i. cujus beneficio convulsiones omnino sublatae sunt: ne tamen iterum succrescerent bezoardicum joviale bis exhibitum est, octo horarum spatio ad gr. x i i. & sic omnino liberatus est: potio alexipharmaca & bezoardicum joviale exhibita sunt, quia magna erat malignitatis suspicio. *Lazarus Riverius, observ. 59. cent. 4.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Convulsione.

24. **S**piritus cornu cervi, aut fuliginis, vel sanguinis humani, vel salis armoniaci q. s. sumantur gutt. x. ad x i i. mane & vespere in cochleari Iulapii sequentis superbibendo haustum ejusdem.

24. Aq. Lumbric. limacum an. ꝑ. v i. aq. jugland. simpl. ꝑ. i v. aq. raphan. comp. ꝑ. ij. sacch. albiss. ꝑ. ij. F. Iulapium. Dosis cochlearia 4. vel 6. bis in die.

24. Millepedum mundator. ꝑ. i. Cario. phyll. concisorum ꝑ. ʒ. superaffunde vini albi ꝑ. ij. destillentur in cucurbita vitrea dosis ꝑ. i. ꝑ. ʒ. bis in die.

24. Pulv. Mellipedum præp. ꝑ. iij. sem. amineos ꝑ. i. F. pulvis dividatur in x. partes, sumatur dosis bis in die vel assellis x i i. contusis cum vino albo affuso exprimatursuccus F. haustus, sumatur bis in die. *Thomas Willis cap. 5. De morbis Convulsivis.*

Virgo quædam 16. annos nata, pulchra & iocunda, patre tamen paralytico progenita, sine causa evidenti, circa brumæ solstitium, malè habere cœ-

pit: primò per aliquot dies Cephalalgia & vertigine, haud gravi tamen modo afficiebatur; deinde in brachio uno, & mox in altero tremorem, & subitam contractionem persensit; cujusmodi spasmi isto die sæpius repetentes, vix punctum temporis durabant; postridie juxta sororem suam in Cathedra sedens, subito exiliens, saltum unum, & alterum, multosque alios successivè ad distantiam plurimum pedum mira agilitate perficiebat: dein cum Camera extremum limitem attigit, aliquandiu in eodem loco, & qualibet vice ad miram altitudinem saliens perstabat, cum saltationi ulteriori crura deficerent, in terram concidit, ac statim caput mira cum violentia huc illuc coniecit: quamprimum ab hoc motu præ lassitudine cessaret, statim manus & pedes idem furor invasit, ut necesse haberet membra hæc parietes aut postes percutiendo, vel pavementum contundendo validissimè exercere: quando ob pudorem, aut verecundiam, amicis aut adstantibus debitam, se magna vi ab his motionibus cohiberet, & (usque enim animo constabat & sobrie loquuta erat) statim affectu interius transmissio, insigni cordis oppressione, cum gemitu, & singultu valde stridulo, plurimum infestabatur; dein cum se relaxaret, statim, cæstro ad artuum exteriorum musculos transmissio, aut saltare, aut caput, vel brachia immaniter huc illuc conjiceret, aut etiam in Camera rapidissimè cursitare, vel humum pedibus contundere cogebatur, die quinto à quo hæc domina primo, ægrotaverat adveniens, vomitorium ex infusione Croci metall. vino scilicet, & sale vitrioli propinabam, à quo septies evomit bilem æruginosam in magna copia, cum admittance humoris acerrimi & quasi vitriolici: postridie sanguis è vena Saphæna ad ʒ. x. detrahebatur. Præterea sumebat bis in die antidota ex pulveribus lapidum pretiosorum, cranii humani, & rad. pæon. maris, horum usu intra septimanam sanari visa, per plures exinde dies affectionibus prædictis immunis degebat: attamen post binas hebdomadas, instanti plenilunio, ejusdem morbi recidivam



solito atrociorē patiebatur. Cœpit hoc tempore, ex aliorum præscriptis, remedia antihysterica, & statis quibusdam intervallis purgantia, sine quovis tamen juvamine. Denuo accersitus, siquidem robusto corporis habitu, & spirituum efferatione insigni prædita videretur, emitticum fortius propinabam, à quo decies evomuit bilem instar æruginis viridescentem, cum pituita instar aquæ stygiæ acerrima, & subito alleviabatur. Exhibui post hæc, quovis manè haustum vini albi cum aqua ceras. nigr. dilutum, asellis contusis superassum, & fortiter expressum. Horum usu statim curari visa, per mensem & amplius integrè valebat: cumque postea affectus redituri quævis præludia unquam persensit, mox vomitorii, & ejusdem milipedum expressionis usu, morbi insultum avertebat, & sic intra tres menses, sanitatem pristinam ita recuperabat, ut plures nunc annos affectionibus ejusmodi Spasmodicis immunis degeret. *Idem de morbis convuls. cap. 9.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### *Pro Convulsione rara.*

**V** Ir quidam militaris ex ictu tormenti bellici vulnus accepit in brachio dextro, quod totum brachium abscissum est, superstitetantum parte, quæ humero vicina est, ad 4. transversorum digitorum longitudinem. Corato brachio & vulnere optimè consolidato, quadam convulsionis specie correptus est, quæ retrahebatur caput versus partem dextram, & mandibulas frequenter agitabat. Medici & Chirurgi convocati, uno ore censuerunt in extremitate ossis à tormento bellico præcisi, aliquam eminentiam acutam adesse, quæ nervum aliquem feriendo, talem convulsionem produceret, & ideo rescindendam iterum esse ossis extremitatem, ac diligenter adæquandam. Hæc operatio, sedulò celebrata, nihil tamen profuit. Fortè fortuna cum ei occurrisset, & ille incommoda sua mihi enarraret, in mentem venit, aliquod virus venereum intus latens hunc affectum forsitan posse producere: Et illico ab eo quæ-

sivi, num morbum aliquem venereum unquam antea passus esset; respondit se per aliquod tempus antequam vulneratus esset gravem passum esse gonorrhæam, quæ tamen curata prorsus fuerat. Hoc meam conjecturam auxit; ita ut ægro consuluerim remedia luis venereæ experiri, quibus ille hujus morbi curandi cupidissimus, se lubenter submisit, præmissis igitur purgatione universali & diata sudorifera, frictiones ex unguento mercuriali celebravi, à quibus pytalismus provocatus est, & post tertium diem pytalismi convulsiones illæ desierunt, neque ab eo malo amplius ullo modo æger conflictatus est. *Oxias Aimar. Chirurgus Celeberrimus, observ. 10.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *De Convulsione unguib. incaute resectis.*

**N** Obilis quidam Venetus dum præscinderet ungues, læso nervo successit inflammatio & convulsio, tandemque tertio mense interitus. *Joh. Rhodius. observ. 50. cent. 1.*

Nervo manus punctiuncula tacto, Prævotius convulsionem mortiferam animadvertit. *Joh. Rhodius, observ. 51. cent. 1.*

## SECTIO LVI.

### *De Cordis Calculo.*

**N** On semel in corde lapides reperti sunt; quod quidem mirum sed non sine variis optimorum aut horum testimoniis, id autem fieri potest, quoniam quæ in corde generantur, ut lapilli & ossa non ei vim inferunt, ut extrema accidentia; *Petrus Borellus, observ. 88. cent. 1.*

## SUBSECTIO PRIMA.

### *De Cordis Calculo.*

**R** Ari quidem Calculi intestinis sunt, at rariores longè qui in ipsa cavitate cordis solidissimi reperiuntur: qualem ego aliquando in sectione nobilissimæ faminae conspexi: pondus, cum à Bibliotheca mea



mea absim, adscribere non possum, curavi autem tunc temporis exactè eum depingi, & historiam calculorum, *Johan. Kantmanni* adieci, totam cordis cavitatem adimplebat, corpore incurvo, colore cineritio, in cujus apice 2. veluti rostra prominebant. *Bernardus Stieberus in Epist. ad Greg. Horstium post obs. 47. lib. 4. obs. Greg. Horstii.*

Mercatoris cujusdam filia in febrem biliosam continuam incidit, cum dolore capitis, intumescencia ventris, & cardialgia frequenti; omnibus præsidis irritis, naturæ tandem debitum solvit. Post mortem à collegis meis aperitur: abdomen ichore fetido repletum, omentum putrefactum, lien atque hepar Schirrho laborans, pulmones pleuræ adnati, cor duplo majus bubulum referens, inveniuntur, quodque notatu dignum, circa valvulas dextri ventriculi calculus ex tartaro concretus, instar minoris castaneæ nucis compressioris membranosa valvularum substantiæ adnatus conspicitur, vehementioris *Καρδιαλγία*, procul dubio causa proxima. *Gregor. Horstius in Epist. post observ. 7. lib. 4.*

Nobilissimus juvenis *D. Carolus Comes de Balcarras* 11. annos natus cum tota ætate præcedente (licet ante ab infantia usque salubriter satis vixisset) febris quotidianæ impetum sustinisset, quam finitam subsequuta sunt frequentes intro assumptorum vomitiones, ut & nonnulla circa appetitum symptomata, præclusa tandem obstructa & intercepta sanguinis & spirituum officina suffocatus obiit, dissecto cadavere præsentem medico ordinario, viscredibile est, quàm magnus Calculus duarum prorsus unciarum ponderis, ejusdemque pariter cum corde figuræ ventriculos ipsius ambos undiquaque occupans sit intus repertus.

Vir quidam Nobilis fideque dignissimus mihi aliquando narravit in Nobilissimi *Il. lustrissimi* *D. Georg. Huntileæ*, Marchionis dissecto post obitum corde lapillum fuisse repertum.

## SUBSECTIO SECUNDA.

## De cordis Calculo.

**N**uper in *Casaris* corde, qui palpitatione frequenter corripitur solitus erat, veluti lapillus quidam niger repertus fuit. *Thomas Erastus consil. 10. lib. 3. consil. Cratonis, &c.*

In Imperatoris Maximiliani secundi corde secto inventi sunt tres lapilli quantitate pisorum, unus interim major altero, colore rubigineo, frequenter vero cordis palpitatione gravi afficiebatur, dum viveret. *Joh. Vierus lib. 4. de præstigiis demonum, cap. 16.*

*Leydenfis* quidam juvenis compotationibus nimium dedicus, in crebras inde cordis anxietates incidit; postea in *Lypothymias* & cordis palpitationes. Cibi potusque erat avadissimus: sed commestum sæpe regerebat. Unde debilitas secuta ipsum deambulare jussit, tum prædicta mala quotidie augescere, atque palpitatione tanta suborta fuit, ut in vehementiori animi commotione, ab astantibus audiri posset, quod ipsi tum valde dolorificum erat, cumque tandem vita privavit, thorace aperto, inventum fuit cor bovino non multò minus, quippe communem magnitudinem quater circiter excederet, increverat autem cor æqualiter ferè circa substantiam & cavitates, ipsaque substantia naturali erat solidior. Sed in villis septi intermedii tres calculi reperiebantur pisi circiter magnitudine, non admodum adhuc solidi, sed arenaei & novaculæ cedentes. *Otho. Heurnius hist. 18. observ. Rarior.*

Quidam audacissimus latro palpitatione cordis frequenter corripitur solitus, à magistratu apprehensus, rotæ est affixus. Nos hujus cor viscendi cupidi, postquam corpus in 4. partes est dissectum, pulsans adhuc incidimus, & in ventriculo ejus dextro tres reperti lapilli ciceris magnitudine, coloris cinere oblongi, pondere unius dragmæ, quos aliquot viri docti & curiosi, non tam viderunt quam admirati sunt. *Zacutus Lusitanus observ. 141. lib. 1. Prax. Admirand.*



In muliere, quæ 4. mensium spatio incredibili urinæ cruciatu laboraverat, duo calculi reperti in corde cum multis abscessibus, integris renibus & vesica. *Jacob. Hollerius, lib. 1. De Morbis internis cap. 9.*

## SECTIO LVII.

*Pro Cordis dolore à verme in ventriculo proveniente.*

**F**aber quidam lignarius cum à cordis dolore ferè perpetuo duobus jam annis graviter urgeretur, ac propterea quod eo sapius in mortis discrimen adductus fuerat, peritissimos quosque nostri sæculi Medicos, sed frustra consulisset, tandem ad nos venit oratum, ut si quo modo possem, tanto malo succurrerem; cœpi itaque mecum cogitare, an id fortè ex malo habitu cordis, sive ille calidus frigidusve esset, an siccus, simplex aut mixtus: sed horum nullus certis indiciis ostendebatur. Cordis enim natura nobilis tanto tempore hujusmodi injuriam non tolerasset; cum nullum ægritudinis genus imprimi in corde possit, quin hominem ad festinam mortem deducat, opinanti igitur mihi malignam aliquam & noxiam materiam in ventriculo detineri; quæ quod vicinus sit locus cordi, ad ejus cervicem ascendens hominem affligeret; visum est eam quoquomodo propellere; quare medicamento vomitionem fieri jubeo. Eo etsi corrupta ac putrens materia expellitur, non tamen dolor remittitur, consulo igitur, ut iterum vomitum experiatur: quem una intermissa diecula validiorem exhibeo: expulsaque eo est crassior pituita, & cum ea vermis longitudinis digitorum 4. capite rubro, lævi rotundoque, quod pisi magnitudinem non excederet, cætero corpore lanugine quadam contexto, cauda furcata ad similitudinem novæ lunæ: pedibus nixus quatuor, duobus in dexteriores totidem in sinisteriores partem coaptatis. Admiratus verbis formam Medicis eruditioribus ostendo, nullum invenio qui monstrum simile se vidisse unquam fateretur, aderat tamen senior quidam, sed Medicæ artis imperitus, qui testatus est se similem vi-

dissevermem vomitu quoque propulsum ab *Alexandro* quodam cœnobita; qui statim ut ille aiebat, projecto eo, mortuus est, ocitabat autem hoc monstrum cordis vermem, at contra æger noster, ut primum vermem ipsum evomit ad pristinam reversus est sanitatem. *Antonius Benivenius cap. 2. de abditis morborum & sanationum causis.*

Vermes vomitione rejeci haud insolens est, nobisque non rarò visum, testatur & idem *Amatus Lusitanus curat. 5 6. & 10. cent. 1.*

Generari autem posse in ventriculo, ut *Amatus* existimat, difficile fuerit affirmare; verisimilius est ex intestinis ad ventriculum pervenire. *Annotat. ad cap. 2. Benivenii.*

## SECTIO LVIII.

*De Cordis ossē.*

**I**N filii Typographi palpitatione cordis sapius laborantis medio cordis disseccto, os tribus articulis constans, cavumque & arenosa quadam materia repletum inveni. *Felix Platerus observ. lib. 3. pag. 636.*

Phthisici cujusdam defuncti cor tam vastum erat, ut sæpe in bobus non majus sit aut ponderosius. In sinistro ventriculo inventum fuit os nonnihil spongiosum & friabile calculis nonnullis per urinam excretis haud absimile, triquetrum & propemodum cordis picti figuram representans vel literam Y. *Thomas Bartholinus hist. 50. cent. 1.*

Cadaver *Urbani* octavi Pontif. *Romani* 1644. *Rome* apertum fuit à *Johan. Trullo* Anatomico insigni ad Pollincturam, reperiendum in sinistro cordis ventriculo os triangulare literam T. Referens, & 5. Calculi in vesica fellea, singuli magnitudine nucis avellanæ. *Thomas Bartholinus hist. 45. cent. 2.*



## SECTIO LIX.

## De Cordis palpitatione.

**P**alpitationis Cordis ( Græcè *πλυστος τῆς καρδίας* ) est immoderata & violenta cordis concussio, quod sibi molestum est studentis excutere, illam efficit facultas motrix à re molesta & aliena irritata, quæ irritant sunt vapores & flatus in febribus malignis, mensium suppressione, & melancholia hypochondriaca, cor subeuntes, humores etiam putridi & acres, vel nimium copiosi, calculi item, ossa & vermes, talia enim aliquoties in ipsis cordis ventriculis generantur, & tum palpitationem necessariò inducunt: tumores denique in pericardio exorti, & sanguis in vulneribus ad cor effusus, & spirituum etiam vitalium defectus, & calor in corde præter naturam, ut semper vehementiorem aliquem motum; ita etiam palpitationem; quæ motus est depravatus, excitant. Causæ externæ sunt vehemens corporis commotio & excitatio, nimia excandescencia & ira, crapula, veneni assumptio, balnea calidiora, & animi passionibus, ægros ad interitum, per syncopen non rarò præcipitat, amoto nimirum cordis motu.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Cordis palpitatione.

**J**uvenis quidam vulneratus fuit in dorso sub scapula sinistra, vulnere Thoracem transeunte; qui mox febre valida continua acuta correptus est, & in cordis palpitationem adeo vehementem, & violentam incidit, ut etiam extra domum, in qua æger decumbebat, à transeuntibus, palpitationis cordis exaudiretur, ut in vita simile casum neque audierim neque viderim, neque à præceptoribus meis observatum compererim. Ad hunc juvenem cum ingressus essem, hanc gravem palpitationem animadverti ortum habere ex sanguine intus remanente, vel ibidem concreto. Venam sinistri brachii statim runderere feci, & illicò à detractione sanguinis, infcio Chirurgo, melissam viri-

dem, & borraginem accepi, contrivi herbas ne ab astantibus cognoscerentur, easque supra tegulam mundam ignitam posui aqua rosacea & aceti momento irroratas, quas cum cordis regioni admovissem, miraculi seu incantamenti modo illicò cessavit cordis palpitationis, omnibus admirantibus. Hoc autem arcano, nulli nisi vero Pythagorico revelando aliquando uti videram præceptorem meum *Elideum Paduanum* in Nosocomio *Bononia*. Verum is solo Melyssophyllo utebatur, nos borragine adjecimus. *Petrus Forestus, observ. 1. l. 17. De cordis & Mammillarum affectibus.*

Juvenis quidam multo sanguine abundans cum subito in cordis palpitationem incidisset; statim venas secari jussit, in mentem enim venit illud *Galen*i dictum *lib. 5. de locis affectis cap. 2.* quod palpitationis cordis pluribus integra valetudine degentibus, tum adolescentibus, tum adultis, subito sine alio accidente manifesto evenire visa est, atque omnes eos sanguis detractio juvit, leniente deinde medicamento corpus purgavi. Postremò theriacam dedi ad ʒ ii ss. superbibendo parum aquæ mellissæ. Exterius etiam hoc Epithema cordi apposui.

ʒi. Aq. meliss. & borrag. an. lb ss. aq. ros. ʒij. maceris, Cariophyll. Cinamom. lign. aloes, cortic. citri an. ʒss. Sem. ocymi. ʒi. croci gr.v. vini odoriferi ʒiij. ambr. mosch. an. gr. iij. F. Epithema cordiale quibus remediis, vel his similibus, non solum hic juvenis, sed alii multi convalescere. *Petrus Forestus observ. 2. lib. 17.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Cordis palpitatione.

**R**ondeletius optimum medicamentum parat & alimentum ex corde porci (in quo inditi sunt Cariophylli) in veru assato, sed prius in aqua cocto, ut caro tenerior fiat, vel

ʒi. Cord. porci, num. 2. cord. Cervi, vel bovis, num. 3. Cariophyll. galang. maj. & min. sem. basilici. an. ʒss. macis ʒiij. flor. bugloss. borrag. an. p. i. flor. anthos p. iij. temperentur in vino malvatico per noctem & de-



& destillentur omnia in alembico, aqua fervetur usui.

℥. Aq. prædictæ ℥iv. Sacchar. parum. F. Iulepus. Aqua illa valet in omni passione cordis à materia frigida flatuosa vel à vaporibus, vel à melancholia. Sed in materia calida adde aq. ros. part. aq. & utatur cum aqua bugl. vel borrag. Dosis hujus aquæ est ℥ss. superbibendo vini hippocratici ℥ij. *Petrus Forestus Schol. obs. 5. lib. 17.*

Pro Palpitatione cordis hac aqua usus sum, quæ cordi, cerebro, nervisque accommodatur.

℥. Cordis Cervi, vel hirci, porci domesticæ, vel *Sylvestris* an. lbi. abluantur vino malvatico, & incidantur in parvas portiones, addendo fol. meliss. majoran. an. Mj. flor. bugl. borrag. viol. ros. scabios. Cariophyll. hortens. an. p. j. sem. ocymi ℥i. sem. Citri ℥ss. Cariophyll. ℥ij. cinamom. ℥vi. macis, Santali citrini, lign. aloes, an. ℥i. incidantur & contundantur, adde vini malvatici lbi. succi limonum ℥i. vel in illius defectu Syrup. illius, destillentur in Baln. M. donec aqua non amplius odorem spiret, tunc enim satis est, fervetur ad usum benè obturata, & rectificetur in calore solis vel alio. *Felix Platerus, obs. lib. 1. pag. 236.*

Exterius theriaca vetus cum vino generoso & croci modico, cordis regioni illita, palpitationibus insigniter succurrere solet. *Hieronymus Mercurialis, consult. 112. tom. 1.*

Remedium esto mixtura simplex, cujus medicamenti nomen quidem absconum videtur, sed si res est integra parum refert. Componitur autem è spiritu theriacali & tartari. Utimur eadem mixtura in morbis malignis etiam. *Wolfgangus Hæserus, lib. 2. Herc. Med. cap. 1.*

Mixtura simplex ita fit. ℥. Spirit. theriacal. camphor. part. 5. spir. tartar. correct. part. iv. spir. vitrol. correct. part. i. Hi spiritus invicem misceantur, & stent per aliquot septimanas in digestionem in vitro angustiorifici, vel in balneo vel in hypocausto calido. Postea transcolentur, & usui reserventur. Dosis in adultioribus ℥i. vel ℥iv. cum aq. scord. vel Card. bened. in junioribus ℥ss. vel ℥ij. plus minusve pro ætatis ratione. *Philippus Grylingius*

in *Florilegio part. octava, capit. sexto.*

Cardiacæ decoctum aut pulvis saccharo mixtus & exhibitus in palpitatione cordis, lienis morbis & affectibus hystericis mirandæ virtutis & efficacæ medicamentum est. *D. Bouvle referente Joh. Ratio in Catal. Plant. Anglia.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Cordis palpitatione.

**P**urgatione peracta sine qua viscera attemperari nequeunt, ad roboranda viscera, cor nimirum & ventriculum, tantisper refrigerata, & ad jecur impensè calidum attemperandum, exhibeatur hoc conditum.

Conserv. ros. conf. flor. Cichor. borrag. & bugl. an. ℥i. spec. triasantal diamarg. frig. diatrion. piperon. an. ℥i. Syrup. de Cichor. mixtæ Citoneor. aromaticæ. Syrup. de cortic. citri, ℥ss. Spec. diambr. diamosch. d. an. ℥i. M. F. Electuarium addendo fol. auri puriss. numero x. cujus ℥vi. vel ℥ss. præbeantur duabus horis ante prandium, cum vino vel altero haustu vini albi generosi, decem diebus continuis. Linimento pro cordis regione ex theriaca vino albo generoso liquata cum croci modico quàm maximè probo. *Joh. Zechius consult. 29.*

Exterius admotum hyacinthum gemmam, regioni cordis, tum etiam corollam ex rubro corallio, sinistro brachio supra manum aliquoties circumvolutam continuo gestatam manifesto experimento comperimus eos juvasse, quibus cor tremit, & palpitat. Unguentum etiam hic addam quo aliàs olim præscribente *Antonio Guainerio* insigni medico, ad cordis angustias, ego sceleriter sum usus in cordis palpitatione.

℥. Ol. è flor. nymph. luteæ. ℥ss. flor. nymph. luteæ. ℥i. corall. rubr. santal. citrin. sem. acetos. an. ℥ss. margarit. præp. lig. aloes odor. ossis è corde cervi an. g. vii. Camphor. gr. iij. F. omnium pulvis M. & cum cera alba lota in aqua nymphaeæ q. s. f. s. a. unguentum cordiale, quo illinatur cordis regio. *Reinerus Solenander. consult. 10. sect. 3.*



## S E C T I O L X.

## De Corde pilis referto.

*Maximilianns* 2. Imperator nullum expertus est præstantius remedium in cordis palpitazione, quàm theriacam extra adhibitam, negari certè non potest, medica. menta externa, ut sunt unguenta, balsa. ma. Epithemata, arteriis & cordi applicata multum prodesse ægrotis morbi gravitate & diuturnitate debilitatis. Sed advertendum, talia medicamenta cordialia, etsi cor in medio situm est, melius applicari non in medio pectoris, quod cartilaginofum est, sed paulò infra mamillam sinistram, quo vergit cordis mucro. *Vulfgangus Hæserus, Hercul. Medic. lib. 2. cap. 3.*

Extra applicentur Sacculi è melissa, flor. lavend. borrag. bugl. & aliis cordialibus parati ac vino albo & aqua ros. irrotati. Ut.

℞. Flor. ros. rosmar. an. ℥ii. lavend. ℥i. sem. angelicæ, cortic. citri, cariophyll. cinam. macis, an. ℥β. croci ℥i. mosch. ambr. an. gr. vi. cum Syndone rubra F. Sacculus qui vino albo, & aq. ros. irroratus, regioni cordis tepide applicetur *Daniel Senertus. Pract. lib. 2. part. 4. cap. 4.*

℞. Conserv. meliss. anthos. fl. borrag. & Cariophylli nostratis, an. ℥i. conf. alker. & theriac. veter. an. ℥i. pulv. el. diambr. & diamosch. d. an. ℥i. cum Syrup. de cortice Citri, fiat opiata qua utatur frequenter.

℞. Aq. bugl. ros. & flor. aurantiorum. an. ℥ii. Syrup. Cariophyll. ℥iβ. aq. cinam. ℥β. Spirit. ros. ℥ij. Confect. Alker. ℥i. M. dentur cochl. ij. per intervalla.

℞. Unguenti rosac. ℥β. ol. Cinnamom. & Cariophyll. an. gutt. vi. mosc. ambr. an. gr. iv. M. F. Linimentum quo illinatur regio cordis.

Clysteres purgantes & carminantes frequenter injecti, flatuosam materia potenter evacuant & discutiunt. Quidam practici admovent thoraci cucurbitulas sine scarificatione, quibus magnam vim tribuunt discutiendis ac digerendis flatuosis spiritibus, qui in partibus internis inclusi continentur. Alii hypocondriis admovent, quando in iis locis mali minera residet. Alii commendant rhaponticum verum, ad ℥ij. cum vino exhibitum, aut vino in quo eadem radix macerata fuerit. *Lazarus River. Prax. Med. lib. 8. cap. 2.*

**L** Ator quidam è patibulo quo suspensus fuerat, veluti jam mortuus, sed qui tamen adhuc viveret, depositus atque curatus convaluit: verùm ut erat homo ingenio malo pravoque ad eadem statim scelera revolutus, pro quibus antea extremum promeruerat supplicium, iterum capitur, atque suspenditur. Hominis admirati nequitiam, mortui cadaver incidendum curavimus: & inventum est cor ejus ob proximam caliditatem undique pilis refertum. Hoc idem inventum est in corde Aristomenis Græci, qui solus perhibetur integras acies pugnando in fugam vertisse. Est ergo non tantum, scelesti ingenii signum, sed quandoque etiam raræ fortitudinis. *Antonius Benevenius cap. 38. lib. de abditis morborum & sanationum.*

## S E C T I O L X I.

## De Corio humano:

**C** Elebres sunt corii humani præparati in medicina usus. Cingula enim inde conficiuntur & lota: quibus per medium discinctæ puerperæ foeliciter fœtum eniuntur. Hystericas quoque passionibus, seu uteri adscensum Corii humani cingulum comprimit; quod non semel expertus sum, & apud non paucas hystericas isto vinculo gratiam merui, in spasmodis manuum pedumque ex eodem corio auxilium sæpe petitur, circa carpum cingulum ex corio humano matronæ convulsionibus brachii sinistri correptæ post inunctionem applicuit cum successu. *Hildanus, cent. 3. observ. 9.*

In vino sexagenario aulico Epilepsiz Paroxysmum sedatum esse corio humano quo collum cinxerat, meminit *Becherus, lib. 2. Microc. Med. cap. 1. Thomas Bartholinus, Hist. 87. cent. 3.*

## S E C T I O L X I I.

## Pro Cornea male affecta à Scoria Chalybis:

**R** Usticus quidam cum Chalybem emeret, optimumque eligere vellet & pro-



proinde ut fieri solet, frustum contra frustum allideret; Scintilla ipsi in illam corneæ partem, ubi iris conspicitur, profiliit, ibidemque membranæ firmiter inhæsit, idque non sine dolore maximo, cum frustra per plures dies adhibita fuissent remedia, en uxor mea remedium longè aptissimum excogitat. Interim enim dum ego ambabus manibus palpebras aperio, illa magnetem oculo quàm proxime æger id sufferre potuit, admovet, id cum aliquoties & quidem repetitis vicibus fecissemus (non diu enim lucem qua tamen hac in re summopere opus fuit, sufferre potuit) tandem Scoria ex oculo nobis omnibus videntibus ad lapidem profiliit. Postea applicato collyrio anodyno brevi convaluit, fuit hæc quidem curatio ingeniosa satis. *Gull. Fabrit. Hildanus, observ. 21. cent. 5.*

Quædam mulier infimæ sortis maculam habebat in oculo, cui consilium dedi, ut bis in die succi rutæ guttam unicam in oculum instillaret, quod cum satis diu continuasset macula prorsus absumpta est, *Samuel Formius, observ. 28.*

### SECTIO LXIII.

#### *Pro Corneæ Cancro.*

**P**Ræmissis venesectione & debita purgatione, aqua sequens pro collyrio & oculi ablutione erit præstantissima.

℥. Rad. scrophular. maj. & geran. Robertian. an. Mij. arnogloss. solan. borrag. bugloss. portulac. euphras. beton. an. M. i. ranar. virid. album ovar. an. num. 12. sem. fenugræc. & cydon. an. ʒi. Radices & semina contundantur, & folia incidantur; deinde affunde aq. ros. & euphras. an. lb. 1. M. omnia & destillentur in alembico plumbeo. *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 2. capit. 12.*

### SECTIO LXIV.

#### *Pro Corneæ ruptura.*

**C**Uratio hujus affectus glutinantibus remediis tentanda est. Præmissis ergo universalibus, venesectione scilicet & purgatione si ea necessaria sint, astringentia &

glutinantia oculo admoveantur. In oculum instilletur albumen ovi, cui trochisci albi *Rhasis* admisceantur; Eadem pars foveatur decocto ros. rubr. fol. polygoni, rubi, burse pastoris & plantag. in vino astringenti parato, si non adsit inflammatio, alioquin aqua simplici. Vel.

℥. Carnis cydon. lb. ros. rubr. p. iij. acacia ʒij. croci ʒi. decoq. in vino astringenti, & fiat cataplasma parti applicandum. Ad integram consolidationem sequens collyrium adhibeatur.

℥. Aloes lotæ, tutiæ præp. & sarcocoll. nutrit. in lacte muliebri, an. ʒss. croci gr. v. cum mucilagine gumi tragacanth. f. collyrium. *Lazarus Riverius. Prax. Medic. lib. 2. cap. 13.*

### SECTIO LXV.

#### *Pro Corneæ & Adnata ulceribus.*

**C**Uratio hujus affectus, quemadmodum & reliquorum ulcerum, detergentibus & exsiccantibus perficitur, quæ tamen mitissima esse debent, propter partismollitiem & exquisitum sensum: Præmittenda tamen ea, qua fluxionem ab oculis revellunt, eamque reprimunt, qualia in ophthalmia fuere proposita. Detergentia & exsiccata moderata sunt; saccharum, mel, crocus, myrrha, thus, aloe, sarcocolla, tutia & cerussa. Ex quibus formulæ sequentes componi poterunt.

℥. Decocti hord. & fenugræc. ʒiv. mell. opt. ʒss. vel syrup. de ros. sic. ʒi. M. f. collyrium quo oculi sæpe abluantur. Vel.

℥. Aq. verben. & plant. an. ʒij. Sacch. cand. ʒss. M. pro collirio. Vel

℥. Aq. mell. in B. M. destillat. & aq. ros. an. part. æq. Vel

℥. Ovum coctione induratum & à putamine mundatum. Dividatur in 2. partes, & detracto vitello, repleatur fovea saccharo cando pulverato: optimè ligetur, & ponatur in cella vinaria, extillabit liquor, qui detergentis ulceribus sine morbo valde idoneus est. Et si potentius remedium desideres, myrrha pulverata cum sacch. cando admiscenda est.

*Montanus* pulverem sequentem valde commendat.

℥. Al-



24. Album. ovor. rec. num. 20. ponantur in vase stanneo ad solem donec exsiccantur postea pulverisentur subtilissimè cum equali pondere sacchar. & pulvis immittatur in oculos qui sine erosione plurimum adjuvat.

In progressu morbi, si potentius detergendum sit & exsiccandum, adde collyriis prædictis troch. albos *Rhasis*, thus, aloem myrrham, sarcocollam & alia hujusmodi parvatenam dosi, ne oculos exasperent: & iis etiam lac albumen ovi, mucilagine, aliaque anodyna addi poterunt. Tutia præ ceteris valet, quia minimè dolorifica est, & sine morfu siccata cicatricem inducit: ideo collyria, & unguenta ex ea parata utilissima sunt. Et præ ceteris unguentum in ophthalmiæ curatione descriptum quod magnam tutiæ quantitatem recipit, erit utilissimum, quod sic se habet.

24. Tutiæ præparat ʒiʒ. camphor. ʒi. virid. æris gr. xii. Tutiam cum camphora simul contere in mortario, æs seorsim; omnia verò ad pulveris impalpabilis consistentiam. Tum recipe butyri rec. ʒi. aq. ros. ʒi. Bulliant leniter simul, & ab igne remotis, primum tutiam cum camphora, deinde æs viride sensim immisce, agitato optimè, & in vase vitreo reconde, f. unguentum, quod per sericum transcoletur. Probatissimum est ad oculorum inflammationes, & palpebrarum pruritus & lachrymas singulare remedium.

Collyrii valde detergentis & exsiccantis ac cicatricem inducentis formula talis esse poterit.

24. Sarcocoll. nutrit. in aq. ros. ceruss. & aloes lot. myrrh. tutiæ præpar. an. ʒʒ. sacch. cand. ʒi. cum mucilag. gummi tragac. in aq. ros. extract. f. collyrium, quo palpebræ illinantur. *Lazarus Riverius. Prax. Med. lib. 2. cap. 11.*

## SECTIO LXVI.

### Pro Coryza.

**C**URatio hujus affectus à catarrhi curatione desumenda est: easdem enim evacuationes, revulsiones & derivationes postulat, nisi quod errhina huic usurpan-

da non sunt, ne nimium ad partem affectam attrahant; Sed apophlegmatismi & masticatoria post universalia maximè convenient. Præter dicta remedia authores nonnulla commendant, quæ coryzæ compescenda peculiariter conveniunt, ut vapor decoctæ majoranæ naribus exceptus, vel aqua majoranæ naribus excepta. Vapor acetii in ferream laminam candentem infusus ad idem confert; idque efficacius, si in aceto rosæ rubræ prius infundantur. Si fluxio valde frigida fuerit, suffitus sicci ex nigella, thure, aliisque in prunas coniectis, erunt utilissimi: his enim frigida cerebri intemperies corrigitur, & superflua humiditas absumitur. *Lazarus Riverius. Prax. Med. lib. 4. cap. 5.*

## SECTIO LXVII.

### De Coxendicis Dolore & Laxatione.

**C**Oxendicis dolor (Græcè *ix'ia*) arthritidis species est coxam occupantis, pars affecta licet præcipue sit coxæ articulus, quandoque tamen in lumbis; summate, & osse sacro consistit. Dolor enim atrox in omnibus illis locis perpetuò se prodit, & in femur quoque tibiamque & extremum pedem deducitur, mediantibus nervis lumborum & ossis sacri partes has infernas pertingentibus. Eandem pariter cum Arthritide agnoscit causam: non nisi difficulter curationem admittit hoc malum, propter cavitatis ossis ischii profunditatem, & materiæ multitudinem: si diu perseverent, coxæ tandem luxationem infert, quam nullæ machinæ curare possunt.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Coxendici Dolore.

**U**T Anodynis primum solvatur tentandum, fotu nimirum ex decocto flor. chamæ melilot. fœnugræc. sem. lini absinth. & origan. cui quidem vel consimili medicamento sæpius repetito, si dolor non cesserit, ad validiora localia transeundum. Inter quæ Emplastrum ex Sulphuris & picis partibus æqualibus sedi affectæ admo-



tum, gestandumque donec sponte sua decidat. *Galenus ex Andromacho, lib. 10. De comp. med. sec. locos cap. 1.* magnopere extollit. Ceratum etiam nobis valde familiare huic operi accommodatissimum conficitur ex bdellio, ammoniato, opoponac, myrrha & resina pini, omnium autem efficacissimum est, quod à *Galenus ex Democriti monumentis, lib. 10. De comp. med. sec. loc. cap. 2.* mirificè celebratur. Paratur autem ex Iberidis radice exactè contusa atque suilla axungia veteri excepta, linteoque densiore Emplastrum modo affecto loco admotum, ibique per tres horas detentum: ceterum in affectu contumacissimo, rebeli, & aliis remediis ex arte administratis minime cedente, ad validiora ut ad phanigmos etiam & inustiones *Hippocratis* more confugiendum, corpore tamen iterum, atque iterum exactè perpurgat; omnibus prægressis averforiis auxiliis. In curationis principio, corpore saltem semel non nihil purgato, venam secandam omnino consulo sanguinem ex vena poplitica vel malleoli lateris affectis detrahendum nemini in dubium revocari debet; quod misso ex hac vena sanguine, insignis derivatio obtineatur. Sanguis quoque è venis, quæ in sede sunt per hirudines admotas evocatus, mirum in modum ischiadicis opitulatur. Cauterium etiam paulò subtus genu in parte exteriori lateris affecti inustum derivationis causa summopere commendamus; quemadmodum & alterum in brachio opposito aversionis gratia. *Joh. Zecchi, cons. 43.*

Ad Dolores coxendicis præstantissimus est Balsamus sulphuris terebinthinatus, si paucis ejus guttis pars affecta illinatur quo sæpius una nocte curavi homines miseros. *Franciscus Sylvius, prax. medic. lib. 10. cap. 10. paragraph. 24.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Coxa Luxatione.

**C** Apud femoris si excidat, nunquam in suam capsulam potest reduci, si que hoc tentetur, frustaneus erit labor, tendines enim & ligamenta per affluxum aliorum humorum emollita, & lubrica facta, caput femoris retinere nunquam possunt.

Hinc facile intelligitur Adolescentem hunc cui coxa excidit, perpetuò claudicaturum. Inanis etiam est & inutilis labor, quando ægrum calidioribus unguentis ad tabem membrorum usitatis, ex pyrethro, euphorbio, sem. sinap. similibusque exerceant: quandiu enim causa tabis, quæ est dislocatio, abundantia mucoris quæ vasa obstruit, & distortio vasorum non tollitur, tabi mederi non poterit quispiam. Rebus sic stantibus, coxarum restitutio naturalis fieri nequit. Optimum ergo si coxa totumque crus omnibus remediis quantum possibile corroboretur. Observanda autem in hac cura sequentia. 1. Quod egrotus in diætâ omnes cibos frigidos humidos pituitam generantes, omnesque superfluitates fugiat; talibusque vescatur quæ boni sunt nutrimenti; hisce miscenda semper sunt quæ nervosas roborent partes, ut sunt rosmarinus, salvia, majorana, cortex Citri, aurantium: ex hisce memoratis herbis F. decoctum: eademque herba cerevisiæ imponantur, & bibat. 2. Coxa extensionibus & rebus acerbis non vexetur, potius roboretur, quod commodè sit emollientibus, sed potissimum astringentibus: inde perspicere inproclivi est, quod olea recommendata uti ol. lumbric. aneth. chamam. lilior. alb. &c. morbo sint inconvenientia; licet lumbrici singularem quandam possideant proprietatem in talibus affectibus. 3. Quia ob vitam sedentariam exercitiorumque defectum copiosa generatur pituita, & ad locum affectum tanquam imbecillum partem defertur, corpus sæpius purgetur benignis & placidis medicinis: vomitus etiam si interdum accedat, non nocebit. Corpore diætâ & purgationibus præparato; fiat sacculus tantus quantus totam tegat coxam ex sequentibus herbis, & latitudinem pollicis impleatur, interbastetur, terque, quaterque bulliat, & imponatur.

℥℥. Fol. flor. beton. rosmar. salv. prim. veris lavend. organ. absinth. an. Mi. ros. gran. juniperi, musci querni an. M. ii. sem. anis. ℥ii. incidantur omnia grosso modo, de his herbis q. f. sacculo indatur, addatur salis M. ss. & in duabus mensuris aquæ coquatur calideque, imponatur, hic sacculus tres vel quatuor dies efficax est.

Coxa ita manè & vespere fomentata, totum



totum crus, cōxa & os sacrum succo lumbricorum inungatur, & tantisper fricetur, donec benè absorptus fuerit. Succus hoc modo præparetur.

24. Crassissimorum lumbricorum, Mij. vel iij. singulis sordes extrahantur, & exprimantur digitis (non enim vino ablucendi) concidantur minutissimè, postea injiciantur cyatho stanneo vel argento, affundantur aq. flor. lavend. & baccar. juniperi (quæ non cum vino sint destillata) an. ℥iij. salis ℥i. cyathus obturetur vesica humectata ne quidpiam expiret: deinde aquæ inponatur & coquatur quatuor vel quinque horas, refrigerato cyatho vesica auferatur, & succus per pannum crassum exprimatur, indaturque vitro angusti orificii, addaturque aliquid ole. amygd. d. vel lumbric. hoc modo per multos conservatur dies. Utilissimus etiam est hic succus in tabe membrorum, corroborat nervosas partes, reseatque obstructions arteriarum & venarum. Coxa & crure hoc succo benè inuncto, Emplastrum sequens molli inducatur corio, totique imponatur coxa.

24. Emplastr. diapalm. ℥iv. ceræ novæ, ℥ij. gummi elemi, tacamach. an. ℥j. mastich. olibam. an. ℥x. lumbric. terrest. subtiliss. pulverator. ℥iij. pulv. ros. ruber. myrtill. balauft. ivæ arthet. flor. hyperic. an. ℥ij. dissolvantur gummata lentissimo igne in f. q. ole. lumbric. & percolentur per linteam, postea commisceantur omnia cum emplastro supradiçto, & cera liquefacta fiatque massa addendo nonnihil ol. gran. juniperi & spicæ.

Balneo ex herbis ad sacculum præscriptis addito paucis sale & alumine, comodè etiam uti poterit, totumque crus in eo lavare; finito balneo per horam in lecto quiescat, succoque fricari & Emplastrum imponi curet. In usu balnei & sacculi corpus sit quietum, ne natura impediatur: si iterum ambulare incipiat, calceus altior in quantum crus brevius paretur, ne corpus plus imbecilli quàm sanæ incumbat parti, hoc processu, divina juvante gratia, plures sanavi, quod sine fulcro sive baculo incedere potuerint, loco succi lumbric. inservire possunt aquæ betonic. saliv. prim. veris, lavendulæ, gran. juniperi sine

Burnet Parte I.

vino præparatæ. In me ipso, enim expertus sum, vinum internè & externè usurpatum, nervosis nocere partibus. Ustio enim coxæ non contemnenda, sed magni facienda, egregios enim & felices successus in coxarum affectibus inde secutos esse verissimè vidi. *Guil. Fabrit. Hildanus obs. 100. cent. 3.*

*Spigelius* os occygis à partu luxatum nobili matrone sola fascia restituit, *Ioh. Rodius, observ. 80. cent. 3.*

## SECTIO LXVIII.

### De Cranii depressione & fractura.

**C**Ranii fractura (Græcè ἄτραγμα τῆ κεφαλῆ) solutio est continui in cranio à vi exteriore facta, ejus secundum *Hippocr. lib. De capitis Vulneribus*, quinque sunt species. Prima dicitur ῥωγμή & ρήξις (à ῥήσσω vel ῥήγνυμι, frango) Latine verò rima seu fissura: à re gravi & contundenti, aliquando & ab incidenti & acuta provenit. Accidere solet ossibus durioribus, mollia enim cedunt, & non finduntur: hæc vel conspicua est, vel adeo plerumque tenuis, ut sensum prorsus lateat, quæ medio modo se habet, τρικισμὸς appellatur, seu capillaris, rursus vel brevis est vel longa, recta vel curva, in externa lamina, illæsa interna, vel è contra in interna, integra manente externa, aliquando denique totum cranium rimam contrahit. Secunda species vocari solet ὀλκτὶς & θλάσις (à ὀλέω & θάλλω contundo) Latine contusio seu collisio. Fit dum ab irruente violenter intrinsecus, aut obstante duro aliquo & obtuso corpore, os ita contunditur, & deprimitur, ut licet, ejus continuitas integra foris ad sensum appareat, intus tamen multæ latent divisiones in osse contuso. Tertia est σφραξις seu ἐσθλαξις, Latine, depressio, cum os finditur, & simul introcedit, ita ut fragmentum intus detrusum cerebrum vel pungat, vel comprimatur; quod si in sublimi, dum extrahitur telum, attollatur. *Galeno* dicitur καμάρσις & καμάρωμα (à καμάρω fornix, testudo, (Quarta est ἑδρῆ, Latine sedes seu vestigium, cum telum acutum cranium ita lædit, ut sui vestigium, relinquat: huc pertinet punctura à stylo,



cultro, vel alterius rei acute cuspide facta, nunc externam saltem, nunc utramque cranii tabulam penetrans; incisio Pariter ab instrumento acuto, & benè scindente, ita ut suum naturalem situm ad huc obtineat, & vestigium in osse inciso appareat. Dedolatio etiam huc refertur, quæ Græcè dicitur *διανομή*, est cum aliquid de superficie cranii abscinditur. Quintam speciem vocat *Hippocr. ξομφόρον*, i. e. Infortunium, *Paulus* vero ab *Ægineta*, *ἐπίκνου* Latini autem contra fissuram seu resonitum, & est cum in alia parte cranium percutitur, & in alia finditur, aut in eodem osse, aut in diversis, accidit dum percussione impulsus aer intra diploen conclusus parti alteri crani allisus ipsum perfringat.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Cranio depresso.*

**I**N pueris sapissimè huiusmodi depressiones cranii abrasis crinibus, & apposita cucurbita, naribusque & ore clausis quemadmodum *Ambr. Paræus* Chirurgus æterna laude dignissimus, lib. 10. cap. 5. rectè docuit, in naturalem situm reposui: vel emplastrum aliquod tenaciter adhærescens, veluti ex pice, resina, colo phonia, & gummi elemi in medio ossis depressi applicetur, vel hoc quod tenacius adhæret.

℥. Farin. tritici, ℥i. ichthyocoll. in aq. beton. & saliv. dissolut. ℥ss. pulv. mastich. thur. farin. volatilis, sang. dracon. gypsi, an. ℥ss. M. coque in aq. beton. & salvia, ad justam consistentiam applicetur calidè, quamprimum undique agglutinatum & exsiccatum fuerit emplastrum, vi auferatur; sic enim attracta cute & pericranio, cranium depressum simul elevabitur; id si prima vice minus successerit, ab opere tamen minimè desistendum, sed denuò novum emplastrum applicandum, & ut antea vi auferendum. Sit Emplastrum ejus magnitudinis, ut tantum tertiam circiter partem impressionis crani cooperiat, sic enim in ablatione minor erit dolor, & facilius impressum cranium elevabitur. Si hinc dolor aliquis oritur, locus inungendus

est oleo rosac. aut myrtino, & de vitell. ovo<sup>r</sup> habeat præterea emplastrum in medio funiculum, quo à Chirurgo apprehendi possit. Dum vero Chirurgus emplastrum auferet, os & nares infantis claudendæ sunt, si in flato cerebro propter retentione in ipso spiritum, cranium impressum facilius in situm naturalem relevabitur. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 5. cent. 2.*

Puelula quædam 18. menses nata per scaldas decedit, & capite illiso in lapidem, facta fuit cranii depressio inter suturam sagittalem & coronalem magnitudinis dimidiæ nucis: ad quam vocatus, raso capillitio, parti cucurbitulam admovi sine scarificatione, & consequenter iterum admovi cum scarificatione. Postea applicui cataplasma ex furfure, pane cum rosis & vino compositum, idque iteravi bis in die, per quinque vel sex dies, iterando cucurbitulæ applicationem sine scarificatione, ante singulas admotiones Cataplasmatibus; deinde per quatuor aut quinque dies solum Cataplasma admovendo, tumor à cucurbita excitatus discussus est, & depressio sublata apparuit, atque os ad suum naturalem locum restitutum. *Samuel Fornevius, observ. 14.*

In multis Cranii depressio curata est, admota post unam vel alteram phlebotomiam, supra depressionem cucurbitula cum multa flamma; addita interdum incisione, multis aliquando scarificationibus, & interdum sine illis. *D. Des Grands prez, observ. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Cranii fractura.*

**U**Ndecimo die morbi cum æger prodeplorato habebatur, cranium cum successu perforatum fuisse observavi. Historiam hic recensere non gravabor.

Anno 1586. Sexagenarius quidam in bregma sinistrum percussus fuit, cū cranii fractione & depressione cecidit mox interram, cibum indigestum evomuit; & loquelam amisit. Curatio ab initio Barbitonfori commissa fuit; quum verò omnia in pejus ruere vidissent adstantes, *Janum Antonium Saracenum* Medicum longè cele-



celeberrimum, & *Johannem Griffonium* Chirurgum peritissimum præceptorem meum fidelissimum in consilium vocatum. Pervenimus itaque ad ægram decimo die morbi sub vesperam, ipsumque ardentissima febre laborantem delirantem, & absque loquela invenimus; vulnus angustum & fractura cranii aderat: verum etsi rem in angustiis positam satis superque nobis palam esset; adstantium tamen petitionibus commoti, facta prius prognosticatione, curationem sic aggressi sumus: injecto enemate & exonerata alvo crines abrasimus, totumque caput ol. rosac. & myrtill. inunximus: deinde cutem & pericranium in formam crucis incidimus, craniumque denudavimus, nec non pulvillis ex stupis suavis preparatis & albumini ovi intinctis vulnus implevimus. Sequenti die ossiculis nonnullis quæ à prima tabula separata erant, extractis, cranium perforavimus, & quod asperum in osse instrumento lenticulari, lavigavimus. Postea panum Sericeum melle rosaceo parumque ol. rosac. (Propter dolorem immensum) tinctum cerebro imposuimus, totum verò vulnus sequenti digestivo implevimus.

24. Terebint. lotæ in aq. beton. & salv. ʒi. olei rosac. ʒi. olei de vitell. ovar. ʒii gummi elemi lentissimo igne cum supradictis oleis dissoluti & percolati ʒi croci pulveris. ʒi. vitell. ovar. numero 2. M. F. Unguentum quo imposito vulnere, Emplastrum Basiliconis applicuimus; totumque caput & collum ol. rosac. & myrtill. inunximus. Eo die iterum Clysterem injecimus, optimamque victus rationem præscripsimus; atque ista methodo per dies aliquot processimus. Iterum pus per factum foramen effluxit, & febris reliquaque symptomata paulatim remiserunt: sedato dolore & inflammatione, melli rosato quod membranae imponendum erat, guttulam unam aut alteram atque vite admiscuimus, & vulnere sequens mundificativum imposuimus.

24. Pulver. rad. caryophyllat. angelic. aristol. rot. irid. flor. an. ʒi. extract. salv. beton. an. ʒii. gummi elemi in oleo rosac. dissolut. ʒii. M. & F. cum melle ros. q. s. parumque aq. vitæ unguentum in mortario. Tandem sedato Emplastrum applicuimus.

24. Emplastr. de beton. ʒiv. gummi elemi in oleo rosac. dissolut. ʒi. pulv. ros. odorifer. myrtill. an. ʒi. mastich. cal. aromat. angelic. caryophyllat. an. ʒi. cum q. s. ol. rosac. parumque ceræ fiat emplastrum.

Interim dum vulnus hac methodo curavimus, singulis aut alternis diebus, alvo sponte non respondente, clysteres injecimus: per intervalla quoque syrupo rosac. solut. comp. cum. rheo. agar. & sena, manna item, & cassia corpus leniter expurgavimus. Sic divino favore, magna cum admiratione adstantium sanitati restitutus fuit. *Guil. Fabric. Hild. obs. 4. cent. 4.*

Emplastrum de betonica cujus hic fit mentio, describitur in hunc modum à *Foresto, lib. 6. observ. Chirurg. observ. 43.*

24. Therebinth. resin. pini, ceræ novæ, an. ʒiv. pulv. betonice. ʒi. mastich. thuris, an. ʒi. mummiæ, ʒiii. F. massa. S. A.

Ante annos 10. vocatus fui à quodam rustico ut ipsius inviserem sororem, quæ vulnus contusum in dextro osse bregmatis, cum fractura & impressione Cranii acceperat. Evomuit mox ab initio biliosum humorem, & cibum indigestum; sinistrum latus resolutum est: in dextro autem convulsiones patiebatur, abrasis crinibus, fragmenta aliqua cranii & portiunculam ad instar fabæ ex cerebri substantia digitis extraxi, altero die advenit *Slotanus*, qui dilatato vulnere denuò extrahit fragmenta quædam ossis, & portiunculam ipsius cerebri, ad nucis avellanæ magnitudinem. Postea aliquoties ipsemet *Slotanus* me presente de cerebri substantia detraxit, & tamen convaluit plenissime. *Guil. Fabric. Hildanus, observ. 13. cent. 1.*

## SECTIO LXIX.

*Pro Cruribus exulceratis leviter, & excoriatis in superficie in hydropico.*

**H**Uic cum multa & varia, sed frustra, medicamenta præscripsissem, tandem jussi ut decocto plantag. & ungul. caballin. in vino foverentur membra, & folia ejusdem ungulæ caballit. in decocto madefacta, & molliter expressa apponerentur, quo facto egregie curatus fuit. Alii etiam quamplurimi per nos eodem



remedio eodem morbo laborantes sanati  
fœliciter fuisse, *Petrus Forestus, observ. 1.  
lib. 7. Obser. Chirurg.*

## SECTIO LXX.

*Pro Cruris ulcere inveterato & maligno.*

**M**ercator quidam cum ulcus malignū  
in crure haberet, nec ullo modo cu-  
rari posset, quidam ei consilium dedit, ut  
agrimoniam herbam superponeret bis in  
die, manē, & serō, atque ita miraculi  
instar, intra novem dies sanitati restitutus  
est, valet eadem herba, tum ejus succus  
cum filamentis impositus ad vulnera tam  
recentia quam antiqua. Alius quidam  
cum eidem intestinum rectum procide-  
ret, ac ex hæmorrhoidibus doleret, pul-  
vere hujus herbæ assumpto tam in potu  
quam cibo, brevi sanitatem recuperavit.  
Alius etiam cui lapis in vesica erat, cum  
crebrō herbam hanc cum ovis comedisset,  
lapis per frustra cum lotio tandem expul-  
sus est. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 7.  
Observ. Chirurg.*

Ulcus cum quidam diuturnum ac mali-  
gnum in crure haberet, ne id ullo modo  
curari aut consolidari posset, ac varia  
Chirurgi medicamenta adhibuissent, etiam  
pulverem præcipitatum subinde inspergen-  
tes, tandem superveniens quidam Medi-  
cus cortices granatorum in tenuissimum  
pulverem contumdebat, ac ulceri insper-  
gebat, atque hoc unico tam simplici medi-  
camento vir ille ab ulcere curatus fuit. *Petrus Forestus, ob. 2. lib. 7. Obser. Chirurg.*

℥. Lutharg. cadmiæ fossilis, cerussæ,  
an. ℥ii. thur. myrrh. an. ℥i℥. rad. aristol.  
℥i. ærug. æris sublimati, an. ℥℥. argen-  
ti vivi, ℥iii. extincti cum terebinth. ℥i℥.  
mellis, ℥℥. ol. rosac. & succ. plantag. an.  
℥ii. E. instar Emplastri, excellens est Em-  
plastrum, quo plura crurum ulcera per-  
versa sanavi. *Felix Platerus, observ. lib.  
2. pag. 560. & ejusdem praxeos, tomo se-  
cundo, pag. 837.*

## SECTIO LXXI.

*Pro Crustis caput pueri occupantibus.*

**P**uerulus quidam recens natus crustas  
in capite patiebatur, quæ ad oculos  
scendebant, & ita eos occupabant, ut ti-  
mor esset, ne in ipsis vitium aliquod im-  
pingeret. Nos igitur huic occurrentes vi-  
tio, jubemus, ut nutrix optimo victus or-  
dine utatur; atque ut ex ubere suo ulcera  
ipsa multo lacte irroret, ac postea carnali  
capitis parti, versus sinciput, folium cau-  
lis tepidum admoveat, ac sæpe innovet: his  
enim facillimis remediis puer liber intra  
paucos dies fuit. *Amat. Lusit. cent. 5. cur. 80.*

## SECTIO LXXII.

*Pro Cutis externa excoriatione  
in infantibus.*

**Q**uidam utuntur oleo raparum, vel ex  
oleo raparum & cera virginia limmera-  
tum facio, quo commodè admodum sæpe  
usus sum. Sed illud experimentum infal-  
libile habetur, quo obiletrix quadam ute-  
batur in infantibus.

℥. Ol. raparum, farin. tritici volatilis,  
vel siliginæ; an. part. æq. M. unguenti in-  
star, & super petiam lineam raram, te-  
nuem & antiquam liniatur locisque corro-  
sis applicetur: curabuntur eo Infanti  
instar miraculi, vel loca corrosa aqua  
communi tepida ablue, deinde cerussa  
subtiliter pulverisata inspergatur, brevi  
cutis reparabitur; etiam cerussa sola in-  
spersa sine lotionē.

Quidam à casu in tibiam cute nuda-  
tam & corrosam incidit, nostro consilio  
membranam intus succingentem ovum  
gallinæ valde tenuem & mollem loco do-  
lenti apposuit, & illico sanus factus est;  
& alii plurimi cum eo. *Petrus Forestus,  
obser. 27. lib. 29. De Arthritide & externa-  
rum partium Affectionibus.*



# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER QUARTUS.

*De Affectibus à littera D incipientibus.*

### SECTIO PRIMÆ.

*De Dentium Affectibus.*



Entes varie affici solent, modò enim externi aut longiores prominent; modò atteruntur, aut mandendo externarum causarum vi: Stupescunt aliquando frigidioris & acidi humoris influxu, & acerborum crudorumque fructuum esu. Nigrescunt etiam & faciendo lentore obducuntur, detergendi incuria, frequenti dulcium esu, masticatione fructuum nigrorum, humorum vitio sursum expirantium propter viscerum impuritatem, & hydrargyri illitu in lue venerea. Hinc est quod scemina faciem pingentes fucis ex mercurio plerumque dentes malè coloratos habeant. Vacillant quandoque mobilesque fiunt externa vi concussi, & quum eorum radix multo humore madet laxiorque sit alveolus: defectu etiam alimenti, ut in senibus, & inunctione hydrargyri; & à succis pravis gingivas erodentibus. Dolore pariter conflictantur acerrimo, qui Græcè dicitur *ὀδονταλγία*, quæ nihil aliud est quam tristis dentium sensus ab ipsorum continui per humores solutione proveniens.

Causa est humor frigidus vel calidus, serosus, falsus, & acris, qui vel in maxillæ membranâ, vel in dentium nervum, vel etiam in corpus decumbit, fluxionis hujus materiæ principium plerumque est è capite, aliquando etiam ab inferioribus partibus procedit. Si humor in dentibus putrescat, vermes inde generari solent, qui doloris dentium etiam causa sunt. Corroduntur pariter dentes & cariem patiuntur ab acris humoribus ad ipsos defluenti-

bus. Ita ut frangantur, & frustulatim excidant.

### SUBSECTIO PRIMÆ.

*Pro Dentibus dealbandis.*

Inter omnia quæ dentes præservant à putredine, & dealbant, maximè commendatur oleum vitrioli, si cum aqua miscetur, cum puræ & integræ carni sit innoxium, & corruptam saltem tollat; vituperant autem multi illud, quia verum illius usum ignorant: qui verò eo uti sciunt, scilicet in magnis morbis adhibent, gutta una vel altera saccharo vel melle rosac. admixta mirificè deterget dentes, & gingivas putridas cum ulceribus oris plurimum juvat. Eadem vi, quæ camphora, propter partium tenuitatem prædita est, & cum refrigerationibus datum refrigerat, cum calfacientibus eorum calorem auget, atque universi corporis substantiam minori noxa quàm Camphora, quæ humido radicali inimica est, permeat. *Iohannes Craton. consilior. 8. lib. 5.*

℥. Fol. rosmar. ʒss. siccentur, in pulverem redigantur, adde pannis in albi in pulverem combusti ʒii. corall. rubr. ʒi. Alabastr. ʒss. M. F. Pulvis. Quo quotidie dentes fricentur, & est optimum medicamentum. Post frictionem os aqua rosmar. colluatur. *Rodericus à Fonseca. Tomo primo, consultatio 46.*

Optimum est remedium, & sæpe experientia comprobatum, ad dentium radices carne obducendas, dentesque firmandos & de-



& dealbandos opiata sequens. Parum aluminis in olei Sulphuris  $\mathfrak{z}$ i pone adde Conserv. bugloss. vel ros.  $\mathfrak{z}$ vi. & deterfo dentium tartaro ope Scalpelli lignei, admoveatur opiata, & intra 15. dies, si hæc sæpe fiant, dentes firmabit, dealbabit, & carnem gingivarum producet. *Petrus Borel-Ins., observ. 65. cent. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Dentium dolore.*

**P**Ræmissis venæsectione, scapularum scarificatione, & medicamento lenitivo, quibus dolor multum sedatus, ad sequens topicum tandem devenimus.

24. Mastich. staphysag. an.  $\mathfrak{z}$ i. sem. hyoscyami  $\mathfrak{z}$ i. F. duo globuli in panno lineo raro, unum post alterum masticabat, & pituita ex ore defluente, ab omni dolore liberata est ægra, cum quadam admiratione hoc remedio nunc juvante, quod prius dolorem inferebat, idque ob causam antecedentem nunc per evacuationes ablata, cum in iis adhibendis remediis ordo servandus sit, quem Empirici ignorant. *Petrus Forestus observat. 3. lib. 14.* De affectibus Labiorum, gingivarum, dentium, oris &c.

Cum juvenis essem in dente molari insignem dolorem habui, dens cum corruptus esset, & Chirurgum extraheret, extrahere non potuit, videbatur tamen paululum elongatus, & dolor cessabat ad 4. vel 5. annos. Sed postea redeunte, dolore, extractus est idem dens, & ab eo tempore usque in senectutem, nullo unquam dolore dentium laboravi. Quanquam postea anno ætatis meæ 63. cum alius dens mihi doleret etiam molaris, ac attritus & corruptus esset, & aliquo modo videretur mobilis, deliberabam ob dolorem insignem, ut idem extraheretur, propter senium tamen non audebam, cum Bononiæ contigerit eo tempore, quo studiis ibidem in Italia impallescere, quo *Dentarius* in foro publico cum in sene detraheret dentem, subito extinctus est, ob ingentem tamen dolorem accessi Chirurgum, qui eundem extraxit, qui equidem omnino corrosus erat, quanquam radicitus in-

hæreret, dente ablato, statim dolor cessavit: neque unquam postea ullo dolore affectus sum. *Petrus Forestus, ob. 4. lib. 4.*

Famula nostra cum asperrima hyeme lintea exposita lavaret, vento boreali flante, ex frigore dolorem dentium incurrebat, cum lana succida oleum chamæ. & anethi circa dolentem locum exterius admovebam: inungebam quoque unguento Alabastrino, illud enim egregiè valet in omnibus doloribus dentium, ut experti sæpe sumus ex quacunque causa. Auri instillari iussit castorei exiguum cum nardo in oleo coctum; quo & *Ætius* nititur. Postea maxilla inflata, quod bonum erat signum, materiam foras evocari, continuando inunctionem, dolor cessavit. *Ætius* commendat suffitum ex canis mortui dente, ita ut fumus inde progressus excipiat. Deinde dentem ustum exigo aceto tritum in ore retinendum præbet. *Petrus Forestus, Schol. observ. 5. lib. 14.*

Corpore expurgato, imperavi ut supradentem dolorosum radicem lapathi acuti poneret per taleolas concisam, quo remedio dolor multos annos affligens illicò sedatus est, cum tanto successu, eodem remedio in aliis plurimis (præcedentibus tamen universalibus præsidiiis) prosperè usus fuerim. Habui illud à rustico quodam. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 14.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Dentium dolore.*

**C**Apeopium in pauca quantitate, & manu calefactum, ita ut mollescat: ut cera, circumpone denti dolenti, aufert omnem dolorem stupefaciendo. Item.

24. Camphoræ modicum, in aceto bulliat parum: deinde teneat eger in os, valeat ad omnem dentis dolorem. *Bartholomæus Montagnana cons. 87.*

Omnium præstantissimum est oleum buxi, quod tanquam incantamentum, illicò dolores sedat, ad miraculum usque, & pro maximo secreto habetur; ita ut hoc solo ditari aliquis possit, in foramen dentis gutta una vel altera injiciatur: illicò dolorem tollit; ideo nihil præstantius reperiri potest. Aliud remedium ad hoc fit:



## SUBSECTIO QUARTA.

## Pro Dentium dolore.

ex oleo Camphoræ, cujus gutta si intra foveam dentis instilletur, mirificè dolores sedabit. tertium est.

℞. Aq. plantag. ℥i. vitrioli rom. contus. gr. ix. M. madefac. linteolum in liquore calido, quo dentes & gingivæ mad. fiant, pos. sunt dentes cavi aduri per stylum aureum vel argenteum ignitum, & ita firmatur erosio, cessat dolor, nec redit, sed franguntur dentes: *Rodericus à Fonseca, Tom. 1. consult. 46.*

Nil præstantius oleo terebinthinæ chimico cum pulvere Camphoræ; cujus etiam oleum chimicè paratum est efficacissimum. Item vitellum ovi assi applicatum prodest, ut & theriaca illita. Exterius interim confert panis calidus nuper è clibano extractus, qui magis proderit, si cum sale, anisis, & pulvere florum anethi factus fuerit. *Jul. Caesar. Claudinus, consult. 20.*

Episcopus quidam Ecclesiæ *Laugingane* dentium dolore infestissimè cruciabatur, cui ego supra dentes dolentes crebrò admovebam sequentem aquam lana vel linteolo exceptam; qua statim omnis dolor evanuit, plurimum ex ore phlegmatis profluxit.

℞. Aq. solan. ℥iii. ol. vitrol. rom. q. s. ut acida reddatur, probè diluantur. *Martinus Rulandus, curat. 9. cent. 1.*

Illustrissima quædam princeps torquebatur miserè dentis cavernosi dolore: pro quo frænando, molliendo & pellendo usa fuit multis variisque medicamentis in tali casu expertis & probatis, sed sine successu, vocatus tandem ego, guttas aliquot olei Camphoræ gossipio parvo excipio, ac dentis cavernæ applicari jubeo. Quo facto cruciatus illicò præter omnem expectationem inhibitus & suppressus ex toto fuit, neque amplius rediit, hoc enim oleum certò domat, & abolet omnem dolorem. *Martinus Rulandus, curat. 3. cent. 2.*

In dentis cavernulam imposui oleum heraclei ligni, & confestim ex toto evanuit dolor: nam oleum istud humores extrahit, vermes dentibus innatos necat, & doloris omnem causam ex qua ortum trahit dolor, tollit. *Martinus Rulandus, curat. 31. 52. 53. cent. 3.*

**P**urgato primùm corpore, cum dolor in dextro latere magis urgeret: allium contusum carpo dextro apposui, unde cuticula abscessit, dolorque in eo latere remissit, verum in sinistro latere, dolor non solum dentium regionem occupabat, sed & temporum, totaque mala illic dolorem patiebantur, cumque intollerabilem, punctionesque in aure sentiebantur, itaque cucurbitulas binas scapulis utrinque adhibui; allium etiam sinistro carpo applicatum fuit, in aures aqua ros. cum album. ovi & lacte conquassata, additis guttis 4. Extracti opii, immisit, temporibus oxyrrhodinum adhibitum addito oleo chamæ. Lotiones item crurum ex decocto herbarum capitalium factæ. Hisceremissit aliquo modo dolor, rediit tamen, quare repetii cucurbitulas, rursusque purgavi, & postea scarificatione uti jussi, & hanc crurum collutionem præscripsi.

℞. Rad. bistort. pyreth. an. ℥i. Rad. i. reos ℥ß. herb. hyssop. agrimon. salv. beton. majoran. an. Mianthos pi. Sandarach. pulv. ℥vi. piper. long. Zinzib. an. ℥ii. bulliant in aqua, addito aceto donec decoctum acefcat: utebatur eo tantùm eo tempore, quando dolor urgebat, alio minimè, semperque profuit, temporibus hoc Epithema, cum stupa canabina, quoties dolor ingruerat, appositum fuit.

℞. Aq. ros. ℥iv. aq. lavend. ℥i. lactis, ℥ii. album ovi agitatur. num. 1. pulv. sem. Cumin. ℥ii. extracti opii liquidi gutt. 1v. quoties applicuit, levamen sensit.

Naribus succum betæ & sol. majoran. cum penna indidit, unde sternutatio secuta est, redeunte dolore purgavi illam denuo extract. Cydon. ℥i. unde septies dejecit.

Cucurbitulæ duæ majores scapulis iterum adhibitæ. Carpo brachii sinistri allium contusum bis apposui, & potionem illius in aurem partis affectæ immisit: quæ adjuvamentum aliquod adferebant, jussi tandem ut dentem cavum malorum humorum causam evelleret, quo facto, postea ab ejusmodi doloribus, liberata fuit. *Felix Platerus, lib. 2. pag. 397.*

℞. Rad.



24. Rad. pyrethr. ℥ii. Rad. angel. ℥ss. sem. staphysagr. ℥i. cubeb. ℥i. nuc. mosch. ℥i. F. pulvis adde Sacchar. ℥ss. & cum infus. gummi tragacanth. F. rotulæ mastice expuendo.

24. Rad. alth. pentaphyll. an. ℥ii. Rad. galang. ℥ii. Liquirit. ℥ss. Salv. beton. an. Mi. flor. ros. malv. an. pi. flor. anthos pß. hord. pi. nucis mosch. ℥ii. F. decoctio in aqua & vino ad ℥iiii. in colatur. dissolve diamor. ℥ii. mell. anthos ℥ss. aceti Scill. ℥i. F. gargarisma quo sæpè fauces gargarizet. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 403.*

Mira vi prædita est nicotiana nuper huic orbi illata. Cum ego ipse ante annum vehementer ex dente laborarem, hanc decoxi ex aqua, adjectis chamæm. floribus, tepidi hujus decocti cochlear ore tenebam, expuebam; acidem agebam horis duabus; dolor mitescebat: postridie cum ex more meo hortulum in suburbis accessissem, inclinatoque capite quid graminis evellerem, liquor croci flavedinem referens copiosè è naribus meis affluxit, nicotianæ odorem referens; ac omnis dentium dolor evanuit. Mihi toto vitæ curriculo nec sanguis, nec quid præter serosam pituitam, è naribus fluxit unquam. At nihil ego vidi hoc effluxo liquore flavedine altiore tinctum. *Iob. Heurnius, lib. 1. Methodi ad Præsin.*

Parva quædam lamina ferrea à Sereniss. *Farnesia*: gente tanquam arcanum quoddam pro sedando dolore dentium haberi potest, qua quidem lamina si confricentur extremitates infernæ aurium usque ad incalescentiam partis, sedabitur dolor. *Benedictus Sylvaticus, obs. 2. cent. 2.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Dentium dolore.

**M**ulier quædam gravida septimestris, & biliosi temperamenti, tandem dentium dolore correpta est, ut frustra tentatis omnibus remediis, per multos dies insomnis & clamitans cum lachrymis, & vigiliis continuis, quælibet remedia, imò ferrum & ignem experta, ad desperationem ferme adducta fuerit, ita ut coactus fuero ipsi exhibere nocturnis horis (quia tunc

præcipuè intollerabilis ipsi dolor erat) laudan. opiat. gr. iv. quibus cum pauca quantitate confect. de hiacintho assumptis, post horæ quadrantem placidè per aliquot horas dormivit, ac sine dolore expergefacta, reliquum gravidati tempus jucundè transegit. *Lazarus Riverius, observ. 90. cent. 4. vel Simeon Iacoz.*

Infinitos à dolore dentium liberavi, denticoroso admovendo tantillum gossipii oleo buxi imbuti, illud autem oleum extrahitur per retortam igne reverberii, scobem illius prius infundendo per 24. horas in vino albo, & omnia simul destillando, primum egreditur aqua acida, quæ etiam ad eundem affectum confert, simplici ablutione dentis, mox egreditur oleum usui diligenter reservandum, hoc etiam remedio foeliciter usus sum.

24. Sem. plantag. ℥ii. tormentill. ℥iii. rad. hyoscyami albi ℥iv. omnia exsiccata redigantur in pulverem subtilissimum addendo opii gr. i. includantur nodulis qui macerentur in decocto sequent.

24. F. Sambuci. Mi. ros. rubr. pii. bulliant in aceto ad suum dictum.

Hi noduli in decocto dicto macerati, intra dentes leviter comprimuntur, & detinentur, & intra exiguum temporis spatium multus humor effluit per os, & dolor auferitur. *Samuel Formius, observ. 40.*

*D. Leseq.* Medicinæ Doctor, se curatum vidisse retulit dolorem dentium sale fraxini, quo impletur digitale mulierum, aut quid simile, & applicatur arteriæ temporum, ubi sentitur pulsatio, & intra breve tempus nodum facit in arteria, quo fluxus intercipitur, observ. 11. observationum hinc inde decerptarum & *Riverio* communicatarum.

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Dentium dolore.

**A**Nno 1647. Gravissimo dentium dolore afflictus sum, qui cum circa mediam noctem intolerabilis evasisset, frustulam tabaci ore assumpsi, & diu leviter masticaui, donec vomitus excitatus est: quo omnia alimenta in cœna assumpta rejecta sunt, & cum iis multa pituita, dolor verò



vero intra in duas horas evanuit. *Lazarus Riverius, observ. 31. cent. 4.*

Anno 1645. Corruptus sum frequenti & molesta salivatione cum dolore dentium acerbissimo. Sumpsi resinæ Jalapæ gr. viii. quibus optimè & blandè purgatus, ferofam illuviem in corpore redundantem, doloresque in diversis corporis partibus excitantem, 7. dejectionibus, in maxima copia excrevi, & sequenti die à prædictis doloribus, & molestissimo ptyalismmo immunem me sensi; attamen post 2. menses reversus est dolor dentium, & ptyalismus, qui sumpto eodem medicamento intra 24 horas profuse evanuerunt. *Simeon Jacoz observ. 15.*

Cum ego olim cum aliis à viro primario sat lauta cœna exceptus essem, quidam gravi dentium dolore infestari cœpit, ut incœnatus abire constituerit, iussi aliquantulum sustinere patientiam, & paulisper morari; interea modicum Camphoræ adferri curavi cavitati dentium inferendum, cum subitaneo levamine, ut animo hilari compotare licitum usque ad metam. *Augustinus Thonerus, observ. 1. De Dentium dolore, lib. 2.*

Bursa pastoris contusa & auribus indita avellanæ magnitudine optimum est remedium, & sæpe expertum; est enim quidam aurium cum dentibus consensus. Allium etiam contusum cum salis momento, & pollicis admotum vesicas efficit, è quibus apertis aqua fluit, qua fluxio à dentibus derivatur, & dolor eorum tollitur; quod non minus mirum est, quàm cum *Galenus* è contra digitorum impotentiam motus admoto in dorso Emplastro ad nervorum origines curavit. *Petrus Borellus, observ. 27. cent. 3.*

Emplastrum ex pice burgundica cum pulvere nucis mosch. arteriæ temporali admotum multis contulit, eosque a dentium dolore liberavit, *Petrus Borellus, observ. 68. cent. 4.*

Anno 1648. Tumores quidam genarum cum dentium dolore populariter grassati sunt, à fluxione Catarrhica ob pluvias immodicas, at omnes breviter curati sunt, qui sicum inversum calefactum, sæpè renovando, interius admoverunt; tumor enim citò maturatus in ore aperie-

batur, & cum sputo evacuabatur. *Idem observ. 86. cent. 1.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

## Pro Dentium dolore.

**I**llustrissima quædam princeps tempore hyemis patiebatur dolorem dentium diuturnum ac gravem dentibus maxime erosio cavisque existentibus, remedia quibus sælici cum successu usus sum. fuere sequentia.

24. Extract. panchymag. Croll. Dis. gumm. gutt. laxat. gr. iv. (erat enim difficilius solutionis) ol. succin. anis. stillat. an. gr. ii. M. F. pilulæ num. 21. pro una dosi, accepit in aurora, & sufficientur excrevit, præmisso hoc minorativo, noctu antequam cubitum se conferret, accepit pro catarrho sistendo v. vel vi. de istis pilulis.

24. Oliban. selectiss. mass. Pil. de Cynoglossa an. Dis. laudan. opiat. gr. is. ol. cravi succini an. gutt. iv. cum Syrup. papav. pil. num. 25.

Interdum utanur istis morsulis contra catarrhos, pro lubitu accipiendo aliquoties.

24. Oliban. ol. nuc. mosch. an. Zi. matich. liquirit. pulv. an. Dis. C. C. usti præp. Zi. coriandr. Dis. conferv. ros. antiq. 3vi. saccar. equ. ros. solut. lib. Dis. F. confectio in morsulis. Si dolor urgeat, placetur istis topicis.

24. Aq. salv. beton. verben. an. Dis. aceti, flor. cariophyll. rosac. an. Dis. ol. succini, cariophyll. an. gr. iii. laudan. opiat. aceto scyllit. solut. gr. iv. camphoræ solut. gr. ii. M. F. gargaris. vel sic fiat.

24. Rad. alth. pyrethr. bistort. ireos, ras. ligni sanct. an. Dis. fol. hyssop. salv. verben. beton. an. M. flor. anthosambuc. an. p. i. F. decoctio in colat. lib. dissolve aceti rosac. 3vi. laudan. opiat. gr. v. ol. cariophyll. gutt. v. M. F. gargarism. atque his Deo benedicente, immanis ac diutinus dolor remisit, placarique cœpit. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 4. cap. 4. lib. 2.*

Ex unico alumine inveni solatium, quod ignita scutella fusum in pulverem redegei, cumque nuce moscata & mellis, in mortario in limenti formam permis-



miscui; quo per vices partem dolentem in-  
unxi non vano successu, sopiti enim dolo-  
res & nox quieta fuit! *Thomas Bartholi-  
nus, histor. 54. cent. 5.*

Vidi os brachii bufonis statim primo con-  
tactu odontalgiam tollere. *Ioh. Helmontius,  
tract. cuitit. Butler.*

Quicumque excavatos dolentesque den-  
tes digitis eximere sine omni molestia &  
cruciatu cupit, is dissolvat ℥ii. gummi am-  
moniac. aut galbani cum sufficiente lacte  
esulæ aut hyoscyami, & coquat lento igne  
donec lac absumatur, ex his gummatibus  
conformet globulos, & erosis foraminibus  
dentium imponat per noctem & sic sine  
dolo eximere dentes poterit. *Franciscus  
10cl. pract. lib. 2. sect. 6.*

Si dentes sunt cavi & dolent, vel etiam  
citra cavitatem in dentibus dolentibus pre-  
stans est oleum cariophyll. in cuius ℥i. cam-  
phoræ. ℥ss. solutus fuerit, huius compo-  
siti gutta una vel altera in gossipio ( præ-  
sertim moschum redolente ) cavo denti  
immissa, vel etiam dolenti alioquin ap-  
plicata, omnem dolorem aufert. *Johan-  
nes Hartmanus prax. Chimiatr. pagin.  
126.*

*Carolus Piso* ( qui existimat dolorem  
dentium à seroso humore ut plurimum fie-  
ri ) lib. *De Morbis ab illuvie serosa*. Refert  
seipsum dolore dentium per multos dies  
afflictum, ab assumpto medicamento pur-  
gante, post sesqui horam, sinceram aquam  
ad sibi. & amplius evomuisse, tanto succe-  
ssu, ut postea vel decem annis ab hujus-  
modi dolore immunis prorsus fuerit,  
quo edoctus experimento, simili affectu  
laborantibus, medicamenta serosos hu-  
mores educantia præscripsit felici suc-  
cessu.

Præmissis venæ sectione & purgatione,  
cucurbitulis item cum & sine scarificatione  
scapulis, & vesicatoriis nunchæ vel pone  
aures admotis & applicatis; ad fluxionem  
etiam inhibendam, adstringentia tempo-  
ribus utiliter applicantur. Qualia sunt  
Emplastra ex gummi elemi, vel mastiche  
sola, supra pannum sericum liquata,  
cum pistillo æneo calefacto, Emplastrum  
de mastiche officinar, vel contra rup-  
turam, radix consolidæ maj. recens, con-  
tusa & adnota tempori in formam Em-

plastri, fluxionem efficaciter intercipit.  
In aures quoque immittuntur medicamen-  
ta ad dolores dentium, quia venulæ per  
quas fertur alimentum addentes, per illas  
partes excurrunt. Ideo infunditur oleum  
amygd. amar. in aurem vicinam denti  
dolenti, aut excipitur fumus aceti,  
in quo pulegium aut origanum cocta sint.  
Alia acētum in aurem infundunt, quo flu-  
xio cohibetur efficacissime, & in fluxione  
calida præcipue confert. In frigida verò  
fluxione, succus alli cum theriaca mixtus,  
& in aurem tepide instillatus; mirum in  
modum dolorem compescit. Idem præ-  
stat allii bulbus detracto cortice infor-  
mam suppositorii scissus, & in aurem  
intrusus.

Irritis omnibus aliis remediis, Dens præ-  
sertim si valde exesus fuerit, ferro extra-  
hendus est, eo enim extirpato, statim do-  
lor cessat, non amplius reversurus. Evul-  
so dente, ea pars à qua extractus est, di-  
gitis undequaque comprimatur, ut ad  
naturalem situm statim redeat; postmo-  
dum æger os colluat oxycrato tepido,  
caveatque ab aere frigido. Si verò sanguis  
in tanta copia effluat, ut vix cohiberi queat  
( quod interdum contingit ex venâ vel arte-  
ria discissa ) sistitur ut plurimum ille san-  
guinis fluxus, appposito globulo solidiori  
ex lineo confecto, & digitis per horam  
unam aut alteram compresso, quod si  
non succedat vitriolum ustum admo-  
vendum est, & lineum in aceto maceratum  
superimponendum, digitoque compri-  
mendum, donec crusta inducta fuerit.  
Postremum remedium est cauterium  
ignitum, quo sanguis erumpens statim co-  
hibetur. Si quis meticulous Chirurgi  
manum refugiat, ea sunt tentanda re-  
media, quæ ab authoribus passim pro-  
ponuntur, & dentis casum promovere cen-  
sentur: qualia sunt, pasta ex lacte tithy-  
mali, & thuris pulvere simul mixtis cum  
paucis amylo, in cavum dentis immissa;  
radix ranunculi, cortex radicis mori, ci-  
nis vermium terrestrium, pyrethrum ace-  
to infusum, radix cucumeris agrestis ace-  
to infusa, & similia.

Sed præ cæteris efficacissimam vim ob-  
tinet ad dentium casum promovendum  
helleboraster, si ejus folio contrito dens  
con-



confricetur. Sed diligenter cavendum est, ne alii dentes hoc remedio tangantur, eorum enim casum promoveret.

Quidam rusticus cum dolore dentium acerbissimo premeretur, suavit alter ut helleborastro dentem confricaret, ille incautè hoc utens remedio, majorem partem dentium maxille afflicte confricuit, & intra paucas horas omnes prope modum deciderunt. Si quis igitur tam vehemens remedium experiri cupierit, suaserim ut reliquos dentes cera diligenter obducatur. *Lazarus Riverius, prax. medic. lib. 6. cap. 1.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Dentium dolore.

**M**iles strenuus ætatis tempore liquatis crudis succis, in tribus molaribus superioribus dextri lateris immani dolore est concussus, ita ut rabie quadam, & doloris sævitie pressus, furibundus veluti, & amens, è domo vociferans exire vellet, huic revellentia primò omnia facta sunt præsidia, mox anodyna, soporifera, imò ipsum opium dentium cava applicitum. Sed incassum omnia tentata: nam vehementius dolor agrum vexabat. Demum nive, qua aquam bibendam refrigerabat, fortuitò in ore detenta, eaque iterum atque iterum accepta, à dolore intra horam immunis evasit; & plures alii, qui hoc præsidium sunt experti, doloris sævitiam effugere. *Zacutus Lusitanus, observ. 85. lib. 1. Prax. admirand.*

In dentium dolore à flatibus solent nostrates mulierculæ, pro magno secreto rapi sub cinere calente assi infimum orbiculum calidissimum post aures applicare, magna certè efficacia revellit, & dolorem sedat, ut ego, qui ejus rei, experientiam & feci, & ab aliis factam observavi, testari possum. *Joh. Fiennus. lib. De Flatibus, cap. 16.*

Si à ventriculo dolor est, medetur vomitus, idque subito, sicut gravissimos dolores dentium videmus subito simul ac evomuit aliquis; tolli, *Joh. Crato lib. 5. epist. ep. penult.*

In acerbis dentium doloribus pyrotica

ex usu sunt, quoniam educit quædam sanes tenuis, & mirum tam exigua materia & pauca excreta, tam acerbos dolores dentium sedari. *Guill. Ballonius, lib. 1. epidem. & ephemer. pag. 87.*

Dens à cadavere extinctis viribus defuncto, quemlibet dentem hominis vivi, solo tactu marcescere excidereque facit, quod non item præstat dens à cadavere violenta nece interemptio, vel acuto mox morbo extincto. *Joh. Helmontius, tract. cui tit. Tumulus Pestis.*

*Joh. Heurnius* mulierem quandam pipere aquatico denti dolenti indito protinus dolorem sedasse testatur. Laudat idem Sandaracham albam (gummi Juniperi) in aceto coctam.

Dentium etiam dolori ut secretum remedium hoc adhibuit.

*24. Roris marini, hederæ arborescent an. Mi. coque ex posca, tepidè ore retineatur. In notis ad cap. 8. lib. 5. Patholog. Joh. Fernelli.*

Quidam socius meus patiebatur intensum dolorem dentium, cum inflatione & tumore genarum, sic quòd videbatur sibi, quòd dolor esset mortalis: quem sic curavi. Feci colligi rad. urticar. pungentium Mi. & feci lavari cum tribus aquis optimè ultimò ex vino feci eas lavari, & teri optimè in mortario cum ʒß. zinzib. & ʒi pyrethri. Deinde feci omnia in libii vini optimi bullire usque ad tertiæ partis consumptionem; & sub vesperam, cum volebat intrare in lectum, feci ipsum pluries gargarizare cum prædicto vino calido, & radices prædictas optimè pistari, & supra stupam extensas supra maxillam tumefactam emplastrari, & sic stetit per noctem. Manè verò recessit dolor dentium & tumor maxillarum, sic quòd perfectè liberatus fuit. *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 1. cap. 34.*

Virgo quædam nobilissima affligebatur sævissimo dentium cruciatu, quæ cum nullis cederet remediis, tandem feci sacculum ex tartari pulverati Mi. quem dolori applicavit, ex quo omnis dolor resolutus, solutus & sublatus fuit. *Martinus Rulandus, cur. 18. cent. 8.*

Odontalgiam ingravescentem non parum placavit sacculus hic anodynus.



24. Salis eom. M.ii. Torrefiant in sartagine, & f. sacculus dolenti maxillæ accomodandus. *Martinus Rulandus, cur. 36. cen. 7.*

Pilula D. Herlicii in ore detenta mira præstat in dentium dolore. Componitur hoc modo.

24. Sem. apii gr. ii. hyoscyam. opii. an. gr. iv. Syrup. papav. q. s. M. f. pilula. *Joh. Andr. Schmitzius. Compend. Med. pract.*

Puella quædam 18. annos nata, plurimis annis dolore dentium afficiebatur, variisque adhibitis remediis, tum iis quæ empirica dicuntur, nullo modo sedari potuit. Tandem ex mulierculæ consilio duo noduli vel parvæ puppæ lineæ ad pisorum magnitudinem confectæ sunt, quibus inclusa erant piper pulveratum, sal, medius cortex sambuci, & filo constrictæ ne solverentur. Per vices denti doloroso appositi sunt, & mox dolor cessavit. Postea & alii plures hoc eodem medicamento sanati sunt. Non placet tamen mihi hoc remedium, si humorum adsit defluxus, nisi corpore prius repurgato. Mathematicus quidam insignis se pluries experimento comprobasse mihi fassus est, solia lappæ, sale adjecto, in aceto decocta ad dentium dolorem miraculosè contulisse, si decoctum repidè in ore supra dentem potissimum dolentem frequenter detineatur. Idem præstare dicuntur à *Plinio* radices plantag. in aceto decoctæ, quo remedio *Ericius* collega meus uti solebat. *Petrus Forestus observ. 6. lib. 14.*

Mulier quædam morbo *Gallico* olim infecta dentium dolore torquebatur. Ad eam accedens, purgato prius corpore, jussi hoc diluto dentes colluere.

24. Sandarach. *Arabum* optimè pulver. ʒi. aceti acerrimi, vini rubri an. lʒss. M. & ad ignem f. ebullitio sufficiens. Hoc medicamento calido os colluebat ter aut quater in die, quod sibi multum opis attulisse dixit. *Amatus Lusitanus, cur. 21. cent. 5.*

Ancilla nostra odontalgia immani diu vexata, topicis & specificis nequicquam adhibitis, tandem suasu juvenis cujusdam feminis hyoscyami super prunas injecti fumum per infundibulum ore excepit, unde subito plus quam quinquaginta vermes è cavitate dentis profiluerunt, albi-

cantes & exiles admodum, vix filii crassitiem æquantes, qui statim non nihil sese intorquendo mortui sunt. Sedatus quidem dolor fuit, nec post rediit, sed vertigine, stupore & imbecillitate, capitis ex eo tempore correpta fuit, quæ necdum omnino evanuerut, ut plus hic mali quam illic boni fuerit. *Thom. Bartolinus in Actis Medicis Sect. 114. ann. 1671. & 1672.*

Experimenta duo *εὐτοπίστῃ* in dolore dentium:

1. 24. Flor. spic. nardi q. s. coq. in vino. Colaturam calidam sæpe in ore teneat. Hoc plurimis profuit.

2. Post catharsin cum pilulis lucis, sine quibus & aureis, admoveatur decoctum sabinae cum baccis juniperi. Optimè inde habuit mulier quædam ingenti dolore dentium afflicta. *Joh. Schroterus apud Joh. Philip. Brendelium, Cons. 57.*

## SUBSECTIO NONA.

### Pro Dentium eruptione in dentitione.

**A**D dentitionem facilitandam, cerebro cuniculi vel leporis in vino cocto vel butyro recenti cum melle permixto, gingivæ infantium leniter & sæpe ungendæ: quod solidiores & duriores dentium protrusionem remorari velle videantur, unde sæpe gravissima accidentia & symptomata supervenire solent, imprimis convulsiones & diarrhœæ lethales, mosque ipsa; tunc sine mora scalpello, aut incisorio alio acuto aperiri poterunt, quod tuto & sine metu inflammationis, doloris, aut hæmorrhagiæ fiet, qua operatione Chirurgum magnum & celebrem, suos & multos alios infantes dentientes, à gravissimis symptomatibus liberasse in *Gal- liis* vidi. *Felix Platerus, pract. tom. 2. cap. 8. pag. 346.*

Fricare gingivas cum cerebro leporis, facit nasci dentes infantium sine dolore, verum utrum crudo vel cocto utendum sit, non dicunt authores, coctum non bene permiscetur melli: ideo mulierculæ crudum accipiunt, & cum cochleari uno mellis concutiunt, sed valde fluidum est; ideo minus mellis accipio: ut in crassius limentum coeat, meliusque frictione,



gingivis adhaereat, *Petrus Forestus, observ. 8. lib. 14.*

Inruptione difficili dentium apud pueros maxillæ sæpius inungantur butyro recenti, & facilius prodeunt, quod si nec hoc modo prodire videantur, & necessitas urgeat, accipe sanguinem è crista gallinaei recentem, & cum digito semel tantum, vel ad summum bis inunge gingivas, & sine difficultate aliisque accidentibus tandem prodibunt. *Joha. Hartmannus, pract. Chimiatri. pag. 121.*

Ad facilitandam dentitionem & mitiganda symptomata præscripti linimentum gingivis per intervalla affricandum.

℥. Mell. virg. butyr. insuls. an. ℥ss. pulv. liquir. ras. dent. apri, lupi an. ℥i. M. f. linimentum. Ad dolorem leniendum, inflammationemque inhibendam, peculiariter commendavi succum sempervivi & plantag. Utque densitas & crassities gingivarum magis laxaretur & emolliretur, mucilaginem sem. malvæ & althææ cum vitello ovi subactam gingivis repetitum illinendam consulvi. Extra maxillis cataplasma ex floribus chamæm. summitatibus anethi, malva & farina hordei applicui, facta prius inunctione ex oleo lil. albor. & amygd. d. Cumque non parum blandimenti adferat gingivarum frictio, etiam rarefactioni conveniens, jussi dentem lupinum sæpius morderet puer. Verum cum ne sic quidem prodirent dentes, guttam unam atque alteram sanguinis ex incisione cristæ galli adhuc calentis per vices affricui, quo factum ut tandem erumperent incisores, quos postmodum, ex aliquo temporis intervallo, canini, tandemque molares sequuti sunt. *Timæus. Cas. 10. lib. 5.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### Pro Dentibus mobilibus.

℥. Vernicis, mastich. an. ℥i. gummi elemi, terr. sigillat. bol. armen. an. ℥ss. gummi dissolvatur in aceto scillit. & reliqua pulverisentur postea cum oleo terebinthinæ addita modica cera fiat linimentum, tum manè fricentur dentes cum pano lineo intus & extra, suaviter tamen, deinde laventur cum vino aromatico, *Burnet Parte I.*

postremo fricentur leniter cum prædicto linimento *Ioh. Baptista Montanus, consil. 113.*

℥. Mellis ℥ss. Sandarach. seu vernic. amoniac. alumin. scissil. thuris, an. ℥ss. M. bulliant in aquæ vitæ, ℥iij. aceti alb. ℥j. unica ebullitione, dein coletur, colaturæ calenti adde croci, gr. ij. & cum bombace hoc liquore calido imbuta dentes & gingivæ fricentur. Hoc quidem præsidium non solum mobiles dentes confirmat & roborat, verum etiam congelatos in pristinum statum restituit, dolorem sedat, & rheuma desiccet. *Ioh. Zecchius consult. 72.*

Mobiles dentes firmiores reddit hic pulvis.

℥. Corall. utriusque an. ℥ij. mastich. tragacanth. gummi arabic. an. ℥j. M. F. pulvis. *Ioh. Crato consil. 8. lib. 5.*

Gargarismo & lotioni usi sumus adstringente, & ad commotos dentes faciente.

℥. Rad. pentaphyll. bistort. an. ℥ij. rad. cyperi ℥ij. flor. ros. rubr. cupul. glandium, spongiæ bedeguar. an. ℥ss. sumach, ℥ij. Coq. in aqua ferrata vel cisterna. Colaturæ add. alumin. ℥ij. semel ebulliando, quibus dentes foveantur. Deinde circa gingivas & dentes mobiles fiat talis inunctio.

℥. Alumin. corall. rub. C. Cervi. an. ℥ss. sumach. spongiæ bedeguar. rad. bistort. an. ℥i. Media pars pulverisetur, & cum succo vel vino cydon. f. ad crassitiem mellis. Quod reliquum est pulveris, circa dentes mobiles inspergatur subinde; & hoc quod sequitur, myrrha, pompholix, lentiscus ac amyllum, quibus *Archigenes* dentes mobiles sistere docuit, & abluantur cum aqua supradicta: hiscè dentes firmiores facti sunt. Abstinendum à calchite, cortice mali granati, gallis, balauistiis, quia dentes migrant. *Petrus Forestus, observatio 11. lib. 14.*

## SUBSECTIO XI.

### Pro Dentium Nigredine.

Hoc unum præstantissimum iudicio, tum ad abstergendos mundificandosque



dosque dentes, tum etiam à putredine conservandos: quod hujusmodi est.

℥. Ossium dactylorum, ℥ij. corall. rubr. ℥i. farin. lupin. ℥iij. scyllæ assar. ℥vi. rad. Irid. ℥iij. contundenda contundantur, & omnia mis. cum optimo melle ut F. trochisci parvi, exsiccentur in umbra. Postea usus tempore dissolvantur vel in aceto scyllit. vel in vino albo, & cum eo liquore, abluat singulis diebus manè dentes, & foveantur tenendo in ore istum liquorem, sed prius diligenter fricentur panno albo subtili munde aliud dentifricium optimum.

℥. Cortic. ostreor. combust. & pulverisat. ℥iij. vernicis seu sandarach. arabum. ℥ß. Rad. Irid. ℥ii. Rad. aristol. gentian. cent. maj. an. ℥ii. terantur omnia per se. Deinde M. & excipiantur cum oximel. scillit. F. trochisci parvi, & postea usus tempore, fricentur dentes cum illis, & laventur cum aceto scyllitico, vel dissolvantur trochisci cum vino, & fiat sicut supra dictum est.

Aliud præstans remedium, quod dentes mirum in modum abstergit, & à putredine præservat, prius frictis dentibus, sola gutta olei vitrioli liniat dentes, & postea perfricentur cum panno asperiore, statim enim decidunt sordes per plurimum tempus in iis collectæ. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 111.*

*Montanus* retulit se didicisse Romæ ex quadam muliere, se formæ, atque virium integritatem oleo vitrioli acceptum debere, ipsi enim significavit, se ex ejus usu dentes quos in juventutes pessimos habuerat, nunc pulcherrimos habere & firmissimos; gingivas etiam firmas. Adiditque quod videretur sibi ob ejus usum tardius senescere. Usa erat autem singulis diebus una aut altera guttula, gingivas & dentes leniter fricando. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 113.*

Uxor mea charissima solo sale tosto cum digito saliva intincto dentes commode ad præservationem omni mane fricabat. *Felix Platerus. Schol. observ. 10. lib. 14.*

## SUBSECTIO XII.

### Pro Dentibus nigris.

**N** Os Matronæ cuidam imperavimus ut cum oleo vitrioli gutta 1. aut altera aquæ admixta dentes fricaret; hoc enim mode & flavi & nigri albißimi evadunt. Oleum etiam vitrioli vacillantibus dentibus prodest.

At prumex ignitus vinoque albo bis extinctus, & tertia vice ignitus relictus donec refrigeretur absque alia extinctione, demum tritus & ablutus albißimos facit dentes: nec eo magis celebre experimentum invenitur. Imò si dentes: eo quamvis non combusto, sed trito fricentur, albißimi evadunt. *Petrus Forestus, observat. 13. lib. 13.*

Cinis tabaci ad dentes abstergendos & dealbandos mire efficax est. *Lazarus Riverius, lib. 6. Prax. Medic. cap. 2.*

## SUBSECTIO XIII.

### Pro Dentium stupore.

**V** Ir quidam stupore dentium frequenter corripiebatur, huic portulacam commanducandam proposui; nam secundum *Paulum*, stupori benefacit portulaca commesta: huic etiam profuit. Nuces pineæ avellanæ quoque aut juglandes commanducatæ profunt, ut & caseus commestus. Prodest etiam si sale dentes confricentur. *Petrus Forestus, observ. 9. lib. 14. & Schol.*

## SUBSECTIO XIV.

### Pro Dentibus vacillantibus.

**U** Tatur hoc Gargarismate.

℥. Aq. ros. vel plantag. fßß. murræ olivar. condit. bene percolatæ, ℥ii. vel. ℥iij. alumin. ℥ii. vel ℥iij. aceti rosac. ℥i. huic immisceri poterit oxymel scillit. parum, aut si gravius habere velis, mellis rosac. parum oxymel scilliticum in istis omnibus ex defluvio in os, fauces & gingivas affectibus valde utile est, quare author sum etiam si amari-



cet, ejus tibi multum esse usum. Est enim singularis ei facultas ad dentes confirmandos & stabiliendos, humor exsiccat, influxum omnem arceat, dealbat dentes, atque omni putrilagine absumpta, anthelitem ex ore corruptum emendat. *Reinerius Solenander, consil. 29. sect. 2.*

Est hic pulvis efficax.

24. Rad. cyperi, sumach. gallar. balaustr. ros. rubr. an. ℥iv. alumin. ℥ii. C. C. usti, ℥ii. F. omnium pulvis subtiliss. quo dentes gingivæque fricentur leviter. Hoc modo solent brevi confirmari. Paratu facilis etiam hic est; & tamen ita applicatus utilis.

24. Gallæ coctæ in aceto ad aceticonsumptionem & exsiccatæ, ℥ii. malicorii, myrrhæ, alumin. usti, C. C. usti. an. ℥i℥. F. pulvis subtilis. Usus idem qui superioris, quod si pulverum horum affricus gingivarum infirmitas mobilitasque dentium non patitur, acetum in quo alumen solutum sit, quidam ore continendum propinant; quod et si utile sit, tamen quia acerbius esse videtur, licebit hoc decocto subscripto in os sumpto dentes gingivasque fovere, non enim colluere utile est.

24. Gall. ℥ii. myrrh. ℥i. malicor. rad. Ireos, an. ℥i. rad. cyperi, alumin. an. ℥i. C. C. usti, ℥℥. aceti, q. s. coquantur, & aceto excolato ore contento, foveantur dentes & gingivæ.

Melius hoc est, paratu facilius & plurimis profuit. Myrrhæ quantumvis, in coque vino, & addito oleo olivarum dentes & gingivas fove, firmat dentes, confortat; & ne corrodantur aut dissiliant efficit. *Reinerius Solenander, consil. 24. sect. 3.*

## SUBSECTIO XV.

### Pro Dentium Verme.

**D**entium vermes decoctum corticum fraxini interimit. Item decoctum rad. uræ, quod etiam dolorem dentium tollit. *Jo. Crato. consil. 8. lib. 5.*

Mihi secretam suam communicavit Rusticus Empiricus. Sevum nempe cervinum linteum exceptum & ad ignem liquatum inbibitumque & gingivis impositum, quo & vermes attrahi expertus

est, & dolores mitigari. *Thomas Bartholinus, hist. 96. cent. 1.*

## SECTIO SECUNDA.

### De deglutitione depravata.

**C**uidam sexagenario deglutitio adeo depravata fuit, ut liquida omnia præsertim vinum non sine suffocationis metu deglutire poterat, reliqua verò quamvis solidissima facillimè ad ventriculum descendebat. Rarum hunc affectum præcessit, catarrhus & paralytis sinistri lateris. Cum itaque liquida sorbere non posset, & solidis non satis nutritur, tandem ad summam imbecillitatem, lapsusque virium pervenit. Ego ad ipsum vocatus, primo pilulis (quas facillimè deglutiebat) corpus leniter expurgavi, deinde omnia quæ ad vires instaurandas requirebantur exhibui, & quia ut dictum est, liquida imprimis vinum sine suffocationis metu, sorbere non potuit, juscula utcumque spissa præparavi, additis vitellis ovorum: pro potu lac amygdalarum dedi, hinc factum ut liquida facilius quàm antea sorberet. Verum enim vero non diu post meum abitum, catarrhus denuo maximo cum impetu ad latus sinistrum & laryngem delapsus est, & de novo paralytin istius lateris induxit, quapropter cum nihil liquidi deglutire posset, nec solidis satis reficeretur corpus: vires quum etiam propter longitudinem morbi (antea enim semoris os sibi fregerat) prostratæ essent, brevi naturæ debitum persolvit. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 34. cent. 5.*

## SECTIO TERTIA.

### De Diabete.

**R**arissimus est hic affectus quem *Galenus* biantum vidit. διαβήτης Græcis dicitur ἀπὸ τοῦ διαβήναι, transire, quod citò transferatur materia urinæ. Vocatur etiam hydrops ad matulam, quod qui eo laborant, perpetua mictione matulas impleant, & διψήσις, propter sitim huic affectui junctam. Est autem Diabetes immoderatum urinæ profluvium,



quo assumptus potus nihil mutatus profunditur.

Hujus mali causa proxima est attractio renum depravata, cum retentione debilitata propter intemperiem calidam excedentem; quam affluxus humorum acrium mordacium & falsorum renum parenchymati impactorum infert. Locus affectus renes sunt.

Signa sunt, assidua oris siccitas, sitis intensa, urinæ copiosissimum profluvium corporis extenuatio, viscerum æstus & ardor. Malum est plerumque lethale, & vix unquam curatur.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Diabete.*

**S**omnum solito longiorem præcepimus & quietem, nam quodvis exercitium & immodicus motus, & animi affectus immoderati vitandi, tota vitæ ratio omnino frigida esse oportet, alimentis crassius utendum, cibi sint crassi, bonique succi mordacitate carentes ac frigidi. Dedimus igitur ptisanam, & sorbitionem ex alica, pedes vervecinos, vitulinos, suillos, bubulos & hædinos, caseum item recentem citra salem; & lac per silices aut ferrum igitum scissum, seroso humore adempto, ova etiam sorbillia, & ex oleribus intybum, portulacam & lactueam; inter pisces, saxatiles, inter fructus, pyra, poma & castaneas. Quod ad medicamenta attinet, à venæsectione abstinuimus invalde vetula & exangui, quæ aliàs convenit in principio in cubito. Syrupos ex portulaca, de ribes, acetosa, myrtinum rosac. & nymphæ exhibuimus, qui bilem contemperarent. Tandem ad hoc Electuarium deveni.

℞. Carnis cotoneor. conserv. consolid. maj. ros. vet. an. ℥ss. mucag. gummi tragac. & sem. cotoneor. cum aq. ros. extract. an. ℥ss. bol. armén. terr. sigill. an. ℥i. amyli ℥iij. cum Syrup. myrtino & papaver. an. q. s. F. opiatum. Capiat bis in die & semel in nocte, lumbos inunximus hoc linimento.

℞. Ol. ros. omphac. cotoneor. nymphæ, an. ℥ss. succi plantag. ℥i. santall. omnium ℥ss. ceræ & aceti parum, fiat linimentum.

Lumbiqueque interdum unguento populi inungebantur. His tamen non obstantibus naturæ debitum persolvit. *Petrus Forestus, obs. 4. lib. 24. De Renum Morbis.*

Honestus quidam civis urinæ detinebatur profluvio: subinde uno die amplius quàm urnam 40. librarum reddebat, bibebat non minus, ut qui propter assiduam urinæ profusionem, assidua quoque siti premeretur. Cum autem huic nulla prodesse remedia, & vix ulla sibi adhiberi pateretur, paucis diebus deficiens, è vita commigravit. Morbum hunc diabatem fuisse apparet, quem *Galenus* comparat lævitati intestinorum seu lienteria: quemadmodum enim per hanc cibus assumptus citò dejicitur; ita & in diabete potus velocissimè per vias urinarias descendit. *Rombertus Dodonæus, lib. observ. cap. 32.*

Diabetis specificum positum est in martis essentia croci martis à *Urollo* descripta multum hic prodest. Felicius operatur tinctura. Smaragdi (de qua infra sect. de Dysenteria) tinctura Corallorum, item sal Corallorum mirabiles in diabete potestates habent. *106. Hartmanus, præct. Chimiæ, pag. 268.*

*Erastus* valde commendat Syrupum ex rad. Symphyti maj. & prunis Sylvestribus confectum, quem se summa cum felicitate in affectibus huic malo similibus usurpasse testatur.

Narcotica, ut theriaca recens, Sirup. de papav. & laudanum opiatum, prudenter usurpata, in hoc affectu plurimum prodesse poterunt. Pro potu utatur ager aqua ferrata cum Syrup. acidis & astringentibus, vel decocto prunorum Sylvestrium & corticis interioris quercus, quo remedio fere solo se hunc morbum in puero curasse testatur. *Erastus. Lazarus Riverius. Prax. Med. lib. 14. cap. 6.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Diabete.*

**P**uer quidam 7. annorum usu acidularum *Griesbachensium* in tantum urinæ profluvium incidit, ut an unquam simile visum sit, valde dubitem. Hinc sitis talis supervenit, ut singulis noctibus



bus plus quàm librās x. aquæ (quantitatem vini, quod admiscebatur, non observarunt adstantes) ebiberet, & eodem modo protinus, nihil alteratam, iterum emingeret. Ego cum alio Clarissimo Medico in consilium adhibitus, victus rationem refrigerantem & insigniter nutrientem præscripsimus. Loco vini & aquæ quibus antea, copiosè usus fuerat, lac amygdal. & juscula castratorum, caponum & pullorum in quibus vitella ovorum dissolvebantur, propinavimus, carnem assatam castratorum, perdicum, caponum, turdorum, alaudarum, & similia avicularum dedimus. Hac cum per dies aliquot usus fuisset victus ratione, & vires nonnihil recollegisset, Syrupo rosato solutivo composito cum rhab. & myrobal. citrin. corpus leniter expurgavimus & per intervalla potiunculam sequentem exhibuimus.

℞. Rad. tormentill. bistort. Symphyt. maj. plantag. an. ℥ij. fol. agrimon. veronic. ros. rub. an. M℥. coq. in aq. ad tertiæ partis consumptionem incolat. ℥ij. dissolv. Syrup. de ros. siccis ℥ij. C. C. usti & præpar. corall. præpar. trochisc. de spodio an. ℥j. M. F. potio. De præscriptis pulveribus quoque non raro cum lacte amygdalino dedimus, renes unguentis & oleis refrigerantibus & adstringentibus, veluti oleo rosac. myrtillorum, mastiches, unguento rosac. & comitissæ inunximus. His cum per aliquot dies usus fuisset remediis, & victus ratione, plenissimeque restitutus esse nobis videretur puer, domum me contuli. Post meum abitum, cum victus rationem non observasset, & loco lactis amygdalinum aqua dilutum iterum bibisset; denuo in eundem morbum incidit, & quidem tam graviter, ut naturæ debitum persolverit. *Guil. Fabric. Hildanus, observ. 35. cent. 5.*

Duo diabete laborantes qui ita squalidos habebant renes, ut folia nymphaeæ illis imposita, momento temporis chartæ pergamenæ instar durissima redderentur; postquam plurima frustra usurpata prædicia tandem lactis asinini chalybeati potu unius mensis spatium nutriti, & philonio persico ex intervallis assumpto à tanto malò, me jubente; succe immunes. *Za-*

*Barnet Parte I.*

*cutus Lusitanus, observ. 80. lib. 2. Prax. Admirand.*

Mulierem quandam diabete laborantem istis paucis & facilibus remediis liberavi.

Manè & vespertiæ gra residere in Balneo aq. dulcis; in qua ferrum vel ignitus Chalybs aliquoties extinctus erat. Post egressum Balnei regionibus renum ac vesicæ applicabat plantaginem aqua chalybeata decoctam. Cibum præscribebam siccantem, & ex Chalybeata aqua vel lacte coctum. *Martinus Rulandus curat. 98. cent. 2.*

Diabetem curatum vidi hoc medicamento.

℞. Cancror. fluviat in clibano siccet, & pulv. ℥i. thuris masculi ℥℥. Sacchar. modicum detur in potu. *Achilles Gasserus, observ. 36.*

Trochisci magistri mei, cum quibus plures curavit, & ego cum iis quendam juvenem intra 4. dierum spatium curavi, qui diabetem patiebatur, & mingebat involuntariè in lecto.

℞. Ros. spond. an. ℥x. sem. portulac. succ. liquir. boli sumach. an. ℥ij. sem. lactuc. coriandr. santal. berber. an. ℥i. tragac. gum. Arabic. balauft. an. ℥ij. camphor. ℥℥. Temperentur cum succo malor. granator. acetosorum, & f. trochisci, quorum quilibet sit ponderis ℥i. Capiat manè & serò unum cum aqua frigida & syrup. ros. Est summum & expertum remedium ad prædictam passionem. Item fiant sæpe clysteria cum lacte frigido & succo herbarum frigidar. & parum ol. ros. & viol. simul mixtis; ex prædicto tamen lacte prius butyrum extrahatur.

Trochisci ad idem. ℞ Carab. boli, myrobal. nigr. torrefact. medull. glandium excorticatar. sumach. coriandr. torrefact. in aceto positi ros. spodii, & sem. lactuc. portulac. gummi Arab. an. ℥ij. Conficiantur cum succo granat. acetosor. & detur ℥i℥. cum syrup. ros. & cessante siti purgetur cum aliqua levi colatura cholleram mundificante. *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 20.*

Principium curationis sit vomitus, jubendo, ut dum maxima torqueatur siti, copiosam deglutiat frigidam, hancque repentè evomare fiat hoc singulis 4. diebus



Certum est hoc auxilium pro revulsione & refrigeratione. Singulis quoque diebus degustet aliquid, quo fluida reddatur alvus. Leves clysteres placent. Sudor provocetur factobalneo ex aquo dulci. *Felix Platerus* apud *Brandelium*. *Consil.* 83.

## SECTIO QUARTA.

### De Diarrhœa.

**D**iarrhœa (quæ communiter sumpta omne alvi profluvium denotat) propriè sic dicta, est immoderata frequens ac jugis alvi dejectio, qua non ut lienteria, crudum alimentum, nec ut in dysenteria, cruenta colluvies, sed humores excrementitii & sinceriores quantitate & qualitate molesti sine inflammatione, exulceratione, aut vehementi doloris sensus profluunt, eam gignit humorum copia & pravitas facultatem ventriculi & intestinorum expultricem nimium irritans. Adjuvantes causæ sunt errores in victu commissi, cibi mali succi, venenati & facile corruptibiles, nimiaque copia ingesti, cerevisia etiam recens, aeris intemperies, omissa corporis exercitatio, & cutis totius corporis adstricta.

Diarrhœæ plurimæ sunt differentię, ratione materiæ, biliosa est & pituitosa melancholica & serosa; ratione loci, unde materia profluit, alia est à toto corpore, alia a parte aliqua peculiari, ut cerebro, ventriculo, intestinis, mesenterio, hepate, liene, & utero. Denique ratione modi & causæ efficientis, alia est critica, natura in febribus, apparentibus signis concoctionis, rectè agente; alia symptomatrica. Dentitio in pueris alvi fluxum inducit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Diarrhœa.

**Q**ui diuturno alvi fluxu laborabat, & omnem suam substantiam frustra in medicorum ope consumpserat, consilii causa, ut ab hoc malo liberari posset, me accessit: cui consilium dedi, ut mespilla etiam immatura, in maxima copia devora-

ret, quibus commestis alvi profluvium paucis diebus cessavit. Idem evenit mercatori *Zelando*, quicùm multis mensibus laborasset profluvio & tandem etiam dysenteria neque ab ullis medicis curari posset, tandem mespilis commestis ex *Johannis Spirinchii* Medici *Lovanienfis* consilio, sanitatem consecutus est, & medico trecentos aureos pro sola mespilorum præscriptione numeravit; quibus solis in pristinam sanitatem fuerat restitutus. *Petrus Forestus*, *observ.* 1. *lib.* 22. *De Diversis generibus Profluviorum alvi.*

Convenientissima sunt remedia quæ parantur ex rhab. myrobal. & mastich. ex quibus hæ pilulæ confici possunt, quæ in omni fluxu ventris juxta *Rondelet.* tutò dantur.

℞. Myrobal. citrin. chebul. an. ℥ss. Mastich. ℥i. Spic. nardi gran. vi. cum. Syrup. rosat. F. Pillulæ. Dosis pro prima vice ℥ss. deinde ℥j. si opus fuerit reiteratione. *Petrus Forestus*, *observ.* 2. *lib.* 22.

In pauperibus si fluxus non constringeretur, post Universalia remedia, soleo commode exhibere ℥j. sem. plantag. exsiccati cum cerevisia vel ovo sorbili, idque post deterforia medicamenta. *Petrus Forestus*, *observ.* 3. *lib.* 22.

Qualiscunque fuerit redundans humer clysteribus utendum. Ego sequentibus felicissime sæpe usus sum.

℞. Decoct. hord. non decortic. ac torrefacti ℔i. Sacch. rubr. ℥i. vitellum unius ovi F. Clyster. Sal non imponendum, propter eius mordacitatem.

Hoc etiam præcedente corporis evacuatione feliciter usus sum.

℞. Decoct. hord. torrefact. ℥vi. succi plantag. ℥iv. ol. rosac. omphac. an. ℥ij. vitellum ovi unius. Sach. rubr. ℥i. M. frigide potius quàm tepide aut calide injiciantur. In fine etiam tali usus sum (quibus omnibus jam dictis etiam præceptor meus *Benedictus Faventinus* utebatur.)

℞. Lactis vaccin. lapidati vel Chalybeati ℔j. succ. plantag. ℥iv. Sacch. rub. ℥i. vitell. ovor. num. 2. F. Clyster. *Petrus Forestus*, *observ.* 9. *lib.* 22.

Medicus quidam *Hibernus* celeberrimus in Diarrhœa præ omnibus aliis quibuscunque sequens commendat remedium.

℞. Butyri insulsi. q. v. bulliant lento igne



igne ad tertiam vel medietatis partis consumptionem subinde despumando, exhibeatur de eo ægrotanti satis magna quantitas. Mitigat plurimum acrimoniam humorum, & ab eorundem corrosione intestina defendit. *D. Robertus Boyle, lib. De Utilitate Philosophiæ Experimentalis. Part. 2. sect. 5. cap. 18.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Diarrhœa in prægnante.*

24. **M**astic. el. ℥ij dissolv. in oleo rosæ. acc. cum ceræ ℥ss. vel q. s. fortiter commisceantur, quousque venerint in formam linimenti, deinde infundantur telæ linæ munde q. s. exsiccantur, post applicentur ventri.

Hoc Emplastrum per biduum aut triduum supra ventrem geret, singulis tamen diebus renovando: quod si fluor non cessarit, applicabi sequens ceratum linteum superinductum, quod etiam per dies aliquot gestabit.

24. Oriz. torrefact. ℥ss. mastic. cortic. thuris an. ℥ij. gallarum quercin. cupress. an. ℥iij. gummi torrefact. ℥iij. myrtill. ℥ss. pulveris. pulv. & cum resina & cera sufficientibus F. Ceratum. Remedia illa quo multis profuerunt prægnantibus Diarrhœa laborantibus.

De condito etiam sequenti sæpius in die ad quantitatem nucis castaneæ deglutire poterit, & maxime ante cibum. Sistit enim fluxum ventris, & ventriculū miselle roborabit.

24. Conserv. ros. antiq. diacyton. simpl. cum sacch. sine speciebus an. ℥iij. rad. tormentill. ℥ii. sem. sanguinaria: ℥ss. nuc. condit. torrefact. ℥i. ossium dactyl. ℥ss. Smaragd. orient. præp. corall. rubr. præp. an. ℥i. cum miva cydonior. simpl. q. s. f. conditum. Poterit etiam quandoque cochlear unum bibere balsami puerorum, si embryonis senierit debilitatem. Plurimum enim laudatur à prægnantibus usurpatum ubi senserunt fœtus imbecilles esse. Hoc tamen admonitum volo, ut ubi videris fluorem ad sistendum inobedientem futurum, ne multum urgeas, ferunt enim nonnunquam prægnantes ejusmodi diarrhœas usque ad partum citra noxam;

excluso tandem fœtu sponte sua desinunt. *Ioh. Navius, consil. 32. lib. 3. Consil. Cratonis & aliorum Medicorum.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Diarrhœa.*

**V**ir quidam robustus, ætate media correptus est diarrhœa biliosa valde urgente; cum siti intensissima. Vocatus ad eum, præscripsi sal prunellæ, in potu ordinario, tum etiam in julepis ex aq. lactuc. & portulac. paratis ter in die sumendis: & intra 24. horas convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 33. cent. 1.*

Correptus sum diarrhœa biliosa tanta acrimonia prædita ut anum eroderet, ardoremque urinæ concitaret, translata materiæ portione ad urinas. Dysenteria erat in procinctu. Ingressus semicupium tepidum illico liberatus sum. *Lazarus Riverius, Observ. 59. cent. 2.*

Auspicianda est curatio ab humoris peccanti evacuatione, quod fiet medicamento quod purgando adstringat, quale est hoc. 24. Rhab. el. ℥i. mirabol. citrin. ℥ss. Santal. citrin. ℥ss. Infund. in aq. plantag. in express. dissolv. rhab. pulv. ℥ss. Syr. ros. ℥i. F. Potio. Vomitus etiam interdum convenire poterit, quia revellet, & evacuat materiam morbificam.

Si sanguinis redundantis indicia fuerint, & robur virium, phlebotomia initio celebranda est. Corpore sufficienter evacuato tum medicamentis purgantibus, tum ipso alvi fluxu, astringentia & roborantia erunt, tum per os assumendo, tum per clysterem injicienda, tum ventri admovenda, quorum formulæ à curatione Dysentericæ erunt repetendæ.

Folia plantaginis in jusculis decocta ad hunc affectum utilissima sunt. In contumaci alvi fluxu, clyster ex jusculo & theriaca recenti utilis, suffitus etiam capsi barbati in cathedra perforata receptus, insignis est efficaciam; Syrupus corallo- rum ad idem est efficax, & multo magis illius tinctura, vel magisterium. Conserva cinorrhodi per se ad diarrhœam biliosam utilissima est, tum etiam si



opiatas astringentibus permisceatur.

Pilulæ de bdellio bis aut ter in septimana, vel alternis diebus usurpatæ; ad diuturnos, & contumaces alvi fluxus sistendos utilissimæ sunt. Utilissimæ etiam hæ tabellæ.

℞. Ras. ebor. ℥iii. confect. al Ker. ℥i. sacch. in aq. ros. dissolut. ℥iv. F. tabellæ.

Mercurius diaphoreticus per aliquot dies ad gr. x. i. exhibitus, omnes corporis impuritates aufert, quæ contumaces interdum alvi fluxus parere consueverunt.

Decoctum granorum juniperi in vino paratum, multum etiam confert materiam alvi fluxum committentem derivando ad urinæ vias, ita fit.

℞. Granorum juniperi Mi. vini rubri ℥i. bulliant ad duarum tertiarum consumptionem, colaturam capiat mane per triduum. *Lazarus Riverius, Præc. Med. lib. 10. cap. 5.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Diarrhœa.

**P**ilulas has pro causa & minera diarrhœæ averruncanda, ordinavi.

℞. Myrabal. citrin. ℥ii. rhabd. & parum tost. ℥i. Spicæ gr. iv. cum Syrup. ros. laxat. F. pil. ix. inaurandæ, habuit eo die decoctiones aliquot, cessantibus à meridie torminibus. Circa vesperam regionem stomachi & umbilici calida hoc linimento inunxit.

Ol. Cydon. menth. omphac. an. ℥ss. ol. nuc. mosch. ℥ss. ol. mastich. mac. cariophyll. an. gr. iii. sumach. balaustr. an. ℥ss. cum ceræ q. s. F. linimentum.

Postea commendavi hanc pulviculam.

℞. Farin. tritici ℥i. vitell. ovor. numero 3. pulv. cinnamom. nuc. moschat. an. ℥i. coq. omnia cum vini rubelli ℥iii. vel q. s. ad pulvis consistentiam, adde Sacch. finiss. q. s. ad gratiam.

Laudabat successum remediorum, appetentia ciborum, alvoque ad pristinam consuetudinem redeuntibus. Nihilominus majoris præservationis ergo præcepti, ut de pulvere sequenti per aliquot dies fumeret manè & vespere.

℞. Margarit. præp. ℥ss. corall. rubr. terr.

sigill. C. C. præp. an. ℥ii. croci martis. ℥ss. sem. plantag. papav. alb. an. ℥i. serici crudi. ℥ss. spec. diatrion. santal. anis. saccharo cooperti, an. ℥ss. sacchar. ros. tab. ad pondus omnium M. F. omnium pulvis. His ille paucis diebus à Diarrhœa tum epidemica liberatus est: sicut etiam iisdem remediis & plurimi alij restituti sunt. *Ioh. Petrus Lotichius observ. 1. cap. 7. lib. 4.*

Vidi nobilem pleuriticam: huic ad statum forè immanis fluxus alvi supervenit. Præscripsi illi usum Syrupi Myrtillor. ac summi Dei beneficio servata fuit. *Ioh. Hæurn. ad Aphor. Hippoc. 16. sect. 6.*

℞. Album. ov. conquass. num. ii. ponantur in cella vinaria, ut distillantur in aquam puram, cui tantundem aq. ros. vel rub. Idæi adde & exhibe patienti. Ex Obstetrice Gallica *Vvolfangus Hæserus lib. 3. Herc. Med. cap. 5.*

Plurimi commendant caseum antiquum sic præparatum. Comminutus sæpius abluatur aqua aliqua refrigerante & adstringente, ut rosar. plantag. portulac. Postea diligenter in sartagine exsicceetur, & in pulverem redigatur, cujus ℥i. vel cum cibo, vel cum aqua aliqua conveniente exhiberi potest. *Daniel Sennertus Practic. libr. 3. Part. 2. sect. 2. cap. 6.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Diarrhœa Biliosa in Dysenteriam commutata.

**E**Vocatus è Gallis ab illustrissimo meo principe, *Lugduno* media ætate distressi, idque in magno æstu: hinc factum est, quod in itinere labore fatigatus, æstuque confectus inciderim in diarrhœam biliosam, quæ statim in dysenteriam commutata est, non subveniente consilio, cum Clysterum pertasus essem: captans ex tempore consilium, sàmebam ferè singulis noctibus, statim à dejectione, cum dolor acerbius lancinaret, ℥ii. & amplius theriacis non admodum veteris (quam tum fortè *Lugduno* mecum in viam attuleram) dissolvenda in vino rubello, quo assumpto, quolibet vice, statim sedato sopitoque dolore, occupabat me somnus, corporeque in sudorem resoluta, videbar plane persudatus, eoque paucis vicibus reiterato,



penitus restitutus, persanato ulcere, nihil amplius incommodi sensi. Satis jam constat quid theriaca possit; quam illa fluxus inhibeat, quantum dolores sedet.

Utile est hoc Emplastrum ad hepar, quod sæpe in omni fluxu tam hepatico quam dysenterico excoxiativo, in antiqua diarrhœa, & similibus mirum in modum comperi juvisse.

℞. Eupator. Schœnanth. an. M℥. spic. Ind. p℥. mastich. macis. an. ℥℥. lingn. aloes. odorif. ℥iii. myroball. Cheb. Emblic. torrefact. an. ℥i. bol. armen. terr. Sigill. hæmatitid. an. ℥vi. coriandr. præpar. ℥i℥. Spod. ℥ii. ros. ℥i. Spec. trionfantal. sine Camphora ℥℥. Scorix ferri præp. farin. hord. ℥ii. ol. mastich. Myrtill. an. q. f. ad impinguandum. F. Emplastrum cum modica aceto in bona forma, & superpone ab osse Xyphoeide supra totum ventrem, usque ad os pectinis, removeatur quandoque ne pendere nimis gravet.

In hoc quidem stringentia atque ligantia sunt; quia tamen multis hepaticis & roborantibus temperata non formidanda in actu ipso comperi.

Addam hoc paratu facilè & verè εὐτόπρον, quod in fluxu pernici vidi profuisse. Incoquantur flores roris maris leviter acri aceto, expressi ventri calentes imponuntur. Addam & alia comperita.

Omni fluxum observavi à matronis Neapolitanis, tam Diarrhœam & henteriam, quàm dysenteriam, fluxumque hepaticum curari.

Destillabant poma granata acida nec dum satis matura, aquæ extillatæ propinabant ℥ii. vel ℥iii. quibus ad manus non fuit extillata aqua, decoquebam poma; decoctumque exhibebant, haud dissimili effectu. Memini fuisse mulierem, quæ cum 6. menses fluxu hepatico colluctata esset, nec posset curari; quodam consulente, ut manè ℥i. pulveris mediæ corticis fraxini cum tantillo malvatici sumeret; quod cum tertium fecisset, fluxum restitisse. Addam & hoc quod sæpe numero plebeis præscribo, qui ferè ut hic homines sunt, ab iis medicamentis quæ à pharmacopola porriguntur abhorreere solent; quod compertum est contra fluxum ventris diuturnum.

Accipio furturem pinguem depluma-

tam, abluo leviter, exinteratam infarcio ocræ novæ ℥i. percoquo in aquæ q. f. eam edendam porrigo, jusque bibendum: atque exossedendum, comperi istud verum & salutare in quodam Lucense Peraccino qui diu gravissima Diarrhœa laborabat, atque ab eo tempore subinde utor. Ego delector id genus Euporistis, atque diligenter ea observata adnotare soleo. *Rinerus Solenander, Consil. 9. sect. 4.*

## SECTIO QUINTA.

### *Pro Digitorum in manibus contractione.*

**P**ost diuturnum colicum morbum, & resolutiones contractionesque secutas in manibus & pedibus in Nobili quodam Sene, remanserunt in utraque manu contracti digiti, inter nodis duobus exterioribus adeo astrictis, ut incurvati in volam manus digiti nulla vi extendi amplius possent. Multis rursus remediis, & thermis, nihil profecit; durante & jam per biennium perseverante malo, meo tandem utens consilio; hoc pacto curationem inchoavi, purgato prius decenter corpore per triiduum vino cathartico nervis simul accommodato, dextræ manu sequens Emplastrum applicui.

℞. Gummi ammoniac. ℥ii. galban. opoponac. bdell. an. ℥i. dissolv. in aq. vitæ; adde styrac calamit. ℥℥. axung. anser. medull. cruris vituli an. ℥i. thuris ℥ii. rad. Ireos ℥i. hermodact. ℥i. loric. & resinæ communis an. q. f. F. Emplastrum super alatum extend. & manus interiori sedi universæ applicetur, & in plicaturam astrictorum digitorum imprimatur. Fuit Emplastrum scissum in partes tot, quot digiti erant, chirothecæ instar, singulis digitis petiis obvolutis, ut exactè illis jungeretur Pöstea pittacium ex panno duplicato formatum, firmiter impressum, & asserculum panno involutum transversim collocatum, & omnia fascia probè coercita sic, ut Emplastrum undique se digitis incurvatis accommodaret, eosque non nihil extrorsum premeret, totam noctem sic collocatam retinuit, aliquotque noctibus continuavit manè verò hisce impedimentis remotis, singulis digitis plumbeam



massulam chorda plana appensam, quæ illos sensim extenderet, gestavit, suffitu insuper manè usus est ex trochiscis sequentibus carbonibus ignitis impositis, parato.

℥. Marcaf. ℥i℥. myrrh. mastich. an. ℥i. Storac. benjoin. an. ℥i. rad. Ircos ℥℥. cum laricea F. trochisc. hisce vix dum octiduo usus est, cum digitos, premendo tamen eos, extendere posset. Emplastrum rursus sinistræ quoque manui, tribus noctibus tantum apponens, eos etiam digitos jam cedere non nihil sensit, quibus ad me scriptis, jussi ut articulorum roboris causa, bis autem manum decocto Salviæ in lixivio, in quo Chalybs extinctus esset, foveret, usuque horum pergeret: & ut utramque manum digitosque ante Emplastri appositionem hoc unguento illiniret.

℥. Ol. Lumbric. Lilior. an. ℥i℥. ol. cheir. rin. irin. an. ℥℥. Lithargyr. ℥i. coq. parum. adde gummi ammoniac. in aq. vitæ solut. ℥i. Styrac. ℥ij. laric. ℥℥. ceræ, q. s. F. unguentum. Interea licet omnia in melius tenderent spesque esset integræ restitutionis, nolens amplius apud nos subsistere, thermas adiit Piperinas. Sed irritò conatu, nam earum usu, digiti amplius astringi potiusquam relaxari cœperunt. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 147.*

## SECTIO VI.

### Pro Dorsi dolore.

**S**Eptuagenarius quidam cum longo morbo attenuatus & debilitatus, immensos dorsi dolores jam diu sentiret; nec quicquam proficerent medicamenta, obiter eum invisens, hoc consilium dedi, ut dorsum hoc balsamo (sic enim vocare soleo quod balsameon aliàs dicitur) manè & vesperi illiniret.

℥. Aq. vitæ rec. extill. ℥i℥. aq. vitæ comp. ℥℥. ol. spic. gr. iij. hoc remedio per triiduum cum esset usus, ita profuit, ut dolor omnis evanesceret, & integrè convalesceret; itaque illud multis laudibus extollere non desit, mihi que ut annotarem occasionem dedit. *Felix Platerus, observat. lib. 2. pag. 515.*

## SECTIO VII.

### Pro Dracunculis puerorum.

**H**Oc unum remedium experiri libuit mulierculis Polonis valde usitatum: quod mihi profectò miraculi loco est, idque eo magis, quod nulla ejus rei causam investigando reperire possum: iniiciebatur in labrum aquæ calidæ, in quo pueri lavabant, panis in micas friati manipulus, cineris item parum: elotis pueris, aqua percolata, panis ille in massam compingebatur: quæ in diversas partes manibus distracta, magnam subtilissimorum pilorum vim oculis offerebat primo die; subsequenter autem diebus pauciores pili, postquam convalescerunt, prorsus nulli apparuerunt, hos illæ caninos, aliæ vermium pilos vocant, & morbi causam ad hos referunt. Præterea humeros & brachiola in unum farina aceto permixta (*Sennertus* linimentum pro harum partium frictione ex farina triticea & melle conficit) vix peracta unctione, & abluta statim eminebant ex cute tubercula quædam pusilla instar seminis, Papaveris coloris cinericei (quæ ab illis vermium capitula esse dicuntur) ea statim cultello seu novacula abradebantur, nisi id ocyus fieret; recondabantur iterum, & intra cutem se recipiebant. Hi quoque sive vermiculi, sive alio quovis nomine vocentur, primò multi sese proferebant, postea pauciores, postrema unctione prorsus nulli; Cum in vestris medicis quærerem, altum ubique silentium reperi. In uno inveni dracunculo sad *Arabibus* vocari. *Andreas Dudithius, epist. 12. lib. 13. consil. & epist. Cratonis, &c.*

Qui hoc morbo laborant infantes contabescunt ferè, & licet satis comedant, & alias bene valeant, non nutriuntur, & pruritus molestissimus in dorso percipiunt. Generantur hi vermes in dorso præcipuè, & in brachiis nonnunquam & in aliis partibus externis ex materia viscosa subter cutem conclusa, & ob prohibitam transpirationem in hoc vermium genus transmutata. *Sennertus, practic. lib. 2. part. 2. cap. 24.*

Commemorat in *Saxonie* historia *Albertus Crantzius*, *Henricum* quintum Imper-



peratorem morbo illo quem dracunculos appellant, ipsique congenitus fuerat, extinctum esse Anno 1125. *Ioh. Wierius, lib. 2. observ. cap. 1. De Varenis.*

*Æthiops* maris præfecti servus, juvenis 18. annorum, cum primum ex *Memphi Egypti* celebri civitate *Tbessalonice* advenisset, illicò de cruris dolore conquestus est; in quo juxta talum primò ulcus excitatum est, in quo venæ caput conspiciabatur: quod advertentes *Turca* morbum cognoverunt, periculosumq; esse in *Ægypto* & *India*, ac reliquis regionibus quibus innasceitur, significarunt; quem *Arabes*, præcipua *Avicenna* venam medenam appellari tradi, *Galenus* verò dracunculum. Pro cujus curatione accersitus Medicus Linguae *Arabicae* doctus ita orsus est: Primò debità victus ratione proposita, partem extremam venæ, aut verius nervosæ cujusdam substantiæ, subtili ligno alligavit, quam paulatim ligno trahebat rotabatve, adeò ut ad ultimam ejus partem, hoc est, ad trium cubitorum longitudinem, post multos dies pervenerit. Unde *Æthiops* à doloribus, & angustiis morboque ipso liberatus est nullo supraposito cataplasmate. Vena, an nervus, vel lumbricus, morbus hic fit, in dubium vertunt authores. Ego verò oculatus testis, multis auritis verior, testor morbum hunc tanquam lumbricum conspici album, subtilem, lineæ contortæ modo, qui ex se foras prodit, & pars extra missa cum arefcit, eum nervum exsiccatum quivis dicet: qui si abrumpi contingat, intensos excitat dolores, & non leves inducit animi angustias. Evenit autem hic morbus, fortè ut in renibus pili, à materia crassa & lenta, quam calor plus justo calfecit & exsiccavit unde medicamentis atram bilem respicientibus & purgantibus curari debet, prout imperat *Avicenna*. *Amatus Lusitanus cur. 64. cent. 7.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Dysenteria.

**C**Ruentarum deiectionum apud *Galenum* quatuor statuuntur differentia, una est, quum sanguis purus & affatim, propter membrum aliquo abscissum

aut sanguinis intermixtam consuetam evacuationem aut aliam similem causam per alvum excernitur: alia cum liquor aquosus loturæ carnis recens maceratè prorsus similis, in fluxu hepatico, dicto, dejicitur. Tertia verò est nigri & splendentis sanguinis excretio & melancholia appellatur. Quarta demum est Dysenteria, quæ ἐκχυσις ἐστὶ τῶν ἐντέρων; in hoc fluxu intestina primario affici satis indicant torsiones ventris ac tormina nimium molesta. Definiri potest, quod sit alvi frequens, cruenta & purulenta, cum dolore ventris, & intestinorum exulceratione, à materia acriterodente & intestinis peculiariter adversa, dejecto. Pro causa proxima agnoscit humores quosunque acres peculiarem & occultam dispositionem obtinentes, qua intestinis duntaxat infesti sunt, eaque exulcerant; non secus ac pulmo marinus pulmoni, & Cantharides vesicæ sunt infestæ, easque non verò alias partes exulcerant. Causæ remotæ sunt cibi pravi & insoliti, fructus autumnales, uvarum esus, multi potus, venenata & violenta pharmaca, aquæ per plumbeos & vitres canales fluentes, aer vernus, post hyemem siccam & aquiloniam, pulvisiosus & australis calidus etiam & siccus, plerumque enim in fine æstatis & autumnii initio morbus hic excitatur, & in regionibus calidis potissimum viget, contagium denique non raro suas agit partes in hujus affectus productione. Pars affecta sunt intestina nunc tenuia, nunc crassa, nunc utraque. Si in tenuibus malum consistat sequentibus signis ut plurimum se prodit; tormina secessum longe præcedunt, dolor acutior, est, ac circa & supra umbilicum se ostendit, alvinæ faeces & sanguis plurimum confunduntur, quia diu simul iter agunt. Cum afficiuntur crassa, non tantus urget dolor, & inferius subsistit, quin etiam statim à torminibus excernuntur excrementa quibus insuper potius supernatat cruor, quam illis intimè permiscetur.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Dysenteria in tenuibus intestini.

**C**urationem instituimus auxillis illis quæ per os assumuntur, ita jubente *Gal.*



*Galenolib. 6. De locis aff.* Ideo huic agro dedi primò rhab. opt. ℥i. infusi cum ℥iij. decoct. hord. non excortic. syrup. da ribes ℥ß. M. Postea imperavi, ut bis aut ter in die ex istis Syrupis caperet cochl. j.

℥. Syrup. cotoneor. myrtin. de rosis siccis, de succo portulac. an. ℥i. deinde ad majorem restrictionem, dedi hunc pulverem.

℥. Myrobal. citrin. ℥j. rhei parum torrefact. ℥j. dabam cum syrup. cotoneor. Me mini me hoc pulverem quondam viro cuidam dysenterico dedisse, cum cyatho uno cerevisiæ communis, & ad miraculum eo curatus fuit, semper ante cibum sumebat ℥ij. vel ℥iij. diacidon sine speciebus, victu demum constringente utens præter opinionem convaluit. *Petrus Forestus, observ. 33. lib. 22. De diversis generibus profluviorum alvi.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Dysenteria.

**H**oc detergens Enema & simul dolorem mitigans injectum fuit.

℥. Decoct. hord. aliquantulum torrefact. ℥iij. dissolv. sacchar. rubr. ℥iij. ol. ros. omp. hac. ℥iij. adip. renum capræ, ℥ij. ovi vitellum F. Clyster lavans & dolorem mitigans, ter copiosè indè alvum expurgavit, & tormina magna ex parte sedata sunt. Ideo & sequens injeci Enema, quod & dolorem sedaret, & simul constringeret, & intestinalia roboraret.

℥. Lactis vaccinis in quo lapides igniti sæpius extincti essent ℥vi. succi plantag. ℥iv. ol. rosac. omp. hac. ℥ij. vitellum unius ovi. F. Clyster, frigide injiciebatur. Hoc præceptor meus *Benedictus Faventinus* utebatur, quo quidem secundo clystere tormina cesserunt, juvenis hic statim à principio magno cum meo honore convaluit, optima victus ratione præscripta. *Petrus Forestus, observ. 31. lib. 22.*

Mercator quidam *Delphis* habitans temperatura biliosa triginta annos natus, per longam peregrinationem, multosque perpestos labores, ex *Gallia* reversus, & nunc paulò tranquillior, uxorem duxisset, & delicate magis viveret in fluxum diuturnum ventris incidit, mox in dysen-

teriam lapsus; per sex integro menses, cum miscerè vitam duxisset, doloribus ac torminibus sub umbilico pene extinctus est verum cum hic experimenta multorum, ac muliercularum frustra, ac diu, multumque tentasset, tandem nostram opem exposulavit, omni spe destitutus, qui equidem cum hæc subsequētia remedia eidem per me fuissent præscripta, præter omnium opinionem sanitatem consecutus est. Omnium primò injectum est hoc Enema.

℥. Decoct. hord. parum torrefact. ℥iij. ol. rosac. ℥iij. sacch. rubr. ℥iij. vitellum unius ovi. M. Materia eo clystere ut cunque deterfa, dolor quoque nonnihil mitigatus est. Mox altero die sequens Enema infusum, recipiens lactis bubuli chalybeati. ℥iij. sacch. rub. ℥iij. 2. vitella ovorum. Deinde & tertium, ita.

℥. Decoct. hord. torrefact. ℥iij. ol. ros. cotoneor. an. ℥iij. ovorum vitellos num. 2. sacch. rub. ℥iij. M. Ista tormina cessarunt, & facta est excrementorum mutatio in meliorem statum: injectis demum clystribus his acres materias eluentibus, per superiora hæc propinavimus; & primò abstersorium hoc medicamentum.

℥. Decoct. hord. communis, ℥vi. syrup. ex infus. rosar. ℥iij. M. conficiebatur ex rosis omphacinis non valde apertis, affusis septies vel pluries, atque abjectis, ut ego parare soleo; in eo enim inest vis doloris sedandi mira & etiam oblinendi.

Purgavimus autem hoc modo.

℥. Fol. plantag. Mj. flor. ros. rub. ℥j. myrobal. citrin. ℥iij. myrobal. chebul. indor. an. ℥iij. schenanth. ℥j. bulliant in aqua, in colat. ℥iij. adde rhab. el. ℥iij. syrup. infus. ros. & cotoneor. an. ℥ß. M. F. potio. quinquies eduxit. Deinde & hoc præscriptum est.

℥. Hord. commun. p. j. sem. plantag. flor. ros. rub. an. ℥j. bulliant in aqua, in colat. ℥iij. dissolv. syrup. cotoneor. & infus. ros. an. ℥ß. M. Postea dedi ℥iij. rhab. parum tost. cum decoct. plantag. & flor. ros. Deinde & ea quæ magis constringerent.

℥. Sem. plantag. exsicc. & pulv. ℥j. trochisc. de carabe, de spodio an. ℥ß. C. C. usti ℥iij. corall. rubr. ℥ß. pulveriscentur  
su-



subtilissime & dividantur in tres partes & detur una dosis, cum vino rubro, altera cum decoct. sem. plantag. flor. ros. & centinod. tertia cum decocto vini rubei in quo bullierint rosæ, sem. plantag. & centinodium. Hoc etiam condito ufusest.

24. Conserv. ros. vet. ʒvi. diacydon. sine speciebus ʒß. troch. de spodio, ʒiv. syrup. cotoneor. rob. de ribes, syrup. myrtin, an. ʒß. M. Insuper victu convenienti utens probè convaluit à Dysenteria deplorata. Unicè etiam prodest, vinum decoctionis Gnaphalii, tam potum quàm loco fomenti adhib. tum, & nihil præstantius quam ʒj. coaguli leporis pota ex sapa: & stercus canum sola ossa vorantium, cum lacte chalybeato ut sæpius expertum est. *Petrus Forestus, observ. 33. lib. 22.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Dysenteria.*

**N**Os scilicet cum successu per multos annos ipsum rhabarb. tostum in principio morbi tam evacuationis gratia, quam corroborationis, per vices aliquot exhibuimus hoc modo.

24. Decoct. hord. tost. ʒiv. rhei tost. & pulver. ʒiv. Syrup. rosat. solut. acetos. citri. an. ʒß. M. F. haustus; qui reteretur per biduum. Cum ad consolidationem ulceris (post sufficientem ejusdem abstersionem) accedendum esse putavimus; aliquoties pulverem emplasticum ex cera alba cum æquali parte gummi Arabici tenuiter incisa & pulverisata in pomo affaro solutum quantitate ʒj. exhibuimus magno cum successu.

Si vero neque sic fluxus sanguinis sistatur, sequens narcoticum per os exhibeatur.

24. Conf. ros. antiq. ʒij. laudan. opiat. gr. iij. Conf. alkerim. ʒß. Syrup. papav. errat. q. s. F. Electuarium molle, hoc modo in nostro ægrotante conciliata quiete, rariores exinde dejectiones & somnus interveniens effectum medicamenti comprobabant; victum instituvimus convenientem, ut sunt juscula gallinarum cum ossibus minutissime incisarum, & contusarum, additis succis citri, berberorum & similibus,

oriza cum lacte chalybeato, cydonia, pyra magis assata quàm cocta *Gregorius Horstius, observat. 19. & 20. lib. 4. De morbis infimi ventris.*

24. Rhab. ʒiß. pistetur & maceretur in aq. plantan. ʒiii. per aliquot horas, tandem facta celatura & levi expressione, rhei prædicti substantia aliis ʒiii. aq. plantag. denuo infundatur, quibus pulp. cassiæ noviter extractæ, ʒß. dissol. vito & pharmacum parato, ac ægrotanti propinato, quo multa egressit. Cæterum prima infusione rhab. si quas partes exasperantes, & ulceribus adversas habet, omnino amittit, & mitius ac securius redditur, quàm testa ustum aut assatum, ut multi dare solent. *Amatus Lusitanus, Cent. 2. curat. 44.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Dysenteria.*

**C**lysterem hunc abstersivum & lenientem imperavi.

24. Lactis chalybeat. lb. i. dissolv. vitello. ov. num. 2. mell. rosat. ʒiß. latic. dissolut. in his duobus ʒii. F. clyster quo non diu retento, sed rejecto, potionem postea hanc bibit.

24. Syrup. de ros. rub. siccis ʒi. syrup. de papav. ʒß. aq. plantag. ʒi. M. cum adhuc non cessarent sedes, & sitiret admodum, prostratusque esset, amylo cocto refectus fuit & lacte amygd. d. quod cum aqua chalybeata parabatur, addito sacch. ros. rab. clyster astringens dein tali injectus fuit, & sub vesperam repetitus.

24. Hord. orizæ an. p. i. F. decoctio in lacte pro duobus clysteribus, dissolve in uno vitell. ovor. numero 2. sacch. rub. axung. hædi, an. ʒi. laticæ ʒi. F. clyster. Pulverem hunc quoque duabus vicibus sumpsit, cum lacte amygdalarum d. paulò antequam clysterem admitteret.

24. Troch. de carabe ʒi. rad. tormen. till. ʒß. sacch. ros. tab. ʒii. M. venter hoc unguento inunctus fuit.

24. Ol. myrtill. ʒi. mastich. ʒi. bol. rub. ʒi. ros. santal. an. ʒi. ceræ, q. l. fiat unguentum.



Clyster astringens deintalis injectus fuit.

24. Rad. bistort. totmentill. an. ʒi. consolid. maj. ʒii. equiseti, plantag. agrimon. an. Mi. flor. ros. rub. p. ii. hord. mund. orizæ, an. p. i. semin. anis. ʒiʒ. semin. acetos. ʒii. sem. plantag. ʒi. F. decoctio in sero lactis, dissolv. sacch. rub. ʒiʒ. mell. rosat. ʒiii. mucilag. sem. cydon. ʒiʒ. sem. psillii. ʒi. M. F. clyster. sub noctem alius fuit injectus.

24. Orizæ parum torrefact. p. i. gallar. conquassat. ʒʒ. balauft. ʒi. ros. rub. p. i. sem. plantag. ʒii. rad. bistort. ʒiʒ. rad. consolid. maj. ʒii. F. decoctio, in aqua chalybeata, in colatura lb. r. dissolv. succi plantag. ʒiii. lap. hæmatit. ʒii. sang. dracon. ʒi. axung. hædin. mell. ros. an. ʒi. F. clyster. eo rejecto, tab. meas narcoticas sumpsit; & noctem quietiorem habuit. Cras ante prandium idem clyster injectus fuit: postea usus est hoc suffitu.

24. Rad. thapsi barbati, bistort. an. ʒii. gallarum ʒi. plantag. Mi. ros. rub. flor. chamam. an. p. i. coq. in aqua fabrorum extinct. ferri pro suffitu. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pagin. 893.*

Qui navigant in *Indiam* Orientalem ex usu putridarum carniuni incidunt interdum in Dysenteriam, quibus præsentaneum est remedium, allium cum saccharo & succo citriorum: ut & placentulæ in sartagine coctæ ex ovis gallinaceis & argentina. 10. & *Otho Heurnius, ad cap. 10. lib. 6. patholog. Joh. Fernelii.*

In Dysenteria potus exiguus semper esse debet, quod remedium edocta aliqua bruta, ubi alvi fluxu tentantur, sibi ipsis ex toto potum naturali quodam instinctu interdiciunt. *Hier. Mercurialis. consult. 90. tom. 2.*

Sequens pulvis probatus est ad omnem speciem dysenterię.

24. Turtur. cum pennis suis, interiora extrahantur, & impleantur venter mixtura ex bolo Armena, sang. drac. mumia, aceto forti & vitellis ovor. confecta. In olla nova ponatur, & in furno panis comburatur. De hoc pulvere des quotidie cum succo plantag. vel aq. ros. vel aliquo syrup. astringente. Probaturum est. *Arnoldus Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 37.*

Quum puer quidam nobilis torminibus

a dysenteria vexaretur, jussimus hircos mactare, ac eorum omentum ita recens calidum supra pueri ventrem extensum admove, & fascia fasciari; idque bis & ter iterari mandavimus: quo remedio à doloribus puer libes brevi evasit. Topicum hoc remedium securum & optimum à vervecibus & aliis animantibus non minus quàm ab hircis accipi poterit. *Amatus Lusitanus, curat. 93. cent. 5. Vid. cur. 2. cent. 6.*

Quidam dysenteria laborabat febreque carebat. Inter alia jubeo pullo columbino asso, sed cera infarcto, vescatur. Adhæc pomum cotoneum excavatum cera quoque repletum, & ad ignem ex assatum, jejuno stomacho comedat, nihilque supra bibat, suadeo: iis enim non sæpe iteratis convaleuit. Ceram dysentericis convenire tradit *Dioscorides lib. 2. sui Medici operis, cap. de Cera*, ad hunc modum dicens, cera datur in sorbitionibus dysentericis. Cui suffragatur *Galenus*, & cæteri post eum Medici. Cæterum nonnulli ceræ mastichem adjungunt. *Amatus Lusitan. cur. 14. cent. 6.*

Ad virum quendam, qui dysenteriam diuturnam 30. dierum ingenti cum febre patiebatur, & post multa & varia adhibita remedia, imbecillis & gracilis est factus, perseverante etiam fluxu ventris, multo cum sanguine, Medicus cordatus ingressus est, & sanguinem ex basilica brachii dextri extraxit; sed quanto juvamento audite. Illico (mirum dictum) sanguis cohibitus fuit, perseverante adhuc fluxu ventris. Cæterum saccharo rosaceo ad aliquot dies ingesto, & nonnullis injectis clysteribus, & topicis constringentibus remediis applicitis, alvus in totum restricta est. Advertant igitur Medici, qui, ob unum *Galeni* verbum non satis fortè intellectum, in dysenteria sanguinis extractionem formidant. *Amatus Lusitanus, cur. 15. cent. 7.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Dysenteria in gravida.

**N**obilis quadam mulier gravida in Dysenteriam incidit, consilium sequens dedi.

I ac amygdalinum cum aqua cocta chalybeata paratum, loco vini bibat orizam co-



Etiam cum jure gallinæ frequenter comedat, & pulcem (*Cadle*) cum vino rubro in quo aurum extinctum sit, ovis & saccharo coctam.

Electuarium hoc manè & vesperi sumat, quantitate nucis mosch.

℞. Pulv. rad. tormentill. ℥ii. sem. lapath. ℥i. corall. ℥ss. Conserv. ros. & carn. cydon. an. ℥ss. cum syrup. cydon. F. Electuarium.

Julepi hujus coch. v. superbibebat; atque circa meridiem totidem sumat.

℞. Syrup. cydon. ℥i. syrup. fragor. ceras. acid. de papav. (ad sensum intestinorum nonnihil obtundendum) an. ℥ss. aq. ros. & plantag. an. ℥ii. M. F. Julep.

Inungat ventris regionem oleo absinth. mastichino & cydon. pedes abluat vino rubro stiptico, sic restituta fuit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. p. 861.*

Prægnans mulier quum gestationis novum mensem ingrederetur, dysenteria lethali corripitur, quæ nullis presidiis domabatur, at cum pareret, illico dysenteria restricta est, & illa paulatim sanitatem consecuta fuit. Dysenteria ante partum salubris ab *Hippocrate*, judicatur quod verum esse historia nostra testatur: ita enim *Hippocrates lib. De morb. popul.* quinto memoriæ commendavit. *Epicharmi* uxori ante partum dysenteria, dolor, alviægestiones suberuentæ mucosæ aderant, ubi peperisset, statim sana erat, diversiones fortè ratione. *Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 51.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Dysenteria.

**N**E detur potus chalybeatus ut fieri solet, non enim is astringit, ut falsò existimant Medici, sed turbat alvum.

Ante septimum diem priusquam ulcera intestinorum probè extergantur, astringentia per os non conveniunt, nec foris etiam applicanda sunt. In morbi enim initio talia vel in mortem vel graviores morbos præcipitare multis exemplis potest ostendi.

Tutus est usus pulv. tragacanthi in ovo rpmili cum pulv. corall. & nuc. mosch. hoc odo.

℞. Pulv. tragacanth. ℥i. nuc. mosch. corall. an. ℥ss. M. F. pulvis. Foris admoventur multa, ut Empiast. de crusta panis, diaphænic. & similia. Ad opiata non nisi in summa necessitate deveniendum, prius tamen quàm manifestus sit virum lapsus. *Joh. Crato consil. 22. lib. 5.*

Aqua chalybeata in dysenteria ab omnibus ferè qui in medicina claruerunt, præter *Iohanem Cratonem* laudatur. Cujus quoque sententiæ favere videtur *Felix Platerus* in epistola quadam ad me scripta. Ego ut ingenuè fatear, doctrinam & praxin præceptorem meorum imitans, per multos annos aquam chalybeatam dysentericis quoque præscripsi; tandem verò cum ea quæ *Crato* hac de re observavit, mihi innotuissent, ac proinde loco aquæ chalybeatæ agris lac amygdalarum aut decoctum aliquod conveniens exhibuissem, omnia profectò longè feliciùs mihi successerunt: ita quidem ut observationem *Cratonis* verissimam esse re ipsa expertus sim.

Hoc decoctum pro potu propino.

℞. Agrimon. Mi. veronic. Mss. rad. bistor. & ras. C. C. an. ℥ss. coq. in lb. x. aq. font. donec tertia pars sit absumpta, idque fortissimo igne & in vase aperto, herbæ & radices sint exsiccatae, recentes enim decoctum reddunt ingratum.

Lumbricos terrestres lotos & concisos, cumque carne castratorum coctos, si agro corundem juscula exhibita fuerint, mirum in modum dysentericis prodesse sæpius expertus sum. Dolores enim leniunt, & quæ in intestinis sunt ulcera aut vulnera facultate quadam specifica consolidant, quod & clarissimus *D. VVierus*, libro *De Scorbuto* testatur. Sed quia urinas simul insigniter movet, non nisi prius expurgato corpore hujusmodi juscula exhibenda sunt: & quidam paulò ante pastum: diuretica enim reliquis cibis minimè sunt permiscenda. Lac etiam mulieb. & summo perè convenit. *Guil. Fabrit. Hildanus, lib. De Dysenteria, cap. 7.*

Ego sanctè affirmare possum confectione Alkermes nihil præstantius me unquam reperisse etiam in ipsis infantulis dysenteria laborantibus. Non ergo ob lapidem Lazuli qui debita dosi purgat rejicienda videtur, cum in exigua illa quantitate qua



qua exhiberi solet, impossibile prorsus est, ut alvum moveat. Singulæ enim dragmæ confectionis, duo duntaxat grana cum dimidio lapidis Lazuli in se continent. Certè hanc confectionem omnibus aliis cordialibus præferendam esse, experientia semper fidem mihi fecit. *Guil. Fabrit. Hildanus, observ. 23. cent. 6.*

Ad dolorem sedandum, in dysenteria sæpius utor oleo amygd. d. cui tantum sacchari miscelanei admisceo, quo formam electi. acquirat. De hoc Electuario æger singulis ferè momentis aliquantulum sumat. Si aliquid olei rec. ex vitell. ovorum admisceas, præstantissimum habebis medicamentum, non solum ad dolores sedandos, verum etiam ad excoriationem & ulcera intestinorum curanda, *Guil. Fabrit. Hildanus. lib. de Dysenteria, cap. 9.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Dysenteria.

**M**ulier medica quædam annosa (sunt enim authore *Galeno, lib. 5. De locis aff. cap. 5.* & mulieres medicæ quædam) mirabile consulvit remedium.

Iussit pomum integrum (cotoneum magis laudarem ob vim adstrictoriam) excavari, implerique cavitatem cera alba vel citrina selectissima, & indito operculo prunis admoveri pomum donec omnifariam liquefieret cera & pomi substantiæ intermiseretur, tumque pomum sic paratum estitare agrum jubebat ante omnem cibum, & profecto optimè contulit, nam cum clam me dies aliquot hoc esset usus remedio, mihi postea rem omnem detexisset, & equidnam mihi de tali adhibito remedio videretur, rogasset, ingenuè quidem respondi, non malum mihi omnino auxilium videri, cum virtutem habeat emplasticam, qua agglutinare ulcera intestinorum posset; quin & dysentericis opitulari ex *Dioscoride* affirmavi: nec me propterea remedium improbare velle, quod esset à muliercula excogitatum, cum & *Gal.* ipse veritus minime sit, nec dedecori sibi fore putavit à plebeio homine inventam fumarie herbæ vim, ad stomachum roborandum & ventrem lubricandum in monumenta

sua referre, & tanquam exploratum probare, ut *lib. 7. De simpl. facultat. cap. De Fumaria, Franciscus Valeriola, observ. 4. lib. 3.*

Illico præscribe julapia ex aq. cichor. cum emulsione sem. cichor. & endiv. misce tyrop. deribes, & alternis diebus propina rhei & myrobalan. an. ʒʒ. cum syrup. de ribes. *Ioan. Heurnius. ad aphor. Hippocrat. 23. sect. 7.*

Principem vidi quæ querula fuerat ante de splene: in febre dejecit alvo cruentam atram materiam copiose bis aut ter; trepidabat illa ad conspectum excrementi; verum in bonam spem eam erigebam, evasit, non erat hæc dysenteria ab atra bile, nec diuturna, nec illa quæ est cum ulcere intestinorum, sed cruenta, quæ illico placatur, nam splenem evacuat. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 48. sect. 6.*

Optimum remedium est infusum rhabbarum in decocto ros. sicc. rad. plantag. & mirobal. ex aqua endiv. cum paucò cinnamomo, expressio fiat valida, præbeatur cum syrup. de ribes vel de ros. siccis. Sumatur bis in septimana. Intermediis diebus lac à vacca calens datur ter in die cum saccharo rosato. Dolor si urget, lac clysmo infundatur cum butyro rec. & vitello ovi, Coquatur in lacte taphus barbatus & rosæ, tandem ut stringas, lactis dimidium excoque. Bibat ter in die. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 3. sect. 6.*

Quendam vidi, quem Dysenteria longissima ad tabem tantam deduxerat, ut ei lac sugendum muliebri Medici præscripserint Sed miraculo quasi curatus optime & breviter fuit, usu aque pro potu ordinario, in qua suber bullierat: usus est etiam utiliter syrupo corallorum, & conserva Cynor. rhod. Sed aqua suberata præcipuum ejus curæ fuit instrumentum. *Petrus Borrellus, observ. 57. cent. 1.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Dysenteria venenosa.

**N**obilis quidam *Lusitanus* devoratis tribus pyris ab amasia porrectis, in fluxum incidit ventris diuturnum, cum diris symptomatis. Plurima ex abstergentium pri-



primò, deinde adstringentium sylva medicamina parantur, extra adnota, intus assumpta, & per sedem infusa, sed frustra: cum tandem de veneno suspicio esset, propinantur cardiaca & alexipharmaca, at malum solum smaragdo trita, & conservæ cydon obvoluta conquievit. Hanc alternis diebus jejuno ventriculo assumebat, superbibita aqua, in qua tragacanthum prius erat incoctum, smaragdi, quantitas erat pondus duodecim granorum, quam quum quinquies devorasset à fluxu immunis evasit. *Zacutus Lusitanus, observ. 91. lib. 3. prax. admirand.*

## SUBSECTIO NONA.

*Pro Dysenteria.*

**P**uerulus quidam bimulus Dysenteria contumaci laborabat: post multa alia remedia frustra usurpata, exhibui extract. Corallorum ℞. cum aq. plantag. & eodem die fluxus cohibitus est. *Lazarus Riverius, observ. 66. cent. 1.*

Adolescens quidam 20. annorum laboravit Dysenteria per 12. dies, quam nullo remedio oppugnare conatus est, donec ad Xenodochium deductus, sumsit ex præscripto medici Xenodochii Salis vitrioli ℥i. in aqua dissolutam, multa evomuit biliosa & pituitosa; sicque facta est revulsio humoris ad intestina defluentis, & hoc solo remedio curatus est. *Lazarus Riverius, observ. 9. cent. 3.*

Alvum coactam vomitio solvit, & plus æquo fluidam sistit: illam quidem humectando, hanc vero siccando. *Hippocr. Libro de dieta.*

Uxor mea mense Augusti incidit in gravem Dysenteriam, ab assumpto pridie pharmacæ leviori. Circa horam somni exhibeo laudani gr. ii. cum conserv. ros. Postridie hora secunda pomeridiana, cum perseveraret affectus, exhibeo ejusdem laudani gr. ii. continuavit alvi fluxus sine sanguinea dejectione, qui per 5. vel 6. dies perseveravit, ac tandem medicamento ex infus. rhab. & mirobal. cum rheo pulv. & syrup. ros. omnino sublatus est. *Lazarus Riverius, observ. 84. cent. 2.*

Puer quidam 8. annos natus Dysenteria

*Burnet Parte I.*

tenebatur, cum multo sanguine, dejectionibus viridibus & porraceis admixto, & febre continua, tertio morbi die sumpsit infusum rhei ad ℥i. in aq. plantag. cum Santalocitrino, dissolvendo rhei pulv. ℥i. Syrup. rosac. ℥i. optimè purgatus est, multa excrementa rejecit sine sanguine, & febris ferè expers fuit toto illo die. Postridie sanguinem purum rejiciebat, frequens erat dejectio, cum dolore ventris & febre, quæ perseveravit usque ad diem octavum, licet omnia remedia ordinaria, interna & externa adhiberentur, tum etiam Clysteres varii. Septimo die extractum Corall. ter exhibitum fuerat ad ℥i. cum aq. plantag. & Syrup. Cydon. sed frustra. Octavo die cum febris & fluxus ingravescerent, ac merus sanguis excerneretur, circa meridiem secta fuit vena, & sanguis ad ℥v. detractus, nocte omnia eadem, postridie manè exhibui laudan. gr. ii. cum extract. Corall. aq. plantag. & ros. & Syrup. Cydon. alvus omnino suppressa est per 4. horas; & placidè dormivit, sensim tandem convaleuit. *Lazarus Riverius, observ. 37. cent. 2.*

Quidam dysentericus omnia remedia reſpuens, solo usus est Pimpinellæ decocto cum aqua & butyro confecto, cujus Scutellam sumebat manè & serò & intra tri-duum curatus est.

Plurimum valet Pimpinella ad depurandum sanguinem, & levem habet astringendi vim, ideo non est mirum, si dysentericis conferat. *Lazarus Riverius, observ. 83. cent. 3.*

## SUBSECTIO DECIMA.

*Pro Dysenteria.*

**D**omina quædam dysenteria gravi correpta est, mense julio, æstu maxime sæviente, ad eam vocatus tertio die morbi præscribo clysterem detergentem, & venæsectionem, quarto purgata est medicamento ex rhab. ℥i. myrobal. ℥i. infus. in aq. plantag. dissolvendo rhab. pulv. ℥i. Syrup. ros. ℥i. bis deiecit humores excrementitios; sed in reliquis dejectionibus, quæ frequentes erant, mucosum quid sanguine perfusum. Vespere exhibui laudani



## SUBSECTIO XI.

## Pro Dysenteria.

danigr. ii. quibus tormina parum remiserunt, & dejectiones paulò rariores fuere. Quinto tormina eadem, dejectio frequens eaque sanguinea: Clysteres ex lacte, & vitell. ovor. frequenter injiciebantur. Vespere iterum sumpsit laudan. ad. gra. iii. cum conserva ros. & illicò dolores sedati sunt, ac semel tantum in hora deiciebat. Dormivit per intervalla. Sexto die dejectiones iterum frequentiores cum doloribus intensis, rursus secatur vena: & post 3. horas sumpsit decoctum intestinorum vervecis, cum pulveris granorum actes ℥i. dolores omnino sublati sunt, & dejectionum intervalla multo longiora reddita: statim etiam à venæsectione totus venter inungebatur oxyrhodino ex ol. rosac. aceto & aq. ros. parato, quod admovebatur singulis horis ad sedandam intestinorum inflammationem, & hoc remedio multum levabatur. Vespere injectus fuit Clyster ex lacte cum ℥iv. succi plantag. ad eandem intestinorum inflammationem demulcendam, noctu etiam exhibitus fuit julep. ex aqu. plantag. cum ℥i. pulv. gran. actes. Postmodum per triduum sumpsit manè decoctum myrobal. quo integrè curata est, illud decoctum ita compositum fuit.

℥j. Cort. myrobal. chebul. ℥i. citrin. ℥ss. passul. corinth. ℥ii. coq. in aq. ℔ii. ad tertiæ partis consumptionem, in colat. dissolv. Sacchar. ℥i. clarificentur & aromatizentur cinam. ℥ii. capiat in iv. doses manè & sero. *Lazarus Riverius, observ. 2. cent. 3.*

℥j. Juris intestinorum aut capitis castrati ℥viii. Sacch. rub. ℥ii. M. F. Clyster.

℥j. Ossis sepia ust. pulv. ℥ii. Spongiæ pice imbutæ & in ollula ustæ & in cinerem redactæ, cortic. ovor. indurat. pellicula ablata interiore an. ℥ss. margarit. præp. boli armen. an. ℥i. M. F. pulvis, dosis ℥i. in lacte vel chalybeato vel cocto, aut in aqua polygoni, certò vobis polliceor, hunc pulverem recentes omnes dysenterias nisi fluxio admodum urgeat, licet valde cruentas, statim sanare. *Hercules Saxonia. Pract. part. 2. cap. 19.*

**C** Ivis *Haffnienſis* honestus secreto suo aliquot mille dysentericos servasse se gloriabatur, ad præſervationem vinum vel cerevisiam absinthites commendabat, ad curationem præſentis fluxus seu albi seu sanguinei, libram semis calidæ cerevisiæ propinavit adultis ægris, cui summitates absinthii & sal album incoxerant, & nucem moschatam tritam cochleari ultimo superbendam dabat. Infantibus verò pro ratione ætatis cochlearia hujus potus tria 4. vel 6. miscuit applausum à multis meruit hoc secreto. *Thomas Bartholinus. Histor. 65. cent. 2.*

Sæpe contulit pulvisculus stercoris canini per triduum cum ossibus nutriti, cum lacte caprillo haustus. Nos sæpiissime glande ex opio facto & intestinis inserto tormina abstulimus & dysentericum profluvium cohibuimus, & somnum ægroto conciliavimus. Crebro autem glans ex opio podici inferatur; sed ultra quadrantem horæ in intestinis non est dimittendus, sed rursus appenso filo eximendus. *Franciscus Joel. Pract. sect. 3. lib. 4.*

Memini frixis equorum ungulis in butyro, iisdem dein pulveratis, sedatum fuisse frequenter pylori furorem, stetisse dysenterias, atque medelæ benignitatem sensisse, olido illo remedio adhuc intra stomachum detento. Sin autem ungula sit jumentis lascivientis, dysentericis certam perniciem allatura dicitur. *Ioh. Helmontius. Tract. cui titulus. Pylorus rector.*

Linteam in leporis (venando per canum morsum interempti) sanguine tinctum, siccatumque & in vino carptim exhibitum curat dysenteriam: & siccum Erysipelati appositum illud sanat. Milites Germani leporem fumo siccatum præbent in potu, & curatur dysenteria non fallaci eventu. *Ioh. Helmontius Tractat. cui titulus. Potestas Medicaminum.*

An in fluoribus dysentericis assiduus Clysmatum anodynorum usus tutus? nequaquam, & in hoc valde Medici decipiuntur, cum intestina abluendi lacte finem non faciunt; dum enim sic intestina pro-



luuntur & difluuntur, effœminatio & mol-  
lirudo adfertur ipsis intestinis, unde fit  
diœsœm quam *Galenus* *ῥοιπατικὴν* vocat.  
*Guil. Ballonius lib. 1. Ephemerid. & Epid.*

Quidam dysentericos certò curabat fu-  
mogingiberis per anum in sella perforata  
recepto, alius vero prætulit fumum C.  
Cervi. Nobilis *Robertus Boyle, lib. De u-  
tilitate naturalis Philosophiæ, part. 2. sect.*  
*5. cap. 14.*

Cryſtallus in tenuiſſimum pollinem re-  
ductus, ac cum vino propinatus dysente-  
riam curat, ac albos uteri fluxus ſiſtit, flu-  
xum præterea cholericum, vel cœliacum  
citiffimè & à proprietate tanquam Bezoar  
aliquod compescit. *Anſelmus Boetius, lib.*  
*2. De lapid. & gemm. cap. 74.*

Dysentericum quendam ita curavi.  
Glandes quercinas in aceto forti conco-  
quendas jubeo; quarum nidorem, & fumum  
ano per ſedem perforatam excepit. Hinc  
ſedabatur dolor, fluxio ſiſtebatur, & pau-  
cis diebus, integras vires redintegrabat.  
*Martinus Rulandus, obſerv. 40. cent. 7.*

Studioſus quidam in Dyſenteriam incidit  
cui opitulatus ſum his paucis præſidiis, ci-  
bus, quo meo monitu veſcebatur, aut ſic-  
cans erat, aut toſtus, aut aſſatus, aut in  
aqua vel lacte chalybeato decoctus. Potui  
dabatur à me lac amygdal. dulc. ex aq. cha-  
lybeata confectum. Præter hæc ſacculos  
calidiſſ. ex furfuribus in forti aceto coctis  
factos crebrò ano applicari juſſi, & ſic bi-  
dui ſpatio convaluit. *Martinus Rulandus,*  
*curat. 18. cent. 5.*

## SUBSECTIO XII.

### Pro Dysenteria.

**D**ysenteriam ſæpius à ſe curatam no-  
tavit.

*Ioh. Præuotius* in adverſariis ſuis exhibi-  
to 3i. pondere, ex vino aut ovi vitello, pul-  
vere rad. ſilipendulæ, quem ante ipſum ſe-  
creti loco commendaverat *Eudovicus Mer-  
cator. lib. 1. de recto præſidiorum uſu c. 14.*  
eſt ſanè huic plantæ inſignis vis adſtrin-  
gendi. *Georg. Hieron. Velfchius, obſer-  
vat. 44.*

Pro arcano habeo à viro illuſtriſſimo, ar-  
gentinæ folium plantis pedum admotum,

omnes dyſenterias intra 24. horas ſiſtere,  
notavi aeris mutationem mirè ad dyſente-  
tiæ curam conferre.

Vidi enim *D. Solerium* Mercatorem *Ne-  
nauſenſem* dyſenteria ſerè morientem, qui  
curari nunquam potuit, niſi aeris Caſtren-  
ſis, cum ſuo immutatione; poſtquam ſta-  
tim curatus fuit, pinguiſque evaſit, licet  
antea tabe confectus eſſet. *Petrus Borellus,*  
*obſerv. 13. cent. 1.*

Tormina ſedabuntur hauſtu aquæ ver-  
baſcicui parum aq. juniperi admixtum.  
Fiant ſacculi etiam è verbaſco aqua incôcti,  
& ventri dolenti imponantur. *Philippus*  
*Michael. Conſil. 94. lib. 7. Conſil. Crato-  
nis, &c.*

In dyſenteria à proprietate ſpecifica ju-  
vat eſſentia ſeu tinctura Smaragdi, ſit hoc  
modo.

24. Particulas ſeu recrementa Smaragdi,  
tere (non in mortario, niſi ferreo) in pul-  
verem tenuiſſ. ſuper. porphyriò, ſuperfun-  
de urinam puerorum ſimplici deſtillatione  
paratam, & in loco calido tincturam ex-  
trahe, quam toties aſuſo menſtruo recen-  
ti collige, quoties illa in idem mittitur,  
tincturas omnes collectas & filtratas, ab-  
lato per deſtillationem menſtruo, reduc in  
pulverem grifeum, quem de novo cum Spir-  
vini extrahe in ſummam viriditatem, Spi-  
ritu vini denuo ablato ad aliqualem conſi-  
ſtentiam, relinquitur eſſentia vel tinctura  
Smaragdi infundo, cujus gr. ii. iij. iv. ad  
viii. vel x. in aqua plantag. vel tormentillæ  
exhibita omnes dyſenterias miraculoſè ſi-  
ſtunt & ventriculum roborant; eſſentia et-  
iam Croci martis à Crollio deſcripta hic  
plurimum valet. *Ioh. Hartm. Prax. Chi-  
miatr. pag. 192.*

## SECTIO XI.

### De Diſpnœa.

**D**iſſicultatis ſpirandi (quæ *ῥιπνοια* vo-  
catur) apud ſcriptores medicos  
tres gradus reperiuntur interdum non eſt  
vehemens & diſpnœa nominatur, generis  
nomine retento: aliquando vehemens eſt,  
cum ſono & ſtrepitu, & aſthma dicitur, a-  
liquando vehementiſſima eſt, & cum ægri  
nequeunt ſupini decumbere ſed coguntur



Vel erecti vel sedentes manere, & orthopnea appellatur. Eadem est omnium causa, quæ prout augetur vel diminuitur, hunc vel illum producit affectum. Vide supra Sectionem de Asthmate.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Dyspnœa in hydropica.*

**H**Ydropicæ matronæ magna dyspnœa laboranti, & pedibus tumidis exhibui Succum iridis ℥ss. cum Sacchar. ℥ss. & vini hyppocrat. ℥i. vomuitque inde viscosæ tenacissimæque pituitæ matellam semiple-nam, sedesque ternas habuit; meliusque postea spirare & sperare cœpit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 177.*

Dyspnœa vehementi laborabat mulier quædam disposita ad hydropem, quod ex tumore pedum & urina aquea cruda conjiciebam, præscripsi illi vinum sequens.

℥. Rad. iridis ℥i. rad. Enulæ, Scillæ præpar. an. ℥ss. Marrub. Mj. cort. rad. Sambuc. & ebul. an. ℥i. fol. Sen. ℥ss. agar. ℥ii. zinzib. ℥i. conquassentur, & infund. in vini lib. iv. coq. parum in duplici vase; bibit cubitum itura haustum per dies 6. cessavitque dyspnœa, & tumor pedum evanuit pulchreque curata fuit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 178.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Dyspnœa.*

**C**URatio in eo consistit, ut crassa & viscida in pectore contenta incidantur, attenuentur, & educantur, ita tamen ut tenuis catarrhi qui accedit, aliquando habeatur ratio, ad incidendum exhibui oxymel. cum aq. cinamomi, ad eandem intentionem & simul etiam roborare pectus ac maturare crassiorem materia studens, Syrupum è succo cardui, veronicæ & scabio. se, ad tenuem catarrhum Syrupum violaceum cum bolo armena, quæ in morbis pectoralibus mirificè convenit, ad educendam materiam in pectore, eamque attenuandam movendamque etiam alvum, nihil convenientius nostro hoc oxymelte.

℥. Fol. hyssopi, veronic. scabios. mar. rhub. origani puleg. Card. ben. an. Mj. rad. ireos incis. ℥vi. zinzib. ℥ss. agar. albi. ℥ss. infund. in aceti ℥ss. aq. veronic. card. ben. an. ℥ss. stent in vase vitreo obturato loco calido per triduum, deinde lento igne decoq. & exprimantur.

℥. Expressionis ℥ss. mell. opt. ℥ss. coq. iterum lento igne & despumentur usque ad Syrupi formam, ac in vase vitreo conserventur, imponi poterit cinamomum, cariophyllus, calamus aromaticus, pulverisata omnia & in peria linea ligata, ita ut diutius conservetur, & sapor suavior fiat de hoc assumat 2. vel 3. cochlearia paulatim forbendo, ubi vel difficultas spirandi molestior, vel alvus adstrictior fuerit.

In ore autem ratione tenuioris catarrhi teneat istos orbiculos.

℥. Boli armen. orient. præp. ℥ss. cum aqua tussilag. vel viol. addito parum mucilag. tragacanthi F. Orbiculi. *Job. Crato, consil. 8. lib. 4.*

Hoc Emplastrum tanquam efficacissimum raso capiti (ut sine labore rursus avelli queat) applicetur, ita ut illi agglutinatum hæreat, vel si hoc displiceat, interposita tenui syndone proximè illud attingat, dies noctesque gestet, cum opus est, renovando, descriptio hæc est.

℥. Rad. Ireos. galang. cyperi. angelic. an. ℥ii. rad. pyrethr. agar. rhab. rad. Scillæ an. ℥i. Sen. ℥ii. majoran. ℥i. sem. coriandr. bacc. Lauri. cariophyll. nuc. mosch. macer. an. ℥i. sem. nigell. Sinapi. an. ℥ss. benjoin Storac. an. ℥iii. calcanth. albi. ℥ss. lap. calamin. ℥ii. alumin. ℥i. ol. nuc. antiquiss. addendo gutt. aliquot ol. major. & Salvie per distillationem, laricæ resinæ & ceræ q. s. F. Emplastrum. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 176.*

Alium adipe suillo contusum, si plantæ pedum eo inungantur, multum conducit ad pulmonum canales aperiendos & ab infarctu liberandos in dyspnœa vel asthmate. *D. Hulse, referente Job. Raio, Catal. Plantæ Angliæ.*



## SECTIO DECIMA.

## De Dysuria.

**D**ysuria. e. mendi difficultas est, urinæ magno cruciatu & labore excretio; à stranguria affectu cognato differt, quod in stranguria seu urinæ stillicidio vesica non expectat, ut urina tota colligatur; sed statim tanquam mordentem expellit: in Dysuria verò expectat quidem, atque aliquando diutius quàm oporteat, sed cum excernenda est, percipit æger dolorem aut tantam difficultatem, ut sæpe, nisi locum vesicæ comprimat manu, aut diu & magno conatu enitatur, liberè non profluat. Præterea in stranguria nec libera est nec liberalis *ἡ γρηγορία* guttatim enim redditur; in Dysuria autem liberalis est sed non libera, aut si liberalis non est, est libera. Causa ejus vel in urina consistit, vel in vesicæ cervice: in urina quod acrior evaserit, vel ratione victus calidioris, vel humorum acrium permixtione, ut bilis & pituitæ salsæ; puris etiam ex rupto abscessu manantis, in vesicæ cervice vel exulceratio est, vel inflammatio, quam transiens, urina acrius ferit. Dysuriæ nomine aliquando indigitatur affectus qui ardor urinæ dicitur, easdem enim uterque agnoscit causas.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Dysuria.

**A**crimonia urinæ & vesicæ imbecillitas hujus affectus solet esse causa; aliquando tamen à plethora nascitur. Vbi acrimonia fatigat, utatur emulsione Sem. 4. frigid. & papav. albi ex sero lactis, vel decocto jujub. & liquirit.

Si sit ab imbecillitate, vino utatur tenui cum nuce myristica, vel folia ribes nigri illi immacerentur. Sumat myrrhæ pulv. ʒß. cum Syrup. viol. id sæpe agat: vel bibat lixivium factum ex cineribus roris marini ex vino albo factum. *Joh. Henrnius ad Aphor. 36. sect. 6.*

Phlebotomia hic, ad hepatis aliarumque partium intemperiem corrigendam, necessaria est: eaque pluries repetita, pro plethoræ magnitudine, aut inflammatio-

*Burnet Parte 1.*

nis periculo, ex brachio dextro primùm ad evacuationem & revulsionem: postmodum verò ex venis inferioribus ad derivationem à parte affecta. Purgatio etiam convenit, sed ex lenientibus tantum & refrigerantibus composita, alioquin ardorem urinæ maxime exasperaret. Ideo multi bolum ex cassia simplici non audent transcendere, & illa certè reliquis præferenda, magis tamen refrigerans efficietur, si pulpa tamarindorum etiam adjiciatur, vel dilutum cassiæ ex decocto lactucæ, portulac. & summitat. malvæ paratum, ad plures dies, exhiberi poterit, ut acres humores in partes urinarias confluentes ad intestina sensim deriventur. Vomitus blandis remediis concitatus præstantissimus est revellit enim à parte affecta, & incommoda arcet, quæ à purgantibus per inferiora induci consueverunt. Semel igitur aut bis in septimana proritandus. Clysteres frequenter injiciantur in hunc modum.

ʒi. Rad. alth. ʒi. fol. malv. viol. lactuc. an. M. i. flor. nymphæ & hord. mund. an. p. i. coq. in colat. lb. i. dissol. cassiæ rec. extract. ʒi. ovum integrum unum, ol. viol. ʒii. F. clyster. Mucilagines sem. alth. cydon. stenugræ. clysteribus utiliter admisceri possunt ad dolorem leniendum, verùm ad contemperandum dolorem & ardorem, Clysteres ex lacte puro, vel cum prædictis admixto, ita efficaces esse consueverunt, ut quosdam viderimus ægrotantes, qui in diuturnis doloribus ex hoc solo remedio, & semicupio ex decocto herbarum refrigerantium parato, levamen susceperint. Per os exhibeatur quod sequitur.

ʒi. Aq. portul. lactuc. ros. & nymphæ, an. ʒi. Syrup. viol. & nymph. an. ʒvi. Sal. prunell. ʒi. M. F. Julep. sæpe iterandus.

Juscula parentur in hunc modum.

ʒi. Rad. alth. ʒß. sem. malv. Mi. liquirit. ʒß. sem. cydon. ʒi. F. cum pullo jusculum. Conveniet etiam non parum serum lactis caprilli magno haustu exhibitum, imo & majori efficacia, absente febre, lac integrum, præsertim asininum, propinari poterit, quod non solum detergit, sed etiam dolorem mulcet, & humorum acrimoniam contemperat.

*Amatus Lusitanus curat. 58. cent. 6. dicit*  
O 3 quan-



quandam mulierem dysuria laborantem, post multa frustra usurpata remedia, tandem usu conservæ flor. malvæ fuisse persanata, iumebat autem conservæ ʒi. manè & vesperi superbibendo aq. malvæ ʒili. *Idem curat.* 59. dicit senem quendam ab excreto lapillo dysuria laborantem, eadem conservâ, eodem modo usurpata, intra triduum fuisse liberatum. Conserva flor. altheæ est ejusdem vel majoris efficacîe.

Dolore admodum urgente non inutile est, dum urina redditur, penem demergere in lac tepidum, vel decoctum malvæ, & sem. papav. albi. Imò & aqua sola tepida non parum conducit ad hujusmodi dolorem & ardorem minuendum. Potus sit

decoctum leve malvæ cum Syrup. viol. aut conserva rosac. agitatum. Ad eundem verò ardorem leniendum fiunt etiam injectiones in vesicâ ductum, ex lacte, emulsione sem. frigid. aqua plantag. sero lactis; quibus addi potest liquor albuminis ovi probè concussi, vel trochis. alkekengi. ʒi.

Externa etiam remedia ad hujusmodi ardores temperandos non parum conducunt, qualia sunt balnea, vel semicupia, & fomenta pubi & perinæo admota ex decocto herbrum refrigerantium parata. Linimentum ex ol. ros. nymphaeæ, unguento rosac. refrigerante *Galenî*, populeone cum Camphora & mucil. psyllii extract. in aq. plantag.

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER QUINTUS.

*De Affectibus à littera E incipientibus.*

### SECTIO PRIMÆ.

*Ad Ebrietatem præcavendam.*



**I**nterrogatus sæpe numero, cum tot annos ab ægris plurimis frequenter accersitus Principibus, Nobilibus, & aliis Magnatibus, apud quos splendide vivitur, quomodo mihi cavere potuerim, quo minus ab illis ad potandum invitatus, uti moris est, inde noxam nullam contraxerim, & ad hanc grandem & vegetam ætatem salvus pervenire potuerim. Respondi id quod & verum erat, me in conviviis, quæ in multas horas protrahuntur, ab initio ad horam unam vel etiam duas à potu abstinere posse, idque eo facilius, quod sitis me non urgeat, donec ad satietatem ferè comederim; tuncque ventriculo cibus referto, etsi quandoque liberalius bibens, nullam offensam inde me hætenus sensitse, quod cum & alii quidam me suadente, fecissent, se quo-

que contra ebrietatem egregiè fuisse præmunitos, mihi sunt fassi. *Felix Platerus, observ. lib. I. pag. 41.*

### SECTIO SECUNDA.

*De Entropio.*

**E**ΚΤΡΟΠΙΟΝ (à τρέπω verto) affectus est inferioris palpebræ, qua invertitur & deorsum trahitur, ut internæ palpebræ pars cum deformitate videatur, & instar rubræ carnis apareat, neque cum superiore committitur, sed pendet atq; hiat. Causæ hujus mali variæ sunt. Primò, Incrementum carnis vel tumor in parte interna palpebræ, obquæ invertitur palpebra: Secundo Vulnus vel ulcus in inferiore male curatum, ita ut palpebra in agglutinando deorsum nimis retracta sit.

Ter-



Tertiò, Paralysis vel convulsio inferioris palpebræ, ob quam attolli nequit, quod in palpebra inferiore est Ectropion id in superiore est λογιδροπικαλγος, seu oculus leporinus: est verò affectus superioris palpebræ, quæ ita sursum adducta est, ut oculum totum tegere non possit, sed per somnum etiam aliquantum apertus maneat. Dicitur hoc vitium *Plinio* Corybantiasmus. Causæ hujus affectus sunt plures: nam vel potest in utero palpebra ita fuisse conformata, vel à consuetudine istum positum accepisse, cum Infantes in canis sursum vel retro continenter spectant, vel à convulsione, vel à vulnere, ulcere, & cicatrice potuit imminuta aut sursum retracta fuisse.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Ectropio.

**R**usticus quidam hoc vitio laborans, ad nos venit. Habebat enim palpebras inversas supra seipsas & extra. Ego ex materia falsa malum contractum existimabam, facta sectione venæ, per pilulas illum bis terve purgavi. Deinde ut oculum lavaret præcepi vino albo, cui alumen de rocha in exigua quantitate semel ebullitum erat. Postea palpebram linimento subsequenti inungeret jussi.

℥. Axungie porcine colat. ℥i. tutie præpar. ℥ii. camphoræ, ℥ss. M. simul & lavetur novies in aqua ros. somni tempore inungatur. Hoc modo *Gilbertus Horstius* præceptot meus Nobilem Romanam Matronam curavit, cum multis annis ex catarrho calido & falso & inversione palpebrarum laborasset, alioqui & hoc ut uteretur præcepi, quod sæpe experti sumus ad oculorum rubedinem.

℥. Butyri rec. novies loti in aq. communis, postea novies loti in succo plantag. deinde ter in aq. ros. ℥iiss. tutiæ præp. lotæ semel in aqua ros. aloes lotæ in aqua plantag. aut solani. Sief. albi. cum opio, an. ℥iiss. camphoræ lotæ, ℥i. M. F. unguentum vesperi inungatur, & aqua calida abluitur. Hoc unguento plurimum adjutus fuit. *Petrus Forestus, observ. 41. lib. II. De morbis oculorum & palpebrarum.*

## SECTIO TERTIA.

## De Empyemate.

**E**Μπύημα (à ἔμειν pus, & πύμα putrefactio) i.e. suppuratio, est puris in thoracis capacitatem collectio, in cujus illuvie pulmo totus mergitur, eo autem confluit, vel ex angina, vel peripneumonia, vel quod frequentius contingit ex pleuritide. His enim non bene tussis expurgatis, abscessus exoritur, è quo tandem rupto, pus sæpe universum in thoracis capacitatem influit.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Empyemate ob destillationem à capite.

**A**D intercipiendam & siccandam destillationem Sacch. rosat. antiquum cum bolo armena, tum theriacam aut recentem, aut saltem cum conserva viol. exhibitam hora somni summis laudibus extollo, capiti etiam Emplastrum de betonica cum portione cerati sacri, vel ceratum *Montagnane* applicitum maximè commendando, pro expurganda deinde materia in thorace contenta, exhibeatur lo hoc de pulmone vulpis, vel de caulibus, cum pulvere pulmonis vulpis. Verùm & per vias urinæ; expurgantia propono, in quem finem terebinthinam cum pulvere rubiæ tinctorum omnibus præfero, jus quoque paretur cum rad. aperientibus, capill. vener. adiantho, seminibus melonum, adjecto syrup. de liquirit. capill. ven. his omnibus non sufficientibus dissipanda est materia jure galli non valde antiqui, in cujus ventre china sit incocta, cui si expectorantia diuretica & purgantia immisceantur, medicamentum parabitur plurimi usus. Si hæc non conferrent, & Chirurgus peritus audaxque multum in promptu sit, ad ustionem thoracis tantoperè ab *Hippocrate* celebratam devenire non hæsitarem, *Jul. Cesar Claurinus, consult. 82.*



## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Empyemate ex pleurisi.*

**C**Um suspicio esset futuræ suppurationis, ad illam promovendam, emplastrum preceptoris mei *Faventini* ad maturationem faciens, ut loco affecto apponerent, consulvi, quod ex foliis malvæ cum rad. viol. rad. althææ, lilior, alb. & enul. camp. flor. chamæm. melil. constabat, bullitis ac colatis & adjectis farina fœnugrææ. frumenti, & in fine exiguo fermenti, pingued. porci; butyro & oleo communi ad impinguandum emplastrum. Usus est etiam intus decocto ficuum, uvarum pass. liquirit. rad. malv. alth. sacchar. adjecto. Aliis item commodis remediis per quatuordecim dies dein aliquot diebus interjectis, dolor cœpit sedari, & erosa membrana ac perrupta sanies non admodum multa in pectus collecta est. Tandem ne in tabem transiret, consulvi statim ab eruptione, ut ter quaterve in die, aquam hederæ terrestris (post decocta hordei mel. rosac. syrup. viol. infus. ros. & alia eclegmata pectus repurgantia) ad ℥iv. pro vice sumeret, id enim juxta *Benedictum Faventinum* præceptorem meum, disruptum apostema pleuriticum è sanie repurgat, ne ex empyemate in tabem æger incidat. *Petrus Forestus, observ. 40. lib. 16. De pectoris & pulmonis morbis.*

Senem curavi qui ex pleuritide empyema est passus, febre assidua, tussi sicca, spuito saniei copiosæ, difficultate spirandi laborabat, & tabidus prorsus factus erat. Medicis jam deploratus videbatur, & mirum erat, ex quo loco tanta puris copia emanabat, nam quotidie libras duas excernebat. Huic præter alia quamplurima auxilia, lactis asinini potus per tres menses exhibitus miro fuit auxilio, hujus enim ope, puris copia omnino est imminuta, reffectum corpus, febricula evanuit, tussis nulla. *Zacutus Lusitanus, observ. 119. lib. 1. Prax. admirand.*

Apud nos juvenis quidam à me fuit liberatus, qui per annum pus in thorace collectum post pleuresin gestavit, & quasi absumptus erat, usus fuit, & per vulnus purgatum pus. Multos hoc modo curavi,

quorum nomina supprimo. *Guil. Rondeletius prax. Med. cap. 15 lib. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Empyemate.*

**P**uer quidam quinque annorum febre continua laborabat, per duos ferè menses perseverante, cum tussi frequenti ac molesta, ita ut ad tabem vergere crederetur. Tandem vocatis in consilium medicis, relatum fuit illum conqueri de dolore lateris sinistri, præcipuè cum manu contrectaretur, tum etiam relatum fuit, illum in febris principio persensisse aliquem dolorem in illo latere, qui tamen intra paucos dies delituerat, idcirco pleuriticus non fuit judicatus à medico ordinario. Suspicio fuit Empyema aliquod ibi latere, atque ut res clarior evaderet, decretum fuit, admovendum esse per aliquot dies Cataplasma emolliens & attrahens, quo per triduum admoto, apparuit elevatio quædam in parte, & in ea fluctuatio subobscura percipiebatur, convocato iterum consilio, de Empyemate nemo amplius dubitavit. Apertione facta pus copiosum effluxit, ejusque vacuatio per duos menses continuata est, donec tota materia evacuata, æger tandem pristinae sanitati restitutus fuerit. *Lazarus Riverius, observ. 75. cent. 2.*

Si aperto thorace pus debitè non fluat, sequenti emplastro eliciendum est, quod ex omnibus abscessibus potentissimè pus attrahit, & foras educit.

℥℥. Resinæ pini rec. claræ & odoratæ. ℔. ss. ol. laurin. & terebinth. an. ℥i. gummi elemi, ℥ii. primò resina & gummi in igne liquentur, donec simul misceantur, postea adde terebinthinam & oleum, omniaque simulque bulliant tantillum, & per lintum crassius transcolentur. Massa istius portio extendatur super alutam, & fiat emplastrum, quod mutetur semel tantum in die hyemistempore, bis autem in die in æstate. Perforetur in medio duabus aut tribus incisuris oblongis, ut pus attractum effluat. Dum pus aperto thorace per intervalla educitur, utatur æger bis in die portione hac vulneraria, quæ sanguinem expurget, ulcera detergat, & putredinem inhibeat.



24. Sanicul. bugulæ, scabios. beton. hyperic. tard. ben. pilosell. pimpinell. vinc. per vine. agrimon. plantag. an. M. i. sem. hyperic. card. bened. an. 3ß. flor. cordial. an. p. i. coq. in hydromel. ad 1b1ß. cujus capiat 3vi. singulis diebus. Hoc eodem decocto poterunt fieri injectiones in thoracis cavum. *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 7. cap. 4.*

Servus quidam ex curru decidit læsus est thorace, præsertim dextra in parte. Dolores remediis non cessant, cogitabant de sectione inter quintam & sextam costam. Divisæ sunt sententiæ, tandem vicit pars minor, & periclitandi occasionem captans ex desperatis penè rebus, applicatum cauterium, fluxit per dies plus minus viginti aut viginti quinque materia saniosa ferè ad pintas 15. ut retulerunt Chirurgi convaleuit. *Guill. Ballonius, lib. 2. Evidem.*

Cum summus *Hippocrates* passim hoc remedium usurpet nunquid satius est aliquo remedio cruento & ancipiti certam mortem (si aliter facias, & id remedii genus omittas) redimere? Humanum est, & officii plenum aliqua ratione miserorum ægrorum dolores levare, atque id magis si cum aliqua salutis spe. *Guill. Ballonius, consil. 6. lib. 2.*

Enatum ex pleuritide Empyema, cum alia non profuissent, frequenti potione ex syrupo althææ, oxymel. te saccharino & manna, cum oleo amygd. d. rec. & aq. scabios. feliciter curatum *Roma* accepimus a *Matthia Baccono* Anglo, pure nimirum alvo proclivius quam ore, expurgato. *Greg. Hieronymus Velschius, observ. 29.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### De Empyematis expurgatione.

**C**larissimus *Baubinus* noviter ad me scripsit se peculiarem & insignem ramum ad cordis ventriculi sinistri ostium ex arteria venosa propagatum observasse; qui supra pulmonem sinistrum elatus, ac mox reflexus, arteriæ magnæ truncum descendentem comitatus, & in eum sub diaphragmate implantatus sit: per quem vomicam pulmonum & per urinas & per alvum evacuari posse minimè dubitat, in iis scilicet, qui sani evadunt; at in iis qui moriuntur,

posse purulentam materiam, etiam corde mediante, ad vias urinarias promoveri non negat. *Gregorius Horstius, observat. 11. lib. 3. De morbis pectoris.*

## SECTIO QUARTA.

### De Epilepsia.

**I**nter Symptomata terrificam quibus non solum ægri, verum etiam ij, qui præsto adsunt, exterrentur, præcipuum obtinet locum id quod è subito casu & totius corporis correptione nomen habet, & Epilepsia dicitur; nimirum ab ἐπιλαμβάνειν, i. e. corripiendo, deducto vocabulo. Est vero totius corporis præternaturalis concussio & motus convulsivus cum mentis, & sensuum omnium ob læsione. Hoc infausto morbo qui corripitur, subito concidit; nec audit, nec videt, nec expeditus præteritorum recordatur, concussione ex ore spumæ moventur, & solutis musculis interdum vel urina, vel stercus, vel genitura præter voluntatem exit. Hæc absolutæ & fortis Epilepsiæ signa sunt, plerumque levior existit, cujus non tam expressa sunt symptomata. Causa hujus affectus proxima est humor aut vapor specifica & occulta vi cerebro insensus, ejusque membranas nervosumque genus crudeliter vellicans, eo verò feriente, cerebro rursus contra pugnante, quasi colluctatione quadam & dimicatione fit Epilepsia. Hæc autem materia modo, in ipso cerebro, modo in ventriculo, nonnunquam & in aliis distantioribus locis delitescit: è quibus furtim per carcos ductus in cerebrum prorepit. Antecedentes causæ sunt omnia illa quæ specificam hanc cerebroque adversam materiam apta nata sunt suppeditare; ut sunt succi quicunque in corpore vitiosi; craniæ caries, secundina corrupta & vermes. Ad Epilepticam etiam dispositionem facit hæreditas, & in eclipsi lunari nativitas. Pro catarticiæ seu externæ causæ sunt cibi excrementitii, & facile corruptibiles, fructuum horariorum crudorum, & lactis nimia ingurgitatio, carnes hædorum, hepar hircinum, coturnices, passerres, anguillæ; isti enim cibi à proprietate Epilepsiam excitare creduntur: qui-



quibus annumerandum venit apium; huc referuntur etiam radii lunæ, olfactus rerum foetidarum, ut bituminis, picis, cornuum, sulphuris, corii caprilli, alii, apii, & gagatis, cujus suffitu antiqui servos emendos, an essent epileptici explorabant terror item ex tonitru, tubarum clangore, bombardarum fragore, aut occurrente re aliqua improvisa & terribili, &c. Varias obtinet appellationes, vocatur enim morbus puerilis, herculeus, comitialis, lunaticus, divinus, fonticus & caducus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Epilepsia.*

**C** Alcearius quidam annos 50. natus Epilepsia repente correptus erat, vociferabatur stertebat & spuma ad os ferebatur, & concussio totius corporis valida aderat: ad eum accitus, ne ex concussione linguam sibi amputaret, inter dentes lingueum cuneum intromittebam, ad anhelitum facilitandum, & spumam & humiditates extra mittendas ad os: fortesque deinde frictiones membrorum extremorum & ligaturas dolorosas adhibeo, ut ita ægrum miserè afflictum à paroxysmo excitarem, rutam quoque intra manus meas contritam naribus ægri applicandum, & succum quantum potui naribus infundebam, naresque constringebam & digitis contorquebam, quibus remediis mox à paroxysmo liberatus fuit. Verùm ne postea rediret, cum hic valde pituita abundaret, & etiam ex parte succo malancholico post exhibitam hieram picram, hoc decocto utebatur.

℥. Beton hyssop. meliss. an. Mi. Salv. majoran. fol. Lauri, an. Mß. (vel loco fol. lauri ℥i. bacc. lauri) rad. bugi. borrag. pœon. polip. q. an. ℥ß. thymi, epithymi, an. ℥i. F. decoctio in aq. q. s. colat. adde squillæ, ℥i. cranii human. ℥iß. nuc. mosch. ℥i. iterum bulliant & denuo colentur hujus decocti accipiebat omni mane ℥iv. oxymel. scillit ℥iß. M. deinde & hoc decoctum descriptum est.

℥. Beton. salv. majoran. hyssop. an. Mj. flor. stœchad. anthos an. p. i. sem. pœon. fœnic. an. ℥iij. rad. pœon. ℥ß. fol. sem. ℥i.

agar. alb. ℥i. epithymi. ℥iß. polipod. d. ℥ß. sem. cartham. contus. ℥iij. uvar. pass. examinat. ℥i. liquirit. ras. ℥ß. coq. in aq. communi pro ℥ix. fortissimè expressioni adde syrup. de stœchade, oxymel. scillit. syrup. de beton. an. ℥i. M. pro tribus dosibus matutinis. Postea & has pilulas deglutivit.

℥. Pil. coch. de hiera simpl. an. ℥i. agar. troch. pil. aggregat. an. ℥ß. troch. alhand. g. v. cum melle anthosato F. pilule vii. corpore ita expurgato, quotidie ex infra scripto medicamento sumens, ad magnitudinem fabæ majoris epilepticos paroxysmos, quos antea crebrius habuerat, amplius non patiebatur.

℥. Hirundin. deplumatar. & lotar. in vino & in furno exsiccatur. num. v. pulveriscentur subtiliter; quibus adde conserv. flor. pœon. luna decresciente paratę. conserv. flor. herb. paralyf. an. ℥i. rad. pœon. collect. luna decresciente exsiccatur. & pulv. ℥iij. conserv. anthos. ℥ß. probe misce cum oxymel. scillit. exiguo adjecto aceto scillitico, F. f. a. opiata, sapor non aridebat: tamen sumens curatus fuit. Alium Epilepticum novi, qui corde hirundinis solo pulverisato utebatur, nostro egroto magis profuit hirundo cum reliquis pulverisata; cujus usu liberatus fuit. *Petrus Forestus, observ. 23. lib. 10. De Cerebri morbis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Epilepsia.*

**P**uerulus duorum mensium Epilepsia continuo affligebatur, ita ut me vocari jusserint, quæ cum spectarem miserè afflictum, ex *Galen*i testamento sacculum hunc quadratum collo suspendi ut furculam stomachi nudam attingeret.

℥. Rad. pœon. virid. ℥ß. sem. pœon. maris nempe nigri ℥iß. radice concisa, & semine contuso, hæc in sacculum concludebam, bombace interjecta & Syndone coaptum & inter sutum, ad collum cum filo sericeo rubro suspendi mandavi, ut ventriculi os attingat; & ut ibidem suspensum ad aliquos dies permaneret, hoc suspensorio miraculi instar, paroxysmi cessarunt, neque amplius reversi sunt, eodem re-



medio eoque solo plurimi alii convaluere, ante hoc tempus & postea in aliis hujus suspensorii maximam esse vim & præclaram experti sumus *Petrus Forestus, observat. 59. lib. 10.*

Puer trium annorum cum Epilepsia corripere, simul vermes mortuos cum excrementis subinde ejiciebat. Existimavi, quod ex tetrīs vermium fumis in cerebrum elatis hic Epilepsiam incurrerit, quare cum eidem pulverem sequentem cum aquis destillatis dedissem, optimè deinde habuit.

℞. Sem. contra vermes, pulv. rad. pœon. agar. troch. an. ℥ss. diamosch. dulc. ℥i. syrup. acetos. simpl. ℥ss. aq. absinth. mellisæ, an. ℥i. M. Dedi illico in intervallis paroxysmorum, & jussi ut continuò sumeret parum sem. zedoar. saccharo incrustati, iisque sumptis hic statim melius habere cœpit; & ejectis vermibus ab Epilepsia liberatus est. *Petrus Forestus, observ. 65. lib. 10.*

Pro Epilepsia in puero duodecim annorum. Præmissis universalibus commendare soleo sequens Electuarium solidum.

℞. Coagul. leporis ℥ij. sem. pœon. maris ℥ss. visci q. ℥v. sang. mustel. præp. ℥i ss sem. anis. cinnamom. caryophyll. an. ℥i ss corall. rub. ℥i. cranii humani anterioris partis adusti, ℥vi. pulverisatis omnibus cum sacchar. fino in aqua pœoniæ dissoluto F. tabellæ ponderis ℥iij. capiat unam pro vice tribus horis ante prandium. Mustellæ sanguis hoc modo præparatur.

Mustella decollata totus sanguis asservatur in vase vitreo, mox ubi concreverit, dividitur in partes minutas, & umbre æstivo tempore expositus, siccare finitur. Mustellæ sanguis præstantissimus censetur pro Epilepsia sananda; imò hoc certissimè tibi dicere possum: vidisse me sanatum epilepticum 25. annorum solo hujus sanguinis usu, potati scilicet statim atque è venis exiit ad ℥ii. cum ℥i. aceti. Curato diligenter ut copiam habeas testiculorum apri, aut saltem verris, i. e. suis domesticæ venere utentis, ac simul testiculorum galli, exsiccabis illos in furno: mox in pulverem tenuissimum rediges. Sint pulveris apri ℥ij. galli ℥i. Deinde addito duplum saccari fini. De hoc pulvere continuo sumat puer tuus

in omnibus fereulis; nam experieris Pharmacum absol. utissimum. Refere at mihi *Ludovicus* pater solitum sese dare ℥iij. hujus pulveris cum aq. betonic. decem continuis diebus sine saccharo, & sanasse mulierem, quæ passa fuit Epilepsia annis octo, præcipiebatque ut omnino mense integro abstineret à potu vini. Nunc tibi communico aquam verè præstantem pro hoc morbo aut omnino propulsando, aut certè magna ex parte mitigando.

℞. Flor. lavend. Mviii. flor. lil. convall. Miii. macerentur 6. diebus in lbxxv. vin. flavescens ac generosi, mox distillantur in M. B. lento igne sine fumo, tum verò postea aq. destillat. addito spec. diamosch. d. ℥ss. visci q. ℥i. sang. mustel. præpar. ℥vi. rut. sic. Mj. cubeb. & sem. citri an. ℥iij. macerentur hæc quatrduo: ac quod destillaverit; postea usui reserve-tur. Exhibeatur hujus aquæ, ℥ss. ex cochleari mane post electuarium solidum superius descriptum antequam invadat Epilepticus insolutus, detur ℥ss. hujus aq. cum ℥iij. juris pullæ, in quo decocta sit radix pœon. & semina. Equidem accessionem si non removeret, saltem retardat. observes tempus invasionis, & antea quam invadat, diebus quatuor aut quinque, aquam exhibeas ante cibum horis tribus. Cum verò no-veris jam proximè instare accessionem, ean-dem propinabis; nam aut non revertetur accessio, aut certè quotidie magis brevior em faciet. Hæc medicamenta apud me potiora sunt. *Horatius Augenus. Tom. 2. Epist. & Consult. lib. 8. Epist. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Epilepsia.

**I**Nter alia commendavi hunc pulverem cum jure pulli ad ℥i. sæpe in aurora sumendum.

℞. Sem. pœon. pulv. cranii human. an. ℥iij. caryophyll. nuc. mosch. sem. Citri an. ℥i. M. F. pulvis usui servandus. *Forestus, obs. 61. lib. 10.*

Juvenis quidam Epilepticus postquam bene purgatus esset, nostro jussu continuò comedebat radices pœoniæ virides per longum scissas & in sartagine frictas, quæ val-de



de profuere: ut & etiam alteri puellæ, quæ ab illarum esu ab epilepsia admodum gravi curata fuit.

Empiricus quidam post universalia remedia, nucham candela cerca incensa cauterii instar inurebat, & radices pœoniæ in patella cum butyro frictas continuò comedendas dabat: & ita juniores & magis adultos magna cum admiratione curabat. *Petrus Forestus Schol. obs. 61. lib. 10.*

Præmissio lenitivo, venæsectione, & Julepis alterantibus, utatur hac medicina.

℞. Conf. Hamec. ℥ss. troch. alhand. gr. x. Syrup. ros. fol. ℥ii. M. F. potio detur in aurora.

Pro purgatione peculiariter in mense sumat una hora ante cœnam pilulas è sequenti pasta.

℞. Rheiel. ℥ii. Cariophyll. Cinamom. an. ℥ii. Aloes ℥ss. agar. opt. ℥iii. sem. pœon. ℥ss. M. cum melle ros. F. madaleon de quo sumat. ℥i. singulis vicibus accipiat etiam interdum una hora ante cibum myrobalan. chebulum unum conditum. *Joh. Baptista Montanus, consil. 37.*

Ego summopere laudarem cauteria in brachiis, imò hoc est familiare remedium, & vidi anno præterito Nobilem senem qui solo cauterio sanatus est. Laudatur pœonia ob singularem quandam occultam vim. Ego tamen sæpe eam exhibui; sed semper coactus sum ad alia remedia devenire, nec unquam ita efficacem expertus sum, detur tamen cum non possit obesse *Joh. Baptista Montanus, consil. 50.*

Post purgationes universales, mandavi ut uteretur decocto guaiaci, in unaquaque libra addendo ℥ss. rad. pœon. adjecto etiam Hyssopo, & oxymel. Scillit. ℥ss. ad dies 40. hoc enim modo, multi curati sunt. *Petrus Forestus, observ. 58. lib. 10.*

Setone ad cervicem adhibito, *Hollerii* Medici undequaque doctissimi decreto, Adolescentem quendam 20. annos natum morbo caduco, cujus insultibus ante crebrò præhendebatur, liberavi: derivatis, ut credere par est illa arte ichoribus mali fomitibus. *Ambrosius Paræus, lib. 10. cap. 25.*

Puer quidam singulis 15. diebus Epilepticus concidebat. Per affectum capitis hoc fieri Medicorum præstantissimi *Friskmelica, Montanus, Odus & Francanza-*

*nus*, existimarunt. Sed quò plura pharmaca exhibuerunt, eò affectus magis crevit, ita ut in 24. horis paroxismos haberet plures centum & quinquaginta, leves tamen, quia parva commotio capitis cum bulla circa frœna labiorum aderat, unde tandem cognoverunt morbum esse, non per affectum capitis, sed per consensum à ventriculo, quare cum illum pharmacis exagitare desisterent, & roborarent; puer egregie convaluit. *Victor Trincavellius, consil. 25. lib. 1.*

Paretur potio ex cerasis nigris maturis, accipiendo libras ducentas horum cerasorum, contundantur cum ossibus, deinde affundantur libræ centum aquæ fontis, in qua infundantur, per diem naturalem ℔ii. ligni buxi incisi, & ligni arboris tilia; nec non libra semis radic. pœon. & tantundem radic. Lilior Convallium factaque infusione per diem naturalem in aqua calida, & ebullitione ad tertiam partem, aqua prædicta calida colata affundantur cerasis contusis, & fiat Ebullitio ad duos dies, postea coletur, & succus seu vinum recondatur in dololio, impositis iisdem lignis, quæ subsidebunt, & succus clarescet in usum continuum prandii & cœnæ. *Benedictus Sylvaticus, observ. 46. cent. 1.*

Facta universalis totius, & particulari capitis expiatione laudo aquam stillatitiam hunc in modum paratam.

℞. Sex paria Hirundinum, & totidem picarum lanugine tectarum radicum pœon. maris una decresciente sub signo leonis collectarum, ligni visci quercini, buxi raspati, an. ℥iij. Sassafras incisi. ℥i. flor. Lilior convallium, flor. Hyperici, tilia arboris, primula veris, roris marini an. pij. incidantur pulli cum visceribus, & lanugine; contundantur radices, & imponantur in vase vitreo, affundendo succi Cerasorum nigrorum de ruta capraria, acetosæ, limonum, aceti scyllitici. an. ℥iv. vini albi generosi ℔ij. macerentur triduum in Bal. M. additis floribus præscriptis in maceratione, factaque forti expressione, & colatura, destillentur & servetur aqua; cujus dosis singulis matutinis erit ad ℥iij. cum tribus guttis ol. Buxi, & spiritus Salis Præmissio bolo in hunc modum parato.

℞. Terebinth. cipria lota in aq. Lavendul.



dul. castor. an. ℥i℥. sem. pœon. pulv. cardamom. cranii human. an. ℥i℥. ungu. alcis pulver. ℥ij. cum oxymel. Scyllit. F. boli x. quorum singulis diebus sumat duos, & superbibat, aquam superscriptam. *Benedictus Sylvaticus, observ. 47. cent. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Epilepsia.*

**P**ER aliquot annos autumno & vere purgetur hoc modo.

℥℥. Flor. Cassie ℥x. spec. hier. ℥ij. cum Saccharo F. bolus, sumendus tribus ante prandium horis. Item.

℥℥. Oxymell. Scilit. Syrup. de beton. an. ℥i. aq. pœon. ℥iii. M. pro uno julepo & sic pro aliis septem. Post ultimum Syrupum die immediatè sequenti accipiat infra scriptam medicinam manè cum custodia.

℥℥. Confect. hamec. ℥iii. cortic. rad. hel-lebor. nigr. ℥i. Syrup. rosat. solut. ℥iii. cum aq. pœon. F. potio, & hæc pro evacuationibus tam autumnis quam veris.

Mediis temporibus utatur ter vel quater in mense pilulis superscriptis consil. 37. item utatur frequentissimè hoc electuario, bis aut ter in septimana; ad cochlearia duobus horis ante prandium.

℥℥. Oxymel. Scillit. ℥ii. mithrid. opt. ℥i. succirad. pœon. rec. ℥iii. sem. pœon. sem. citri an. ℥ii. pulv. Cranii hum. ℥i℥. Sacch. ros. ℥℥. M. Cum julepo rosato F. lambitivum item quandoque ubi Electuarium m fastidierit sumat ℥i. infra scripti pulveris in brodio pulli circa aurora.

℥℥. Sem. pœon. pulveris humani cranii. an. ℥iii. Cariophyll. nucis mosc. sem. Citri an. ℥i. M. F. pulvis ad usum. Duo cauteria in cruribus continuò teneat aperta. *Job. Baptista Montanus, consil. 41.*

Ut præservetur puer ab Epilepsia quæ imminere videtur, abstineat omnino à vino, bibat aquam decoctam cum cinnamomo, tormentilla, & pœonia, utatur frequentissimè Agarico, & faciat hoc sibi familiare, ut evacuetur caput, sit dosis pro vice ℥℥. *Job. Baptista Montanus, consil. 46.*

Mirabilia scripsit *Galenus* de pœonia & maximè experimentaliter cum dixit, quod volens experiri iuvamentum ejus, suspen-

dit eam collo patientis, & nunquam evenit ei paroxysmus; cum autem eam deposuit, reversus est paroxysmus. Et ego iterum depono me hanc experientiam oculo meo sæpe vidisse.

Hoc Electuarium quod sequitur in usum vocetur; cujus experientiam, apud Deum testor, millies me vidisse sanavisse homines ab Epilepsia, & inter alios socium domini Archangeli, qui paroxysmis Epilepticis decies in die vexabatur.

℥℥. Pyrethr. stœchad. costi an. ℥x. agar. ℥v. sem. carvi, anethi, assæ fœtidi. aristol. rot. an. ℥i℥. succi squill. mell. el. an. ℥i. & ℥ii. coq. simul Scylla & mel lento igne usque ad bonam viscositatem, deinde superadditis speciebus F. Electuarium, cujus dosis sit omni mane ℥iii. & tardetur post ipsum cibum ad minus 4. horis *Barthol. Montagnana, consil. 43.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Epilepsia.*

℥℥. **H** Erb. paralyf. i. e. primulae veris quantum vis, minutim concidatur, Cariophyll. rad. pœon. & pyrethr. an. pt. aq. cum melle F. Electuarium, de quo sumat quotidie cochlear i. vel alterum: hoc Electuario testatur *Nicolaus Florentinus* se liberasse ab Epilepsia virum quadragenarium; hic pulvis etiam optimus est.

℥℥. Ras. Cranii human. ℥i. ras. ungu. alcis, C. C. an. ℥ii. visci querc. rad. & sem. pœon. rad. tormentill. sem. dictamn. alb. an. ℥i℥. corall. utriusque præp. ras. Ebor margarit. præp. an. ℥i. sol. auri, num. xxx. Sacch. opt. ℥ii. M. terantur omnia in mortario marmoreo, ut F. pulvis Epilepticus, detur ad ℥℥. cum aqua Lilior. convall. vel cardui sancti, in accessione apponatur. naribus succus rutæ agrestis, qui præ cæteris mirificè excitat Epilepticos; injiciatur in nares imo per os assumptus solet ab Epilepsia præservare, quando nec sic cedit accessio abrafo capiti applicetur vesicatorium.

Ad excitandos in accessione epilepticos, accipiatur succi rutæ ℥℥. castor. ℥i. M. intromittatur intra nares. *Rodericus à Fonseca. Tom. 2. consil. 80.*



Laudatur oleum buxi, cujus gutt. iii. in conserva pœon. dantur jejuno stomacho & in ipsa quoque accessione cum aqua florum tilia exhibitur. Mirabile est hoc oleum, quia narcoticum est, narcotica sensum stupefaciendo solent prohibere accessione, ita exhibitur in accessione.

℥. Aq. pœon. ℥iii. ol. buxi gutt. x. M. dato. Potest etiam exhiberi ante accessione & præcavebitur. Est hoc oleum idem cum oleo ligni heraclei, quo *Martinus Rulandus* ad miraculum usque curabat hunc morbum, & etiam dolorem dentium. Habes secretum pretiosum & maximum ad Epilepsiam & dolorem dentium à me explicatum cum magno labore, hoc idem remedium convenit etiam in vertigine. *Rodericus à Fonseca. Tom. 1. consult. 15.*

Post purgationem præcipue commendo, ut ipsi infirmo inscio, pulvis ossium humanorum ℥i. ponderis in aq. pœon. manè frequenter exhibeatur. In abstinencia vini diu persistat, & si factu illi facile erit, semel aut bis in mense, semperque post novilunium & plenilunium à cœna vomat. *Hieron. Mercurialis. Consult. 72. Tom. 1.*

Illud pro Colophone addam, eam esse morbi comitialis vim, ut quanto plus Medicinis tractetur, eo acerbior fieri videatur, ac propterea præter assiduam temperatæ vitæ rationem aliorum remediorum usum aut nullum, aut parcum esse debere. *Hieron. Mercurialis. Consult. 92. Tom. 3.*

Muri domestico vivo detrahatur cutis, & capite, cauda, pedibus, & intestinis abjectis, truncus reliquus in lamina ferea exuratur, & redigatur in pulverem, cujus pauxillum quotidie detur ex aq. flor. tilia. *Hier. Reusnerus, observ. 152.*

Mulier quædam 20. annos nata, integrum per annum laboraverat motibus Epilepticis, non quidem vehementibus, sed à septima matutina in horam nonam vespertinam durantibus, cum spuma oris, sine loquela, sensuumque manifesto usus, præscripsi ipsi hæc pilulas unica pro vice.

℥. Castor. salis artemis. an. gr. iv. res. a. Jalap. gr. vi. Aloes succotrin. g. ix. ol. majoran. gutt. ii. M. F. pil. num. 5. deaurentur. Pro voto illis purgata, usa est bis quotidie haustulo sequenti.

℥. Sapon. Hispanici albiss. ℥β. coq. ex lacte vaccino, & colat. ℥iii. dentur usui, miratu dignum erat hoc remedio assumpto paroxysmum in dies gradatim, deque hora in horam ita ivisse imminutum, ut trigesimo die plenissime curata exiverit, manseritque restituta. *Paulus Barbette, Præxos, lib. 1. cap. 1.*

Juvenem quendam Epilepticum hoc solo condito purgante curavi, sed non ante septimum mensem.

℥. Elect. è succo ros. ℥i. pulv. Jalap. ℥i. spirit. salis rectific. ℥i. ol. roris mar. gr. vii. M. F. conditum molle, de quo sumat nucis mosch. magnitudinem ter in hebdomada, loco spiritus salis poterit substitui Spiritus salis armoniaci, aliusve salis volatilis oleosi; vel ex hisce duobus mixtis & binis ternisve cohobationibus junctis destillati spiritus ℥i.

Pilulæ sequentes in Epilepsia conveniunt.

℥. Extract. rhei, Aloes lucid. resin. Jalap. an. gr. vi. salis succini, gr. iii. olei Lavendul. gr. ii. M. F. pilulæ iv. deaurentur pro una dosi. *Paulus Barbette, Prax. lib. 1. cap. 2.*

Commendantur hic Spiritus C. Cervi, salis dulcis, ut & nitri dulcis, ast omnibus ferè antecellunt salis armoniaci flores albi, rubri, flavi, vel ejusdem salis spiritus, qui non tantum pituitam incidit, verum etiam acido austerum corrigit, estque valde volatilis ac penetrantissimus; quo ipsi melancholici redduntur hilares, quod quidem cunctis observavimus: atque non tantum puerorum, ast quoque adultorum Epilepsias varias hujus beneficio, iusto vehiculo mixti, annuente divino numine curavimus.

Ad Epilepticum quendam vocatus inter alia remedia, quibus tandem annuente Deo opt. max. curatus est, hunc iulepum præscripsi.

℥. Aq. beton. flor. tilia. an. ℥ii. aq. fœnic. vitæ Matthiol. antepilept. Langii an. ℥i. Spirit. Salis armoniac. ℥β. tinctur castor. gutt. x. flor. hyperici ℥i. Laudan. opiat. gr. iv. ol. Succini gr. v. Syrup. Stæchad. ℥i. M. cujus singulis diebus ad minimum cochlear unum atque alterum quater assumebat. *Federicus Dechters: Notis ad Prax. Barbettiana, lib. 1. cap. 1.*



infantes plures motibus convulsivis Epilepticis afflictos sequenti mixtura cochlearum usurpata sanavimus,

℞. Aq. flor. tiliaë fœnic. an. ℥i. Syrup. Stœchad. diacod. an. ℥ss. Spirit. sal. armoniac. ℥ss. M. *Idem ibidem.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Epilepsia.

**C**ivis cujusdam Lavingani filia decem annos nata, per tres menses quotidie incurrerat in Epileptica Symptomata, rogatus ego à puellæ matre, gravi, sævo, & longo huic morbo curationem talem adhibeo.

Purgato rectè capite propinabam per 5. dies manè jejuno stomacho & in ipsa accessione tres guttas olei ligni heraclei: cujus usum mox cum omnium admiratione. Deique laude omnino liberatur à Chronico & quotidiano malo: quod jam annis multis amplius non rediit. Laus soli Deo & gloria; qui contra morbum comitalem peculiarem & occultam huic oleo vim & facultatem indidit. *Martinus Rulandus, curat. 6. cent. 2.*

Puer quidam Lavinganus 7. annorum torquebatur graviter Epilepsia dies noctesque, sed ex hac ægritudine sanus factus est isto remedio.

℞. Olei ligni heraclei, gr. vii. has meo consilio ante & an. paroxysmo exhibuerunt per 7. dies, atque efficacia ejus Epilepticus paroxysmus post modum non visus est amplius, sed liber ab hoc malo & incolumis semper mansit. *Martinus Rulandus, curat. 86. cent. 10.*

Consul quidam quinquagenarius gravi Epilepsia coreptus erat, in ipso paroxysmo dedi 13. guttas antepileptici nostri: quo adstantibus omnibus obstupescens, confestim quievit, ad se rediit, & convaluit: convalescunt & sanantur per idem oleum etiam innumeri alij ex hoc horribili morbo. *Martinus Rulandus, curat. 32. cent. 10.*

Vir quidam triginta annorum levem passus Epilepsiam, à nobis curatus fuit fœliciter & integre hac ratione.

℞. Pulver. Sen. Laxativ. ℥ss. vinj ℥ v.

commixta stabant per noctem; manè exhauriebat, multaque ac varia excernebat. Pulvis hic Senæ laxativus, non est pulvis Senæ Montagnanæ qui passim in officinis prostat, sed est pulvis senæ laxativus *Job. Viceri*, cujus descriptio hæc est.

℞. Fol. Sen. tartar. alb. an. ℥i. sem. anisi, Caryoph. cinamom. galang. an. ℥i. diagridi. ℥ii. F. omnium pulvis subtiliss. S. A. dosis est à ℥ss. ad ℥ss. in substantia ad summum cum convenienti liquore. Dosis in infusione est ad ℥ss. educit per infrabilem tam flavam quàm atram, & pituitam, atque inde natos morbos curat fœliciter: quare in officinis parari suadeo, cum usus ipsius sit maximus & salutaris & tutissimus in omni morbo, ut sum per diu expertus. *Martinus Rulandus, cur. 3. cent. 10.*

Mulier quædam epileptica me consulto & maximè Deo implorato ad sanitatem reducta est hac via.

℞. Aq. flor. tiliaë, ℥vi. trochisc. alhand. ℥ss. M. F. infusio S. A. pro duabus vicibus colandis ac per duos continuos dies bibendis, post bonam per alvum factam purgationem, septem dies in lecto sudavit, capiendo de hyssopi decocto calente ℥vi. his ita peractis, liberata ex toto fuit. *Martinus Rulandus, curat. 66. cent. 10.*

Mulier quædam sexagenaria sexies facta est epileptica, hæc à me per Dei gratiam adjuncta ac sanata est sequenti solo, facillique remedio.

Vino sublimato imposuit, meo iussu, hyssopum, de quo manè & noctu cubitum abitura bibit tria cochlearia, vel ad ℥ij. hoc cum singulis diebus per septimanam fecisset, convulsio hæc ex toto intermisit, & nunquam reversa est. *Martinus Rulandus, curat. 95. cent. 10.*

Erat qui Epilepticos multos etiam Provecta ætate, & qui diu laboraverat, post purgationes, hoc pulvere percuraret.

℞. Crystall. præpar. ℥i. corall. rub. ℥ij. Margarit. or. smaragd. an. pr. ℥ss. M. F. pulvis, cujus pars dimidia est una dosis ex aqua taraxaci.

Alius Empiricus hoc fœliciter utebatur, in acervis formicarum reperitur aliquid simile thuri, quod pulverisatum dabat. Epilepticis ex aqua pœon. vel florum tiliaë. *Hieronymus Reusnerus, observ. 15.*

℞. Cor-



℥. Corvos juvenculos ferè implumes, mense *Martio* exclusos, statimque nido extractos in ollam novam conjice, probeque lutatam clibano impone ut comburantur corvi, quos tere in pulverem; qui plures annos efficax servari potest, capiat de eo parum in liquore appropriato semel in die. Est hic pulvis corvinus summè secretus.

De corvis *Conradus Gesnerus lib. 3. De Avib. pag. 141.* hæc habet.

Medicus quidam celebris nostra ætate, corvos duo mense *Martio* è nido combustos, in levissimum pollinem redactos epilepticis propinabat bis vel ter die, ℥i. pondere exhibito cum aq. decoct. castor. & paulo post cerebrum corvi in stillatio liquore verbenæ haustum epilepticis prodesse nuper amicus quidam ad nos scripsit. *Hieron. Reusnerus, observ. 13 & scol.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Epilepsia.

**F**Abro claustrario annorum circiter viginti, apud ejusdem artis opificem *Berna* operanti, tumor exiguus subortus est in vola manus dextræ, sub radice minimi digiti, cum dolore, qui tumore crescente augebatur. Post dies aliquot, nihil gravius sentiens, subito corruit, epilepsia prehensus, convulsus, sensibus sublatis, motuque inordinato aliquandiu agitato, finito paroxysmo ad se rediens, munia consueta obivit, verum exactis diebus 14. paroxysmo rediit; ab eo diebus octo post, denuò recidivam passus, quo Magister perterritus, eum à se dimisit, itaque in patriam ad nos reversus, Magistratu sumptus pro remediis solvente, sic cura fuit instituta.

Purgatus fuit primum hoc pacto.

℥. Rad. pœon. rec. ℥ij. polipod. ℥i. fol. sen. ℥ij. epithimi, ℥i. sem. fœnic. ℥ij. fumat. Mj. F. decoctio in. aq. & vino pro tribus vicibus sumenda.

Inde pulvere usus est sequenti.

℥. Cranii hominis triti, ℥ii. rad. pœon. unguel. asini, an. ℥i. cineris hirundinum, ℥i. visci querni, ℥i. ras. eboris. ℥i. sacchar.

ad pondus omnium, fiat pulvis, capiat singulis matutinis cochlear unum superbibendo aq. flor. pœon. ℥i.

Denuo purgatus fuit sequenti modo.

℥. Tartar. vini, ℥ii. diagrid. ℥i. sem. anis. ℥i. rad. pœon. ℥i. sacch. alb. ℥v. F. pulvis tribus vicibus sumendus.

℥. Sem. ocymi, hormini, pœon. palmæ Christi, an. ℥i. visci q. rad. pœon. an. ℥i. corall. utriusque ℥i. cineris unguel. asini, & cranii anterioris humani, an. ℥i. spec. diamargar. frigid. ℥i. sacch. dissolut. in aq. beton. & pœon. q. s. F. tabulæ, dosis ℥i. postea hæc opiata præscripta.

℥. Theriac. veter. ℥vi. rad. & sem. pœon. visci q. an. ℥ii. sem. hormini, & ocymi, an. ℥i. cranii, hominis. ℥i. cum melle scilicito. F. opiata, detur ℥i. cubitum ituro, & continuet.

Cauterium postea inustum cervicis posteriore regioni, à quo tempore licet præludia quædam paroxysmi sentiret, non tamen eo usque ut caderet, invaluerunt.

Postea pilulæ sequentes ordinatæ.

℥. Castor. assæ fœtid. an. ℥i. gummi ammoniac. sagapeni dissolut. in aceto scilicito. an. ℥ij. fellis bovis ℥ij. ol. succini, gutt. viii. cum succo rad. pœon. F. pilulæ pond. ℥i. capiat unam nocte cubitum iturus aliquoties, iterum etiam fuit purgatus sic.

℥. Pil. aggregat. ℥i. cum aqu. pœon. F. pilulæ, dejecit per biduum oëties.

Ut vinum sequens biberet injunctum.

℥. Rad. pœon. ℥iv. ireos, enul. camp. an. ℥i. fol. salv. majorau. chamæpit. an. ℥ij. sem. pœon. ℥ij. sem. fœnic. ℥i. incidantur pro duabus mensuris vini bibat singulis matutinis haustum. Ab eo tempore quo fontanella fluebat, sex septimanarum spatium, à paroxysmo liber fuit; & post vini præscripti usum, dicebat convulsivos illos motus seu palpitationes in pedibus cessasse, saltem in brachio remanere, quare etiam brachio cauterium fuit applicatum, ulcere inducto, dicebat se noctu ter aut quater sensisse convulsionem levem in digitis, sed non alibi, quapropter iterum pilulis aggregativis fuit purgatus, denuoque vinum prius præscriptum bibit per dies duodecim, cauteriumque tertium in sura pedis dextri fuit apositum, denuoque pilulis purgatus.

Cum



Cum adhuc sentiret reliquias aliquas, incepit hoc uti Electuario.

℞. Rad. pœon. pyrethri, an. ʒʒ. hyssop. sem. pœon. an. ʒii. mell. scillit. q. s. F. Electuarium, utatur singulis matutinis.

Postmodum sentiebat tantum, ut exponeret ab ulcere manus, vaporem per brachium ferri, & per cauterium brachii, & nuchæ, & suræ pedis evaporari, alioquin graviolem paroxysmum non sentiens *Felix Platerus, obser. lib. 1. pag. 24.*

℞. Conserv. flor. pœon. ʒiʒ. conserv. majoran. meliss. beton. & flor. rosmar. an. ʒi calam. aromat. zinzb. cortic. citri condit. an. ʒʒ. pulv. sem. & rad. pœon. visc. q. an. ʒi. ras. ebor. ʒʒ. cranii hominis pulver. subtiliter, ʒiʒ. cinamom ʒii. nuc. mosch. ʒi spir. plirisarch. ʒʒ. cum syrup. cortic. citri. F. Electuarium capiat alternis diebus ʒi. manè jejunos superbibendo Julepi sequentis ʒi.

℞. Aq. saly. meliss. an ʒii. vini alb. ʒi. sacch. rosat. perlat. ʒii. M.

Balsamolæo sequenti fricet Spinam.

℞. Gummi galban. bdellii in aq. vit. dissolut. an. ʒʒ. benzoin. ʒi. styrac. liquid. ʒi. fol. rut. chamæpit. flor. stœchad. lavendul. an. ʒii. rad. costi, ʒʒ. castor. ʒi. infundantur incisa & pulverisata in aq. vitæ. Stent in maceratione in calore per dies aliquot ante usum. Hec profuerunt Epileptico cuidam cordis palpitatione simul etiam laborante. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 236.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Epilepsia.

**P**ER triduum ferè paroxysmis epileptici corripiebatur puella infans, jussi succum rut. cum aceto fortissimo permixtum in spongia naribus adhibere; cujus usu statim ad se redibat, sed mox iterum recidivam patiebatur, brevibus tamen quando hæc naribus admovebat paroxysmis. Emplastrum hoc cordis regioni applicavimus.

℞. Thæriacæ veteris ʒi. rad. pœon. pulv. ʒʒ. M. item pulvere rad. pœon. capilli conspergantur, & sic præter omnium spem evant. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 29.*  
*Burnet Parte 1.*

Pueris applicentur cauterium actuale in parte capitis posteriore, & maxime iis qui obesoires sunt; estque præstantissimum remedium. *Florentia* ubi pueri valde sunt obnoxii huic morbo, etiam mulieres admovent cauteria actualia, ut torrem ignitum: idque habent in communi usu, edoctæ quotidiana experientia. Rusticæ pueros sacerdotibus deferunt, ut cauterio vel carbone ignito partem illam posteriorem urant, quod quidem maxime confert, si epilepsia facta fuerit per idiopathiam. In anti-qua Epilepsia aqua sequens mirificè confert, & potissimum in Paroxysmo data, illos subito excitat.

℞. Hirundin. num. 90. rut. Mii. castor. ʒi vin. alb. ʒiij. destillentur in Bal. M. & aqua serveretur usui: ex ea dentur cochlearia duo in paroxysmo, vel manè extra paroxysmum, precedente universali purgatione totius corporis & capitis. Valet etiam intus assumpta & extrinsecus apposita in convulsione & paralyti, sed magis in paralyti, & efficacior est oleis. *Guil. Rondeletius cap. 36. lib. 1. Methodi curand. morbos.*

℞. Sanguinis è vena aperta hominis sani collecti, ʒiʒ Rad. pœon. rec. incisæ, ʒij. sem. pœon ʒʒ. hyssopi, rutæ, an. Mj. cranii humani, ʒi. eliciatur per destillationem aqua, cujus datur ʒi. ad præcautionem. *Felix Platerus pract. tom. 1. lib. 1. cap. 2. pag. 73.*

Sanguinem ex homine sano decollato haustum Epilepsiæ præsens remedium plurimi commendant. Plurimi nostratum inter familiaria secreta habent sanguinem ipsius Epileptici. Extrahunt enim secta vena brachii in ipso convulsions paroxysmo parum sanguinis illumque ovo sorbili mixtum, ægro sorbendum propinant quod experimentum non paucos, & in urbe nostra, & extra illam ab insultu epileptico statim liberavit, & plane deinceps immunes reddidit. Sed post haustum liquorem, cordialia, pulverem bezoarticum, aliaque addunt, ut ad sudorem componatur æger, ita enim à sanguine proprio materia convulsions mota & turbata per sudorem discutitur, & evacuatur, pro amuleto Epilepsiæ habetur Lapis nephriticus collo sus-  
*pensus. Thomas Bartholinus, hist. 78.*

Experientia comprobatum est prid. *D. Jo-*  
*han-*



*hannis Baptista* sub radicibus artemisiæ evulsæ carbones reperiri, quorum ℥i. si in pulvisculum redigatur, & cum aqua stillatitia flor. tiliæ, aut flor. lil. convall. ebibenda offeratur, protinus ad Epilepsia ægrum liberatum iri. *Franciscus Joel. prædic. lib. 1. sect. 3.*

Quidam multa perhibent de carbonibus pridie *D. Johannis Baptista* sub radicibus artemisiæ evulsis, sed hallucinantur Authores, non enim sunt carbones, sed radices artemisiæ annosæ emortuæ multo sale volatili constantes: & semper ferè sub artemisia reperiuntur, adeo ut tantum superstitio quædam sit, quod radices illæ annosæ emortuæ pridie *D. Johannis Baptista* circa duodecimam nocturnam evelli debeant. *Fredericus Deckers* notis ad cap. 1. lib. 2. *prax. Barbettiana.*

Ad Epilepsiam inter multa alia commendatur pulvis secundinæ. *Idem ibidem.*

Quidam ultra viginti epilepticos uno anno sanavit hac ratione. Cane vivo dissecto, fel poculo excipiebat, & cystin felleam aceto eluens miscebat, mixturam potinuculæ instar ægroto exhibebat, quam si fortè vomitu rejiceret, ex alio cane repetebat. Eligebat autem juvenibus bimulum, senioribus, trimum scæminam feminis, & viris marem. *Jeremias Martius observ. 45.*

Insuave quidem remedium, sed quod spes sanitatis jucundius effecerit, quam crudelissimum sanguinis humani potum, cæterum eodem felle canino cum duplo vini cretici seu aq. picarum aut flor. tiliæ feliciter usum *Ludovicum Hermannum* idem hic *Martius* alio loco adnotavit, cum aceto sumendum, probeque à portione sudandum monet *Franciscus Hildeshemius. De capitis morbis, Spicileg. 7. Hier. Velschins* notis in *observ. 45. Ier. Martii.*

Epilepsia sæpius remedio arcano curata ab avo meo *Petro Gassero*, succo nimirum aquilegiæ cum succo vermium terrestrium æquis potionibus ad ℥i. diebus 40. continuis dato. *Achilles Gassierus, observ. 55.*

Dum anno 1659. medicinæ studii *Monsperii* incumberem; unus ex præceptoribus meis clarissimus Dominus *Salienus*. Practicus consummatissimus, perpetuaque memoria dignissimus, mihi tanquam se-

cretum insigne Emplastrum sequens ad Epilepsiam benignè communicavit, quo aiebat se plurimos etiam provectæ ætatis Epilepticos sanitati integræ restituisse, præmiis scilicet universalibus.

℥i. Gummi ammoniac. gummi juniperi, thuris & mastich. an. ℥ij. sem. pæon. maris suo tempore collect. & nuc. mosch. an. ℥iij. corall. rubr. præp. ras. eboris & Cervi, an. ℥i. malaxentur cum Styrace liquida, formanturque in Emplastri massam in sequentem usum.

℥i. Mass. Emplast. præscript. p. f. extend. super alutam vel pannum sericeum rub. & formetur Emplastrum magnitudinis & figuræ debitæ, ad movendum vertici & futuræ coronali calidè, detonso prius capillitio, ibidemque diu gestandum.

Hac etiam aqua hirundinaria in eodem affectu feliciter utebatur.

℥i. Hirund. adhuc in nido existent. numero viii. rad. pæon. visci q. an. ℥iij. fol. rutæ, Mj. flor. lil. convall. p. ij. caryophyll. maccis, an. ℥ij. cum sufficienti quantitate vini albi, aceti scillit. & aq. melliss. super cineres calidos infund. per 24. horas. Dein destillentur, atque in vase vitreo optimè clauso servetur aqua, dosis pro majoribus ad ℥i. ad ℥ij. pro junioribus ad ℥ss. ad ℥i.

## SUBSECTIO NONA.

### Pro Epilepsia.

**N**obilis quidam *Danus* in gravem Epilepsiam incidit, ex translatione peccantis materiæ à partibus externis ad internas: de dolores enim in aure interno prius conquestus erat, quo remittente, protinus successit hic affectus, non tantum ruta contusa & in aceto macerata laborantem à paroxysmo excitamus, guttulis etiam olei succini aliquot naribus per pennam immisissis, sed lenito quodam modo paroxysmo pro corroboratione cochlear unum atque alterum de spiritu ceras. nigror. item aliquid syrup. flor. pæon. cum spiritu vitrioli permixtum, & similia exhibuimus: capiti verò raso Emplastrum *Cratonis* applicare iussimus quod.

℥i. Succin. alb. thur. mastich. an. ℥iij. galbani,



bani, opopon. an. ʒi. visci q. ʒii. ambræ grif. gr. vi. mosch. gr. iii. sem. pœon. ʒß. ladan. ʒiß. ol. nuc. mosch. parum, ol. ros. q. s. extend. in corio, aspergatur pulvis cubeb. & futura coronali imponantur.

His remissionem gravissimorum symptomatum introduximus, ut æger mentis compos vicissim redderetur, & adstantes cognosceret, cum iisque loqueretur ad tempus, donec gravibus recidivis remorantibus, sequenti die naturæ debitum solveret. *Gregorius Horstius, obs. 21. lib. 2. De Morbis capitis.*

Puer quidam duodecim annorum perfecta ratiocinatione & articulado sermone destitutus, post paralytio dextri lateris in Epilepsiam incidit, ad eum vocatus ante omnia Phlegma, quare pulverem hunc purgantem præscripsi.

ʒ. Rad. pœon. ʒß. crem. tartar. ʒß. spec. diaturbith. cum rhab. ʒi. diagrid. cum ol. fœniculi præpar. ʒß. sem. anis. coriand. præp. an. ʒi. M. F. pulvis in duas partes pro duabus dosibus.

Ad cerebrum roborandum utatur interius per vices hoc pulvere corroborante.

ʒ. Pulv. marchionis, ʒiß. C. C. ust. præp. corall. rub. præp. an. ʒß. sacch. ros. tabul. ʒß. M. F. Pulvis.

Spinalem medullam & partes lasas hoc linimentum inungat.

Ol. de castor. lumbic. rutac. an. ʒiß. unguenti nervini, ʒvi. ol. fœnicul. distill. ʒß. M. pro linimento. Hisce aliisque ejus generis per semestre diligenter adhibitis, Dei gratia, non tantum ratiocinationis & loquelæ defectus corrigebantur, sed etiam pristino vigori restitutus puer, nihil amplius de subitaneo lapsu vel insultu conquererebatur. *Gregorius Horstius, obs. 41. lib. 2.*

Durante accessione alvus est irritanda glandibus & clysteribus acribus.

In os etiam vi apertum instillatur quod sequitur medicamentum.

ʒ. Ungul. alcis, ʒiß. sem. pœon. lign. visci q. an. ʒii. beton. ʒiii. cranii. human. castor. an. ʒiß. cum oxymel. scillit. F. pasta cujus ʒi. ex aq. hyssopi in os infundatur, vel palato affricetur. *Julius Caesar Claudius. consult. 130.*

Ut morbi causam præscinderemus, sin-

gulismensibus per diacydonitem purgatorium à nobis excogitatum, puerum (qui trium erat annorum) purgabamus, quem avidissimè puer ipse comedabat. Et ita habet.

ʒ. Cydon. mundat. ʒß. mell. vel sacchar. ʒß. aqua vel vino liquefiat, & fiat conditum ad ignem, cui adde spec. diaturbit. ʒii. M. F. diacydonitem purgatorium, cujus dosis sit pro vice ad ʒß. optime eo egerebat, ita enim *Galenus* monente, pueri qui pharmaca renuunt, purgandi sunt. *Amatus Lusitanus, cent. 4. cur. 22.*

## SECTIO DECIMA.

### De Epilepsia.

**P**ost evacuatum corpus venæsectionem & purgationem, verno, æstivo, & autumnali tempore, decocto radicum Cichorii uti rectissimum, hyeme mithridatica antidotus cum syrup. de succo Cardui, vel syrupus Cardui conveniens erit, destillatum autem cardui, & millefolii cum syrup. viol. toto anno probo, de quoquere etiam in iis lignum Guajacinum cum ligno visci q. & per dies viginti vel quadraginta, bibere vere & autumnno utilissimum Medicamentum de Cinabare non præscribo, cum *Fernelius* in libello suo *De Lue Venerea*, tam dira symptomata usum Cinabaris consecuta referat, Mihi, ne quid dissimulem, non per suadet, cum bono successu me eo usum esse *Vienne* vere affirmare possim. Stercus pavonis ex destillato cardui vel millefolii magis probo. Hepar ranarum & perdicum comestum plurimi commendant. Sed ego ut dixi nihil carduo & mille folio efficacius reperr. *Io. Crato conf. 4. lib. 1.*

Ante paucos dies *Thessalus* ille puero cuidam pulverem epilepticum ex cinnabare viva confectum dedit, non velim hoc facere, si omnes homines mihi autores essent cum robusta etiam corpora vix illius usum ferant, & quam graviter ferant viderim, Sed cum audacia illi proscientia sit, arte sua Medica *Fierdvanum* nebulonem pessimum, qui *Venetius* ejectus est, magistrum habuerit, hæc atque alia ab eo



designari non novum. *Io. Crato epist. 7. lib. 1. epist.*

Decoctum radicis Sassaphras, aut solum, aut cum vino singulare. Frustulum aloes perpetuò gestandum, ut cutem attingat. Lupietiam corium ea parte desumptum, qua spinæ adhæret, latitudine duorum digitorum in cinguli formam effingendum, ventrique & lumbis circumcingendum, & semper gestandum, ut corium attingat cutem, pilis exterius positis.

Cum primum pullus equinus in lucem prodiit, vomitu materiam quandam rejicit, quam nisi quis præripiat, mater statim devorat, hæc materia siccata & pulverisata, a morbo comitiali liberat certo experimento, ut mira quadam res videatur. Chalcantini olei ritè præparati gr. v. in jusculo manè sumptæ per multos dies plurimos ab hoc morbo liberant.

Theriaca etiam tam idoneum est morbi hujus remedium, ut ea sola quotidie liberentur multi: aqua etiam theriacalis plurimum prodest. *Hieron. Donzelinus, consil. 38. lib. 6. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Præscripseram nuper cuidam puero Emplastrum futuræ coronali apponendum, is tentatis multis remediis beneficio Dei convaleuit. Pharmacopœi conjux Emplastrum hoc aliis pueris epilepticis adhibuit, itaque tam multus de eo sermo, ut etiam senes bono successu uterentur. Descriptio Emplastri hæc est.

24. Succin. alb. thur. mastich. an. ʒiʒ. galban. opoponac. an. ʒi. visci q. ʒiii. Ambr. gris. gr. vi. mosch. gr. iii. sem. pœon. maris, ʒʒ. ladani, ʒiʒ. ol. nuc. mosch. parum, aspergatur pulvere cubebæ, & extendatur super alutam. *Io. Crato, epistola ad Iordanum, lib. 4. Epist. Cratonis &c.*

## SUBSECTIO UNDECIMA.

### *Pro Epilepsia.*

**Q**Uæ à tota proprietate huic affectui sunt accommodata non sunt negligenda, ex quibus omnibus confectum quoddam medicamentum nostrum sæpius

scilicet à nobis usurpatum hic describere non gravabor.

24. Sem. pœon. cranii hominis combustum, flor. anthos, cort. citri, an. ʒii. visc. q. rad. tormentill. ras. eboris, an. ʒi. M. F. omnium pulvis, cujus ʒi. cum aqu. pœon. ʒiv. jejuno ventriculo sex vel septem diebus continuis antè diem accessionis consuetæ propinetur. *Ioh. Zecchius, consult. 2.*

Vomitibus bis saltem in mense post Plenilunium & Novilunium à cœna excitatus mirificè hoc affectu laborantibus conferre solet. Sed omnibus præstare videtur medicamentum nobis sæpe ac sæpius comprobatum, quod tale est.

24. Cranii hominis violenta mortem defuncti, sem. pœon. an. ʒʒ. Rad. tormentill. lign. visc. q. ras. ebor. an. ʒii. conserv. anthos ras. conserv. acori, an. ʒx. syrup. de stœchade q. s. F. electuarium, cujus detur ʒʒ. quatuor horis ante prandium alternis diebus.

Experientia compertum est Smaragdum cum corallo gestatum, ita ut carnem contingat, epilepticas accessiones coercere. *Ioh. Zecchius, consultat. 44.*

Curat Epilepsiam acori radix contusa & potui indita. Fimus Ciconiæ bibitus, & pulvis cranii humani, si detur cum succo rutæ vel cum decocto pœon. visc. q. tormentill. & cubeb. Sumitur etiam quotidie ʒi. castor. cum decocto prassii per 14. dies id agitur. Pulvis lumbricorum terræ cum vino potus. Contunde rad. pyrethri cum melle ita ut fiat Electuar. detur ʒi. & superbibat decoctum stœchad. hoc agat semel septem dierum spatium, sed toto anno. Si ab utero sit Epilepsia, quæ puellabus frequens,umat bis in mense pilula foetidas. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 45. sect. 2.*

Radicem pœon. collo appendimus, ac in sorbitiunculis eam coquimus. Damus mel Scillæ vicibatam, hyssopo ac roremarino cibos coqui iubemus.

Cuidam juveni à manu repebat quid per humores in cervicem & caput; mox cadebat. Post provisionem habitam totius corporis, phænigmos adhibui manui, tum malum incipiebat ab humeris: illis caustica admovi; ac ut theriaca uteretur quotidie manè ad ʒi. jussi. Mox à lingua in-



debat & à genis, genis phænigmos admovi, perennique theriacæ usu summi Dei beneficio evasit. Sed diu mutus perseverabat, at loquella rediit tandem. *Ioh. Heurnius, ad aphor. Hippocr. 7. sect. 5.*

## SUBSECTIO DUODECIMA.

*Pro Epilepsia gravissima cum pulsu intermittente.*

**C**Um advenissem hominem veluti in agone mortis reperi, pulsus adeo erat variabilis, ut nunquam similem in homine qui evaserit, me observasse ausus sim affirmare, jam enim erat magnus & celer, jam tardus, rarus, inæqualis, formicans, parvus, & languidus, sed & (quod omnibus admirabilius est) aliquoties adeo intermittebat & quiescebat, adeoque deficiebat pulsus, ut æger jam animam effudisse videretur, non enim ictum unum aut alterum, verum quatuor aut quinque, aut etiam plures intermittebat, & ita quidem ut facillimè passus quatuor aut quinque, quiescente pulsu, per cubiculum fecisses, interim dum ita quiescebat pulsus, corpus appoplecticorum more, planè sine motu & respiratione iacebat, oculi aperti & fixi erant, & vix signum ullum vitæ in ipso observari potuit, nisi quod partes corporis imò ipsæ quoque extremitates suo calore naturali fruebantur. Ego cum advenissem protinus nares, labia & tempora succo rutæ (maximas istius succi in Epilepsia esse vires testantur viri docti) in quo nonnihil theriacæ dissolutum erat, inunxi, regioni cordis & carpi epithema calidè applicui & pulverem epilepticum & aliquantulum confect. alkerm. cum aq. lil. conv. l. pœon. & beton. exhibui. Sequenti die cum iterum præscriptam potiunculam sumpsisset, præter meam & adstantium opinionem melius se habuit: deinde observata victus ratione expurgatoque corpore, brevi restitutus fuit. In hoc autem casu videmus quid natura valida etiam præter spem & opinionem Medici præstare potest, quando quidem ego ut ingenuè fatear, cum pulsus ut dixi, non solum variabilem & summè imbecillem, verum etiam omnino intermittentem in ipso observassem,

*Burnet Parte I.*

mortem in propinquò esse adstantibus significavi; ille tamen quia juvenis & robustus adhibitis remediis idoneis, intra dies quatuor sanitati restitutus fuit. Respexi autem in prognostico meo non solum ad ea quæ quotidie in praxi accidere observamus: verum etiam ad locum illum *Galenii, lib. 2. De præcognitione ex puls.* ubi ita scriptum reliquit, si arteria duorum pulsum tempus moretur, haud scio an quisquam superstes esse possit, & eodem libro, naturalis arteriæ motus sanitatem refert; vitiosus morbum, intermissus mortem. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 22. cent. 4.*

## SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

*Pro Epilepsia.*

**C**Um piscator quidam bis, ter & sæpius quotidie Epilepsia corripere-tur, nec radix pœoniæ, cranium humanum, alcis ungula, aliaque remedia, à multis authoribus enumerata juvarent; accidit fortè ut legerem in *Fabii Columnæ* historia Plantarum, cap. *De Phu.* hæc verba. Præter has vires plantæ huic tributas, addo & hanc proprietatem jamdiu in multis, atque in memetipso expertam, quod pulveris radicis plantæ hujus spontè ortæ extirpate antequam caulem edat, cochlearii dimidium cum vino, aqua, lacte, aut alio quovis decenti succo semel sumptum, aut bis Epilepsia correptos liberet; hunc pulverem amicis dono dedi, deinde divino prius numine fautore glorificato, ejus usu illis restitutam sanitatem affirmarunt. Hæc sunt ipsius verba: & sicut ipse jubet, ita dedi, & sanatus est æger, & in posterum sæliciter hoc remedio usus sum. *Dominicus Panarolus, observ. 33. Pente-coste 1.*

Pulvere sem. saponariæ ante paroxysmos sumpto semel in mense per tria novilunia ad 3i. observavi paroxysmos valde minui tum numero, tum violentia; idque in filia viginti & quinque annos nata tentavi cum felici successu. Nota etiam herbam hanc signaturam hujus proprietatis habere, spumam enim, si in aqua fricetur, saponis instar emittit (unde ei nomen



inditum) sicque spumantibus epilepticis confert. Rutæ Mi. in vini amphora infusus, & per tres dies manè sumptus idem præstat. *Petrus Borrellus, observ. 18. cent. 1.*

Pavi stercoris pulvis cum vino ad Zi. luna silente deglutitus præstantissimum est remedium (si semel in mense sumatur per aliquot menses) ad sacri morbi paroxysmorum sævitiam compescendam imò ad curandam omninò. *Petrus Borellus, observ. 15. cent. 3.*

*Adrianus Spigelius* memoravit Nobilem Patavinum 19. annorum sæpius epilepsia conflictatum; quin quum à gravi de scalis lapsu, *Fabritius* ab *Aquapendente* cranio terebram admovisset, nunquam ex eo malum percepisse. *Ioh. Rhodius, observ. 66. cent. 1.*

*Cæsarem Palavicinum* aliumque Nobilem melancholia & comitiali morbo alternatim laborantes, & frustra à Medicis vexatos somniferis & lotionibus capitis; solo potu pulveris chysoliti ex vino, octo dierum spatio sic liberavi, ut nunquam morbus redierit. *Hieron. Cardanus, curat. 3.*

Dedit mihi Rex *Poloniæ Sigismundus Augustus* integrum pedem posteriorem dextrum animantis illius à secassi, eo ipso tempore quo dextram aurem unge pedis illius scalperet; quod quidem tempus fuit inter duos divæ Virginis *Mariæ* festos dies immediatè sese consequentes interjectum. Nam hæc omnia religiosè observanda dicunt, si unguis ille id quod creditur vulgò, efficere debeat, totum in multa frustra concisum distribui amicis, nemo tamen unquam adjutus est, expertus ego sum in aliquot comitialibus frustra: quæsi ex infinitis etiam superstitionibus, fabulas esse comperi, quæ ratio igitur est, ut tantum morbum tam leviusculo amuleto profligari muliebriter credamus. *Andreas Dudithius. Epist. 24. lib. 6. consil. & Epist. Ioh. Crat. &c.*

## SUBSECTIO DECIMA QUARTA.

### Pro Epilepsia.

**A**ncilla Epileptica usu oxycrati liberata est; cujus cyathum sumebat manè singulis diebus, & ante tempus in-

vasionis acetum purum. Curato morbo doloribus artuum correpta est, qui usu thermarum curati sunt. *Lazarus Riverius observ. 10. cent. 4.*

Puella duodecim annorum epilepsia frequenter corripiebatur, ad cuius curationem multa remedia frustra tentata fuerant, cum autem pleuritide correpta fuisset, pluries ei secta fuit vena, & ab eo tempore epilepsia nunquam correpta est, inde colligere licet, venæsectionem ad epilepsiæ curationem plurimum conferre. *Lazarus Riverius, observ. 38. cent. 4.*

Puer quidam trimulus patiebatur insultum epilepticum à quo liberatus fuit fumo tabaci, quem minister tubulo attrahebat, & insufflabat in os pueri apertum, vomitus inde illi concitatus est, & paroxysmus solutus. *Lazarus Riverius, observ. 60. cent. 2.*

Pueri fermè omnes, qui alvum adstrictam habent, obnoxii sunt convulsionibus, ut ex *Hippocr.* didici & experientia, filius meus adstrictione alvi perpetuò laborans convulsus periit. *Petrus Pachequus, observ. 50.*

Præmissis universalibus decocto guajaci semultosepilepticos curasse refert *Iachinus*. Continuetur autem per triginta vel quadraginta dies, singulis dosibus decocti sudorifici aliquot guttæ Spiritus vitrioli addantur, qui etiam specificus creditur ad epilepsiam.

Sequens opiata ad hunc affectum specifica est.

*℞.* Conserv. flor. anthos pœon. bugloss. an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cort. citri condit. Zi. pulv. visc. q. sem. pœon. decresciente luna collecti & ungul. alcis; an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cranii humani non humati ad albedinem calcinati  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cor. præp. marg. præp. & C. Cervi, præp. an. Div. lapid. Bezoard. veri Di. diamosch. d. & diatriasant. an. Di. theriac. vet. & Confect. de Hyacinth. an. Zi. spiritus vitrioli, gr. xv. cum syrup. condituræ corticiscitri F. opiata, de qua capiat ad magnitudinem avellanæ, superbibendo aqu. cinamomi parum.

Sequens vero efficacissima est ad morbum radicatus tollendum, post diligentem corporis purgationem.

*℞.* Conserv. flor. beton. & anthos an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . Rad. eryngii condit. & mithridati, an. Zi. Pulv.



℥i. Pulv. ligni sassaphras ℥vi. castor. ℥iii. crani humani non humati, ungulæ alcis, an. ℥ii. rad. & sem. pœon. sem. nigell rutæ Sylvestr. & rad. pyrethr. an. ℥i. oxymel q. s. F. opiata, de qua capiat ℥ii. vel ℥iij. reliquas omnes efficacia superat opiata *Montagnana*. cujus beneficio multi epileptici liberantur. (Ejus descriptionem vide supra *Subsect. 4.*)

Si cætera non profuerint, extremum remedium erit sinciput terebello perfodere, vitæ futuris, ut hoc veluti spiraculo aura maligna exhalare possit, hoc remedio aliquando desperatæ epilepsiæ curatæ sunt; & sine periculo celebrari potest, si periti Chirurghi manus adhibeatur.

Si conjectura sit, vapores ad cerebrum exhalantes à partibus inferioribus affectum producere, vel fovere, utilissimum erit causticum sincipiti admoveere, vitæ futuris: refert enim *Carolus Piso*, duos epilepticos hoc cauterio fuisse curatos, tum etiam si à partibus inferioribus affectus producat, aquæ acidulæ mirabiles sæpe effectus producant, & morbum interdum radicitus tollunt, si prius evacuationes universales, & venarum inferiorum sectiones celebrentur.

Peculiariter verò ab utero procedens Epilepsia curationem sortitur pulvere granorum actes à *Quercet.* descripto per triiduum exhibitò ad ℥i. cum aqua hysterica.

Utatur æger pro potu ordinario hydromelite, vel bochetto ex guajaco & rad. pœon.

*Crato* cinnabarim nativam epilepsiæ magnetem vocat, ex eaque talem pulverem parat.

℥. Cinnab. nativæ pellucide limatæ & in tenuissimum pulverem tritæ, ℥ss. corall. rub. & margarit. præp. an. ℥ij. croci orient. ℥i. fol. auri, num. 15. terantur omnia subtilissimè super lapidem, & M. dosis in ipsa accessione à gr. vi. ad ℥i. cum aquis appropriatis. *Lazarus Riverius, prax. Med. l. 1. c. 7.*

Si pueros, ut sæpe fit, Epilepsiaprehendat, primò Suppositorio vel Clystere alvus solvenda est. Postea & fere eodem tempore, purgans medicamentum exhibendum satis validum pro ætatis robore, ita ut non dubitemus in puerilis unius anni ele-

ctuarium diacarthami ad ℥ii. exhibere, si fiat ex lacte corrupto.

℥. Hier. pier. ℥ss. vel ℥i. pulv. de gutteta ℥ss. cum liquore specifico, vel cum melle rosato dentur. Cucurbitulæ scapulis & lumbis admoveantur, & cum scarificatione, si puer sit grandior. Vesicatorium applicetur posteriori parti cervicis. Si purgatio non rectè processerit, aut parum profecerit, vomitus provocandus est vitriolo albo præparato, veletiam sale vitrioli, quod bis, ter & quater exhiberi poterit, si affectus protrahatur. Pulvis epilepticus de gutteta vulgo nominatus, frequenter exhibeatur cum lacte, jusculo & panatellis, à ℥ss. ad ℥i. cujus hæc est descriptio.

℥. Rad. pœon. sem. ejusdem, dictamni albi, visci q. an. ℥ss. sem. attriplicis, ℥ij. crani humani, ℥iij. corall. rubr. præp. hyacinth. præp. an. ℥ss. alces, præp. ℥ss. mosch. ℥i. fol. auri, ℥i. M. F. pulvis.

Spina dorsi & membra quæ contrahuntur, inungantur sequenti linimento.

℥. Ol. rutac. lumbric. an. ℥ii. ol. castor. ℥i. aq. vitæ, parum. F. Linimentum.

℥. Theriac. vet. ℥i. Confect. alkerm. & de hyacintho, an. ℥i. aq. beton. salv. majoran. & cinnamom. an. ℥ss. M. Foveantur nares tempora & auresejusdem aquæ cochlear unum per os poterit exhiberi.

*SchenKius* exotericorum experimentorum, cent. 5. ex *Georgio Kufnero*, hæc habet. Pro Epilepsia puerorum expertum medicamentum. Detur de moscho sîno parum, ex mero subtili, bis vel ter in die, & sic perfecte curantur.

Dum hæc omnia fiunt, Clysteres semel aut bis in die injiciendi sunt in hunc modum compositi.

℥. Rad. arist. rot. polipod. q. sem. cartham. an. ℥ss. sem. pœon. cumini, an. ℥iij. flor. chamæm. & anthos, an. p. j. coq. ad sibi. de colatur. cape ℥ss. hier. pier. ℥iii. mell. anthos, ℥i. ol. rutac. & lilior. an. ℥iij. F. Clyster.

Inter specifica est fel. catelli lactentis, quod ab *Vntzero* his verbis prædicatur. Sume catellum parvum nigrum adhuc sugentem (pro fœmella epileptica sume catellam) eumque strangula, ac interfice, ex interfecti



& per sectionem aperti corpore extrahet totam cystim felleam vix tres vel quatuor guttas sinceræ bilis in se habentem illum biliosum succum omnem puerulo, in paroxysmo Epileptico, cum pauxillo aquæ florum tiliæ propina, & miraculi instar videbis illum ab hoc morbo è vestigio sanari & curari. *Lazarus Riverius, prax. Med. lib. 1. cap. 8.*

## SUBSECTIO DECIMA QUINTA.

### Pro Epilepsia.

**Q**uidam ab aliquot annis Epilepticus, si quandoprehendendus esset paroxysmo, auram quandam frigidam ex crure, itemque ex brachio quasi ascendere sentiebat, moxque concidebat. Suasi itaque post adhibita variæ medicamenta, ut sentiens vaporis ascensum, partem ligaret; id quod præstitit, sicque semper paroxysmum inhibuit. *Philippus Salmuthus, observ. 90. cent. 1.*

Rusticus quidam longo tempore morbi comitalis paroxysmis frequenter conflictatus nullo remedio curari potuit; donec febre quartana superveniente, ab eo liberatus fuerit. Ita enim *Hippocrat. Aphor. 9. Sect. 6. lib. 6. Epid.*

Quartana laborantes nullo magno morbo corripuntur, si prius autem corripiantur, & quartana superveniat, liberantur. *Gallenus* in Comment. nomine magni morbi Epilepsiam intelligit. *Philippus Salmuthus, observ. 84. cent. 2.*

Nobilissima quædam domina Epilepsia penè hæreditaria diu afflictæ, irritis omnibus remediis, ab excellentissimis Medicis præscriptis, tandem solo pulvere veri querini ad ℥i. quantitatem in aq. ceras. nigr. vel cerevisia singulis matutinis per dies aliquot circa plenilunium exhibiti, sanitatem obtinuit. Licet nullam habuerit medicamentum sensibilem operationem, tamen post primum diem: nisi unum paroxysmum passa est *D. Robert. Boyle Tractatu de Utilitate Naturalis Philosophia part. 2. sect. 5. cap. 7.*

Inter alia ungula alcis circumferenda est in annulari digito. *Guil. Ballonius, consil. 60.*

Retulit *Iacchinus* in Epilepticorum curatione, se semel viscum quercium ea ratione qua ligno guaiaco utimur, per dies 40. propinasse, & profuisse quidem non tamen morbum abstulisse neque licuisse iterum id remedii in facilior morbo experiri. *Iul. Cesar Baricellus* in hortul. genial.

Ungula alcis præsentanea vi pollet adversus morbum comitalem, quod multis experimentis comprobatum habeo, dicet mihi ratio visa sit obscura, semel atque iterum contingit, ut muliercula quædam in ædium nostrarum vestibulo, tamquam fulmine icta, concideret; quod ubi essem conspicatus: accedo proprius atque annuli gestamen, cui alcis particula inferta erat, digito qui infimo proximusest infero, illa è vestigo erexit se in pedes, potuque refocillata iter inceptum alacriter peregit. *Levinus Lemntus, lib. 2. De Occultis Naturæ Miraculis, cap. 3.*

*Petrus Merenda* scribit, in comitali morbo admodum vehementi, exiguo intervallo sæpius repente, nec aliis remediis cedente, se quam plurimos per admota collo prope scapulas rubificantia medicamenta, donec vesicæ exsiccarentur, brevi temporis spatio ad pristinum rationis usum frequenter perduxisse, & ab accessionibus liberasse, qui deinde decenti curatione, ad ingentem sanitatem perducti fuerunt: Sed hoc faciendum est post purgationem, nisi morbus urgeat, sed neque hæc, neque setones, neque cauteria conveniunt circa caput, nisi morbus cerebro sit essentialis, ut fiat diversio à cerebro. *Iacobus Hollerius, lib. 1. De morbis internis, cap. 15. in Scholiis.*

## SUBSECTIO DECIMA SEXTA.

### Pro Epilepsia.

**I**lluſtris Neogamus amore formosissime puellæ, quam jam quintum deperiebat annum, potitus, in arcem milliari à Leodio disſitam eam ducit, ibi cum amore se pulcherrimo ad ſatietatem explet, depleri facultatem animalem, puriſſimamque ſpirituum partem abſumi non ſentens, Epilepsia corripitur, ad volo ego  
cita-



citato equo; atque à paroxysmò excitato; album pavoninis excrementis, derafum, in decocto mille folii (erat casu ad manum) propino, à cujus sumptione cum aliquot horas liber fuisset, iterumque corripere-  
tur, antepilepticum Serenissim. Ernesti Principis mei, quod oleum heracleum, qui ingenti pretio ipsi vendiderat Chymista indigitabat; Leodio adferri curavi; quo bis terve sumpto, per omnem vitam ab Epilepsia immunis fuit, ejus olei, quod sæpe sidum expertus sum, descriptionem hic ponam.

24. Vitrioli veneris, aut viridis agris calcinati, lbss. cranii humani, ungulæ alcis, an. ℥iii. visci querni (malim colurnum) sem. pœon. maris, an. ℥i. cum spiritu vini rectificatissimi lbii. digere in retorta & distilla S. A. ingratißimum est hoc oleum, & odore & sapore, sed miræ efficacix, si cum aqua convenienti sumatur. Huic omiſſis universalibus, quia ob virium imbecillitatem mortem timebam, solis antidotis consulvi, monuique meminisset, dicere stagiritam naturæ ocellum, synusiam seu coitum esse parvam epilepsiam, à parva autem ad majorem proclivem esse transitum. *Henricus ab Heers, observat. 18.*

Puella quædam ab ebriis duobus ad stuprum sollicitata, in epilepsiam ex subito terrore & animi consternatione incidit gravissimam. Ad illam accersitus, duas quæ lecto adstabant famulas rogo, quoties concideret; jam videbis inquit, adhuc loquebantur, cum se vißimè convulsa fuit, lecto affixus, observo illam duos utriusque pedis pollices confricare, nec ullam in illis movendis, quoties paroxysmo libera erat quietis partem interponere, extemplo curo beri butyrum antimonii, ex æquis antimonii crudi & mercurii sublimati concinnatum partibus: quo utrique pollicum applicito, vesicisque magnis excitatis, iisque abscissis, demum carne ad ossa ablata, ab omni paroxysmo, triduo liberrima fuit: quarto die cum levissimè convulsam domesticici dicerent, sumpto antepileptico, ex cranio hominis, pavonino excremento, vesica apri cum lotio in furno siccata. visco colurno, oleo succini inodoro, aquisque eirci dicatis apprimè facto, nunquam po-

stea vel umbram convulsionis sensit. *Henricus ab Heers, observ. 24.*

## S U B S E C T I O XVII.

### Pro Epilepsia.

**P**Ræmissis universalibus vomitivis & catharticis exhibeantur specifica qualia sunt. Primò, Hepata ranarum quæ sic parentur, ex quadraginta ranis viridibus aquaticis vivis jecinora exime, & sigillatim pone supra folia brassicæ capitata ad eam partem qua terram respiciunt, ita ut se invicem contingant; postea in ollis devitreatis & recentibus superius tectis, exsiccantur, ad lentum ignem, ita ut in pulverem tenuissimum teri possint, à foliis cautius separata. Postea divide pulverem integrum in quinque partes æquales, & usui serva, partem unam exhibe patienti jejuno ventriculo in haustulo aque vel spiritus ap. propriati, cùm Luna ingressa est cancerum: vesperi duabus horis à cœna alteram partem, atque sic consequenter postero die manè tertiam, vesperi quartam; tertio die ultimam partem manè, ubi tamen observandum semper ante & post sumptionem pulveris duabus horis ab omni cibo & potu abstinendum esse. Si patiens post sumptam hanc medicinam in fronte & temporibus sudet, testimonium est operationis exquisitæ, itaque si post tertiam, quartam & quintam exhibitionem sudor provocetur totius corporis, vel in lecto, vel laconico, effectus sperandi sunt uberiores. Hic pulvis mense *Majo, Junio, & Julio*, usque ad medietatem *Augusti*, tantum confici potest, extra hæc tempora ranæ inutiles sunt, ultra annum non durat, vix dici potest quantum emolumenti ab hac medicina simplici accedat. Hoc remedio restitutus est *Fredericus quartus Palatinus* qui ab anno quindecimo ætatis ad vicesimum sextum epilepticus fuit.

Secundò, Amuletum ex frutice sambuci in salice inventi, colligatur frutex quolibet mense, melius tamen *Septemb. & Octob.* quando maturuerint grana sambuci ante plenilunium diebus duobus, & reserve. tur usui (servari potest annos duodecim) teneriores saltem furculi sufficiunt, usus talis



taliseſt. Seca ſurculum unum tenuiorem in taleolaſtenus, & quantum fieri poteſt integras: earum novem redigantur in nodulum, vel ex linteo vel ſerico confectum & cum ſimplici filo lineo ſuſpendatur collo uſque ad orificium ventriculi, ut rectè noduſeò pertingat, applicetur poſt univerſalia, & relinquantur tam diù donec ſpontè ſua citra omnem vehementiam rumpatur filum & nodulus videatur cadere, quem deinceps neque patiens, neque ullum animal nudis manibus vel pedibus tangat, ſed mediante aliquo instrumento vel forcipe, vel alio, ſepeliatur ſubtus terram, eo in loco, ubi neque animalia pertranſire poſſint. Secus ſi tetigerit, morbus epilepticus denuò invadet eum; vel alios antea morbum non paſſos corrumpit, id quod ſtudioſè eſt evitandum. Hoc amuleto curari poſſunt & ii, qui longiſſimo tempore hoc morbo laborarunt. In adultis ſoleo ex majoribus ſurculis excavatis facere cannas, per quas tempore geſtationis amuleti omnem ſuum potum hauriunt. *Ioh. Hartmannus. Pract. Chimiatr. pag. 67.*

*Hartmanni* amuleto ex frutice ſambuci in ſalice inventi, plurimi epileptici ſalutem ſuam debent. Medicus quidam noſtræ urbis exercitatiffimus pluſculos ſolo iſto amuleto reſtituit, præmiſſis præmittendis.

Sartor Juvenis *Haſſiniensis* tumido ventre diu aquam inter cutem collegerat, nullis adjutus medicamentis, tranſmiſſo ad cerebrum ſero copioſo, epilepticus evaſit. urgebat viginti & quatuor horis paroxyſmus, & miſerè torquebatur, ſed appenſo amuleto, imminutus primum paroxyſmus, mox planè remiſit, hydrops verò tractu temporis alvi fluxu ſuperveniente detumuit. *Thomas Bartholinus, hiſt. 69. cent. 4.*

## SUBSECTIO DECIMA OCTATA.

### Pro Epilepsia.

**A**Nno 1598. Juvenem *Lausanna*, quindecim annos natum, curandum habui, qui ſingulis ſerè diebus, ſemel ad minimum, acceſſionem epilepticam patie-

batur, cuique ob id multa, ſed fruſtra; præſcripta adhibebantur remedia. Ego purgato corpore pilulis aureis & cochiis, inſtitutoque regimine optimo, ſetaceum ipſi adhibui, hinc acceſſiones remiſerunt, & paulatim ab Epilepsia liberatus fui t, corpore eius poſt leniter aliquoties purgato. *Guil. Fabrit. Hildanus, obſerv. 41. cent. 1.*

Inter amuleta præcipuè commendatur Smaragdus, nam ſi è puerorum collis pendeat, eos ab epilepticis paroxyſmis tutari creditur; digitis etiam geſtatus comitialem morbum impedire omnes authores aſſerunt; eamque habere facultatem, ut ſi morbus ita vehemens ſit, ut ſuperari a gemma non poſſit, eam in partes diffringi, itaque vel tollere morbum, vel frangi quaſi pugnando à potentiore devictam *Anſelmus Boetius. De Lapid. & Gemm. libr. 2. cap. 53.*

Refert *Arnoldus Villanovanus* grana x. corall. rubr. ex materno lacte infanti primum nato exhibita ante omnem alium cibum vel potum, efficere ne unquam in vita epilepsia corripiatur: quod *Camillus Leonardus Medicus Piſaurenſis*, frequenter ſe expertum fuiſſe teſtatur. *Anſelm. Boetius. De Lapid. & Gemm. libr. 2. cap. 154. & Volfgangus Hæſerus in hercul. Medic. libr. 7. cap. 6.*

*Cæſar* in Epilepticis hoc remedium præmaximo ſecreto habet, & ait *D. Petrus Cavierum* etiam homines provectæ ætatis, & qui diu hoc morbo fuerint obnoxii, poſt purgationes curaffe.

℞. Cryſtall. præp. ℥i. corall. rub. præp. ℥ii. margar. orient. ℥i. ſmaragd. orient. ℥ß. M. F. Pulvis, cujus media pars eſt doſis in aq. taraxaci, bis feci periculum, ægri liberati ſunt ab Epilepsia, ſed poſtea tamen obierunt, Cryſtalli uſum non exiſtimo eſſe tutum, & Smaragdus, quo vulgo utuntur, non eſt verus. *Io. Crato. Epiſt. 14. libr. 5. conſil. & epiſt.*

*Crato* exiſtimat cryſtalli uſum non eſſe tutum, verum contra probatur ab aliis Medicis, ut *Antonio Guainerio, Ioh. Langio, & Anſelmo Boetio*, & experientia aliquoties docuit, ejus uſum non ſolum tutum ſed & utilem eſſe.

Nec refert, quod ægri, qui ex uſu pulveris



febris antea descripti ab Epilepsia liberati sunt tandem obierint; alia enim obitus causa, non Crystallus esse potuit. *Daniel Sennertus. practic lib. 1. parte 2. cap. 31.*

Semen pœoniæ maris collo subnexum vim habere experimus, & ungulam alcis vel appensam, vel annulo inclusam vidimus Epilepticam accessionem cohibere. *Ioh. Fernelius, consil. 1.*

Pro epilepsia infantium. Quando infans deambulare inceperit, si ab hoc languore vexetur, propinetur syrupus ex succo cichor. manè cum urina ipsius calida permixtus. Hæc enim potio suaviter solvit ventrem & educit phlegma, & à tota specie curat morbum lunaticum. Non omitam quod gratia Dei mihi collatum utile ad sanitatem huius infelicis languoris: fateor me expertum in quàm pluribus infantibus, quod suspensio pœoniæ & ligni quercini usti cum argento curant in tota specie morbum caducum, & lapis smaragdi similiter. *Socrates* recitat hoc experimentum pro mirabili & electo. In pullis, inquit, hirundinum inveniuntur duo lapides, quorum est rubeus, alter albus: albus quidem, lunatico cadente, appositus levavit eum; Rubeus autem acceptus & ligatus in pelle collo ei apponitur. Lapis smaragdus deferentes cum in annulo à morbo caduco liberat. Propter hanc causam docentur Reges suspendere in collo puerorum suorum, statim quando nascuntur ne superveniat iis morbus caducus. *Arnoldus Villanovanus, lib. de Epilepsia cap. 4. & 24.*

Emplastrum hoc roborans occipiti admoveatur.

℞. Storac. benjoin. ladam. an. ℥iv. rad. pœon. ireos, flor. visc. q. mastic. an. ℥i. styrac. liq. q. f. f. emplastr. massa.

Exhibeantur guttulæ aliquot mixturæ spiritalis cum liquore idoneo. Olei succin. gr. ii vel iij. cum pari quantitate spir. vitrioli in aq. beton. Exhibita puerulos à paroxysmo epileptico statim plerumque liberant. Idem oleum naribus illicum multum confert. Oleum etiam buxi utiliter hic exhibetur. Ad præservationem ab hoc morbo, recens natis, antequam lactare incipiant, detur Pulv. de guttet. ℥i. cum pauculo lacte, eademque dosis ter repetatur intra 2. dies. Iisdem vero post aliquot dies à par-

tu, tum etiam iis qui semel epilepsia correpti sunt, causticum occipito inurere utilissimum est: Purgetur puer bis in mense cum manna, syrup. ros. aut de cich. cum rheo. Singulis interluniis capiat dosin pulv. de gutteta. Paretur cucupha cerebrum roborans, & suffumigium pro tegumentis capitis. Nonnulli denique ad præservationem hoc remedium comendant.

℞. Spir. vini lib. .iv. castor. ℥i. rad. pœon ℥iij. macerentur & colentur. Colatura totum corpus infantuli abluatur calidiusculè. *Lazarus. Riverius Prax. Med. lib. 1. cap. 8.*

Chimici valde commendant mixturam spiritualem, qua in Epilepsia nullum medicamentum præstantius exoptari posse asserunt. Illius compositio talis est.

℞. Spirit. vitrioli part. i. spir. tartar. part. iij. aq. theriacal. camphor. part. iv. M. & vitro bene clauso per 3. aut 4. septimas digerantur. Dosis est ℥i. in convenienti vehiculo. *Lazarus Riverius, Prax. lib. 1. cap. 7.*

Cornu cervi ustum hic utile. Quotidie ad mucrones aliquot vel per se, vel cum syrup. de pœon. aut aq. cinam. exhiberi poterit. Hoc modo præparetur. Primum contundendo redigatur pulverem, deinde teratur super marmor affundendo aq. pœo. flor. tilia, aut lilii conval. tamdiu teratur donec justam spissitudinem aquirat. Componantur, planetur, & decussatim scindendo dividantur; servetur ad usum. Inter omnes pulveres ad hunc morbum valentes, præstantissimus judicatur pulvis cranii humani præparati. Pro secretis habetur stercus leonis & ciconiæ in prædictis aquis sæpius propinatum. Vulgus stercus boum juniorum ligat in petia intingit aq. flor. tilia, exprimit & patienti bibendum dat. Præ ceteris commendatur vesica apri cum lotio suspensa & exsiccata in furno, & lento igne in pulverem usta, cujus itidem aliquid pueris in aq. flor. tilia exhibetur. Ex amuletis præstantissimum est lapis in pullorum ventriculis inventus in aluta cervina ligatus & de collo suspensus *Solomon Albertus apud Ioh. Philippum Brendelium. Consil. 18.*

Epilepsiam, experimento certissimo videtur

In lugar de febris debe de dar seis para que se guarde el diámetro  
a pesar de la equivocación de los nombres que se le dan a los



dux cujusdam hoc remedio se suamque familiam sustentantis, curari per pulverem ex ovis coturnicis factum testatur Illustris Domina quædam. Exsiccantur paulatim ova, ut in pulverem teri possint; de hoc exhibetur pro dosi ℥ss. vel ℥iij. Sic provida natura ex eadem avicula, etiam ut perhibetur epilepsie obnoxia, promit remedium. *Wolfgangus Hæferus, lib. 1. Herc. Med. c. 2.*

℥. Piper. cinam. nuc. mosch. an. ℥i. bulliant in cervis. ℔iij. ad ℔bi. Dein accipe fel. canis majoris vel minoris pro diversa ætate agrotantis affunde bilem omnem in vesica contentam prædicto liquori, & ebibat, abstinendo à potu per duas horas. Dein capiat haustum secundi decocti super eadem aromata. Hoc ego remedio empirico puerulum epilepsia diu & quotidie correptum post universalia, *Dei Opt. Max. beneficio restitui. Nunquam fefellit hoc pharmacum empiricum quendam nomine Stevartum.*

*Wederburnus* pulverem suum antepilepticum unice prædicat, & ejus eximias dotes multum extollit, cuius ope quam plurimos curavit puerulos. Descriptio sequitur.

℥. Ras. ungu. alcis, spond. an. ℥i. rad. pæon. mar. sem. anis. succin. alb. præpar. c. c. præp. an. ℥iij. cranii humani præp. ℥ss. cal. arom. visc. q. ras. buxi, ebor. & lign. Rhodii. an. ℥iij. magister corall. rub. rad. valerian. Sylv. corallin. an ℥iij. flor. beton. salviæ, lavendulæ majoran. roris mar. an. ℥i. nunc. mosch. ℥iv. fol. auri & argenti an. mum. 15. M. Dos is à ℥i. ad ℥iij. ex posseto salviato. Compositioni Ambr. grif. ℥i. addi poterit. Non contemnendum pro epilepsia est sequens remedium à Doctore *Jolly* in usum sæpius vocatum.

℥. Stercor. pavon. exsic. ℥i. flor. tunicæ ℥iij. M. & infund. in aceti ℔i. Capiat coch. j. è colatura sæpe. Clarissimus *D. D. Robertus Cunninghame* Medicus celeberrimus in M. S.

Pulvere hoc antepileptico in plurimis cum laude sum usus.

℥. Stercor. pavon. alb. in umbra optimè siccati ℥iij. talpæ totius præter cutem optimè in clibano post exemptum panem siccatæ ℥ss. secundine mulieris primiparæ mas-

culum enixe ℥vi. Rad. pæon maris, valerian. Sylv. & visc. querc. ℥iij. CrySTALLI rupis & fragmenta tor. smaragd. rite præp. an. ℥v. Rad. contraverv. & viperinè Virginianæ, an. ℥iij. f. omnium pulvis subtilissimus addendo Ambr. grif. ℥i. Dos is ℥ss. cum aq. ceras. nigr. & flor. tilix exhibita. Eum Illustrissimo viro *D. Theodoro de Mayerne* acceptum, fero; qui si per anni tempestatem licebat jecinora ranarum viridium, nequid pulveri deesset, addere solebat. *Fredericus Lossius, lib. 1. observ. 11.*

## SECTIO QUINTA.

### De Epinyctide.

**E**ΠΙΝΥΚΤΙΣ (sic dicta quod noctu oboritur, & noctu hominem vehementius excruciet) pustula est pessima, circa quam vehemens inflammatio conspicitur, cum ingenti dolore subrubra est, & quadante nus livescens, noctuque potissimum affligit. Sponte exulceratur, ex eaque subcruenta sanies emanat, speciem habere cognoscitur carbunculi, causamque similem sed quæ nullius malignitatis particeps, levior existat: quemadmodum & ejus pustula carbunculo minor: fabæ enim est magnitudine.

## SUBSECTIO VNICA:

### Pro Epinyctide.

**P**urgato prius decenter corpore, brassicam crudam contusam imponere mandavimus quæ sola satis fecit ad curandum hunc effectum; imponitur etiam Cicuta cum melle trita, solanum etiam per se, & cum Coriandro viridi; hyoscyami item folia cum melle pertrita admoventur, aut olivæ folia cum aqua cocta. *Petrus Forestus obser. 16. lib. 1. observ. Chirurg.*

Cum nullis remediis epinyctides potuissimè curare in atrabilario venatore, mulierculæ consilio illitæ fuerunt oleo juniperino, & vir ille placidè dormivit, cum antea infomnes noctes duceret, & sanatus fuit. *Petrus Pachecus observ. 7.*



## SUBSECTIO SEXTA.

## De Epiphora.

**E**πιφωρη (à ὀφρῶ ferò) est immoderata tenuis humoris fluxio lachrymarum specie in oculos præter naturam facta, humor qui fluit, modò frigidus est & aqueus nullo dolore molestus, modò acer est, aut falsus, dolorem ardorem & ruborem, imò nonnumquam palpebrarum exulcerationem inferens, Symptoma est in excretis. Hujus affectus causa proxima est humor excrementitius, à capite vel aliundè à parte aliqua corporis in angulos oculis influens. Causæ disponentes sunt partis affectæ imbecillitas, roburque mittentium.

## SUBSECTIO VNICA.

## Pro Epiphora.

**P**uellæ cuidam novem annorum ex uno oculo lachrymæ ultro effluebant, quæ frigida erant, neque oculum corrodabant. Erat autem puella pituitosa & catarrho obnoxia, præmissis universalibus ut sequenti collyrio uteretur mandavi, quod omnibus convenit in quibus malum perseverat.

℥. Aloes, nucis cupr. thuris, mastich. myrrh. an. ℥ij. tutiæ præp. sarcocoll. nutrit. an. ℥i℥. sang. drac. herbar. fumach. ros. rub. an. ℥i. pulverisentur tenuissimè & excipiantur aqua fœnic. & fiat collyrium, cuius ope ab hoc malo liberata est. *Petrus Forestus, observ. lib. 11. De morbis oculorum.*

Epiphoram calidam in muliere quadam ita curavi, corpore repurgato & vena secta, collyrio sequenti utebatur.

℥. Troch. alb. rhasis sine opio, ℥i. aq. ros. vel peculi ros. ℥iij. aq. fœnic. (ne ob refrigerationem obtundatur acumen visus,) ℥ij. M. F. Collyrium.

Si illud non juvaret consului ut sequenti uteretur.

℥. Ceruss. abluta, sarcocoll. nutrit. licii, acaciæ, thuris, an. ℥i. ossium myrobal. adustor. corall. alb. rub. an. ℥℥. margarit. ℥℥. succi mali punici ad dimidii

absumptionem cocti, q. s. F. Collyrium. Solus etiam malorum punicorum succus coctus, donec dimidium absumatur, lachrymas calidas curat. In hac Epiphora commendantur etiam cauteria retro aures *Rondeletius*, potius laudat cauterium supra commissuram. Vetula quædam in *Italia* cum oculos haberet lippientes, lachrymantes & saniosos, cum intenso dolore & prurigine, & nullis remediis posset curari tandem raso capite emplastrum vesicatorium impositum est; excitatisque vesicis ac rupis, butyro imposito, ac demum caulis folio, quo præsidio perfectè curata fuit. Vesicatoria etiam in collo egregiè profunt. *Petrus Forestus, observ. 12. & Schol. lib. 11.*

Pro singulari experimento habetur hoc unguentum.

℥. Æugin. æris, gr. xij. camphoræ, ℥i. tutiæ præp. ℥℥. butyr. rec. quod cum aqua ros. liquefiat, & parum bulliat, ℥vi. M. decenter ut fiat unguentum. Indatur pisi magnitudo in oculi canthum majorem leviterque inungantur palpebræ. Est ad Epiphoras & pruritus oculorum, singulare experimentum. *Felix Platerus, tom. 2. prax. med. pag. 279.*

## SECTIO SEPTIMA.

## De Erysipelate.

**E**ρύσιπelas (Latinis ignis sacer, vulgò rosa) tumor est biliosus cum ardore vehementi per corporis summa, diffusus, nec tumore manifesto extuberat, nec partem attollit, nec penetrat in subjectam carnem, sed larè diffunditur, nulla collectione circumscriptum, quamcunque partemprehendit, vehementer mordicat & urit. Color inest ex rubro flavescens qui pressu subter fugit, moxque redit, dolor nec pulsans, nec admodum vehemens. Est autem duplex, unum quod simplex Erysipelas dicitur, solo rubore & ardore; nulla exulceratione molestum; alterum quod ignis sacer appellatur, atque exulceratum erysipelas, ejus origo est è fervente tenuissimoque sanguine qui vulgò biliosus appellatur, cum febre semper invadit. Erysipelas nothum aliud est phlegmonodes, quod tumentius quidem sed minus fer-



fervidum existit, aliud œdematodes, & aliud scirrholes.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Erysipelate.

**H**oc pro arcano accepimus, si sperma ranarum Martio mense collectum, in Alembico destillatur, & ille liquor destillatur cum petiis linei applicetur Erysipelati, egregiè prodesse.

*Bened. Faventinus* in Erysipelate, si tumor adesset, sanguinem mittebat è Basilica; si autem esset absque tumore, tantum cuti inherens, à phlebotomia astinebat.

Detur hæc potio.

℞. Cassiæ ℥i. el. de succo ros. ℥ss. cum aq. endiv. F. potio, ab evacuatione statim alterandum est in hunc modum.

℞. Syrup. de ros. de succo endiv. de succo acetos. an. ℥ss. aq. plantag. & ros. an. ℥i. M. deinde hæc apposui.

℞. Succ. plantag. solan. semperviv. an. ℥vi. aq. ros. ℥iij. M. cum petiis infusis appone, cum verò diutè petiè incipiunt calesceri, statim eas amovere oportet, Preceptor meus valde attramentum commendabat, si eo Erysipelas integeretur, ob frigida & styptica ingredientia attramenti, vel inungebat petiam unguento de cerussa & apponebat. Vel,

℞. Ung. de cerussa ℥vi. succ. plantag. ℥ij. aq. ros. ℥i. M. & eo extenso supra petiam Erysipelati apponatur, vel hoc quo sequitur valens in augmento.

℞. Lithargyr. argenti, ℥vi. succ. plantag. ℥iij. ol. ros. ℥ij. aceti opt. ℥i. M. Omnia in mortario plumbeo benè ducantur quousque fiat unguentum participans de colore plumbi, extend. super petiam, & apponatur, permutentur hæc manè & vesperi, tamdiu donec certus fueris de augmento & statu ejusdem. Cum verò declinare cœperit; quod cognosces ex mutatione coloris ad album vel rubrum, tunc siste gradum ab applicatione frigidorum ob metum mortificationis partis, & illorum loco hoc fotu foveatur.

℞. Flor. Chamæ. melil. fœnugræc. an. Mss. bulliant in aq. q. s. & facta quoti-

diana fomentatione cum petia madefacta in liquore dicto, abluatur locus cum modico vini albi odoriferi calidi. Hoc enim est quod prohibet futuram membri mortificationem ex Erysipelate. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 2. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Erysipelate puro in crure.

**P**ost exhibitum infusum rhei cum sero lactis & syrup. viol. terram cimoliam ex furno cum butyro instar pultis mixtam circa suram apposuimus, & statim Erysipelas curatum est.

Cum hæc colligerem cognata quædam mea erysipelate legitimo in crure sinistro circa talum ad suras sursum ascendente correpta est. Ad hoc curandum, epoto hoc pharmacoquinquies alvum deposuit.

℞. Fol. sen. ℥iij. sem. anis. ℥ss. infund. in ℥v. decocti communis, facta ebullitione levi & fortiss. express. adde syrup. ex infus. ros. ℥i. M. cruri autem apposuimus pultem ex lacte & pane silig. neo contrito & pulvere terræ cimoliæ quæ exterius furnis circumducitur, estque grisea, & vocatur apud nostrates vulgari nomine *Clep*: cum ter quaterve hoc emplastri modo apposuissemus, dolor sedatus est, & rubedo evanuit, & ab Erysipelate curata est. In alio etiam profuit terra hæc Cimolia in parte externa furni collecta, & cum butyro trita instar pultis apposita. Hoc enim arcano etiam plures alii ex erisipelate phlegmonoso curati sunt per me, alii quoq; hoc sequenti experimento usi sunt ad erysipelas tam purum quam phlegmonosum, quod constat ex vitellis ovorum duris & sale contritis. Hoc enim solo remedio plurimi curati sunt. *Petrus Forestus observ. 2. lib. 2. Observ. Chirurg.*

Extra stupam cannabinam farinà hordei & pulvere liquir. conspersam aplicui, in horas ob calorem mutandam, præscriptis actu frigidis, adstringentibus, & præcipuè humidis. *Baltassar. Timæus Casus 38. lib. 4.*

Inter plura ignis sacri genera *Isidorus* numerat *Plinius Nat. Hist. lib. 26. cap. 11.* qui medium hominem ambiens si cinxerit eum ene.



enecat ; quo Marchionem *Brandeburgensem* interiisse, Principem verò *Palatinum* sanitati à se restitutum refert *Langius lib. 1. Epist. 32.* Corripiebatur eodem honesta matrona jurium practici vidua, quodcum præ pudore dissimularet, & tibiam saltem eodem igne inflammata & exulceratam Chirurgo tractandam exhiberet, accidit ut altero illo subito invalescente & in gangrænam desinente, ægra præterspem placide expiraret, paulò ante mortem & superioris illius inspiciendi copiam faciens. Deprehendi autem illud inferiorem ventrem tam accuratè circumdedit, ut cingulum fuscum palmam latum examussim refert. *Thomas Bartholinus. Act. Modic. Sect. 108. anni 1671. & 1672.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### *Pro Erysipelate Cruris.*

**J**ussi illinire locum rubentem hoc linimento.

℥. Succ. Solan. plantag. an. ℥i. ol. viol. ros. an. ℥ii. aceti rosac. ℥β. coq. succorum consumptionem, adde unguenti populei & de cerussa an. ℥β. camphoræ, ℥i. ceræ alb. parum. F. Linimentum, quo illinant crus ubi rubet, & postea involvat corio canino, mitigabatur dolor & rubedo: Sed post biduum vehementer iterum recrudit malum, itaque quia spissius adhærebat prius unguentum aliud præscripsi.

℥. Succi solani plantag. an. ℥ii. aceti ros. ℥β. laricæ, dissol. in vitello ovi, q. f. vitell. ovi, nu. i. ol. ros. viol. de nymphaea, an. ℥i. probè agitentur, & illinat locum affectum. *Felix Platerus observ. lib. 2. pag. 347.*

℥. Ol. ros. & vinum antiquum equali mensura; in eo fervendi duplicatum linteum immergere jussi, expressumque calidum tibie obvolvere, statim dolor remisit, aliquoties per biduum eo usa, liberata ab ardore & rubore fuit. Idem hoc in aliis tentatum remedium egregiè profuit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 517*

Præclaram remedium est stercus recens bubulum, si in sartagine coquatur cum aceto, adjectis flor. camæ. & sambuci, ut F. Cataplasma, quod tepidum admove-

tur, ex aceto rosato & aqua ranarum coquitur myrrha, & ea aqua admovetur. *Ioh. Heurnius, ad Aphor. Hippocr. 25. sect. 6.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### *Pro Erysipelate.*

**A**D præservandum ab Erysipelate medicamentum hoc tibi commendatum volo.

℥. Fl. Sambuc. rec. vel siccat Mj. lactis vaccæ rub. ℥viii. vel ℥ix. coque moderato igne, ne ebulliendo quicquam effluat, inde colla: excolatum lac bibe manè tepidum qualibet decrescente luna, idque licebit prout commodum fuerit, bis, ter quaterve facere, atque per annum integrum qualibet decrescente luna continuare. Affirmant qui experti sunt, ab istius annuo usu homines nunquam postea Erysipelata tentari, neque omni penitus ratione hæc experientia destituitur. Statim ut morbus invadensprehenditur, ad naturæ motum adjuvandum, quod intus noxium est, & quasi in venis turget, ab internis visceribus ad cutem excutiendum, in quem finem aliqui theriacam, aut mithridatum optima ratione exhibent. Ego in ista prima humoris motione, priusquam in extremis aliquid rubere incipiat, atque ita de morbo adhuc incertus sum, propinare soleo subscripti electuarii (cujus mihi etiam in peste usus est) ℥i. vel ℥β. vel ℥ii. secundum corporis ægrotantis constitutionem, robur, & ætatem, in paucis aq. cichor. vel card. bened. vel scabiosæ quapotione levi sudore moto fluctuans humor excutitur.

℥. Theriac. andromach. ℥i. bol. armen. præp. vel terræ sigill. veræ, vel istius ex Silesia recens importatæ ℥iv. gran. juniper. rec. rad. cormentill sem. card. bened. an. ℥v. spec. elect. de gemmis, diamarg. frigid. an. ℥i. ras. eboris, vel ossis de corde Cervi sem. acetos. corall. rub. præp. an. ℥β. cum Syrup. acetositi citri, q. f. F. Electuar. liquidus S. A. mirum in modum huic morbo convenire ingredientia donec, & usus comprobatur.

Ubi jam in parte aliqua effloruit tumor Erysipelatodes, Medici statim frigida & hu-



humida, Solani & sempervivi succos adhibent tam diu donec coloris rubicundi vigor deferbuerit remissus sit, tunc enim ad leviora discutientia transeundum est, in principio igitur hoc & leve & tutum est locale.

24. Aliquot folia crassulæ major (quæ cotyledonis species est) & applicentur parti ita ut exterior foliorum pars detracta pellicula cuti jungatur. Tutum est hoc remedium & mihi sæpenumero utile compertum quin, & paratu facillimum est & elegans quo & calor extinguitur & dolor mitigatur, juvat etiam aqua in Maio destillata ex rec. stercore bubulo applicata: quæ & suo tempore in æstate bibita multos juvit.

Utile est Emplastrum quod vocant Diapompholigos admotum quocunque tempore sive sit simplex, seu exulceratum Erysipelas, nihil pingue, nihil oleosum adhibendum aut quod gravet sua mole, aut aliqui cutis meatus impediat vel obstipet, nam ista solent ad suppurationem vel putredinem (quod Hippocr. autore 20. Aphor. Sect. 7. valde malum est) causam dare, atque in isto morbo naturæ impedire motum. Aliqui scilicet hoc utuntur supra & infra ruborem filo serico rubente partem tumentem circumdant, atque ex stercore vaccino, albuminib. ovorum & paucis bolo cataplasma imponunt.

Ubi jam calor deferbuerit, utiliter siccis panniculi linei calefacti imponuntur, qui maduerunt in subscripto liquore, & in umbra exsiccati sunt.

24. Saponem album venetum dissolv. in aq. scabios. calente, atque ista imbuantur panni linei mundi, & exsiccantur, istis admotis discutitur & resolvitur tumor rubens. Imminentem morbum aliquoties præcaveri vidi usu huius medicati cibi, accipiunt absinthii paucas comas, pauca folia taraxaci, caput monochi vocant, & tantundem chamædryos vulgaris à Fuchsio depictæ, recenter manè lectas omnes minutim concisas immiscunt recenti ovo, coquunt in placentulam mollem cum tantulo buryri vel olei olivarum, vel subigunt tantum ad levem ignem, hac vescuntur manè novem ex ordine in Maio

diebus, incipientes ab ipsis Maii calendis. Isto modo novi nonnullos ab isto morbo se liberos integrum annum servasse qui alias sæpius affligi isto solebant. Cum hoc medicamentum hepar ita disponat, ut minimum istius tenuis, biliosi, pinguis, fluxilis humoris ingeneret, ego mea fidei commissis autor esse soleo, ut non solum novem primis verum etiam singulis in Maio diebus quotidie eo utantur: nam ita ab obstructionibus hepar liberatur quod in eo & vicinis partibus biliosum in hærescit, abstergitur, refrigeratur hepar mediocriter, & inter humiditatem & siccitatem, quandam temperiem, atque totum hepatis corpus. Quendam & rebur acquirit, ut porro massam sanguineam ingeneret magis stabilem, minusque fluxilem, pinguedine sanguinis absumpta, abstersaque tenui bile, qui utebantur sine potu sumebat: ego quibusdam permitto, ut post esum parum vini absinthitis bibant. Reinerus Solenander, consil. 12. & 13. sect. 5.

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Erysipelate.

**E**rysipelati applicare jussi Cataplasma ex libb. micæ panis albi, terræ Cimoliz ex parte furni externa ʒij. cum paucis croco, & vitello ovi coctum in s. q. lactis vaccini ad consistentiam. Sed mulierculæ melius suis experimentis confidentes, feli vel cato nigro prehensio, articulum vulnerarunt, atque exinde stillantem cruorem parti Erysipelatosæ induxerunt super imposito linteo sicco, unde illico Erysipelas recedere visum. Joh. Petrus Lotichius, observ. 9. cap. 6. lib. 1.

Erysipelas odore lintei leporino cruore tincti sanatur; si siccum illigetur. Joh. Helmontius, tractat. cui tit. Imago fermenti impregnat massam semine.

Probatissimum vulgi remedium unum Chartæ huic ad suam, quod nunquam fallere experientia inter nostros docuit, urinam propriam mele subactam summo mane continuis tribus diebus assumunt, & exinde tutos se ab Erysipelate per vitam sciunt. Mel sanè humores calidos temperat & ex-



& expurgat, urina verò vehiculi loco adhibita, sale suo abstergit bilem Lithargyrum tritum inter duas petias externe Erysipelati impositum, & dolorem mitigat & tollit Erysipelas. Vidi effectum, & aliis auctor sui ut uterentur, quia etiam *Crato* id probavit. Cavendum quidem in huiusmodi morbis à refrigerantibus & adstringentibus; cæterum multorum scilicet eventum usus comprobat, quorum rationes ignoramus. *Thomas Bartholinus, histor. cent. 6.*

Erysipelas recens quamcumque partem invaserit externa discutientia requirit moderata. Sanguis menstruus in aceto rosac. dissolutus, & calidè applicatus subito solvit; præsertim si sudores quoque moveantur ex bezoardico tum simplici tum composito in aqua *Senecionis*. Nonnullis aqua spermatis ranarum ad extinguendum ignem sacrum familiaris est, sed sæpè malo cum successu: est enim nimis frigida. *Job. Hartmannus. Prax. Chi. miatr. pag. 385.*

Rusticus quidam Erysipelate phlegmonode in sinistra manu laborans, ex tonforis consilio per aliquot dies manum & brachium oleo rosac. inunxit: unde dolores, inflammatio, aliaque symptomata magis magisque ingravescabant, ita ut tandem gangræna correpta sit tota manus, is cum ad me accessisset, scarificatione aliisque remediis quæ ad gangrænae curationem spectant, curatus fuit. Ex quibus perspicuum est, oleum maximè inflammationibus adversari. *Guil. Fabr. Hild. observ. 82. cent. 1.*

Quidam Erysipelas in seipso & aliis plurimis curavit secreto præstantissimo, quod sic habet, accipiebat folia & ramusculos Sabinæ & in pulverem crassiusculum redactis quotidie ter suffiebat membrum affectum. Si verò exulceratio adjuncta esset, ceram virgineam in aqua calida manibus tractatam, emplastri modo, solam imponebat. *Hieron. Reusnerus, obs. 124.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Erysipelate.

**S**I Patiens sit Plethoricus, & venas habeat amplas & tumidas, & bilis fo-

*Burnet Parte I.*

veatur a sanguine, tunc vena hepatica, aut mediana dextri brachii est incidenda. Novi ego Comitem, qui ex Erysipelate mortuus est, præ timore & pusillanimitate Medici, qui sanguinem ipsi verebatur detræhere.

Si Plethoræ signa non adsint, superfedere possumus venæ sectioni, & quamprimum naturæ laboranti subvenire potiuncula leniter purgante quæ dicata sit bilis expurgationi. Postquam pravis humoribus corpus expurgatum est, siue una vice pluribus, sequenti die sudoriferum est exhibendum, ut natura partim per sudores expellat humores peccantes residuos, partim materiam contentam & impactam digerat, si fortè eadem aut imbecillis nimium, aut cutis densior existeret. Sequens ergo sudoriferum propinetur.

℥℥. Aq. Sambuci, ℥iii. sem. apii, ℥ii. terræ sigillat. ℥ss. M. Utilis etiam pro hac intentione est Syrupus, S. Ambrosii, ut & theriaca cum aq. cardui exhibita. Inter externa procul absint refrigerantia. Nonnulli adhibent linteum, quod adhuc lotionem expertum non est, sed recens a textore venit, ad hoc opus probatum est remedium & admodum utile, si, sapo conquassetur in aq. flor. sambuci, aut in ejus defectu in aq. communi, & linteum intingatur & continuo exsicceetur, & tepidè applicetur loco affecto, & quamprimum incipit exsiccare, iterum renovetur. Multi Erysipelas tantum suffumigant mastice thur. aut hyper. possumus etiam miscere partem unam saponis Veneti, & duas fimi vaccini in aqua, & ex his conficere cataplasma quod Erysipelati applicetur. Varia etiam possunt comparari remedia ex solo Sambuco, nam præcipio, ut statim Erysipelate incipiente cortex sambuci abradatur, & circumcirca membro patienti obvolvatur, renovando idem ter in die, alioqui miscere soleo ℥i. theriacæ cum ℥iv. aut ℥v. aq. flor. sambuci, & linteum immerso, illudque expressum tepidè impono Erysipelati, quod sæpius a me probatum est, potestque commodè adhiberi capiti, aut collo, aut lateribus seu costis. Similiter possumus internæ corticis tiliæ Mj. aut alterum minutum



concidere, & per noctem macerare in aq. flor. sambuci, eique linteum intingere, quod leviter expressum imponitur, & exsiccatum iterum recens adhibetur. Ex quo facile patet, similia ferè adhibenda esse in Erysipelate, veluti ad ambusta. Est etiam secretum præstans, si Erysipelas inungamus leviter pluma intincta in felle carpionis, superponendo linteum nitidum seu exsiccatum. Nonnulli accipiunt vitellos ovi numero vi. addunt parum salis, & pauxillum boli armeni, ex iis emplastrum conficiunt, imponuntq; affectui, quod ardorem extrahit.

Quod si per negligentiam aliudque infortunium contingat cutim abscedere, & Erysipelas in ulcus transeat, affectui inspergendus est pulvis lapidis calaminaris, vel diapalma imponatur, vel sequens Sparadrapum.

℥. Ol. olivarum ℔ii. ebulliat in vase terreo vitreato, adde ceruss. super porphirite levigatæ ℥iv. agita continuo & ebullire fac usque ad nigredinem, deinde admisce Lithargyrii aurei similiter levigati, ℥ii. & agita donec spissum evadat. Deinceps ab igne remove & agitando misce ℥i. Myrrhæ pulveris. in quo petiæ lineæ immergantur, eæque lavigentur, servanturque ad usum. *Joh. Wierus, observ. lib. 2. cap. De Erysipelate.*

℥. Lixivii facti ex cineribus sagi ℔. iv. album. ovor. num. 3. camph. ℥ii. his mixtis linei panni mundi imbuantur, & in umbra exsiccantur, atque unus ad ignem calefactus parti applicetur, & per diem ter aut quater mutetur. Victus sit refrigerans & humectans, sed tamen simul incrassans, quapropter vitentur calida & sicca, ut aromatica, acria, salsa, pinguis, oleosa, dulcia, butyri multus usus, porrhum, cape, raphanus, sinapi, sale macerata, & fumo indurata, abstinendum etiam a vino potentiore, cerevisia crassa, carne suilla & anserina. Sit contra usus frequens cichorei, ptisanæ hordeaceæ, & omnium ex hordeo paratorum: convenit & oriza, lactuca, acetosa, portulaca, endivia, quæ in acetariis adhibeantur, aut cibis reliquis misceantur, acetum ipsum quoque admittitur, sed sit passulatum, rosac. vel sambucinum, u-

tilis quoque est agresta, succus ribium, berberorum, cydonior. cerasorum. Nec serum lactis inutile est. Conceditur & vinum absinthites. Vitandus est corporis & animi nimius motus. Somnus, si in erubus sit Erysipelas, sit mediocris: Si vero in facie sit, quantum fieri potest à somno temperandum est, *Daniel Sennertus, lib. 2. De Febris c. 16.*

## SECTIO VIII.

### *Pro Excrecentia carnea in faucibus.*

**S**artor quidam *Monspelliensis*, cum pisces comedendo spina satis insignis faucibus infixæ esset, eam extrahendo sibi fauces laniavit, unde temporis progressu exorta est paulatim excrecentia carnea in faucibus juxta uvulam, nunc magnitudinem superans, ad cujus curationem Empiricum vocavit, qui oleo vitrioli frequenter ad noto tumorem absumpsit, & ad perfectam cicatricem perduxit. *Samuel Formius, observ. 46.*

## SECTIO IX.

### *Pro Excrecentia carnea in ulcere.*

**P**ulverem illum corrosivum descriptum a *Bertapolia*, qui minuit carnem mollem & sine molestia, inspergebamus; cujus hæc est descriptio.

℥. Cortic. granat. gallam & spongiam adustam, & fiat pulvis, ipsa etiam spongia adusta sola carnem minuit sine dolore & ægri molestia.

In alio etiam usi sumus, & in multis frequentissimè unguento *Ægyptiaco*, corrodit enim carnem sine mordificatione, ut etiam pulvis solus hermodactyl. valent etiam & cortices asphodelorum & unguentum apostolorum. *Petrus Forestus, observ. lib. 7.*

℥. Croci nostri metall. q. s. pulver. & superponatur super carnem mortuam vel excrecentem. Citò & absque ullo dolore depascit atque absumit, nostra multa experientia. *Martinus Rulandus. Curat. 10. cent. 3.*



## S E C T I O X.

## De Excretionē critica.

**O**bservavi interdum quædam excreta mole parva, attamen vi magna fuisse, ac ægros liberasse, id evenit quam plurimis, dum pestillens illa febris quam *Hungaricam* appellabant, grassabatur anno 1572. Manabat tunc quibusdam hac in febre sanguinis substillum è naribus exiguum, verum illud erat purpureum roseoque fulgore micans: merus namque is sanguis erat arterialis nimia flamma incandescens, ita illi evadebant, unde sæpe mecum cogitavi, num salutari-ter in his arteria aperiri potuisset. Sed quis audet? doctiores quæso hac de re cogitent. *Job. Heurmius, ad Aphor. Hippocr. 23. sect. 1.*

## S E C T I O XI.

## De Excretionē Pilorum.

**D**octor *Echtius* mihi retulit se vidisse puerum per alvum veros pilos excernere. *Reinerus Solenander, cons. 15. sect. 5.*

## S E C T I O XII.

## De Exomphalo.

**E**ξομφαλος umbilici prominentia, symptoma est pueris familiare, in quo umbilicus in tumorem sine inflammatione attollitur, accidit hoc malum, vel ob umbilici ligaturam perperam factam, cum nimirum pars ejus major quam debebat, relicta est, vel quia relaxatur peritonæum, aut rumpitur, ob fletum, tussim, vociferationes, risum, cursum, saltum, &c.

## SUBSECTIO VNICA.

## Pro Exomphalo.

**E**Go pro umbilico extante vel exomphalo in pueris nuper natis, quatuor rotulas ad formam Stuseri rotun-

das ex corio rubro conficio, oxycrocco obductas, hoc enim expertissimum remedium est, ut expertus sum etiam in adultis; una autem rotula maneat affixa per quatuor pluresque dies antequam amoveatur, deinde altera admoveatur. *M. Iohannes Tiengius* Medicus percelebris accipiebat petias tres rotundas ex panno lineo, primam magnitudinis denarii, secundam quadrantis, & tertiam Stifferi; inungendo primam cum oleo ovor. & ita rotulam unam ponendo supra aliam, & ultimo emplastrum hoc glutinans diligenter ligabat, supraponendo plumaceolum aptum supra ventrem, ita ut umbilicus nullo modo eminere aut exire posset, usque ad perfectam curationem, & ita puerum duorum vel trium annorum affectum magna eminentia umbilici curavit. Emplastrum tale est.

℞. Gummi arab. tragacanth. mastick, bol. armen. sang. dracon. glutin. pisc. glut. ex corio bovum, an. ℥ii. thuris, ℥iii. picis græc. ℥i. picis navalis, ℥ii. mumie ℥iii. glutinis Carpentariorum, ℥℔. Item conterere semen psyllii, infunde ipsum in aquam pluvialem decoctionis caudæ equinæ & consolidæ & dimittatur in ea donec incrassetur & pinguescat, cui deinde superadde pulverem Squinanthi, gallarum balauft. psidiæ, & nuc. cupress. item liquefiant pix navalis & græca ad ignem, & cum liquefactæ fuerint, addantur glutina, & iis calefactis postea adde aquam psylli cum pulveribus; quibus incorporatis deponatur ab igne, & cum infrigidari cœperint, fiant ex iis magdaleones, manibus prius oleo rosac. inunctis, vel ceratum. *Petrus Forestus, observ. 28. lib. 27. De secreti & testium vitiis, ac De ramicum speciebus.*

Intra corpus infantulo exhibeatur ℥i. pulveris rad. Scrophulariæ cum lacte. *Franciscus loel. Practicæ, lib. 9. sect. 4.*

Umbilici Eminentia & crassities in pueris innumeris ferè curata est cataplasmate ex fanicula, in vino cocta umbilico apposita cum ligatura strictiori; & rad. consolid. maj. contrusa dorso è regione umbilici admota. *Achilles Gasserus, observ. 93. Vide Hieron. Reusnerum, observ. 96.*



# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER SEXTUS.

*De Affectibus à littera F incipientibus.*

### SECTIO PRIMÆ.

*De Faciei vitii.*



Utis faciei speculum est morborum corporis, qualis enim humor dominatur in visceribus, talis efflorescit in facie. Hinc est quod plura sunt ejus, quam reliquarum partium cutaneorum vitia, interdum scedantur pustulis ardentibus ob biliosum sanguinem intus immodicè auctum: suffunditur non rarò pertinaci rubore ob sursum elatos calidos vapores. Aliis etiam quandoque inficitur coloribus: pallida est in *χλόρωσι* virginum; ad flavedinem vergit in ictero, dehonestatur præterea gutta rosacea, varis, lentigine, impetigine, de quibus omnibus infra fusius dicitur.

#### SUBSECTIO PRIMÆ.

*Pro Faciei & Oculorum flavedine ab ictero.*

**A**ccipe fumum ex aceto calido in quo decocta sit herba rosmarinus. *Matth. Ratzenbergerus, 73. lib. 6. consil. Cratonis, &c.*

#### SUBSECTIO SECUNDÆ.

*Pro Faciei maculis.*

**P**uella alioqui venusta cum faciem maculis quibusdam deturpatam haberet, me consultandi causa accessit, huic ut talis aqua conficeretur, mandavi.

℥. Albumina ovorum ad duritiem cocta vitellis abjectis, eamque more chimico destillato, & aquam inde proveniente usui servato, hæc enim aqua omnem maculam

faciei delet. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 31. De Fucis.*

#### SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Faciei pustulis.*

**Q**uidam contraxit in facie permultas pustulas magna feritate extuberantes, quæ universam faciem foedissimo infestarunt colore: is meo monitu manè & vesperi cubitum abiturus sulphuris oleo omnes infectiones perunxit ad calentem fornacem vel focum; quo omnes pustulæ intra septem dies absque aliorum medicamentorum usu evanuerunt, nec unquam post repullularunt, *Martinus Rulandus, curat. 91. cent. 1.*

Juvenis quidam cui facies tota quasi rubra, pustulosa, & morpheatica erat, ut ferè de emendatione turpitudinis istius desperaret, me aliquoties conveniens consilium avidè corrogavit, motus ejus precibus, apozema digestivo purgans pro tribus matutinis tale injunxi.

℥. Rad. enulæ, liquir. cichor. lapath. acuti, an. ℥i. fol. fumar. scabios. endiv. summit. lupul. an. Mi. flor. ʒ. cordial. an. ℥i. polipod. epithym. rhab. monachor. an. ʒss. fol. sen. sem. cartham. contus. an. ℥i. sem. anis. fœnic. an. ʒss. passul. corinth. ficum, an. ʒss. F. decoct. in s. q. ser i lactis caprilli pro tribus dos. in colat. ʒv. dissolv. crem. tartar. ʒiiss. spec. diaturb. cum rhab. ʒi. syrup. rosat. laxat. ʒss. aq. cinnamom. ʒi. M. F. apozema, absoluto apozemate venam aperiat cubiti dextri, inde rubor & pustulæ faciei notabiliter remiserunt, per aliquot



quod postea septimanas in usum vocavit singulis diebus lac caprinum recens, abstinere interim a vino, cibis salis, multumque aromatizatis. Hoc etiam utebatur condito quotidie aliquot vicibus.

℥. Conserv. flor. & rad. cichor. ℥i. conserv. acetos. acetosell. borrag. viol. an. ℥ss. troch. de camphora. ℥i. spec. diarrh. diatrionfant. an. ℥ss. cum spiritu vitrioli, & Syrup. de pomis redol. F. conditum gustui gratum Externè faciem illiniat hoc cosmetico.

℥. Lithargyr. auri pulv. ℥ss. alumin. ℥ss. boracis, ℥ss. ceruss. ℥ii. aceti, ℥i. aq. ros. plantag. an. ℥ss. bulliant lento igne ad tertie partis consumptionem, colat. adde succi limon. ℥ii. M. F. lac virginale, hisce tandem curatus est. *Ioh. Petrus Lotichius. observ. 1. cap. 3. lib. 6.*

Quidam occurrunt affectus, qui licet ut parvi momenti negligantur, & raro Medicorum curationi præsent, tamen quod molesti sint, & pertinaciter hæreant, non sunt contemnendi. Ita se res habuit non ita diu in quandam muliere, quæ nullis remediis faciei intensum ruborem cum multis varis pustulisque illam indecore dehonestantem abolere poterat, quamvis famulos Medicos ad id agendum adhibuisset. Illi consului, regimine vitæ humectante & refrigerante præscripto, & tussà jecoraria vena, itemque sumpta per tres dies opiata, sensim dosim ejus augendo humores adustose evacuante, hac aqua destillata faciem ablueret.

℥. Summit. myrti & mali gran. oleastr. ceterach, plantag. morel. quæ species folani est, clavicul. vitis an. M. iv. uvar. acerbarum cum pediculis, vel labruscarum, ℥iij. Incidantur, irrorentur aceto. Aqua destillata reservetur usui.

℥. Aq. præscript. ℥iv. alum. usti ℥ii. album. ovor. fortiter agitatorum ℥i. Admoveantur faciei eundo cubitum, & abluantur frequenter facies prædicta aqua. Postea.

℥. Tuthiæ præp. ceruss. ustæ, an. ℥ii. Lithargyr. ℥i. Succ. plantag. aq. superioris destillatæ, an. q. s. ol. myrtillor. ℥ii. de vitell. ovor. ℥i. Incorporentur simul & raducantur ad formam nutriti. Add. chalcitid. ℥iij. alumin. ℥ii. sulph. ℥i. succi citri ℥ss.

*Burnet Parte I.*

Applicentur noctu, manè verò abluatur facies aqua destillata. Si istis medicamentis non cessisset, addidisset argenti vivi ℥i. aut eo plus. Sed cum rubor & vari evanuisent, nihil opus fuit quidpiam adjicere. *Observ. 25. Anonymi Medici Riverii Observationibus additi.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Faciei rubore.

**R**efert Eruditus quidam practicus se novisse celebrem Medicum, cui nasus & facies tota rubore sædo, & pustulis deformata erat cum his duobus auxiliis curatum, quod quinque mensibus, verno videlicet uno, æstivis tribus, uno autumnali, continuò vinum decocto cichorii diluerit, & ante pastum horis matutinis fructu rosæ caminæ cydoniati more cum saccharo factæ usus sit. Vinum decocto cichor. insuaviter reddi non est dubium, ut hoc incommodum effugiamus, posses pro primo haustu decoctum cichor. separatim bibere, & deinceps vino uti: quod ad topica attinet, imprimis utile existimatur interdum faciem noctu illinite sanguine leporino, & manè aqua fragorum, vel aqua è floribus verbasci cum succo limon. destillata abluere.

Utile etiam est rubeatæ faciei caseum recentem imponere.

Si verò pustulis facies deformata sit, exprimatur mense Maio ex Scrophularia herba, cum radice lota succus, & cum ol. amygd. d. misceatur, atque insolenter, eoque facies inungatur, vel fiat unguentum ex eadem herba hoc modo.

℥. Scrophulariam cum radice bene lotam, incidantur, ac addito butyro Majali optimè depurato, coquantur, & exprimatur, atque expressum in vitro usui servetur, hoc unguento etiam ulcera lepræ similia, inuncta sanantur. *Jo. Crato consil. 19. lib. 3.*

Ut faciei rubor tollatur primum facilibus remediis utendum. Commendatur succus pomorum acetosorum, si eo vespri facies inungatur, & manè aqua in qua amygdalæ & semina melonum ita comminuta sint, ut quasi lac appareat, abluatur, quod



quod si hoc non prodest, accipiatur ovum integrum, & impone quatríduo aceto fortissimo, donec corticem molliorem redditam appareat, & tunc accipe albumen ovi, eique admiscethuris, mastich. ceruss. an. ℥i. F. Unguentum, quo ungetur facies, rectè etiam ista aqua & magno successu adhibetur.

℥. Lithargyr. præpar. ℥ss. aceti, ℥iv. bulliant usque ad tertiæ partis consumptionem & in alia olla bulliant salis, alumin. an. ℥ss. thuris, ℥i. in aq. ros. ℥ss. commisceantur deinde omnia posteaquam per linteolum fuerint colata, & habebis lac quo facies abstergetur, hoc cæteris non conferentibus, non solum maculas rubras faciei tollit, verum etiam pustulas aufert, potest eo manè & vesperi uti. *Io. Crato consil. 8. lib. 4.*

Decoctum rad. taraxaci plurimum valet si ante cibum sumatur & ablutio faciei, cum aq. fragorum, cui aliquid sulphuris pulverisati in linteolo imponatur. *Io. Crato consil. 26. lib. 4.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Faciei rubore.

**C**ontra Faciei rubedinem hoc experimentum habetur.

℥. Albumin. ovor. numero centum, terantur in mortario, adde vitrioli rom. alb. pulverisati, ℥i. M. & destillentur in alembico lento igne, & aqua facies abluatur, hoc similiter & rubedinem & pustulas tollit radix scrophulariæ bulliat in aq. fontis, & colatura sæpius lavetur facies. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 31.*

In studioso Patricio facie rubra squalida, pustulis referta laborante, cura sic fuit instituta: præparavi materiam.

℥. Syrup. acetos. simpl. de Cichor. an. ℥ss. aquæ cichor. acetos. an. ℥iv. M. F. Julepus pro tribus vicibus. purgatus fuit hoc modo.

℥. Aq. endiv. cichor. an. ℥iii. aq. acetos. bugloss. an. ℥ii. infund. fol. sen. ℥ss. epithym. ℥ii. tamarind. ℥ss. Bulliant in duplici vase in colat. parum expressa, infunde rheï, ℥ss. spicæ, ℥i. rursum fiat

expressio; adde syr. de fumar. simplici, ℥ii. syrup. diafer. ℥i bibat tribus vicibus.

Inungat faciem sequenti.

℥. Unguenti citrini, ℥i sublimati, ℥ss. ol. de tartaro succi limon. an. ℥ss. Lithargyr. ℥i. ceruss. ℥ss. M. cum paucis pomato, inungat, exulcerabatur nonnihil, quare jussi rarius uti, postea hanc aquam præscripsi.

℥. Ap. ros. plantag. flor. fabarum an. ℥iii. aquæ acetos. ℥iii. aluminis ℥ii. M. hæc plurimum profuit, ejus diutino usu rubedo ex parte cessavit, pustulæque sanatæ sunt exactis multis annis mihi iter facienti per ipsius patriam, hanc adhuc laudavit aquam, faciem tamen subrubram nonnihil semper retinuit, erat enim originale, sed planam. *Felix Platerus, lib. 3. pag. 618.*

Facies seni cuidam ebrio rubris maculis commaculata & inflata, crustisque flavis per barbam serpentibus descædata fuit; adeo ut Elephantiasin metueret vix octiduum hoc remedio usus convalevit, & postea recedivam passus iterum eodem sanatus est, post purgation. factum cum cathol. ℥ss. confect. hamec. ℥iii. & aq. fumar. illinat faciem hoc liquore.

℥. Lithargyr. auri pulv. ℥i. alumin. ℥i. boracis, ℥iii. ceruss. ℥ss. aceti, ℥ii. aq. ros. & plantag. an. ℥iii. Bulliant lento igne ad consumptionem tertiæ partis, postea coletur, adde succi limon. ℥ss. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 627.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Faciei pustulis.

**P**restantissimum remedium est menstruum (virginis, vel alias juvenulæ boni habitus) in aqua calida solatum, quo si per dies aliquot sub vesperam eundo cubitum facies lavetur, & spontè exsiccet, pustulæ cadent succrescente nova cuticula, & robur evanescet.

In iisdem pustulis & morphea totius faciei radicitus extirpandis mirificè valet oleum bufonum, quod fit hoc modo.

℥. Bufones vivos (propter signaturam macularum in bufonibus) numero 3. vel 4. coque in olei olivarum ℥ii. per integrum



gram horam, postea cola, hoc oleo illine faciem aliquoties, sed singulis diebus semel, post aliquot dies cadunt pustulæ & morphea sanatur. Omnium fortissimum est hoc oleum, ideoque cæteris nihil proficientibus, ad id accedendum. *Iohannes Hartemannus. Pract. Chimiatri. pag. 117.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Ad Faciem decorandam.*

**M**agnæ virtutis hæc est aqua, qua *Maria Medicea* Regina Mater ad Faciem decorandam utebatur.

24. Tres Capones albos statim post jugulationem axungia detracta, minutissimè concisos, caseos duos recentes ex lacte caprino excoctos, pulpam sex limonum corticibus detractis, albumina ovorum, numero viii. una cum putaminibus, boracis, sulphr. pulv. an. ℥ss. camphor. ℔i. aq. flor. fabarum & nymphæ, an. ℔i. collocentur in Bal. M. atque in rostrum alembici aliquot grana moschi, aqua exstillans servetur ad usum, hac noctu ante somnum lavetur facies. *Felix Platerus, Prax. Medicin. tom. 3. lib. 1. cap. 2. pag. 153.*

## SECTIO SECUNDA.

### *Pro Fame ingenti in viro quodam ex verme Cucurbitino.*

**V**ir quidam optimo præditus temperamento, multoque sanguine abundans, anno suæ ætatis 26. famescere multum cœpit, mox sensim, in dies augescente fame, ed eum statum pervenit, ut inexplibilis omninò redderetur: atque licet oppiparè viveret, & multum ederet, saturatus tamen à mensa nunquam discedebat, imò cogebatur hora una, aut, quod summum erat, duabus à cibo transactis, denovo comedere; neque alimenta vomebat unquam, neque alvus fluebat illi, sed contra, siccior quotidie evadebat. Vocatus ad curationem accedo libenter, putans observaturum affectum memoria dignum, & certè vanum non extitit iudicium, nam statim atque conveni ægrotum, non quidem comedentem, sed devorantem video, ita

ut fuerit mihi admirationi maximæ, ac rursus à prandio horis nondum duabus præteritis, famescentem vidi ita, ut omnino cogeretur cibari: alioquin statim animo delinquebat, contempler omnia, quæ secundum naturam, & præter naturam incrant in ægroto, & facta in omnibus, ut parerat, diligenti consideratione, dico nullam adesse refrigerationem oris ventriculi, nullam melancholiæ naturalis fluxionem ad ventriculum, ut existimabant Medici quidam, sed suspicari me vermem cucurbitinum mali causam existere, omne alimentum depascentem, hanc conjecturam præter alia comprobabant hæc duo: Unum quod ægrotus dicebat se sentire aliquid moveri in inferiore ventre, & veluti manum quandam extendi ad ventriculum, ac omnem cibum ex eo rapientem. Aliud verò, quod in pueritia multum fuerit obnoxius vermibus, retuleritque pater illius sese recordari illum anno 17. suæ ætatis, supra viginti vermes glomeratos ejecisse. Data mihi fuit sanandi hominem provincia, quæ scelicem admodum successum habuit in hunc modum, primum omnium, hora quinta ante prandium exhibeo illi ℔ss. ol. amygd. d. rec. hoc potissimum consilio, ut emolliendo alvum viam ad exitum vermi pararem: quia verò nolebam concitari vomitum, quo perperam & intempestivè ante usus fuerat, non unico haustu, sed quatuor vicibus totam exhibui quantitatem, jubens ut sextam horæ partem inter unam ac aliam sorbitionem interponeret: nec minori indigebamus in magno corpore, multo potui assueto, quantitate, hora prandii statim ante cibum dedi bolos duos ex ℥i. spec. hieræ, & ℥i. rhei: ac statim iussi ut sumeret ℥vi. decoctionis sebesten. humidum paravicibum, sed acidum. Fuit panis contritus in iure pullæ cum ℥iii. succi limonum, hisce peractis, jam cepit mitigari fames, neque enim duarum horarum post cibum spatio, esurivit, hinc non ille modo, sed omnes benè cæperunt sperare, maximè quod usque ad sextam à prandio sine appetitu mansit, ante cænam parari iubeo clysterem ex lactis caprini ℔i. exhibeo ℥i. pilul. ex aloe non lora, statim ante cænam, cum eadem quantitate decoctionis sebesten. in contrito pane de-



cem amygdalas amaras dissolvo nocte emollita illi alvus, excrementa erant pituitosa, admodum viscida, subcineritia, nocte quievit, parum esurivit, eadem repetito secundo die remedia, nulla fames hora cœnæ, sed ferè nauseabundus videbatur, emollitur alvus nocte media, ac paulo post sentit ægrotus exire aliquid solidum, ac tangens, esse intestinorum portionem retur, clamans, vocari me jubet, accedo, ille statim, morior, inquit, nisi manus porrigas adjutrices, en intestina ex ventre profiliunt video cucurbitinum vermem ac ridens; bono sis animo, dixi, jam sanus evasisti. Intestina non sunt ex ano prodeuntia, sed vermis ille, qui famem inexplibilem efficiebat, devorabatque omne alimentum. Erat longitudo illius cubitorum 25. adhuc vivens movebatur, latitudo erat digiti minimi, erant plus quam mille cucurbitini vermes adhærentes illi mucosae membranae, ac una ferè vixit hora, & sic convaluit non sine admiratione assistentium, ac artis nostræ honore. *Horatius Augenus. Tom. 2. epist. & consult. lib. 5. epist. 6.*

### SECTIO TERTIA.

#### De Favo.

**V** Ide supra Lib. 1. Sect. 7. de Achoribus.

### SUBSECTIO UNICA.

#### Pro Favo in Puero lactante.

**I**nfans quidam in capite Favum habebat cum ingenti pruritu. Imperavi ut caput leviter balnearetur cum decocto scænu-græ. malv. & althææ. Deinde ut inungerent solo oleo ros. in quo Camphoræ exiguum immixtum sit, alioqui si istis non curaretur, jussi pararent oleum descriptum à *Montagnana consil. 298.* (cujus descriptionem vide supra, *sect. 14. lib. 3.*) quod egregie valet ad crustas & eruptiones puerorum, valet enim ad favum, tineam & achores. Nam ea quæ ad crustas capitis puerorum à Neotericis practicis scripta sunt valere, eadem quoque conferunt favis, achoribus, & tineis. *Petrus Forestus, ob-*

*serv. 24. lib. 8. De exterioribus vitiis capitis.*

Præstat in pueris uti levibus, quale hoc est à *Bayro* sæpius expertum, tam in favis quam achoribus, nempe caput abluere cum decocto flor. salicum, fol. parietar. betæ albæ & dentium, & post ablutionem inungere unguento subsequenti.

24. Lithargyri cum oleo ros. & aceto nutriti, ʒi. fol. rutæ viridis; ʒß. (vel ceruss. ʒß) staphisag. ʒii. vitrioli, ʒi. (vel aloes succotrinæ, myrrh. fuliginis oris furni, tuthiæ, an. ʒiß.) probe M. in mortario cum aceto & ol. rosac. vel myrtino) diu agitando, ut fiat unguentum instar nutriti, eo inungatur caput & est mirabile. *Petrus Forestus, observ. 26. & Schol. lib. 8.*

### SECTIO QUARTA.

#### Pro Fancium ulcere.

**C**uidam in palato juxta uvulam ulcus obortum ex defluxione, ut aiebat, spatium temporis adeo invaluit, ut magna illius portione absumpta, uvula simul perderetur, unde vocem non nihil raucam edebat, potusque quandoque in deglutitione per narium amplitudinem ascendens effundebatur, licet multa tentasset remedia topica & generales purgationes sæpe repetitas, & sudores usu decocti guajaci, nihilominus tamen exulceratio hæc persistens, ulterius serpebat; duraveratque tunc cum ad me venit per biennium, difficilem fore curationem prædicens, nec uvulam amissam reparari posse, curam sic aggressus sum, ut potionem hanc vulnerariam, prout in praxi mea describitur, per mensis spatium manè quotidie biberet iussi. Potio ita se habet.

24. Pyrol. sanicul. consol. artemis. alchymill. sanguisorb. pilosell. agrimon. millefol. vinc. pervinc. an. Mß. coq. in vino rubro ad tertias dulcorando melle ut fiat potio vulneraria. Postea aqua viridi exulcerata loca in faucibus cum penicillo in ea madefacto tangat semel in die, cautione adhibita ne quid illius deglutiat, & ideo statim postea lacte caprino cum Chalybe ustulato oscolluat & expuat; in cuius lactis poculo uno, mellis, ʒi. aluminis usti, ʒi. mista fuerint, aqua viridis sic parabatur.

24. Æru-



℥. Aerugin. aris, ℥i. alumin. ℥ss. vitriol. minii, an. ℥i. coq. in vini alb. ℥vi. aq. vitæ, ℥ss. reponatur ad usum, post illius per aliquot dies usum, colluat sæpe os vino in quo sol. Ligustri cocta sint.

Mastichen, thus, myrrham, carbonibus ardentibus, inspergat, fumumque interdum per infundibulum in os intro mittat, hisce tantum effecimus, ut exulceratio nulla amplius conspiciebatur, sed omnia sana; & ipse optimè contentus à me discessit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 404.*

Si non sit inflammatio, unicum ac summum remedium est spiritus vitrioli aut sulph. qui in adultis purus ac pustus usurpari poterit, intincto in eum gossipio bacilli apici alligato, eoque ulceri admoto levissimo contactu: Sic enim aphthæ simplices momento ferè curantur. In pueris verò permiscetur dictus spiritus cum melle rosaceo, ea proportionem, ut aciditas linguam leviter feriat, & cum penicillo ex linteo baculo alligato aphthæ illinuntur frequenter & citò curantur. Si admodum dolorifica sint ulcera, cum inflammatione conjuncta, lacte frequenter gargarisato demulcentur, vel, ejus defectu emulsionibus sem. frigid. vel mucilag. sem. psyll. & cydon. cum aq. ros. plantag. & solani extractis. Si denique dolor pertinax revulsionibus & topicis non sedetur, sed ab illius vehementia copiosi humores acres continuò attrahantur, unde vigilæ continuæ exoriuntur, & corporis consumptio sequitur, quæ vitæ summum periculum minatur; extremum remedium est ad narcotica confugere, quæ dolorem sedant & humorum influxum inhibent. Ego aliquando puerum 4. annorum ab orci faucibus Dei beneficio liberavi, exhibito laudani gr. i. cum ejus lingua & fauces profundis ulceribus scaterent, cum tantæ inflammatione, ut ne iuscula nec topica remedia ferre posset, & tanto humorum acrium affluxu, ut illi continuò ex ore rivuli instar emanarent, & dies noctesque puer insomnis transigeret ejulando. *Lazarus Riverius, lib. 6. Prax. Med. cap. 5.*

## SUBSECTIO QUINTA.

## De Febre continua.

**F**ebbris est motus inordinatus sanguinis eiusque nimia effervescencia, cum calore & siti, aliisque pluris symptomatibus, quibus œconomia naturalis variè perturbatur, alia est continua, alia intermittens; de intermittente infra.

Continua est cujus accessio ad plures dies sine ἀπόρρηξια protenditur, sua habet remissionis & exacerbationis tempora, intermissionis verò nequaquam.

Tribus modis sanguis effervescens febrem continuam inducit. Primus est, cum subtilis & spirituosus sanguinis portio nimis incalescit, & exandescencia quadam afficitur, quæ idcirco reliquas cruoris partes exagitat, & in orgasmum incitat, & sic in toto corpore fervor & incalescencia solitò maiore excitatur. Quoniam verò spiritus solummodo in culpa sunt, eorum æstus & inordinatio intra breve tempus solent sponte sedari; hinc est quod hæc febris intra diem terminetur, rarò ultra triduum extenditur, ideoque febris Ephemera, aut Synochus plurium dierum appellatur. Secundus effervescencie modus est, quando pars sanguinis sulphurea sive oleosa nimis calefacta fervorem concipit, tunc enim & immodicè in vasis effervescit, & plurimum in corde accensa, deflagratione sua, calorem valde intensum in toto corpore producit, & sic huiusmodi febris inducitur quæ Synochus putrida vulgò nominatur: quæ symptomatice est vel essentialis; Symptomatice dicitur, quæ ab alio quodam morbo in corpore prius excitato originem ducit, cujusmodi habetur febris, quæ an angina, pleuritide, peripneumonia, à vulnere, ulcere, aut abscessu quoque in parte principe, aut eius vicina dependet. Essentialis dividi solet in causam, quotidianam, tertianam, & quartanam, iuxta diversimodam sanguinis dyscrasiam, succique nutriti degeneris supplementum, citius aut tardius ad turgescencie plenitudinem assurgens. Tertius verò gradus (qui & distinctam febris continuæ speciem constituit) à fermento quo-



quodam maligno & venenato excitatur, quo cum sanguinis massa imbitur, & spiritus, & pars sulphurea una fervorem concipiunt, eorumque excandescencia non prius sedatur, quàm aut materia ista maligna assumpta sit, & foras eliminetur, aut à veneno ejus corruptivo, sanguinis coagulatio & velut putrefactio quædam inducatur, qua & circulatio impeditur, & spiritus vitalis extinguitur: & juxta hunc modum fiunt febres malignæ, variolæ, morbilli, & etiam pestis.

Differt autem effervescencia febris continua, ab illa quæ intermittentem constituit in hoc quod in ea spiritus aut sulphuris aut utriusque inordinationes propria *ἐνδογενῶς*, suaque spontè sine alterius miscela fervorem concipiant, & immaniter ebulliant; secus se habet in febre intermittente.

Clarissimus *Fr. Sylvius* existimat febrium omnium continuarum causam esse bilem aut lympham (sub qua succum pancreaticum, ipsamque adeo salivam comprehendit, quatenus cum ipsa deferuntur ad cor) aut utramque vitiosam, & in dextro cordis ventriculo effervescenciam talem excitantem, unde continuo pulsus producatur frequentior.

Febrem ephemeram inducunt nimius corporis motus, animi perturbationes, calor ambiens; puta Solis aut Æstuarii, vini potus, ciborum piperatorum esus, vigiliæ, labor immodicus, bubo, aut vulnus, in puerperis lactis proventus, ad eam disponunt temperies corporis calida, habitus athleticus, vita sedentaria, & exercitii defuetudo.

Febris putridæ causæ procatarctiæ sunt, temperies calida & humida, habitus corporis atheleticus. Ætas juvenilis, victus lautus & opimus, vinorum, divitum potus assiduus, tempestas verna aut æstiva, corpus cachochymicum, & vitiosis succis refertum, præ cæteris verò observatione constat, quod crebra sanguinis missio, homines febri aptiores reddat, ex eo nimirum quod hac ratione sulphur in sanguine copiosius congeratur, subducatur verò sal quod ipsum ab efferatione cohibere debet, quæ latentem hujus febris diathesin in actum deducunt, sunt præcipuè

*διὰ πύον* impedita & crapula; hæc non solum fermentationem immodicam sanguini inducit, sed simul etiam materiam nitrosulphuream adustioni & incendio aptam velut pabulum sanguini flagranti subministrat; propter illam verò sanguinis massa mole aucta turgescit veluti fermento quodam de novo inspirata fervorem concipi, & immaniter ebullit.

In hac febre quatuor licet obsequare tempora, quibus velut toridem stadii se ejus cursus peragitur, sunt autem hæc, initium, augmentum, status, & declinatio, hæc in quibusdam citius in aliis tardius & longiori tempore solent absolvi. Initium computari debet, à quo sanguis fervere, ejusque sulphur æstum concipere incipit, usque dum in totam cruoris massam ardores & excandescenciæ diffunduntur, tunc est quod plerumque rigor aut horror infestat, ob nimirum crudi succi cum sanguinis admixtionem. Augmentum erit cum febris incendium totam occupavit sanguinis massam, h. e. sulphur seu oleosa sanguinis pars jamdiu excoacta, & per partes effervescens tandem instar fœni madidè repositi post longam incalescentiam simul tota in flammam erumpit, ejusque massa recrementis seu particulis adustis, quæ & fermentationem adaugent, aggravatur, hoc tempore ægri de siti intollerabili quærantur; insuper dolor capitis, vigiliæ pertinaces, sæpe etiam deliria, phrenitis, & motus convulsivi infestant; alimenta quævis fastidio sunt, aut vomitu rejiciuntur: accedunt oris amoror, sapor ingratus, linguæ scabrities, pulsus vehemens & citatus, urina summè rubicunda, plerumque turbida & contentis saturata. Status est illud morbi tempus, in quo natura crisin seu materiæ adustæ & à deflagratione sanguinis residuæ expulsionem molitur. Post enim sanguinis & succi alibilis deflagrationem, materia hæc adusta in tanta copia congeritur, ut turgescencia sua naturam ad expulsionem irritet, quæ crisis dicitur: cujus causa inde potius potèda est quàm à Lunæ influentis. Declinatio crisin sequitur, quo tempore sanguis languente incendio minus effervescit, & vel spiritu vitali adhuc præpullente, quod reliquum est materiæ istius adustæ subigit, & pau-



& paulatim excernit, donec pristino vigore restitatur; velleodem spiritu nimis depresso, recrementis adustis adhuc inficitur, ideoque turbidus & depauperatus evadit, ut nec succum nutritium assimilet, nec circulationi, neque in corde accensione pro lampade vitæ sustentanda, idoneus perstat. *Thomas Willis, lib. De Febribus.*

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Febre Synocha simplici.*

**J**Vvenis quidam Nobilis bene habitus & sanguineus mense Majo pila palmaria ludens, seque vehementer exercens, adhuc cum antagonista contendens; atque exandescens, postea domum reversus in febrem incidit Synocham, itaque Chirurgo accersito, vena brachii aperta, sanguinisque ℥viii. detracta fuerunt, statimque ad sanguinis fervorem extinguendum julepum hunc propinavi.

℥℥. Aquar. endiv. & acetos. an. ℥i. succi limon. ℥i. Syrup. de ribes & de agresta an. ℥i. Julep. viol. ℥i℥. capiat mediam partem statim à venæ sectione, alteram sub nocte, ut aquam fontis, quam summè expetebat, injecta tamen prius crusta, panis, affatim biberet concessi, quia nox inquieta fuit ob turbulenta insomnia, & caput dolebat, oxyrrhodinum fronti & temporibus applicui.

℥℥. Aq. ros. ℥iv. aq. plantag. viol. & lactuc. an. ℥ii. aceti rosac. ℥i. album ovor. num. i. ol. rosac. ℥i. agentur ut fiat oxyrrhodinum.

Pulsus cum nihilo remissior esset, iterum crastino die missus est sanguis ex sinistro brachio bona quantitate. Sub vesperam quia alvus non respondebat, & ut calor magis restingeretur clyisma injectum fuit tale.

℥℥. Fol. malv. viol. acetos. lactuc. endiv. an. Mi. flor. viol. nymphaeæ an. pi. sem. cucurb. conquassat. ℥℥. sem. psyllii, ℥ii. F. decoctio, in colat. ℔i. dissolv. sacch. rub. ℥i. cassiæ rec. extract. ℥℥. succi lactuc. ℥℥. ol. viol. ℥ii. salis parum. F. Clyster huiususu bis ejecit, post mediam noctem facies & pectus madere coeperunt, indeque somnus subsequi, moxque interdor-

miendum egregiè sudare: & postea febris cum penitus dereliquit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 277.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Febre ardente.*

**P**Auper quidam quadraginta annorum coreptus est ardente febre cum symptomatis solitis, illum paucis & nullius pretii remediis sequentibus sanum feci.

℥℥. Aq. Card. bened. ℥vi. rad. asari pulver. ℥ii. M. pro haustu, hausto hoc calide in lecto, sudavit multum, vomuitque nonnulla biliosa, sequenti die basilicam cubiti dextri aperuit, & copiosè sanguinem misit, pro cibo dabantur juscula, potus erat aqua decoctionis fragrarum, atque his sanè mox subventum est misero. *Martinus Rulandus, curat. 56. cent. 9.*

Experientia longa observavimus in curandis febribus omnibus, & iis equidem quæ nullis pharmacis solvi & tolli potuerunt, illas mox & certò solutas & sublatas esse aqua benedicta. *Martinus Rulandus, curat. 68. cent. 9.*

Pauperacula quædam febre ardente lethifera laborans, mox adjuncta est & liberata peremptu facilia & utilia ista catapotia.

℥℥. Pil. sine quibus, aurear. an. ℥ii. agar. troch. ℥℥. cum syrup. ros. solut. F. pil. ix. quarum operatio fuit bona & salutaris, potus erat decoctum radicum cichor. *Martinus Rulandus, curat. 69. cent. 9.*

Vir quidam triginta annorum ardente febre extorrescebat, accesserat pertinax vigilia, lingua arida, spiritus difficilis, cibi fastidium, vehemens sitis, ab omnibus erat desperatus, urina fuit rufa, turbida & spumosa, huius deplorati hominis curam suscepi talem. Cibuserat liquidus, sorbilis, humectans, potus aqua julepizata julepo violato, hoc purgatorium propinavi.

℥℥. Decoct. aperitiv. cum rhab. ℥iii. syrup. rosat. solut. ℥ii. syrup. de rhab. ℥i. M. pro haustu: quo alvus multa biliosa & varia egressit, & febris sese mox inclinavit, urinaque coepit: naturalis fieri. Sequenti die post hanc evacuationem, basilicam venam me admonente pertudit, his ita pera-



p̄ræctis præter omnium hominum opinio-  
nem Dei misericordia iterum incolumis  
restituitur. *Martinus Rulandus, curat.*  
46. cent. 10.

Juvenem quendam 19. annorum febre  
continua periculose laborantem mox an-  
nuente Deo, sanum feci per sequentem po-  
tionem & poculum.

24. Aq. font. vini an. ℥iv. bulliant simul &  
semel, postea infundantur in calice nostro  
chimico per horæ quartam partem, dein-  
de invocato nomine Domini, accepit cali-  
cem salutarem ebibitque infusum, & post  
horam evomit multa phlegmatica & bi-  
liosâ, ac alvo quoque consimilia excrevit,  
& statim melius habuit, melior etiam urina  
& quatuor dierum spatio sanatus fuit, vi-  
ctus ratio fuit humectans, potus decoctum  
hordei saccharatum. *Martinus Rulandus,*  
*curat. 27. cent. 9.*

Villicus quidam annorum 40. robustus,  
cunicula æstuante, cum variis cibis ac poti-  
bus sese implevisset, & præter modum se  
exercitasset, in febrem acutam continuam  
lapsus est. Vehementer enim capite dole-  
bat, aderatque totus corporis calor acris  
& mordax, qui unâ cum febre magis inten-  
debatur, & ad interiora penetrabat; vigi-  
lia quoque ac insigni angustia premebatur,  
hypochondria dolebant; sitis valida cum  
linguæ ariditate & palati; pulsus velox,  
& anhelitus spissus, inquietudo, spiratio  
major, decubitus gravis atque molestus,  
somnia terribilia, & frequens in somno lo-  
cutio, delirium per intervalla: quæ omnia  
& acutam & continuam febrem indicabant  
Cumque adesset, plethora, ac lotium ru-  
brum esset, & alia ad sanguinis detractio-  
nem consentirent, balneo prius indito,  
cum alvum non redderet, ad ℥vi. sanguinis  
trahere feci, sed non plures ob æstum &  
in homine bilioso, & macilento. Mox &  
hunc syrupum ebibit.

24. Syrup. de endiv. de succo acetos. viol.  
an. ℥ß. aq. bugl. cichor. acetos. an. ℥i. M. De-  
cocto hordei pro potu utebatur. Quarto die  
à morbi decubitu hoc leniens medicamen-  
tum propinavi.

24. Diaprum. simpl. diacathol. an. ℥ß. e-  
lect. è succo ros. ℥i. aq. decoct. tamarind. &  
flor. cord. ℥iii. Syrup. viol. ℥i. M. Ter co-  
piose ex eo alvum reddidit. Sub noctem ad

somnum conciliandum capiebat ex syrup.  
viol. papav. & nymphææ, cum aq. lactuc.  
Et ad dolorem capitis consopindum, mo-  
dò oxyrhodon fronti imponebatur, mo-  
dò lac muliebre. Quinto julepos sumpsit  
ex aqua endiv. cich. acetos. an. ℥i. Syrup. de  
limon. viol. an. ℥ß. M. Et cum lotium cras-  
sum & concoctum spectabatur. Sexto die  
hanc purgationem sumpsit.

24. Rheiel. ℥iß. spica ℥ß. Infund. per no-  
ctem in aq. endiv. cich. bugl. an. q. s. In col-  
lat. express. ℥iii. dissol. cathol. ℥vi. Syrup.  
ros. solut. ℥i. M. quo sexies multa bilio-  
sa & male olentia excrevit. Septimo die  
cum calor non mitigaretur, epithemata  
hepatis & cordi sunt adhibita, à quibus  
melius habere visus est. Post meridiem  
cœpit delirare; sed sub noctem cum in  
somnum incidisset, mox ad se rediit, &  
cum pulsum tangerem, undosuserat, &  
sudor per totum corpus erumpebat, &  
melius deinde habere cœpit, ita ut po-  
stea eum febris reliquerit. At 7. vel plu-  
ribus diebus interpositis, post meum disces-  
sum cum bene se haberet, recidivam pas-  
sus est, quam ex mala victus ratione fa-  
ctam suspicabar: & tunc multò pejus quàm  
antea laboravit, ita ut etiam hypochon-  
dria fuerint tensa & inflammata, unde &  
delirabat & in paraphrenitidem incidebat,  
ut à quatuor hominibus vix in lecto conti-  
neri posset. Nihil tunc remedii tentatum,  
sed amici astantes, ut moriturum, cum  
omnino sacerdotibus committunt. At de-  
lirium per se sedatum est, fluxu enormi  
subsequenti, singultu etiam oborto, cum  
sopore ac animi deliquio. At his duobus  
accidentibus rursus cessantibus, remansit  
singultus. Retunc quasi deplorata, ite-  
rum me vocarunt, ut, si aliqua spes in  
remediis adhuc posita foret, adhiberem.  
Accedens inveni vires valde dejectas, &  
quod singultu eundem maximè infestaret.  
Sed & sopor & deliquium animi, quæ præ-  
cesserant, cum singultu magis anxium me  
reddebant, juxta *Æstium Tetrabibl. 3.*  
*Serm. 1. cap. 5. sic,,* dicentem: Singultus  
in altiore sopore, aut animi deliquio, aut  
tetanis,, obortus, mortem non longè abes-  
se præsignit. Evanuerant tamen sopor &  
animi deliquium ante quàm eum ac ede-  
rem, remanente virium debilitate & sin-  
gula



gultu: fluxus etiam, qui prius adfuerat, nunc sponte sedatus erat. Cum autem mirum in modum singultu afficeretur, stomachum prope mucronatam cartilaginem tum etiam spinam dorsii è regione ejusdem inungebam oleo viol. ad humectandum & refrigerandum, etiam bombace in eo oleo tincta admota. Deinde imperabam, ut continuò sumeret ex syrupo violaceo & menthaceo simul mixtis: violaceus humectabat menthaceus verò corroborabat; iisque adhibitis remediis, singultus incantamenti instar cessavit. Ad corroborationem quoque saccharo rosaceo perlato utebatur, & præscripta diæta resumptiva hic secundo curatus fuit, tanquam à sepulchro in lucem revocatus, præter astantium opinionem. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 4. De Febris.*

Puer quidam cum febre continua laboraret, & rursus bene haberet non multum postea ab ingestis pomis viridibus in febrem recedit. Huic post injectos clysteres, deposita ventris excrementa, sequenti die ad eum accedens, syrup. rosati solutivi ℥ii. tribus aque portulacæ mistas jejuno stomacho propinavi: quibus ita in sudorem copiosum, universum ejus corpus irrigantem ad tres horas pervenit, ut indeliberà febre maneret; ex pharmaco autem purgatorio, per sudorem evacuans humores factum est. Cæterum elapsis postea quinque diebus puer hic febre correptus est, à qua sudore mundus evasit. Postea quinto altero sequenti die eadem febre eadem hora oppressus fuit, à qua & sudore liber evasit. Sed & quinto altero sequenti die similis paroxysmus vexatus est, à quo & sudore in totum sanatus est. Quintani autem tres hi paroxysmi à me in hoc puero deprehensi sunt adeò evidentes & manifesti, ut ex tertianis quotidie percipiuntur. *Amatus Lusitanus, curat. 67. cent. 5.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Febre continua putri.

**J**Uvenis quidam biliosus 25. annorum, cum tempore verno à cibo, operi rustico valde intentus esset, in febrem continuam eamque putridam incidit. Secundo

die à morbi initio ad eum accitus, cum alvum strictiorem haberet, minorativum medicamentum sequens propinavi.

℥i. Elect. lenitiv. & cathol. an. ℥iii. syrup. rosat. solut. ℥ii. aq. cichor. ℥iv. quo multa biliosa evomuit, simulque ter alvum excrevit, sequenti verò die, ℥viii. sanguinis ex vena brachii dextri extractæ sunt, cum robustus esset, hora quarta pomeridiana hunc julepum ebibit.

℥i. Aq. lactuc. cichor. endiv. an. ℥i. syr. de endiv. viol. oxysacchar. simpl. an. ℥ss. M. pro capitis dolore fronti oxyrhodinum admovi, cumque male dormiret, tempora inunxi oleo viol. & papav. simul mixtis, cum à sanguinis tractione, aliquantulum sudasset, & bene egressisset quarto die melius habere visus est, quinto autem cum signa coctionis in urina apparerent, neque alvum deponeret, rhabarbari infusum sequens dedi.

℥i. Rhabarb. el. ℥ss. spic. ℥ss. infund. per noctem facta prius leni ebullitione in aq. endiv. ℥v. fortissimæ expressioni adde syrup. rosat. solut. ℥ii. M. quo optimè excrevit, ita ut febris sexto die minus illum affligeret, & urina crassior facta valde subsideret; septimo autem die per sudorem crisis subsecuta est, & sanitati restitutus fuit. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 2. De Febris continuis.*

Puella quædam septem annos nata, laborabat febre continua non admodum vehementi, sed quæ per intervalla, scilicet circa vespèram exacerbabatur, incepit febris cum vomitu pituitoso, quem deinde secutus est alvi fluxus etiam pituitosus, per unum tantum diem perseverans, urina erat pallida & turbata, anhelitus acidus & graveolens. Præscribo potionem ex infuso ℥i. rhei cum syrup. rosat. ℥i. quam paulò post assumptionem evomuit, cum pituita crassa & valde putrida, deinde circa vespèram clysterem ex catholic. duplic. ℥ss. injiciendum curo: quo & reliquis medicamentis simul operantibus, quinquies deiecit tota nocte materiam pituitosam, biliosam, & valde foetentem; manè febris perexigua, & meridiè febris expers, ac sanitati restituta est.

Ex hac observatione colligere est, quantum



tum aberrant illi Medici qui in omni febre continua indiscriminatim à venæ sectione inchoandam esse curationem existimant, cum sæpe in pueris dictæ febres à putridis humoribus, in prima regione stagnantibus oriantur; qui purgatione facillè educuntur, in hac autem puella vomitus pituitosus & alvi fluxus talem humorum redundantiam indicabant. *Lazarus Riverius, obs. 57. cent. 1.*

Inter reliqua, quod semper certa fide à me longo experimento probatum est, laudo ut singulis diebus sumat infusionem rhabarbari in aqua endiviæ: Nunquam enim vidi febrem ex obstructione hoc remedio non esse sublatam, si modò pertinaciter quispiam in ejus usu perseveraverit. Quandoque enim crassissimos humores impactos, & obstructions, quæ ob caloris imbecillitatem facillè tolli non poterant, ex rhei assumptione curatas vidi. Consuevi accipere libram aquæ endiviæ, in quam ℥i. rhei infundo in panno lineo involutam. Deinde singulis diebus ℥iv. illius infusionis, facta aliqua expressione, accipi jubeo circa auroram; & est hujusmodi dosi puerorum. Neque desisto ab hac potione, priusquam video omnino & febrem & obstructions esse sublatas: auferentur enim procul dubio, si reliqua omnia rectè fiant, & curationi consentiant. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 10. De febribus.*

#### SUBSECTIO QUARTA.

*Pro febre summe maligna cum pulsu intermittente.*

**N**obilis quidam incidit in febrem summæ malignitatis, quam statim ab invasionis principio comitabatur. continuus vomitus materiæ biliosæ, vehemens linguæ ariditas, sitis, inquietudo, intollerabilis æstus ventriculi, cum frequenti eructationum repetitione, quæ per intervalla gulæ communicabat angustias & coarctationem difficillimam; pulsatio arteriarum deprehendebatur valde inæqualis & inordinata usque ad septimum diem, quo percipi cæpit intermittens, sed hic nondum arripui desperationis ansam, licet haudquaquam me latere *Galen*i de hoc signo judicium prorsus formidabile.

Ad medelam huic affectioni præstendam accitus, neglecta sanguinis detractione, quam hoc anno in quibuscunque malignis & pestilentibus morbis crudeliter grafsantibus periculosam compereram, illico exhiberi jubebam antidotum hoc cum aq. Card. bened.

℥i. Theriac. el. ℥iii. rad. tormentill. bacch. junip. sem. Card. bened. an. ℥i℥. Bol. armen. præp. ℥℥. diamargar. frigid. ℥ii. sem. acetos. citri, ras. eboris, an. ℥i. syrup. acetos. citri, q. s. F. conditum, unde provocato abundè sudore meliusculè habuit, tertio die observata maxima humorum putredine, & apparentibus incendii adustionisque gravioris indiciis, ordinavi decoctum ex hordeo, Carduo bened. & scabiosa confectum, admixto saccharo & aceto in formam syrup. acidi quo assidue utebatur, quandoque haustum ex stilaticia Card. bened. & oxalidis aqua bibebat. Nutriebatur ptisana subacida, avenato in aqua cum pauxillo aceti præparato, ac tandem juscule pulli gallinacei simplici in quo vitellus ovi erat dissolutus, assumpsit quoque succum mali punici. Quinto die contacto diligenter corpore, exhibitaque aqua hordeacea dulcorata, copiosissime profluxit sudor, qui mirè ægrotantem sublevabat anxietatis continuæ molestiis. Sexto per secessum prodibant excrementa penitus biliosa cum fœtore magno adeo ut natura materiæ peccantis diminutionem paulatim molliori jam videretur, sed impedita fuit ab insultu noctis subsequenti, qua symptomatum omnium concursus ingruebat tanta & vehementia & celeritate, ut æger condito ultimæ voluntatis testamento migrationis è vita momento intenderet. Septimo rediens manè in acerbo consanguineorum astantiumq; luctu citra ullam delationem digitis carpo ad motis pulsum percipio intermittentem tertia quaque pulsatione, qui primo quidem contactu terrorem incussit, at examinatis interea cæterorum accidentium præsagiis, indeque certa convalescentiæ spe data, quicquid discriminis portendebat variata illa cordis & arteriarum motio, id totum retuli ad acerrimam naturæ cum vi morbi consertationem, neque profectò conjecturam meam eventus rei fefellit, quoniam reliquo diei decursu



expultrix facultas occupabatur planè in exonerando stomacho à noxia materiæ aduste multitudine, animadversio ne habita primò ad virtutis corroborationem, odoratiui mala arantia aq. rosac. obtuli. Deinde ad juvandum naturæ conatum insciendo vomitu exhibui aquam tepidam cum ol. communi & arantiorum succo mixtam; inde serosa quidem, excrementa nonnulla emanarunt. Sed quum minera malinondum attingeretur satis ab imbecilliori hoc medicamento, aut ejus tenacissima malignitas infringeretur sequenti die (qui octavus numerabatur) deliberato animo, & pulsus intermissione quamvis perseverante, ministravi potionem purgantem sequenti modo confectam.

℞. Rhei el. pulv. sen. laxativ. an. ℥i℥. infund. seorsim in aq. endiv. ℥iv℥. horis x. post fortem expressionem colat. adde syrup. ros. solut. ℥i. M. & quia mentio incidit pulveris senæ solutivi, cujus usum in hac inferiore *Germania* ego primus introduxi, ejus descriptionem lubenti communicatione obiter subjungam, ut quibus visum fuerit in suis præparent pharmacopoliis.

℞. Fol. sen. purgat. tartar. alb. an. ℥i. sem. anis. cariophyll. cinamom. galang: an. ℥i. diagrid. ℥iii. comminuantur minutissimè in pulverem. S. A. dosis est ℥ii. substantia & ℥℥. in infusione. Ex superscripti pharmaci assumptione sexies æger per alvum excrevit flava, biliosa, adusta, fœtida, cum sedatione omnium symptomatum: ut etiam testaretur sensibili perceptione sese liberari ab ingenti pondere incensi glomeris per intestinorum longitudinem à ventriculo delabentis. Postea roboravi intrinsecus conf. ros. exhibitione foris. verò illinitione olei ros. immitaturi, convaluit probe nobilis hic post universalem corporis evacuationem: saltem pulsus intermittens perdurabat adhuc in nonum usq; diem, quo commutabatur in parvum, raram, & tardum, qui necessariò debilitatem sequebatur ex mutua naturæ & ægritudinis colluctatione natam. Proinde manifestissimè apparet hanc prædicendi cautionem à Medicis esse observandam, ne animo penitus percusso & commoto de valetudinis recuperatione confestim diffidant, si

quando ejusmodi pulsus sensui occurrat; cum causæ quidem morbificæ magnitudinem & ancipitem oppugnantis naturæ luctam denotet, non tamen mortis propinquitatem, nisi plurium lethalium signorum tanquam *τὸ ἀμύμιον* accessione confirmetur artificiosa conjectura. *Ioannes Vviers lib. 1. observ. 4.*

In febre maligna hodie frequentissimus est lapidis bezoardici usus, cujus (ut libere loquar) numquam evidentem ullum fructum conspexi, veruntamen usurpari facile concedo, quod ex iis sit, quæ si non juvent, nec etiam obsunt: quæque exerce-ri à Medico indulgebat. *Hippocr. Hier. Mercurialis, consult. 5. tom. 3.*

Utingenue dicam, dum *Venetis* proxim excercerem, maximam lapidis bezoardici copiam consumpsi, nec egregiam operam sensi. Scio plurimos quibus exhibui, fuisse sanatos, sed non retuli in lapidem: Scriptores dicunt, quodeo sumpto sudor copiosus excitetur, post quem statim sublevantur. Ego tamen non vidi sudorem prorumpentem: vel si apparebat, erat sudor imperfectus, itaque quantum ad me, abjeci omnem spem huius lapidis in his febribus. *Hercules Saxonia, lib. De Febribus, cap. 38.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Febre putrida maligna.*

**I**N eam facile sententiam descendo, ut quamprimum mittatur sanguis quamvis nonnullis venesectione in febre maligna virium causa, veluti valde suspecta improbetur, habeo tamen rationes quæ id mihi semper persuaserunt.

Contra malignitatem ita pugnandum est.

℞. Margarit. alb. non perforat. C. C. usti, sem. citr. mundati, an. ℥i. boli armen. orient. ℥ii. sacchar. albiss. ℥℥. M. F. pulvis subtilis cujus ℥i. bis in die detur in cibis.

Placet nunc confectionem quandam huic operi maxime opportunam longo usu à me comprobata recensere. Est autem hujusmodi.

℞. Bol. armen. or. ℥i. corall. rubr. ℥ii. macis ℥℥. rad. angelic. tormentill. fol. dictam rec. an. gr. v. sem. citri mund. margarit.



## SUBSECTIO SEXTA.

## Pro Febre maligna.

garit. alb. an. ℥ss. rad. Scörzoner. condit. ℥ii. sacch. albi. in aq. vel decocto Sonchi dissolut. q. s. ut fiat confectio in rotulis ℥ii. ponderis : quarum una singulis sex horis junctio ventriculo offeratur : præterquam enim quod venenosos illos halitus aut humores eadem contagione infectos mirificè corrigere & extinguere valent, temperatæ admodum sunt, ita omnibus humoribus indifferenter spiritui venenoso materiam præstantibus in omni ætate, temperamento & anni constitutione nec non in utroque sexu, maximè sunt accommodatæ : delirio succurrendum est venæ sectione, vesicantibus, oxyrrhodino, cucurbitulis scapulis affixis, clysteriis, frictionibus & ligaturis dolorificis partium inferiorum : & somnum conciliantibus : pro linguæ ariditate, scabritie & siti, lactucæ & oxalidis folia aqua frigida madefacta ore contineantur; neque unquam gelida pro abluendo ore illi denegetur, vulgatissimum enim est veterum illud præceptum, cave ne exsiccentur fauces ægri : in hunc usum efficacissimum est hoc conditum.

℥. Sem. citrull. sem. portulac. virid. sem. papav. alb. an. ℥i. rad. liquirit. traganth. an. ℥ss. cum mucagine sem. cyton. aq. rosac. extract. F. globuli in ore detinendi. *Job. Zecchius, consula 47.*

Pro potu sit decoctum C. C. vericum hoc syr.

℥. Syrup. acid. citri, ℥ss. rob. de berberis & de ribes, an. ℥i. sp. vitrioli gutt. vii. M. Ad fervorem restinguendum hunc julepum exhibui.

℥. Syrup. acid. citri, è succo acetos. an. ℥ss. sal. prunell. ℥ss. aqu. acetos. ℥ii. aq. cichor. endiv. an. ℥vi. M. non parum contulit tinctura rosar. ita præparata.

℥. Aq. endiv. ℔i. aq. acetosell. ros. an. ℔ss. flor. ros. rub. ℥ss. spirit. vitrioli ℥ss. infunde tepidè in vase vitreo per horas x. colat. adde julep. rosat. ℥ii. de qua bis in die haustus auferatur : ad refrigerium, roborandum, & malignitati resistendum valde accommodata. In febribus continuis, & malignis primas tribuo partes aque acetosell. quæ & alterando, & malignitati resistendo suo merito principatum obtinet. *Augustinus Thorneus, lib. 1. observ.*

U Ngula alcis sumoperè in epilepsia commendata mirabiliorum virtutem possidet, ut sæpius nos experti sumus contra venena & febres malignas, eo modo sumpta quo lapide Bezoar utimur. Sudorem facillimè movet. Nos exhibimus in minutissimas partes lima redactam cum conserv. de acredine citri ad septem granorum pondus, mirabileque effectus in morbi malignitate superanda ægrotis peperit. *Dominicus Panarolus, observ. 33. Pentecoste 3.*

Vir quidam incidit in febrem malignam quæ ipsum ad convulsiones & delirium perduxit, cum summa pulsus inæqualitate, unde brevi moriturus videbatur. Ex variis quæ illis exhibita fuerunt, maximè profuit aqua theriacalis nostra in febris pestilentis curatione descripta ad ℥iv. exhibita cum bezoardici jovialis, gr. xii. à quibus sudor copiosus excitatus est, & æger veluti miraculo liberatus. *Lazarus Riverius, observ. 66. cent. 4.*

Compositio aquæ theriacalis *Riveriana* talis est.

℥. Limones recentes & succolentos, numero 12. cortices & semina eximantur, succus exprimatur, eique adde cortices prædictos & semina : succi scordii, ℔iij. succi acetos. rutæ caprariæ, scabios. & Card. bened. an. ℔i. ras. C. C. ℥iv. theriac. vet. ℥vi. cortices limonum in tenues laminas dividantur, semina contundantur, & herbæ quæ minus habent succi inter contundendum succo limonum irrorentur. Omniaque destillentur in B. M. hujus aquæ detur ℥i. per se vel cum aliis liquoribus permixta.

Matrona quædam Sexagenaria febre maligna laborabat, cum summa virium dejectione ex continuo alvi fluxu ad lenteriam tendente, & totius corporis refrigeratione singulis diebus recurrente, & per plures horas perseverante. Cum remedia ordinaria, quæ pro febre maligna, alvi fluxu & corroboracione virium vulgò præscribi solent, sedulo ac continuo per bidduum usurpata, nihil profuissent, & ægram pejor.



pejus rueret, ita ut die undecimo morti proxima ac veluti in agone constituta videretur ab bezoardicum joviale tanquam alexipharmacum eximium, & potens diaphoreticum confugiendum esse censui, illius gr. xii. exhibui: ab eo tempore non amplius deiecit: perfrigerationes non redierunt, & intra biduum febris expers fuit, ac postmodum brevi convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 56. cent. 4.*

Civis quidam *Monspeliensis*, cum laborasset febre maligna per 6. septimanas, tanta virium deiectione detinebatur, ut brevi moriturus videretur. Ego tunc temporis eum videre incipiens, & audiens parum expurgatum fuisse toto morbi decursu, ab humorum sarcina vires opprimi censui, eas tamen adeo deiectas vix purgationem sustinere posse. Ideo per epicrasin purgationem institui, & potionem præscripsi ex infusione ℥i. Senæ in aq. cicchor. cum sal. tartari ℥ss. addendo syrup. ros. ℥i. Continuata fuit potio per triduum. Ex ea bis deiciebat singulis diebus, vires paulum recreatæ. Quarto die sumpsit syrup. de absinth. ℥i. Quinto exhibita infusio ℥i. Senæ, & per biduum continuata, blandè purgatus est cum fructu. Unde melius habere cœpit, & sensim convaluit repetitis per intervalla purgationibus. Post ali-quod tempus recidivam passus est & Medicum non vocavit, donec ad extrema redactus fuerit, atque ita ultimum diem clausit. Hoc tantum in hac observatione notatu dignum est, medicamentum purgans exhiberi posse in summa virium deiectione, modò per exigua dosis præscribatur. *Lazarus Riverius, observ. 87. cent. 2.*

Mercator quidam febre acuta & maligna correptus est cum pessimis symptomatis, quæ licet septimo videbatur sopita, decimo quarto tamen rursus increbuit. Ad quem accitus debilem inveni dentibus stridentem, & nares palpantem. Hæc mihi præbebant suspicionem vermium, qui in ejusmodi febribus putridis & malignis sæpe adesse solent. Cumque per 2. dies alvum non ceposisset, clysterem injicere jubeo, ad materiæ putridæ aversionem & retractionem, quæ ad caput. tendebat surditatem & delirium inferens.

*Burnet Parte I.*

℥4. Juris pulli decocti cum lactucæ, viol. malv. lib. i. cassiæ extract. ℥i. Spec. hier. (ob vermes & materiam aliquo modo pituitosam) ℥ss. ol. oliv. viol. an. ℥ss. sal. ℥i. M. f. clyster. Benè excrevit, & vermem in excrementis conspeximus. A clystere parum melius habere visus est, delirio nondum ex integro sedato. At cum per intervalla ad se rediret, dicebat se subinde dolorem modò circa ventriculum, modò totum ventrem sentire. Verum cum confectione sequenti uteretur, quatuor deinde vermes admodum longos vomitu, & 4. per alvum unà cum excrementis valde male olentibus deiecit. Tale erat Electuarium.

℥4. Spec. diarrhod. abbat. diatrag. frig. 1 spec. cordial. corall. rubr. (nam fluxus quasi symptomaticus postea accessit) cornu cervi usti an. ℥ss. subtiliter pulveris. dissolv. in aq. portulac. bugl. adiect. sacchar. albiss. q. s. fiat Confectio in tab. Capiebat bis in die ℥ij. vel iii. Altero die, dictu mirum, cum continuo ex istis tabulis sumeret; denuò adhuc quatuor vermes vomitu, deinde adhuc quatuor per secessus magno impetu reiecit, quibus mox fluxus cessare cœpit, & pristinæ sanitati restitutus fuit. In hac curatione hoc notatu dignum, quòd cornu ustum (ut sæpius aliàs experti sumus) maximè confert in febribus ejusmodi malignis, ubi fluxus adest, & vermes intestina lancinat. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 2.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Febre maligna.*

Post *Monspeli* obsidionem an. 1623. grassata est per plures mense febris admodum maligna, ex qua media ferè pars agrotantium interibat particulariter verò quibuscunque parotides superveniebant: (quod circa nonum vel undecimum morbi diem solebat contingere) omnes interibant, cum autem plures huiusmodi vidissem, neque ullis alexipharmacis liberare potuissem, cogitare cœpi ideo censerì lethales parotides, quod pars illa non sit capax recipere totam materiam morbificam, quæ intus manens, intermit; & sup-

R

plen-



## SUBSECTIO OCTAUA.

*Pro Febre maligna.*

plendum esse naturæ opus: ac quanquam ægrogantes pulsum haberent parvum & frequentissimum ac pene formicantem, ut in agone mortis versari viderentur, quæ etiam brevi succedere solebat: at tamen hanc *C. Celsi* sententiam animo revolvens, multa scilicet in præcipiti periculo recte fieri, quæ alias essent omittenda, & satius esse anceps remedium in uno, aut altero experiri, quam toto ægros certo exitio relinquere; sanguinis missionem præscripsi partitis vicibus, propter virium imbecillitatem bis aut ter in eodem die, & sequenti die, purgationem: qua via omnes, quibus hæc remedia administrata sunt, scilicet evaserunt, neque ullus deinceps interiit. *Lazarus Riverius, observ. 43. cent. 1.*

Vocatus ad quendam febre maligna laborantem, præter remedia ordinaria & julepos cardiacos cum sale prunellæ ter in die exhibendos hunc pulverem præscribo.

℞. Salis prunellæ, ℥ss. camphoræ ℥ss. M. F. pulvis: qui dividatur in quatuor partes, quarum una capiat tertia quaque hora: noctu hunc pulverem sumpsit, manè multò melius habuit, jubeo iterari pulverem cum aliis remediis, & eodem die à præsentaneo vitæ periculo liberatus est, paucis & modum post diebus omnino convaleuit. *Lazarus Riverius, observ. 18. cent. 2.*

Aromatarius quidam viginti & quatuor annorum laboravit febre maligna, ex qua tandem circa undecimum morbi diem incidit in delirium, & paucis post modum diebus in motus tremulos & convulsivos nervorum qui phrenitidi lethali supervenire solent per mensem ferè integrum delirium perseveravit convulsiones verò per dies duodecim, tandem evasit post multorum remediorum usum: ea quæ magis profuerunt, sunt sectio venæ frontis, & julepi compositi ex aq. card. bened. ℥iv. aq. theriac. ℥iii. bezoard. mineral. ℥ii. camphoræ, gr. xii. qui quinquies fuere exhibiti. *Lazarus Riverius, observ. 62. cent. 2.*

**A**Ncilla quædam febre maligna laborare cœpit, quæ cam ad deliria & convulsiones deduxit: qui paupercula erat, & parcebat sumptibus, paucis remediis curata est in sequentem modum. Quatersecta fuit vena cucurbitulæ pluries ad motum humidæ & siccæ: pro potu utebatur decocto radicis acetosæ, in quo dissolvebam bis in die salis prunellæ, ℥i. spirit. sulphuris, gutt. xv. In iusculis fumebat frequenter bezoard. mineral. ℥i. die undecimo morbi exhibui spiritus fuliginis, ℥ii. in aq. card. ben. & parum sudavit: die duodecimo exhibui ejusdem spiritus ℥iii. cum eadem aqua copiosè sudavit, eodemque febris remissa est, deliria & motus convulsivi desierunt: & intra paucos dies postmodum convaleuit. *Lazarus Riverius, observ. 36. cent. 3.*

Virgo quædam viginti annos nata correpta est febre maligna, quæ eo usque processit non obstantibus remediis ordinariis, ut circa undecimum morbi die in delirium & nervorum contractiones incidere, quibus accedebant interdum Leipsychie: in gravi illo periculo præter epithemata & pullos columbinos, aliaque roborantia interna & externa, sequentia remedia præscripsi; quæ in his affectibus maximæ solent esse efficaciarum: nempe vesicatoria quinque cervici, brachiis, & femoribus admovenda; julepos ex aq. card. bened. ℥iii. aq. theriac. Bauderon, ℥iii. Bezoard. miner. ℥ii. camphoræ, gr. vi. qui julepi per biduum usurpati fuere manè & serò; tum etiam prædictum bezoard. mineral. exhibebatur in singulis iusculis ad ℥i. hisce remediis intra paucos dies, à gravi morbo liberata est. *Lazarus Riverius, observ. 73. cent. 2.*

Mulier quædam triginta annorum sese mihi curandam obtulit, laborabat febre maligna à duobus diebus, cum dolore capitis, inquietudinibus fere continuis, sitique intensa, maculis quibusdam lividis circa pectus & dorsum apparentibus: ter intra biduum sanguinem adu-



xit ad 3viii. singulis vicibus, cumque interna omnia remedia adversaretur, ad externa animum contuli: quinto itaque morbi die cataplasma ex cochleis cum sui testis contusis, stupisque superpositis utrique pedi circa plantas applicandum curavi admotum est hoc remedium circa horam tertiam pomeridianam inclinante autem die, coepit ægra sentire dolorem quandam molestum & gravem in utroque femore & ribia, qui ad mediam usque noctem duravit, ea sævitia ut ægra de removendo cataplasmate perpetuo cogitaret. Media autem nocte sudor totum corpus invasit, tanto fœtore, ut illum sustinere vix posset, mutato indusio, amota sunt e pedibus cataplasmata tetrum adeo odorem exhalantia, ut adstantes ferè inficeret; manè ægram alacrem invenio, febre, aliisque symptomatis valde imminutis, & brevi post omnino convaluit. *Ioh. Martinus, observ. 8.*

## SUBSECTIO NONA.

*Pro Febre purpurata.*

**V**Ocatus ad invisendum virum quemdam febre continua laborantem ab octo diebus, in quorum spatio ter ipsi vena secta fuerat, & purgatus medicamentum semel exhibitum, ex præscripto medici ordinarii; invenio pulsum valde frequentem & inæqualem unde suspicor febrem esse malignam, simulque eum detegi jubeo, & totum corpus invenio exanthematis purpureis refertum: urinae erant satis laudabiles concoctionis rudimenta quædam ostentantes. Præscripsimus cucurbitulas multas secundum spinæ longitudinem applicandas, tum siccas, tum humidas, epithemata, inunctiones ex oleo scorpion. Mathioli, confectionem de hyacinto in jussulis, & julepos refrigerantes cum cardiacis, pro potu utebatur ptisana vulgaris, in quam nodulus C.C. mergebatur: hæc remedia continuavit usque ad undecimum morbi diem, cum tamen omnia in pejus ruerent, egerque delirio, & convulsionibus coreptus fuerit: dicto die undecimo leviter sudavit sine fructu. Delirium cum stupore quodam conjunctum erat: ideo vesicatorium cervici admotum est, &

cucurbitule continuatæ partibus inferioribus.

Julepi sequentes præscripti sunt.

24. Hord. integri, p. i. rad. bugl. 3ii. sol. borag. pimpinell. scord. an. M. i. sem. citri, acetos. an. 3ß. tamarind. 3ii. flor borrag. bugl. ros. rub. an. p. i. dictamn. cretic. p. ß. F. decoctio in aqu. 3viii. ad tertie partis consumptionem: in colat. dissolv. sacch. alb. 3i. F. julep. de quo capiat 3viii. manè & serò, addendo unicuique dosi salis prunellæ, 3i. spirit. vitrioli, 3ß. Pro potu præscripta fuit tinctura ros. in jussulis, pulv. ex margarit. corall. ras. ebor. C.C. & lap. bezoard. at postremis diebus instante decimo quarto die, cum omnia in pejus ruerent, loco pulveris illius, substitui bezoardicum minerale purum, cujus 3i. sumebat in singulis jussulis. Cum verò circa vesperam, febris, delirium, & convulsio plurimum intendi consuevissem; duabus horis ante exacerbationem hunc pulverem exhibuimus.

24. Salis prunellæ 3ß. bezoard. miner. 3i. camphoræ, gr. v. M. capiat cum aqu. Card. ben. & exinde melius habuit: decimo sexto die cum appareret concoctio in urinis, medicamentum catharticum exhibitum est ex senæ 3ij. rhei. 3iß. in decocto refrigerante infusis. Addendo colaturæ manua, syrup. rosac. an. 3i. quo blandè purgatus est: eodem die pustulæ quàm plurimæ animadversæ sunt instar varicellarum ad suppurationem tendentes magno quidem numero circa vesicatorum, tum sparsæ per dorsum, lumbos, & nates: die sequenti prædictæ majori ex parte ruptæ apparuerunt, & ad exsiccationem tendentes; verum in parte anteriore circa hypochondria & pectus pustulæ perexiguae, pellucidæ, & diaphanæ, humore seroso refertæ, infinito propemodum numero prodire: febris valde remissa, & delirium valde imminutum: decimo octavo somnus multus fuit, & ferè continuus diu noctuque usque ad diem vigesimum: purgatus est iterum die vigesimo secundo; postea febris omnino desit, ac paucis postmodum diebus perfectè convaluit. *Lazarus Riverius, obs. 21. cent. 1.*

Raphanus quia magnam vim habet attrahendi malignitatem materiæ, utile est scobem ejus pedibus sale & aceto prius



mundatis alligare : idem etiam occipitio apponi potest, si vehemens capitis dolor adsit, *Job. Crato. consil. 16. lib. 3.*

Nihil aquè juvit in febre petechiali ac a *Cratone* in hunc modum descripta emulsio.

℥. Seni. Card. bened. ℥i℥. citri ℥℥. aq. card. ℥i℥℥. M. f. emulsio Add. syrup. acetos. citri. an. ℥℥. M. *Balthasar Timæus. Cas. 24. lib. 8.*

Vir 60. annos natus febre laborabat continua: ad quem vocatus ego, eum male habereprehendi. Nam pulsus intermittentem habebat, singulis quippe quinque pulsationibus arteria stabat. Sed hoc fortè non ita ingens malum erat, præsertim in homine sene, ut aliàs diximus, nisi secundum hoc conjunctum haberet: à longinquo namque hic multum fatebat, corporis ingentem corruptionem præ se ferens. Nota. Unde non diu vixit, sed à præsgio habito intra biduum diem suum obiit. *Amatus Lusitanus. Cur. 72. Cent. 7.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### Pro Febre maligna.

**C**irca potum hoc annotandum, vinum in hac febre aliquando esse proficuum, utpote insigne cardiacum; & malignæ qualitati maximè adversum.

Inter revulsoria remedia meritò referuntur frictiones partium extremarum cum linteo asperiori frequenter repetitæ. Sed præcipuè commendatur illa, quæ fit in toto corpore cum linimento. Ætî, quod in hunc modum componitur.

℥. Ol. amygd. d. & aq. fontis, an. ℥iv. salis nitri, ℥ij. bulliant ad aquæ consumptionem, & manibus hoc oleo inunctis perfricetur calidè totum corpus manè, & serò. Hoc linimentum cutis poros aperit, ut natura commodius vapores venenatos ad eam transmittere valeat.

In maxima virium imbecillitate potiones merè cardiacæ componi poterunt in hunc modum.

℥. Aq. nanph. & rosar. an. ℥i℥. confect. alker. ℥i. syrup. de pomis, ℥i. succi limon. ℥i℥. F. potio.

Si Febris non sit intensa, aq. cinnam.

ad ℥i. vel ℥iij. addi poterit, & interdum ambra grisea ad gr. v. vel viii.

Emulsione parari poterunt sic.

℥. Amygd. d. excortic. ℥i. sem. melon. cucurbitæ, napi, citri, card. ben. an. ℥ij. contundantur in mortario marmor. sensim affundendo decoct. julepi sequenti, ℥i℥. syrup. de limon. ℥iij. salis prunellæ, ℥i℥. F. emulsio pro tribus dosibus, bis aut ter in die sumendis.

Hæc julepi forma in febris initio convenire poterit.

℥. Rad. acetos. bugloss. tormentill. an. ℥i. sol. endiv. cichor. acetos. pimpinell. an. Mi. tamarind. ℥j. coquantur ad ℥ij. in colatur. dissolv. syrup. de limon. & granat. an. ℥i℥. F. Julep. pro tribus dosibus in die sumendis: addendo unicuique dosi confect. de hyacinth. ℥i. lapid. bexoard. gr. vi. & spiritus sulphur. q. s. ad gratam accidit.

Medici *Monspelienses* utuntur in hac febre tanquam alexipharmaco utilissimo, nulla calefaciendi vi prædito, trochiscis viperinis, eosque exhibent à ℥i. ad ℥℥. cum aquis cordialibus vel julepis. Utilis etiam hic est radix quam contrayervam nominant: cujus ℥i. vel ℥℥ exhiberi potest in pulverem redacta cum aq. card. bened. *Lazarus Riverius, cap. 1. sect. 3. lib. 17. Prax. Med.*

Servus cujusdam Archiepiscopi febre petechiali laborans eo devenerat, ut nulla spe superstite, de vita esset conclamatum, ille verò mortis candidatus, qui mori se intelligebat, misso ad Episcopum nuncio, supplex vini haustum expetit ante fatalem horam, quod illi illico concessum fuit largiore quam expetierat, mensura. Post haustum vini in rhenani in sudorem solutus, quievit, & iudicata est cum salute febris. Similia exempla plura apud nos memoriæ occurrunt. *Thomas Bartholinus. bist. 7. cent. 6.*

Ego certè testari possum, me, cum extremè febre pestilenti decumberem, animique deliquia singulis momentis haberem quatuorque dies & noctes absque omni somno habuissem, omnesque astantes de mea salute desperarent, sex guttulis tincturæ coralli cum decoctione violarum ex cochleari propinatis, extemplo &

quasi



quasi miraculosè fuisse liberatum: quam-  
primùm enim ad duo cochlearia tincturæ  
sumpseram, cordis spiritus ita recreari, &  
naturæ gratissimum quippiam accessisse,  
ac omnia præcordia subiisse, sensi ut illico  
quasi luce depulcis tenebris, morbi vim,  
medicaminis efficacia, manifestè abigi per-  
ciperem. Sudorem enim & crism (cujus  
tamen nulla indicia præcesserant) movebat,  
maculasque quam plurimas purpureas ad  
cutem pellebat: quibus sudore continuo  
deletis, brevi pristinam valetudinem recu-  
perabam. *Anselmus Boetius, lib. 2. De La-  
pid. & Gemmis, cap. 154.*

### SUBSECTIO UNDECIMA.

*Pro febre continua in puerulo octodecim  
mensium, cui à secto Linguae freno  
Sanguis in ventriculum efflu-  
xit, ibique putrescens. Fe-  
brem excitavit cum  
seuissimis Sym-  
ptomatis.*

**Q**Uam primùm vomitus provocetur  
cum ℥iii. ol. amygd. d. ut putridus  
in ventriculo contentus sanguis evocari  
possit, mox à vomitu Clysteriolus quam-  
primùm injiciatur ex iure pingui & saccha-  
ro, vel melle despumato, ut faeces, & e-  
iusdem corrupti sanguinis reliquæ ab in-  
testinis detrahantur. Propinato vomitorio,  
sanguinis concreti purulentique notabilem  
copiam evomit, adhæc unâ cum reiecto  
clystere sanguinis corrupti grumos per-  
multo excrevit: & sic statim remissa fuit  
febris: cessaruntque omnia symptomata,  
neque in posterum quicquam mali persen-  
sit. Sanguis in ventriculum fluxit, quod  
ad opus Chirurgico, non statim primum  
situaverunt infantem, ut ex ore potuerit  
protinus profluere. *Ioh. Zecchius, conf.  
46. & append.*

### SECTIO DUODECIMA.

*Pro Febre maligna cum vermibus  
in Muliere.*

**A**B umbilico inuncto sequenti linimen-  
to, & pilulis deinde devoratis, no-  
*Burnet Parte I.*

vermes cecit, & sic præter omnium  
spem sana evasit.

℥. Ol. ovor. lilior. fellis bubul. succi ce-  
pæ assatæ, butyri rec. an. ℥ii. M. F. lini-  
mentum.

℥. Aloes succotrinæ, ℥i℥. spec. diatra-  
gac. frig. gr. v. cum syrup. viol. F. pil. iii.

Sorbebat autem supra pilul. (ne aloë fe-  
brilem calorem auget) cochl. i. syrup. de  
limon. *Petrus Forestus, observ. 4. lib. 6. De  
Febribus malignis.*

Filia cuiusdam Procuratoris annos nata  
12. febre continua laborabat cum alvi flu-  
xu molestissimo, quo materias excernebat  
colore cineritio infectas, quales apparere  
solent plerumque in verminosis affectibus.  
Præscripti initio fuerunt clysteres deter-  
gentes, ex rebus dulcibus parati; tum po-  
tus vulgares contra lumbricos, & rheum  
pulveratum etiam bis iteratum, ex quibus  
omnibus nullum levamen obtinuit: imò  
febris & alvi fluxus in deterius vergebant:  
ut iam de puellæ salute dubitaretur, quan-  
do quidem delicatula, & à longo tempore  
male affecta erat, ac pallidis coloribus de-  
fædada. Tandem sequentem Julepum ipsi  
præscripsi:

℥. Rad. acetos. gramin. & cichor. an. ℥i.  
fol. endiv. cichor. acetos. portulac. & hy-  
peric. an. M. i. Scord. & absinth. pontic. an.  
℥ss. flor. 3. cordial. p. i. Coq. in aq. hordei  
ad quartaria 5. In colat. dissolv. syrup. li-  
mon. ℥iv. spirit. vitriol. gutt. aliquot ad le-  
vem aciditatem. f. Julepus pro iv. dosibus  
manè & serò sumendis.

Intra illud biduum, quò Julepo usa est,  
febris & alvi fluxus omnino quieverunt, &  
perfectè curata est. Si quis miretur tam le-  
vi remedio sublatum esse hunc affectum,  
sciat hypericum & scordium mirabili ef-  
ficacia putredini resistere & lumbricorum  
generationem prohibere, nedum iam geni-  
tos enecare. Et verè testari possum, me hu-  
iusmodi Julepis in infinitis puerulis lum-  
bricis laborantibus cum felicissimo succes-  
su usum esse. *Lazarus Riverius, observ.  
16. cent. 1.*

Puer quidam undecim annos natus in fe-  
brem lapsus est ingentem. Sex à morbi i-  
nitio elapsis diebus ad eum invisendum sum  
vocatus, quem ita imbecillum & viribus  
prostratum inveni, ut ea ipsum nocte



mori, ni obviam tantò malo iremus, certum esset. Pulsus non apparebat, foras frigidus & algidus totus puer ipse erat: ad hæc circa guttur laqueum habere, & velut ieo strangulari inculcaverat cubili prostratus cum jaceret; non quiescebat, sed furibundè huc illuc movebatur. Quæ omnia non aliunde venire, quàm à vermium multitudine puerum infestantium, mihi fideserat. Proinde statim Clysterem sequentem injiciendum curavi.

℥. Coralin. portulac. gramin. an. p. i. betæ, malv. mercurial. an. p. β. coriandr. præp. ℥β. sem. sancti ℥ii. in lib. 2. aq. f. decoctio.

℥. Prædicti decocti ℥xv. ol. ros. ℥ii. cass. extract. ℥vi. hier. picr. ℥ii. mell. viol. ℥i. sal. ℥i. M. f. clyster, quo 12. ageffit vermes crassos & ingentis magnitudinis, & tunc meliusculè habere visusest. At ut vires robore afficerentur, ex pullo aquam stillatitiam in hunc modum parare jussi.

℥. Carnis pulli gallinac. ℥xii. corall. præp. margar. præp. an. ℥ii. sem. sancton. ℥i. sem. limon. ℥β. M. & in balneo M. f. destillatio. Ex hac aqua nonnihil deglutire ac ebibere cœpit. Sequenti die clysterem iterari jussi, quo tantam vermium proluviem egressit, ut omnibus admirationi esset; & tunc meliusculè gustavit, & ad oblata melius hebebat; pulli autem contusum bibebat. In aurora jejuno stomacho syrupum hunc sumebat.

℥. Sem. acetos. portulac. sancton. an. ℥ii. coralin. ℥iii. sem. citr. limon. coriandr. præp. an. ℥i. fol. acet. scord. portulac. gram. pimpinell. an. p. β. f. decoctio in aqua libi. ad lib. i. In colat. ℥iv. dissolv. oxyfacch. ℥i. M. f. Julepus. Et interdiu ex electuario sequenti miris prædito viribus pro detrudendis vermibus lingebat.

℥. Sem. sanctonic. ℥i. contundatur, & per 2. horas in aceto accerimo maceretur, ac postea coletur, & semen melle cocto excipiat & f. conditum. Electuarium primas contra vermes habens dignum ut appeletur: paratu enim ut est facile, ita viribus & facultatibus mirum. Hoc enim per intervalla adhibitum gustabat, & ex aqua coriandro incocta vino granatorum mista superbibebat. Iis puer hic intra decem dies, quod utrum, sed verum dixerim, trecen-

tos egressit vermes, & eorum plures crassos & ingentes, ac vivos omnes stercori liquido & putido mistos. *Amatus Lusitanus, cur. 3. cent. 6.*

### SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

*Pro Febre publice grassante cum gutturis dolore molestissimo ex Catarrho pene suffocante.*

**P**Lurimum profuit ad dolorem gutturis gargarismus subsequens, quo in meipso usus sum tum in aliis, ita ut cum illo septies tantum gargarissem, dolor ille subito cessarit, simul & angustia pectoris miraculi instar.

℥. Aq. plantag. libi. aq. scabios. libi. flor. ros. rubr. p. i. sem. cydon. ℥i. bulliant leviter & colentur: adde diamor. dianuc. an. ℥i. terræ sigill. veræ pulver. ℥i. M. quo cum ufus essem videbat quasi liberatus ab hoc malo, ita ut nocte subsequente optimè dormirem. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 6.*

### SUBSECTIO DECIMA QUARTA.

*De Febre stata.*

**A**Rchitectus quidam singulis annis statodie, hoc est, quo natus fuerat, febre implicabatur, quæ ex putrescente bile genita suum circuitum servans decimum quartum non transgrediebatur diem, donec senio confectus, & eadem ex more complicitus febre natali suo die vi morbi prostratus, naturæ concessit. *Antonius Benvenenus, cap. 84. lib. De abditis morborum & sanationum causis.*

### SUBSECTIO DECIMA QUINTA.

*Observatio circa lotium in Febris acutis.*

**R**Ardevenit, ubi urinæ nigræ minguntur, in febribus acutis, si alia adsint signa mala, ut evadant, ut accidit nostræ puellæ, quæ per totum morbi decursum lividam & nigram urinam mejebat. Sic & *Philiscus* apud *Hippocr. c. 1. epid. egr. 1.* qui



qui prope murum decumbebat, tertio die nigra minxit, & quarto urinæ nigræ, & quinto: sexto demum die obiit. *Scilenus* etiam ægrotus secundus, qui in *Platamome* prope *Eualcidem* habitabat, primo die urinam nigram minxit, ex alvo biliosa, sincera, spumosa, & multa effluerunt. Secundo die secessus plures, tenuiores, spumosi, urinæ nigræ, nox molesta, parum deliravit: tertio omnia exacerbata, secessus tenues subnigri, urinæ turbatæ, subnigræ. Undecimo & hic quoque mortuus est. Sed hic notandum, urinam nigram tum præcipuè esse mali ominis, cum non semel sed sæpius per totum morbi decursum se ostendat. Nam *Herephonti* apud *Hippocratem* cui urinæ nigræ tenues in principio, cum post octavum melioris coloris essent, & parvam subsidentiam haberent, & nono sudaret, judicatus est morbus: idem pariter fuit exitus febris uxoris *Epicratis* quæ decumbebat prope *Archegentem*.

Cum igitur lotium in prædicendo tantam vim habeat, videndum nunquid bonum sit aut malum. *Petrus Forestus. Scol. observ. 6. lib. 2. De Febr. continuis.*

## SECTIO SEXTA.

### De Febre intermittente.

**I**N febre intermittente non minus intensa & violenta, durante saltem paroxysmo, ad sanguinis effervescentia quàm in continua: hoc tamen illi præ continua, peculiare est quod quædam ἀποεῖς seu intermissionis habeat tempora, quod quilibet paroxysmus à frigore aut rigore plerumque incipiat, & in sudorem desinat, quod accessiones statim periodis, certisque temporum intervallis redeant, ut non sit automaton horologicum exactius. Effervescencia verò sanguinis hanc febrem constituens unice dependet à succi nutritii assimilatione, ipsius sanguinis vitio, præpedita: Dum enim succus nutritius cum sanguine non assimilatur, licet ejus particula velut heterogeneum quoddam & non exactè congener in sanguinis massa persistant, adhuc tamen cum eo sine tumultu aut perturbatione circulantur, donec iis ad tur-

gescentiam cruoris massa saturatur; tum protinusebullit illa & effervescentiam febrilem concipit, qua vel subigitur, vel foras protruditur quod heterogeneum est: cujus consortio cum sanguis liberatur, sequitur accessionis febrilis intermissio; postea demum à novo hujus succi supplemento novus inducitur paroxysmus. Causa verò rigoris & frigoris, quæ in paroxysmo huius febris excitantur, hæc videtur esse, nimirum succi nutritii in materiam nitrosam & acetosam degeneris fluor & turgescencia, quo spiritus & calor suffusi obtunduntur (inde in toto corpore frigoris sensus percipitur) & corpora nervosa irritata in tremores cientur. Postea autem cum particulis hisce nitrosis aliqua ex parte in superficiem corporis protulis earum gravamine & oppensione sanguis nonnihil liberatur, spiritus vitales se recolligunt, & emicare incipiunt, & sic calor succedit intensissimus, qui usque persistit, donec materia ista fermentativa penitus combusta, subacta & subtiliata sudore aut transpiratione insensibili evaporet: quod verò itatis temporum intervallis accessiones plerumque repetant, ratio talis reddi potest, quod nimirum æqualis succi nutritii portio sanguini in valis confluio continuo ut plurimum suppeditatur.

*Franciscus Sylvius* febrium omnium intermittentium causam esse putat, succum pancreaticum aliqua sui parte in uno pluribus pancreatis ductibus lateralibus obstructis stagnantem, ac mora sua ibi acriorem factum, atque acrimonia ista acida per pituitam plus minusve viscidam & notatæ obstructionis causam, via vi parata penetrantem ac in tenue intestinum effusum, vitiosamque ibi cum bile atq; pituita effervescentiam excitantem. Dividitur febris intermittens in tertianam, quartanam & quotidianam. Tertiana est cujus paroxysmus tertio quoque die repetit, & si exquisita est, cum rigore vehementi incipit, cui succedit calor acris & mordax, qui in sudorem exolvitur, atque intra duodecim horas accessio finitur.

Causæ ad hanc disponentes sunt temperamentum calidum & biliosum, ætas juvenilis, præservida victus ratio, acris constitutio calidior, vigilia, curæ, ira, je-



junia, exercitatio nimia. Febri tertianæ interdum icterus supervenit, eamque solvit. Scribit *Haly* & vulgatissima docetur experientia in tertiana laborantibus, si ulcera aut pustulæ in labiis & naribus erumpant, finem febris prælagire, est enim quædam veluti crisis. Alvi etiam fluxus tertianæ superveniens, materia jam concocta, eam solvit. Quotidiana rursus est, cujus accessio quolibet die redire solet: ut plurimum nocturnis horis invadit, idque sine rigore, sed cum frigore tantum, aut levi horrore, calor deinde, transacto frigoris tempore, mitis est, ac minimè deurens, paroxysmus diutius protrahitur, & sæpe horas octo-decim aut viginti solet durare. Quartana denique illa est quæ paroxysmus habet quarto quoque die recurrentes: incipit cum oscitatione, pandiculatione, & gravitate totius corporis quam sequitur frigus, postmodum horror & rigor quo ossa confringi videtur; unde dolor qui à quartanariis percipitur, ὁ σπασμὸς nominatur. Calor deinde succedit satis molestus, sed remissior quam in tertiana. Sudor plerumq; accessionem concludit. Febris hæc longissima esse consuevit, & quæ autumnò incipit, ut plurimum tota hyeme perseverat, nec nisi accedente vere finitur: imò nonnullæ ad annum unum vel plures extenduntur: æstivatamen breviores sunt: ad hanc febrem disponunt, tempus autumnale, loca maritima, ætas declinans, temperies melancholica, & quæ ob malam victus rationem affectioni hypochondriacæ obnoxia est. Causa verò harum periodorum febres has constituentium adscribenda videtur diversæ sanguinis constitutioni, quæ nimirum à debita temperie in diatesin modo acrem, modo acidam aut austeram pervertitur: pro diversa enim hujus dyscrasia succus alibilis recens advenus plus aut minus à mutatione desciscit, & in materiam citius aut tardius fermentescere aptam degenerat. *Thomas Villis, lib. De Febris.*

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Febre tertiana exquisita.*

**I**N principio mensis Junii, cum tempus valde calidum esset; ac impensè circa agros curandos ipse laborassem, vigiliis, curis, & solitudine, plus æquo occupatus, in tertianam veram & intermittentem lapsus sum: in paroxysmi principio & augmento à somno & potu abstinebam, die verò sequenti intermissionis post primum paroxysmum ter in die ex julepo sequenti sumpsi.

℞. Fol. acetos. endiv. viol. lactuc. scariol. an. M. i. prunor. damasc. num. i. s. coq. in sero lactis pro ℥ix. col. adde: syrup. viol. ex multiplici infusione ros. de endiv. an. ℥i. M. F. julepus: eo alvus nonnihil solvebatur. Cibus erat panata vel pomum acidum coctum, potus cerevisia tenui tempore intermissionis, tempore febris ptisana ex hordeo mundato & liquir. parata: post secundum paroxysmum die quietis hac leniente medicina usus sum.

℞. Flor. nymphææ, viol. borrag. an. p. i. prunor. damasc. numero 13. tamarid. ℥β. coq. in sero lactis in colat. ℥iiβ. dissolv. diapr. simpl. cassiæ rec. extract. syrup. viol. an. ℥β. M. inde habui sex sedes valde copiosas ac biliosas. Postea tertius rediit paroxysmus adeo violentus, ut in statu delirarem. Die verò subsequente, nempe quieto, cum urina aliquo modo tincta spectaretur, & crassior, ex basilica brachii dextri ℥iv. sanguinis extraxi: sed adeo inde debilitabar, ut quasi syncopen futuram præsentirem, nisi Chirurgo imparassem, ut illico venam constringeret: at modico vino rhenano sumpto deliquium animi intercipiebam, ut non fuero syncopen passus. Alteratio tamen illa adeo profuit: ut postea non amplius paroxysmum habuerim, *Pet Forestus. observ. 2. lib. 3. De Febre intermittente.*

Virum quendam febre tertiana laborantem Dei auxilio & sequenti medicina mox liberavi.

℞. Decoct. Card. bened. ℥iii. extract. eful. ℥ii. M. pro haustu, quo multa biliosa phlegmate permixta egressit: per sequentes novem dies in aurora & longè ante paroxys-



xyſmum accepit decocti ſequentis ꝑvi. calidè & in lecto ſtragulis benè conſectus ſudores graveolentes & acres emiſit, ac eo penitus remiſit febris, ſanuſque evaſit decem dierum ſpatio. Eſt autem decoctum tale.

Ꝛ. Flor. centaur. min. M. iii. coq. in aq. q. ſ. ad dimidias! *Martinus Rulandus, cur. 97. cent. 1.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Febre Tertiana.*

**A**D Generoſum quendam febre tertiana correptum vocatus, in hunc modum curationem inſtituo. Primò longè à remiſſo paroxyſmo venam hepaticam perſundo. Sequentibus diebus ſex horis ante paroxyſmum jejunus aſſumebat aquam hanc frigide.

Ꝛ. Aq. fontis, ꝑvi. ſpirit. vitrioli, gutt. v. vel vi. M. ut F. potio aut aqua acetosa, quæ dentes non contrahat in ſtuporem, per hujus primi potuſe efficaciam & Dei potiſſimum miſericordiam febris arcebat, atque ex toto quieſcebat, nec unquam poſtea revertebatur: verùm nihilominus per ſequentes tres dies febricitans aqua iſta dabatur ante ut dixi acceſſionem. *Martinus Rulandus. curat. 100. cent. 1.*

Alium febre tertiana laborantem curavi in ſequentem modum.

Ꝛ. Aqu. bened. aq. fontis, an. ꝑi. commixtas frigide exhauſit, atque ſuprà, & infrà rectè multumque purgatus fuit: exhibui potionem hanc ſeptem horis ante paroxyſmum; ſequenti die ſecari juſſi dextri lateris baſilicam, & ſanguinem ad decem nuchas fluere. Interea ſupra pulſus manuum per octo dies ligavi ſequens Epithema manè, quod per diem retinebat, noctu removebat. Eſt autem hoc.

Ꝛ. Rutæ, Salviæ, burſæ paſtoris, an. Mi. cum aceto roſac. conterebantur in formam pultis, & adaptabantur ad pulſus: poſt quæ remedia, acceſſio febris ex toto reſceſſit, nec in poſterum rediit: cibus dabatur refrigerans & humectans, ſed raro & parcè: potui dabam decoctum hoc ad ſatiæatem quoties urgebat ſitis.

Ꝛ. Cichor. Miii. rad. cichor. ꝑiii. liqui-

rit. raf. ꝑß. paſſul. cōrinthiac. ꝑiii. coq. in aqua q. ſ. ad tertias: & ſic omninò convaleſcit. *Martinus Rulandus, curat. 94. cent. 2.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Febre Tertiana.*

**A**Lternis diebus febrili paroxyſmo correptiebatur Puella Nobilis jam nubilis. Purgavi illam die quietis hoc pacto.

Ꝛ. Rad. cichor. dentis leonis, an. ꝑi. rad. rhapont. ꝑß. abſinth. chamædr. chamæpyt. an. ꝑi. flor. cordial. p. i. fol. ſen. ꝑi. ſem. anif. ꝑi. infund. in aqu. & vino: coque parum in duplici vaſe: colaturæ denuo infunde rhab. ꝑii. cinamom. ꝑi. exprimatur: bibat unam doſim, alteram tertio poſt die quo apyretos eſt. Cum non remitteret, juſſi in principio paroxyſmi aquam ſequentem bibere.

Ꝛ. Aq. cichor. cent. min. & gentian. an. ꝑi. M. die febris elapſo repetatur hujus aquæ potus: pulſibus applicari juſſi in utroque carpo ſequens.

Ꝛ. Cortic. intern. nucis arboris, maceretur in aceto forti, & ligetur ſupra pulſus; unde nigra macula, & poſtea cutis excoꝛiata ſecuta: paroxyſmus poſt mitior fuit.

Juſſi tertio aquam bibere, & pulſibus ſequens apponere.

Ꝛ. Fol. thalaſpi, burſæ paſtoris, & plantag. an. q. ſ. contund. cum ſale & aceto, & applicentur: vix bis hoc facto, febris ceſſavit, ipſaque ſana facta eſt. *Felix Platerus, obſervatione lib. 2. pag. 288.*

Nobilis adoleſcens menſe Martio febre correptus, duobus diebus continuis paroxyſmum habuit, poſtea alternis diebus paroxyſmos aliquot, qui horis nunc tribus, nunc quatuor anticipabant: purgatus fuit, poſtea vena ſecta, iterumque purgatus: cæterum cum non ceſſaret febris cumque miſerè affligeret, dedi illi ante paroxyſmi adventum ſequentem Iulepum.

Ꝛ. Aq. plantag. ꝑiii. ſyrup. de papav. ꝑiii. bibat. Pulſibus applicet in carpo, & temporibus unguentum populeonis ſubactum cum telis arancarum: ſuperveniente paroxyſmo ſtatim ſudor erupit, calorque longè mitior ſubſecutus. Poſtea denuo inſtan-



instante paroxysmo, hæc duo remedia repetii, addendo ad Julepum aquam Nicotianæ. Sudavit iterum mox ab initio, & vix frigus persensit: calor etiam medicris fuit: postea tandem febris illum deseravit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 293.*

Ob inordinatum thermarum usum, in febrem incidi tertianam intermittentem; sequenti die à secundo paroxysmo hausi ℥i. Tartar. vitriol. cum gr. ii. diagridii in aliquot cochlear. vini absinthii calidi, cujus operatione bilis evacuatio egregia est subsequuta. Cum autem propter plenitudinem moderandam sollicitus essem, die paroxysmi tertio venæsectionem institui, idque cum successu, signis concoctionis sese offerentibus: quam ob causam spem bonam de quarto paroxysmo non futuro suscipiebam. Quid sit; Natura ab onere ulteriore liberata sub noctem diarrhæam producit biliosam cirticam, qua sanitati, Dei gratia, ab acuto morbo restituebat. *Gregorius Horstius, obser. 10. lib. 1. De Febribus.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *Pro Febre tertiana.*

**O**Mnibus ad curationem paratis, & evacuationibus tam per sanguinis missionem quam per pharmaciam adhibitis, quum semel in paroxysmo (vigente ardentissima febre) nimia siti cruciaretur me rogat, ut illi gelidam bibendam traderem, cui lubentissimè obtemperans ad satietatem usque concedo: à cujus potu multam flavam, citrinam, sive pallidam dictam bilem evomit, & melius habuit, ita ut intra viginti dierum spatium sanitati fuerit restitutus. Magnificus ille & liberalis vir, qui tunc pro hac curatione mihi trecentos largitus est aureos ducatos. *Amatus Lusitanus, curat. 3. cent. 1.*

Pharmacopæus quidam quinquagenarius laborabat febre tertiana intermittente: bis fuit purgatus, bis etiam phlebotomia celebrata: postea ante paroxysmum, sequens portiuncula ei exhibita est.

℥i. Aq. cichor. ℥i. salis absinthii, ℥ss. spirit. sulph. gr. xii. M. ab hac potione accessio non rediit, sed per urinas plurimùm

fuit evacuatus. *Lazarus Riverius, cent. 1. observ. 20.*

Studiofus medicina post quinque accessiones febris tertianæ, secta vena bis, & semel purgato corpore, sumpsi initio paroxysmi, aq. bened. ℥i. accessio fuit cohibita, tum etiam operatio medicamenti per duas horas, postea vomuit quinquies aut sexies sine molestia, accessio brevior solito fuit, & in fine illius purgatus est per alvum pluribus vicibus, & omnino curatus est. *Lazarus Riverius, cent. 2. obser. 57.*

*Gratianopoli* vocatus sum ad equitem quendam ordinis Divi *Iohannis*, febre tertiana laborantem; erat tunc temporis in tertia accessione: prius tamen quàm tres illæ accessiones ordinem cœpissent, per aliquot dies sine typo febricitaverat: præscripti ad diem sequentem, qui erat intermissionis dies, calomelanos. Turqueti ℥i. diagrid. gr. v. in forma pilul. quibus valde purgatus est; redeunte circa vespèram ciborum appetentia, qua prius destitutus fuerat: die verò accessionis sumpsit ante paroxysmum julepum sequentem.

℥i. Aq. cichor. ℥i. sal. absinth. ℥ss. spirit. sulph. ℥i. F. julepus: quem hausit duabus horis ante paroxysmum, & corpore propè contecto sudavit copiosissimè, sicque à febre liber evasit. *Lazarus Riverius, cent. 1. obs. 26.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Febre tertiana duplici.*

**C**onsiliarius quidam annum agens 63; feb. tertiana duplici laborabat à quinque septimanis, in quarum decursu multa remedia administrata fuerant ab alio Medico; quater secta fuerat vena, pluries purgatus erat, & multi julepi aliaque remedia exhibita: morbus tamen in pejus ruebat, & accessiones graviores evadebant, ita ut eo die quo ego vocatus sum, ipsum attonitum, & comatoso quodam stupore affectum invenerim, & adstantes de ipsius salute maximè dubitarent: tanta autem erat virium prostratio, ut nulli evacuationi locum esse censuerim. Primo igitur die quo ipsius curationi incumbere cœpi, julepum sequentem exhibui hora una ante accessionem.

℥i. Aq.



℥℥. Aq. cichor. ℥iii. sal. absinth. ℥ss. spirit. sulphur. ℥i. M. F. Julepus Secundo die idem remedium iteratum est, hora etiam una ante accessionem. Tertio item die eadem hora sumpsit & accessio perexigua fuit. Quarto die manè sumpsit sequentem potionem.

℥℥. Sem. mund. ℥ii. sal. tartar. ℥ss. spirit. sulphur. ℥ss. aq. cichor. ℥vi. infund. frigide per noctem, & colaturam capiat cum regimine: pluries purgatus est cum euphoria: & eo die accessio non apparuit, neque deinceps, & ita perfecte curatus est, *Lazarus Riverius, observ. 2. cent. 4.*

Gravida quædam septimestris correpta est febre tertiana duplici, quæ per mensem eam afflixit; nulla apparente remissione, quod periculum non exiguum portendebat. Docet enim experientia quotidiana mulieres gravidas, hujusmodi febribus laborantes, difficillimè curari, & non paucas abortu interveniente de medio tolli: ter ipsi secta fuerat vena, purgans medicamentum bis exhibitum, & multi julepi aperiens & refrigerantes propinati, tandem venæsectione hora ante paroxysmum celebrata, & exhibito immediate ante venæsectionem, julepo ex decocto flor. Chamæ. & crem. tartari parato, febris omnino sublata est; accessio enim quæ post venæsectionem expectabatur, non comparuit, neque deinceps. *Lazarus Riverius, observ. 72. cent. 4.*

Patronus quidam Sexagenarius febre tertiana laborans, post usualia, remedia tandem curatus est secta, hora una ante paroxysmum, vena, præmissa decocto chamæ. & cremor. tartar. & admotione carpi emplastri. *Strobelbelgeri, Lazarus Riverius, observ. 12. cent. 4.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### De Febre tertiana.

**A** Spiritu sulphuris cum aqua exhibitto, copiose sudor provocatur, quod multis experimentis nobis innotescit, qui plures tertianas febres curatas vidimus eodem remedio in summo accessionis æstu, & urgente siti exhibitto, unde copiosi sudores provocabantur, à quibus non

solum paroxysmus, sed etiam totus morbus integrè solvebatur. Hac dosi exhibeo.

℥℥. Aq. frigid. ℔i. spirit. sulphur. gr. xx. M. *Lazarus Riverius, observ. 19. cent. 1.*

Retulit mihi *D. Chomel*, se omnes prope modum tertianas curare solitum, exhibendo per horam ante accessionem bonum haustum decocti chamæ. & cremor. tartar. & statim ab assumpto remedio sanguinem detrahendo. Si non sit ad manus decoctum, aquæ frigidæ cyathum exhibet; & idem fere succedit effectus, putat aquam illam assumptam per phlebotomiam ad venas rapi, & materiam ebullitioni proximam diluere, unde accessio impeditur. *Franciscus Chomel, observ. 3.*

Vir quidam febre tertiana notha correptus est, quæ cum per mensem perseverasset, sumpsit meo consilio vomitorium ex ℥i. salis vitrioli in aqua dissoluti, à quo ter aut quater excitatus vomitus, nec febris amplius apparuit. *Simeon Jacz, observ. 14.*

Civis quidam *Monspeliensis* febre tertiana laborans, sumpsit aq. bened. ℥i. & à febre liberatus est; hujus etiam medicamenti operatione latum lumbricum excrevit septem pedum longitudinem æquantem. *Samuel Formius, observ. 12.*

Initio ducatur alvus ita.

℥℥. Elect. lenitiv. ℥vi. diacathol. ℥iii. cum aq. cichor. F. haustus, dein cum apyrexia adest modicè adimatur sanguis si opus est, ac præpara julepiis per triduum, mox purga rhabarbaro cum manna & syrup. rosat. laxat. *Joh. Heurnius, ad aphor. Hippocr. 59. sect. 4.*

Maxima damna sibi adferre solent febrecitantes, dum potant ineunte paroxysmo, usque mihi compertum est, inde plerumque ex febribus intermittentibus periculique expertibus, nasci continuas ac letales febres. *Joh. Heurnius, ad aphor. 62. sect. 7.*

Ad inhibendum paroxysmum.

℥℥. Rad. gentian. ℥i. summit. cent. min. serpill. an. ℥iii. bulliant in vino, bibat haustum duabus aut tribus horis ante paroxysmum, in lecto maneat, & cooperiatur, ut sudet. Succus crudus herbe plantag. ad ℥iii. cum tertia parte circiter succi portulac. dimidia ferè hora ante paroxysmum inva-



invasionem ebibitus ad eam sistendam prodest, vel pulvis hic mirè in omnibus febribus, uti & pestilentialibus commendatus.

℥. Sacch. card. ℥iii. zinzib. ℥i. camphor. ℥ii. F. pulvis detur ℥i. cum aqua calida; alter.

℥. pulv. canceror. fluviatil. cranii. hominis, raf. ebor. an. ꝑi cinnam. ℥ss. croci ꝑi. F. pulvis detur ℥i. cum vino, exercitium si ita instituat, ut corpus ante invasionem paroxysmi incalescat & sudet, paroxysmos diuturnarum febrium nonnumquam sistit, hoc autem motu corporis eundo, equitando, curendo ante adventum paroxysmi, donec corpus incalescat, perficitur: panis etiam maceratus aliquoties in aceto, & pulvis applicatus prodest. *Felix Platerus, Prax. Med. tom. 2. cap. 2. pag. 149. 150.*

Per familiare remedium febris inter vulgus nostrum ex pipere percrebuit: quo cum successu usum magnum olim *Solandia* Episcopum *D. Joh. Resenium* seniore accepimus, in ipsa accessione piper cum spiritu vini exhibent, vel absinthium in aceto coctum cum paucis pipere tribus continuis propinant, quanquam malè multis cessarit, non paucis tamen profuit, siue quod vomitum provocarit, siue quod horrorem febrilem discusserit. *Thomas Bartholinus, hist. 48. cent. 5.*

Ad febrem tertianam intermitentem epidemicam sudorifera maximè profuere paroxysmo instante cum alexipharmacis exhibita præmissis ex metodo præmittendis. Innotuit in horum censu virtus unicorni nostri *Groenlandici*, quia non solum ℥ss. pondere cum appropriatis ante paroxysmum exhibitum, sudorem largum procuravit, sed febrem plerumque extinxit, expertus id remedii novi genus sum magno successu in plurimis. *Thomas, Bartholinus hist. 56. cent. 2.*

## SUBSECTIO SEPTIMA

### Pro Febre tertiana

**P**RO minorativo has pilulas dedi.

℥. Extract. pil. coch. ℥ss. diagridi præp. gr. iii. ol. anis. fœnic. an. gr. ii. cum

aqu. cinnamom. F. pil. vii. deglutivit involutas pulpa pomi sub cinerib. assi, & mediocriter inde deposuit. Sequenti die in ipsa accessione istud expulsum exhibui.

℥. Aqu. cinnam. card. bened. an. ℥x. C. C. usti præp. ℥ii. Confect. alker ℥ss. lapid. bezoard. gr. vi. M. F. haustus hydroticus, sudavit, & visus paroxysmus brevior. Sequens paroxysmus multum anticipavit: in limine ejus dedi cochlear. 2. hujus pulveris ex cerevis. calente.

℥. Salis absinth. gra. xvi. pulv. fol. centaure. min. ℥iiss. sacchar. alb. ℥iiss. M. F. pulvis.

Pro potu ordinario utatur hoc decocto.

℥. C. C. usti præpar. ℥ii. coq. in lbv. aqu. fontis, deinde impone in cantharo cinnam. el. & fracti, & sacch. albiss. an. q. s. superaffundatur decoctum effervescent, & sinatur sponte sua refrigerari, paroxysmus rursus anticipavit, sed mitior fuit, exhibui iterum dosim pulveris superscripti, & pulvis hoc sequens unguentum applicavi.

℥. Vng. popul. ℥ii. tel. araneæ. ℥iiss. opii. thebiac. aceto. solut. gr. iv. ol. fœnic. gr. ii. M. fiat unguentum, paroxysmus non reversus est. Ad reliquias febris discutendas, unica vice illum purgavi, ita.

℥. Elect. diacydon. lucid. lavat. ℥iiss. exhibe, habuit aliquot sedes, bene tulit, & ad pristinam sanitatem. *Petrus Lotichius, observ. 1. cap. 5. lib. 1.*

Alteri, paroxysmi leve quoddam præludium sentienti dedi ℥ss. sequenti pulveris mei antifebricitici.

℥. Pulv. flor. & fol. cent. min. ℥ii. C. C. usti præp. ℥ii. sal. absinth. card. bened. cent. min. an. ꝑi. manus Chr. perlæt. ℥ii. M. fiat pulvis, ante sequentem paroxysmum ita accepit.

℥. Pulv. antifebricitici superscripti, ℥i. syrup. de papav. ℥iiss. cum vino albo, q. s. haustus.

Ab inde sudore copiosè insecuto placidè dormivit, & sese liberatum prædicavit illo pulvere contra quascunque intermittentes febres scilicet hactenus uttor. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 2. cap. 6. lib. 4.*

Vulgo exhibentur theriaca ad ℥i. cum vino albo ante accessionem tribus vicibus repetendo.



Ubi theriacæ caliditas timetur, sola primum exhibetur, & desuper aquæ plantag. Cyathus propinatur, hoc frequenter utebatur *Varandens* præceptor meus tanquam specifico, id ipsum præstare potest vini hippocratici cyathus unus ante accessionem exhibitus, eoque remedio gratissimo multi curati sunt. In vulgari usu habetur, & sæpè scilicet succedit, potiuncula confecta ex aquis ros. plantag. & aq. vitæ, singulis ad cochlearis mensuram, exhibenda ante accessionem.

*Zecchi* in frequenti usu habebat pilulas sequentes, quæ ad aperiendas obstructions, hepar roborandum, & viscerum dyscrasias tollendas sunt efficacissimæ.

℞. Trochisc. de rhabarb. de eupator. & de absint. an. ℥ss. pulv. el. diarrhod. ℥i. cum syrup. de absinth. F. massa pilul. de qua capiat ℥i. manè per triduum superbibendo iusculum ex cichoraceis & capillariibus paratum. In eundem finem maximè laudatur à *Montano* decoctum cichor. & chamædrios in iusculo, quod dicit esse admirandum in febribus longis ab obstructione pendentibus. *Lazarus Riverius*, cap. 3. sect. 2. lib. 17. *Prax. Med.*

Multas tertianas intermittentes, tertia, secunda, imo prima exhibitione sequentis haustus, præcesso purgante, curavimus.

℞. Aq. Card. bened. ℥ii. theriac. simpl. ℥ii. sal. absinth. ℥ss. spirit. salis armoniac. ℥ss. syrup. papav. errat. ℥iii. M. pro haustu quo multum sudarunt, & ut plurimum prima vice febris recessit. *Freder. Dechers*, notis ad cap. 3. *Prax. Barbettian.*

Ad febres tertianas specificum est spiritus salis armoniac. cuius gutt. iii. usque ad vii. in aq. cent. min. vel cichor. horis quinque vel sex, ante paroxysmum sudoribus inde profluentibus dantur, aqua item rad. imperatoris pro specifico habetur, & sic hoc modo.

℞. Rad. Imperator. & vini generosi, an. digerantur invicem in B. M. sub alembico cæco, postea destilla ex alembico per arenam in sine cavendo, ne Empyreuma redeat, huius exhibe patienti die quietis, & postero tribus horis ante paroxysmum, atque ita etiam tertio die ieiuno ventriculo coch. i. ut sudores, si possit, moveat, raro

post specificum paroxysmus redit. *Ioh. Hartmannus*. *Prax. Chimiatri.*

*Ioh. Heurnius* in tertiana intermittente maximo cum successu hoc semper usus est.

℞. Nucem moschatam ustam, adde tantum nucleorum persicorum, & amygd. amar. F. pulvis, cuius ℥i. sumatur cum vino, ante febrem. In notis ad cap. 11. lib. *De Febribus*. *Ioh. Fernelij*.

℞. Vini albi optimi haustum unum, bulliat ad dimidiæ partis consumptionem, & sic hauriatur: multas tibi vomere faciet aquas. Sic multos tertiana febre laborantes curavi. *Petrus Borellus*, observ. 56. cent. 3.

In accessionibus contra præceptum *Hippocratis*, dare cibum oportet biliosis, quibus os ventriculi biliosis humoribus tentatur facile, & exquisitioris sensus est, febribus syncopalibus laborantibus, morbo extenuatis & famelicis & melancholicis: alioqui facile iis deficeret animus. *Guil. Ballonius* lib. 1. *Epid. & Eph.* pag. 62.

Ad tollendum paroxysmum tertianæ, accipe fol. urticæ, salic. vitis, an. M. i. terantur & cum forti aceto conficiantur, & pulsibus brachiorum applicentur duabus ante accessionem horis. Probatum est. *Arnoldus Villanovanus*. *Prætic. lib. 4. cap. 18.*

In hac curatione hoc observandum, à spiritu sulphuris cum aqua exhibito sudores copiosos fuisse provocatos, quod multis experimentis nobis innotescit, qui plures tertianas febres vidimus eodem remedio curatas, in summo accessionis æstu, & urgente siti exhibito; unde copiosi sudores provocabantur, à quibus non solum paroxysmus, sed etiam totus morbus integrè solvebatur. *Lazarus Riverius*, observ. 19. cent. 1.

Adolescens quidam temperatura sanguineus inchoante hieme, febre correptus est octavana, quæ ad medium veris usque perduravit, non quidem obscuris, sed evidentibus paroxysmis. Singulis namque octo diebus horret, horrore horam unam perdurante: deinde subsequitur febris 15. ferè horas eum affligens: Sed post ita rectè valet, ac si nihil mali passus esset. Eveniebat hæc febris ab humore melancholico paucis sed bene crasso. Pro qua abigenda, ac sanitate huius.



hujus juvenis recuperanda, cum multa concinnè data sint medicamenta, sanatus est. Febris quintanæ, septimanæ, octavanæ, & nonanæ *Hippocr. Lib. Epid. & Procrhet.* veluti sexcentis aliis locis meminit. Longæ sua natura sunt, sed nonana cæteris longior omnes tamen salubres & minimè lethales. Quintana verò cæteris periculiosior est, & magis mortifera. *Amatus Lusitanus, cent. 7. curat. 75.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Febre quartana.

**E**Xhibentur per aliquot vices in aurora ℥ij. aq. flor. chamæ. destillatæ ex succo eorundem, hæc aqua est præstantissima, vimque magnam habet ad febres solvendas, ita ut jure merito dici possit febri-fuga, aperit enim obstructions, & ventriculum roborat. Alii pro secreto habent maxima & experto exhibere ℥ij. pulv. fol. betonic. in ovo, die accessionis horis quatuor ante illam, & ter aut quater repetunt aliis diebus certò in quartana inveterata mira præstat. *Rodericus à Fonseca. Tom. 1. consult. 65.*

*Henricus Vergerius* Medicus Doctissimus pro febre quartana propulsanda, aquam quandam vomitoriam ex aceto & herba acetosa destillatam in ipsis accessionibus, videlicet, cyathum unum propinabat, atque ita vomitum irritabat: ad idem malum utebatur etiam aqua rosac. ex pallidis rosis provincialibus dictis destillata, quam & *Amatus* pro experimento indubitato pro quartana convenire tradit. *cent. 2. curat. 97.*

Quidam etiam recentiores Practici, in initio hujus febris vomitum provocant, & ante paroxysmum, vel initio paroxysmi: in hujus remedii tanta vis est, modo rectè instituat, ut multi hoc unico presidio convaluerint. *Petrus Forestus, observ. 35. & Schol. lib. 3. De Febris intermittentibus.*

Quidam Gentianam experti sunt aliquot diebus acceptam, quartana laborantes mirabiliter juvasse, *Christophorus Guarinonus. consult. 270.*

Empiricum *Parisiensem* plurimos quar-

tanarios decocto radic. lappæ maj. ex vino albo, magno successu curare solitum, accepimus inter observatione Celeberrimi Viri *Pauli Marquardi Slegelii*, nimirum eadem quartanæ & luis venereæ quandoque remedia observatur. Sicillam cum tibi-um ulceribus hydragyrofi curatam narrat *Ballonius, lib. 2. epid. & ephem. pag. 131.*

Hanc verò ab *Henrico III. Galliarum Re.* ge eodem decocto *Bardana* à *Petro Pena* delatam testatur, *Samuel Formius, obs. 41. Georgius Hieronymus Velschius observ. 4.*

Decoctum Salsæparill. in sequentem modum paratum ebibitum (præmissis tamen debitis evacuationibus) quartanas brevi curat, paucis diebus etiam cujuscunque speciei hydropem sanat.

℥. Salsæparillæ contusæ & incisæ ℥iv. decoquantur in aq. ℔xvi. cum senæ ℥ß. F. decoctio lento igne quousque absumentur ℔iv. tunc adde epithymi ℥ß. hermodactyl. contus. ℥ii. qui prius cum modico parati decocti dissolvantur, & parumper insuper bulliant: deinde amoveantur ab igne, vas optimè claudatur quousque; decoctum frigescat, fiat colatura: qua utatur pro potu in prandio & cæna, quantum ægro fatis est: hoc decoctum ad vigesimum, diem usque bibendum erit, hoc enim temporis spatium quartanas curat. in diebus decem hydropem, *Franciscus Arcaus, c. 8. lib. De Febrium curandarum Ratione.*

Doctor Medicus certò affirmavit, vidisse sequendam quartanarium, cui in decursu febris ulceruscula apparuerunt maligna, consilio quorundam frictions ex hydragyro usurpantur. Sanantur ulcera, imò & febris ipsa quartana. *Guil. Ballonius, lib. 2. Epid. & Ephem. pag. 158.*

Hoc unum subicere libet, quod ab amico seu secreto quid accepi, & in multis casibus non inutile deprehendi.

Sumatur cor leporis, & eo modo quo pulmo vulpis solet, præparetur, postea in pulverem redactum, atque in tres æquales portiones divisum, tribus vicibus exhibeatur, hora una aut circiter ante invasionem, vino albo, aut alio convenienti liquore dissolutum. Vidi ego semel atque iterum post hujus amuleti assumptionem, febrem deinceps non magis ap-



paruisse, aut saltem paulatim evanuisse.

Verum hoc non statim ab initio morbi, sed ubi jam manifesta coctionis signa apparent, faciendum est. *Petrus, Mo- navius, ep. 62. lib. 5. consil. & epist. Cratonis & aliorum Medicorum à Schol- izio editorum.*

## SUBSECTIO NONA.

### *Pro Febre quartana.*

**Q**Uoniam in hoc levissimum & securis-  
simum experimentum incidimus,  
quod quisque experiri poterit, literis id  
mandare placuit, quod ita se habet. Cum  
frigore quartanarius torqueri cœperit, cy-  
athum stillatitiæ aq. rosar. ebibat, quo mul-  
ta & biliosa evomet, & sanus evadet: ita  
enim multis evenisse observavimus: proxi-  
mum est hic citare aliud contra quartanæ  
ingens frigus remedium; quod ex *Galeno*  
habetur, & sæpe à nobis in usu habitum,  
& pro vero compertum, grana 5. vel 6. pi-  
peris integra deglutienda frigoris tempore  
ægotanti cum pauculo vino generoso da-  
bis, quo auxilio repetito, æger bene habe-  
bit, ut nostro accedit ægotanti, cui quar-  
tana post tres desit, paroxysmos. *Am-  
atus Lusitanus, cent. 2. curat. 97.*

Postquam multa & varia medicamenta,  
quæ tum atram bilem, tum splenem res-  
piciebant, daremus; tandem propinato  
pharmaco atram bilem respiciente die pa-  
roxysmi quatuor horis ante accessionem,  
multa & nigra excrevit, ac liber à quarta-  
na evasit.

Hujus evacuationis die paroxysmi ratio  
assignatur talis, quia commotione agitata  
materia facilior ad expulsionem redditur,  
quam divinus senex contemplatus, in quar-  
tana febre die paroxysmi pharmacum da-  
re mandat. *lib. De Affectionibus*, non lon-  
gè à principio (si verò quartana apprehen-  
derit, siquidem impurgatus fuerit, pri-  
mum caput purgato, & interpositis tribus  
aut quatuor diebus pharmacum sursum  
versus purgans dato in ipsa apprehensio-  
ne, & interpositis diebus rursus aliud de-  
orsum purgans dato in ipsa apprehensio-  
ne) nos verò hodie hora paroxysmi vom-  
itum proritamur, accum purgandi tempus

instat die paroxysmi pharmacum damus;  
quibus multa & egregia consecuti sumus,  
adeo ut rarò quartanam incuratam hoc in-  
cedendi ordine dimiserimus. *Amatus Lu-  
sitanus, curat. 4. cent. 1.*

℥℥. Aq. flor. cent. min. & rad. gentian. an.  
℥i. Iulep. rosat. ℥i℥. M. bibat initio paroxys-  
mi, & spinam dorsi oleo chamæm. & aneth.  
inungat: bis julepum exhibui quo fugata  
est febris.

Alteri in principio paroxysmi haustum  
aq. tabacci exhibui, & valde profuit. *Fe-  
lix Platerus, observ. lib. 2. pag. 302.  
& 304.*

Aliqui pro singulari remedio singulis ma-  
tutinis exhibent hanc aquam destillatam  
ad ℥ii. vel ℥iii.

℥℥. Aceti fortiss. ℔iiii. panis albi calentis  
adhuc detracta crusta ℔bi. pulv. pyrii ℥ii.  
M. & destillentur in B.M. Similiter laudant  
quidam & hanc.

℥℥. Aq. Meliss. ℔℥. aq. vitæ ℔bi. medull.  
ebuli ℔℥. M. destillentur: dentur ℥ii. per di-  
es aliquot manè aut serò. *Felix Platerus,  
præct. tom. 2. cap. 2. pag. 138.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### *De Febre quartana.*

**S**I alvus sit adstricta rectè adhiberi ene-  
mata humectantia ex decocto veronic.  
& Card. bened. judico: ac verè affirmo,  
me magni nominis virum solo usu enema-  
tum (cum alia remedia omnia aspernaretur)  
liberasse. Sed hoc fit in illis, qui ini-  
tio paroxysmorum tormina ventris senti-  
unt, diligenter autem observandum est quæ  
pars corporis in ipsa invasione laborare vi-  
deatur, eaque diligenter fovenda, ut calor  
innatus (qui est omnium actionum natura-  
lium opifex) ad juvetur. Audiui hæc à Me-  
dico excellentissimo, qui quartana ferè con-  
fectus, ab Empirico isto modo est curatus,  
primùm parti quæ initio paroxysmi afficie-  
batur fomenta adhibebat, processu tempo-  
ris, cataplasma applicabat quod mate-  
riam educeret. Existimabat autem Empla-  
strum quod adhibebat fuisse ex helleboro  
compositum. Nunc quid in plurimis rectum  
usu atq; experientia compertum signifi-  
cabo, multis diebus quartana laborantibus  
floum



Solum decoctum raparum do, admonitus sum de hoc excellentissimi Medici *Guainerii* consilio qui scripsit se Abbatem quendam feliciter rapis quam aliis medicamentis curasse. Sic autem exhibeo, mundandas ab exteriori cortice, deinde decoquendas curo, primum jus tempestivè abiiicio, aliam aquam puram affundo, & donec diffuant rapæ decoquo, exprimo succum accuratè, & addo butyrum recentissimum absque sale cum saccharo, si flatulentus est ager, adiiicio caryophyllos leviter incisos. Matutinis horis do quinque nucleos persicos mundatos, in ista curatione persevero plerumque diebus quindecim, ante accessionem decoquo in Vino Naccarino herbam illam quam *Matthiolus* appellat Clinopodium, & exhibeo, & ne quid in paroxysmobibant veto, viribus omnibus rationibus consulo, victus rationem exactam non requiro, a lacticiis tamen & piscibus abstinere jubeo, hoc modo servavi plurimos. Ubi valde contumax morbus est, in augmento paroxysmi, iis qui promptè evomunt aquam rosæ tepidam exhibeo, & non solum arteriis in brachiis & pedibus, verum omnibus articulis radices urticæ contusas & cum aceto maceratas adhibeo. *Jo. Crato. consil. 26. lib. 5.*

Ubi emicuit natura, & cum urina non sit inflammata, purgetur Elect. Indo, & Confect. Hamec & altero die sumat ex aceto vel vino ℥i. hujus pulveris.

℥i. Zedoar. galang. zinzib. an. ℥i. sumat ante paroxysmum: quidam ipsa hora novilunii scindunt venam sinistram salvatellam. Sed id non agatur die paroxysmi.

*Thaddæus* ter ante ternos paroxysmos drachmam dabat rad. Gentianæ rec. ex malvatico vino frigide. *Job. Heurnius, ad aphor. Hippocr. 25. sect. 2.*

Vidi ducem militum, qui cum diu quartana afflictus fuisset & emaciatus tandem concreti sanguinis magnam copiam per sedem deposuit, postridie obiit. *Job. Heurnius, ad aphor. 23. sect. 4.*

Communicavit mihi quidam amicus meus Medicinæ Doctor singulare quoddam experimentum in quartana, quo se quam plurimos restituisse gloriabatur: estque hoc.

Accipe cor lepōris ita præparatum ut pulmo vulpis præparari solet, postea dividatur in tres partes æquales, & patienti paulo ante paroxysmum, aut etiam in ipso paroxysmo cum vino detur: continuetur hoc tribus vicibus, ut dictum est: & paroxysmum prorsus evanescet. *Petrus Monavius, Epist. 34. lib. 2. Epist. Cratonis & aliorum Medicorum a Scholtzio editorum.*

Si in febribus intermittentibus quibuscunq; apparente aliqua, etiamsi non perfecta in urinis coctione, ægro ipso die paroxysmi medicamentum purgans dederis, ita ut effectum suum ante paroxysmi invasionem compleat (horis scil. quatuor aut quinque antequam paroxysmum adventurum putas) videbis febrem post illum paroxysmum non amplius reverti, sed prorsus tolli quasi incantatione quadam probavi jam sæpius & in pluribus semper eventus respondit. In tertianis post tertium aut quartum paroxysmum hoc facio. In quotidianis tardius: in quartanis tardissimè ac vix ante tricesimum diem. *Petrus Monavius, epist. 37. lib. 2. Epist. Consil. Cratonis & aliorum Med. &c.*

## SUBSECTIO XI.

### Pro Febre quartana.

**I**lli occurratur diligenti usu jusculi sequentis.

℥i. Rad. borrag. ℥ii. rad. cichor. cortic. appar. an. ℥i. Incid. & coq. in jusculo gallinæ juvenis macro pro 2. dosibus: diebus quietis hora una ante prandium assumendo: repetantur octies herbæ superius ordinatæ: temperabit humorem melancholicum, obstructions jecoris & lienis referabit: imò materiæ formæque febrili resistet egregiè. *Balthas. Scheiderus, cons. 39. lib. 7. consil. Cratonis & aliorum a Scholtzio editorum.*

℥i. Pulv. sem. Hyperic. ℥i. M. pro tribus dosibus, usurpandis 3. horis ante prandium cum aq. agrimonix. Inungatur lien sequenti oleo.

℥i. Ol. Chamam. & de cappar. an. ℥i. M. *Job. Sigismundus, cons. 40. lib. 7. consil. Cratonis, &c.*

Quidam ante triennium quartana laborabat



rabat diu, dicebatque mihi se multis remediis usum esse, unum hoc profuisse, accepisse vinum sublimatum diligenter, quod aquam vitæ appellant, & madefecisse petiam lineam, ac adveniente quartana, imposuisse ventriculo: hoc modo se eam depulisse: videtur mihi satistuta esse medicatio, præsertim in ventriculo frigido. *Ioh. Crato, epist. ad Camerarium, lib. 5. cons. & epist. Cratonis, &c.*

Consiliarius quidam à febre quartana liberatus est casu rarissimo: cum secta illi fuisset vena, paulò post occlusum vulnus, & ligatum brachium, fluere cœperunt ex vulnere guttulæ quædam aquæ limpidissimæ quæ fasciam penetrabant & indusia sæpè mutare cogeant: perseveravit ille fluxus per multos dies, donec febris quartana cessaverit. Notandum est illum post multos annos ex hydrope interrisse. *Lazarus Riverius, observ. 70. cent. 3.*

Aromatarius quidam febre quartana satis diuturna laborans, quæ multis adhibitis remediis non cessaret, miscuit cum ptisanæ potus ordinarii cyathis tribus mixtionem ex ambro & moscho, quam pro conficiendis muscardinis paraverat saccharo addito, in qua erant utriusque gr. viii. & in calore accessionis ptisanam sumpsit in tres doses singulis vicibus agitando ne pulvis in fundo remaneret, unde copiosissimi sudores oborti sunt, qui moschum redolebant, & ille perfectè curatus est. *Lazarus Riverius, obs. 35. cent. 4.*

## SUBSECTIO DUODECIMA.

### Pro Febre quartana.

**M**ultos quartana detentos curavi vomitibus; abstinentia cibi diebus accessionis, purgatione, inunctione dorso hora frigoris cum oleo scorp. & pinguedine anseris & gentianæ succo.

Alios verò curavi succo rad. verbasci in potu dato. *Hier. Cardanus, cur. 24.*

Aranea viva quàm fieri potest magna inter duas testas nucis juglandis occlusa ac colligata, & collo appensa; & per quatuor dies gestata, specifica virtute à quartana liberare creditur. Similiter etiam Cantharides quatuor telis aranearum involu.

*Burnet Parte I.*

tas & collo appensas quartanam tollere proditum est. Urina patientis in paroxysmo emissa, & cum farinæ q. s. subacta, & in massam redacta, & in clibanis panis modo cocta, si famelico cani, masculo quidem, si masculus est æger, & fœmellæ, si fœmina, projiciatur, comedendaque præbeatur, idque ter aut quater reiteretur, patiens quidem liberabitur à febre, sed laborabit canis: novem item piperis grana integra plures dies deglutita à quartana febre liberant. *Franciscus Ioel, pract. tom. 5. lib. 1. sect. 2.*

Præmissis aliquoties alterantibus & catharticis ad eorum usum accedo quæ à proprietate huic febri apponuntur, & putredini resistunt, qualia sunt Elixir. propriet. specificum febrile *Crollii*, gentiana, cent. min. theriaca, arcanum duplicatum *Minichii*, radix *China China*, à Ziß. ad Zii. in vino (quæ nihil aliud esse videtur quàm gentiana indica frutex, respectu nostræ herbæ) & spirit. salis armoniaci admirandarum in hoc affectu virium: hac methodo plures à quartana Dei auxilio fœliciter à me sunt restituti. *Volfangus Hæferus, lib. 6 cap. 3. Hercul. Medic.*

Plurimum commodi ex hæmorrhoidibus apertis sperandum est.

Inter sudorifera imprimis commendatur asarum, si folia cum radice in pulverem redigantur, & pulveris hujus ÷iv. cum aliquot gran. piperis hora una ante paroxysmum cum vino generoso exhibeantur: ægerque in lecto stragulis coopertus vomitum & sudorem expectet: quin & finito paroxysmo plerumque alvus dejectur: idque bis vel ter repetatur. Proposuit hoc medicamentum *Pedemontanus, lib. 1. Secretorum.*

Laudatur & hoc quod sequitur.

℥. Mithridat. ÷iv. succi plantag. depurati Zii. M. detur ante accessionem.

Memini ante biennium hic civem quendam, cum toto autumno & hyeme quartana laborasset, tandemque acutissimos in sinistra scapula dolores perciperet, mulieris cujusdam persuasum, ranunculam carpo applicasse, & pustula excitata, à febre & dolore liberatum fuisse. *Daniel Senner-tus, lib. 2. De Febr. cap. 20.*

Elucescentibus Pepasmi signis singulis heb.



hebdomadibus, duabus horis ante Paroxysmum sumat theriacam.

Sanguis emitti poterit, si homo succi plenus sit, ex brachio vel manu sinistra. Si is crassus & niger effluit, elabatur pro ægri viribus: si tenuis ille fluxerit, illi co suppressatur; nam indicat crassum sanguinem solum circa hepar latere.

Aque dulcis balneum huic feбри utile est.

Trochiscis sequentibus unica exhibitione hyemis tempore multi à quartana liberati sunt.

℞. Sem. rutæ, petrosel. myrrh. theriac. rec. an. ℥i. opii, ℥ss. F. trochisci parvi: dabis unum cum aqua ante paroxysmum. Pro sunt etiam quotidianis: vinum fortissimum in quo decocta est agrimonia quartanam tollit: idem facit millefolium cum vino. *Ioh. Heurnius, cap. 25 lib. De Febris.*

Ad cohibendum paroxysmum, hora una ante illius invasionem, purgantia leviora utiliter exhibentur, quæ sollicitando naturam potius, quàm purgando, humores revellunt: eo nomine hoc præscribi potest.

℞. Sennæ mundat. polipod. q. thymi, epi. thymi an. ℥i. flor. borrag. p. i. F. decoctio ad ℥iii. capiat hora una ante paroxysmum.

*Quercetanus* in pharmacopœo maximè laudat pilulas de Sagapeno, quarum unam tantum exhibet initio paroxysmi, continuando ad aliquot dies; paulo post inungendo spinam dorsi linimento composito ex theriaca, aqua vitæ, & oleo laurino, vel de spica, exhibendo duabus horis post pilul. devoratione jusculem cum radaperientibus: dictæ autem spine inunctiones ad rigorem leniendum utilissimæ sunt: sunt enim in frequenti usu, quando rigor est vehemens fiuntque non solum ex prædictis, sed etiam aliis quam plurimis medicamentis; ut oleo anethino, chamæ. irino, costino, rutaceo, de piperibus cum aqua vitæ, theriaca, cariophyllis, castoreo, sinapi, pipere, aliisque permixtis. Efficacius operantur hæc linimenta si hora una ante paroxysmum spina ad ignem inungatur; deinde ager in lectum calidum deferatur, & lateres calentes vino perfusi odorifero, ac lin. tei involuti plantis pedum, volisque manuum admoveantur.

His accedent fons & linimenta hypo-

chondriis adhibita, ad pravam viscerum diathesin corrigendam (quæ novam continuè accessionibus materiam suppeditat) humoremque valde impactum emolliendum & attenuandum; quæ in hunc modum præscribi poterunt.

℞. Rad. Alth. lilior. enul. camp. cortic. rad. cappar. & median. tamarisci, an. ℥j. fol. malv. althææ, parietar. borreg. bugl. pimpinell. absinth. an. m. j. sem. lini & petrosel. an. ℥ss. flor. chamæ. melilot. aneth. an. p. i. F. decoctio in tribus partibus aquæ & una vini albi sub finem additi, qua foveantur hypochondria, bis in die longè à pastu.

℞. Unguenti de althæa, ℥i. ol. lilior. alb. chamæ. rosac. & absinth. an. ℥ss. F. linimentum: applicandum post fotum.

Ac denique balneum aquæ tepidæ, vel solius, vel in qua emollientia & temperantia bullierint, vel ex hordeo & amygdalis, ut vulgò fieri solet, ad hunc affectum expugnandum erit convenientissimum. Siquidem viscerum intemperiem corrigit, atrabilis siccitatem ac fervorem emendat, dura emollit, vias referat & crudos humores concoquit: quapropter frequens illius usus erit convenientissimus. *Lazarus Riverius, cap. 5. sect. 2. lib. 16. Prax. Med.*

## SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

### *Pro Febre quartana.*

**A**Nno 1571. multi quartanarij decubuerunt; qui sine remediis derelicti sunt, omnes pene convaluerunt: quibus curiosè adhibita remedia, ii fere interiere, præferrim si macilenti biliosique forent, ut febres istæ potius à bile essent usta quàm à face sanguinis. Sic cum quartanis agendum mitissimè, ne officiosa sedulitas plus obstit quàm profit. *Guil. Ballonius, lib. 1. epid. & ephem.*

In quartana & tertiana intermittente.

℞. Salis absinth. Card. bened. an. gr. xv. tartar. vitriol. gr. vi. sacchar. perlat ℥ss. M. F. pulvis immediatè ante paroxysmum assumendus: cortex Indicu. *China* dictus multos curavit, sed nec tam tutò, nec tam citò, nec tam jucundè quàm supra



supradicta salia; interim magno constat pretio *Paulus Barbette*, c. 3. l. 3. *Prax. Med.*

Nuperis annis in *Europam* delatus est cortex arboris *Peruviana*, cujus pulvis ad febres quartanas & tertianas efficacissimus deprædicatur: cortex hic vocatur *China China*, seu *China* febris colore est ferrugineo, sapore amaro, à *Gentiana* non valde dissimilis: hoc modo in usum vocatur. Sumuntur  $\text{℥iij.}$  subtilissimè tritæ & per cribrum pollinarium traiciuntur, tribus circiter horis ante paroxysmum infunduntur in phiala vini albi generosissimi & ingruente febrili horrore, universa dosis præparata assumitur, & æger lecto committitur: proficuum huius pulveris usum experta sunt *Rome* aliquot hominum milia: rarò evenit, ut post iteratam summptionem perfecta valetudo non obtineatur. Secus si contingat, tertio exhibeatur, ut firma deinde & longa sanitas sequatur: quod recidiva subsequatur crassioribus pulveris partibus *Antimus Conygius* in defensione ejusdem *cap. 8.* imputat, quæ a subtilioribus segregandæ sunt, ut sola pulveris virtus sine vitio exhibeatur; ut autem segregentur, quum altè & arctè insint, longa maceratione opus esse, 40. scil. vel 50. horarum, expresso deinde per telam laxiorem diluto, pulverem in diluto ita exhibitum iusta mensura  $\text{℥ij.}$  sed majore vi & nisu expresso febrem fugare citra ullum recidivæ periculum ipse *Conygius* expertus est; monet idem per destillationem ex eodem pulvere liquorem parari posse qui eadem vi polleat, & longè facilius sumatur. *Thomas Bartholinus*, *hist. 56. cent. 5.*

Non ita pridem invisebam Generosum quendam pessimè per aliquot menses à febre quartana tractatum, quæ cum elusisset omnes etiam præstantissimorum Medicorum conatus, author illi tandem fuit, ut corticem *Peruvianum* in usum vocaret, cujus tam mirandos effectus sæpius observavi: non repugnante candido & doctissimo suo Medico ordinario, bis ejus pulverem ex vino, ut fieri solet, assumpsit, tanto quidem cum successu, (licet in hyeme essemus tempestate anni omnium minimè favente) ut per primam dosim paroxysmus multum imminutus, per secundam penitus ablatus fuerit. Honoratiss. D.

*Robertus Boyle*, in aureo suo tractatu *De utilitate Naturalis Philos. part. 2. sect. 3.*

Si credendum erit magno *Digæo*, culpandus potius Medicus quàm Nobilis hæc Medicina, si post ejus exhibitionem unquam revertatur febris, nam cum illum consulerem super hac re, sanctè mihi asseveravit, ex triginta aut eo circiter quartana detentis, quos hoc solo remedio curavit, ne vel duos relapsos fuisse. *Idem ibidem. Part. 1. sect. 1.*

Uusus pulveris corticis *Peruviani* hunc morbum certissimè curare perhibetur, cujus virtus seu operatio sine quavis evacuatione solummodo in hoc consistit, quod paroxysmos febriles ingruentes inhibeat: vulgaris exhibendi modus est, ut hujus in pulverem triti  $\text{℥ij.}$  vino aut tenui aut generoso in vase cooperto per duas horas infundantur, ac dein ingruente paroxysmo, ægroto intra lectum composito, liquor cum pulvere propinetur. Hæc potio non rarò accessionem imminuentem tollit, sæpe tamen istac solito more habita, proximè succedentem præcavet: ut cunque sive prima, sive secunda aut tertia periodo paroxysmus inhibetur, atque morbus curari visus sit, intra viginti aut triginta dies sæpissime redire solet, Dein pulvere hoc rursus exhibito, pro temporis circiter ejusdem spatio: morbi insultus denuò protelatur, atque hoc ritu novi plures quartana laborantes, toto autumno & hyeme accessiones febriles tantum rariores pertulisse, hostemque ita in præcinctu detinuisse, donec vere ineunte, tempestatis anni, & alius pharmacix ope, sanguinis diathesis in melius alteretur, adeoque affectus iste sensim evanesceret: qui hac ratione crebras inducias quartanæ procurabant, alacres & vividi ad negotia quævis expediti degebant, cum secus enerves & pallidi in languorem & vitiosum corporis habitum redigerentur, vix unus è centum hoc remedium incassum tentavit, imò si in dimidia aut minore quantitate, sc. ad  $\text{℥i.}$  aut  $\text{℥ss.}$  pondus sumatur, accessiones sæpissime tollit nec tantum in febre quart. verum in aliis intermittentium speciebus cum fructu abhibetur, vulgò præcipitur, ut hujus purgatio lenis præmittatur, ac in quibusdam valde imbecillis & lecto affixis sine



previa pharmac. hic pulv. solitariè sumptu effectus laudabiles procuravit. *Thom. Willis, cap. 6. De Febr.*

Viscus oxyacantho innatus pulverisatus, & vino albo aut *Hispanico* infusus, & duabus ante paroxysmum horis exhibitus, dosi subinde repetita, si opus fuerit, febrem quartanam non rarò fugat & perfectè sanat. *Joh. Rains Catalog. Plantar. Angl.*

## SVBSECTIO DECIMA QVARTA.

### De Febre quotidiana.

**A**ffinis quidam meus gratis innumeros febricitantes febre quotidiana & tertiana detentos pericarpio sequenti curavit; quosdam prima vice, alios secunda, pertinaces tertia. Remedium tale est. Novem Pentaphylli folia radicitus colligit, postea incipiente paroxysmo, arteriæ brachii dextri tria folia cum sale, rursusque desuper alia tria folia cum salis pugillo in medio foliorum imponit, & sic mille ad minus febre detentos curavit, multique etiam quartana detenti quatuor folia eodem pacto imponendo curati sunt. *Petrus Borellus, observ. 23. cent. 1.*

Malo non cedente ad Generosum aliquod auxilium confugiendum est hoc, vid.

℥. Lign. guaiac. ℥ii. lign. visc. quern. ℥i. lign. sassa fr. ℥i. infund. omnia horis duodecim in juris pulli gallin. ℔j. deinde bulliant ad consumptionem tertiæ partis, sub finem addendo cichor. beton. & menth. viridis an. folia duo, colaturæ ℥vij. dentur horis quinque ante prandium per dies aliquot continuos. *Joh. Zecchini, consult. 22.*

Ad digestionem humorum pituitosorum ordinatum hoc claretum.

℥. Aq. cichor. absinth. fœnic. an. ℥iii. de cichor. cum rheo ℥i℔. syrup. de quinque rad. ℥i. de granat. acid. ℥vi. crem. tartar. ℥℔. spiriti vitriol. gutt. vi. aromatizetur cum spec. diarrhod. abbat. ℥ii. cinamom. el. ℥i. M. F. Julepus instar clareti, pro tribus vel quatuor dosibus matutinis & vespertinis, paroxysmus anticipavit & fuit paulo brevior ex usu clareti quod continuabat. Se-

quenti die ex hac potiuncula purgante ter vomuit, & per inferiorem gutturem copiosè evacuavit.

℥. Gummi gutt. gr. viii. tartar. vitriol. gr. vi. spirit. vitriol. gr. ii. aqu. cinamom. ℥i. M. F. haustulus. Postea sequens expulsi-  
vum in accessione febris accepit.

℥. Aq. Chard. bened. cent. min. an. ℥i. aq. cinamom. ℥i. syrup. de papav. ℥iii. sal absinth. gr. viii. pulv. fol. cent. min. ℥℔. spirit. vitriol. gt. i v. M. diligenter. F. haustulus. Paroxysmus vix tres horas duravit, horum usu continuato intra paucos dies à febre immunis evasit. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 2. cap. 4. lib. 1.*

Curatur ferè hæc febris ut tertiana, diuturna & notha; ita tamen ut inter præparantia humores, & obstructions aperientia, seligantur ea, quæ majorem attenuandi & incidendi vim obtinent, tum etiam in hac febre peculiaris ventriculi ratio habenda est, qui plerumque graviter laborat; ideoque roborantibus tam internis quam externis reficiendus est. Imprimis autem maximè conducit Cataplasma sequens.

℥. Absinth. & menth. virid. an. ℔j. crustæ panis assatæ & in aceto rosac. infus ℔℔. pulp. cydonior. vel cydoniati cum melle confecti ℥ii. Mastich. ℥℔. macis & nuc. mosch. an. ℥ij. omnia pistentur fortissimè cum oleo cydoneor. F. Cataplasma, quod calidè applicetur ventriculo ante paroxysmum.

*Zacutus Lusitanus* duo remedia proponit, quibus se febre pituitosas contumacissimas expugnasse gloriatur, unum est decoctum chamæ, in hunc modum compositum.

℥. Flor. chamem. p. iii. comar. absinth. pont. p. ij. coq. in aq. ℔iiii. ad mediæ partis consumptionem, colaturæ adde sacchar. alb. ℥iv. capiat manè singulis ℥v. vel vi.

Alterum est decoctum Chinæ & Guaiaci ad 25. dies exhibitum. *Lazarus Riverius, cap. 5 sect. 2. lib. 17. Prax. Med.*

Duobus ab hinc annis febre quotidiana violenta laborabam, à qua liberatus sum carpis applicando sequens.

℥. Salis marini, lupul. anglic. an. Mij. passul. corinthiac. ℥iv. probè misceantur & con-



& contundantur. *D. Robertus Boyle, lib. De utilitate Natural. Philosoph. cap. 10. sect. 5. part. 2.*

## S E C T I O S E P T I M A.

*Pro Febre Hæctica.*

**F**ebri *Hæctica*, id est, habitualis vel in habitum conversa febris, est calor præter naturam in cordis substantia solidisque partibus ardens & hærens, easque absumens, arefaciens, & ad extremam macilentiam totum corpus deducens tres ejus constituuntur gradus. Primus est cum rorida humiditas absumitur & exsiccat: Secundus, cum carnosa & adiposa substantia depopulatur & perit, in eo est evidens corporis extenuatio. Tertius, cum fibrosa & membranosa substantia colliquatur, corpusque ita marcescit, ut facies succedat Hippocratica, & ossa pellibus tantum circumtecta appareant, hic verus est marcor & hæctica *μικροπύδης* nominata, quæ & immedicabilis existit. Causæ hæcticæ internæ sunt febres ardentes & diuturnæ, hepatis item, ventriculi, pulmonis, renum aliorumque viscerum diuturnæ inflammationes & ulcera. Ad externas referuntur quæcunque reliquas febres generare possunt, dummodo tales sint, quæ vel plurimum humidæ substantiæ in membris solidis absumere, vel maximum & diuturnum calorem excitare, vel utrumque præstare aptæ natæ sunt, ad quam rem imprimis facit subjecti ad calorem hunc præternaturalem recipiendum, promptitudo & dispositio, ac continua & vehemens calefaciendi actio. Tales verò sunt calor Solis aut Ignis, exercitium vehemens, cibi & potus calefacientes, excretiones immodicæ, ut diarrhœa & dysenteria; animi pathemata vehementiora ac denique inedia. Corporis calidior & siccior habitus ad hanc febrem suscipiendam aptior est. Incipiens hæctica non facile cognoscitur, cognita autem facilius curatur. Reliqua genera, difficulter curantur, licet facile cognoscantur. Omnium *Hæcticarum* signa communia sunt, calor toto corpore æqualis, ex quo non dolent, nec se febricitare intelligunt, de-

*Burnet Parte 1.*

bilis primò apparens, ob vaporum paucitatem, postea si manum diutius admoveas, acerrimus & mordax propter subjecti siccitatem & soliditatem; in arteriis major quàm in reliquis partibus ob cordis communionem; hora una aut altera post cibum sumptum increascens nec aliter effervescens quàm calx viva, si aquam aut aliquid aliud tale superinfundas; pulsus parvus, frequens, & celer, urina oleaginosa cum sedimento farinaceo.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Febre Hæctica.*

**P**ræ cæteris ad lactis asinini usum quam primum tanquam ad sacram anchoram confugiendum. Hoc enim tam generosum præsidium, ut decet de more administratum, & febrem hæcticam evincere, & corpus universum humectare, refrigerare, simulque reficere valebit.

Necessarium etiam erit ut vespere duabus horis ante cœnam quotidie sese aquæ dulcis tepidæ balneo paulo minus horæ spatio immergat: & ita simul lacte & lavacro diebus pluribus continuis utatur, lactis asinini loco, si non illi conveniat, juris pulli gallinacei more nostro parati ℥vi. vel viij. horis quatuor vel 5. ante prandium non minori fructu sumere poterit.

℥4. Sacchar. rosat. ℥iv. sacch. viol. ℥ij. carniū testudin. nemuralis contusar. ℥ij. includantur ventri pullæ prius per aliquot dies nutritæ hordeo in lacte excocto, olixetur pulla in s. q. aquæ, donec carnes contabuerint; in fine adde fol. lactuc. hyssop. cichor. an. p. j. rad. farfar. ℥ij. coletur & ut diximus adhibeatur. Ad remittendum immensum totius corporis morbosum calorem fiat tale unguentum.

℥4. Mucilag. sem. psyll. sem. cytonor. sem. malv. an. ℥i℥. butyri rec. loti. ol. viol. loti, an. ℥i. ceræ alb. q. s. F. unguentum, quo tepido cum lactis muliebris modico manè & vespere ante cibum tota illinatur dorsi spina.

Alvus lubrica singulis diebus servetur clysteribus citra caliditatem emollientibus



## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Febre Hæctica cum initiiis tabis in muliere quadam.*

**C**ommendata victus ratione humectante & nutriente, sic præeunte divina benedictione, processum est.

℥. Sem. papav. alb. ℥ss. gummi arabic. tragacanth. farin. amyli, an. ℥i. sem. alth. malv. portul. bombac. an. ℥iv. sem. 4. frigid. maj. rec. & excortic. an. ℥iij. ciner. cancer. fluviatil. corall. rub. ust. succ. liquir. spodii, ros. rub. an. ℥iv. spec. diatragac. frigid. diar. Solom. an. ℥iii. cinnamom. ℥ii. pulm. vulp. præp. ℥i. incis. & non contus. sem. omnibusque loco calente exsiccatis. M. F. pulvis dividendus in tres partes.

℥. Pulv. præscript. partem unam, sacch. rosat. vet. ℥i. pinear. rec. amygd. d. rec. excorticat. an. ℥v. sacch. penid. ℔i. aq. tussilag. veronic. ros. odor. an. q. s. ol. cinnam. gt. vi. F. rotulæ, è quibus diglutiat manè in lecto numero ii. vel iii. elapsæque hora sumat coch. i. sequentis misturæ quæ.

℥. Aq. tussilag. ℔i. syr. jujub. ℔ss. M. Noctu verò in ingressu lecti de hocce capiat.

℥. Pulv. præscripti partem secundam, syr. de jujub. de papav. loch. de farfara, an. ℥i. M. F. Elect. cum fol. auri.

℥. Pulv. præscripti partem tertiam, sacch. penid. ℥ii. M. ad Scatulam. Familiarem sibi faciat usum istius pulveris interdiu.

℥. Flor. ros. ℥iiss. flor. viol. bugl. borrag. & nymphaeæ, an. ℥iiss. santal. rub. ℥iiss. corall. ℥ii. cariophyll. ℥iiss. sem. citri, ocy. mi, an. ℥iiss. camphoræ ℥i. conquassatis omnibus. F. Sacculus pyramidalis è syndone rubro, isque interbastatus; irroretur sequenti mistura.

℥. Aq. ros. odor. ℔ss. spirit. ros. ℥i. M. tepide ista irroratus sacculus admoveatur cordis regioni, hisce remediis diligenter cum insisteret, rectius habuit, convaluitque. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 6. cap. 2. lib. 1.*

corporis & animi quies omni industria quaeratur, retineaturque. Somnus pro viribus concilietur, quod ad alimenta spectat, sorbitiones præ ceteris in usu sunt habendæ: & ex his quæ commodè alant, facile conficiantur, refrigerandi, humectandique vi prædita sint, & pauca gignant, excrementa: inter quas primum locum obtinent ptisana hordeacea cum modico cydonior. succo; ova forbilia, pulli gallinacei juscula, in quibus carnes contabuerint: cancrorum fluvialium & testudinum nemoralium carnes in lacte bubulo clixæ, & ejus generis aliæ. Vinum prævalidum suspectum habetur, quod & caput feriat, & universum corpus, vehementer excalefaciat: pauciferum tamen, probeque dilutum aqua cum mica panis excocta, in virium & ventriculi gratiam tutò concedi potest semel saltim in mensa: in reliquis verò potionibus aqua ex cochlearum & testudinum carnibus per alembicum vitrò extracta utilissima semper erit: inter edulia etiam quæ multum & commode nutriunt, pedes suilli, & vervecis exacte elixi, butyrum & lactaria cum saccharo mixta maximè conveniunt. Sed præ cæteris tum ad hoc multa alia, tum ad roboranda simul præcipua viscera, confectio hæc nostra non ignobilem obtinet locum.

℥. Carnium Capi, carn. testudin. elix. an. ℥ij. amygdal. dulc. pinearum avellan. an. ℥i. sem. frigid. min. an. ℥i. margarit. santal. alb. rubr. & citrin. an. ℥ss. conserv. borrag. rosar. an. ℥iiss. sacchar. albiss. dissolut. in aq. ros. & viol. q. s. F. decoctio in morsellis in ultima mensa devorandis.

Unum autem alicujus momenti non est silendum, videlicet ante cibum immediatè jus parvæ pullæ omni pinguedine semota ad ℥v. vel hæctica laborantibus utiliter propinari, buo solidæ partes humectentur. Sic Cæmentarii aqua parietem aspergunt, priusquam calcem aut cæmentum admoveant, ut paries tenacius ac firmitus incrustetur. *Ioh. Zecchius, consult. 28.*

Aqua ex sanguine lactentis vituli vel agni balneo M. præparata mirificè in hoc affectu accommodatur. *Lalius à Fonte, consult. 126.*



## SUBSECTIO TERTIA.

## De Febre Hæctica.

**I**Nfanti cuidam trium annor. atrophica & hæctica laboranti, cui brachia & pedes flacceſcebant, venter verò tumidus erat, ſequentia conſului. Primò de hoc lacte cancrorum detur infanti manè & vespere calide cachl. j. vel ii.

℞. Cancror. fluviatil. viv. num. 5. bene lotis & mundatis affunde lactis caprini q. ſ. contunde parumque coq. Poſtea per linteam ſuccus expreſſus edulcoretur ſacchar. card. q. ſ.

Sit uſticula adſit, ſuccus raparum ſub cineribus coctarum & expreſſarum ſacchar. candilo edulcoratus propinetur. Deinde fiat balneum ex aq. dulci fontana tepida in qua caput, & pedes agni cocti ſint, in eo ponatur infans per horam dimidiam & amplius ſi ferre poſſit, ante ingreſſum aſſumat parum lactis caprini rec. & calidi, vel lactis cancrini ut ſupra. Prodivitiis parari poteſt balneum è ſolo lacte caprillo vel vaccino, vel dimidiis partibus lactis & aq. dulcis. Tertio quoque die renovetur balneum, & caput & pedes agni tamdiu coquantur: donec caro ab oſſibus ſeparetur. Poſt egreſſum è balneo pectus cum ſpina doſi hoc linimento calidè inungatur.

℞. Adip. capon. anſer. an. 3j. ol. viol. 3ij. ol. amygd. d. rec. exp. 3iij. mucilag. ſem. pſyll. cum aq. viol. extr. 3ß. cum pauca cera F. linimentum, extra uſum balnei etiam manè & vespere fieri poteſt hæc inunctio. *Job. Petrus Lotichius, obſerv. 3. cap. 2. lib. 1.*

Habui hæcticum in curatione diu, qui ſiccatus & tabidus, nec balneo, nec lactis potu, aliſque innumeris humidis, & reſcientibus auxiliis unquam potuit reſtutui, tandem morbi pervicacis pertæſus, ad ranarum uſum acceſſi. Stillatitiam aquam ex illis extractam in balneo Mar. cum ſyr. violaceo permixtam pro potu quotidiano bibendam obtuli: eas elixas cum oleo, ſale, ſaccharo: & ſaſſamentis in cœna & prandio deguſtabat, interdum illi erat pro frequenti uſu jus album, factum ex illarum contuſa carne, cum amygdalis, lacte,

butyro, farina hordei, ſaccharo, vitellis ovorum: quæ omnia reſperſa cinnamomo, & roſacea irrorata, ad ignemque percocta, conditum faciunt ſuaviſſimum, quod optimè nutrit, humectat, impinguat, coquitur facilè, citò diſtribuitur: hoc modo gubernatus hic æger, trium menſium ſpatio priſtinam recuperavit ſanitatem. *Zacutus Luſitanus, obſerv. 36. lib. 3. prax. admirand.*

In hæctica ſimplici, quia adjectione & humectatione opuſeſt, nec evacuationo ſanguinis, nec aliæ purgationes inſtituendæ; ſed potius cum medicamentis, tum diæta corpus humectandum. Quæ intra corpus aſſumuntur medicamenta imprimis humectare, & ſimul refrigerare debent, qualia ex violis, borragine, bugloſſa, nymphæa, roſis, endivia, cichorio, ſem. quatuor frigidis, amygdalis, papav. parantur. Utilis eſt ſequens miſtura.

℞. Sacch. albiſſ. ʒiij. amyli ſubtiliſſ. pulveriſ. ʒiv. ol. amygd. d. rec. expreſſ. 3iij. diſſolv. ſacch. ſuper igne cum aq. roſ. vel viol. & cum inceperit inſpiſſari, adde nunc amyllum, nunc oleum amygd. d. & cum ſpatula continuo agitentur, fiatque mixtura.

*Ioh. Angelicus* hunc ſyrupum commendat & aureum appellat.

℞. Ungul. caballin. umbilic. Veneris capil. ven. lenticul paluſtr. endiv. hepatic. cichor. viol. lactuc. ſem. papav. alb. portulac. ſem. frigid. maj. malv. ficus paſſul. pineas, amygd. ſantal. omnia genera, flor. violar. raſ. ebor. pruna damaſcena, caſſia fiſtul. liquirit. ex quibus ſingulorum q. ſ. coquit in aqu. hord. q. ſ. & cum ſacch. albiſſ. q. ſ. parat ſyrupum quem ægro manè & vespere propinat.

Inter ea quæ extra corpori applicantur, imprimis laudatur balneum aq. dulcis: quod refrigerat ſimul & humectat, & propterea convenientiſſimum eſt.

Maxima verò curationis, ſpes in diæta conſiſtit, aer ſit mediocriter frigidus: ciſus ſit refrigerans, & humectans, facilis coctionis, boni ſucci, paucorum excrementorum, & qui non mox diſcutiatur: tales autem ſunt, ptiſana, vel eius cremor, ova recentia, pulli gallinacci, caro hœdina, piſces optimæ notæ, &c. Con-



diantur autem lactuca, endivia, sem. frigid. & papav. Imprimis verò lac convenit, & vix quicquam ad curandam hæcticam eo est convenientius, quod non solum alit, sed etiam medicamenti rationem habet. Est enim frigidum & humidum, facilis concoctionis, optimi nutrimenti, ac summam vim habet substantiam corporis nostri humectandi & reficiendi. Inter lactis genera, commendatur primo loco humanum, utpote quod nostræ naturæ sit familiarissimum; secundo loco constituunt Medici lac asinum, quod tenuis est substantiæ, & facile in totum corpus distribuitur: tertio caprinum, quarto vaccinum: ne in ventriculo lac coaguletur, ei saccharum vel sal admiscendum est. *Daniel Sennertus, cap. 3. lib. 3. De Febris.*

Matrona nobilis phthisi correpta non diu post in hæcticam febrem incidit, cui tandem in fine etiam admixta fuit quartana continua, quarto die magis affligens, ita ut omnino tabida evaserit. Hanc Medicus optimè tractabat, ad quam & ego post aliquot dies, cum diu laborasset, accitus fui: Cui varia remedia præscripsimus, & inter reliqua & hanc pullam, qua Præceptor meus *Benedictus Faentinus* in phthisi uti solebat.

℞. Hord. mund. ℥iv. amyli, gummi tragac. an. ℥ii. Infundantur per noctem in aqua ungulæ cabalinæ. Manè fordities quæ supernatat amoveatur, deinde aqua coletur leviter, & crassiora pullæ infuantur, & coquatur ad jectâ aqua colata & aq. communi, bulliatque ad putrilaginem, donec ab ossibus caro decidat. Facta forti expressione ius reservetur, de quo capiat ℥iv. Præscripsimus quoque decoctum ex ungul. caball. scabios. cap. ven. ceterach. scolopendr. viol. pimpinell. beton. flor. cordial. hord. mund. sem. 4. frigid. mai. jujub. febest. & similibus; colaturæ addendo syrup. convenientes viol. jujub. & fumar. simpl. purgavimus cum ℥vi. ceph. rec. extract. & diacathol. ℥ij. in bolo. Pectus in unximus oleo amygd. d. butyr. rec. loto in aq. ungul. caball. Capiti ad catarrhi suspensionem sacculos capitales ex mastiche, olibano, ros. siccis, beton. maiorana, macere, cariophyllis & santalis composuimus. Pro phthisi continuè dedimus conserv. ros. &

sacchar. ros. quibus *Gordonius* dicit *Avicennam* curasse mulierem à Medicis deploratam. Præterea usi sumus pilulis sub lingua & pulvere haly. Et quartana illa contineat tandem minùs apparebat, licet febris ipsa magis tabida fieret. Et tunc ius hoc restaurans præscriptum est.

℞. Caponem mundatum, ut decet; abscissis pedibus, capite & collo, in minutas partes concisum, addendo conserv. ros. hujus anni ℥i℥. conserv. borrag. ℥℥. sacchar. viol. manus ch. cum perlisan. ℥i. cinnamom. el. ℥i℥. aq. ungul. caball. ℥℥℥. vini *Rhenens.* opt. ℥iiij. Bulliant in balneo M. ad horas 10. deinde coletur expressione ut f. ius restaurans. Post mensem tabe confecta, cum remedia non iuvarent, incidit in alvi profluvium, quod nullo modo restringi potuit, & ita paulò post mortua est. *Petrus Forestus, observ. 12. lib. 4.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *Pro Febre Hæctica morasmode.*

**V**lctu humectante & restaurante usi sumus. Hoc inter alia eius restaurans præscripsimus.

℞. Capon. deplumat. minutissimè incisum prius lotum cum vino & aq. rosacarn. vervecin. non pinguis ex armillo ℥bi. succor. trium granator. medii saporis, pedes duos ovillos prius coctos (ut melius instar gelatinæ adhæreant ob alvi fluorem quem semper metuebamus) coq. in poculo stricti orificii bene obturato, in balneo M. ut artis est per horas septem vel octo, & jus expressum ac concretum usui reservetur, & ablata pinguedine, quæ ius conservat, cum opus est singulis tribus horis capiat tria vel quatuor cochl. ut melius sapor placeret, adiecitimus vini rhenani exiguum, pauco cinnamom. pulverisato insperso, adiecto quoque sacch. rosat. perlato.

Hoc item restaurans denuò à nobis præscriptum.

℞. Capum deplumatum, purgatum; pedem porcinum, à pilis optime repurgatum, pedes duos ovillos coctos, vini rhenani odoriferi ℥bi. manus Ch. perlat. ℥i℥. cinnamom. select. ℥℥. coq. in balneo M. ut artis



artis est ad horas octo, & usui reservetur. Sapor huius restaurantis ei valde arridebat. Postea hæc pasta regalis præscripta est.

℞. Pulv. capon. & perdic. an. ℥iii. amygd. d. excortic. aq. calida rosac. ℥iii. pinear. rec. lotarum in aq. ros. ℥ss. pistach. ℥ii. terantur ultima contritione addendo gummi Arabic. tragacanth. an. ℥ss. diarrhod. abbat. diatragac. frigid. an. ℥ss. pulv. Haly. diapenid. an. ℥i. conserv. viol. borrag. an. ℥ss. conserv. ros. unius anni ℥ii. pulv. cinnam. el. ℥i. manus ch. perlat. ℥iii. adiecta exigua aq. rosac. F. Pasta regalis, foliis auri obducta. Sapor valde placebat. *Petrus Forestus, observ. 9. lib. 4. De Febr. Hecticis.*

## SUBSECTIO OTAUA.

*Pro Febre albo in Virgine.*

**P**Ræmissis lenitivo & venæsectione ita purgetur.

℞. Agar. rhei an. ℥i. salis tartar. ℥ss. F. infusio S. A. in decoct. Senæ, q. s. ut fiat potio.

Sal tartari præterquam quod obstruções aperiat, hoc peculiare habet, quod infusionibus purgativis additus, vim medicamenti auget. *Rodericus à Fonseca. Tom. 1. consult. 6.*

## SECTIO NONA.

*Pro Febre verminosa cum alvi fluxu.*

**P**Uella quædam duodecim annorum febre continua laborabat cum alvi fluxu molestissimo, quo materias excernebat colore cineritio infectas quales apparere solent plerumque in verminosis affectibus: præscripti sunt clysteres detergentes ex rebus dulcibus parati, tum potus vulgares contra lumbricos, & rhabarbarum pulveratum bis iteratum; ex omnibus tamen his nullum levamen obtinuit, imò febris & alvi fluxus in deterius vergebant, ut iam de salute puellæ dubitaretur: tandem sequentem iulepum ipsi præscripti.

℞. Rad. acetos. gram. & cichor. an. ℥i. fol. endiv. cichor. acetos. portulac. & hyperic. an. Mj. scor. & absint. pont. an. Mss.

flor. cordial. p. j. coq. in aq. hord. ad quartaria v. in colat. dissolv. syrup. limon. ℥iv. spirit. vitrioli gt. aliquot ad levem aciditatem. F. Julepus pro quatuor dosibus manè & serò sumendis: intra illud biduum quo julepo usa est, febris & alvi fluxus omnino quieverunt, & perfectè curata est. Si quis miretur tam levi remedio sublatum esse hunc affectum, sciat hypericum & scordium mirabili efficacia putredini resistere, & lumbricorum generationem prohibere, nedum genitos enecare: & verè testari possum me hujusmodi julepis in infinitis penè puerulis lumbricis laborantibus cum scelicissimo successu usum esse. *Lazarus Riverius, obs. 16. cent. 1.*

## SECTIO DECIMA.

*Pr Ficu cancroso seu tumore Scirrroso in cancrum degenerante in oculi dextri orbita.*

**T**UMOR hic ovo anserino major erat, extra palpebras prominebat, partemque faciei cooperiebat; cum comitabatur magna oculi & vicinarum partium inflammatio, capitis dolor, & oculi quoque dolor acutissime pungens, accessit & febris, sitis, lipothymia, & vomitus. His ego statim cœpi occurrere; itaque post præscriptam legitimam victus rationem, iussi lenientem Clysterem iniici. Postridie purgatum fuit corpus; sequentibus diebus propinatum fuit iulapium sequens.

℞. Aq. borrag. acetos. & beton. an. ℥ii. syrup. de succo citror. & granat. an. ℥i. M. pro tribus dosibus: à purgatione secta fuit vena cephalica respondens parti affectæ, & missus sanguis ad ℥vi. paucis post diebus admovi hirudines venis iugularibus sub aurem ad idem latus, necnon & scapulis cucurbitulas modò cum scarificatione. Pedes lavi decocto herbarum calidarum rorismar. salv. maioran. organ. menth. cum sale: ita mitigata sunt imminutaque paulatim symptomata. Statim etiam partem affectam ablui gossipio imbuto stillatitia hac aqua, quæ multum potest adversus cuiuscunque partis cancrum.

℞. Rad. scropul. mai herb. robert. an. Mij. arnogloss. mai. solan. bugl. sylvestris borrag.



rag. portulac. euphras. betonic. an. Mj. ranar. aquatil. album ovar. diu agitator. an. num. 12. sem. cydon. fœnugræc. aliquantum conquassator. an. ℥i. his seminibus affunde aquam ros. & euphras. an. ℔i. incidantur omnia & conquassentur, & destillentur in alembico plumbeo: & quoniam ingens fuit affluxus, præter revulsiones admovi fronti sequens unguentum ad fluxionem interceptandam.

24. Farin. hord. ℥ii. pulv. ros. rub. myrtill. balauft. nuc. cupress. & fl. beton. an. ℥ii. acaciæ, ℥i. cum oleo rosato, pauca cera & aceto, fiat unguentum. Hoc defensivum adhibui tribus vel quatuor diebus assistendum fluxionis impetum; deinde superfedi, ne plus satis refrigeraretur caput: hac methodo sedavi ad tempus tum capitis tum ulceris dolores acutissimos, ceteraque symptomata: crescente nihil hominus in dies tumore hac curatione palliativa seu fucata invalida existente, ad reprimendam morbi vehementiam, & perfectè sanandum ægrum superat Chirurgica operatio, ut simul & semel extirpetur quicquid vitiosum est in parte affecta, quæ meo iudicio omnium minimè periculosa est. Decreta tandem est per initam consultationem plurimum Medicorum, mali extirpatio per incisionem, cui facile assensit magnanimus æger, sed prius præscripta est agro victus ratio congrua ad reparandas vires, præscriptus est etiam potus laxativus: exhibitus etiam bis est hic potus cordialis, die operationem præcedente, & ipso die manè quo instituta est.

24. Aq. bugl. viol. ros. meliss. an. ℥i. Syrup. cortic. citri, & de succo acetos. an. ℥i. Confect. alkerm. ℥i. pulv. diambrae ℥ss. M. F. potio pro duabus dosibus: exterius etiam super corde ante & post operationem applicitum est scutum sequens.

24. Flor. 3. cordial. an. p. ii. meliss. majoran. an. Mss. sem. & cortic. citri. sem. ocymi: an. ℥ii. pulv. el. diamargar. frigid. el. è gemmis & diamosch. d. & diambrae an. ℥ss. croci ℥i. excipiantur gossipio, & cum syndone rubra, F. scutum interceptum pro regione cordis: ante & diu post operationem, unctus est stomachus hoc unguento.

24. Cerat. stomachi. Gal. ℥iii. pulv. arom.

rosat. ℥i. cariophyll. & nuc. mosch. an. ℥ss. ol. nardin. & mastich. an. ℥ss. F. linimentum pro stomacho ante cibum.

His præscriptis, & præmissis solemnibus precibus pro felici successu, & tribuenda ægro patientia ac viribus ipsemet sumpto recenti ovo, & cyatho vini, cathedram accommodam sibi elegit, & ultro sedit ita ut quam mollis quispiam cathedræ alligandus foret, necesse duntaxat habuerim adstantium duobus brachia, tertio caput committere; tum crumena ex utraque parte aperta ad hanc operationem à me inventa, totam excrescentiam sive ficum tam altè quantum fieri potuit, versus nervum opticum apprehendi & inclusi, crumenulamque constrinxi, & sinistra mea nonnihil attraxi.

Crumena hæc fit ex corio tenerrimo. Sic apprehenso & crumena incluso fungo cæpi sub palpebra superiore ad maiorem oculi canthum, cultello hic figurato (quem ipse inveneram & nominatim præparatim ad eam operationem) separare conjunctivam, adactoque ferro ad opticum usque nervum percurri oculi ambitum quæ erant separanda disjungens eodemque instrumento opticum secui, tum & eum qui secunda conjugationis est: & tam dextrè (sine jactantia sit dictum) me gessi, ut vix decem passus fierent, dum ficus ille cancrusus totam oculi orbitam implens, & in faciem late prominens, intactis palpebris radicitus erutus sit; porro etsi adnata tunica, quæ precipue incidenda erat, exquisitissimo sensu sit prædita, non usque adeo tam dolorifica fuit operatio, injeci illico copiose pulverem nostrum ad sanguinem sistendum, stupis quinetiam albumine ovimadefactis & prædicto pulvere conspersis oculi capsulam implevi, ita ut vix ℥ij. sanguinis extillarent; deinde fascie involuta est orbita, & defensiva ad frontem & collum circumcirca adhibita. Pulvis noster sanguinem sistens ita describitur *lib. de Gran. cap. 19.*

24. Farin. volatil. ℥vi. sang. drac. thur. an. ℥j. bol. armen. orient. terr. sigill. an. ℥ss. gypsi ℥ss. ranarum aquatil. præpar. (mirifice enim & proprietate quadam oculi sanguinem sistunt) ℥ii. musci cranii human. ℥i. pil. leporin. minutissimè incisor. ℥ii. pulv.



℞ii. pulv. alb. ovor. sole caniculari exsiccat. spumæ maris, spongiæ novæ torrefact. an. ℞i. M. F. pulvis subtilissimus. Ranae autem ita præparandæ sunt; accipio ranas aquatiles, suspendo illas in cucurbitam, ita tamen ut fundum non attingant, ne in carbonem comburantur, & aqua quæ extillat odorem gravem acquirit, accenso igne aquam in arena clementer extraho, & ad usum reservo, est enim pretiosa in ulceribus malignis & cancris, item in polypo, ozæna, aliisque pudendorum & sedis ulceribus, inflammationem extinguit, & malignitatem corrigit, ignem non extinguo, usque dum omnino exsiccatæ fuerint ranae, nec ulla amplius extillet aqua, illam tamen quæ circa finem extillat separatim colligo, odorem enim graviolem habet, & in ulceribus oris & narium minus grata est. Ranas ita exsiccatas in catillum fusorium projicio & in albißimos cineres comburo, valent non solum ad sistendum sanguinem, verum etiam in omnibus ulceribus & sordidis & malignis, si iis inspergantur, mundificant, abstergunt & corrigunt malignitatem. Ipso operationis die non est relictum vulnus metu hæmorrhagiæ, post tri die tantum applicatum ex conceptis filamentis digestivum sequens.

℞. Terebinth. lotæ in aq. beton. ℞ii. gummi elemi, ℞ß. dissolv. in ol. ros. ℞i. adde vitell. ovor. num. 2. croci ℞ß. M. F. digestivum. Insuper admovi emplastr. basilicum, in unxi totum caput & collum ol. myrtill. & rosac. fronti & collo defensivum applicui, sex diebus continuavi digestivo adhîbui mundificativum sequens.

℞. Terebinth. lotæ in aq. beton. ℞ii. gummi elemi in ol. rosac. dissol. ℞ß. rad. aristol. rot. irid. flor. an. ℞ii. cum melle rosac. F. mundificativum, tum applicui emplastrum de betonic. eoque ipso incarnavi vulnus, cicatricem induxi pulvere sicco ex cerussa, lithargyro, C. C. usto, alumine & radice irid. super inducto emplastro diapalma, victus rationem æger adeo accuratè & libens observavit, ut supra decimum quartum diem vino sibi temperarit, contentus ptisana, cui adjectum erat paucum coriandrum præparatum, atque sic adductis tandem concinnè palpebris à sicu can-

croso ejusque omnibus symptomatis vir genere & virtute imprimis verò pietate Nobilissimus persanatus est. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 1. cent. 1.*

## SECTIO UNDECIMA.

*Pro Fissuris & Rimis in volis manuum ex Lue Venerea.*

**P**ost universales purgationes, & universalem curationem factam per lignum, ut sequenti unguento uteretur consulti.

℞. Ol. Tart. vitr. an. ℞i. Tart. vitr. alumin. an. ℞i, axung. porcin. rec. ℞iv. succi limon. ℞i. probè commistis. F. linimentum: deinde hoc quod fortius est utatur.

℞. Unguenti enulati ℞iii. argenti vivi ℞i. sublimati ℞i. M. ungatur manus. *Petrus Forestus, observ. 26. lib. 32. De Lue Venerea.*

## SECTIO DUODECIMA.

*De Fistula.*

**F**istula est ulcus sinuosum, angustum, callosum, & aliquatenus indolens: ut plurimum ex abscessibus parùm dextrè curatis oritur. Fit in omni ferè corporis parte: plures sunt ejus differentiæ, aliæ profundæ sunt, aliæ intra carnem desinunt, aliæ ad os aut cartilaginem penetrant, aliæ ad nervos, aliæ ad venas & arterias perveniunt, aliæ præterea simplices sunt, aliæ verò ab uno ore incipientes duplices triplicesve.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Fistula in dorso à Scapula ad lumbos pertingente.*

**P**urgato corpore potionem hanc vulnerariam præscripsi.

℞. Rad. consol. mai. ℞ii. rad. bistort. aristol. rot. dictamn. alb. an. ℞iß. herb. pyrolæ ℞iii. consolid. Saracen. ℞ii. fol. alchimill. agrimon. equiset. beton. flor. hyperic. ros. rub. an. ℞i. sem. hyperic. perfoliat. an. ℞ii. ocul. cancr. ℞ii. F. omnium pulvis: cucus



ius sumatur tertia pars & coq. in mensuris quatuor vini albi, & mensura una aq. plantag. coletur & servetur ad usum, addendo Sacchari quartar. i. aq. cinnam. ℥i. bibat de eo manè jejunos cyathum unum, & sub vesperam horis duabus ante cœnam tantundem, ita continuando donec reliquæ pulveris partes consumptæ fuerint. Interea dum hoc decoct. utitur, injectionem sequentem per Syringam in ulcus in dies infundat.

℥. Succ. apii officin. succ. plantag. & agrimon. an. ℥ii. succ. tabacc. ℥i. mell. ros. ℥iii. vini rub. ℥i. dissolv. calcanth. alb. aluminis, tartari, an. ℥ii. vel plus, dum sordidum adhuc est ulcus, arugin. æris, auripigmenti, an. ℥ß. F. injectio. Cum supra & infra pateret ulcus, ut siccaretur, fumus per canales infundibuli in humilior ulcus fuit intromissus, tam diu donec per superius ulceris foramen prodiret, sicque interiores omnes cavitates pervasisset.

℥. Mastich. thuris an. ℥ß. myrrh. ℥ii. benjoin. storac. an. ℥iii. sarcocoll. pic. resin. pini, gummi elemi, an. ℥i. F. Pulvis carbonibus inspergendus pro fumo. Postquam curam hanc per injectionem & suffumigationem aliquot septimanis continuasset, integrè sanatus fuit. *Felix Platerus observ. lib. 2. pag. 568.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Fistula inferioris maxillæ à dentis dolore.*

**I**Nstituta optima victus ratione, sequentem exhibui potiunculam.

℥. Pulv. passavant. ℥i. detur cum decocto beton. salv. rorismar. & majoran. Postridie venam in cubito incidi: deinde materiam in capite sequenti decocto præparavi, & leniter purgavi.

℥. Fol. & flor. beton. scabios. veronic. cuscut. agrimon. an. Mi. summitat. rorismar. major. flor. salv. & prim. veris, an. Mß. sem. anis. & fœnic. an. ℥ii. liquirit. ℥i. coq. in aq. ad consumptionem tertiæ partis huius colaturæ per triduum in aurora calidè ad ℥iv. melle despumato dulcoratæ exhibui. Postea.

℥. Eiusdem decocti colaturæ ℥ii. fol.

sen. ℥ii. agar. rec. troch. rhei el. an. ℥ii. maneant in infusione horas duodecim, deinde iterum leniter calefacta, fortiter exprimantur, expressione adde Syrup. beton. & rosat. solut. comp. cum rheo, agar. & sena an. ℥i. M. potio pro quatuor matutinis, tandem sumpsit sequentes pilulas.

℥. Mass. pil. aurear. & aggregativ. an. ℥i. troch. alhand. & diagrid. an. gr. iv. cum syrup. de stœchad. F. pilul. quinque, quæ diluculo sumantur.

Præparato satis corpore, radices dentis in alveolo à barbitonfore relictæ effodi, callositatem verò fistulæ unguento quodam caustico absumpsi, & ulcus unguento de succo apii mundificavi, tandemque cicatricem emplastro diacalciteos, & pulv. aluminis usti induxi, sicque curationem spatium triginta dierum feliciter absolvi. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 32. cent. 3.*

Quia pulvis passavanti excellens est, nec omnibus notus, ejus descriptionem hic annexere placet.

℥. Fol. sen. mundat. ℥iii. turbith. gummof. ℥ii. rhei el. ℥i. liquirit. sem. anis. fœnic. an. ℥ß. spic. indic. gr. viii. F. omnium pulvis tenuissimus, detur à ℥ii. ad ℥iv. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 80. cent. 2.*

*Iohann. Schroderus lib. 2. Pharmacop. Med. Chymic. cap. 77. pulverem passavanticum in sequentem modum describit.*

℥. Flor. borrag. viol. an. ℥ii. zinzib. spic. nard. an. ℥i. liquirit. sem. anis. an. ℥ii. diagrid. ℥iii. rhei el. ℥v. turbinth. gumm. ℥i. sen. ℥ii. M. F. Pulvis. Purgat omnes humores noxios, maximè bilem.

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Fistula.*

**S**Tudiosus quidam octodecim annorum in pectore diu habebat Fistulam, ex qua effluebat multum aquosum pus. Hæc à me curata sic fuit, manè & vesperi postquam exivit omne pus, inieci per Syringam oleum heraclinum, ac postea foramini fistulæ turundam majorem imposui, ut maneret aperta, atque tali processu quo-



quotidie penitus confanavit. *Martinus Ru-landus, curat. 39. cent. 9.*

Domina quædam juvencula fistulosis ulceribus pluribus locis prorumpentibus multum debilitata, post expertissimorum Chirurgorum irritos planè conatus, & cum ab omnibus pro deplorata haberetur, tandem brevi temporis spatio sequentis remedii usu integre curata est.

℥. Absinth. & menth. an. Mi. millepedum bene contusor. (demptis prius capitibus) 300. Sacculo omnia includantur, qui suspendatur in cerevis. tenuis pintis viii. peracta fermentatione, capiat haustum de ea bis tervo in die, plurimum præstant mil. lepedes in fistulis & mamillis exulceratis modò non sint cancrose. *D. Robertus Boyle, lib. De Utilit. Natur. Philosoph. part. 2. sect. 5. cap. 5.*

Quidam habens fistulam longo tempore in pectore, non reperiens apud Medicos remedium, usus consilio cujusdam peregrini, accepit quolibet die cum oleribus, carnibus & ovis de herba dicta *Canda equina*, & brevi curatus est. Quædam mulier habens fistulam in manu quotidie apponebat succum chelidonie, & herbam tritam super fistulam bis in die ponebat, & brevi curata fuit. Quædam domina curabat omnes plagas hoc modo. Succum pentaphylli bis in die superponebat, deinde ipsam herbam tritam, & sic brevi tempore curabat omnia vulnera & ineisiones in quacunque parte corporis etiam cum fractura ossis. *Arnoldus Villanovanus, lib. 3. cap. 21.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### *Pro Fistula Lachrymati.*

**V** Ide supra libro primo, sectione octava. *De Egilope.*

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Fistula Lachrymati.*

**H** Onesta quædam & pia matrona triginta circiter annos nata, humidissimo cerebro prædita, cum inflammatio-  
ne oculorum sæpissimè, dolore verò ca-

pititis continuò vexaretur, tandem quodque Fistula lachrymalis in dextri oculi cantho exorta est; ea cum ad annos circiter duos egram excruciasset, tandem me in consilium vocavit, purgato corpore, reliquisque universalibus adhibitis, & collyrio appropriato quotidie in oculum instillato, Setaceum nuchæ quoque adhibui, hinc dolor capitis non diu post ex toto remisit, fistula intra menses quatuor plenissimè sanata fuit, laboraverat autem (quod annotatione dignum est) matrona illa per annos aliquot menstruis albis, quamobrem nunquam utero gestaverat, adhibito vero Setaceo, paulatim remisit fluxus, ac paulò post concepit, ac filiam peperit. *Guillelmus Fabritius Hildanus, observ. 19. cent. 4.*

Ante omnia instituenda est optima victus ratio. Secundò, purgandum est corpus, secundum humoris prædominantis naturam. Tertio, caput corroborandum; idque medicamentis tam per os sumptis, quam exterius admotis. Convenit decoctum igni guaiaci, sassaphras, radic. chinæ, & sarsaparill. addita betonica, salvia, rosmarino, majoran. & primula veris. Conveniunt quoque conserv. betonic. rorismarin. salv. majoran. primulæ veris, peon. Cons. alkerm. cortices citri, species dianthos, aromat. rosmar. & hujusmodi. Capiti inspergatur pulvis benjoin. styrac. calamit. mastich. thuris succini albi, granorum kermes, rad. irid. florent. flor. betonic. anthos, majoran. & rosar. rubr. ex quibus pileolus sive cucupha parari quoque poterit. Quarto, materia quæ ad oculum fluit, ad alia loca trahenda est, in quem, finem cucurbitulæ scapulis frequenter appositæ conveniunt, uti quoque vesicatoria post aures. Omnium verò præstantissimum est Setaceum, materiam enim ad oculos fluentem, potenter ad se trahit & evacuat, caput ab omnibus excrementis humoribus expurgat, & egregiè corroborat. Quid plura? tanti est momenti, ut inveteratam fistulam lachrymalem sine hoc præsidio vix curari posse, in aliquibus observaverim: amovet etiam causa antecedentem mali. Purgato itaque corpore, applicandum est Setaceum, nec quicquam circa fistulam tentandum; nisi Setaceum prius ad tempus aliquod fluxerit, materiamque  
ad



ad fistulam decumbentem ad se traxerit, postea dilatanda est fistula turundis ex radic. gentianæ, aut spongiis præparatis, quofacto, pulvis præcipitatus quam diligentissime præparatus, inspergendus, aut filamentis imponendus est ulceri, quod emplastro ex solo gummi elemi, in alutam aut telam extenso, obtegendum. Ego fortiori pulvere isto non utor, ne os, si forsitan adhuc sanum fuerit, à suo peristio detegatur. Sæpissimè enim fistulas lachrymales, etiam inveteras, sanavi, in quibus caries in osse reperta non fuit: quapropter festinandum non est, sed sensim procedendum, insperso pulvere prædicto bis, vel semel in die, prout ulcus fuerit humidum; ut plurimum tamen dum pulvere isto utor semel tantum in die ulcus deligare soleo. Stylo ab initio cariem ossis curiosè perquirere non est necesse: Si enim os cariosum fuerit, pulvis iste carnem, quia mollis & flaccida est, absumet: Sin sanum fuerit os, sanum illud relinquet pulvis, & ulcus non solum mundificabit, sed & ad cicatricem perducet: habet enim diversas hæc facultates pulvis iste, ut ego sæpius observavi. Si os cariosum inveneris, quantum fieri potest detergendum est, postea euphorbium in subtilissimum pulverem redactum copiosè insperge. Nihil enim in ossibus cariosis, imò & in fistula lachrymali euphorbio est præstantius. Aliqui cariem ossis fistulæ lachrymalis cauterio actuali corrigunt, quod non improbo, mihi tamen, laus sit Deo, præcedens methodus cum euphorbio, semper tam feliciter successit, ut cauterio actuali nunquam usus fuerim. Satis mundificato ulcere, & prædicto pulvere præcipitato ferè carne repleto, balsamum tolutanum filamentis applicare poterit; cicatricem enim planam & pulchram facit. Per totum autem tempus curationis, sequens collyrium oculo bis aut ter in die instillandum, & lineum reduplicatum, & collyrio madefactum, applicare convenit, sintque omnia fascia diligenter ligata, ut oculi motus quo ad fieri potest, impediatur. Motus enim humores attrahit, & consolidationem impedit. Collyrium tale est.

℞. Aq. rosar. plantag. an. ℥i. aq. euphras. & valerian. an. ℥i. sem. cydon. con-

tus. ℥i. M. maneatque in infusione horas sex vel octo, colaturæ adde tutiæ præp. plumbi squammos. diligenter præpar. C. C. usti præp. an. ℥i. camphoræ ℥i. M. omnia diligenter in mortario fiatque collyrium quod tepide applicetur. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 3. cent. 6.*

Puer quidam tredecim annorum, ab annis quatuor fistula lachrymali ex sinistra parte, quæ pro deplorata habebatur laboravit: non enim os solummodo cariosum, verum etiam glandula ita erosa erat, ut quotiescunque puer ploraret, lachrymæ per ipsam fistulam copiosè extillarent. Est præterea puer adeo morosus & impatiens, ut cauterium actuale, quod summum optimumque censetur esse remedium fistularum lachrymalium, nunquam ipsi applicare potuissimus; quapropter de aliis remediis nobis cogitandum fuit: itaque instituta optima victus ratione, corpus secundum humoris prædominantis naturam, & ægri tollerantiam expurgavimus: deinde setaceum nuchæ applicuimus; post dies aliquot optimè fluente setaceo, manum fistulæ adhibuimus hoc modo. Primò, quia angustissima, nonnihil de caustico meo, quod absque dolore erodit, applicuimus. Post casum escharæ fistulam unguento escharotico, & spongiis præparatis, usque ad ipsum os dilatavimus: tandem euphorbium per se fistulæ inspersimus, & quidem in copia; deinde emplastrum ex solo gummi elemi applicuimus, hinc qua fieri potuit diligentia per septimanas aliquot adhibitis remediis, squamula ossis sese obtulit, & extracta est: & postquam per paucos dies semiguttulam balsami tolutani, semel in die cum filamentis ulceri imposuissimus, brevi plenissimè consolidata fuit fistula, quæ huc usque clausa est, oculo & visu planè illæsis. Setaceum quoque non diu post consolidatam fistulam cicatrice obduximus. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 22. cent. 5.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Fistula Lachrymali.

**V**irgo quædam Nobilis ex ægilope fistulam lachrymalem contraxit, in maiore



maiore oculi angulo, osse illic vitiato, & pure continuò ex eo angulo fluente, cum multis lachrymis: frustra per anni spatium à *Iudæo* & Chirurgo afflicta, & per diætam extenuata, tandem ad me deducta est. Purgavi eam primum pilulis capitalibus ex cochis & aggregat. Postea applicui sœ cucurbitulas collo utrinque sine sectione per biduum, tertio die cum scarificatione.

Injectione dein hac usus sum.

℞. Lixivii ℥ss. aceti ros. rub. balauft. an. ℥ss. gallar. ℥i. fol. rutæ. M℞. decoq. pro ablu-tione & infectione cum Syringa, in fistulam oculi anguli.

Postquam aliquoties usa fuisset, semper portio illius in nares descendebat, tandem portio ossis maxillæ superioris, in oculi angulo ad nares, cum magna parte carnis putridæ fetidissimè per nasum in palatum erupit, quo factò, nulum pus nec lachrymè amplius ex oculi sede efluxerunt, sed omnia per nasi amplitudinem in palatum deciderunt. Dein unguentum hoc immittebat in ulcus.

℞. Aloes, thuris, sarcocoll. sang. drac. an. ℥i. antimon. crudi, plumbi usti, & loti, tutiæ, lapid. hamatit. an. ℥ij. balauft. aristol. rot. an. ℥ss. alumin. ℥ij. ærugin. aris ℥i. pulverisentur subtilissime, excipiantur melle & terebinthina. Fiat unguentum.

Perfisteat in usu unguenti & lixivii, bisque in die Chirurgus meo jussu administrabat. post dies aliquot applicui cauterium in nucha, & exempta eschara apertum retinui.

Dedi quoque Potionem hanc pro quinque dosibus.

℞. Fol. tanaceti caul. rub. agrimon. filicis maj. filipendulæ, pimpinell. ceterach. an. Mj. fol. myrthi M℞. rad. liquirit. ℥i. cicer. rub. p. ij. F. decoctio ad ℥ss. addendo sacchar. q. s. pro quinque dosibus. Purgavi denuò pilulis. Incipiebat sanari ulcus, sed intrinsecus tunica succincta, metuens autem ne apertus maneret sinus, cauterii portiunculam int rufi, quod mirè urebat, sed illicò remittebat. Postea ad carnem generandam hoc Scarotico sum usus.

℞. Aristol. rot. rad. ireos, cortic. thuris, an. ℥ss. mastich. myrrhæ, sarcocoll. aloes, lap. claminaris, an. ℥i. mellis q. s. F. unguentum.

Integrè sanata, ita ut tantum parva fovea illic citra incommodum, aciculæ capitis instar remaneret, formam tamen minimè defigurans. Post octodecim annos ad me scripsit, cum esset Abbatisa facta, & catarrho laborasset, metuens ne recidivam pateretur, sed nihil subsecutum. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 385.*

## SECTIO XIV.

### De Fluore albo.

**F**luor albus (Græcè *ῥῆς γυναικῶς* dictus) humoris excrementitii tota natura è sanguine alieni, totius vel partis alicujus vitio collecti inordinata ex utero excretio qui excernitur humor, modò liquidus est & albicans lactis sero aut ptisanæ cremori persimilis, modò citrinus, aut pallidus, modò subviridis, & adeo acris & adurens, ut quascunque partes attigerit, erodat aut leviter exulceret, atque is rursus modò graveolens est, modo etiam nullo odore molestus. Virgines rarò hoc malum infestat, frequentius adultiores, nonnunquam & gravidas, in quibusdam quotidie, in aliis post mensium purgationes nonnullis evenit inter duas purgationes tantum. Causa autem quæ corruptum istum humorem assiduò gignit, aliàs in utero, aliàs in corpore toto, vel aliqua parte consistit; neque enim semper hic culpandus est uterus, si labefactata sint mulierum viscera si nimirum refrigerata sint, aut ferventiora, aut obstructa, aut schirrosa, cruditates: malum habitum, humores corruptos, acres & serosos subministrant, qui sæpe naturæ robore in uterum feruntur, & per illum effluunt: atque hæc fluoris uterini causa admodum frequens est, altera causa ex utero rarius contingit, eaque vel intemperies est, fereque frigida, vel imbecillitas ab uteri gestatione, à partu & abortu, contusione, aut ab alia causarum externarum vi contracta, vel erosio, vel exulcerato ex inflammatione aut ex abscessu derelicta, his quippe causis oblaesus uterus, proprium alimentum malè conficit, & excrementa plurima congerit, quæ foras elabuntur &



excidunt. Causæ externæ sunt, aer frigidus & humidus, mœror, vita sedentaria & otiosa, hinc est quod rusticæ mulieris rarò hoc morbo tententur. Alimentorum etiam humidorum & frigidorum nimius usus, sed præ cæteris frequentes cruditates, duæ ut ait *Avic.* sunt omnium morborum mater. Vidit *Fernelius* puellam octavo ætatis anno hoc malo obsessam. Differt hic fluor à Gonorrhæa; quod hæc in minore quantitate excernatur, albidior sit & crassior, & longioribus intervallis effluat.

## SUBSECTIO PRIMA:

### *Pro Fluore albo.*

**P** Vrgato decenter corpore, manè & vespere ante pastum per decem dies utatur hoc balneo.

℥. Fol. Lauri, origan. calamenth. puleg. menthastr. Sabin. an. Miiij. artemiss. meliss. nepit. beton. majoran. an. M. iv. rad. rub. tinct. cyperi, an. ℥iiij. rad. rusci, asparag. an. ℥ij. spic. nard. (exsiccat enim humiditatem) junci odori, an. ℥i. sem. rutæ, dauci, anis. fœnic. sesel. an. ℥ß. rad. valerian. ℥ii. coquantur in aq. pro balneo. Si valde fluant humiditates albæ, ne concitior fiat fluxus, styptica magis addantur. Si adhuc fluor non vincatur, semel in hebdomada accipiat has pilulas.

℥. Pit. mastich. agar. troch. an. ℥ii. cortic. myrobal. cheb. ℥ii. excipiantur melle ros. ex ℥i. F. pil. vi dentur iv. pro vice. Succini farina cum ovo forbili detur. Hæc sunt quæ ad album fluorem profunt, præcipuè hic pulvis, quo multæ matronæ Nobiles post universalia remedia sanatæ sunt.

℥. Faucium Lucii piscis, capitis caponis in furno exsiccati an. ℥ß. ossium dactylorum ℥ij. coriandr. præpar. sem. anis. torrefact. an. ℥i. rad. nymph. ℥ß. sacch. ros. ℥iiij. datur ℥i. cum vino rubro. *Petrus Forestus, observ. 13. lib. 28. De morbis Mulierum.*

Ad evocanda ab utero ad alias partescrementa, tria valde profutura præsidia occurrunt, diureticorum usus, repetita ex rhabarbaro purgatio, & ligni guaiac. decoctum, quod ita fit.

℥. Ligni guajac. ℥i. rad. sassaphras ℥ii. santal. omnium ℥i. infund. in aq. chalybeat. ℥iiij. horis 12. deinde: bulliant ad consumptionem tertiæ partis: sub finem ebullitionis adde fol. plantag. menth. matricar. artemis. fœnicul. capill. ven. an. p. i. sumac. rad. petrosel. an. ℥i. colati ℥vii. vel viii. exhibe in auro-ra, & sudor molliusculè provocetur, idque viginti saltem diebus continuis præstandum: quo tempore cauterium cruris dextri parti interiori affixum, non possum non summopere laudare. *Iohan. Zecchius consult. 35.*

Hujus mali maxima habenda est ratio, cum mulieres quas exercet, steriles ut plurimum reddere soleat, vel etiam gravidis abortum parere remediis usitatis peractis, si vitium adhuc pertinaciter persistat, Electuario mihi hoc in casu sæpe scælici cum successu usurpato utatur.

℥. Gummi Arabic. tragacanth. corall. utriusque, an. ℥ii. ciner. putamin. ovor. C. C. sem. aneth. succin. an. Div. mellis ros. sat. q. s. F. Electuarium: ejus ℥ß. horiduabus ante cœnam devoranda exhibeatur superbibendo aq. plantag. ℥iv. vini sub rubr. ℥ij. *Ioh. Zecchius, consult. 97.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Fluore albo.*

**P** Rò revulsione laudo vomitum cum diasaro *Fernelii* ad ℥ß. detur ex aqua mulsa, vel

℥. Rad. asari ℥i. detur cum oxymel.

Pro derivatione materiæ per alvum conveniens est medicamentum jalapa, in hunc modum.

℥. Jalap. pulv. ℥ß. cinamom. pulv. ℥ß. M. & cum jure pulli. F. potio. Deinde pro præparandis humoribus sumat singulo quoque manè tria cochlear. oxymel. per v. aut vi. dies: deinde sumat ℥ß. hydragog. min. *Fernel.* vel in bolo cum sacch. vel cum paucò vino: his ad exsiccandum corpus & roborandum ventriculum, decoctum Salsæparill. cum paucò ligno guajac. confectum sumat per 15. aut 20. dies, & procuret sudorem semel in die, ut materia revelatur



Jatur ad cutem; id quod *Galenus* procurabat facere in uxore *Boethi*, lib. *De Præcognitione*, fricando corpus melle cocto, & etiam linteis primo lenibus, postea asperioribus: derivatur quoque materia ad urinam, quod fecit *Galenus* ex decocto rad. asari & apii: venter quoque si tumet & maderet, arena calida exsiccare debet: id quod *Gal.* in uxore *Boethi* fecit, victus denique sit exsiccare, & quàm minimum bibat. *Rodericus à Fonseca*, tom. 1. consult. 4.

Nonnunquam evenit mulieribus pituitosum profluvium, cum pituita per alias partes denegatur exitus, hæc per dorsum ad uterum defluit. Siccabimus illam pituitam decocto guajaci & syrupo *Montagnæ*. Nam fotu & suffumigiis curationem recipiunt inquit *Hippocr.* *De morbi mulierum*, *Ioh. Heurnius*, ad aphor. 56. sect. 5.

℥. Fimi asinini M. iv. macerentur aq. rosac. magna rejiciatur, & cum sacch. F. Syrupus: cujus in hoc affectu admirabilis vis est. Paretur etiam Syrupus ex succo urticae mollis. Pro suffitu plurimum valet ratura ebor. carbonibus injecta, commendatur hoc facile parato. Accipitur ebur tenuissimè in lapide prophyrio pulverisatum, & propinatur ex aqua chalybeata. *Guil. Ballonius*, comment. ad Hist. 2. lib. 2. consil.

Nos sæpius hoc remedio hunc morbum sanavimus, nempe nucis pinæ decocto cum ligni vitci quercini portione in potu administrato: mirabilem remedium est huic morbo, sicuti nos pluries observavimus. *Dominicus Panarolus*, observ. 48. *Pentecost.* 2.

Fluore albo, mulier quædam mediæ ætatis laborans diuturno & copioso sic curata est.

℥. Pilul. assajaret & fætid. an. ℥i. cum succo artemis. F. pil. v.

℥. Pulv. aromat. rosat. ℥i. ras. ebor & C. C. an. ℥i. cortic. citri sic. diamargar. calid. an. ℥ss. galang. cyper an. ℥i. ciner. spong. combust. & lotæ aq. pecul. rosac. ℥ss. sacch. ℥i. F. pulvis. Capiat. cochl. i. mane ante ingressum balnei. Balneum tale ordinavi.

℥. Rad. bistort. lapath. an. fbi. gallar. malicorii. an. Mii. flor. chamæm. melil. rot. rub. fol. absinth. an. Mi. aluminis ℥ii. sal. ℥i.

*Burnet Parte I.*

tartar. p. i. F. decoctio pro incessione in balneo. Utatur in dies hora una in hypocausto calido & sic fuit pulchrè sanata. *Felix Platerus*, observ. lib. 3. pagin. 781.

His pessis sæpe usus sum in fluore uterino ad expurgationem illuvici.

℥. Fell. vaccæ ℥i. rad. asar. agar. cinnam. an. ℥i. succ. mercurial. ℥i. coq. cum melle pauco reliquisque permistis. F. instar unguentum ad sacculos implendos. *Felix Platerus*, observ. lib. 3. pag. 782.

Menses albi præmissis universalibus, quibusdam appropriatis emendantur, qualia sunt apud obstetricem gallicam, pag. 83. sem. citruli, si singulis diebus numero 12. deglutiantur, superbibito haustu lactis. vel.

℥. Camphor. ℥ss. scobis ebor, ℥iii. aq. ros. nymphae, an. ℥ss. M. & repetatur sæpius pro dosi. *Wolfgangus Hæserus*, cap. 1. lib. 7. *Hercul. med.*

Mulier quæ integro biennio fluxu albo laboraverat, accepit nucem moschatam, ejusque assatæ & diversæ partem β. manè, alteram β. vesperi adsumpsit: sicque continuando sanata est. Hoc ipso remedio utebatur quoque *Tho. Erastus* in sistendis mensibus nimis & fluore albo. Ceu singulari experimento. *Hieron. Reusnerus*, observ. 101.

Quædam jam aliquot annis fluxu albo conflictata hac ratione convaluit, accipiebat cineres sarmentorum vitium, & aquæ injiciens pedes fomentabat vesperi immediate antequam cubitum iret, primoque die deglutiebat grana juniperi tria, altero 5. tertio 7. semenque præterea urticae adsumebat. *Idem observ.* 103.

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Fluore albo.

**M**ulier quædam quadragenaria diuturno fluore albo laborans, post multa remedia frustra tentata, ptisana laxante per mensem integrum singulis diebus usurpata, protinus liberata est.

Ptisana compositio talis fuit.

℥. Sem. mundat. ℥i. sem. coriandr. præp. liquirit. ras. an. ℥ss. aq. fontis in qua tamar-

T

rin-



rind. ℥iij. ligni lentiscini ℥i. bullierint, cyathum unum infundantur frigide per noctem, & colaturam capiat manè duabus horis ante pastum. *Lazarus Riverius, observ. 81. cent. 3.*

Mulier quædam à septem mensibus fluxu muliebri seroso laborabat, quam curavi intra quinque septimanas exhibendo singulis octo diebus gr. vii. resin. jalapæ: educta scilicet serosa illuvie, à qua pendebat affectus. Deinde recidivæ occasio sublata est usu sequentis opiatae.

℥. Conf. ros. antiq. ℥ii. conf. absinth. ℥i. pulv. elect. triasant. & aromat. rosat. an. ℥i. corall. rub. præp. ℥ss. theriac. vet. ℥ii. cum syrup. de rosis siccis fiat opiata: de qua fumebat ad magnitudinem avellanæ singulis diebus hora somni per longum tempus. *Simeon, Jacoz. observ. 8.*

Hic Syrupus bonus est & utilis in hoc affectu.

℥. Flor. Artemis. matricar. meliss. betonic. salv. organ. eupator. asari, an. Mii. cumini, anis. ammeos: sem. rutæ, carvi, an. Mi. enulæ sicce M. iv. cal. aromat. galang. zedoar. cinamom. an. Mss. bistort. gall. mosch. doric. viol. citrinar. an. ℥ii. liquirit. ℥ss. buliant. omnia in lbxii. usque ad medietatis consumptionem. Deinde cum forti expressione contentur, colaturæ addatur aceti lbss. sacch. lbxv. coquantur ad debitam consistentiam ut F. Syrupus: cuius dentur manè ℥ii. cum aq. absinth. beton. & meliss. an. ℥i. & tardetur cibus post ipsum horis quatuor. *Barthol. Montagnana consil. 214.*

Puella quædam octodecim annorum fluore albo diu laborans post multa & varia remedia quibus per annum integrum usa est, hoc uno sanata est. Sorbebat jejuno stomacho ovi vitellum recentem aq. roascea exceptum, & intra quindecim dies sana evasit: cæterum album ovi prædicta aq. rosac. concussum, & jejuno stomacho ebibitum non solum ad album fluorem facere, sed gonorrhæam sanare satis sumus experti. *Amatus Lusitanus, curat. 12. cent. 4.*

Lamii flores albi ad fluorem album absumentum scæminarum experimento celebrantur. Paraturque à nonnullis in cum usum ex floribus istis cum saccha-

ro conserva: quam singulis aliquot diebus sumendam præcipiunt. *Ioh. Baubinus, Hist. Plantarum lib. 28. cap. 119.*

Flores lamii albi ad fluorem album specificè celebrantur. *Ioh. Rarius Catal. Plantar. Anglia.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### Pro Fluxu post Abortum.

**N**ostre mulierculæ in fluxu post abortum hoc pro arcano habent, carnem fumo induratum ad minus vetustate annum excedentem, quam minutissimè concisam in patella terrea supra ignem torrent & exsiccat, ut in pulverem redigatur, dant cum vino rubro styptico: feruntque hoc remedio deploratas mulieres ex fluxu enormi post abortum restitui. Vulgares mulierculæ experimentum aliud habent ad hoc sanguinis profluvium & nimiam evacuationem in puerperis, nempe nucem juglandem exsiccatam in pulverem redigunt, & tribus vicibus cum cerevisia aut vino rubro exhibent. Quo remedio fluxum enormem restringunt: hoc modo Matrona Rotallera Nobilis in *Hagacomitis* dicitur curata.

Hic etiam Pulvis belle profuit.

℥. Margarit. non perforat. spodii. an. ℥ss. coriandr. præp. C. C. ust. an. ℥ii. cortic. median. castan. ℥iij. sem. ros. ℥ii. lapid. hæmatit. pilor. lepor. combust. an. ℥i. sacch. ros. ad pondus omnium: cinamom. quantum placet pro sapore. Sumatur in die cochlear unum. *Petrus Forestus, Schol. observ. 16. lib. 28. De Mulierum morbis.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### Pro Fluxu Hepatico.

**O**mniū primo dedimus infusum rhei, myrobalan. citrin. & chebul. Postea hoc decoctum propinavimus.

℥. Marrhub. absinth. rom. flor. ros. rub. menth. sicc. & rubr. an. Mi. sem. sanguinar. plantag. coriandr. præp. an. ℥i. myrobal. citrin. ℥ss. rhab. el. ℥ss. schænanth. ℥ss. rad. cichor. apii, petrosel. an. ℥ss.



an. ℥℥. cal. aromat. incis. sanar. rubr. an. ℥i. coq. Calyb. ad libi. in colat. adde syrup. de menth. de cichor. cum rheo an. ℥℥. M. pro quatuor dosibus.

Deinde dedi semel ℥℥. rhei pulv. in modum pilul. cum syrup. de rosis siccis: postmodum imperavi, ut bis in die ex hoc condito sumeret magnitudinem castaneæ.

℥. Conf. ros. antiq. ℥ii. spec. aromat. rosat. sine moscho ℥i℥. myrobal. citrin. parnm assat. & pulv. mastich. an. ℥i. cum syrup. myrtino. F. conditum. Cum fluxus nondum cessaret, & jam ultra quatuor menses durasset, & valde æger debilitaretur, sequens apozema præscriptum est.

℥. Marrub. absint. rom. menth. sic. flor. ros. rub. an. Mi. sem. myrtill. plantag. an. ℥i℥. cinamom. el. santal. rubr. cal. arom. an. ℥i. coq. in vino rubro styptito, aq. equiset. & meliss. ad libi. colat. adde syrup. de menth. myrtill. cotoneor. an. ℥ii. M. sumebat. bis in die: quia circa stomachum dolebat, ceratum stomachicum apposui, & hepatis regionem inunxi unguento santalino & ol. absinth. Postea cum neque his adhuc fluxus remitteretur, omni mane per tres dies hunc pulverem dedimus cum ovo forbili, qui multum juvabat.

℥. Sem. plantag. nucis mosch. mastich. pulv. C. C. ust. an. ℥℥. cinam. el. gr. v. F. pulvis subtilissimus. Sed cum fluxus in totum non cessaret, myrobal. cheb. parum rostos, cum rheo tosto ad ℥i℥. cum aq. plantag. & syrup. de ros. rub. sicc. propinavi, & omni mane capiebat ad magnitudinem castaneæ ex elect. sequenti.

℥. Conf. ros. antiq. diacydon sine speciebus, an. ℥℥. nuc. mosch. mastich. an. ℥i. troch. de Carabe, de spodio, an. ℥℥. C. C. usti, pulv. flor. ros. cortic. granat. balauft. an. ℥℥. Corall. rubr. gr. iii. seric. combust. gr. ii. cum syrup. myrtill. ment. an. q. s. F. moderate liquidum, cujus usu fluxus cepit cessare. *Petrus Forestus, observ. 21. lib. 22. De Profluviiis alvi.*

Ad hepar roborandum eiusque intemperiem corrigendam paretur julepus in hunc modum.

℥. Rad. cichor. gram. acetos. an. ℥i. fol. endiv. agtimon. cichor. plantag. cuscut. an. M. i. absint. pont. M℥. santal. rub. ℥i℥. ras. ebor. & spondii, an. ℥ii. coriandr. præp.

℥i. ros. rub. p. i. coq. ad libi. in colat. dissolv. syrup. cydonior. de aceto simpl. an. ℥ii. F. julep. pro quatuor dosibus serò & manè sumendis. Vel.

℥. Aq. plantag. ℥iv. Syrup. de ros. rub. sicc. ℥i. spir. vitrioli q. s. ad grat. acid. F. Julep. frequenter iterandus.

Fit syrupus præstantissimus ex tinctura rosar. facta in aq. ros. & cum sacch. rosat. redacta in syrupum.

Utilis etiam opiata sequens.

℥. Conf. rad. cichor. ℥i. conf. ros. vet. ℥℥. pulp. passul. corinth. ℥vi. croci martis ℥i. corall. præp. ras. ebor. & C. C. an. ℥i. cum syrup. de ros. sicc. F. opiata, addendo spir. vitriol. ℥℥. de qua capiat magnitudinem castaneæ tribus horis ante pastum. Potest etiam addi hepar lupi præparatum; quod ab authoribus commendatur tanquam specificum.

Passulæ majores vel corinthiæ, quia hepaticæ, in hoc affectu commendantur, ideo magna copia cum seminibus sunt comedendæ.

Syrup. corall. ad hepar roborandum & fluxum cohibendum præstantissimus est; ac longe præstantius illius tinctura.

Succus urticæ per se ad ℥ii. vel cum aqua & aceto exhibitus manè per triduum fluxum sistit, & sanguinem corruptum purificat. *Lazarus Riverius, prax. Med. lib. 10. cap. 8.*

## SECTIO XVII.

### *Pro Fluxu Narium vehementi in Febre continua.*

Cum mihi nihil ad manum esset, & subita restrictione opus esset (plus enim quatuor libris sanguinis ex naribus fluxerant & vires valdè prostratæ fuerant,) accepti atramentum quod ibi in promptu erat cum aceto rosac. & cum fuligine fumaris simul mixta cum lana succida involvens, naribus indebam: quo remedio fluxus sanguinis narium cessavit: interim & aq. plantag. frigidissima testiculos fovebam, & sanguinis restrictus est. *Petrus Forestus, observ. 32. lib. 7. De Symptomatis Febrilium.*



## SECTIO XVIII.

## De Fœtu Mortuo.

**S**æpe exstinguitur in utero Fœtus. Extinctionis causæ sunt Plurimæ: alimenti nimirum defectus vel parvitas, vel etiam copia à qua suffocatur: casus item, ictus, saltus, tussis, sternutatio, quibus solvuntur acetabula, per quæ fœtui alimentum suppeditatur: animi etiam pathemata, medicamenta fœtum enecantia, morbus acutus, & longus, partus denique difficultas. Fœtus mortui signa sunt, defectus motus infantis, refrigeratio imi ventris, ichores ab utero fluentes, facies pallida. anhelitus fœtidus, mammarum extenuatio, ventris concidentia & mollities, quod decumbente in latus matre, in id devolvatur ac decidat fœtus, magisque etiam gravitet: quandoque etiam superveniunt animi deliquia, capitis dolores & convulsiones: quamprimum expellendus est fœtus, aliàs præsentissimum exitium prægnanti inferet.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Fœtu mortuo ejiciendo.

**D**edi tredecim guttas ex oleo heracleo bibendas, & simul umbilico, mejuviente, imposui gr. xv. de eodem oleo. Hoc facto adjuvante Deo opt. max. intra dimidiam horam peperit facilè, & fœtum ejecit dudum mortuum, & ipsa incolumis evasit. *Martinus Rulandus, cur. 57. cent. 3.*

24. Myrrh. el. Zi. sem. nigell. lupin. rad. rub. tinct. an. ʒss. croci, aloes, borac. an. ʒi. cum syrup. artemis. fiat pilul. mast. dosi ʒss. harum usu menses promoti sunt.

Postea Pessarium subdere tale jussi.

24. Agar. ʒii. rad. asar. Zi. myrrh. ʒii. succ. mercuriar. ʒi. mell. ʒi. de quoq. succ. cum melle ad spissitudinem convenientem, pulveresque permisceantur. Sacculusque pro pessario impleatur, quod cum unam noctem saltem retinisset, mox chorda umbilicalis propendere cepit. *Felix Platerus, observ. libr. 1. pag. 227.*

24. Cinamom. el. myrrh. an. ʒss. aristol. long. (ea enim partum magis rotunda adjuvat) ʒi. pulv. diambr. & diamargarit frigid. an. ʒss. fiat omnium pulvis; cujus detur ʒi. vel ʒi. ex aq. decoctionis hyssop. & phascolorum, mirè namque partum faciliat. Quod ad topica remedia attinet, nullo magis quàm oleo calente secundum Deum levata uxor mea fuit. In hunc modum adhibito.

24. Rad. alth. fol. malv. hyssop. calamenth. artemis. cum floribus suis, q. f. coquantur in olei. q. f. Deinde in vesicas suillas oleum illud calens infundibulo injiciatur, tumentibus modicè vesicis suillis, atque muliebricis locis admotis, confestim paupercula agra levamen sentire se affirmavit, graveque pondus ad pudendi ostium descendere, quod paulò etiam post obstetricis ope foras prodiit; erat autem mola semiputris cum fœtu illi alligato. *Franciscus Valeriola observ. 1. lib. 1.*

## SUBSECTIO SECUNDA,

## Pro Fœtu mortuo excludendo:

**I**nstituta per aliquot dies victus ratione optimè nutriente & confortante, ad fœtus mortui exclusionem sequenti methodo progressus sum. Primum constituto die infessionem adhibui ex malv. alth. puleg. hyssop. menth. mentastro, artemis. melil. serpill. origan. thymo, rad. alth. malv. lil. alb. aristol. rut. sem. carvi, cumini, fœnic. bacc. juniper. flor. chamam. & cent. min. Sacculis inclusis, & in aq. decoctis, quibus facculis postea subinde quoque loca muliebria foveri jussi; subsequente inunctione emolliente. Tandem etiam Cataplasma ex decocto eolocynthid. succo rutæ & myrrha, cum farina ordeï concinnatum umbilico imposui, & intra corpus pulverem ex succini albiss. ʒi. unicornu veri ʒss. ol. succini, gr. iv. ex brodio caponis exhibui: sicque post decem horas, obstetricis suo quoque officio probè fungente, enixa est fœtu masculinum perfectum, sed nigra putrilagine obductum. *Gregorius Horstius, observ. 37. lib. 5.*

Mulier quædam, cui à perverso marito violenta manu super umbilicum vehemens illa.



illatus est ietus, post quem exanimis immobilem fœtum persensit, pluribus celebratis remediis, hoc solo unguento posito super ventrem & in perinzæ, fœtum exclusit.

24. Medull. cococynthid. succ. colocynthid. virid. an. ʒi. succ. rutæ ʒiʒ. euphorb. ʒii. unguent. artanit. ʒiii. myrrh. ʒvi. ol. de castor. ol. rutac. an. ʒi. coq. ad succi consumptionem, & fiat unguentum. *Zacutus Lusitanus, observ. 162. lib. 2 Prax admirand.*

24. Troch. de myrrh. ʒiʒ. borac. gr. xv. F. pulvis exhib. cum aq. artemis. ʒii. puleg. ʒʒ. hoc solo liberata est mulier quædam. *Augustin. Thonnerus, obser. 1. De Fœtu excludend.*

Tonsoris mei uxor obstetricis incuria agrippam peperit, relicto in matrice integer, rimo puelli capite: adveniensego post 17. horas, per os, testium equi præparator. boracis, an. ʒi. cruci ʒi. cum aq. lil. alb. propino. Mirum dictu visusque. Patiens humi super pulvinaria jacens quadrante post horæ, sternutatorio ex peto naribus admoto, ita se concussit, caputque relictum tanto impetu ejecit, ut illud per cubiculum ad octodecim pedes spheræ instar lignæ se rotaverit. Secretum de equinis testibus, communicavit mihi anno 1600. *Patavii Horatius Augenus* cum illum in praxi comitaret. *Gesnerus* etiam hoc tanquam mysterium habendum scribit in epist. ad *Gasserum*. Illa supervixit, & ter post, ut decies ante, sed eadem fortuna peperit. *Henricus ab Heers, observ. 14.*

Stercus equinum in vino expressum, & percolatum subito Fœtum & Secundinam expellit. *Johannes Hartmanus. Practic. Chimiatr. pag. 299.*

### SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Fœtu roborando, ne in partu moriatur.*

**M**ulier quædam ter peperit maturum partum. Labores patiebatur consuetos ante partum, quemadmodum aliæ scæminæ, sine majori molestia, ita ut neque partus admodum difficilis, aut laboriosus esset, In ipsiis partus doloribus fœtus in utero movebatur sufficienter, attamen sita.

*Burnet Parte 1.*

tum post exclusionem mortuus inveniebatur; idque ter hætenus contigit. Quæritur causa & medela; cum nulla causa in historia referatur, difficile est eam conjectura assequi. Ut tamen sententiam nostram proferamus, dicimus hos casus accidere, vel ob fœtus debilitatem, vel ob constrictionem uteri aut cervicis ejusdem tempore partus. Remedia igitur ad duo erunt dirigenda; imbecillitatem scilicet fœtus corrigendam, & uteri constrictionem nimiam impediendam. Ratione prioris conjuges ante conceptionem debent uti victu euchymio & laudabili, ut semen purum & omni labe vacuum generetur: tum mater toto graviditatis tempore eodem victu uti debet, ut sanguinem laudabilem fœtui suppeditet. Præterea bis in septimana pulvere sequenti utatur.

24. Gran. kermes, ras. ebor. corall. præp. & margar. præp. an. ʒi. maltich. ʒʒ. manus ch. perl. ʒii. M. f. pulvis. Dosis ʒi. in ovo sorbili aut jusculo. Alternis vicibus, loco pulveris, utatur opiata sequenti.

24. Conserv. ros. ʒii. cort. citr. cond. ʒi. myrobal. cond. & nuc. mosch. cond. an. ʒʒ. corall. præp. & margar. præp. an. ʒi. ras. ebor. ʒʒ. f. opiata cum syrup. condit. citri, de qua capiat magnitudinem castanæ semel aut bis in septimana loco pulveris.

Si utcumque tandem fastidiat, utatur tabellis sequentibus gustui gratissimis.

24. Confect. al kerm. ʒiii. Ambr. gris. ʒi. Sacchar. in aq. naphæ & ros. dissoluti ʒiv. f. tabellæ: quibus etiam omni hora uti poterit per supradictorum usum.

Dum ingreditur nonum mensem, sequentia applicentur ventri manè per dimidiæ horæ spatium.

24. Vini generos. ʒiii. Calefiat, & in eo dissolv. ol. nuc. mosch. ʒʒ. pulv. cariophyll. & granor. chermes an. ʒiii. M. & spongia hoc liquore imbuta umbilico applicetur calide bis in septimana.

24. Nuc. mosch. macis, cariophyll. & cinamon. an. part. æq. Excipiantur melle calido ad formam linimenti, & extendantur super crustam panis assatam, & umbilico applicentur manè singulis diebus vacuis ab usu fomenti.



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Fractura Brachii in Sene decrepito.*

**C**urationem hoc modo institui, clementer expurgato corpore, illam virtutem rationem quæ multum nutrit (omissis tamen cibis viscosis, qui mihi in fracturis mirum in modum suspecti) sanguinemque optimum procreat calidum nativum, & humidum radicale instaurat, præscripsi. Singulis quoque diebus jejuno stomacho, ad ℥iii. sequentis Pulveris ex jusculo carnis recentis exhibui.

℥. Lapidis osteocoll. diligenter præpar. ℥i. cinnam. el. ℥iii. sacch. ℥ii. M. F. pulvis tenuissimus, brachium usque ad scapulam sequenti linimento quotidie bis inunxi.

℥. Ol. lumbric. ℥ii. ol. gran. junip. ℥ii. Succi lumbric. ℥i. M. F. linimentum. sed ante omnia primo ossa in locum suum, ea qui fieri potuit diligentia, repositi, post inunctionem sequens applicui Emplastrum.

℥. Empl. Vigonis ad fractur. ℥ii. empl. oxycroc. ℥β. lapid. osteocoll. præpar. ℥iβ. lumbric. præpar. & in subtilissimum pulverem redactor. ℥i. cum q. f. ol. lumbric. F. Emplastr. fracturum de tertio in tertium, aut de quarto in quartum diem solvi, & medicamenta renovavi. Reliquum vero brachium quotidie semel aut bis, ut dictum est, ad scapulam & nucham usque inunxi: hisce adhibitis remediis, callus intra paucos dies, usque adeo procreatus fuit; ut collisio ossium non amplius perciperetur, & brachium intra quatuor septimanas restitutum fuerit: & sic natura in hoc decrepito veluti assopita expergefacta, & calor natus ferè extinctus in ista parte, iterum beneficio prædictorum medicamentorum accensus fuerit: quantum valeat in fracturis ossium osteocolla seu lapis ossifragus non rarò expertus sum: reperitur in campo quodam arenoso prope *Darmstadium*. Eligitur qui sub terra absconditus, extra terram prominens est invalidus nulliusque momenti. *Guil. Fabrit. Hildanus, obs. 90. cent. 3.*

Lapis osteocolla, qui & Sabulosus dicitur, singulari quadam virtute, & proprietate

℥. Aq. namphæ & rosan. ℥iii. aq. cinnamom. ℥i. M. capiat cochl. unum singulis diebus manè per totum noni mensis decursum.

Tempore partus exhibeatur cum singulis jusculis ℥β. confect. alker. & hora una post jusculum quodvis exhibeatur aquæ cinnam. cochl. unum. Umbilico applicetur frequenter frustum semiasæ carnis calidum, & pulver. cinnam. nuc. mos. & cario-phyll. conspersum.

Ratione constrictionis uteri, aut cervicis illius, si mulier non sit gravida extra hyemem, utatur frequenter semicupio ex decocto emollientium parato. in graviditate à principio noni mensis ad diem partus illinantur cervix uteri perinaum ol. sem. lini sine igne extracto. Actum *Monspeli* anno 1635. *Lazarus Riverius, observ. 7. cent. 2.*

## SECTIO DECIMA NONA.

*De Fractura.*

**F**ractura (Græcè *κτάγμα* ab *κτίνω* & *αγνυμι* frango) continuitatis ossium est solutio à violentia quadam extrinsecus irruente accidens. Causæ internæ nullæ sunt, externæ vero ea omnia quæ contundere vel dividere ossa possunt. Facit etiam ad faciliorem ossium fracturam eorundem constitutio fragilis, sive ea sit naturalis, sive à carie luem veneream subsequente acquiratur. Fracturarum pluries sunt differentiæ alia est per transversum, ita ut nullo pacto extrema cohæreant, & hæc *καυλῶδον*, à fracti caulis similitudine appellatur. Dicitur etiam *ῥαφανῶδον*, à similitudine fractæ radicule & cucumeris. Alia est quæ *σπύτριμμα*, i. e. comminutio dicitur, quando os in plures partes conteritur, quæ & *καρυῶδον*, i. e. nucatim à quibusdam vocatur, quod sit facta in modum contusarum nucis testarum; alia rursus est secundum longitudinem, quæ *Fissura* nuncupatur. *Galeno* verò *Χιδανῶδον* i. e. asferis modo. Alia demum est magna, alia parva, alia simplex, alia multiplex, alia est sola, alia est cum carnis contusione, & vulnere: à parte denique affecta variæ pertinentur differentiæ, ut alia est fractura cranii, alia humeri, alia brachii, &c.



rate occulta generandi callum præditus est: idque ego cum in aliis tum præcipue in quadragenario quodam observavi, is quum utraque socilia ad malleolum sibi transversim confregisset me advocandum iussit. Ossa in situm naturalem reposita, singulis matutinis horis jejuno stomacho ℥i. hujus lapidis in marmore cum aq. rad. symphit. præp. exhibui primis diebus cum ptisana, aut juscule carnis recentis, postmodum verò cum vino: iis quæ fracturæ applicui eundem lapidem pulverisatum & præparatum admiscui inde factum est, ut spatio triginta dierum plenissimè restituta sit tibia ita ut sine adminiculo incedere potuerit *Guil. Fabrit. Hildanus, obs. 90. cent. 1.*

Lapis hic cautè & in senibus tantum aut extenuatis, & quibus languet calidum nativum adhibendus est, ne aliàs callus superfluous generetur multo labore diminuendus. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 91. cent. 1.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Fracturis.

**E**go jam à multis annis magno cum successu sequenti utor emplastro infra-

℥i. Empl. Slotani ℥vi. ceræ nov. ℥ij. coloph. gummi elemi pinguißimi an. ℥i. dissolv. lento igne. Postea insperge sequentes pulveres, rad. consolid. maj. balaußt. nuc. cupress. ros. an. ℥i. mastich. thuris, an. ℥ii. M. addendo ol. rosac. q. s. ut F. ceratum. In adultis & extenuatis ad ℥i. hujus emplastri tantundem osteocollæ præp. admisceo. Singulis quoque diebus manè tribus ante pastum horis, de eodem lapide cum juscule carnis vel vino albo exhibeo: multum enim curationem lapis ille accelerat. In juvenibus verò, & qui optima corporis sanitate fruuntur, lapis ille sive per os datus, sive exterius adhibitus minimè convenit: non autem statim ab initio, neque primis diebus applicandum est prædictum emplastr. multo minus oxycroceum, ne affluxus humorum ad partem læsam sequatur: ab initio itaque postquam os fractum in situm suum repositum

est, sequens applico Cataplasma:

℥i. Rad. consolid. maj. torment. bistort. an. ℥ß. boli alb. ℥i. balaußt. ℥i. nuc. cupress. gallar. ros. rubr. an. ℥ii. F. omnium pulvis tenuiss. cui admisce farinæ hordei ℥vi. hujus pulveris accipe quantum opus est pro membri fracti magnitudine, ex quo cum posca formetur cataplasma in mortario vel alio vase sine calore ignis, addendo vitellum ovi cum albumine, parumque olei rosac. applicetur membro fracto & renovetur ab initio tertio vel ad summum quarto quoque die, donec Symptomata non amplius sint metuenda. Tunc Emplastr. Vigonis, vel meum applicari poterit, & de sexto vel decimo in decimum diem reiterari. *Guil. Fabritius Hildanus, Cista militar. classe 15.*

Emplastri palmei sive Slotani qui primus ejus author, hæc est descriptio.

℥i. Adipis porcin. rec. & fragrantis, minii, an. ℥xiii. chalcitid. ust. sed non ad rubedinem, aluminis usti, an. ℥ii. adipis cervini ℥iv. mastich. thuris in tenuiss. pulver. reducti, an. ℥ii. fiat emplastr. S. A. agitando bacilis faliceis & succulentis. *Guil. Fabrit. Hildanus, in consilio. De conserv. valetudine, in Epistola ad Croquerum.*

Curationes illas ossium confractorum per lapidem, quem *Erastus* fabulosum vocat, quis non pene fabulas esse judicet? Multo etiam magis, unguentum illud, quo telorum inunctione; vulnerati sanantur, ridiculum videatur: & tamen fide digni amici nostri utrumque sanctè affirmant. Sunt alia sexcenta, quæ fidem omnem superant, non tamen ideo falsa sunt: quare vehementer in iis exerce & ubi ratio repugnat, experientiæ, cum admiratione subscribo *Andreas Dudithius, epist. 5. lib. 6. & epist. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Fractura humeri.

**O**sse per Chirurgum reposito, emplastrum hoc adhibitur.

℥i. Farin. Fabar. farin. ciceris, hordei, farin. volatil. molendini, an. ℥ß. mastich. tragacant. gummi Arab. mummiæ, boli,



bol. armen. myrtill. pulverif. an. ℥iii. album ovor. v. conquassata in vino styptico nigro: succi plantag. aut vini styptici q. s. ad incorporandum. F. Emplastrum. Hoc constringit, repercutit, roborat, & firmat. Deinde stupas longas, latas, aqua prius balneatas & expressas toti brachio circumvoluebat, & fascia latitudine quatuor digitorum, aut quandoque duabus præparatis alligentur dicta, adjectis ferulis quatuor aut sex, interim facta restauratione, etiam pannus lineus infusus in ol. ros. prius apponatur. Deinde reliqua jam dicta, ut emplastr. stupæ & ferulæ in injectis fasciis ut moris est: non solvebatur ad quinque dies. Interim brachium inungebat, nec non & spaculam & loca vicina aliquo defensivo: & sanguis detractus est ex brachio opposito: atque ita Chirurgus procedente, ut in reliquis fracturis hic tandem curatus est. *Petrus Forestus observ. 8. lib. 8. Observ. Chirurg.*

In principio fracturæ dislocationis & torsionis juxta *Ioh. de Vigo* hoc medicamentum apponi potest.

℥. Album. ovor numero iii. ol. rosac. omphac. ol. ros. compl. an. ℥x. ol. myrtill. ℥i. farin. volat. farin. hord. an. ℥vi. bol. armen. subtiliss. triti, sang. drac. an. ℥iii. M. F. Emplastr. Est mirabile primis diebus. Transacto autem nono aut decimo die; nullo contradicente symptomate, ut est dolor, apostema, pruritus, tunc supra fracturam & dislocationem utilissimum est hoc infra scriptum apponere.

℥. Albumin. ovor. numero iv. ol. myrtill. ol. ros. an. ℥ii. terebinth. claræ ℥i. myrrh. aloes, an. ℥ii. sang. drac. bol. armen. an. ℥i. farin. violat. ℥iii. M. & utere, in fractura & dislocatione est singulare remedium. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 8. Observ. Chirurg.*

Ubi callus justæ magnitudinis generatus fuerit, medicamentis roborantibus confirmandus est. Ideo tale Emplastrum imponendum est.

℥. Ol. rosac. ℥ij. ceræ ℥i. resina pulverif. ℥iij. colophon. mastich. thuris an. ℥i. nuc. cupress. rad. erythrodan. i. e. rubiæ tinctor. an. ℥i. croci ℥i. M. F. ceratum quod super lineum vel alutam extendatur,

& applicetur. *Daniel Sennertus, præ. Etic. lib. 5. part. 5. cap. 1.*

## SECTIO VIGESIMA.

### Pro Fuci Vulnere.

Cum die quodam apud amicos commoraretur, unus ex iis in superiore labro à fucis vulneratur, statim intumuit vulnus, cum maximo patientis dolore: sine mora, muscas coneritas apposui, quo brevi dolor sedatus est, tumorque evanuit. *Iul. Caesar. Baricellus. Hortul. geniali.*

## SECTIO XXI.

### Pro Fungorum veneno.

Princeps quædam magni nominis, cum quodam die in prandio fungos comidisset, sub vespere dolore torminibusque maximis ventris, nec non cardialgia correpta fuit; mox quoque vomitus & fluxus ventris supervenerunt. Primo excrementa & fungos excrevit, mox quoque mucum qui intestinis adhæret, sanguinemque deiecit; leipothymia frequentes & virium prostratio aderant, & ita quidem, ut excrementa involuntariè simul & sudores frigidi profluerent. Medici etsi summam adhiberent diligentiam, morbus tamen medicamenta præcellere, eaque respuere videbatur: totam itaque noctem veluti in agone contrivit. Sequenti die, cum princeps (quem peregrè absentem illic acciverant) advenisset, protinus ad gr. 40. lapid. bezoar. or. in pollinem redacti ex vino albo propinavit, post semihoram sudor calidus & universalis supervenit, & intellectus rediit, mox somnum quoque repetiit, cujus beneficio vomitus simul & fluxus sanguinolentus cessarunt, & intra paucos dies integram valetudinem recuperavit. *Gnil. Fabrici. Hildanus. observ. 34. cent. 4.*

Plurimos Romæ fungorum esus interfecit: huic veneno remedium optimum proposuimus toties quoties opus fuit, semper cum victoria; videlicet oxymel cum theriaca: duplici modo Fungi noxii sunt.

aut



aut ob pravam qualitatem quam habent à sua natura, aut ob lentorem & crassitiem, seu viscositatem quandam, qua mediante maximopere lædunt: viscositas incisione, & prava qualitas indigit alexipharmaco: administrando theriacam cum oxymel. tam simplici quàm scyllitico, his indicationibus satisfacimus, ut pluries experimento comprobavimus. Nullus enim hoc remedio sumpto interiit, sed omnes, placente Deo, convaluerunt. *Dominicus Panarolus, observ. 45. Pentecost. 3.*

*Galenus* in tali casu utitur stercore gallinaceo, 10. Simpl. cap. 10. sic scribens. „ Porro cùm conspexissem illum in *Mysia* „ Medicum gallinaceo utentem stercore „ in iis, qui ab esu fungorum suffocabantur, & ipse quoque sum usus in quibusdam urbem inhabitantibus, qui & ipsi fungose sitarunt; ipsum videlicet ad lavorem contritum tribus quatuorve oxycrati aut oxymelitis inspergens cyathis, & palam adjuti sunt, idque celeriter. „ Nam qui præfocabantur, paulò post vomebant pituitosum humorem omnino crassissimum, & exinde planè liberati sunt symptomate. Est autem hoc sterces columbino minùs calidum. *Petrus Forestus, observatio 116. Schol. lib. 10.*

## SECTIO XII.

### De Furunculo.

**F**urunculus Δορῶν Græcis appellatus, tuberculum est acutum, cum inflam-

matione ac dolore; ovum columbinum magnitudine non excedens, oritur a sanguine crasso & vitioso: rarò solitarius erumpit, sed plerumque plures simul.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Furunculis in dorso.

**P**ost sanguinis missionem & purgationem, solo pane nigro frumentaceo cum butyro manso & valde pingui appposito, facilè ad suppurationem perveniunt; vel solo diachylo appposito, vel, ut alias expertus sum, beta vel caulibus butyro illitis apppositis erumpebant, & facilè sanabatur. Sed & hoc Cataplasma ad furunculos expertum est, & alia apostemata ex adustione sanguinis.

℞. Fol. malv. acetos. an. Mj. ficuum ping. numero vi. uvarum passerarum amottis arillis ʒj. bulliant, pistentur in mortario addendo fermentis acris ʒiſs. axung. porc. rec. sine sale q. s. F. Cataplasma. Dissipat etiam Furunculum ac concoquit triticum commansum & impositum, pingues item ficus dissectæ.

In eo nullum est periculum, etiamsi nulla adhibeatur curatio, maturescit enim per se atque erumpit; sed dolor efficit, ut potior medicina sit, qua maturius liberet. Proprium ejus medicamentum est Galbanum, vel resina, vel fermentum: expresso pure, nulla ulterius curatio necessaria est. *Petrus Forestus, observ. 9. & Schol. lib. 1. Observ. Chirurg.*



# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER SEPTIMUS.

*De Affectibus à littera G incipientibus.*

### SECTIO PRIMÆ.

*De Ganglio.*

**G**ΑΥΓΑΛΙΟΝ, tumor est præter naturam color, durus, renitens, & indolens, at si violenter premas, stuporis sensum exhibet: frequenter pellicula propria includitur, nonnunquam etiam ea omnino caret: circa partes membraneas, ossa, tendines, nervos, & articulos ut plurimum enascitur. Si extra has partes oriatur, quibusdam nodus appellatur. Pro causa agnoscitur, tum extensionem aut laborem nimium, à quibus nervus vel tendo nimis extenditur, vel etiam secundum membranam quasi rumpitur, hinc facile partis nervosæ nutrimentum exodat, & circa ejus substantiam adhærescit, & tandem a facultate partium earum formatrice in hanc substantiam mutatur: a lenta etiam & viscida pituita oriri volunt plerique.

#### SUBSECTIO PRIMÆ.

*Pro Ganglio in summa sinistra manu.*

**D**issolvi & dissipari debet tumor iis, quæ digerunt & resolvunt, sed videndum est ut ita tractetur, ne tenuiore parte extracta, quod reliquum est viscosum & crassum concreascit: quare necessarium est omnino, ut uno eodemque tempore applicentur tumori, quæ emolliant, incidunt, digerunt & resolvunt: in hunc usum applicarem sequens ceratum.

℞. Empl. oxycroc. ℥i. ammoniac. ping. bdellii, solutor. in aq. vitæ, an. ℥ii. rad. ireos ℥i. lumbric. vino lotor. & dissolut. numero iii. commixtis omnibus cum pauculo terebinth. & cera nova. F. ceratum extend. super alutam, applicetur tumori,

& fascia arctissime constringatur, huic cerato si lamina plumbea super ligetur, videtur mihi ex usu fore. *Avicenna* & secuti eum ante nos plerique plumbeam laminam simili aliquo emolliente & digerente medicamento illam imponebat: quod sane ego improbo: & quia humor viscosus est, difficilis resolutionis, membranis & tendonibus adnatus, arbitror maximopere profuturum si singulis quatuor, quinque, vel sex diebus soluta facia, ablato cerato, suffumigetur tumor suffitu acerrimi aceti, quod *Satureiam*, vel *Origanum*, vel quid simile incoxerit, affusis pyritidis, vel lapidum molarium frustis candentibus. Deinde absterfo sudore, & compresso, & frictionibus exercitato tumore, rursus ceratum imponatur. Mirum quantum commodum hoc præstet, & expeditum sit, id genus morbis remedium; attenuat, incidit, discutit, resolvit, partem roborat & firmat. Ex *Galeno*, bractea tenuis plumbi probe ganglio alligata planè ipsum dissipat. *Reinerus Solenander, consil. 24. sect. 1.*

Illustris Matrona quædam ganglion ad carpum jam annos aliquot habet, avellanæ magnitudine, indolens, quod proximis partui diebus sponte evanescit. Sensim decrescens leve aliquod sugillationis indicium in circuitu relinquit, quod & ipsum percutis poros omnino dissipatur, certissimo brevi instantis partus argumento, quod repetita experientia jam dudum advertit. Secunda a partu septimana, quod penitus abiisse jurares ganglion, in eodem quo antea fuit loco revertitur, sensim ad pristinam assurgens magnitudinem. Causam verò

statu.



statis vicibus sic sponte & abeuntis & redeuntis tumoris, quia nec a sanguine, nec a peculiari uteri cum carpo consensu derivare queo, a felicioribus naturæ mystis discere amo. *Thomas Bartholinus. Act. Medic. cap. 56. anni 1671. & 1672.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Ganglio in poplite utriusque cruris pugni magnitudine.*

**H**onesta quædam matrona aliquot annos in poplite in utroque crure tumorem gerebat, pugni magnitudine in uno, & altero paulo maiorem, concolorem, molestiam potius quam dolorem afferentem, flexionem tamen articuli illius, & sic incessionem aliquo modo impedientem: quem tumorem cum inspicerem, Ganglion esse judicavi. Plumbariis thermis, ut eos extirparet, aliisque remediis, sed sine fructu, usa fuerat. Ad fortiora transeundum esse docui, illique primum hunc forum præscripsi.

℞. Lixivii, urinæ, & vini an. pt. aq. adde ad mens. i. hujus liquoris, aq. vitæ ℥i. spirit. jubip. ℥i. cum spongia intincta fomententur tumores calide. Postea apponatur hoc emplastrum.

℞. Rad. bryon. irid. rec. an. ℥ss. bulbor. lilior. ℥ii. coq. in aceto fortiss. & contund. & pistentur: addendo ol. lilior. ℥ii. gummi ammoniac. in aq. vitæ solut. ℥iii. pulv. rad. ireos ℥ii. redigantur in formam emplastri vel cataplasmatidis; continuabat forum & emplastrum in dies, domum reversa spatium trium mensium, unde admodum immixti tumores, adeo ut licet aliquid adhuc appareret, tamen nullum ferè impedimentum amplius adferrent. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 703.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Ganglio.*

**J**uvenis quædam mulier Ganglion habebat in facie Cerasi magnitudine, infra oculum supra Zygoma, quod intra mensem discussum est, admota lamina plumbea hydrargyro illicita & emplastro in-

fixa, ut melius hæreret: eaque super Ganglion admota, una cum emplastro, splenium satis solidum superimponebam, deinde fascia alligabam quæ semiphalara a Galeno nominatur. *Samuel Formius, obs. 16.*

Mulier quædam ictum frontis passa est, quam tumor nullus subsecutus est, ante quindecimum diem, quo tumor obortus est magnitudine nucis juglandis, sed mobilis, nuncque dolebat, nunc mollescebat, nunc minuebatur, nunc augebatur, & sic per longum tempus cum maximo incommodo permanfit: curatus tandem fuit aq. vitæ cum rutæ succo mixtæ admotione, lintibusque arctè fronti appositis. *Petrus Boerellus, observ. 15. cent. 1.*

## SECTIO SECUNDA.

*De Gangrana.*

**G**angrana, (vulgò ignis *S. Antonii*) incipiens est partis corruptio ad *νεκροποιον* tendens, quæ cum jam eo processit, ut pars corruptione extincta & emortua sit, *σφαιηρος*, sîderatio nuncupatur: adeo ut duo hæc mala non nisi magnitudine differant: in Sphacelo enim pars omni sensu & vita destituitur, in Gangrana vero nondum adhuc adest perfecta partis corruptio: Causa utriusque est caloris nativi in parte destructio, quam infert frigus nimium, venenata qualitas, prohibita transpiratio, calor externus vehemens: alimenti & caloris influentis defectus.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Gangrana ex inflammatione.*

**P**ost præscriptam victus rationem, ad arcendam defluxionem, pro primo scopo Chirurgus applicet loco affecto defensivum sequens.

℞. Farin. hord. ℥vi. bol. armen. alb. ℥ii. pulv. gall. virid. nuc. cupress. cortic. granat. an. ℥ss. camphor. ℥i. cum oxymel. F. cataplasma. Hoc mihi usitarum est: oleosa enim omnia suspecta sunt in Gangrana, poros quippe obstruendo transpirationem inhibent, & vapores putridos in parte affecta



Ita retinent: cessante defluxione possunt defensiva intermitteri, ut innatum calidum minore negotio penetrare queat in partem affectam. Secundus scopus est alio revellere & derivare humores in partem affectam affluentes, idque quam citissime, adhibitis purgationibus, phlebotomia, cucurbitulis, hirudinibus, aliisque id genus remediis: Tertius scopus est, ut pars in pristinum ac naturalem statum restituatur; id fiet evacuato accuratè sanguinis, & cæteris humoribus parti affectæ impactis, ac in ea conclusis, itaque quamprimùm prospiciendum est quid facto opus sit, & scalpelli acie tentandum, sitne Gangræna profundior, an superficialia: tum pro diversitatis ratione, scarificationes levius aut altius imprimendæ: dein satis magna sanguinis quantitas sinenda effluere: quin etiam si quæ sit in parte affecta grandior insigniorque vena: ea audacter & sine mora incidenda, sic enim sanguis & humores exonerantur, pars affecta refrigeratur, & aperitur pororum obstructio: id tamen nequaquam aggrediendum nisi morbus gravissimus, & æger juvenis, & vires firmæ fuerint: nervos autem maiores, tendines & arterias nefas attingere, nisi maxima & insignis adfuerit corruptio; alioquin metuendum a convulsione, motus deperditione, doloribus acutissimis, sanguinis profluvio, & spirituum vitalium resolutione, Syncope, imò & morte. Præter scarificationes *Avic.* & alii Scriptores iubent apponere hirudines, pro plus depleatur sanguinis & humorum: id quod & ipse soleo facere, quoties potissimum sanguis parvus educitur scarificatione: evacuato sanguine, abluenda pars aceto & sale marino simul liquatis, hæc enim putrefactioni plurimùm repugnant: at si profundior fuerit gangræna, efficacior adhibenda lotio, qualis est ea quæ sequitur.

℞. Lixiv. fortiss. aceti opt. an. ℞iij. scordii, utriusque absinth. rutæ, lupinor. contrus. an. M. ℞. rad. aristol. rot. vincetoxic. an. ℞ss. samarin. ℞iv. coq. ad consumptionem tertiæ partis: in colat. dissolv. aloes, myrrhæ, an. ℞ss. aq. vitæ ℞ii. camphor. ℞ss. quoties remedia permutare necesse fuerit, lavare oportebit partem fotu illo tepido: nam præterquam quod plurimum resi-

stet putredini; etiam revocet innatum calidum, resolvit & exsiccat corruptos humores inibi conclusos Insuper toti parti affectæ scarificatæ imponendum unguentum *Ægyptiacum Mesues.*

Quod si corruptio major est, soleo idem unguentum sic componere.

℞. Ærugin. ℞iv. mell. opt. & cum decoct. absinth. & scord. despumat. ℞xvi. aceti sciilit. ℞vi. alumin. roch. sal. armoniac. an. ℞j. succ. rutæ, scordii utriusque & alliariæ, an. ℞iii. coq. ad spissitudinem mellis. Deinde admisce theriac. opt. mithridat. an. ℞ss. camphor. (plurimum enim penetrat & putredinem inhibet) ℞i. Sic præparatum unguentum solum resistit putrefactioni, sed & temperat ac minuit vaporum malignitatem, qui perpetuò attolluntur à parte obsessa gangræna, & lædunt principes: breviter *Ægyptiacum* præstantissimum & primarium est in gangræna remediis, separatque mortuam carnem à viva & laudabili gignense scharam: ubi tota pars *Ægyptiaco* contexta fuerit, insuper applicandum cataplasma sequens, quod & ipsum resistit putredini exsiccat humores excrementitios doloresque sedat.

℞. Farin. lupin. lentium, fabarum, lolii, sal. marin. an. ℞iii. pulv. summit. absinth. scord. utriusque, alliar. rutæ, an. ℞j. coq. in oxymel. simpl. & F. Cataplasma; refrigerato adde aloes, myrrh. an. ℞i. aq. vitæ ℞iii. M. prædictæ autem farinæ imprimis lupinor. mirum in modum in Gangræna aliisque putridis ulceribus conveniunt. Exsiccant enim, discutunt, & putredini resistunt. In præparatione autem diligenter prospiciendum est, ne diu farinæ hæc cum reliquis pulveribus coquantur: fieret enim nimis viscosum & glutinosum, ac proinde inutile cataplasma.

Hæc autem remedia omnia, ablutio cataplasma, &c. tepidè sunt admoventia, linteisque præterea calidis obvolvenda pars affecta, etiam si Gangræna orta sit ex inflammatione. Sic enim pene extinctum & intermortuum innatum calidum revocatur, & quasi rursus accenditur in parte affecta.

Chirurgus quoties ad ægrum accedet, his remediis excitatæ scharæ summam partem



tem tollere conabitur, aut scalpelli acie incidet, usque ad partem sanam, quo detur medicamento penetrandi via, ad corrigendum quicquid depravatum & corruptum est: nec alia procedat methodo donec videat morbum superatum & evictum: id verò ex eo deprehendet, quod malum non latius serpet, & circa ipsum apparebit circulus exactè rubens & exquisiti sensus: separationem enim carnis mortuæ à viva nature & medicamentorum beneficio fieri indicat. Corrigitur etiam corruptio & caro emortua cauterio actuali nempe ferro ignito, quod uti supremum remedium, ita quoque maximum putatur: quapropter in curatione Gangrænæ & Sphaceli, potentiâ ab authoribus classicis dignitate & præstantia præponitur. Eschara his remediis facta, curandum quamprimum ut excidat. Ad id utile est unguentum sequens, itemque ad ulcus abstergendum & mundificandum.

℞. Farin. ervi. rad. aristol. rot. irid. flor. vincetoxic. angelic. an. ℥ss. theriac. ℥ii. cum f. q. mell. rosat. F. unguentum.

Mundificativum nostrum de succo apii, ad mundificanda & incarnanda Gangrænæ ulcera, aliaque sordida & maligna sic præparatur.

℞. Succ. apii, scord. arnogloss. maj. rutæ, an. ℥iv. mell. rosat. ℥vj. coq. ad consistentiam Syrupi: tum admisce farin. lupin. pulv. rad. aristol. rot. angelic. vincetoxic. theriac. an. ℥ss. aq. vitæ ℥j. M. F. unguentum; quod servetur in vase vitreo.

Si Gangræna in Sphacelum desinat, unica curandi ratio erit, ut pars sincera & sana conservetur, defensivis applicatis, ne mortificatio altius serpat, & extirpetur omne illud quod corruptum est. Amputatio membri fieri debet in parte sana, cum fatius sit sincerum aliquid rescare, quàm emortuum quidpiam relinquere. *Guil. Fabrit. Hildan. lib. De Gangræna & Sphacelo.*

Quidam ante membrorum amputationem semper exhibens Philonium Persicum metu hæmorrhagiæ, ad retinendum sanguinem, & cum successu quidem: verum Philonium unico tantum die naturali valere notum est, quotidie ergò illud assumendum foret, cum magno corporis detrimento. Satiùs verò, est. ex *Hippocratis*

sententia, tertio, vel quarto die venam secare. *Philippus Salmuthus, observ. 80. cent. 1.*

Si proveniat ex frigiditate ego utor hoc medicamento optimo & divino quo plures sanavi.

℞. Rapum unum domesticum, unam satis crassam radicem raphani: optimè deradantur, cum verò sunt derafa.

℞. Pulv. sem. sinapi, ℥j. cariophyll. ℥iii. ol. sem. lini. ol. nuc. jugland. vetust. an. q. s. M. in mortario, & F. Emplastrum, & calidum superponatur, aut tepidum, & optimum est. *Gabriel Fallopius, lib. De Tumoribus, cap. 26.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Gangrænæ pedum.

**S**tatim supra pedes imponere oportet quæ calefaciunt actu & potentia nisi putredo solidas partes occupaverit. Emplastrum tale est.

℞. Radicem unam raphani hortens. & aliam rapi: terantur in mortario, ad Sinapi ℥j. pulv. cariophyll. ℥iii. ol. sem. lini & jugland. veter. an. q. s. F. Emplastr. quod calidum applicetur pedibus per unum diem, in loco calido jaceat. Hoc emplastro solent curari liquorum pedes in triremibus per hyemem siderantur à frigore, & qui iter hyeme per loca frigida conficiunt. Sed si magna sit putredo, usque ad partes internas se extendens, illicò scarificanda loca altis & profundis sectionibus, & procurandum sanguinem defluere, qui in partibus putruit, deinde, quæ valde siccæ sunt apponenda, & lavandæ partes aqua falsa, in qua Ægyptiacum dissolutum fuerit: bene calida sit lotio, & idem unguentum postea apponatur. Si hæc non juverint, abscindantur partes. *Rodericus à Fonseca. tom. 2. consult. 11.*

Vir quidam Nobilis Gangrænâ patiebatur in tibia, quæ eò processerat, ut Medici & Chirurghi partem amputare decreverint, quod cum ad sequentem diem distulissent, post eorum discessum, adductus fuit Empiricus, qui Gangrænæ curationem pollicitus est, & cum æger se illi commisisset, per totam noctem partem



affectam fovit aqua in qua Calx & Creta alba decocta fuerant, & manè Gangrana apparuit protinus ablata. *Samuel Formius, observ. 24.*

Vir quidam è plebe febre continua laborans, ab imperito Chirurgo vena aperta, incidit in tumorem illius brachii cum inflammatione, quæ tandem in gangranam desit, ita ut totum brachium livescens appareret. At in duobus lotis color magis immutatus erat, in iisque scarificationes non sentiebat. Igitur post multas scarificationes admovebantur remedia, quæ parùm proficiebant; imò brachium in deterius vergebat. Ego tandem vocatus locos scarificatos humectari jubeo spiritu sulphuris, quo caro mortificata exusta est, ac veluti cauterizata. Postea foveri jubeo totum brachium calidè spiritu vini, in quo pulveres aloes & myrrhæ infundebantur. Postea inspergebantur toti brachio pulveres prædicti ex aloes & myrrha, magna quantitate, ac deinde supra pulveres admovebantur lintea spiritu vini madefacta. Quo remedio per aliquot horas, usurpato, brachium, miraculi instar, nativum colorem recepit, tumore imminuto; & gangrana fuit cohibita, ita ut sequenti die loca mortificata & exusta à viva carne separari cœperunt; quibus admotum fuit digestivum ex vitellis ovorum, terebinthina & melle, ac post integram separationem epuloticis curatio absoluta est, *Lazarus Riverius, observ. 84. cent. 1.*

### SECTIO TERTIA.

#### *Pro Genu tumido.*

**B**lemmum totum tumorem immensum mollem & laxum mulier quædam rustica in genu habebat, qui quo minus rectè stare vel incedere posset, admodum illam impediēbat. Sequenti remedio brevi sanata est.

24. Radices brionia recentēs & irid. in taleolas sectas unā cum bulbis lilior. & narcissi vulgaris pratorum, incid. & contrund. & in vino addita etiam aqua vitæ coq. ut fiat cataplasma, cujus portio calidè cum panno lineo in dies tumori imponatur, detersa semper prius remanentia

quæ siccata tumori adhæret. *Felix Plateus, observ. lib. 3. pag. 704.*

Mulier triginta annos nata ab octo mensibus tumorem patiebatur partem femotis inferiorem occupantem & ipsum genu, nulus rubor aderat, sed dolor eam infestabat, ut claudicare cogeretur. Multis remediis solventibus adhibitis, tumor in eodem statu permanebat, tandem in duobus locis, parte scilicet interna & externa elevatio satis insignis apparuit, eaque circumscripta cum mollitie & fluctuatione, ita ut purulentam materiam adesse omnes existimarent, admotum est causticum potentiale parti magis tumenti, quæ erat exterior, postmodum scalpello incisa eschara, & aperto tumore, flatus quidam emanavit, & nihil aliud. Simile exemplum habetur apud *Zacutum Lusitanum, lib. 2. prax. admirand. observat. 163.* ubi docet ex *Gal. & Avic.* hujusmodi tumores in genu sæpe à Medicis aperiri; pus intus latere existimantibus, & nihil aliud tamen quàm flatuosum spiritum egredi. *Lazarus Riverius, observ. 13. cent. 3.*

Auriga quidam genu inflatum durum ac scirrhum habebat, post febrem chronicam, non tamen sine dolore: qui cum per tres menses incedere non posset, variisque usus esset remediis; tandem appositum est furfur minutissimè contritum & cribratum, cum melle linimenti instar, quo non solum dolor (qui diu hominem afflixerat & consumpserat) remissus est, verum etiam sedatus est, & paulatim durities evanuit, & deinde ambulare potuit, & paucis diebus ad pristinam sanitatem restitutus est. Cataplasma ex furfure utile est ad tophos & scirrhus in quacunque corporis parte fuerint.

Mercator quidam cum per totum crus ab ipsa coxa doleret, nec ullis remediis dolor sedari posset, tandem nescio quis eidem consuluerat, ut radices morsus Diaboli contunderet succumque exprimerent) qui olei instar mucilaginosus est) ac eo crus totum inungeret, quo facto brevi ab omni dolore liberatus est. *Petrus Forestus, observ. 28. lib. 29. De Arthritide, &c.*



## SECTIO QUARTA.

*Pro Gibboſo.*

**G**ibboſo cuidam Puero Nobili, cui ſpina dorſi extrorſum admodum extuberabat, thoracem ferreum qualem armati ferre ſolent, ex tenuiſſimis laminis fabricatum, atque intus foriſque ne nimium illum premeret, pannis ſuffultum, indutum ut geſtaret docui, quo facto, cum eum integri anni ſpatio, dies nocteſque geſtaſſet, eiſque ſic aſſueviſſet ut non magnam inde ſentiret moleſtiam, ſenſim preſſa illa curvatura, ſpina rectitudinem iterum ſuam naturalem eſt adepta, poſteaſque ſemper recto corpore incedens, procerus admodum eſt factus. *Felix Platerus, obſerv. lib. I. pag. 164.*

Puellula quædam octodecim menſium excreſcentia vertebrarum dorſi laborare cœpit. Ad eam vocatus, tertiam & quartam vertebras lumborum extuberantes inveni ad ovi Anatis magnitudinem, quas ſecunda & quinta nonnihil ſequebantur, ita ut in maximum gibbum excreverit ſpina, præcipuè verſus ſiniſtrum latus, quapropter ſiniſtrum crus dextro longè imbecillius fuit. In curatione ſequenti modo proceſſi.

Primò dorſum totumque crus ſequenti aqua ad nervos corroborandos inunxi.

℞. Aquæ gran. juniperi ſine vino deſtillat. aquæ ſalviæ, betonicæ, lavendulæ, ana ℥ij. pulveris radicis, biſtortæ, tormentillæ roſarum an. ℥ii. M. fiatque infuſio in ampulla magna per dies octo vel decem. Dein per inclinationem à pulveribus ſeparata aqua ad uſum reſervetur. Poſt inunctionem, ſequens Emplaſtr. quo etiam in fracturis oſſium utor, applicui.

℞. Emplaſtr. Slotani ℥v. ceræ novæ ℥ii. lapidis oſteocoll. ℥i. pulveris radicis conſolid. maioris, terræ ſigill. an. ℥iii. pulveris balaiſt. nucis cupreſſi, roſarum odoriferarum an. ℥i. miſceantur lentiſſimo igne, fiatque emplaſtrum: addendo ol. roſac. aut maſtich. quantum ſatis, totum autem præcipuumque artifiſcium in curatione gibbi, in hoc conſiſtit, ut extuberantia vertebrarum reprimatur retrorſum, alioquin omnia fruſtra tentantur. In

hunc itaque ſinem laminam ferream, aliâ quantum incurvatam, & eiſ quidem longitudinis & latitudinis, ut totum gibbum cooperiret, in thoracem ex reduplicata tela ita adaptavi ut exturberantes vertebras reprimere poſſet. Laminam tamen carbaſo obtexi, ut puellæ minùs eſſet moleſta, thorax nudo corpori induatur, & ita quidem adaptandus, eſt ut totum ventrem ad muliebria uſque comprehendat: Per medium ventrem ligula oblonga conſtringatur: circa pectus quidem mediocriter, ne metaphrænum & coſtæ conſtringantur; poſt coſtas verò mendoſas, uſque ad imum ventris arctiſſimè, quo lamina ferrea extuberantes vertebras reprimere poſſit. Ne autem thorax à ſcapulis ſarſum trahatur, faſcie duæ tranſverſum digitum latæ, in utroque inguine annectendæ erunt thoraci, quæ descendentes perinæum, iterumque aſcendentes ſubter nates, in utroque latere thoraci ligulis annectendæ. Emplaſtrum autem & inunctiones de quarto in quartum, aut etiam de ſexto in ſextum diem renovavi, coxam vero totumque crus ſingulis diebus, præſcripta aqua inungere iuſi, ſic divino favore, intra menſes ſex, gibbus depreſſus fuit, thoracem verò, laminamque propter imbecillitatem & mollitiem membrorum in ſecundum uſque annum geſtavit. Nunc cum annum ætatis tertium attingit, quam belle ſe habet. *Guilelmus Fabricius Hildanus, obſerv. 165. cent. 5.*

## SECTIO QUINTA.

*Pro Gingivis excreſcentibus.*

**F**oelici ſucceſſu ſal. prunellæ aut ſpiritus ſalis natri, ut & ſalis communis, cum penicillo aut goſſipio, gingivarum carni luxurianti attricatur, quæ niſi iuvent oleo vitrioli ſolo vel milto leviter madefaciendæ. *Felix Platerus, prætic. tom. 3. pag. 350.*

Commendatur hic peculiariter aquilegia, & unguentum ex aquilegia paratum in hoc malo utile eſt. Imprimis verò efficax eſſe ſequens linimentum, multo uſu compertum eſt.

℞. Pulv. fol. aquileg. ſalv. menth. criſp. hunc



## SECTIO SEPTIMA.

## De Gonagra.

**G**onagra Arthritidis species est in genu consistens. Vid. supra, lib. I. sect. 40.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Gonagra.

**G**enu dolenti hoc Cataplasma valde profuit.

℥. Medull. panis sibi. coq. in lacte, add. farin. sem. pap. nigr. ℥i. sem. psyll ℥β. lini ℥i. olei chamæm. ranar. an. ℥ij. croci ℥j. curatus sic fuit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 496.*

Mulieri Gonagra laboranti, ut aquam hanc, qua genu tantopere dolens inungeret, præscripsi.

℥. Aq. vitæ compos. ex speciebus calidis, herbis capital. aromatibus & castor. paratæ ℥iβ. aq. vitæ simpl. ℥iii. opii dissolut. in aq. vitæ ℥i. croci, styrac. liquid. an. ℥j. ea aliquoties usa, tantum levaminis sensit, ut quiete fruens, nullo se usam remedio, quod citius & rectius quàm hoc dolorem sustulisset, prædicaret. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 498.*

Innumeris ferè experimentis comprobatum est, radicem Sigilli beatæ *Maria* probè contusam & admotam genuum tumoribus & doloribus mirè conferre, præcipuè Gonagricis, idque à Chirurgo quodam *Nemausensi* accepi, verumque esse comprobavi. Sed in podagricis primò corpus evacuandum est jalapio, & tandem causa conjuncta hoc topico tolletur. *Petrus Borellus, observ. 10. cent. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Gonagra.

**P**ropinavi duabus horis ante cibum pro evocando sudore, de sequenti hydrotico poculum, unde modicè sudavit.

℥. Limatur. guajac. ℥iii. farsæparill. ℥ij. rad. chin. ℥j. radic. enulæ, ℥β. fol. chamæpit. Mi. flor. rosmarini salv. betonic. an. p. j. passul. enucleat. ℥β. sem. anis. ℥iβ. co in q,

nuc. mosch. an. ℥β. (nonnulli etiam rutæ & myrrh. tantundem addunt) alumin. ust. ℥j. mell. puriss. ℥iv. vel q. s. mel leni igne despumetur, despumato & calenti pulveres inspergantur. F. linimentum, quo gingivæ inungantur. Vel,

℥. Mell. optim. ℥ij. aceti vini ℥j. flor. æris ℥j. alum. ℥i. bulliant donec rubefiant; adde pulveris Sabinæ, nucis moschatae an. ℥β. C. C. præp. ℥β. F. linimentum. *Daniel Sennertus Practica lib. 2. part. 1. cap. 16.*

## SECTIO SEXTA.

## De Glaucmate.

**Γ**λαυκμα (à γλαυκός cæsius) est crystallini aut vitrei, aut etiam aquei humoris in glaucum ceu cæsius colorem mutatio. Oritur vel ab humore viridi humoribus oculi commisto, eorumque alborem seu pelluciditatem nonnihil opacante, vel ex certa lucidi & opaci proportionem quæ nobis ignota est. Humoribus exsiccatio & condensatio hunc affectum producere nequit. In glaucmate incipiente uti & in suffusione per fumum, aut per nebulam ægri se videre arbitrantur. Cum confirmatum est malum, visum omnino tollit. Si ab alieno humore affuso oriatur, curari poterit, alias insanabile est.

## SUBSECTIO VNICA.

## Pro Glaucmate.

**F**iat ablutio ex *Scribonio Largo* tum aq. marina; vel aq. salita, vel cum aq. stillatitia ex mica panis actu calente, aspersa pulvere Euphrasie, chelidon. sem. scenic. rutæ, tutiæ præpar. bol. armen. & salis atque madefacta succo rutæ, facta maceratione per viginti quatuor horas. Fiat præterea instillatio ex felle piscium mixto cum aquis sceniculi vel chelidon. inter cetera tamen valet fel perdicis, cum croco, thure, & rosâ in vino, huc referenda aqua ardens (vitæ) cum decocto gallarum, ve gutta una aut altera olei chalcantaris cum aqua malvæ. *Iul. Cesar. Claudinus, cons. 74.*



in mensur. iij. aq. font. limpidiss. ad casum medietatis. Colatura adulectetur sacch. & julep. Cinamom. an. q. s. ad gratiam.

℞. Ol. laurin. lumbric. terræ, an. ℥j. ol. vulpin. ursin. an. ℥i. adipis human. ℥i. ol. salv. rusmar. an. ℥ss. Cera q. s. F. linimentum pro regione dolente.

℞. Aq. vitæ destillat. è spec. arom. & herbis capital. & castor. ℥iij. aq. vitæ simpl. ℥ij. spirit. junip. ℥j. aq. salv. roris marin. an. ℥ij. ol. sal. succini. an. gutt. iij. ol. spic. gutt. iij. croci, styrac. liquid. opii thebaic. aq. vitæ solut. an. ℥i. F. aq. anodyna & arthritica pro fotu partium dolentium ante unctionem.

Quod si ranæ aliquot vivæ cum oleo oliv. communi vel oleo lumbricorum, vel butyro recenti decoquerentur eoque caldè foverentur articuli, præstans quidem id foret.

Pro humoribus electivè evacuandis in usu sint pil. sequentes, de quibus singulo mense cap. ℥ss.

℞. Hermodactyl. veror. excotic. ℥ii. turbit. gummos. ℥i. agaric. troch. mechoac. alb. an. ℥ii. rheiel. ℥i. diagrid. præpar. ℥i. euphorbii ℥i. rad. aristol. rot. chamæpit. an. ℥i. flor. stœchad. herb. paralyf. an. ℥i. spic. incid. zinzib. alb. an. ℥i. cum succo chamæpit. F. pil. ulæ parvæ. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 7. cap. 1. & observ. 1. cap. 2. lib. 6.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Gonorrhœa.

**G**onorrhœa (à γονη genitura & ροη fluo) est invita & nimia seminis proflusio citra venerem, aut colistentiginem, quam efficit tum spermaticarum partium imbecilla retentio ob intemperiem humidam & frigidam: tum etiâ seminis ipsius vitium quando vel copiosum nimis est, ex Veneris intermissione, & ciborum benè nutrientium nimio usu, vel rursus acre est & calidum excretricem stimulans, vel denique crudum, aquosum & tenue retentricem primariò lædens. Gonorrhœa alia est benigna, quam hætenus descripsimus, alia virulenta Luis Veneræ soboles, cuius indicium est, quod principio virus al-

*Burnet Parte 1.*

bus aut subcitrinum è vasis spermaticis sine sensu excidit, vigilantibus pariter & dormientibus, quod tempore putret & acrimoniam adsciscit, dutum penis in transitu exedit & exulcerat: unde dolor exoritur qui intingine quasi funem peni subtendit, & in emictione tanquam in dysuria acius stimulat: oritur à spermaticorum vasorum & testium imbecillitate ex venenata lue contracta, quæ efficit, ut quicquid in his vasis colligitur, in fœdum virus faceat, quod dein contagione alium quemvis contaminat.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Gonorrhœa.

**P**ræhabitis purgationibus accommodatissimum atque efficacissimum remedium erit quod sequitur.

℞. Menth. sic. ℥iij. sem. lactuc. ℥ij. sem. rutæ, viticis, rad. ireos, an. ℥j. sacch. albiss. ℥j. M. simul inque tenuissimum pulverem redigantur, cujus ℥i. cum aq. plantag. tribus ante prandium horis per aliquot dies offeratur. *Iohannes Zecchius, cons. 16.*

Mulier quædam cum Gonorrhœa laboraret, hoc uno decocto, à profluvio seminis, & urinæ ardore, post universalia remedia adhibito, ex incontinenti per me curata fuit.

℞. Liquirit. ℥vi. sem. myrtillor. coriandr. præpar. plantag. agn. cast. an. ℥j. sem. papav. alb. ℥ij. sem. hyoscyam. ℥ss. hord. mund. M. j. acaciæ, sumac. an. ℥j. semina contund. crasso modo & bulliant omnia in aq. chalibeata pro ℥ss. colat. addetroch. alkikeng. ℥j. M. Sumebat cyathum bis in die neque aliis medicamentis opus habuit.

*Benedictus Faventinus*, Præceptor meus hoc in simili casu magno cum successu & experientia utebatur. Si & Gonorrhœæ adesset dolor & ardor, dabat tepidè septem diebus lactis ovilli ℥iij. aq. plantag. vel succi ejus ℥j. boli armen. ℥j. M. *Petrus Forestus, observ. 15. lib. 26. De Penis Viriis.*

*D. Bontius* in Gonorrhœa, ut *Ioh. Heurnius* inter secretiora remedia sua annotavit, usus fuit his Pilulis.

V

℞. Sem.



Sem. lactuc. papav. an. ℥iij. rad. nymphaeae ℥iij. ros. rub. ℥j. corall. rub. ℥ij. camphorae ℥ss. sem. agn. cast. ℥j. cum mucagine tragacanth. F. massa ex ℥j. fiant Pilulae viij. *In Notis ad cap. 13. lib. 6. Pathologiae Job. Fernelii.*

## SUBSECTIO SECVNDA.

### Pro Gonorrhœa.

**V**ir quidam Gonorrhœa antiqua laborans, à me consilium petiit: cui primum præscripsi purgationem ex Mercurii dulcis ℥i. cum pil. coch. min. eadem quantitate, & sequenti die venæsectionem. Deinde bolum ex rhabarb. pulv. ℥j. cum terebinth. ℥iij. quem continuavit per quinque dies, eoque purgabatur ter aut quater in die: iterum sumpsit Pilul. Mercuriales, prædictum bolum per alios quinque dies: ac tandem aquam sequentem per octo dies.

℥j. Menth. sicca. ℥iij. sem. lactuc. rut. agn. cast. an. ℥iij. ireos flor. ℥ij. dictam cretic. ℥x. sacch. albi. ℥iij. omnia pulverentur addendo terebinth. venet. ℥v. vini albi generosi ℥xxx. F. destillatio in balneo Manipoli capiat cochlearia duo manè duabus horis ante cibum. His remediis a contumaci illo affectu liberatus est. *Lazarus Riverius, observ. 25. cent. 1.*

Juris quidam utriusque Doctor Gonorrhœa laborans, a me consilium petiit: illi bolum præscripsi ex rheo & terebint. per quinque dies sumendum: & cum nondum fluxus cessaret, postea usus est aqua ad Gonorrhœam *Quecetani* in illius Pharmacopœa descripta: prima exhibitione omnino sublatus est fluxus, & ideo per tres aut quatuor dies tantum illis usum continuavit, neque amplius rediit affectus. *Lazarus Riverius; observ. 36. cent. 1.*

Vir quadraginta annorum ex impuro concubitu Gonorrhœam contraxit, cui ab initio præscripsi bolum ex cassiæ ℥j. rhei pulv. & crystall. tartar. an. ℥i. Sequenti die volebam sanguinem mittere ex pede, quod ipse æger renuit. Emulsionem præscriptam sunt ad tres aut quatuor dies quibus urinæ acrimonia tempe-

rata est fluxu eodem modo perseverante. Postmodum ptisana laxante usus est per septem dies continuos, in hunc modum præscripta.

℥j. Tamarind. ℥ij. aq. fontis ℔iv. coq. ad ℔iij. in colat. infund. frigide per noctem sen. mund. sem. coriand. liquirit. & ros. rub. an. ℥ij. capiat cyathum unum manè hora una ante pastum. Hoc remedio fluxus valde imminutus est, ad quem omnino delendum bolum sequentem præscripsi.

℥j. Terebinth. venet. ℥iij. rhei pulv. ℥j. F. bolus quem capiat manè per quinque dies: deinde aqua superius descripta usus est per septem dies. Hoc modo Gonorrhœa curata est; quia tamen exigua quædam humiditas in extremitates glandis frequenter apparebat, ut in fine hujus morbi plerumque fieri consuevit: ad eam prorsus cohibendam & exsiccandam sequentes pilulae præscriptæ sunt.

℥j. Gummi arabic. tragacant. carab. mummia, bol. armen. an. ℥i. pulverentur, cum syrup. de rosis sicca. F. pilul. massa de qua capiat ℥j. singulis diebus manè, duabus horis ante pastum per octo vel novem dies, & ita fluxus omnino cohibitus est. *Lazarus Riverius, observ. 74. cent. 2.*

Conserva fructus brusci à ℥ii. ad. ℥ss. per aliquot dies exhibita Gonorrhœas multas curavi.

Idem præstat aqua ejusdem fructus destillat. *Samuel Formius, observ. 47.*

In Gonorrhœa commendatur pulvis sequens.

℥j. Fol. menth. mummia, corall. rub. agn. casti, carabes, an. ℥i. M. F. Pulvis: de quo accipiat eger aliquid manè jejuno ventriculo cum ovo tremulo. Vehementius sistit profluvium feminis pulveris ossis Sepiæ ℥j. cum conservæ ros. ℥ii. bis vel ter sumptus. Excellentissimum est Magisterium ejusdem cum conserva ros. antiqua à gr. vi. ad. ℥ss. sumptum. Tinctura etiam coll. mirabil. prodest.

In Gonorrhœa virulenta interdum inflammantur testes cum maximo tumore: in eo casu præstantissimum remedium est Cataplasma ex foliis rute & ebulli aceto coctum, & applicatum. *Joh. Hartmannus, Practic. Chimiatri. pag. 265.*

Quia



Quia sentiebat maligna ulcera ex scabie in pudendo, hanc ei aquam præscripsimus.

℞. Sacchar. albi ss. ℥ i. alum. roch. ℥ ss. sal. com. ℥ iij. Ponantur in alembico & destillentur s. a. Hæc aqua ulcus sanavit, malignitatem abstergendo Utor etiam hac aqua ad dealbandos dentes, ubi scabie Gallica denigrati sunt, & ulcuscula in gingivis apparent. Quidam oleo sulphuris utuntur: sed hæc aqua est longè præstantior, & est arcana apud Medicos, nec libenter communicant. *Ioh. Schroterus aqua Ioh. Philippum Brendelium. Consil. 96.*

## SECTIO NONA.

### De Graviditate falsa.

**V**Idua quædam postquam maritus peste sublatus fuisset, indicia conceptionis sensit, menstruorum nimirum primum suppressionem, mox ventris tumorem & mammillarum incrementum, tandem etiam commotionem in interioribus ventris quam illa, quæ prius sexies pepererat, non ab alio quàm ex fœtus commotione fieri, certò sibi persuadebat ita ut exacto decimo à mariti obitu mense, parui se accingeret, & nihil aliud quàm pariendi tempus expectaret: verùm cum etiam undecimus, & duodecimus quoque à mariti decessu mensis præterisset, omnesque eam gravidam ut & ipsa quoque se esse pro certo haberent, ceperunt multi de ipsa, ac si aliud interea fortè commisisset, malè suspicari: alii verò qui eam probam esse mulierem sciebant, de conceptu dubitare: quibus sic se habentibus, illa exacto, mense duodecimo, mensim sensibus rursus fluentibus, subsidente & evanescente paulatim ventris mole, & mammillarum tumore, ad pristinam rediit integritatem, nec molam, nec aliud quidquam nisi purum sanguinem profudit.

Aliis quæ se uterum gestare putabant, idem evenire vidi quibus cum venter intumisset, citra alium affectum, tempore partus præterito, vel etiam tardius superveniente mensium fluore, demum se deceptas cognoverunt: Sicuti Marchionis cuiusdam conjugis, de qua an gravidat esset, non

solum ipsa, sed & Medici, eoque cum illis dubitabamus, idem contigisse meminimus. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 658. & 659.*

## SECTIO DECIMA.

### Pro Gula dolore ab officulo illic hærente.

**S**Criba quidam cum in artocreate pullos columbinos, contractis ut solent, prius ipsorum ossibus coctos comedens, officulum simul ex parte deglutivisset, illic ubi abruptum fuit, acutum, œsophago infixum hæsit, unde tantus dolor subortus, ut miserè cruciaretur, mox secuta inflammatione & tumore, qui etiam foris in collo apparebat. Cum variis instrumentis illud eximere Chirurgus studeret apprehendere, tamen cum non esset conspicuum, minimè potuit, deorsum propellere longè minus cum tunc dolor admodum exacerbaretur: vocatus jussi eum iusculis & lacte nutrire, crassiora enim deglutire minimè poterat, tumori extrinsecus, cum mollis esset Cataplasma maturans apposui, quo exactis diebus aliquot, maturari & in abscessum converti cœpit, quo aperto, unà cum pure officulum quoque prodiit & exemptum est. Postea sanato ulcere, nihil mali amplius passus est. *Felix Platerus observ. lib. 2. pag. 413.*

## SECTIO UNDECIMA.

### Pro Gummatis & doloribus Gallicis.

**Q**uidam ad Gummata & Dolores hanc Potionem instituunt.

℞. Rad. lig. Sancti ( dummodo æger sit pituitosus ) ℔ j. aq. ℥ x i i i i. persistat in infusione per diem deinde bulliat ad consumptionem ℔ v. tunc adde polipod. ℥ i j. cichor. Mi. aloes succotrin. ℥ i j. bulliant rursus per horam, postea adde fol. sen. epithymi, an. ℥ ss. colocynth. ℥ v i. sacchar. ℥ v i i i. demum bulliant quoad reneant. ℔ v i i. colentur: adde moschi gr. ij. Sumat hanc Potionem matutine & vespere ad sudandum, per viginti dies. Hoc est Secretum aquæ quosdam eximium certè pro Gummatis & Doloribus Gallicis. Sena à proprietate, morbum Gallicum op-



pugnat. *Rodericus à Fonseca*, to. 2. conf. 61.

## SECTIO DUODECIMA.

### De Gutta Rosacea.

**G**utta Rosacea, rubedo est Faciei maculosa, seu potius rubor cum tuberculis, quibus tota facies defœdantur, ac si guttis roseis conspersa esset, cognoscitur visu. Ortum dat sanguis crassus & fervidus, ad faciem delatus. Hoc malum sæpe contrahunt, qui poculis & ebrietati nimium dediti sunt: quibusdam vitio naturæ obtingit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### De Gutta Rosacea.

24. **L**ithargyr. auri 3j. Ceruss. 3ij. Axung. anser. & gallin. an. 3ß. argenti vivi cum saliva extincti 3ii. F. unguentum, cum quo fero inungatur facies, & manè lavetur cum aq. furfuris. Item pinæ nuces recentes pistæ cum crema lactis in modum unguenti cocant, quo inungatur Gutta rosacea. Mirabile habetur. Vel

24. Lithargyr. bene triti & pulveris. lbj. aceti fortis lbj. v. M. Stent ita per duos dies. Postea coq. ad consumptionem tertiæ partis: deinde adde aq. flor. fabarum lbj. & simul ponantur in alembico & destillantur. Postea isti aq. destillatæ adde gummi Tragacanth. & Arabic. q. s. ut F. Unguentum quo facies unguatur. *Petrus Forestus, Schol. observ. 9. & lib. 2. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Gutta Rosacea.

**P**uella Nubili facies admodum defœd. a ta erat jam multos annos pustulis siccis flavescentibus serpentibus, accedente rubore, ita ut de lepra suspecta esset. Vocatus ego veris tempore, primo venam aperui brachii. Scarificatione postea, adhibitis cucurbitulis in scapulis, iussi uti singulis mensibus. Vesicato-

rium quoque nuchæ applicui, quod magnam illic vesicam excitavit, & quod admirandum, ut aliquandiu sanguinem minxerit, fecit. Bibit aliquoties hoc decoctum.

24. Summitat. lupul. rec. fumar. rec. an. Mj. fol. fen. 3iii. coque in fero caprimo, colaturam bibat uno haustu, & aliquoties repetat.

Unguentum pro facie sequens præscripsi.

24. Lithargyr. auri, ceruss. an. 3ii. Unguenti citrini 3iß. Thuris alb. mastich. an. 3iß. Rad. serpentar. ossis sepiæ, an. 3i. Ol. tartar. 3ß. Succi limonum 3i. M. Inungat faciem. Manè abluat aqua flor. fabarum: recesserunt hac ratione pustulæ, sed iterum de novo obortæ sunt. Denuo itaque eam phlebotomia uti iussi, alteroque mox die scarificationibus. Purgavi que de novo sic.

24. Fol. lupul. fumar. an. Mj. flor. cordial. pi. sem. anis. 3ii. fol. sem. anis. 3ij. fol. sem. 3j. epithymi 3ß. decoq. in fero lactis; bibat duabus vicibus: sed in posteriore dissolvat Confect. Hamec. 3ii.

Electuario deinde hoc utatur.

24. Conserv. flor. cichor. viol. an. 3i. Conf. flor. bugl. nymphae, an. 3ß. pulv. trionfantal. duplicato rheo 3ii. diarrhod. abbat. diamarg. frigid. an. 3ß. medull. sem. melon. 3ii. Syr. conserv. cortic. citri q. s. F. Electuar capiat alternis diebus bolum.

Postea illinat faciem singulis noctibus hoc unguento.

24. Spec. unguenti citrim. 3iß. camphor. 3ß. boracis usti 3i. ossis sepiæ. 3ß. rad. serpentar. 3i. lactis virginal. parat. ex lithargyr. cum aceto & aq. fabarum 3iii. succi limon. vel arantior. ol. de tartaro, de frumento, an. 3ß. fugitivi 3i. (plus addidissim, sed valde denigrabat) misceantur benè, sic cabatur sæpe, sed rursus succis molle red. debatur: manè abluat hac aqua.

24. Cuspid. rosar. p. i. flor. viol. Mi. furfur. 3ii. cicer. rub. conquass. p. s. rad. ircos, 3i. rad. lilior. 3ii. rad. serpentar. cyclamin. an. 3ß. add. aquæ mensur. s. eliciatur aqua, quam, cum faciem ea lavat, aqua fabarum diluat: absumpto semel unguento & denuo parando addidi lithargyr.



gyri & borac. an. ℥i. & hac ratione curata fuit. *Felix Platerus, obs. lib. 3. p. 619.*

In Gutta rosacea faciei sananda cuidam Doctissimo viro, qui jam fuerat purgatus & sanguinem detraxerat. Sequentia jam usurpanda, & autumnii tempore repetenda præscripti.

Hoc mense *Majo* frequenter lac caprinum manè bibat. in quo decoq. rad. lapath. fol. Mercurial. fumar. teneritates Sambuci & Lupulorum. Vngat faciem unguento sequenti.

℥. Lithargyr. quart. i. infund. in aceto fortiss. sæpe moveatur, & acetum effundatur: residua sumatur, cui adde camphor. dissolut. in aceto ℥ss. pomatæ q. s. f. linimentum. Manè hoc decoct. abluat.

℥. Fabar. conquassat. parum, & orizæ an. p. i. decoq. in sero lactis, & eo abluat faciem: quod si non sit satis efficax unguentum: succum granatorum illi permisceat. Reversus ex *Italia*, cum inspicerem, vix

amplius apparebat rubedo; dicebatque imprimis profuisse unguentum ex Lithargyro. *Felix Platerus, obs. lib. 3. p. 627.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### Pro Gutturis Morbo Epidemio.

**A**D dolorem gutturis, cum ægri subito ex catarrhi fluxione videbantur suffocari, plurimum profuere gargarismi, qualis subsequens erat, quo in me ipso usus sum, tum in aliis, ita ut cum illo septies tantum gargarissem, dolor ille gutturis subito cessavit simul & angustia pectoris, miraculi instar.

℥. Aq. plantag. ℔i. aq. scabios. ℔ss. flor. ros. rubr. pi. sem. cydon. ℥i. bulliant leviter & colentur; add. diamori dianuci an. ℥i. terræ sigillat. ver. ℥i. M. quo cum usus essem, videbatur quasi liberatus ab hoc malo. *Petrus Forestus, lib. 6. obs. 1.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER OCTAVUS.

## De Affectibus à littera H incipientibus.

## SECTIO PRIMÆ.

### De Hæmoptoe.



Patum sanguinis (Græcè *emoptoi* & *emopsis* ab *ema* Sanguis & *ptio* sputo) in genere quidem omnem sanguinis per os rejectionem significat. Propriè tamen sanguinis cum tussi ex pulmone thorace, & aspera arteria excretionem denotat. Hujus causa conjuncta est vasorum illarum partium *anastomosis*, *diapidesis* & *rixis*: antecedens verò sanguis, tum quantitate, tum qualitate peccans: externæ sunt victus plenior, mensium aut hæmorrhoidum suppressio: exercitatio nimia, clamor ingens, ictus, casus, vulnus, & alia quam-

plurima: ex qua parte profluit sanguis, his dignoscetur signis: si levissima tussis, & leviter spumofus excernitur, ex aspera est arteria, si verò majore cum tussi, majore quantitate, & cum majore spumæ copia rejicitur, à pulmone prodit; à thorace verò qui exit, præterquam quod maximam tussim infert, lividus est & nigricans; ex ore & gingivis simplici expuitione sine tussi excernitur, & ex gutture cum rascatione & screatu. Omnis sanguinis per os effusio terrificæ est, & in malis ducenda.



## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Hæmoptoe.*

**V** Ir quidam Patritius hyeme media, de repente in copiosissimam sanguinis floridiè pulmonibus rejectionem incidit, ita ut una nocte, sanguinis heminas plusquam quatuor ore excreverit; unde pallidus & prope sine viribus redditus, pulsu exiguo & intersecto, voce tremula, deliquiis cerebri oppressus, moriturus in horas sperabatur. Ad hunc nos vocati, quum graviter urgeret affectus, huic protinus acceleri manu succurrendum duximus: itaque protinus e cubiculo turbam omnem, quæ multa officii causa affinium & sanguine coniunctorum aderat, locum dare iussi, forasque prodire, præter eos qui ægro necessarii erant: ignemque qui tum ob frigoris inclementiam succensus multus in cubiculo erat, extinguere iussi, Mox verò quum adstricta esset aluo æger, mollem clysterem indere jubeo: atque interea dum apparatus clyster, poscam devorandam atque gargarisandam do. Silentium ægro impero, ut ne quicquam loqueretur, sed nutibus quæ sibi opus essent significaret, atque etiam ut ne magno respiratu uteretur: nam & loquutio & respiratio vehemens, thoracem atque pulmones exagitant, & ob id sanguinem promovent. Protinus verò clystere soluta alvo, sanguinem e vena media dextri brachii auferri venæ sectione jubeo, non affatim, sed bis eodem die, quatuor inter unam & alteram sectionem interpositis horis. Sic namque jubet *Galenus* & eo pacto melius avertitur sanguis, fervaturque virtus: quin & crastino ejus diei iterum, sed leviter sanguinem detraximus, quod & æger viribus valeret, florenti ætate esset & copioso sanguine abundaret. Vbi hæc Peracta sunt, mox vinculis fortioribus crura, brachiaque deligavimus, & multa posca os colluere, ac portionem etiam devorare iussimus: ut si quid intro concreti sanguinis esset, dissolveretur: multos namque thrombos deorsum clysteris usu deiecit, sanguine in ventriculum pergulam delabente: frictionibus etiam crurum ad diversionem usi sumus: quum vero sanguis nimium proflueret, sistere eum ante omnia

potionibus datis adstringentibus, glutinantibus & refrigerantibus coacti sumus. Hac itaque potione bis, ter etiam in die data usi fuimus.

24. Lapid. hæmatit. cum aqua plantag. lot. corall. rubr. similiter loti an. Div. terr. sigillat. ℥ii. margarit. splendid. ℥i℥. sem. plantag. arillorum uvar. exsiccat. an. ℥i. M. redigantur omnia in tenuissimum pollinem, adde troch. de carabe ℥i. atque ex hoc pulvere ad sistendum sanguinem efficacissimo ℥i℥. ex aq. plantag. & peculi rosar. & ℥ii. syrup. de ribes dari iussi: quum adhuc sanguinis ingens profusio perstaret, compescendam validiore præsidio censuimus. Dedit igitur sequentem potionem.

24. Philon. persic. ℥i. lapid. hæmatit. ℥℥. syrup. cydon. ℥ii. aq. plantag. q. s. diluendis reliquis. F. potio: dabam dormituro, ut & somnus conciliarentur, & eadem opera sanguis sisteretur: in jusculis sem. papav. alb. & rhois obsoniorum in panno lineo raro ligata injici jubebam. Conditum hujusmodi ad virium robur præscripsi.

24. Conserv. rosar. antiq. ℥ii. conserv. symphit. maj. ℥i. margarit. select. corall. rubr. loti cum aq. ros. & subtiliss. pulver. an. ℥i. man. ch. perl. ℥i. conserv. bugl. ℥i. M. cum sacch. opt. F. conditum auri foliis contactum. Interdum Electuario ex margaritis confecto utebar.

Extra verò ad sanguinis motum compescendum cervici & collo, tum & pectori linimentum admovi, & unguento hoc sum scilicet usus.

24. Ol. mastich. cotoneo, & myrtill. an. ℥i. sevi hircini aq. rosar. diluti ℥i℥. pulv. pilor. leporis minutissime incisorum, corall. rubr. bol. armen. sang. drac. oliban. mastich. an. ℥i. ceræ alb. q. s. M. F. unguentum, quo thoracem illiniri & colli atque cervicis partes jubebam: clysteres lenes ad excrementorum subductionem (imbecillus namque viribus erat). Parari hujusmodi jubebam.

24. Decocti caponis lib. in quo bulliat hord. p. i. sem. melon. cum cortice contus. ℥i. colatura dissolv. mell. rosar. colat ℥ii. vitell. ovor. numero ii. sacchi. rubr. ℥i. M. F. Clyster. interdum catholici ℥i. nonnunquam verò cassiam cum saccharo admix-



admiscebam. Quoniam verò bilis multa sanguini mista fervorem & profusionem non parum augebat, hanc confestim nulla expectata mora evacuandam duximus; hac data potione.

℞. Rhei. elect. subtiliss. pulver. ℥i. rhei. elect. in aq. endiv. cum tantillo cinnamom. per noctem infusi & manè fortiter expressi ℥iv. (quia obstructa hic vir viscera habebat, infusum etiam rhei dare visum est, ad obstructions aperiendas) syrup. ex infus. rosar. ℥ii. decocti pectoralis, q. s. fiat potio.

Interdum etiam ad sistendum sanguinem confectione de styrace usus sum, cuius hæc est descriptio.

℞. Passular. exacinatar. & cribro seraceo transmissarum ℥i. liquirit. ras. & subtiliter pulverata ℥vi. xyloaloes, nucis myristicæ, an. ℥ii. gra. xv. cumini tantundem styrac. calamit. ℥i. bol. arm. præp. ℥i. sacchar. in aq. beton. dissolut. q. s. F. Electuarium in tabulis.

Hac methodo, hisque cum paucis aliis ejusdem generis præsidis, magna cura & sedula opera adhibitis curatus est hic vir præter nostram & omnium opinionem, nutu Dei opt. max. qui sanat languores nostros, *Franciscus Valeriola, obs. 2. lib. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Hemoptoe.*

**V**irgo quædam quadraginta annorum à sex circiter annis valetudinaria, sæpiusque sanguinis exiguum cum pituita expuere solita, tandem circa secundam noctis horam dum lateri dextro incumberet, ob maxima copia in os & asperam arteriam, affluentem sanguinem, à somno excitata, de suffocatione repentina periclitabatur, tussi & vomitu quasi copiosissimum sanguinem excreavit. Accedens summo manè ex relatis & rejectis, venam pulmonum referatam a fluxione fortè salsa, quam referebat in ore sensisse, vel ab plethoram, è qua tanta sanguinis copia prodierit, cognovi, quapropter præscripsi ei pulverem sequentem, de quo cum brodio statim cochl. i. & postmodum cum syrupis portiunculamumat.

℞. Sacch. ros. tabul. ℥ii. corall. rubr. ℥ss. succin. sem. hyosciam. an. ℥i. M. F. pulvistenuissimus. Item.

℞. Syrup. iujubin. & myrtill. an. ℥i. M.

Circa octavam matutinam, me præsentente, dum lateri dextro incumbere conabatur, sanguinis copiosa profusio, cum tussi, vomitu, horrore, & virium prostratione, eodem planè modo rediit, ut prius nocte ei accidebat: repræsentabat sanguinem à pulmonibus elapsum, spumosum & rubicundum unciarum circiter quinque, postmodum expuebat cruenta. Circa tertiam exhibui ei julepum ex syrup. præscriptis cum aq. plantag. & portul. q. s. Post cœnam sumpsit julepum ex syrup. de plantag. cum aq. plant. ros. parum & portulac. gargarisavit prius os aceto rosac. & aq. pura, sicuti & postmodum frequenter, locopotus bibit lac amygdalinum. Post mediam noctem hora secunda eodem modo rediit expuitio, cum tussi & conatu vomendi dixit se sentire semper ardorem in gutture præcedere, subsequente statim copioso sanguine salso, sumpsit de pulvere præscripto, sed nihilominus horis duabus elapsis, rediit cruenta illa expuitio, cum horrore & virium prostratione: illo die manè ebibit potiunculam ex syrup. plantag. & portulac. an. ℥ss. syrup. myrtill. ℥iii. terr. lemnix veræ ℥i. aqua plantag. & burs. pastoris, an. q. s. Postea jecori adhibita fuit cucurbita magna sine scarificatione bis reiterata, ante somnum bibit hunc julep.

℞. Aqu. plantag. & portul. an. ℥i. syrup. plantag. & portulac. an. ℥ii. syrup. papav. alb. ℥ss. terr. lemnix veræ ℥i. M. Illa nocte sceleriter satis dormivit, nec expuitio illa sanguinis copiosa rediit, mirè medicamentum hoc prædicabat, manè bibit coch. i. pulv. præscripti cum syrup. de plantag. portulac. & aq. plantag. & portulac. reiterata fuit cucurbita sine scarificatione in regione hepatis. Sub noctem bibit julepum priorem cum syrup. papav. placide quievit, nec amplius excreavit sanguinem, ut grumi sanguinis è corpore expurgarentur, & dissolverentur, præscripti potionem hanc.

℞. Rhei subtiliss. pulveriss. ℥ss. syrup. ros. solut. cum infus. rhabarb. & mannæ elect.



elect. an. ℥vi. cum aq. plantag. & portulac. q. s. F. Potio, addendo aq. cinnam. ℥ii. ter copiosè deiecit.

Tandem ut sanguis si quis in pulmonibus remansisset facilius excreari posset, præscriptum fuit hoc Lohoch.

℥. Syrup. de portul. ℥i. de plantag. ℥ss. tab. diamargar. frigid. ℥i. terr. sigill. lemnix veræ & pulv. supra præscript. an. ℥ss. F. lohoch. de quo lambat frequenter cum baculo liquirit. Postea præscripsi tabulas sequentes, de quibus singulis noctibus unam vel duas in ore, ut sponte diffluent, continuit.

℥. Sem. hyosciam. alb. subtiliss. pulveris. ℥ii. gummi Arabic. ℥i. corall. rub. ℥ss. viol. rec. num. 10. succ. berber. ℥ii. aq. ros. & plantag. an. q. s. sacch. F. tabulæ. Hisce omnino restituta est: nec ab aliquot septimanis quicquam cruenti in sputo apparuit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 789.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Hæmoptoe.

**Q**uidam profusè sanguinem purum aliquot dies cum tussi per os effundebat, idque sequente mox summa imbecillitate cum vitæ discrimine. Dedi illi troch. de alkikengi cum opio, ut aliquot noctes cum lacte caprino dissolutos biberet. Profuerunt plurimum: sicque à mortis imminenti periculo, vel subsequenti phthisi, uti ferè ea sequi solet, & à lethali morbosanus evasit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 792.*

Quidam tussiendo excreabat sanguinem satis copiosè, catarrho simul affecta, alvusque ei constipata erat: valdè phthisimetuebat, quam venam ruptam in pulmonibus sequi solere, ex lectione practici cujusdam Germani didicerat, adeo ut vix eam consolari potuerim: exhibui ei mannæ ℥ss. cum jusculo, quàm & pectori prodesse dixi; excrevit placide & copiosè. Sanguinem postea detraxi è mediana; jussi manè & vesperi sumere tabulas in hæmoptica passione utiles ex semine hyosciami: in præcedente subseptione descriptas. Desiit sanguinis excretio, sed mox rediit: jussi tabulas repetere, idque sacrum est tertio; sed post tabularum usum con-

tinuatum nihil amplius cruenti apparuit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 793.*

Manè & vesperi si sanguinem expueret, capiat ℥i. phlon. persic. aut tantundem nostri electuarii ad sputum sanguinis quod est mirabile.

℥. Sem. Hyosciam. alb. papav. alb. an. ℥x. terr. sigill. corall. rubr. an. ℥v. sacchar. rosar. antiquiss. q. s. F. Electuar. *Helidæus de Paduanis, consil. 7. lib. 3. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Novi nostratem quendam Lemovicum Hæmoptoicum, qui cum alternis temporibus multum rejectasset sanguinem nec ullis potuisset remediis sanescere, ad *Julium Casarem Scaligerum*, Medicorum suæ tempestatis facilè Principem, confugit, ex quo pulverem accepit; hujus formulam, quia mihi communicavit, libet hic adscribere.

℥. Spodii, ros. rubr. bol. arm. terr. sigill. hæmatit. an. ℥v. corall. rubr. carab. margarit. non perforat. an. ℥ss. Gummi Arabic. tragacanth. an. ℥ii. sem. papav. portulac. sem. ros. rub. sem. arnöglos. C. C. combust. an. ℥ii. acaciæ, succi barb. hircin. succ. liquirit. an. ℥ii. amyli torrefacti ℥iii. terantur, misceantur, & fiat pulvis, cujus dosis sint ℥iii. Datur cum aqua pluviali.

Hoc remedium tandem descriptum reperi: apud *Serapionem, cap. 25. tract. 2. Antonium Valerium, ad c. 27. lib. 1. De morbis intern. Iac. Hollerii.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### Pro Hæmoptoe.

**C**onsiliarius quidam *Monspeliensis* circa noctem incidit in sputum sanguinis spumificum tussi, & magnam illius quantitatem excrevit tota nocte. Sequenti die manè vocatus, venæsectionem præscribo ad ℥viii. Deinde julepum ex aq. plantag. syrup. de ros. sicc. & sale prunellæ postea injectus fuit clyster cucurbitula admoda regioni hepatis, lohoch. incrassans & adstringens usurpatum: hora decima iterata fuit venæsectio ad ℥vi. syrupus ex succo portulac. etiam præscriptus: Post meridiem



diem rediit sanguinis sputum, magna copia scilicet ad ſibi. iteratus fuit julepus, oxycratum admotum testibus epithema refrigerans hepatis, linimentum refrigerans eadem parti, & lumborum regioni, cucurbitula hypocondriis frequenter iterata, & circa vespere sanguis denuo miſſus ad ſviii. præſcripti julepi ex infuſione millefolii, &c. qui magnæ ſunt efficaciz in hunc modum.

℞. Millefol. flor. albo & flor. luteo, an. Mii. rad. tormentill. rec. & cum ſol. ſi haberi poſſit, ſi minus ſiccæ ℥i. pimpinell. mai. M. i. Conſerv. roſ. rub. ſſ. aq. fontis ſſxvi. ponantur in olla vitreata quæ cum ſuo operculo diligenter luterur, ut vapores non expirent. coq. poſtea in balneo M. bulliente per horas 16. colatura ſervetur in vaſe vitreo; de qua capiat ℥vi. mane, meridiè & vespere.

Pro potu utebatur conſerva roſ. cum decocto hord. & liquirit. ad noctem præſcriptus eſt hic ſyrupus ſequens.

℞. Syrup. de roſ. ſicc. de ſucco portulac. & papav. alb. an. ℥i. M. capiat cochl. i. Singulis duabus horis, ita ut intra noctem tres illæ uncie abſumantur, mirum in modum proſuit hic ſyrupus, & ſequenti die fuit iteratus; ut per longiora intervalla ſumeret cochl. i. Sequentibus vero diebus nihil amplius ſanguinis excrevit, & omnino convaluit. *Lazarus Riverius, obſerv. 83. cent. 1.*

Vir quidam militaris temperamento ſanguineo & bilioſo præditus, triginta annos natus, ab octo menſibus incidit in ſanguinis excretionem per os, quem vomitu rejecit prima vice ad ſviii. à quo affectu frequenti phlebotomia liberatus eſt. Idem tamen vomitus ſanguinis poſt aliquod tempus ſemel atque iterum recurrit, ſed minori copia, & jam per intervalla ſputa cruenta, & ſincerum ſanguinem per ſputum rejecit. Huic ſequentia præſcripta fuere remedia, injecto clyſtere laxante aperiatur primùm vena baſilica cubiti dextri, deinde die ſequenti vena malleoli ſiniſtri & mittantur ſingulis vicibus ſanguinis ℥vi. vel vii.

℞. Fol. plantag. M. i. tamarind. ℥ſſ. coq. ad ℥vi. in colat. infunde rhab. elect. ℥i. myrobalan. citrin. ℥ſſ. ſantal. citrin. ℥ſſ. in

expreſſ. diſſolv. mann. & ſyrup. roſac. an. ℥i. rhei. pulv. ℥i. F. potio, quæ detur poſtridie ultimæ venæſectionis, die ſequenti applicentur duo cauſtica poſteriori parti cervicis inter tertiam & quartam vertebam.

℞. Rad. biſſort. tormentill. ſymphyt. maj. an. ℥i. ſol. plantag. pimpinell. pilofell. vinc. pervinc. an. M. i. ſantal. rubr. ℥ii. coq. ad ſſiſſ. in colat. diſſolv. ſyrup. de roſ. ſicc. ℥iv. F. Julep. pro quatuor doſibus matutinis, addendo unque doſi ſalis prunellæ ℥i.

Finitis julepis, reiteretur potio purgans prædicta; addendo pulv. jalapæ ℥i. & totum rhab. infundendo.

℞. Rad. conſolid. maj. ℥i. ſol. plantag. pimpinell. bugl. prunell. & pilofell. an. M. ſſ. coq. cum juſculo vervecini, & colaturam accipiat manè tribus horis ante prandium continuando per duodecim dies.

Poſt quartum quodlibet juſculum, capiat potionem purgantem prædictam.

Finitis juſculis, utatur opiata ſequenti.

℞. Conſerv. roſar. & rad. ſymphyt. an. ℥i. troch. de carabe, & de terr. ſigill. an. ℥ſſ. corall. præp. margarit. præp. lap. d. h. matit. an. ℥i. gummi Arabic. & tragacanth. an. ℥i. cum ſyr. de roſis ſicc. F. opiata de qua capiat magnitudinem avellane duabus horis ante paſtum, ſuperbibendo parùm aquæ potus ordinarii, quæ erit piſana conſecta ex decocto hord. & liquirit. vel aqua ferrata in qua pimpinella vel pilofella infundatur.

Utatur per quindecim dies lacte caprillo vel ovilo leviter calybeato.

Quam primùm aggreſſus eſt horum remedium uſum, ſanguinis ſputum ceſſavit, nequiquam amplius in toto eorum decurſu comparuit neque deinceps. *Lazarus Riverius, obſerv. 12. cent. 3.*

Exhibeantur medicamenta quæ oſcula vaſorum reſerata occludant vi emplatica & aſtringente: ita tamen, ne nimia aſtrictione ſanguinem in pectore retineant: quin potius ea interdum permittantur, quæ ſanguinem extravasatum & concretum diſſolvant & expectorent, inter quæ præſtantiffima ſunt; ſequentia.



24. Liquoris albumin. ovi fortiter agitati ℥ii. sacch. rosac. ℥i. amyl. ℥iii. M. F. lohoch., quo utatur ex cochleari frequenter.

24. Spirit. vitriol. ℥ss. aq. plantag. ℥iv. M. F. potiuncula: subito sistit sanguinem tussi vel vomitu rejectum.

Syrupus coralliorum ad coch. ii. singulis diebus exhibitus, omni sanguinis fluxui convenientissimus est: at tinctura ejusdem cum succo limonum recenti extracta, potentius operatur.

*Quercetanus* in Pharmacopœa sequentem aquam describit ad Hæmoptysin, quæ est magnarum virium.

24. Rad. bistort. symphyt. maj. tormentill. an. ℥i. fol. centinod. millefol. veronic. pyrolæ, fanicul. burs. pastoris cum rad. an. Mi. summat. rubi lentisci, an. M. ss. granor. sumach. myrt. sem. plant. berber. pap. alb. an. ℥vi. flor. nymphææ cucurbitæ cyd. ros. rub. an. p. ii. contusis & commixtis omnibus, macerentur per quatrimum ad ignem balnei, in succorum depurator: plantag. portulac. acetos. agrimon. ana ℥bii. Dein fortiter exprimantur. His adde acaciæ, hypocistid. ana ℥ii. terr. sigill. bol. armen. veræ, an. ℥ss. elect. diatragac. frig. ℥ii. macerentur denuo per quatrimum, dein per cineres ad siccitatem destillentur: hujus aquæ capiat æger cochl. ii. vel iii. per se aut cum syr. convenienti.

Oleum de carabe chimicè extractum potentissimè penetrat, astringit, & siccat, si guttæ duæ in potu dentur cum aq. plantag. ut docet *Cesalpinus* in speculo artis medicæ.

*Amatus Lusitanus* succum urticæ mirè prædicat his verbis. Qui sanguinem ex pectore reiectionarunt, & à Medicis tanquam deplorati sunt habiti, solo urticæ succo convaluerunt. Post multa autem machinata remedia, nullum ita contulit ut sanguis cohiberetur, ac urticæ succus, quem ad quinque vel sex dies ebiberunt: singulis scilicet diebus ℥iv. jejuno stomacho: imò & ipsam urticam in coctam iure pulli aut vervecis sæpe comedebant.

Pilulæ sublinguales usitatissimæ sunt, & in sequentem modum componi possunt.

24. Mucag. gummi Arabic. & tragac. ex-

tract. cum aq. plantag. ℥ii. mumia, mastich. an. ℥i. sacch. rosat. q. s. F. pilulæ sublinguales, quarum unam teneat in ore perpetuo.

Quia verò astringentium usu sputum supprimitur, & difficultas spirandi exoritur, per intervalla recurrendum est ea quæ pectus leniunt, & nihilominus sanguinis sputum cohibent: qualia sunt ea quæ componuntur ex gummi Arabico, tragacantho, amylo, & syr. de rosis sicc. cydon. myrtill. juleb. de succo portul. aut plantag. *Lazarus Riverius prax. med. lib. 7. cap. 6.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Hæmoptoe.*

**P**Ræmissis venæsectione & debita purgatione soleo maximo cum fructu præbere singulo manè ℥ss. plus minusve seminis papav. alb. cum ℥ss. sacchar. rosat. antiquiss. quod remedii genus compluribus insigni juvamentum attulisse scio. *Hieron. Mercurialis, cons. 15. tom. 1.*

In hoc casu sæpissimè expertus sum magnopere profuisse semen hyosciami alb. cujus pulvis acceptus cum sacchar. rosac. antiq. & syrup. de portulac. solet mirum in modum fluores sanguinis compescere. *Hier. Mercurialis, consult. 42. tom. 2.*

Civis quidam *Monspeliensis* Hæmoptoe laboraverat per triennium, qua sanguinem reiciebat per intervalla satis magna copia: tandem post multa remedia, per mensem integrum mane sumpsit amyllum in aqua decoctum (& sine calce paratum) instar panatellæ; & ab eo tempore sanguinis sputo nunquam correptus est. *Lazarus Riverius observ. 11. cent. 4.*

*Andrea Baillao* consulis regii filio annorum viginti, magna sanguinis per os reiectionio: valde pulmonibus metuitur: omni arte pulmonibus studetur: fortè fortuna dum hypochondria manu blandè continguntur, pulsus percipitur, ac veluti πηλὸς τῆς nec non ab hypochondriis decurrentis sanguinis ac partes superiores affectantis cursus percipiebatur, ac si manu sanguis duceretur: prout partes superiores petebat, hor-



horror quidam excitabatur: at tum confertim rejiciebatur è pulmonibus: talis rejeſtio erat hemorrhagiæ loco, quæ juvenibus erat familiaris. Relictis tum præſidiis quæ pulmoni dicabant, converſum eſt ad hypochondria ſtudium. Expurgata innumera colluvie prærepta eſt ei rejeſtioni ſanguinis occaſio: quod notandum valde eſt. *Guil. Ballonius, lib. 1. Epid. & Ep- hem. pag. 62.*

Syrupus ex ſtercore aſinino in omni rejeſtione ſanguinis plurimum confert. Lavatur primum aqua roſac. in eadem incoquitur cum ſacchar. roſac. & fit Syrupus. *Guil. Ballonius, conſil. 22. lib. 1.*

Quater in anno corpus purgandum erit frequenti bolo.

℥. Gaſſiæ rec. extract. ℥vi. rhei el. pulveriſ. ℥iſſ. elect. diatragac. frigid. aut ſacch. alb. q. ſ. F. bolus.

Sæpe etiam ſub noctem ad lecti ingreſſum uti conſerva roſacea expediet. Si tamen accideret ſputum hoc ſanguinis repetere, commodum videretur poſt blandam alvi mollitionem mittere ſanguinem è baſilica dextra, quæ eſt lateris fluxioni magis opportuna. Die ſequenti hauſtulam rhab. torrefacti potare in hunc modum.

℥. Rhei. el. torrefact. Syrup. roſ. ſicc. ℥vi. ℥ß. plantag. ℥iii. M. F. potio.

Utatur quoque frequenter, atque adeo omnibus horis hac familiari opiata, donec ſanguis conſiſtat.

℥. Conſerv. roſ. ſicc. ℥i. bol. arm. ℥iii. terr. ſigillat. ℥ii. corall. rubr. carab. C. C. uſti, an. ℥ß. ſyrup. myrtill. q. ſ. F. opiata.

Ad præcautionem, etiam ſi ſanguis non erumpat, hoc condito ſæpe utendum.

℥. Conſerv. roſac. & ſymphiti an. ℥ß. troch. de carabe & de terra ſigill. an. ℥i. corall. rubr. margarit. elect. an. ℥ß. ſacchar. roſat. q. ſ. F. conditum. Capiat cochleare unum hora una ante paſſum. Uſus boli armen. perutiliſerit ſi ſanguis rurfus erumpat.

Deinde ipſo ſuppreſſo ſequenti ſyrup. pulmones corroborandi leniendi, & detergendi.

℥. Paſſul. mundat. ℥i. polipod. q. liquirit. raf. an. ℥ii. tuſſilag. ſcabioſ. pimpinell. centinod. an. M. i. ſem. altheæ & bom-

bacis, an. ℥i. F. decoct. ad ſibi. in expreſſ. diſſolv. ſacch. alb. quartaria tria. F. Syrupus mediocriter coctus: utatur omni hora ex cochleari ſine aquis: pulmones roborat & detergit. *Joh. Fernellius, conſilio 22.*

Qui ſanguinem ex pectore rejeſtarunt, & à Medicis tanquam deplorati ſunt habiti, ſolo urticæ ſucco ebibito convaluerunt. Poſt multa enim machinata remedia nulum ita contulit, ut ſanguis cohiberetur, ac ſuccus urticæ quem ad quinque vel ſex dies ebiberunt. Singulis namque diebus uncias quatuor jejuno ſtomacho bibebant, imò & ipſam urticam incoctam jure pulli aut vervecis ſæpe comedebant. Urticam hoc munus conſicere poſſe credi, tu eſt difficile: *Dioſcorides* tamen de ea, ita inquit Urticæ folia profluvia narium, cum ſucco ſiſtunt tria impoſita, & ultimo urticæ ſuccus gargarrifatus uvam reprimit. *Amatus Luſitanus, cent. 6. cur. 4.*

Puella quædam ex patritia familia, non multum poſtea quàm menſes primo vidit. in ſanguinis mirum ſcreatum incidit. Hæc enim mirum dictu, inter diu duodecies ſcreabat, qualibet autem hora ſemel; noctu non ſcreabat ſed dormiebat. Screabat autem, ut ex ſcutulis 12. percipiebamus pro vice parum, aliquando ſanguinem rubicundum, ſæpe verò aquoſum, quem non tuſſi, aut difficiliter aliqua anxietudine rejeſtabat. Adhibitis variis medicamentis, rejeſtatio ſanguinis tandem deſiit. Qui Artis Medicæ ardua cacumina conſcendunt, facile iudicare poſſunt caſum hunc rarum eſſe. Quis enim quam vidit, aut literis mandavit, ſanguinem tam longo tempore (ultra tres menſes perduravit) tanto ordine & tam ſervata periodo, per eos rejeſtari? Intra enim duodecim diei horas duodecies puella hæc ſcreabat ſemel in hora cruentum & parum; noctu verò nihil ſcreabat, etiam ſi vigilem totam noctem ageret. An verò ſanguis menſtruus, qui eo tempore deſiciebat, partem altam cõbrepebat, & per venam parvam & exilem ſtomachi parti altæ complanam exhibat, in dubium verti poſſet: Vos qui rerum naturalium cauſas percurritis, conſiderate. Hoc unum ego hic teſtatum relinquo,



quo, non minus difficilem hujus morbi cognitionem esse quàm illam *Euboici Euripi ab Aristotele frustra investigatam*, nec tamen inventam. *Amatus Lusitanus, cent. 6. cur. 49. & Scol.*

Si sanguis tussi excretus è pulmonibus fluat, emittendus est sanguis ad revulsionem, si ex pectore abstinendum est à sanguinis emissione. Ita *Hippocr.* in pleuritide ubi sanguis expectoratur, à venæsectione cavet: nam hic opus est firmis lateribus venæ autem sectionem admodum franguntur vires. *Ioh. Heurnius, ad Aphor. Hippocr. 13. sect. 5.*

In cruenta spuētibus venæsectionem impediunt tempus anni, pleuritis, bilis. *Hippocrates lib. 6. Epidem. sect. 3.* Quasi verò in pleuritide non sit secanda vena; imò tunc secandi sumitur indicatio, cum sputum cruentatur. Hoc non vult *Hippocrates*, quanquam littera id videtur indicare; sed considerat sputum cruentum vel ut morbum, vel ut symptoma. Ut morbum cum est proprio vitio pulmonis; ut symptoma, cum sit ob pleuritim. Cum enim sit ob pleuritim, non ex se postulat phlebotomiam est enim ipsa pleuritis, quæ forte postulat, aut non. Nam cum mendi pleuritidi alia ratio sit quàm per phlebotomiam, fieri potest ut sputum sanguinis nullo modo phlebotomiam indicet, quatenus symptoma est; quatenus morbus, omne sputum cruentum phlebotomiam insinuat. *Guil. Ballonius Hist. 1. lib. 2. Consil.*

Sententia *Hippocratis*, quæ 6. *Epidem. sect. 3.* textu ultimo habetur, jure multos Medicos sollicitos habuit: siquidem non solum contra rationem videtur, verum etiam contra communem & quotidianum Medicorum usum, quippe qui tunc multò magis mittunt sanguinem in pleuritide, quando sputa sanguinolenta excernuntur. *Franciscus Valesius Hippocratem* vult in ea sententia minimè loqui de impedimento mittendi sanguinem sed de impedimento curationis, ut voluerit *Hippocr.* nos docere, ubi cruenta expuntur, curationem impediri à pleuritide: quippe cum cruenta expuitio requirat adstrictoriam curationem, pleuritis autem potius requirit laxatoriam. *Hæc Valesii*

interpretatio est quidem veritati admodum consentanea: verumtamen quia expressissimis verbis *Hippocr. & Galeni* interpretationi: refragatur, minimè à nobis æstimanda est. Ideo puto *Hippocratem* deserte nos monere, ut ubi cruenta sunt sputa, & pleuritis adest, minime sanguis mittatur. Cur igitur Medici quotidie secus operantur, ut tunc potissimum sanguinem mittant, quando sputa sanguinolenta conspiciuntur? Respond. cruenta sputa, quæ in pleuritide rejici solent aut esse purè sanguinea, aut non est, sed permixta. Ubi sputa pure sanguinea sunt, certè nullo pacto convenit sanguinem mittere, 1. ea ratione quam proponit, quia morbus scilicet est mitissimus, & sic non exigit vehementissimum remedium. Alia ratio est, quia ubi sanguis purus excernitur, si etiam sanguis licet parè mittatur, periclitantur vires. Hoc itaque pacto intelligendus est *Hippocr.* quando scribit impediri sanguinis missionem in pleuritide quoties sputa sunt purè & sincerè sanguinea. Caterum si sputa minimè sunt sincera, sed permixta, tunc necessarium est omnino mittere sanguinem, quia huiusmodi sputa arguunt morbum esse acutissimum & periculosissimum. *Hieronymus Mercurialis Med. Practic. lib. 2. cap. 6.*

Cum dicat *Hippocrates*, Cruentum si fuerit expectoratum in pleuritide, à sectione venæ esse temperandum, hoc voluit; Si plena manu expectoratum sanguine mixtum procedat, ita ut inde mitescat dolor, febrisque conquiescat, non opus erit phlebotomia: nam natura excludit ipsa suum onus, phlegmoneque materiam elidit. Si verò sanguinem expectoratum parce procedat, si nec dolorem nec febrem excludat, cur non secaretur vena? an non vehemens affectus? *Ioh. Heurnius, cap. 2. De morbis pectoris.*

Quidam *Hippocratis* autoritate decepti nunquam secant venam in pleuritide, si sputum sit sanguineum. Sed nos ad methodum & fundamenta revocantes omnia, distinguere debemus, dum sanguis expuitur, num sanguinis peccatum sit vehemens necne. Si non est vehemens, mitis est inflammatio, dum scilicet sanguis qui fluit egreditur & non retinetur. idea.



ideoque sensibiliter dolor imminuitur; è quibus mitis cognoscitur inflammatio: ideoque non est tunc vena secanda, quia sanguis in hac miti inflammatione evacuat per tussim. Si peccatum sanguinis sit vehemens, inflammatio non est mitis: dum scil. æger expuit sanguinem, sed in parva copia, & dolor non minuitur, sed intenditur potius: quia major est portio sanguinis fluentis, quam ejus qui excernitur. Proinde vena secanda; cum vitium sanguinis sit vehemens. *Hier. Capiuaccius. Pract. lib. 2. c. 3.*

Pleuritides biliosa simul & sanguinea ut plurimum nono, aut undecimo judicantur, ac serè salutem conducunt. *Hipp. Coac. prenot. lib. 2. Tit. 17. sect. 9.*

Sputum rubrum simul & flavum promoveri debet iis quæ expurgationem juvant, molliendo, leniendo & sputum ciendo; non autem sanguinis detractio retrahi & impediri, quod usu venire videmus, non sine mœrore & nemesi, ab isti pragmaticis vulgò dictis, qui omnem pleuritidis curationem exigunt in sanguinis detractioe sæpius iterata, quandiu pleuriticus hujusmodi sputa expurgat, cum spe salutis prædivite. O homines Reipublicæ calamitosos atque funestos; Ipsam pleuritidem quæ sua sponte nullius operis indigens, cum tali sputo quiesceret, ex eventu reddunt mortiferam. *Ludovicus Duretus, in Coac. prenot. supra citatam, & circa finem lib. 2.*

## SECTIO SECUNDA.

### De Hemorrhagia Narium.

**A** *ῥοιπαγία* (ab *ema* sanguinis, & *ri*so vel *riqini* frango, rupto) immodica est & præternaturalis sanguinis ò naribus profusio apertis, ruptis, vel exesis venis aut arteriis eò desinentibus: eas aperit per anastomasin, sanguinis copia & acredo, rumpit verò per *rixin*, vulnus, contusio ex ictu, aut violenta quavis evidenti causa: exedit demum per *diabrosin*, sanguinis vel cujusvis humoris exuperans acrimonia: per eas denique quæ in *diapidisi* transfudat sanguis ob vaforum tunicæ raritatem & sanguinis

tenuitatem. Hemorrhagia alia est critica; alia ex consuetudine naturali, alia etiam omninò præter naturam: in duobus primis generibus sanguis suppressi non debet, nisi quum viribus metuitur.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Hemorrhagia Narium.

**V** Idimus *Pichueris* anno 1545. puellam annorum octodecim pauperulam per quatuor integros dies sanguinis fluxum è naribus adeo enormem habuisse, viribus prostratis, mensibus ad longum tempus retentis, humi prolapsam, ut nulla spes salutis superesse videretur. Ad quam vicini cum omnia tentassent remedia, me tandem ad eam perduxerunt: statim arrepto utroque brachio circa carpum, ubi pulsus tangitur, aquam frigidissimam ex poculo stricti orificii embrochæ instar continuo stillavi, sinumque procinque naribus objeci, & ut ore repleto aqua frigidissima, succum urticæ per nares attraheret, mandavi: nucham autem aq. plantag. frigida lavari permisi, quanquam hoc remedium febricitantibus sit suspectum; hæc autem non febricitabat. His remediis fluxus cessavit, viribus postea paulatim recreatis ut veniam saphanam secaret consului ad menses revocandos.

Alteri puellæ cui & menses purgationes ad quatuor menses restrictæ non procedebant, & sanguis è naribus per tres continuos dies fluxerat, saphæna ejusdem lateris incisa non proficiente, irritisque omnibus aliis auxiliis uti solitis, tandem ut ventosa magna absque scarificatione sub mamilla dextra ad hepatis regionem (è dextra enim nare fluebat sanguis) applicaretur, mandavi: quo procinque fluxus enormis cessavit, cum pro mortua & deplorata prius haberetur.

Alia etiam mulier cum profluvio sanguinis narium admodum vehementi & diu perdurante detineretur, neque ullis remediis restringeretur, tandem cinere chartarum albarum combustarum naribus demisso, præter spem sanata est. Addam,



& indubitatum experimentum ad sanguinem è naribus fluentem cohibendum, quod ipsimet vidibus sæpius expertum in Nobili Matrona. Hæc cum sanguis è naribus supra modum flueret, frustum cretæ albæ digito annulari continebat è regione naris fundentis sanguinem, donec incalesceret, & statim sanguis supprimebatur: ut diversis vicibus in eadem Domina spectavimus. *Petrus Forestus, observ. 10. lib. 13. De Nasi Affect.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Hemorrhagia Narium.*

**V**ir quidam cum mustum in cœna largius bibisset in multam satis noctem, & in fine etiam vinum Hispanicum, die subsequenti manè in fluxum sanguinis narium enormem incidit, ita ut ultra sex libras ferè sanguinis è nare sinistra profuderit; cum debillior fieret, me vocavit; ut de vena incidenda mentionem feci, id protinus amici ægro dissuadebant, cum sanguis è naribus largius profusus esset; à nobis tamen persuasus, cum sanguine repletus esset, & pulsus satis constaret, eo præsidio ad diversionem usus est. Secta ergo vena brachii sinistri cum hoc anacolema fronti circumligassem, & sterco porcino (asininum si reperiri potest magis laudatur) recens cum bolo armena mixtum, ne perciperetur quid esset ad olfaciendum naribus objecissem ab enormi sanguinis fluxu præter astantium opinionem curatus est.

Anacolema tale erat.

℞. Aq. ros. ℥iv. aceti rosac ℥i℥. bol. armen. ℥i. M. frigide cum panno lineo inculcato fronti alligabatur: & ubi incalesceret, novum denuò idque frigide apponebatur, neque aliis remediis uti necessum fuit. *Petrus Forestus, observ. 12. lib. 13.*

Cavendum ne ventosam umbilico applicemus, ne nobis accidat quod mulieri acciderat, *Gatinaria* referente, quæ obiit ventosa pinguedine repleta. *Id. Schol. observ. 12. lib. 13.*

Vir quidam Generosus sanguinis na-

rium profluvio cum extremè laboraret neque remedia commodè adhibita juvarent, circiter ℔xii. sanguinis ex utraque nare per vices effluxere. Cum ad eum accitus essem ut duas ventosas absque scarificatione, unam supra hepatis regionem, alteram supra lienis locum poneret, mandavi; quibus parum videtur fluxus subsistere. Verùm post meum discessum, uxor cum videret sanguinem iterum ex utraque nare cum impetu erumpere, & quod ventosæ hypochondriis, impositæ nullo modo juvarent, alias duas, unam supra pedem dextrum, alteram supra sinistrum affigi iussit, & dictu mirum, sanguis præter spem subito restrictus est: verum cum aliquanto tempore ventosæ cuti adhererent, æger in animi deliquium incidit, quare iisdem detractis, aqua in faciem conspersa excitatus est, & odore vini recreatus, ad se rediit: & à fluxu sanguinis narium per ventosas miraculi aut incantamenti instar, præter omnium opinionem restitutus est. *Petrus Forestus, observ. 14. lib. 13.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Hemorrhagia Narium.*

**P**rimò digitum annularem cum auriculari constringo. Postea admoveo fronti, cervicique hoc Cataplasma.

℞. Argill. ust. & contus. M. vi. aceti acris q. s. M. pro cataplasmate, quod duplici linteo inductum fronti atque cervici crebrò admovebam actu frigidum: & sic intra paucas horas ingentem, diuturnum, continuumque sanguinis fluorem per Deum gratiam compescui. Fumum etiam ex electro albo accenso per nares clauso ore excipiebat æger manè ac vespere per dies aliquot; quo sanguis quoque cohibitus, ac vires animales & vitales roboratæ valde fuerunt. Victus rationem observabat frigefacientem & siccantem: potuserat aqua chalybeata. *Martinus Rulandus, curat. 27. cent. 2.*

Vir quidam in sanguinis per nares fluxum valde copiosum incidit, ita ut intra diem circiter decem sanguinis libræ profluxerunt. Consultus mox fluxum repressi sequentibus remediis. Olfaciebat sterco sui-



lum, quo olfactorio statim remissius factum est profluvium: præterea lintea aqua chalybeata frigidissima imbuta applicabam fronti, collo, toti cervici & scapulis, item ad hepatis regionem: his factis fluxus desinit & rectè habere cœpit. *Martinus Rulandus, curat. 57. cent. 10.*

Cum præter naturam sanguis immodicè fluit, revulsionibus, diversionibus per sanguinis missionem, cucurbitulas & ligaturas, remediis item astringentibus & à proprietate quadam sanguinem reprimentibus sistitur. Quidam compressione quæ fit in curvatione vehementi digiti minimi in dextra manu si ex dextra nare fluat, vel in sinistra, si ex sinistra, reprimi senserunt. Aliqui arctius digitum istum serico rubro ligant; sed hoc remedii genus, ubi vel magna est intemperies in sanguine, vel venarum mala compositio parum profuturum videtur. Inter medicamenta à proprietate sanguinem reprimentia, lapis qui in capite carpionum reperitur, tritus, & in pollinem redactus, præsertim si cum lanugine, quæ in malis cydoniis hæret applicetur imprimis commendatur, item herba atque radix fragorum axillis subjecta, vel collo apensa, radix etiam ista & lapillus carpionis in ore teneatur. Sed in fervore sanguinis aquam fragorum bibere & genitales partes aquæ frigidæ, cui acetum admistum sit, imponere, & cum aqua fragorum sanguinem qui effluit lamina ferri candente exceptum, & pulverisatum assumere, vel pulverem istum cum pulvere lapidis carpionum mixtum ut dixi, imponere rectius est. *Joannes Crato. consil. 7. lib. 5.*

Hæmorrhagia narium si moderata; & per intervalla advenerit, ad tuendam sanitatem conducit, & a dolore capitis, aliisque morbis gravissimis liberat, ideoque non illicò sistenda est. Sin verò immoderata fuerit, protinus cohibenda, ne vires simul cum sanguine dissolvantur, partesque nobiles refrigerentur ac debilitentur, inde enim sequitur cachexia, icterica, hydrops, & hujusmodi morbi curatu difficiles, statim igitur turundæ ex carbaso paratæ, albumine ovi imbutæ, ac pulvere nostro ad sanguinem sistendum (cujus descriptionem vide supra lib. 6. sect. 9. conspersæ, na-

ribus immittantur lapis quoque qui in capite carpionum repetitur, in pulverem redactus & turundis inspersus a nonnullis commendatur. Muscum tamen, qui craniis hominum aeris expositis, adnascitur, in subtilissimum pollinem redactus, multò præstantiorem esse, non rarò expertus sum. Postea linteum replicatum, & postea imbutum, aut defensivum aliquod fronti & naso applicandum, quale hoc est quod sequitur.

℞. Farin. hord. ℥iij. sang. drac. bol. arm. terr. sigill. croci martis, cortic. granat. an. ℥j. succ. prunor. sylvest. inspissat. & aceto dissolut. ℥β. & cum album ovi, aceto, parumque aquæ aut omphacio, in mortario fiat defensivum, quod supra linteum extensum, fronti & naso frigidè applicetur, sæpiusque postea irroretur, ne exsiccetur, & incalcescat.

Si verò hisce fluoris impetus non sistatur, cucurbitula cum magna flamma, scapulis, cervici, natibus; & coxis primo absque, deinde verò cum scarificatione erunt applicandæ, maximo quoque cum fructu musculo anteriori cubitum flectenti, qui à nonnullis biceps appellatur: cucurbitulas cum flamma admovi, brachia & crura fortiter liganda, ut sanguis ad longinqua trahatur.

Juveni cuidam *Lausannensi*, propter maximam hæmorrhagiam de vita periclitanti, non solum genitalia linteis aqua & aceto madefactis, verum etiam totum ferè corpus involvi, brachia & crura arctè ligavi, pulveremque nostrum ad sanguinem sistendum naribus imposui: hinc sanguinis fluoremisit, & brevi convaluit.

Est & vena poplitis aut malleoli è regione naris sanguinem fundentis incidenda, dummodo id absque usu aquæ calidæ fieri possit.

Sequenti quoque potione sæliciter utor: temperat enim fervorem sanguinis, fluoremque sistit.

℞. Aqu. fragor. & centinod. an. ℥j. syrup. granat. aut de acetosil. citri ℥i. succus berber. ℥β. terr. sigillat. bol. armen. veræ & præp. an. ℥i. M. fiat potio, frigidè exhibenda Vel,

℞. Aq. plantag. & rosar. an. ℥iβ. troch. de



de terr. sigill. ℥i. syrup. de ros. sic. & de succo acetos. an. ℥ss. M. F. potio.

A vino, & ab eo, quod actu aut potentia calidum est, item à tussi, vociferatione, colloquiis, ambulationibus, & quavis motione corporis, æger abstineat, hac methodo multos feliciter sanitati restitui. *Guil. Fabritius Hildanus, Obs. 15. cent. 2.*

Est usnea cranii humani in pulverem redacta (ut ego multoties expertus sum) in hemorrhagia narium præstantissima, per se aut nonnullis aliis, veluti terra sigillata, pulvere ranarum præpar. & similibus mixta, & applicata. Cranii suspensorum usnea non adnascitur. *Guil. Fabritius Hildanus, Epist. 27.*

Sanguinem restringit muscus cranii humani in manu retentus. *D. Robertus Boyle, tractat. De Utilitate Philosoph. Natural. part. 2. sect. 5. cap. 14.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Hemorrhagia Narium.

**J**Uvenis quidam robustus ac plethoricus, cum sub sole tempore dierum canicularium supra modum incaluisse, posteaque sponsam suam, quam noviter duxerat, ardentius quam sibi pro conservanda bona valetudine conveniebat amplexus fuisset, hemorrhagia maxima narium correptus est. Vocatus ego omnia, quæ profutura existimabam præsidia, præscripti & admovi, sed frustra, quam ob rem cum hominem propter ingentem ebullitionem ac fervorem sanguinis, in maximo versari periculo, probè cognovissem, extremo huic affectui extremum potius remedium (in quo tamen spes aliqua) adhibendum esse, quam immaturam mortem expectare, adstantibus & amicis suasi, labrum itaque frigida impleri jussi, in quod totum corpus immergi. Sic frigefacto ac inspissato sanguine, fluxus paulatim restrictus fuit. Postea per dies aliquot sequens julapium bis in die exhibui.

℥℥. Aqu. bugl. & acetos. an. ℥ii. syrup. de succo limon. ℥i. M. F. julep. victus regimen tenue & refrigerans observavit, & sic brevi convaleuit. *Guil. Fabritius Hildanus observ. 17. cent. 2.*

Quidam hemorrhagia correptus est adeo immodica ut vires deiceret, ad eam cohibendam cum multa usurparentur remedia, hoc unicum profuit, nempe oxycratum per nares frequenter attractum, quo statim cohibitus est sanguinis fluxus, eoque post biduum denuo prorumpente, oxycratum iterum simili modo usurpatum confestim cohibuit. *Lazarus Riverius, observ. 23. centur. 1.*

Vir quidam robustus contumaci hemorrhagia ad extrema redactus fuerat, post multa remedia frustra tentata, tandem cujusdam medici consilio è lecto in pavimentum delatus est supra mattam laneam, & totum corpus contextum linteis oxycrato madidis per longum tempus, donec rigore correptus est, tunc enim ad lectum deportatus & rigorem febris subsecuta est, quàm sudor excepit, a quo curatus est, collum etiam iisdem linteis obducebatur. *Lazarus Riverius, obs. 5. cent. 4.*

Episcopo cuidam quinquagenario circa vesperam oborta est hemorrhagia, quæ per quatuor horas perseverans, sanguinis ferè lbii. æquavit, adhuc assatim fluebat, & vires concidebant, igitur cogitandum fuit de cohibenda hemorrhagia, & præscripta fuit venæsectio revellens in brachio dextro sal prunellæ in aqua frigida dissolutum, frontale adstringens, acetum in aurem instillandum, succus urticæ sumendus, cucubitula regioni hepatis admovenda linteum in aceto madefactum, quo frigide cervix erat obvolvenda, & ligatura extremorum: quibus nihil proficientibus, æger se alvum deponere velle dixit: nec potuit cogi, ut in lecto deiceret; præmonuimus si è lecto surgeret cum tanta exolutione virium, fore ut in syncopem rueret, attamen eam cohibendo sanguini fore perutilem, ita ferè successit, nam postquam surrexisset animi deliquium passus est, a quo statim excitatus est vino exhibito, & aqua frigida in faciem projecta, postea copiosè deiecit, & postquam in lectum delatus fuisset, sanguis multo minore impetu fluebat, postquam verò paululum quievisset, exhibitum est sal prunellæ ad ℥ss. in aqua frigida dissolutum, quo assumpto, statim sanguinis fluxus



fluxus omnino fuit cohibitus, nec aliis remediis opus fuit. *Lazarus Riverius*, observ. 48. cent. 1.

Quidam in *Montepessulano* passus est fluxum sanguinis narium per tres dies & noctes; & cum fecissem omnia quæ credebam utilia, nec potuissem sanguinem restringere, quædam vetula fecit infundi pannos lineos in forti aceto, & frontiejus, & circa collum sæpe & sæpius applicavit, & dedit illi mentham ad odorandum, & restrictus est. *Arnoldus Vullanovanus*, Pract. lib. 1. cap. 33.

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Hemorrhagia Narium.

**R**Evulsionibus quæ in usum vocari solent, aliquandiu usurpatis, si fluxus nihilominus perseveret, ad repellentia veniendum remedia, qualia sunt ea quæ anacollemata vulgò nominantur, fronti & temporibus applicanda, quæ ita componi poterunt.

℞. Bol. armoniac. terr. sigill. sang. drac. thur. mastich. aloes. an. ℥i. farin. volatilis, & pilor. lepor. minutim incis. an. ℥ss. album ovi, numero i. succ. plantag. & solan. an. q. s. F. cataplasma fronti & temporibus applicandum.

In casu urgente promptissimè parari potest cataplasma ex bolo armen. sola, cum album ovi, & aceto subacta, fronti ac temporibus apponendum.

Efficacissimum etiam paratur cataplasma ex gypso cum aceto subacto, & ad crassiciem duorum digitorum fronti & temporibus admoto & si prima applicatio non succedat, iterabitur, & certò curare creditur.

Faba aut numisma argenteum radici narium inter cilia admotum, & fascia arctè alligatum, ut fortiter partem comprimat, eundem fluxum cohibet, animadvertendum est an in temporibus, aut fronte venæ aut arteriæ tumeant: tum enim eas numismate aliquo, aut faba sicco per medium in longitudinem secta comprimere, fascia interveniente, optimum & supremum remedium est.

Præterea repellentia dicta, in usum revocanda sunt, quæ ipsas venas apertas occlu-

dere & conglutinare solent, in quem finem multa remedia in nares immitti consueverunt. *Galenus* thus & aloem in pulverem redacta albumine ovi excipit, & cum linteolo, aspersis pilis leporinis, in nares immittit.

Vel curanda in hunc modum parari potest.

℞. Thuris, aloes, sang. drac. farin. volatil. telæ araneæ. & pilor. leporin. minutim incis. an. ℥ss. excipiantur succo plantag. & gossipia, fiantque turundæ in nares frequenter immittendæ.

Potenter etiam sanguinem fluentem cohibet gossipium atramento infectum, quod in thecis scriptoriis asservari solet, si aliquantulum expressum, & in turundæ figuram efformatum in nares immittatur.

Tandem hæmorrhagia omnibus remediis pertinaciter obistente; ad escharotica veniendum est, quæ venarum extremitates apertas comburendo crustam inducunt, & sanguinem inhibent. In iis tamen magna cautio adhibenda est, quia dum eschara decedit, vasorum apertio plerumque renovatur, & sic fluxus redintegrari solet. Inter escharotica autem principem locum obtinet vitriolum ustum, quod præterquam quod escharam inducit, ad quemvis sanguinis fluxum cohibendum est efficacissimum, si mitius remedium habere desideres, vitriolum allis permiscendum est in hunc modum.

℞. Bol. arm. sang. drac. thur. aloes, gypsi, vitriol. ust. sarcocoll. mastich. an. ℥i. F. pulvis subtiliss. vitriolum album mitius operatur, quam vitriolum ustum, neque valde escharoticum est: hæmorrhagiam tamen potenter cohibet, officina venarum contrahendo, si in nares cum turunda ex gossipio facta immitatur.

Optimum est hepar & lienem epithemate refrigerante, vel etiam oxycrato tepido fovere ad sanguinis ebullientis fervorem temperandum.

Denique in contumacissimo affectu & allis remediis non cedente, ad narcotica veniendum, & inter cætera laudanum ad gr. iij. exhibitum, principem locum obtinet. Cavendum tamen est, ne ægro valde debili exhibeatur, periculum enim



enim est ne calor natus admodum debilis, narcotica vi omnino suffocetur.

Inter specifica succus urticæ miris laudibus effertur ad quemlibet sanguinis fluxum ex quacunque parte prodeuntem, maxima efficacia cohibendum: & ideo tum per os exhibetur ad ℥iv. semel atque iterum, tum per nares attrahitur; tum fronti & temporibus admovetur, in formam cataplasmatum cum farina subactus, vel tota urtica contusa dictis partibus admovetur; nonnulli asserunt radicem urticæ in ore detentam sanguinis fluxum statim constringere. Firmus porcinus inter præstantissima specifica etiam recensetur, si adhuc calens fronti & temporibus admoveatur, vel olfaciendus præbeatur, vel siccus in nares immittatur. Posterioris formula talis esse poterit.

24. Stercoris porcini exsiccat. ℥iij. pulv. rosar. ad fœtorem auferendum ℥ss. excipiantur succo plantag. in eoque intingatur bombax in nares immittendus.

*Finkius* testatur bufonem exsiccatum & pulverisatum in syndone rubra axillis suppositum vel manibus retentum, ut incalcescat, sanguinem statim figere, eumque veluti Gorgonis conspecto capite, statim rigescere, alii bufonem sub dio suspendunt, donec caro universa absumpta sit, os femoris denudatum servant, idque nari inditum, hæmorrhagiam in instanti cohibere asserunt. Dum remedia prædicta in usum revocantur, de omnimoda causæ ablatione cogitandum est, quæ ut plurimum solet esse humor tenuis, serosus aut biliosus in sanguine redundans eique motum præposterum concilians, naturamque ad illius excretionem irritans; unde fit ut humore illo evacuato, & sanguine repurgato, natura eum tanquam amicissimum, & familiarissimum, ac vitæ thesaurum retineat, neque amplius excernat, ideo purgatio instituenda est, bis terve iterata, si opus fuerit ex purgantibus adstrictione præditis, & refrigerantibus composita, in hunc aut simile modum.

24. Tamarind. ℥ss. fol. plantag. Mi. coq. ad ℥iv. incolat. infund. rhei el. ℥i. myrob. citrin. ℥ss. spic. nard. gr. vii. in express. dissolv. syr. ros. ℥i. rhei pulv. ℥i. F. potio.

In affectu inveterato & frequenter recur-

rente, talis purgatio semel in septimana repetita erit efficacissima; interim julepi adstringente post singulas purgationes exhiberi poterunt.

Cibi sint incrassantes & pauci nutrimenti, & sub forma liquida exhibeantur, ut sunt juscula refrigerantia, hordeata, avenata, & oryzata, cum aqua non jusculo parata.

Masticatio enim hæmorrhagiam promovet.

Si vires sint debiles, juscula carniū & panatellas exhibere oportet in quibus amyllum sine calce paratum, aut gummi Arabicum dissolvantur. *Lazarus Riv., prax. Med. lib. 4. cap. 7.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Hemorrhagia Narium.

**M**Emini expertissimum Virum *Emanuel Væzium* Avunculum meum quatuor *Lusitania* Regum Medicum cubicularium quinque sanguinis fluore per nares jam septuagenarius sæpe divexabatur, stercus asininum modicè exsiccatum in capsula semper ad manus habuisse, cui medicamento nullum aliud simile reperisse, sæpissimè referebat, præsertim si succo urticæ commixtum, cum sicco jam erat, aut recens per se naribus adhiberetur. *Rodericus à Castro lib. 1. De Morbis Mulieribus, cap. 5.*

Memini me virginem *Prage* curasse, quæ sex annis hæmorrhagia laboraverat ita vehementer, ut vix unquam hebdomada præteriret quin aliquoties illi sanguis efflueret. Hæc cum nullis remediis juvari posset, à me consilium petiit, qui prætermisissis aliis omnibus, quæ à Medicis præscribi solent, ut pote quibus ad nauseam jam diu usa fuerat, *Jaspidem*, cujus facultas ad hujusmodi symptomata mihi experientia non erat, illi commodato do, ut collo appensam gerat, paret illa, sanguinisque fluxus illicò sistitur, gestat per aliquod hebdomadas, nec rediit fluxus. Cum itaque se prorsus curatam opinaretur, deponit gemmam: post paucos dies rediit fluxus; iterum appendit *Jaspidem*, cujus beneficio mox liberatur. Cum ve-



rò singularem hujusmodi facultatem & & divinam miraretur (ut mihi retulit) experiundi gratia aliquoties à collo deposuit gemmam, ac semper animadvertit redire fluxum, nec curari, quin iterum appenderet. Observavit tamen, non statim seposita Jaspide redire, sed post multas prius elapas hebdomadas; appensa tamen, statim sisti, ita ut nulli aliæ causæ fluxus inhibito adscribi ab illa potuerit quam Jaspidi, tandem cum per aliquot menses à corpore gemmam deposuisset, nec unquam hæmorrhagia rediisset, mihi illam reddidit. Postea cum illam sæpius convenirem, asfirmavit non redire amplius fluxum, ac se omnino curatam esse. Erat Jaspis rubra. *Anselmus Boetius, lib. 2. de lapid. & Gemmis cap. 102.*

℥. Sem. hyosciami albi, & papav. alb. an. ℥ii. Conserv. rosac. ℥i. F. S. A. Electuarium, dosis, quantitas nucis moschatae vel juglandis. Hoc simplici remedio Medicus quidam præclarus enormes hæmorrhagias narium, uteri etiam, & aliarum partium sæpissimè curabat. *Dom. Robertus Boyle, tract. de Utilitate Naturalis Philosophiæ, part. 2. sect. 5. cap. 6.*

Aperiam quod mihi cum maxima languentium utilitate semper adhibere profuit. Bursa pastoris contrita si cum ovi albumine & aceto commista fuerit, & fronti applicetur, confestim sanguis constringetur, ut mihi non semel in infirmorum curam contigit. *Julius Caesar Baricellus, Hrtul. Genial. pag. 160.*

Cuidam febricitanti, die septimo hæmorrhagia copiosissima accidit, ita ut præ immenso sanguinis dispendio æger ferè viribus exolveretur, atque opis Medicæ pro sanguine sistendo maximè incumberet necessitas in hunc finem cum venæsectio in brachio, ligaturæ, epithemata cum capiti, tum imo ventri adhibita, & quamplurima alia remedia incassum tentabantur: tandem mulieris illuc casu occurrentis suasu, nari stillanti ferrum ignitum admovebatur, & de repente a vapore sanguinis torrefacti in nares suscepto, istius fluxus sistebatur, hoc remedium postea in plerisque bono cum successu usurpatum novi. *Thomas Willis, lib. De Febris cap. 11.*

A proprietate hæmorrhagiam sistit ster-  
cus suillum pro odore naribus objectum  
Parens meus admiscuit fragmenta ollæ  
veteris pulverisata, & sic ad miraculum  
sistit sanguinem.

Medicus quidam celeberrimus hæmorrhagiam narium sic curavit.

℥. Pulv. astringent. ℥i. album ovi con-  
quass. q. s. aceti parum M. applicetur fron-  
ti, & circa collum.

℥. Aq. spermatis ranarum, plantag.  
nymphæ, syrup. corall. an. ℥i. M: bi-  
bat frigide.

℥. Carnis bubulæ recentis, asperge ace-  
to forti, & impone nuchæ capitis. *Wolfgangus Hoeserus, Hercul. Medic. lib. 1. cap. 10.*

Hæmorrhagiam narium sistit pulvis bu-  
fonis exsiccati in nares insuflatus, vel laci-  
niis inditus, aut bufo integer sub axillis ge-  
stus. *Iohan. Hartmannus. Pract. Chymi-  
atr. pag. 114.*

Vir quidam hæmorrhagia insigni crucia-  
tus, cum curari non posset: tandem rela-  
tum ei fuit, quendam virum secretum ad-  
mirandum ad hæmorrhagias insigniores  
statim sistendas habere, sola herbæ contu-  
sa applicatione, coque remedio innumeros  
curatos fuisse; remedium igitur hoc habен-  
dum curavit æger noster, missa ergo fuit  
herbæ contusa & aqua in phiala, herbam  
plantis pedum & volis manuum applican-  
dam esse, neque viginti & quatuor horis  
amovendam scribebat secreti possessor, &  
mantile aqua frigida madefactum testicu-  
lis involvendum, naribusque indendas in-  
terioris cepæ partis turundas in aqua su-  
pradicta madefactas, naribus primò ea-  
dem aqua mundatis hæc omnia facta fue-  
runt tanto cum successu, ut nihil melius  
exoptari posset. Ego verò remedii addiscen-  
di desiderio flagrans portionem herbæ as-  
servaveram, qua diligenter explorata, ma-  
nifestissimè secretum agnovi, folium enim  
herbæ malè contusum & ferè integrum in-  
veni; aquamque ex eadem herba esse perce-  
pi, ut autem miseris ægris prodesse pos-  
sim, libenter eam nominabo. Urtica com-  
munis hæc herba tantæ virtutis est, hæc  
enim ut sæpe ab illo tempore expertus  
sum miros ad hoc produxit effectus, imò in  
vulnere equi magni pretii hæmorrhagia  
preuentis, quod etiam præstat si fronti ad-



moveatur. *Petrus Borellus cent. 1. observ. 95.*  
*Otho Heurnius* stupam sequenti aqua madafactam naribus inditam potenter hæmorrhagiam compescere tradit.

24. Aceti fortiss. ʒi. croci martis ʒi. colcothalis ʒi. M. In *Notis ad cap. 7. lib. 5. Pathologia lob. Fernelii.*

### SECTIO TERTIA.

#### *Pro Hemorrhagia ex dente avulso.*

**D** Omina quædam cum sibi dentem avulisset, tam copiosa hæmorrhagia successit, ut fermè moreretur, irritis omnibus remediis. Vocatus jussi ut emplastr. contra rupturam satis magnum tempori denti avulso respondentem admoveatur, item ut alveolo è quo dense extractus erat, parum colcotharis pulverisati adhiberetur eum cotone & digito contineretur. His factis intra horulam substitit sanguis. *Petrus Pachequus, observ. 28.*

### SECTIO QUARTA.

#### *Pro Hemorrhagia ex Vulnere.*

**C** UM miles quidam vulnus accepisset in brachio, quo radius & cubitus transversim secabantur, tanta secuta est hæmorrhagia, ut post varia astringentia admota, tum etiam caustica & escharotica, fluxus tamen sanguinis per intervalla recurreret, ita ut Medici & Chirurgi de brachio penitus amputando cogitarent. Ego verò cui æger commissus fuerat, linteum complicavi in formam cylindri, longitudinis trium digitorum transversorum, crassitiei pollicis, quod perpendiculariter in vulnus demisi: deinde plumaceolis reliquum vulneris spatium implevi, & quia cylindri extremum extra brachii superficiem pollicis crassitia eminebat, splenia quatuor admovi, quæ cylindrum æquabant firmabantque: ipsi verò cylindro quintum splenium, idque quadratum apposui, ac denique fascia arte ligavi: & ab eo tempore sanguis amplius non effluxit, vulnus autem non detexi per quatuor aut quinque dies, donec caro intus enata venæ orificium impleverit. *Samuel Fermus, observ. 1.*

Cum equus commendatori cuidam medicus digitum abstulisset, sanguinisque fluor, multis frustra tentatis, non sistebatur, jussi eum in pulli gallinacei vulnus recenter juxta podicem sectum, intrudere, & sic quam diu caleret retinere, fluorque statim substitit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 772.*

Hæmorrhagia à vena secta quam nemo sistere valuerat, solo aluminis tactu curata est. *Petrus Borellus, cent. 4. observ. 7.*

Rusticus quidam vulneratus in manu, arteriæ lasæ solutionem patiebatur, ubi hæmorrhagia sanguinis arterialis cum saltu frequenter invadebat, nullisque remediis communibus corrigi potuit, hic tandem ad collegam meum *D. Stromajerum* accedens, auxilium in hac periculosa hæmorrhagia desiderat cui pauxillum magisterii opii ad arteriam vulneratam opponitur, quo ad miraculum usque contumax hæmorrhagia mox restinguitur: vulnere post emplastro stictico *Crolliano* facillimè consolidato. *Gregorius Hortius, observ. 12. lib. 9.*

### SECTIO QUINA.

#### *De Hemorrhoidum dolore & fluxu.*

**A** PROPO'S licet quandoque pro omni sanguinis ex quacunque parte effusione accipiatur; in specie tamen usurpatur, pro sanguinis è venis ani fluxu. Definiri potest, quod sit sanguinis per venas & arterias ani profluvium, aut in illis tumor ab influente sanguine. Hæmorrhoides aliæ sunt cæcæ, quæ tument cum maximo dolore, quia, partes illæ acutiore sunt sensu, & sanguinem non reddunt: aliæ sunt apertæ, ex quibus in egerendi conatu sanguis copiosè eructatur: aliæ rursus sunt internæ, quæ à ramo splenico venæ portæ oriuntur, & in musculis ani, & intestino interiore cum socia arteria terminantur, & unica est: aliæ externæ, quæ à venæ cavæ ramo epigastrico procedunt, & in externas intestini recti partes diffinuntur, & hæ duplices sunt, cum duabus comitibus arteriis. Hic sanguinis profluxus moderatus si sit, salutaris est, & à gravissimis morbis liberat, sed si nimium fluat, aut fluxus consuetus supprimatur,



in quam plurimōs mōrboſ præcipitat; profluſit ſanguis in hæmorrhoidibus ob reſeratum vaſorum oriſiciū, à plethora, ſanguine vitioſo & aduſto, ob tunicam etiam eorum divitiā, ab acri intus in iſtis humore, aut exterius ab alvo tranſeunte, poſt fortium purgantium uſum. Cauſa cæcarum hæmorrhoidum eſt ſanguis tum quantitate tum qualitate peccans, qui ſi viam non inveniat, & vaſorum extremitates aperire nequeat, in iſdem congeritur, eaſque replendo tumorem efficit cum inflammatione & dolore maximo, qui ſua acerbitate omnes intentiones curativas ad ſe trahit.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### *Pro Hæmorrhoidum dolore.*

**N**obilis quædam Matrōna in puerperio doloribus hæmorrhoidum ſerè ſemper valde affici ſolebat; quæ cum multis fruſtra tentatis remediis, à dolore minimè liberari poſſet, tandem conſultum fuit, ut ſuberem lignum combureret, & cinerem ejuſdem cum vitello ovi, & oleo roſaceo linimenti inſtar ſimul commiſceret, quo remedio ut nobis retulit, dolores hæmorrhoidum miraculo quodam ſemper ſedabat. Ego autem in hæmorrhoidibus in quibus cruciat dolor, commodè ſæpe oleo ovorum ſolo uſus ſum aliquando vitellum ovi cum roſaceo, aut viol. oleo ſubegi: atque iſt tantum utebar. *Petrus Foreſtus, obſerv. 5. lib. 23. De Ani Affectibus.*

Tria adhuc remedia mihi valde familiaria & probata hæmorrhoidum dolori mitigando deſtinata proponenda duxi, oleum ex vitell. ovor. rec. extractum, oleum balſaminæ, & unguentum populeonis cum opii medico ac ovorum vitello: quibus digito exceptis anus liniatur. *Joh. Zecchiuſ, conſult. 37.*

Pro hoc malo tollendo balſamum ſulphuris ad ʒʒ. exhibeo: quo calido hæmorrhoides ſæpe maximè poſt excretionem perunxit, ac ſtatim ab acerbiffimo & odioſo iſto dolore liber ſanuſque factuſ eſt, nam valet hoc balſamum certò in hoc vitio, nec unquam fallit, ut experimenta innumera docuerunt. *Martin. Ruſ. curat. 87. cen. 1.*

*Burnet Parte I.*

ʒʒ. Unguenti popul. ʒi. opii torrefact. pulv. ʒi. M. applicentur parti. Ad ſedandos dolores ſecretum eſt oleum ſem. lini; item medulla cruris vituli. Unum tamen præ cæteris tanquam ſecretum propono, & experientia comprobatum eſt, & eſt balſamum ſulphuris, in quo peſſulæ intingantur, & applicentur tepidè loco affecto, ſic balſamum ſulphuris, ex floribus illius cum terebinthinæ ſpiritu. In eandem intentionem oleum buxi non minorem efficaciam habet in hunc modum.

ʒʒ. Ol. ſem. lini ʒʒ. ol. buxi ʒi. M. illinantur ex hæmorrhoides.

Si balſamum ſulphuris non reperia-  
tur, miſceantur flores ſulph. cum terebinth. multoties in aqua roſac. lota, & loco balſami ſulph. imponantur, habent enim hæc vim diſſolvendi laxandi & aperiendi hæmorrhoides cæcas ut effundant ſanguinem, quod præcipuè procurari ſolet in hoc affectu in quem uſum etiam aliquando applicantur hirudines: aperit quoque hæmorrhoides lac ficulneum, ſi confricentur folia ad invicem & apponantur. *Rodericuſ à Fonſeca, tom. 1. conſult. 27.*

Hic non celabo quod à *Caſtrenſi* quodam paſtore doctuſ ſæpiſſimè expertuſ ſum. Si quiſ hæmorrhoidum cæcarum inſano dolore torqueatur minimum quid *Scrophulariæ*, vel radicis, vel foliorum, cum cibo aut potu capiendo, ſtatim à dolore liberatur, ſive ipſam plantæ ſubſtantiam ſiccā aut viridē, ſive decoctum ejuſ adſumat. *Henricuſ ab Heers, obſerv. 20.*

Reſert *Orbo Heurniuſ Radolphuſ* Secundum Imperatorem cum immani hæmorrhoidum dolore cruciaretur, vapore Caſei *Hollandici Edamēſis* prunis impoſiti ab Empirico quodam curatuſ. *In Notis ad cap. 11. lib. 6. Patholog. Joh. Fernelii.*

### SUBSECTIO SECUNDA.

#### *Pro Hæmorrhoidum dolore.*

**C**um aliis multis & ſelectis medicamentis non juvabatur, ad balanuſ ex ſevo hircino cum opio conſectum conſugimus,



mus, quod dolor evanuit, nec postea rediit. *Amatus Lusitanus, curat. 91. cent. 2.*

Post multa & varia à medicis tentata præsidia, hoc remedio à nobis præsentato usus fuit, & brevi ab illo infestissimo dolore liber evasit. Habuit autem hoc topicum sic.

℥. Arantium pomum, id cultro excava, in quo oleum rosac. & lavendulæ semina infunde, & ad cineres calidos admove, & calidum applica & sæpe innova, est enim mirum. *Amatus Lusitanus, curat. 6. cent. 3.*

Protinus herbæ linariæ cum floribus M. i. aut ii. conquisivi; quibus contusis, & cum adipe porcina coctis linimentum fieri curavi: cui expresso & parumper refrigerato vitellum ovi permiscui, quod postea cum gossipio vel lana parti dolenti applicetur; quod huiusmodi dolores ad miraculum usque confestim sistit, hoc tanti fecit benè meritis & celebris in *Hassia* Medicus *D. Ioh. Wolffius* ut (quemadmodum ex ore ipsius habeo) tanquam secretum aliquod Illustrissimo suo Principi *Ludovico seniori Hassie Langravio* toties rogatus, non revelare velet priusquam ipsi annuatim bovem saginatum promitteret, qua promissione facta, non tantum herbam linariam ei monstravit, sed etiam addendo versiculum consuetum, differentiam huius ab esula patefecit: nimirum quod *Esula lactescat, sine lacte Linaria crescat*: alter per jocum versiculum invertit hoc modo. *Esula nil nobis, sed dat Linaria Taurum.* *Gregorius Horstius, observ. 50. lib. 4.*

Religiosus quidam mense *Augusti* correptus est dolore hæmorrhoidum acerbissimo cum tumore insigni, atque inflammatione. Vocatus ad eum, venæsectionem præscribo ex brachio sinistro præmisso clystere, postea fotum anodynum cum cataplasmate de mica panis, quod ferre non poterat propter exquisitissimum partis sensum. Secundo die iteratur phlebotomia ex brachio dextro, sumpsit julepos emollientes, & aliquantulum laxantes, ut alvus liquida servaretur, siquidem fæces induratae dolorem ad modum exacerbare solent, julepi erant huiusmodi.

℥. Fol. lactuc. bugloss. & summitat. malv. an. M. i. liquirit. ras. & passul. mun-

dat. an. ℥ss. flor. bugloss. borrag. viol. an. p. i. coquantur ad ℥viii. in colatura infunde cassiæ rec. extract. ℥i. colentur iterum & clarificentur addendo syrup. viol. ℥i. capiat bis in die.

Parti verò sequens unguentum admotum est.

℥. Ol. rosac. & viol. an. ℥i. unguenti popul. ℥ss. F. Linimentum.

Cum autem tumor & dolor perseverarent, admotæ sunt duæ hirudines hæmorrhoidibus extractusque sanguis ad ℥iv. & tensio atque inflammatio aliquantulum remissa est. Postea suffumigium sequens præscriptum est,

℥. Sempervivi mai. M. i. vini. alb. ℥ii. bulliant; huius decocti fumum recipiat in cathedra perforata. Deinde sequens unguentum parti admoveatur.

℥. Unguenti rosac. ℥i. mercur. crudi ℥ii. M. fiat unguentum: quamvis Mercurius eximiam vim habeat emolliendi, & tumorem discutiendi, durities tamen in parte permanebat; ideo ad molliendum, ac discutiendum tumorem, duo remedia præscripta sunt; primum fuit suffumigium aceti in quo silices igniti extinguebantur, quo scirrhosos tumores molliri *Gal.* docuit. Alterum fuit sequens linimentum post suffitum admovendum.

℥. Oleum amygd. amar. ℥ii. bdell. & styrac. liquid. an. ℥ii. M. F. linimentum.

His dolor & tumor singulis diebus multum imminuebatur, cui rei etiam multum contulit decoctum millefollii, quod per biduum sumpsit pro potu ordinario cum paucio vino.

Quia verò alvus continuo adstricta erat, ad eam laxandam, & simul causam antecedentem per epicrasin auferendam pillulæ præscriptæ sunt sequentes.

℥. Mass. pilul. de bdellio ℥ii. sen. mundat. rhei el. & agar. rec. trochisc. an. ℥i. cum syrup. rosat. solut. F. massa pilul. de qua capiat ℥i. Singulis diebus manè, donec massa assumpta fuerit: & hisce per aliquot dies continuatis omnino convaluit. Suffitus ex aceto ad tumorem discutiendum mirè profuit. *Lazarus Riverius, observ. 7. cent. 3.*



## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Hæmorrhoidum dolore.*

**V**Ir quidam sexagenarius dolore hæmorrhoidum molesto conflictabatur cum tumore & inflammatione partis, qui multis remediis non cessaret. Præscripti fofum ex aq. rosar. in cuius ℥vi. sal. Saturni ℥i. dissolvebatur: qui fofus pluries in die iterabatur. Postmodum cataplasma admotum est ex cepa alba sub cineribus cocta, & cum butyro subacta partibus æqualibus: intra biduum inflammatio sedata est, & tumor magna ex parte resolutus. *Lazarus Riverius, observ. 58. cent. 4.*

Ego à muliere stipem emendicante didici infundere millefolium in aqua fervente, & bibere infusionem illam per mensem integrum, aut diutius, & omnes tali affectu laborantes sanati sunt. Tandem hoc ipsum remedium reperimus apud *Arnoldum De Villa Nova*, cap. *De Hæmorrhoidum doloribus*. Id ipsum remedium ad fluxum illarum immoderatum valde confert, si prædicto *Arnoldo* credendum, & ratio etiam suadet. *Petrus Pachegnus, observ. 5.*

Succus vermicularis (sedum minus intelligo) linteoli, sæpius madefactis applicatus benè facit: mitius est, si cum hoc succo unguentum populeum misceatur, appliceturque ita dolorem sedat & pruritus tollit.

Elegans est remedium si crassulæ majoris (cotyledonis speciem arbitror) radix turgentibus primo vere foliis contundatur, in pila, teraturque cum oleo rosar. seponaturque in loco subterraneo aliquandiu, tum coquatur in duplici vase ad lentorem, isque illinatur & apponatur. Scrophulariæ etiam radicem verno tempore tundo, & cum recenti butyro subactam, sepono aliquot septimanas, tectam in subterraneo loco, deinde coquo & reservo ut unguentum istis doloribus aptum. Soleo etiam æstate flores verbasci recentes legere & indere in ampullam vitream, eamque seclusam exponere Soli, ita paucis diebus solvuntur in liquorem: hic illitus calidè dolentibus hæmorrhoidibus, item fluentibus, mirifice utilis est; quod experiri ipso usu probatissimum. Si vero

sine insigni calore aut acrimonia pressæ aut tensæ doceant, tum non utile est refrigerantia adhibere: ea enim difflatum impediunt, & impactum sanguinem magis compingunt: sed tum prodest laxantia discutientiaque admoveere, quæ si præter istas facultates, etiam habeant quod dolorem sopiant, profutura sunt magis. Hic convenit semicupium in aqua mediocriter calida, quæ incoxit rad. & fol. althææ, malvæ, rad. scrophular. flor. aneth. meliloti, chamæmeli, & sem. lini: inde abstersus locus dolens illinatur oleo momordicæ, quod efficacissimum est, vel oleo ex floribus arboris persicæ quo ego sum in isto casu usus magna cum laude. Si defunt, commodissimum erit oleum ex flor. Sambuci. Sic medius cortex Sambuci oleo simplici, vel lini, vel nucum incoctus efficit oleum ad illitonem in tumore & dolore hæmorrhoidum salutare. Si memini *Alexius Pedemontanus* id idem quoque annotavit.

Ego accepi lardum vetus rasum, cum cera recenti aut propoli, ubi haberi potuit, & pauco oleo lini, addidi corticem Sambuci interioris tustum, inde simul cocta, & colata in aquam frigidam assumpsi ad ungendum dolentes hæmorrhoides, non inutile, ubi efficacius defuit: paratu etiam facile est & commodum, cepa alba cocta vel porrum & butyro subacta, vel vitellus ovi cum rosar. utilia etiam sunt, quibus si tantillum croci addatur, efficaciora fiunt medicamenta.

Facit aliquando doloris acerbitas, ut stupefacientia adhibere sit necessarium, sic opium aliquando admiscemus linimentis: dextrè tamen id agendum, ne podex narcoticis refrigeratus non præstet officium. *Avicenna* Philonium quod *Tarsense* describit, applicat. Ego sæpe numero recentibus theriaca vel mithridatio ad motis & dolorem compescui, & siccata discussaque influxa materia tumorem sustuli. Sunt præterea alia medicamenta quæ & nimium fluentibus, & quia astrictæ sunt, dolentibus utilia sunt. Ego adhuc adolescens, vidi *Tarquinius Schollenbergium* Medicum Empiricum omne vitium hæmorrhoidum curantem chelidonio minore is secrete integram herbam siccata in manipulos collectam cerevisiæ macerabat,



propinabat, & aquam ejus destillatam adhibebat lotionem & fotu exterius per linimenta. Postea illa herba ego multis modis ad hunc effectum feliciter sum usus: succus frequenter illitus expeditius juvat, quàm aqua, herba etiam tusa apposita medetur: flores quidam, alii herbam commiscent, ovi vitello coquunt, & in placentula manè edunt: huic herbae ego ad hæmorrhoidum vitium mirabilem efficaciam tribuo.

Novi Chirurgum apud nos, qui in hæmorrhoidum dolore; tumore & fluxu, crassulam maj. nec non Scrophulariam herbas integras cum rad. utriusque part. æq. puta M. i. concisas macerat cerevisia, eamque offert manè & vespere bibendam: his si chelidonii minoris tantundem adderetur potio redderetur efficacior: in harum enim trium herbarum radicibus, characterissimum affectus hujus evidenter natura impressit.

Adscribam medicamenta duo, oleum & unguentum, quibus ego usus sum antehac, & utor feliciter, utrumque implicitæ rationis, in altero tamen scientiæ evidentia major. Conficitur oleum ex bruchis stercorariis autumno hoc modo, quod oleum Scarabæorum vulgari nomine voco.

℞. Ol. lini ℥i. brucos stercorarios vivos, bene pastos, numero 56. eos ordine comprimo, conteroque inter duos politos lapides, atque contritos, injectosque in oleum coquo lento igne in vase terreo tecto, ad tertiæ partis olei aut medietatis consumptionem, inde colatum oleum asservo, in eoque tutiæ optimè lævigatæ, aut pompholygos aliquid dissolvo, quo inungo hæmorrhoides si in conspectum veniunt, sin intus in ano latent, jubeo guttatim per anserinam pennam instillari, dolores sedat, & hæmorrhoides mirum in modum perfanat.

Unguentum ad eundem affectum hoc modo conficio.

℞. Ol. viol. ℥ii. asellor. in subterraneis & humidis locis degentium ℥i. (si mediocres sunt 100. aselli ut plurimum ℥i. pendunt) istos tusos indo oleo, atque in vase terreo leviter coquo, tum addo ceræ albæ rec. ℥ss. deinde colo, & exprimo in aquam frigidam, atque subactum bene, refrigeratumque recondo in usus. Si latent, lini-

mentum in formam glandis involutum isto oblitum suppono, atque splenium eodem indutum superaddo. Si exterius prominent, unguentum in splenio superdare satis est. Desiccat hoc idem, discutitque magis. Si una aut altera radix serpentaria vel ari decorticati & tusi oleo simul incoquantur: his ego magno ægrorum commodo uti solco, quæ omnia lubens tibi communicare volui. *Reinerius Solenander, consil. 20. sect. 4.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Hæmorrhoidum dolore.

**A**D hujus affectus curationem, primò sanguis detrahendus est ex venis brachii, ut fiat revulsio à parte affecta: quæ sufficienter celebrata derivationis gratia vena malleoli etiam aperienda est.

Interdum ad humoris acrimoniam demulcendam, emulsionem quatuor semin. frigid. exhiberi poterunt,

Inter topica *Quercetanus* valde commendat oleum nucum expressum, in quo bullierint millepedes in oleo communi, eoque dulci possunt etiam aselli decoqui, & dolorem mirabiliter sedant. Vel,

℞. Mucilag. sem. psyll. ℥ii. ol. viol. ℥iii. F. linimentum. Vel.

℞. Mucilag. sem. psyll. & fœnugræ. cum vino extract. an. ℥ii. butyr. rec. ℥iii. sevi hædini ℥i. agitentur simul in mortario plumbeo. F. linimentum: vel butyrum solum in mortario plumbeo ductum ad Solem donec nigrescat, est egregium remedium. Pomata etiam recens parti admota est valde anodyna.

Cataplasma etiam ex medulla panis albi in lacte decocti, addendo oleum rosac. & vitellos ovorum commodè usurpatur.

Portulaca contusa & admota dolorem sedat, tumorem imminuit, ulcera consolidat, & excrescentias carneas absumit.

Cepa alba sub cineribus cocta, & cum butyro rec. subacta instar Cataplasmatidis, dolorem sedat, & tumorem discutit.

Fotus admoventur eidem parti, ad dolorem sedandum, ex decocto tapsi barbatii, malv. bis malv. parietar. sem. lini. fœnugræ. althææ, flor. chamæ. & anethi in lacte.



laſte parato: vel in hydralæo, vel juſculo inteſtinorum vervecis: inſeſſus ex eodem decocto, aucta quantitate ſimplicium, parari poteſt: aqua frigida pro ſotu utiliſſima.

Ad tumorem diſcutiendum convenit ſorus ex alumine in vino rubro decocto. *Aqua pendens* admovet ſpongiam ex aqua calcis expreſſam, & ſupra Partem alligat.

Ad hæmorrhoides abſumendas & exſiccandas convenit ſuffumigium ex pulveribus lolii, tapſi barbati, ſcrophulariæ, ſuper prunas conſectis: at efficaciſſime fiet ſuffumigium, ſi ſulphur ſimul uratur: imò verò ex ſulphure ſolo ſuffumigium paratur, & per tubulum exceptum hæmorrhoides cæcas, & latentes potenter exſiccant: mirum in modum conſert injectio ſequens frequenter uſurpata.

℥. Succi plantag. ol. viol. an. ʒ. xv. baſami naturalis ʒβ. M. F. Injectio in anum.

In communi uſu eſt pulmo hædinus ex animali adhuc calens parti applicatus.

In iis qui huic affectui valde obnoxii ſunt causticum tibiæ utiliſſimè admovetur. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 10. cap. 11.*

Succus ceparum cum aloe miſtus & panno aſperiori fricando applicatus aperit hæmorrhoidas. *Joh. Hartmanus, Practic. Chimiatr.*

Habet ſudor morientium mirificas vires mortificandi hæmorrhoides & excreſcentias. *Joh. Helmontius, tract. cui tit. Latex humor neglectus.*

Ad cæcas hæmorrhoides, quibus ſubinde affligebatur avus meus, hoc pulv. experimento ſuo utebatur.

℥. Antimonii pulver. ʒii. hermodactyl. ʒβ. boli arm. ʒi. M. F. pulvis: applicetur cum cottone quoties egeritur. *Acchilles Gaſſerus, obſerv. 42.*

Obſtetrix Gallica lib. 3. pag. 24. medetur dolori hæmorrhoidum etiam gravidis & parturientibus moleſto, hoc unguento:

℥. Milleped. q. ſ. contund. & probè miſc. cum pulpa pomorum acidorum cocta, & applica cum linteo bis in die manè & vespèri. *Wolfgangus Heſſerus, lib. 3. Hercul. Med. cap. 5.*

Quidam habuit hæmorrhoides intus, & maximum dolorem continuo patiebatur. Accepit plantaginem & tapſum barbatum

ac contrivit eaſ aliquoſque, & admovit anno, ter in die renovando, & toties in nocte, & intra paucos dies liberatus eſt. *Arnoldus Villanovanus. Pract. lib. 2. cap. 33.*

Inſulanus quidam vehementi hæmorrhoidum dolore torquebatur, qui nullis anodynis præſcribi ſolitis cedebat. Tandem à quodam docto Germano illac tranſeunte monitus, multis ſotibus ex remollientibus repetitis, unguentum de ſucco nummulariæ cum butyro rec. non rancido parari juſſi, quo turunda illita & ſenſim intromiſſa dolorem compeſcui. Unde ſomnus optatus ſenſim ſurrepſit, appetentia revocata fuit. Eidem ægro paulò poſt inteſtinum rectum prociduum fuit, quod hoc remedio curatum nunquam poſtea foras exiit.

℥. Ol. maſtich. q. ſ. in eo bulliant ſcarabæi num. 8. Deinde hoc oleo ungatur inteſtinum ſupra aſperſo pulvere putaminum overum, ex quibus pulli fuere excluſi. Idem Germanus mihi aſſerebat ſuccum blattariæ itidem mirè dolores omnes hæmorrhoidum mitigare. *Obſerv. infreq. Riverianis annexis obſervatio 27.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Hemorrhoidibus nimium fluentibus :*

**S**I profluvium grave eſt, internam venam in brachio ſecare poterit, quod id remedium expeditum eſt, & efficax. Si profluvium diu duravit, viresque attrivit, ne ſpirituum fiat ſubita eductio, partiri ſectionem in vices decet, ita & viribus minus incommodi inferetur, & revulſio fiet iteratis retractionibus evidentior: ſi nec ita impediatur profluvium cucurbitulæ ſine vel cum ſcarificatione affigendæ: aſfixæ hypochondriis potiſſimum ſiniſtro, profluvium egregiè retinent, illud præcipue quod ex portæ venæ ramo derivatur; & ſcapulis primum, deinde lumbis ad motum efficaciter fluxum retinent, qui ex cavæ venæ propaginibus derivatur: exhibeatur demum potio purgans ex iis quæ ſæculentum, craſſumque, item bilioſum humorem & ichorem melancholicum ducunt, & membra interim abobſtru-



structione vindicata corroborant: inter alia author sum ut rhabarbari usum sibi familiarem faciat. Si profluvium diutius protrahi incipiat ex floribus verbasci & ovo placentulas confectas quotidie edat: & vespere cum decumbendum est, suffitum ano excipiat è sella perforata a concisis verbasci foliis molari ignito lapidi injectis, excitatum: tum plantaginem & verbascum simul tufas ano admoveat, vel calendula tusa succo pororum incocta imponatur, quod est singulare: hoc modo sæpe firman- tur nullo efficaciori adhibito. Si gravior urgeat sanguinis profusio, utatur istis pilulis, quibus in hoc affectu efficaciter uti soleo.

24. Pilul. è bdellio. ℥i. troch. è terr. sigill. troch. è carabe, an. ℥i. cum mucilagine sem. cotoneor. ex aq. ros. extract. F. massa, & ex qualibet ℥. pilulæ ix. ex his diglutiendæ iii. mane ante prandium, & vespere ante cœnam totidem: non est quod quem terreat in harum pilul. exhibitione. *Rondeletii* censura, vulgare nostrum bdellium myrrham esse arbitrantis: nam hic fidem facere possum, me in usu istarum ut sunt præscriptæ, atque cum usitato bdellio compositæ, effectum quem promittunt tam evidentem deprehendisse, ut de compositione dubitare vix queam; nisi quis putet ab adjectis siccantibus & adstringentibus hoc quaecunque quod recipiunt myrrhæ obtusum superatumque esse. Exhibui in hoc casu aliquando troch. è carabe solos cum decocto sumach. Cum alias profluvium fuit instantius, & humor eo delatus calorem induxit; applicui ad anum quod sequitur.

24. Succ. plantag. ℥iib. aq. ros. ℥vi. pulv.umat part. iib. fl. verbasci. roris marin. siccat. an. part. i. redige S. A. in emplastr. Si postulat necessitas, licebit sanguinem drac. bolum armen. malicorium & id genus alia addere. Ista enim foris adhibita minus nocent, licet intus frigidiora omnia sunt suspensa: atque omnia ista utilia sunt, undecunque sanguis profluat; quod si constet ex cavæ venæ propaginibus prodire, jam licebit inferiorem lumborum, & dorsi partem unguento comitissæ vel simili astringente & refrigerante illinire.

Memini me in M. S. antiquo libro legisse

quod tria semina genistæ quotidie manè sumpta, & hæmorrhoidum & sanguinis è naribus profluvium sistant, cui licet nulla manifesta ratio subsit, nisi quis putet, ideo hoc fieri quod ad urinæ vias avertant, indicare tamen id tibi volui, quod experimentum sit facile & sine ullo periculo. Novi qui sanarunt quos nimium profluvium ferè confecerat, ut hydropis periculum adesse videretur, exhibita herbæ chelidonii aqua destillata, sed quia acris est admodum, libentius utor herba ista cerevisia vel etiam vino macerata. *Reinerus Solenander, consil. 20. sect. 4.*

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Hæmorrhoidibus nimium fluentibus.*

**P**ulvis bufonis combusti vel ranæ terrestres positus supra hæmorrhoides, dicitur eas stringere à proprietate. *Petrus Forestus, schol. observ. 6. lib. 23. De Sedis & Ani vitis.*

Cuidam mediæ ætatis nimia præcipitatione fundebantur hæmorrhoides. Cum Medici & Chimici cuncta tentassent, nec successissent, jussi ut una intacta reliquæ tangerentur colcothare; ita appellant crassamentum illud à vitrioli olei destillatione relictum: illicò constitit, vivit: præstitisset tamen sensim aliqua die id actum fuisse. *Ioh. Haurnius ad aphor. 14. sect. 6.*

A proprietate quadam valet cingulum ex foliis recentibus hellebori nigri conquisitis, nudo corpori circumdatum: hoc feliciter usus sum; præstat idem in immoderatis fluxibus mensium, & sanguinis arteriosi post partum gravissimum sæpe magno conamine profluentis. Laudatur etiam hic essentia croci Martis. *Ioh. Hartmannus, præct. chymiatr.*

Cum sæpenumero per multos dies, imò etiam menses gravi hæmorrhoidum fluore opprimor, adeo ut vires vacationis huius copia dejiciat, & pro sanguine nigro ac crasso, ruber jam fluat, hunc fluxum sisto aptando crebrò alternos sacculos calidos ex rubro panno & contusis glandibus, vel quercinis foliis in forti aceto multum decoctis factos, quibus ocyus fluor



consistit. *Martinus Rulandus, cent. 1. curat. 7.*

Pinguedo anguillæ quæ dum torretur exudat unguentis addita proprietate quadam agens, ipsa efficaciora rediit.

Fungus qui crepitus lupi nominatur, siccatus levissimus & subtilissimus in podicem insertus, admodum fluorem sistit: uti & telæ aranearum, & leporis pili subtilissimi.

Sanguis humanus, vel aliorum animalium fervidus adhuc injectus, mirabiliter sanguinem ex alvo profluentem cohibet. Pulmo etiam arietis modò exemptus, tepens adhuc & cruentus podici subjectus, magnam in sanguine sistendo habet efficaciam: oleo vitrioli venam tangere efficax est remedium, vel in extremo periculo aqua forti appellata: cauterium actuale extremum erit remedium: uti & si vena volsella apprehensa, atque elevata, & filo sericeo vel seta cum acû subducto ea vinciri possit.

Hæmorrhoidum, ut & mensium, & post partum sanguinis immoderatum fluxum, proprietate quadam occulta sistunt folia hellebori nigri recentia conquassata, & cum fasciâ corpori, ut nudum corpus tangant, cinguli instar circumligata, reiteranda toties quoties priora siccata fuerint. *Felix Platerus, prax. tom. 3. pagin. 646.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

*Pro Hæmorrhoidibus nimium fluentibus.*

**C**onsiliarius quidam immodico hæmorrhoidum fluxu laborabat a quinque vel sex diebus, quo sanguinis ℥viii. vel x. singulis diebus profundeabat: post venæ sectionem, julepos refrigerantes & incrassantes, aliaque remedia interna & externa frustra adhibita, cum res urgeret, & æger admodum debilitaretur, præscripsi succum urticæ levi ebullitione depuratum ad ℥ii. cum paucis saccharo, & hoc solo remedio fluxus omnino cohibitus est. *Lazarus Riverius, observ. 81. cent. 4.*

Purgatio blanda humores biliosos sanguinis impetum conciliantes ad intestina

derivat; eaque fieri debet expurgantibus adstringendi vi præditis, ut rhabarbaro, myrobalanis, & tamarindis. Docet *Mercurialis* tamarindos præcipuè, ad compescendum hujusmodi sanguinem fluentem, miram quandam potestatem habere, tam decoctos, quam in substantia usurpatos.

Inter topica fots ex verbasci decocto in aqua ferrata vel vino astringente parato convenientissimus est: hæc siquidem planta hæmorrhoidum fluori, & dolori appropriata est: in usu fomenti diligenter observandum, ut frigidè vel saltem tepidè admoveatur: magis composita decoctio in hunc modum præscribi potest.

℥. Rad. bistort. ℥ss. fol. plantag. verbasce. summitat. rubi, & quercus, an. Miiss. granor. sumach. balauft. gallar. virid. & malicorii, an. Mi. myreill. dr. β. rosar. rubr. p. ii. alumin. ℥i coquantur in tribus partibus aquæ ferratæ, & una vini rubri austeri pro fots: ex hac decocto, aucta dosi simplicium, potest fieri infusus, quo utatur æger subfrigidè.

Unguentum comitissæ ad fluxum cohibendum utilissimum est, eoque inungi debet dorsum & hæmorrhoides, vel in rem præsentem tale componi poterit.

℥. Ol. rosat. omphacin. & myrtill. an. ℥ii. succi plantagin. & tapfi barbat. an. ℥ss. aceti vini rubr. ℥i. bulliant ad succorum consumptionem, deinde adde bol. arm. sang. drac. thuris & scoræ ferri subtiliss. pulv. an. ℥i. ceræ q. s. F. unguentum.

*Rondeletius* magis probat unguenta quæ sine oleis parantur, quia magis astringunt, eaque in hunc modum parat.

℥. Succ. plantag. bursæ pastor. & tapfi barbati, an. ℥ii. syrup. acetos. simpl. ℥iii. coq. simul leviter; postea misce sang. drac. ℥i. bol. armen. terr. sigill. & rad. bistort. subtiliss. pulv. an. ℥ss. ceruss. lotæ ℥ii. M. ad formam linimenti.

Si hæmorrhoides sine exulceratæ, sequens parari poterit.

℥. Ol. rosac. ℥ii. thuris & aloes; an. ℥i. sarcocoll. sang. drac. bol. arm. an. ℥ss. spodii, carabes, an. ℥i. amyli ℥iii. succ. plantag. ℥i. F. unguentum.

Cataplasmata dictis partibus utiliter admoveatur in hunc modum.

℥. Bol.



24. Boll. armen. aloes, mastich. thuris sang. drac. an. ℥ss off. myrobalan. indor. & gallar. an. ℥i. subigantur cum albumine ovi & succo plantag. F. Cataplasma.

Suppositoria huic usui sunt valde idonea, quia penitus in partem demittuntur. Horum formatalis est.

24. Colophon. thuris an. ℥iii. bol. armen. ℥ss. ceruss. plumbi usti, an. dr. i. acaciæ dr. ss. subtiliss. crita excipiantur sevo hircino pro formandis suppositoriis.

Injectiones per syringam in anum fiunt ex succo plantag. aliisve supradictis ad fortum propositis. Suffitus etiam in eundem finem utiliter usurpantur, ex decoctis fortum prædictorum parati: quibus addi potest sequens.

24. Thuris, aloes, mastich. ros. rubr. myrtill. & absinth. an. dr. ss. troch. de carab. dr. i. F. pulvis crassior carbonibus injiciendus: cujus fumus recipiendus est in cathedra perforata per infundibulum amplum, cujus angusto orificio aptetur tubulus ex ligno, vel argento, in anum demissus. Suffitus ex decocto tapsi barbati omnium fere utilissimus est.

Toto curationis tempore utatur æger potu ordinario aqua ferrata vel decocto millefolii.

Curato fluxu de præcautione cogitandum est ne iterum redeat: quod fiet victus ratione convenienti, phlebotomia bis aut ter in anno usurpata: purgatione usuali cum caustico tibiæ admoto, aliisque hujusmodi, quæ varianda sunt, juxta varias corporum dispositiones. Præterea aquæ minerales vitriolatæ, aluminosæ, & ferratæ, erunt convenientissimæ.

*Fonsæca* commendat ad præcautionem hujus affectus decoctum lentisci, vel ejusdem infusionem in vino, paratum in hoc modo.

24. Rasur. lentisci ℥ii. infundantur in lb. xii. vini per viginti quatuor horas in loco tepido. Deinde colentur, & de hoc vino bibat pro potu ordinario per mensem integrum. Habet enim vires sistendi hæmorrhoides, tum etiam ventriculum roborandi. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 10. cap. 10*

Experimentum probatum ad hæmorrhoidas constringendum. Decoquatur ca-

lendula in succo porrorum, & supra epithimetur: quia pro certo statim restringit. Probatum est. Comedant omni mane placentulas ex ovi vitello & flor. verbasci cum mica panis & aliis confectas, sed in majori quantitate de floribus ponatur. Vespere accipe lapidem molarem & calefiat fortiter, donec rubescat; deinde frondes tapsi barbati super aspergas, & patiens fumum accipiat per anum sedens in sella perforata. *Arnoldus Villanovanus, Pract. lib. 2. cap. 34.*

## SECTIO SEXTA:

### De Hemicrania.

V Ide supra, Libro 3. sect. 18. De Capitis dolore.

## SUBSECTIO PRIMA:

### Pro Hemicrania per consensum ventriculi.

M Ultis peractis remediis ad decoctum ligni buxi confugimus, quo multum sudavit, & ita valuit ut intra viginti dies ab ejus potu æger optime habuerit, nec amplius in eundem morbum reciderit. Cæterum scire decet lignum buxum, *Europæis* frequens, & *Cordonibus* satis notum, lignum guajacum esse quod superioribus annis ex *Peru* & *Insulis* noviter reperies asportari cœpit, quod tamen ex *Insulis* iis adfertur pinguius, & per consequens calidius est, nostrum verò moderatiorem fortitur temperaturam, ac proinde iis qui calidiori sunt temperatura, & morbo calidiori affliguntur, præcipue in æstate, liberalius ejus decoctum damus guajaci decocti vice, nec enim aliter inter se differunt hæ arbores quam Soli diversi ratione. Nostrum verò hoc lignum buxum unice jecur plus justo calidum emendat, & sudorem egregie evocat, ut sæpe experientia compertum habuimus. *Amatus Lusitanus, centur. 3. curat. 36.*



## SUBSECTIO SECUNDA,

## Pro Hemicrania graviter affligente.

**P**eractis venæ sectione & purgatione, pro discutienda materia à capite, fœtus ex spongia madefacta in decocto chamæ. anethi, beton. verben. in vino austero atque aqua parato. Verùm ea hora qua dolor ingruere solet, caput oxyrrhodium muniendum ad dolorem leniendum confert unguentum alabastrinum, oleum etiam ex vitell. ovor. cum lumbricato, imò verò frustum carnis super carbones ignitos & calefactum maximè prodest, ad qualitatem autem pravam (si quæ subsit) delendam, & dolorem proprietate recondita tollendum, omnibus præfero linimentum ex theriaca media ætatis in succo betæ nigre & aceto liquata: nec usque ejusdem theriacæ recentioris, vel pilul. de cynoglossa per os qualibet hora dolor insævierit inopportunos mihi censetur. *Julius Caesar. Claudinus, Consult. 76.*

℞. Aquæ vitæ optim. saliv. lavend. an. ℥i℥. camphor. croci an. ℥i. M. F. fœtus, quo foveatur calidè locus affectus.

Postea applicetur capiti ea parte raso hoc Cataplasma.

℞. Medull. panis albi ℥℥. sem. scænugræc. lini an. ℥j. fursur. farin. fabar. an. Mj. coq. in sufficienti quantitate lactis vacini ad consistentiam Cataplasmatidis, adde vitell. ovor. numero 2. croci, camphor. an. ℥j. M. F. Cataplasma.

Cùm alvus egrè ferretur præscripsi hunc pulverem.

℞. Agar. albi℥. ℥℥. machoac. ℥i. cinnamom. ℥℥. M. F. pulvis pro duabus dosibus, sed ecce; cum maritus unica vice integrum pulverem præbisset, alvus copiosè soluta, ægraque valde alleviata fuit. *Ioh. Petrus Lotichius, Observ. 4. cap. 1. lib. 2.*

Quia interna nollebat admittere medicamenta hoc oxyrrhodium vel potius emulsionem loco affecto & fronti applicavi.

℞. Amygd. d. depilat. & nucleor. persic. an. ℥vi. sem. canab. papav. alb. an. ℥v. spec. diarrhod. abbat. zedoar. cariophyl. pulv. an. ℥℥. camphor. acet. solut. gr. iv. acet. rosac. ℥i. aq. verben. beton. ros. an. ℥iii. spirit. rosar. (ad gratiam odoris) ℥i℥. M. diligen-

ter. F. emulsio, illico savissimus dolor placatus est. *Ioh. Petrus Lotichius, obs. 6. cap. 1. lib. 2.*

In dolore hemicranio a causa calida oriundo, & in dolore illo, qui a *Gordonio* clavus nominatur, qui est dolor fixus in temporibus, arteriotomia mirificè prodest, quam tutò celebravi in plurimis vulnus alligando simplici splenio ex linteo complicato confecto, & aqua frigida madefacto, ut in vulgari phlebotomia, fasciâ super inducta, quæ a *Galeno* lepus sine auribus nominatur, neque ulla unquam secuta est hæmorrhagia, item vidi cephalæam diuturnam curatam in nosocomio admoto caustico potentiali super arteriam temporalem. Decisa enim eschara cauterii potentialis supra venas & arterias admoti, nullus sanguinis fluxus emergit, quia provida natura, dum escharæ separationem molitur, simul novam carnem generat, qua venarum oscula teguntur. *Samuel Formius obs. 31.*

Non silendum præsens hemicraniæ, pertinacis remedium *Adriano pigelio* in semetipso aliisque exploratum, nimirum incisio venæ quæ inter indicem pollicemque excurrit. *Ioh. Rhodius obs. 76. cent. 1.*

Quidam diu passus est dolorem frontis omni die circa vesperam valde fortem, qui longo tempore remedium non invenit tandem edoctus emplastrum sibi fecit ex nucleis persicorum bene pistis, & fuit perfectè curatus & multi alii. *Arnoldus de Villa nova Medic. Practic. lib. 1. cap. 8.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

## De Hepatis morbis.

**H**epar, cujus officium est sanguinem è vena portæ exceptum ab humore fellico separare, depuratumque in venam cavam deducere, compluribus variisque patet affectibus, quales sunt intemperies calida & frigida, obstructio, scirrhus, inflammatio & dolor, &c. obstructio jecori admodum familiaris est, nulumque viscus hoc æquè vitio tentatur, quod vena portæ per ejus substantiam in ramos tenuissimos dissipata faciliè obliteretur.



tur. Ejus causa sunt. Prima, Ineptior partis permeabilitas ob frigus, res astringentes, contusionem, compressionem & ligaturam. Secunda, Sanguinis ad permeandum ineptitudo ob copiam, crassitiem & visciditatem. Tertia, Partis à plenitudine oppressio, ob victum plenior, intermissa exercitia & evacuationum confuetarum suppressionem: hunc affectum ostendit gravitas, & distentio cum obtuso dolore, dextro insidens hypochondrio, cum præcipue manifesta, quum quis mox à cibo exercitationem subit.

Scirrhus hepatis tumor est in illa parte præter naturam durus ac renitens, doloris expers, nisi fortè durius prematur: ex contumaci & inveterata obstructione ferè semper, aliquando sed rarò ex inflammatione originem trahit: non subito, fit, sed pedetentim. Primò enim tenues jecoris venas implet & infarcit humor obstructionis auctor, auctus dein in omnem visceris substantiam redundat, eamque perinde atque venas obstruens; hinc multò plenior cumulatus, jecur in amplam molem, ut turgidum appareat, distendit: denique siccatus, & vi caloris tenui parte dissipata, reliquus totus obdurefcit cujus permissione jecoris substantia labefactatur, verusque scirrhus tandem emergit, tactu deprehenditur, præsertim si gracile & adipis expers sit abdomen, idque facilius erecto vel in dextrum latus inclinato ægro, quàm decumbente supino, tum enim non nisi pressu animadverti potest jecoris situ & figura circumscribitur facilis præterea est decubitus dexter, sinister verò gravis, quod moles quædam veluti suffocans in ventriculum & præcordia incumbat.

Jecoris inflammatio, quæ Græcè *ἥπαρ* dicitur, est ejusdem tumor calidus ab impetuosa præservidæ materiæ affluxione exortus cum febre continua, dolore gravativo, sensuque ponderis affligens: ejus signa sunt gravitas in dextra præcordiorum parte, dolor à jugulo ad costas nothas protensus, tussis exigua, eaque sicca, difficultas spirandi, febris acuta, anorexia, sitis inexhausta, color totius corporis ad flavum declinans. Tumor hic faciliè in abscessum definit, qui si contigerit,

certain mortem prænuntiat: ideo Medicis quam maximè curæ est, ne ad hoc malum morbus deveniat, abscessus quum jam fit, dolore, febris, & cætera symptomata invalescunt, rigores sæpe nullo ordine invadunt, quos sequitur caloris exacerbatio, confecto pure, omnia quidem remittuntur, vires tamen relinquuntur multò imbecilliores, pulsus frequens parvus & languidus, crebraque animi defectio: rupto abscessu puris illuvies prorumpit, cujus tetto vapore æger tandem de medio tollitur, intemperie etiam, tum calida, tum frigida detinetur hoc viscus; in calida adest cibi, maximeque carnis fastidium, & nihilominus inedia plurimum incommodat, sitis vehemens, corpus universum, præcipue manuum & pedum palmarum calent, in frigida major est cibi cupiditas, sitis nulla, faciei color albus, habitus corporis mollis, & deiectiones crudæ.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Hepate calido.*

**I**Nter omnia remedia, quæ hæcenus ars invenire potuit ad hepar præcalidum refrigerandum atque roborandum, primas obtinet tinctura coralliorum: cuius cochlearia duo æger sumere poterit singulis diebus manè duabus horis ante pastum. Ita præparatur.

24. Corall. rubr. crassiuscule triti  $\text{℥vi}$ . reponantur in vase vitreo, quod matrarium vocant, iisque affundatur succus limonum, ut supra materiam quatuor digitis emineat; (in penuria succi limonum, substitui poterit succus berberorum) vase bene clauso ponantur in B. M. per quatuor aut quinque dies continuos, & tincturam separa à fecce, & in alio vase serva ad usum dictum, gustui gratior fiet tinctura, si cum saccharo candidi pari quantitate reducatur in syrupum; sed multò inefficacior evadet, at melius addetur saccharum cuilibet dosi exhibitionis tempore. Ad eundem usum valde commendatur conserva ex fructu cynorrhodii confecta, cujusumat singulis diebus ad nucis magnitudinem. Uti etiam poterit Electuario sequenti.



24. Elect. triasantal. quadruplicato rheo in tabell. redact. ℥iv. capiat tabellam unam ponderis ℥ii. superbibendo parum potus ordinarii.

Tinctura etiam rosarum ad usum prædictum utilissima erit.

Hæc quatuor remedia in usu continuo ita habenda sunt, ut manè alterutrum sumatur horis duabus ante pastum, vespere verò alterum, in introitu lecti, postridie verò alia duo iisdem horis, ita frequenter remedia immutando, ne natura nimium iisdem assuescat. *Lazarus Riverius observ. 49. cent. 1.*

Si reperiri posset aliquod pharmacum, quod uno eodemque tempore stomachum foveret, jecurque refrigeraret, maximum, esset inventum, cichorium sylvestre duas hæc facultates possidet in cibis administratum, nam amaritudine qua pollet ventriculum roborat, sicut reliqua amara, & bilis fervorem compescendo immensos æstus ipsius, hepatis coercet. Hoc remedio plurimos sanatos vidimus, *Dominicus Panarolus, observ. 47. Pentecoste 3.*

Quia hepar habes natura calidum, contemperatione aliqua interdum indiget, utque ea hepatis refrigeratio sine ventriculi incommodo instituat, suadeo; ut utriusque membro, etsi dissimiliter affecta sint, sic consulas, ut saccharo rosato aliquot grana piperis per medium incisi indas, simul deglutias, ita piper calefaciet ventriculum frigidum, nec ultra progredietur, & sacchar. rosacei frigiditatem inhibebit, saccharum verò rosac. postea hepar contemperabit. *Gaspar Hoffmannus, consil. 9. lib. 3. consil. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Curatio consistit in correctione illius intemperiei, per refrigerantia remedia, & biliosi humoris, qui ab ea producit, eamque vicissim fovet, aliorumque morborum causa existit, evacuatione, ac primùm venæsectio hepar maximè refrigerat, biliosi sanguinis portionem educit, & obstructions à bile solvit, mittendus igitur sanguis est e Basilica dextra, quantitate plenitudini ac virium robori respondente, vel una vice, vel per intervalla, pro affectus magnitudine, & duratione; idque præmisso clyst. vel medicam. primas vias expurgante.

Deinde bilis educenda est cholagogo medicamento benigniore, per intervalla repetito, aut apozemate in plures doses exhibitto, aut syrupo magistrali, aut etiam syrupo de cichor. composito quadruplicato rheo, qui convenientissimus est. Siquidem innoxie biliosos humores expurgat, jecur refrigerat & corroborat, ejusque obstructions aperit.

Apozema bilem evacuans ita componi poterit.

24. Rad. acetos. gram. cichor. oxylapath. ℥i. fol. endiv. cichor. dentis leonis, & capill. ven. an. M. i. sem. 4. frigid. mai. an. ℥iii. liquirit. ras. ℥i. flor. cichor. bugl. viol. an. p. i. sen. mundat. ℥i. tamarind. ℥i. macis & cariophyll. an. ℥i. coq. ad quartar. v. in colat. dissolve expressionem ℥ss. rhei in prædicto decocto cum cinnam. infusi, syrup. de cichor. compos. & rosat. solut. an. ℥ii. F. apozema clarificatum & aromatizatum ℥ii. santali citrini, pro quatuor dosibus matutinis.

Syrupus magistralis componi potest ex materia prædicti apozematis, triplicata dosi purgantium, & addita sacchari quantitate decocto æquali.

Usitatissimus apud nos est syrupus ex succis summæ efficacæ ad chronicos omnes morbos, qui à calida hepatis intemperie, & bilis flavæ aut exustæ proventu oriuntur; & in sequentem modum præparatur.

24. Succor recenter expressor. & per residuum depuratorum ex fol. endiv. cichor. acetos. fumar. borrag. bugloss. ℥iij. succi pomorum redolentium recenter expressi & depurati ℥ij. polypod. q. rec. ℥ss. senne mundat. ℥viii. agar. rec. trochisc. ℥ss. macis & cariophyll. an. ℥ss. infundantur & decoquantur ut artis est, donec colaturæ ℥iij. supersit; in qua dissolv. rhab. el. in prædictis succis, cum spica infusi & express. ℥i. sacchar. alb. ℥iij. F. syrupus perfectè coctus, clarificatus & aromatizatus ℥ii. pulv. elect. triasantal. servetur in vase vitreo: dosis ℥i. vel iii. bis aut ter in mense cum juscule pulli, solis endiviæ, cichor. & acetos. alterato, vel cum sero lactis.

Ad hepatis refrigerium sequentia utilissima sunt.



℞. Radic. acetos. cichor. gramin. & lapath. acut. an. ℥i. fol. endiv. cichor. acetos. capill. ven. an. M. i. flor. cichor. borrag. bugl. an. p. i. coq. ad libi. in colat. dissolv. syr. de limon. ℥iii. F. julepus clarus pro tribus dosibus bis in die sumendis: si magis refrigerare studeas, adde singulis dosibus spiritus sulph. aut vitrioli, q. s. ad gratam aciditatem. Potest etiam misceri salis prunellæ ℥i. ad maius refrigerium.

Sanguis cichor. & chamædrios ad sanguinem depurandum, obstructions referandas, & hepar refrigerandum utilissimus est, in syrupum redactum in hunc modum.

℞. Aq. cichor. in B. M. paratæ, q. v. folior. cichor. partes duas, chamædr. part. i. macerentur simul & digerantur per triduum in B. M. Postea exprimantur: liquori adde nova folia cichor. & chamædr. digerantur iterum per triduum, deinde exprimantur, & infusiones illæ octies vel decies repetantur. Liquor evadet rubens instar sanguinis, cui adde parem liquori sacchari quantitatem: & F. Syrupus.

Utilis est sequens opiata.

℞. Conserv. flor. cichor. viol. nymphaeæ & bugloss. an. ℥i. pul. elect. triasantal. ℥i. cum syr. de limon. F. opiata, qua utatur frequenter.

Balneum aq. tepidæ frequenter usurpatum totum corpus refrigerat & humectat, multò potentius & utilius quovis alio remedio, in emaciatis præsertim corporibus.

Serum lactis ad idem est efficax, si ad quindecim dies aut plures usurpetur: elicitur autem commodè per lactis ebullitionem, affundendo parum aceti vel succi limonium, & postea colando. *Amatus Lusitanus* ipsum præparat in hunc modum.

℞. Seri lactis libi. syr. acet. valde acidi ℥iii. M. & facta una ebullitione, capiat more aq. mineralium, scilicet per duas aut tres vices postea deambulando: antiqui eo utebantur ad libv.

*Quercetanus* verò in hunc modum præparat.

℞. Seri lactis libij. succ. limon. ℥ii. succ. pom. redol. recent. extract. ℥iii. omnia simul cum albumine ovi prius agitata ad ignem clarificentur, addendo parum sacchar. de

colat. cape ℥vi. vel viii. continuando per quindecim aut viginti dies.

At si emaciatum & consumptum fuerit corpus, lac: integrum & præsertim asinum in plures dies exhiberi poterit: decoctum Chinæ cum succo limonum paratum, huic etiam usui confert, præsertim si obstructions adfuerint, ita fiat.

℞. Rad. Chinæ tenuiter incisa ℥i. aq. fontis libvi. succ. limon. ℥iii. macerentur per viginti quatuor horas. Deinde coq. ad tertiæ partis consumptionem. Postea colentur per manicam *Hippoc.* capiat ℥vi. manè & vesperi, vinumque eo diluatur.

Denique aquæ minerales vitriolatæ utpote aperiendi & refrigerandi vi præditæ erunt utilissimæ. Perseverante affectu, hæmorrhoides per hirudines aperiuntur semel aut bis in mense.

Ac tandem exterius regioni hepatis epithemata & unguenta refrigerantia admoveantur; epithemata fiant ex aq. acet. cichor. ros. plantag. aceto & caphura: quibus ad robur partis additur pulvis triasantal. Unguenta vero sint rosaceum refrigerans *Galenii* & ceratum Santalinum. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. ii. cap. i.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Hepatis dolore.

**D**ominum *Sangermanum* dolor ad gibbas hepatis vexabat: irrita omnia fuerunt remedia ex arte comparata, & cum naturæ totum negotium relinqueretur, rusticus advocatus est, hic similem affectum se aliquando curasse asseveravit, æger confidenter ei sese credit: accipit radices hederæ pulverisatæ ℥i. aut ℥ii. potui dat cum decocto capi aut pulli, non longè post juvatur plurimum: ejusmodi remedia à veteribus sunt præscripta, à nobis neglecta: & eadem magno nostro vituperio cum summa laude usurpant Rustici. *Ætius* caput scripsit de iis quæ purgant cavas & gibbas partes jecoris. *Guil. Ballonius, lib. i. Epid. & Ephem. pag. 41.*

Vidi pistorum quendam qui cum in itinere se fatigasset, ac in gramine dormivisset, quere-



querebatur de aliquo ac non valido dolore hepatis: febricitabat non ardens: interdum Leipothymia tentabatur: cum obiisset, hepatis perenchyma, intacta ac integra membrana, in pus merum degeneraverat. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 45. sect. 7.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Hepatis inflammatione.*

**V** Ir quidam crapulae deditus inflammatione jecoris correptus est. Huic febris continua aderat, & dolor valde gravis in hypochondrio dextro, cum tussicula quadam inani: dolor ad claviculam ascendebat. Habebat etiam sitim inexhaustam, nauseam, cibi fastidium & singultum, cum lingua arida in principio, postea nigra & aspera, & lotio rubra, quae omnia inflammationem hepatis indicabant: ad hunc accitus, venam illicò tundunt feci ad  $\text{℥vi}$ . Sequenti die cum non satis alvus responderet, lenitivum sequens ut exhiberetur mandavi.

$\text{℥}$ . Cassiae rec. extract.  $\text{℥i}$ . rhei pulv.  $\text{℥i}$ . fiat bolus: quo quatuor sedes biliosas habuit, ita ut ex hac levi purgatione & sanguinis detractio febris mitior evaserit, dolore parum diminuto: inunximus etiam regionem hepatis unguento santalino, & pannum lineum eodem unguento inunctum apposuimus sine calefactione: interea & hoc decocto utebatur.

$\text{℥}$ . Endiv. Cichor. cum toto dentis leonis cum toto, acetos. viol. lactuc. novell. an.  $\text{Mj}$ . fumar. agrimon. cap. ven. borrag. bugl. an.  $\text{Mss}$ . chamapit. chamædr. (cum esset etiam quadam obstructio) an.  $\text{Mss}$ . rad. gram. petrosel. an.  $\text{℥ss}$ . sem. quatuor frigid. maj. & min. an.  $\text{℥j}$ . sem. anis.  $\text{℥ss}$ . tamariind.  $\text{℥j}$ . prunor. damasc. numero 13. uvar. pass. exacinar.  $\text{℥i}$ . liquirit. ras.  $\text{℥ii}$ . hord. mundat. p. j. F. decoctio in aq. pro  $\text{℔ss}$ . colaet. ad. syr. viol. de lim. de end. ex infusione ros. communium, an.  $\text{℥ss}$ .  $\text{M}$ . quo apozemate cum ususeffet, febris valde diminuta est, & alvum quotidie deponebat. Morbo magis inclinante, pro dolore usus est sequenti epithemate bis aut ter in die, atque ita dolor omnisevanuit, neque ad

*Burnet Parte I.*

apostema devenit de quo metuebat, sed sanus cum nostra laude, ab astantibus pro deplorato habitus evasit.

$\text{℥}$ . Endiv. virid. cichor. an.  $\text{Mj}$ . flor. chamæm. melilot. & ros. rubr. an.  $\text{Mss}$ . summit. absinth. p. i. coq. in aq. communi pro  $\text{℔ss}$ . in fine adde aq. absinth. endiv. an.  $\text{℥i}$ . acet. opt.  $\text{℥ii}$ . spec. triosantal.  $\text{℥ss}$ . iterum bulliant, & F. epithema pro hepatis regione: eo peracto, inungatur linimento infra scripto.

$\text{℥}$ . Ol. amygd. amar. chamæm. an.  $\text{℥ss}$ . ol. ros. unguent. santal. an.  $\text{℥ii}$ .  $\text{M}$ .

Quod ad victum attinet, tenuissimum adhibuimus, in principio nil nisi cremorem ptisanæ, & poma cocta administrando, abstinendum à dulcibus, quibus tum iecur, tum lien intumescunt: à valde etiam adstringentibus abstinendum. *Petrus Forestus, obs. 7. lib. 9. De Hepatis Affectionibus.*

Quidam febre acuta corripitur: dolor ad hypochondrium dextrum satis colligebamus non esse pleuritim: tamen summa erat difficultas ducendæ animæ, & quæ in horas increfceret. Spes erat eam sedatam iri uno medicamento contra aucta est, metus suffocationis: revera phlogosis erat pituitosa circa eas partes, & nisi terna sectione venæ provisum fuisset, metus erat abscessus. *Guillelmus Ballonius, consil. 91. lib. 1.*

Indubitatum auxilium in hepatis inflammatione & corruptione adfert hepar galli nigri vivi exemptum & adhuc calens in  $\text{℥v}$ . acet. rosac. vel acet. simpl. minutissimè contritum, resolutumque, & à fibris colatum tepidumque exhibitum. *Franciscus Joel. pract. section. prima, lib. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Hepatis inflammatione.*

**S** Enator quidam *Paterniacensis* quadragenarius, constitutione corpori gracili, & naturabiliosus, ob exortitia nimis violenta, cum supra modum incaluisse, inflammatione hepatis cum dolore ventris correptus fuit. Advocatus ego, agrum febre acuta, cum linguæ ariditate, tussicula



ficula sicca, respirandi difficultate, cibi fastidio, siti maxima, nausea, vomitu, inquietudinibusque laborantem offendi: duritiem quoque e regione hepatis manifestam persensi: inflammatio enim præcipue gibbum hepatis occupabat in curatione itaque processu, victus rationem refrigerantem & humectantem præscripsi, loco vini, decocto agrimonie & veronicæ, admixto nonnihil syrup. de succo citri & acetosæ utendum jussi, mox sequens enema ordinavi.

℞. Rad. & fol. alth. malv. viol. pariet. agrimon. & veron. an. M. i. flor. chamem. melilot. an. M℞. sem. anis. fœnic. an. ℥i. lini & fœnugræc. an. ℥℞. F. decoctio in colat. ℔bi. dissolv. sacchar. rub. ℥ii. catholic. ℥i. vitell. ovi, ol. viol. & ros. an. ℥i. sal. p. j. M. F. enema, quo rejecto venam in brachio dextro incidi & ad ℥vii. sanguinis extraxi. Exterius totum latus sequenti linimento tepidè inunxi.

℞. Ol. ros. & viol. cerati santal. an. ℥i. ol. absinth. ℥℞. M. F. Linimentum. Post duas à cœna horas, ad inflammationem internam arcendam, & somnum provocandum, nonnihil laudani, adeo ut ea nocte, & sequenti die meliusculè habere cœperit: symptomata enim multùm uti & vires aliquo modorefocillatæ, fuerunt, quapropter sequentem potinuculam ordinavi.

℞. Fol. agrimon. veronic. cuscut. scabios. an. M. ℞. sem. anis. fœnic. an. ℥ii. liquirit. ras. ℥i. coq. in aq. in colat. ℥iv. dissolve elect. diacathol. ℥vi. syrup. ros. solut. compos. cum rhab. agar. & sena ℥℞. M. F. potio. qua clementer expurgatus fuit.

Victus rationem interim optimam observabat: pro potu ordinario utebatur decocto agrimon. & veronic. lacte amygdalino, & emulsionibus sem. 4. frigid. maj. oleis convenientibus quotidie inungebatur, clystere quinetiam urgente necessitate injecimus, corpusque per intervalla infusione rhei, cum syrup. ros. solut. compos. purgavimus, & sic divino favore dolor, reliquaque symptomata remiserunt, tandem hepar, partesque nobiles sequentibus tabellis corroboravimus.

℞. Spec. diarrhod. abbat. ℥ii. aromat. rosat. troch. è rhabarb. an. ℥i. sacchar. disso-

lut. in decocto agrimon. & veron. ℥iv. M. F. S. A. tabellæ, de quibus fumantur ℥iii. horis tribus ante prandium. His plenissimè convaluit. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 48. cent. 2.*

Hominem intemperie frigida ventriculi, & calida intemperie hepatis laborantem cognovi, cui ab Empirico quodam plurima tam emplastra quam unguenta, eaque præcalida, veluti è pipere, cardamomo, oleo cariophyll. cinnamom. & similibus præscripta, atque cartilagini xyphoidi admotæ fuerunt; inde inflammatione hepatis correptus, vix ab eadem liberari potuit, tandem verò Dei beneficio, iis quæ hepar refrigerant & corroborant, veluti julepo ex aq. cichor. endiv. agrimon. veronicæ cum syr. de succo limonum acetosæ & unguento santalorum exterius applicato, sanitati cum restitui. *Guillelmus Fabritius Hildanus, observ. 46. cent. 2.*

Pro potu utatur æger decocto hord. & graminis cum tantillo liquirit. vel. syrup. viol. aut capill. ven.

Exterius conveniunt sequentia topica.

℞. Aq. endiv. cichor. acetos. plantag. & rosar. an. ℥iii. aceti. rosac. ℥i. pulv. el. tria. santal. ℥℞. camphor. ℥℞. F. epithema regioni hepatis tepidè frequenter admovendum. Vel,

℞. Fol. endiv. cichor. scariol. plantag. bugloss. borrh. & flor. nymph. an. M. i. absinth. roman. M℞. ros. rub. p. ii. santal. rub. & citrin. an. ℥ii. coq. ad ℔bi. in colat. dissolv. aq. rosar. ℔℞. aceti rosac. ℥i. camphor. ℥i. F. epithema.

℞. Ol. rosac. ℥ii. ol. absinth. ℥℞. M. abluantur oxycrato, & inungatur eadem regio post usum epithematis. Vel

℞. Ol. rosac. & myrtini, an. ℥ii. succi endiv. & cichor. an. ℥i. aceti ℥℞. bulliant ad succorum consumptionem. Deinde adde pulv. santali rubri & ros. rubr. an. ℥i. ceræ alb. q. s. F. unguentum.

Vel unguentum rosac. solum aut refrigerans *Galenii* oxycrato lotum potest ad moveri.

In progressu morbi, mitescente febre ac dolore, solventia cum refrigerantibus permiscenda sunt æquali, vel inæquali dosi, prout morbus ad statum aut declinationem, magis vel minus accedere videtur, quæ



quæ à Medico prudenti temperari debet, ut eorum materia innotescat, nonnulla exempla annotabimus.

24. Ol. rosac. ℥ii. ol. absinth. ℥i. ol. chamæm. ℥ß. pulv. trium fantal. ℥i. spic. nard. ℥ß. ceræ, q. s. F. Linimentum.

24. Farin. hord. ℥iii. fantal. rubr. ℥ii. ol. rosac. ℥iii. M. cum decocto endiv. & cichor. F. cataplasma.

In declinatione, febre profligata, resoluta erunt admovenda, additis emollientibus, ne qua durities superfit, & nonnullis adstringentibus ad robur partis conservandum.

24. Rad. alth. ℥iii. rad. cyperi, & cal. aromat. an. ℥ß. fol. malv. viol. agrimon. an. M. i. absinth. utriusque an. M. ß. sem. lini. scenugrec. anif. foenic. an. ℥ß. flor. chamæm. melilot. aneth. an. p. i. spic. nard. schænanth. mastich. an. ℥i. fiat omnium decoctio, qua foveatur pars affecta calidiusculè.

24. Ol. chamæm. lilior. & amygdal. d. an. ℥i. olei absinth. & nardin. an. ℥ß. pulv. schænanth. rosat. novell. & absinth. an. ℥i. ceræ q. s. F. Linimentum, in declinatione usurpandum.

Si durities partis persistat, gummi ammoniacum in aceto dissolutum, prædicto linimento addere convenit, vel etiam sequens emplastrum erit admovendum.

24. Empl. de meliloto & diachil. ireati, an. ℥i. M. extend. super alutam. F. emplastr. ad formam semilunæ admovendum parti affectæ. Vel

24. Gummi ammoniac. in aceto remoliti ℥i. ladani & mastich. an. ℥ii. ol. absinth. & ceræ, an. q. s. F. Emplastrum.

Si inflammatio ad suppurationem vergat, quod cognoscetur ex febris & doloris intensione, maximum est periculum, & pauci evadunt, attamen suppuratio adjuvanda est emplastris prædictis, quæ materiam resolubilem solvent, & suppurabilem suppurabunt; tum etiam ad motus cataplasmatum emollientibus; intus verò exhibendum jus pulli alteratum malva althæa, caricis, prunis, rupto abscessu, si pus album effluat per alvum, aut urinas, abstergendum est aqua hordei, vel sero lactis, eum melle rosat. Si verò suppuratio vergat in partem externam, cultello ignito aperi-

enda est, secundum Hippocratem, & si pus effluat album & coctum, spes est sanationis. Si verò rubrum, foetidum, fœculentum, & instar amurcæ, tendit æger ad interitum. *Lazarus Riverius, prax. med. cap. 2. lib. 11.*

Memini me apud *Suetonium* & *Plinium* legisse *Augustum* vitiato jecore laborantem fomentis calidis sine fructu à Medicis tractatum esse, accito autem *Antonio Musa*, eum frigidis remediis fuisse sanatum; quam rem libenter commemoravi, quodcum viderim à solertissimis Medicis remedia calorifica huc usque administrata, aut nullam aut exiguam Medicinam contulisse, in ea sum sententia, ea medendi ratione paulisper omissa, ad refrigerantia moderatè potius omnem curam esse convertendam, ita tamen ne calore nativo hebetato, ulla vis inferatur. *Hieronymus Mercurialis tomo 2. consult. 59.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Hepatis intemperie frigida hydro-*  
*pem minitante.*

**P**Ræscribenda victus ratio, quæ calefaciat, moderate siccet, incidat, attenuet, ex iis quæ faciliè concoquantur & subigantur, ex usu erit hoc conditum, quod ex condit. cortic. arantiorum, rad. enulæ, rad. cichor. spec. arom. rosat. diarrhod & c. confectum est: item maximè probo electuarius hoc quod *Arabes* de vino, *Græci* Cyphoides vocant, hoc modo secundum *Hollerium* præparatum.

24. Passul. corinth. ℥ß. coq. in vino veteri generoso ad pultis consistentiam, tufas excernere per setaceum, tum admisce conservanth. cortic. citri condit. cinnamom. an. ℥i. spec. arom. rosat. diamargar. calid. diacinnam. an. ℥i. lign. aloes odor. ℥ß. croc. ℥ß. M. dosi ℥ß. *Reinerus Solenander. conf. 2. sect. 3.*

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Hepatis obstructione.*

**D**Igestionem facta, semel atque iterum pulverem hunc purgantem cum fructu præscripsimus:



24. Spec. diaturb. cum rheozi. tartar. vitriol. ʒ. M. F. pulvis, in brodio pisorum assumendus. *Gregorius Horstius, observ. 30. lib. 4.*

Rusticis & agrestibus hominibus hepatis & lienis obstructionibus laborantibus, epotandum dedi proprium lotium magno successu, illud enim extergit & incidit, illud etiam calidum cum canabina stupa applicare juvat. Hepar etiam vulpis comestum à quadam proprietate convenit, ut & corallium valde tritum. Prodest etiam urtica mortua quæ lamium dicitur, eo quomodocunque assumpta, induratos & obstructos lienes liberat. Ego soleo eam exhibere manè incoctam ovo in formam placentulæ. Hoc medicamentum didici à Monacho *Hetrusco*, qui solum singulis diebus huius herbarum aliquot folia contrita & ovo incocta exhibebat edenda, & permultos curabat. Ego postea solos ipsius pulveres foeliciter in vino albo in eodem affectu exhibui, debet in usum vocari illa duntaxat lamie species, quæ in foliis maculam habet albicantem. Est etiam filicis decoctum efficacissimum in hoc casu, id quod antiquis cognitum. *Gal. lib. 8. De comp. med.* Si loca, feliciter exhibet in hepatis obstructione, & optimum pharmacum vocat. *Reinerus Solenander, const. 12. 13. sect. 1.*

Studiofus quidam ex intempestivis lubricationibus in gravissimas obstructiones hepatis & lienis incidens, quæ eum ad extremam maciem perduxerunt, cum portiones purgantes, apozemata aperientia aliaque remedia parum contulissent, pilulis sequentibus a me præscriptis intra mensem restitutus est.

24. Aloes opt. & gummi ammoniac. in aceto soluti & per setaceum trajecti atque iterum inspissati, an. ʒiij. sen. mundat. & myrrhæ el. an. ʒiij. croci ʒss. cum oxymel. scillit. F. massa pilul. de qua capiat ʒiij. alternis diebus duabus horis ante pastum. *Lazarus Riverius, observ. 34. cent. 1.*

In omnibus hepatis obstructionibus dextrè demolendis principes partes obtinet Mars seu ferrum, cujus scrobs cruda (à ʒss. ad ʒss.) sæpius ingesta, mirum quantum valeat in talibus affectibus. Martis præparationes excogitatæ sunt multi-

plices: simpliciores verò quo fuerint, eo meliores: simplicitate ipsa natura gaudet, est pulvis cachecticus simplex elegantis virtutis in omnibus obstructionibus internis. Ille sic fit.

24. Chalyb. præp. part. i. cass. lignear, part. iij. sacch. albiss. part. iv. M. i. pulvis (chalybs in bracteas rufas tantisper tunditur super incudem donec prorsus in scoriâ abeat, postea subtiliter pulverifetur; incus benè mundetur undique) ejus tantum, quantum mucrone cultri arripi potest, seu à ʒss. ad ʒi. detur ter quotidie, manè jejuno ventriculo, hora tertia vespertina, & ituro cubitum; tamdiu donec omnis obstructio fuerit expedita, etiam ad aliquot septimanas.

Essentia croci Martis quoque laudabilis est. *Johann. Hartmannus. Prax. Chimiatri.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Hepatis obstructione.*

**P**Ræ cæteris omnibus medicamentis ad delendas obstructiones inveteratas maxime conferunt remedia ex tartaro, vitriolo & chalybe conflata. Sal tartari maximam habet destruendi vim, & apozematis opiatis ac pilulis aperientibus utiliter admisceri potest, sed præcipuus illius usus est in ptisana laxante, quæ sit ex sennæ ʒii. in aq. frigid. ʒviii. infusis, cum ʒi. vel ʒss. salis tartari, a quo sennæ tinctura potenter extrahitur; ut ptisana hæc multo potentius purget, quàm ptisana vulgaris; & ad multos dies continuata, omnes obstructiones solvat, quo effectu non rarò quartanas contumaces hujus ptisanæ usu per quindecim dies continuato radicitus curatas vidimus. Si salis tartari metuatur acrimonia, corrigi potest spiritu sulphuris aut vitrioli, ut pro ʒss. salis sint guttæ xv. spiritus. Spiritus tartari usus ex hydropis durationibus in observationibus nostris descriptis elici potest, sub nomine spiritus diurectici.

Vitrioli spiritus userpatur in apozematis, syrupis, aliisque remediorum formulis. Vitrioli efficaciam ostendunt aquæ naturales acidæ & vitriolatæ, quarum usus frequentissimus & utilissimus est, in omni.



omnibus morbis ab obstructione oriundis.

At spiritus vitrioli cum sale, aut spiritu tartari permixtus, valde commendatur à spargyricis, ex iis conficiunt tartarum vitriolatum.

Denique ex chalybe varia præparantur medicamenta, tum à dogmaticis, tum à spargyricis, quæ evidenti effectû obstructiones brevi solventia, omnes coegerunt ad usum eorum frequentem. Vinum chalybeatum hoc modo confici potest.

℞. Limatur. chalyb. ℥iv. rad. eryng. enulæ camp. an. ℥i℥. santal. citrin. ℥i. corall. rubr. ras. eb. an. ℥vi. cariophyl. nuc. mosch. cinnam. an. ℥i. flor. genist. anth. & epithym. an. p. iii. vini albi generos. ℔vi. macerentur per octiduum in B. M. vel retrò furnum. Deinde transcolentur per manicam Hippocr. ut vinum optimè clarificetur, de quo capiat æger ℥ii. vel iii. manè duabus horis ante pastum per quindecim dies, aut plures, si opus fuerit. Vel in hunc modum fieri poterit.

℞. Chalyb. præpar. cum sulphur. ℥i. rad. enulæ, cortic. med. tamarisci, an. ℥℥. sen. ℥iii. epitym. ℥i. sæculæ brioniæ, & cinnamomi an. ℥ii. pulv. triasant. ℥i℥. aq. agrimon. & vini albi an. ℔i. infundant per triduum in Balneum Mariæ colat. capiat. ℥iii. vel vi. tribus horis ante pastum.

Syrupus ex chalybe ita præparatur.

℞. Limatur. chalybs in aceto macerata vii. cort. med. tamarisc. ℥℥. ceterach. M. ℥. cinnam. ℥iii. aq. absinth. & agrimon. an. ℔℥. vini albi ℔i. infund. per dies sex in loco tepido colaturæ adde sacch. ℔i℥. fiat syrupus, capiat æger. ℥ij. vel iij. manè singulis diebus. In prædicta preparatione chalybis, maceratur in aceto ad Solem, donec acetum exsiccet; idque tertio repetitur, postea lævigatur in marmore.

Tabellæ ex chalybe ita fiunt.

℞. Calyb. præp. cum sulph. ℥℥. confect. alker. ℥ii. ambr. gris. ℥i. sacch. in aqu. naph. & rosac. dissolut. ℥iv. F. tabellæ capiat ℥ii. singulis diebus manè.

Opiatæ sequentes præstantissimæ sunt.

℞. Conserv. flor. tamarisc. & capill. ven. an. ℥i℥. conserv. rad. enul. ℥vi. chalyb. præp. cum sulphure vel aceto ℥i. salis tamarisci

Burnet Parte I.

℥i. spiritus vitrioli ℥℥. cum syrup. condituræ citri. F. opiata, de qua capiat ℥ii. aut iii singulis diebus manè. Vel,

℞. Chalyb. præp. cum sulph. ℥i sen. mund. rhei. el. & agar. rec. trochisc. an. ℥ii. diarrhod. abbat. ℥i. croci ℥i. cum syrup. rosat. solut. F. opiata de qua capiat ℥ii. manè, tribus horis ante pastum, continuando per quindecim dies.

Pilulæ ex calybe reliquis remediis non cedunt, & ita concinnari possunt.

℞. Calyb. præp. cum sulph. ℥℥. aloes opt. sen. mund. agar. troch. & rhei el. an. ℥i. pulv. el. diarrhod. abbat. ℥℥. croci ℥℥. cum syr. ros. solut. F. pilulæ, ex quarum ℥i. formentur pilulæ sex deauratæ, quas capiat manè singulis diebus, tribus horis ante pastum, continuando per quindecim dies.

In omnibus medicamentis chalybeatis hoc perpetuò observandum, ut post eorum assumptionem deambulatione corpus exerceatur, ut huius beneficio medicamenti vires in actum melius reducantur, ac in partes obstructas transmittantur, eaque deambulatio continuanda est per duas horas quibus transactis, capiat æger jusculum in quo herbæ & radices aperientes nonnullæ decoctæ fuerint. Præter omnia prædicta remedia Chymici commendant purgationes mercuriales ex Mercurio dulci præsertim cum pilulis ordinariis, quia Mercurius, valde penetrat, & obstructiones aperit.

Bezoardicum minerale plurimum etiam commendatur, & cum Mercurio dulci exhibitum miranda præstat, in hunc modum præscribi poterit.

℞. Bezoard. mineral. gr. xii. mercur. d. gr. vi. conserv. ros. ℥i. vel ii. F. bolus, qui detur plures dies.

Pro potu ordinario utatur æger aqua ex infusione chalybis parata, cum vino tenui, vel utatur cum levi decocto tamarisci, agrimon. ceterach. cap. ven. pimpinel. iisque simul mixtis, aut seorsum usurpatis, etiam cum vino. Quidam laudant decoctum rad. cynosbati pro potu ordinario, quod potenter aperit, & roborat: potentius operatur infusio limaturæ chalybis facta in vino albo, cum aquis prædictis, aut etiam cum aqu. simplici permixta.



Hoc enim solo remedio quam plurimæ virgines è chlorosi liberantur : & adhuc potentius operatur vinum istud chalybeatum, si præter potum ordinarium, meracum manèsumatur, ad ℥iii. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 11. c. 3.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Hepatis Scirrho.

**C**Um ex mensibus retentis hoc malum provenerit, tota cura consistere videtur in eorum evacuatione: per octo ergo dies ante tempus mensium purganda erit bis aut ter per pomum coctum in quo radix hellebori nigri ad ℥β. affigatur (ut infra Sectione *De Podagra* videre est) singulo quoque mense repetat eandem purgationem. Solet enim hoc medicamentum præ cæteris movere menses, sed continuare oportet per tres aut quatuor menses juxta tempus consuetę purgationis: Præ cæteris verò efficacissimum remedium est ad omnes viscerum scirrhus usus chalybis in hunc modum.

℥. Chalyb. præpar. pulv. ℥β. rhei. agar. au. ℥ii. spec. hier. simpl. ℥i. diarrhod. abbat. ℥ii. mell. despumat. q. s. F. electuarium: cujus sumat singulo quoque mane ℥ii. per quindecim dies. *Rodericus à Fonseca, tomo 1. consult. 61.*

Pro topicis in usu erunt emplastr. diachyl. de meliloto & ceratum à me sæpe cum successu usurpatum: quod,

℥. empl. de mucilag. ℥iii. bdell. ℥i. ammoniac. ℥v. (gummi solvantur in aceto acerrimo) bulliant in ol. absint. ℥ii. cum vini alb. ℥iv. adde spic. nard. ℥ii. cum cera alb. q. s. F. ceratum emolliens & digerens obstructiones & tumores scirrhusos ac præsertim jecoris. *Ioh. Zecchius, cons. 11.*

Domina quædam Cachexia laborans, cum duritie hepatis palpabilis, sequentibus pilulis per viginti dies usa perfectè restituta est.

℥. Chalyb. præp. cum sulph. ℥β. Aloes opt. senna mund. agar. troch. & rhei el. diarrhod. abbat. ℥β. croci ℥β. cum syrup. rosat. solut. F. massa pilul. de qua capiat ℥i. singulis diebus manè leviter deambulando: post tres horas capiat jusculum in quo folia & rad. petrosel. bullierint, quia

he pilule non purgabant, his aut ter addita sunt uni dosi diagridii gr. iv. *Lazarus Riverius, observ. 68. cent. 1.*

Hepatis tumore scirrhuso diuturno premebatur Nobilis vir, cui nullum auxilium prodesse Potuit, licet præter providentiam totius ex ebano sudorifica tentasset, uteretur medicamentis chalybeatibus, balnea naturalia admitteret, & varia unguenta & emplastra parti apponeret: hic solum conserva ex marrhubii floribus cum melle parata quadraginta diebus ad ℥i diluculo assumpta, & desuper aqua ebibita, quę è foliis & radicibus ipsius, vitreis organis stillat, sanitati integræ fuit restitutus: nam sensim, ac sine sensu emmolitus & resolutus est tumor. *Zacutus Lusitanus, lib. 2. prax. med. admirand. observat. 48.*

Scirrhi curatio fiet primùm causæ antecedentis ablatione per remedia obstructionibus referendis idonea: postmodum verò materia indurata emollientibus & aperientibus discutienda est: in hunc finem maxime convenient pilulæ ex chalybe supra descriptæ, præcipuè si iis addantur bdellium, ammoniacum & sagapenum Si durities contumacissima fuerit, sequentes pilulæ ad multos dies erunt usurpandæ.

℥. Gummi ammoniac. in aceto solut. & traject. atque iterum inspissat. ℥ii. bdell. styrac. an. ℥iv. M. capiat ℥i. alternis diebus: intermediis diebus utatur opiata vel tabellis roborantibus & aperientibus in obstructionis curatione descriptis.

Sequentes verò pilulæ ad scirrhum emolliendum ac dissolvendum mirabilis sunt efficacix.

℥. Aloes opt. & gummi ammoniac. in aceto solut. & traject. per setaceum atque iterum inspissat. an. ℥β. Mercur. d. ℥ii. diagrid. ℥i. cum oxym. scilicet. F. massa pilul. de qua capiat ℥β. quatuor horis ante prandium singulis diebus per viginti aut triginta dies.

Quidam Practici commendant usum terebinthinæ in hunc modum præparatæ.

℥. Terebinth. lotę cum vino albo ℥iβ. sacch. pulver. ℥β. capiat ℥i. singulis vel alternis diebus: est enim remedium aperiens, urinam movens & alvum emolliens.

Toto curationis decursu utatur æger pro potu ordinario vino albo aut clareto tenui



tenui ex infusione chalybis parato.

Exterius admoveantur fomenta, unguenta & emplastra insequentem modum composita.

℞. Rad. alth. brion. lilior. an. ℥i. fol. malv. viol. parietar. absinth. agrimon. an. M. j. sem. lini, fœnugr. aneth an. ℥℔. flor. chamam. melilot. ros. an. p. j. coq. in tribus partibus aquæ & una vini albi sub finem additi; vel in aqua & aceto: colatura foveatur regio hepatis mane & serò. Si scirrhus sit contumacior, addantur decocto rad. ireos nostr. cuc. aggreg. & ebuli & paretur decoctio in aqua decoctionis intestinorum vervecis & vino albo.

℞. Ol. lilior. chamam. melilot. & amygd. d. an. ℥i. ol. ros. & absinth. an. ℥℔. gummi ammoniac. in aceto solut. ℥iii. ceræ ℥ii. F. linimentum quo inungatur dicta pars post forum.

Si fortius linimentum desideres.

℞. Succor. bryon. & cucum. aggreg. an. ℥ii. ol. de cappar. & tamarisc. an. ℥iii. vini albi ℥i. bulliant ad succorum & vini consumptionem; deinde adde absinth. pulv. ℥ii. gummi ammoniac. in aceto solut. ℥℔. ceræ parum F. linimentum.

℞. Mass. empl. de mucilag. ℥i. empl. de melilot. ℥℔. gummi ammon. in succo absinth. liquati ℥iij. malaxentur cum oleo absinth. & lilior. F. emplastrum post inunctionem admovendum.

Utiliter etiam parti admoventur folia hyoscyami in aceto decocta, addito oleo amygd. amar. & in formam cataplasmati redacta.

Hæc etiam addere licet semicupia, ex mollientibus, digerentibus & roborantibus parata, qualia pro foru descripta sunt, hisque alternatim eger uti poterit.

Ac denique causticum tibiæ dextræ inurendum, ut materiæ peccantis portio per id loci derivetur. *Lazarus Riverius, cap. 5. lib. 11. prax. med.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Hernia.

**K**'H<sup>a</sup> (Latinis Hernia, ramex) licet apud Græcos cujuslibet partis tumorem significet illâ tamen recent. Medici scro-

ti tumoribus accomodarunt. Cujus 6. sunt species pro materiæ vel illapsæ, vel innatæ varietate discretæ: ex quibus duo sunt verè dicti ramices *enterocili* nimirum, seu hernia intestinalis, & *epiplocili*, i. e. hernia omentalis. Enterocœle dicitur, quando intestina, præcipuè ilium è sua sede prolapsa, ad inguen vel scrotum delabuntur. Epiplocœle rursus, quum omentum ad eadem loca detruditur: Si verò eę partes in inguine subsistant, nec inferius descendant *bubonocili* appellatur; si ad scrotum usque perveniant, *ocheocili*: prolabitur tum intestinum, tum omentum ob productionem peritonei laxatam aut ruptam à cursu, casu ex alto, saltu, vocis contentione, equitatione dura, vomitu, tussi, & gravioris oneris elevatione: Sunt præter has duas veras quatuor aliæ reputatę ramicum species, nimirum *pneumatocili*, hernia ventosa, *idrocili*, hernia aquosa, *sarcocili*, hernia carnosâ, & *cirrocili*, hernia varicosa. Prima est tumor scroti flatulentus ob flatum inibi contentos, qui vel à vicinis intestinis & abdomine transmittuntur, vel ob imbecillitatem partis in eo colliguntur: pueris maximè hoc malum est familiare. Hydrocœle rursus tumor est scroti ab aqua in eo contenta, quæ ab hydrope originem ducens ex abdomine influxit in scrotum. Sarcocœle verò nihil aliud est quam carnea quædam moles in scroto enata, idque in tumorem attollens; oritur ex sanguine impuriore ad testes & scrotum copiosius affluente, & à natura nunquam otiosa in substantiam carni similem mutato. Hic tumor non nisi ferro curatur. Quarta demum species est cirrocœle, seu hernia varicosa, in qua vasa testiculos nutrientia vario cum more dilatantur ob sanguinem crassum & adustum iis effusum.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Hernia Inguinis.

**P**Uella quædam duodecim annorum per dimidium anni hernia inguinali laborans; quum à Medicis quantumvis doctis, quorum opera usa fuerat, sanari non potuerit, ad me accedens, in hunc modum cum ea processi: ut sequentem bolum omnium primò devoraret præcepti.



℥. Cass. rec. extract. ℥vii. sem. dauci pulv. Diß. sacch. asperfo. F. bolus. Deinde hoc fotu usi sumus.

℥. Rad. alch. ℥ii. fol. malv. flor. chamæm. melilot. summit. aneth. an. M. i. sem. lini ℥ß. F. decoctio in aq. pro ℥ß. quæ fotu sine magno negotio intestina in locum suum reducta fuere. Deinde iussimus, ut quotidie locus affectus inungeretur oleo ovorum, myrteo, & hyperici simul mixtis, & ut mox emplastr. contra rupturam applicaret per plures dies: & ut subligaculis ad hoc aptis utens, rectè cincta semper procederet: præterea præcepi ut interea perpetuò uteretur cerevisia in qua decocta esset radix consolid. maj. adjecto exiguo saccharo ad saporem: istis continuatis hæc tandem rectè curata fuit. *Petrus Forestus, observ. 11. lib. 27. De Scroti & Testiculorum vitiiis.*

Inter arcana *Ioh. Tiengis* Medici quondam *Amstelro damensis* hoc erat, quod quidam potans tribus septimanis ex decocto rad. sigilli Mariæ in vino curatus sit à ruptura. Ego etiam felicissimè utor rad. sigilli Mariæ vel Solomonis *Petrus Forestus observ. 15. lib. 27.*

*Avenzoar* refert de Juvene quodam qui hoc malo laborabat decubuitque duobus mensibus in dorso suo, & cum bono regimine sine medicinarum applicatione liberatus est. *Idem, observ. 10. lib. 27.*

Danda opera ut alvus sit lubrica: tumorem totum inungat terebinthina, sed prius foveatur decocto absinth. ex vino: sacculus etiam parvus ex foliis absinthii opponi poterit. *Joh. Crato, consil. 17. lib. 7.*

Oleum hiperici compositum, quo utor per se illitum subinde calidum, mirum in modum in hoc affectu efficax atque utile comperi quemadmodum in aliis ruptis, convulsis, recens vulneratis, maximè ubi membranae aut nervosi generis aliquid oblæsum est. Oleum ita fit.

℥. Ol. opt. ℥ß. sem. & flor. hyperic. ℥ix. vini Hispan. vel malvat. ℥viii. rad. tormentill. ℥iii. myrrh. gummi elemi, sarcocoll. thur. aloes, an. ℥ß. lumbric. lotor. vino ℥iii. M. S. A. contusa bulliant ad dimidii consumptionem in duplici vase, deinde exprimendo coletur oleum: in eo dissolve croci ℥iv. ol. abietin. (resinam vel

lachrimam abietis ita vocant) velejus loco terebinthin. puræ ℥ß. flor. maturor. hyperic. Mi. infunde mista per dies sex aut octo, ad Solem diligenter obturata. Solis calore deficiente, post panem extractum, imponantur furno, deinde diligenter prioribus floribus expressis infundantur secundo, tertio, quarto, alii recentes hyperici flores prioribus, exemptis; atque ita comparatum oleum servetur in usus.

Emplastrum sequens continuò geratur.

℥. Empl. contra ruptur. ℥i. mastich. glutin. piscium, sarcocoll. an. ℥ii. pulv. rad. osmund. regal. sang. drac. an. ℥i. thur. alb. pulv. rad. consolid. mai. mumia, an. ℥ß. gummi dissolvantur in aceto & cum olei hyperic. supradicti, q. s. F. empl. S. A. *Reinerus Solenander, consil. 14. sect. 4.*

Applicetur loco affecto hoc emplastrum, quod optimum est & expertum, & multoties hernias etiam inveteratas sanavit.

℥. Lithargyr. auri, sap. hæmatit. sang. drac. bol. arm. mastich. gummi ammoniac. mumia, galban. thur. costi, lumbric. terrestr. an. ℥ß. picis naval. picis Græc. ceræ alb. & rubr. an. ℥i. rad. consolid. maj. min. & med. an. ℥iii. ros. myrrh. aloes, an. ℥iii. paleæ marinæ combustæ, gallar. balauft. aristol. rot. an. ℥vi. visc. q. terebinthin. an. ℥iii. sang. hominis ruffi ℥i. minus quarta. Conficiatur hoc modo. Pellem hædinam vel arietinam recenter detractam seu excorticatam cum pilis omnibus per integrum diem coque ad dissolutionem, ita ut liquore consumpto gluten tantum restet. In colaturæ ℥i. r. viscum bulliat ad lentum ignem, continuò cum baculo agitando; postea lumbrici terrestres triti, cera item, pix, therebinthina & reliqua inicienda, & tamdiu coquenda, donec gutta super marmor projecta coaguletur. Sanguis verò humanus ipse etiam prius in moderato calore exsiccare debet, ut possit in pulverem redigi, & cum reliquis inspergi. Hoc emplastrum super petiam lini fortem extensum loco affecto applicetur, & desuper cum fascia ligetur; & jaceat in lecto pedibus elatis & capite depresso per 15. dies, vel diutius, si opus fuerit. Quidam narravit *Guidoni de Cauliata* modum hunc, cum quo curabat



omnes crepatos, in magno secreto. Supposito bono regimine, & quiescente patiente per 30. dies, & reductis intestinis, accipiebat manè & serò Si. limaturæ chalybis cum vino decoctionis hepaticæ terrestris, & super locum rupturæ per 15. dies, de tertio in tertium permutando, ponebat emplastrum factum de magnete grosso modò pulverisato & cum unguento Apostol. incorporato. Post alios 15. dies continuet emplastrum consolidativum suprà dictum, & ligetur cum brachiali, & jussu Dei erit curatus. *Arnoldus de Villanovanus. Practic. lib. 2. cap. 30.*

Hoc quod sequitur mirè convenit in omni ruptura vel vulnere.

24. Rad. chamæleontis alb. ped. columbin. siccat. an. q. s. coq. hæc duo in vino rubro stiptico, & bibat interdum manè haustum unum, Mirum est quantum hoc præstet. *Felix Platerus apud Joh. Philippum Brandelium, consil. 91.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Hernia intestinali oscbocele.

**N**Ovimus Illustriss. Principem, qui jam annos circiter viginti & tres intestinorum satis magnum ramicem perfert folius fasciæ aptæ beneficio, & tamen sine ullo valetudinis dispendio omnes principum actiones etiam vehementes & graves in venerationibus, equitatione frequenti etiam in succussante equo, in longis & difficillimis peregrinationibus, in intenso frigore subire solet. Si quando tussendum erit, item quotiescunque alvus egerenda, maximè si ea durior fuerit, inguen oblaxum retinendum, atque utraque aut saltem altera manu adducendum comprimendumque: in cibo cuncta, quæ ventrem flatibus implere nata sunt & distendunt, vitanda: quod si accidat ut ileum intestinum vel quid aliud procidat & descendat in scrotum, & mora ibidem flatibus aut induratis fæcibus ita distendatur, ut difficulter reduci possit, ex usu erit (quod in ista necessitate subinde factum utile comperi) ut ex stercore ovillo dulci lacte incocto fatus adhibeatur, tum etiam idem cataplasmatibus in modum apponatur reitereturque ut postea blandis ma-

nibus contrectatum reducatur. Ego fidem facio me aliquoties isto fotu prædicto, cum res alioqui videretur in præcipiti esse, prolapsa & aliquandiu extra corpus existentia intestina reposuisse, antea tentatis frustra aliis remediis, quapropter hoc te celari nolui: quidam ab hernia sanatus fuit persoliata usu, non tamen sine apta fascia. Ego non paucos hernia affectos juvenes in quiete degentes fasciæ commode ope percuravi; non admodum multis adhibitis medicamentis: ad hernias probantur symphytum majus, sanicula, jacea alba & nigra, sigillum Solom. quinque folium tormentilla, filix, pilosella, cujus integræ herbarum pulverem *Majo* collectæ, infantibus & pueris herniosis continuo in cibis, in lacticiiniis, puerilibusque pultibus exhibitum comperi mirum in modum profuisse. Quidam persoliata ad rupturas sanandas feliciter utuntur. Novi qui hunc affectum novem ex ordine diebus cinere lactantis leporis in vino rubro vel decoct. cons. maj. exhibitio sanarunt.

*Gaspar Peucerus*, Vir & pietate & doctrina insignis narravit *D. Adolpho Occoni* medico & mihi, se puerorum hernias recentis coagulati & in caseum formati lactis impositione curasse. Scribit *Hollerius* se herniarum herbullæ succo expresso affuso vino exhibitio novem diebus perfecte hunc morbum curasse, & *Antonius Valetius*, qui luculentis exercitationibus *Hollerii* praxim ornavit, testatur aquæ ejus herbarum stillatiæ unico haustu percuratum *Parisiis* adolescentem, cui citatior saltus insignem herniam induxerat: adhibito tamen, ut scribit, emplastro. Vocatur hæc herba *Hollerina*, quod *Hollerius* primus eius in hoc affectu efficaciam observaverit. Præscripta hæc omnia ex simplici medicina desumpta remedia tam exterius admota, quam intro assumpta in propriè dictis herniis prodesse mirificè possunt: quæ tamen in præsentia casu maximè profutura arbitror, hæc infrequentia ex prænominatis selecta notare placuit: itaque reducto intestino applicetur ceratum hoc triquetrum inguini superposito splenio (quod fasciæ annexum inguene dehiscat aut laxetur continere debet) ut totum inguen contegat, prius nudato loco pilis.



℥℥. Nuc. eupress. gallar. an. ℥i. balauft. hypocist. veri, an. ℥ij. mastich. Div. rad. consolid. maj. pulv. perfoliat. herniar. an. ℥iij. bdell. ℥iij. boli armen. ℥ij. sang. drac. Div. pic. græc. ℥j. refin. pini, ℥vi. cum cerebinth. cera & oleo vitell. ovar. vel hyperic. magistr. q. f. F. ceratum: hoc foeliciter usus sum.

Verum usitatum illud commune *Arnoldi de Villa Nova* ex pelle arietina dictum mihi præcæteris omnibus maximopere probatur.

Recordor me Medicum exercitatum vidisse, qui assumpto quantum volebat gummi elemi, affundebat acetum, eo macerabat donec acetum in superficie obduceretur alba pinguedine, tum affusis olei paucis guttis (oleum è vitell. ovar. vel hyperic. magis probarem) coquebat gummi lento igne liquatum ad formam cerati. Quando ego ipsius usum commodum scio, improbare haud queo. Ego hoc in pueris aliquoties foeliciter sum usus.

℥℥. Perfoliatæ viridia folia, & rad. consolid. maj. contero ut planè subacta simul sint & lævigata, addo ceræ novæ vel propolis tertiam partem, vel paulò plus: incorporata & bene commixta induco pittura, ut inguini affecto sub plenio imponi possint: te autem suadeo, ut hoc quod sequitur simplicissimo utaris.

℥℥. Consolid. maj. radicem solam ab omni forde ablutam, munda nihil interim abradens, istam exquisitè tritam, & lævigatam, calefactam leviter induc pittura aliquo lineo albo & impone emplastri modo inguini rupto sub plenio: mutetur bis in die, inducto alio. Observavi intra dies quindecim ista ratione coalescere: possunt consolid. maj. radices saccharo conditæ, subindeque exhiberi. *Reinerus Solenander, cons. 13. sect. 4.*

*Ætius* jubet papyrus (nos charta empoetica uti poterimus) triduo in aqua macerari atque in globo coactum inguini apponi reposito prius intestino. Solet enim tridua na adhæsiōe à delapsu vindicare: sed erit efficacius si aqua astringenti ut pûta rosæ myrtac. papyrus vel charta maceretur; hoc remedio ait *Paræus* se multos sanasse. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 36.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Hernia intestinali.*

**N**onnulli hanc curam ut certissimam, nec sine ratione commendant.

℥℥. Rad. cichor. flor. albo part. iij. pulsatill. part. ii. sem. perfoliat. part. i. F. pulvis, de quo in prandio & cœna quantum tribus digitis primoribus capi potest, in jure carnis capiat æger, usque dum integrè restituitur.

℥℥. Rad. enulæ, fanicul. consolid. maj. solidag. farracenicæ, agrim. an. q. v. F. decoctio in vino & aqua ad medietatis consumptionem: hoc decocto calido petiæ madescentis quæ quotidie locus affectus sæpius fomentetur, & postea sequenti unguento inungatur.

℥℥. Ol. vitell. ovar. pulv. tormentill. an. q. f. F. unguentum.

Refert *Paræus* quendam Chirurgum hoc modo hernia laborantes curasse: magnetem in tenuissimum pulverem redigebat, & in cibis exhibebat inde verò locum rupturæ, per quæ descendebant intestina melle inungebat, & ferri limaturam aspergebat, atque id per dies decem usurpabat, fascia simul adhibita. Si aliqua fuit efficacia, proculdubio ex vi magnetis sursum attrahentis dependebat. *Daniel Sennertus, practic. lib. 3. part. 2. sect. 1. cap. 6.*

Filiolus cujusdam pharmacopœi hernia intestinali laborans hac ratione foeliciter curatus est.

℥℥. Beton. auric. muris, veronic. alchymill. pyrol. solig. ad. farrac. agrim. fanicul. an. M. ℥. rad. cariophyllat. ℥℥. incis. & contus. coq. in M. ii. aquæ ad consumpt. medietatis: bibat mane & vesperi haustum postea.

℥℥. Lapid. magnet, mastich. an. ℥iij. lap. calaminar. sang. drac. an. ℥i. ferri ℥℥. boli armen. ℥℥. vini sublimat. quart. i. M. in hoc pannus duplicatus intinctus herniæ fortiter adligabatur bis quotidie, manè & vesperi cum fascia: brevi convaluit. *Hieronymus Reusnerus, observ. 95.*

Enterocœlem adsumpta limatura ferri atque empl. magnetico appposito in seipso sanatam narrat *Thom. Campanella lib. 6.*



cap. 20. art. 2. quàm tamen curandi rationem frustraneam doctissimè ostendit *Athanasius Kircherus*, lib. 3. De *Magnete*, part. 7. cap. 2. & contra *Paracelum* urget *Vop. Fort. Plempius*. Schol. in *Ebn. Sin.* lib. 2. quam, non magnetismi ratione, sed propter vim siccandi admittat author *Enchiridii medic. pract. cap. De Enterocoele*, qua ratione hic quoque probari debet. *Hieron. Velshius*, notis ad observ. 65. *Reusneri*.

Generosus quidam *Bernenfis* sexagenarius spatio viginti annorum insigni ac maxima hernia intestinali laboraverat, ad quam curandam, tum me, tum alios in *Gallia* & alibi expertissimos adhibuerat medicos & Chirurgos, sed frustra, tandem cum de sanitate recuperanda ne quidem cogitaret amplius, & subligaculis, ne ingravesceret malum, uteretur, incidit in morbum, à quo ultra menses sex lecto affixus fuit. Post morbum hunc ne minimum quidem indicium præcedentis herniæ sensit, nec amplius utitur splenis aut subligaculis. Ex his manifestum fit, quietem & decubitus in dorso, unicam esse panacæam herniarum. *Guil. Fabricius Hildanus*, observat. 54. cent. 5.

In Enterocoele Bubonocoele & Epiplocele valet balsamus salis gemmæ, arcanum summum in rupturis, qui hoc modo fit.

℥. Salis gemmæ lbii. fluat in igne (in tiglio) & postea solvatur in aqua pluviali destillata, filtretur, & vicissim coaguletur; has operationes liquefactionis, solutionis, filtrationis, & coagulationis tantisper repete, donec sal gemma ad summam subtilitatem fuerit per ductum, quod inde cognoscitur, quando ejus particula ad candelam admota, statim liquefeit: serva in vitro bene clauso: cura sic fit.

Repositis, si opus est (ut in Enterocoele & Epiplocele) partibus prolapsis, locus affectus lavetur cum aceto destillato accerimo, vel cum spiritu vini quotidie bis post fomentationes statim inungatur locus cum arcano salis gemmæ: ad intra exhibe singulis diebus mane jejuno ventriculo essentia consolid. maj. cochlear unum cum guttis ii. balsami salis gemmæ.

Si intestina & reliqua prominentia difficulter reponi possint, etiam si emollientia per infusiones & fomentationes fuerint ad-

hibita, ut scilicet absolvatur cura, cæteris non neglectis, sic procede. Post adhibitas formentationes quotidianas patienti exhibe per tres aut quatuor dies cor talpæ exsiccatum & pulverisatum (quotidie cor unum) mense *Majo* collectum cum aqua cinnam. & scilicet videbis operationem, inungatur locus cum balsamo sulphuris. *Joh. Hartmanus*, practice *Chimiatr.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Hernia intestinali & omentali.

Post universalium & ordinariorum remedium usum, exhibeatur cochlear injure sequentis pulveris, mane & vespere, hora una ante cibum, continuando usque ad perfectam sanationem.

℥. Cortic. myrobal. indar. chebul. an. ℥i. nasturt. portulac. plantag. sumach. an. ℥ss. corall. rub. lapid. hæmatit. carab. an. ℥i. cinnam. el. ℥iv. sacchar. rosat. ℥iv. F. pulvis. *Joh. Fernelius*, consil. 66.

Quæ de cura herniæ intestinalis dicta sunt, applicari quoque possunt herniæ ex omenti prolapsu ortæ, iisdem enim in utriusque curatione sunt scopi. *Daniel Sennertus*, practice. lib. 3. part. 2. sect. 1. cap. 6.

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Hernia hydrocele.

Vir quidam herniam aquosam vocant Græci, patiebatur, quam citissimè removi oleo sulphuris: quo totum ramicem perungebat mane ac vespere, & applicabat sacculum ex calentibus cineribus fatum. *Martinus Ruilandus*, curat. 82. cen. 8.

Paretur cataplasma ex stercore vaccino rec. & tertia parte pulv. bol. arm. ad idem maximè valet & mihi valde probatum est cataplasma nunc describendum.

℥. Stercor. capræ ℥i. cochlear. cum suis testis contusis ℥i. cumin. pulv. sulph. pulv. an. ℥ii. M. f. Cataplasma, parti affectæ applicandum, & sæpe renovandum, quod si hisce non cedat malum, punctione cum phlebotomo vel sectio.



fectione tandem utendum est. *Ioh. Zechius, consult. 63.*

Infans quidam undecim menses natus; laborabat hernia aquosa dextrum testem occupante, ita ut testis ovi exigui magnitudinem æquare videretur, vocatus ego, sequens præscribo cataplasma.

℥℥. Farin. libb. decoq. cum vino generoso ad pultis consistentiam, deinde adde oxymel. simpl. ℥iii. F. cataplasma, admovendum serò & manè: intra octo dies hoc solo remedio tumor omnino discussus est. *Lazarus Riverius observ. 4. cent. 2.*

℥℥. Fol. origan. rutæ, absint. chamæm. an. M. i. baccar. lauri, ℥i. sem. anis. fœnic. cumin. an. ℥ss. coq. in q. s. aq. & aceti pro fotu, quo foveatur scrotum ter in die cum spongia. Postea applicetur hoc emplastrum.

℥℥. Emplastr. de bacc. lauri, sterc. caprin. an. ℥ss. cochlear. contus. cum testis, ℥ss. sem. cumin. sulphur. ℥ii. malaxentur cum olei rutæ. chamæm. an. q. s. F. Emplastrum. Hisce puer convaluit. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 10. cap. 3. lib. 6.*

Vir quidam Nobilis hydrocele laborans, ita sanitatem obtinuit, primò, consilio *D. Ferrandi* peritissimi Medici, & meo jalapio purgatus fuit, postea fotu emollientes, & discutientes admoti, & tandem lanceola perforatus, in parte decliviori scroti, vitando testiculum, & lineam interstitium inter testiculos facientem, ictus autem transversî digiti profunditatem attigit antequam aqua exiverit, quæ iteratis vicibus extracta fuit, clara & non foetida, eaque ad libras duas, cura hæc satis rara fuit, cum paucis post diebus ad negotia iverit. *Petrus Borellus observ. 4. cent. 1.*

In Generoso quodam Virò, quam omnis periculi plena sit scroti, & erythroidis membranæ in hydrocele per scalpellum apertio, teste non sublato, compertum est, ab aliquot annis sinistra parte hydrocele huic molesta fuerat: frustra cataplasmatibus, ac aliis remediis crebrò usus: tandem temerarii Chirurgi consilio acquiescens, aperiri sibi scalpello tumorem permisit: effluxit citò omnis humor: tumor

quoque subsedit; sed cum testis ipse omnino esset corruptus, vicinas partes facile infecit: subsecuta mox scroti universi, ac etiam penis cum tumore & ingenti dolore gangræna. Delirium cum vehementi febre propter doloris magnitudinem supervenit, ac non ita multò post mors accessit: ren hujus sinister corruptus fuit, & seminalis in erythroidem descendens valde ampla & multum patens. *Rembertus Dedonæus, observ. 40. vide etiam observ. 39.*

## SECTIO SEXTA.

### De Hernia Omphalocele.

**I**N oppidulo quodam mulierem inspexi, cui ex hernia omphalocele, universa penè intestinorum mole, è baritonæ cavitæte procidente, tumor immensus ac velut novus venter, à vero venter flaccido & depresso, & in hunc tanquam saccum inanito appensus propendebat, quam & fascia circumducta, ut onus hoc sublevaret, collum suspensum gestabat. *Felix Plateus, observ. lib. 3. pag. 759.*

## SECTIO SEPTIMA:

### Pro Hernia sarcocèle:

**J**Uvenem quendam hernia sarcocèle laborantem absque incisione facile ita curavi.

℥℥. Pulv. sen. laxat ℥ss. vini, absinth. libb. macerentur pro infuso. De quo quotidie bibit ad ℥iii. colatas. Post sufficientem purgationem, utebatur ante & post meridiem balneo aquæ, in qua cogeatur tartarus ad ℥iii. ante & post balneum inungebatur tumor oleo sulphur. nostro, motus rarus erat, quies verò in lecto multa, atque his sanè remediis tumor indies decrevit, & per Dei gratiam spatium quatuor hebdomadum ex toto evanuit. *Martinus Rulandus, curat. 66. cent. 9.*

Chirurgus quidam insignis contra herniam tam carnosam quam aquosam emplastro sequenti feliciter utitur, quod singularis loco secreti mecum communicavit, eoque nobilius aliud in hoc affectu remedium se non habere desertè profitebatur.

℥℥. Gum-



℥. Gummi ammoniac. ℥i. bdell. ℥i. farin. sem. sinap. sem. urtic. lap. spong. an. ℥i. aristol. rot. ℥vi. sulph. ℥β. terebinth. ℥i. spirit. vini ℥β. ol. olivar. ℥iv. ceræ ℥vi. M. F. S. A. emplastrum, extend. super alutam, & loco affecto applicetur, continuo gestando. Si hoc non iuverit substituat ceratum de pelle arietina tam à Medicis *Augustanis* commendatum: intus verò de sequenti pulvere quo alias contra hernias prodesse soleo, aliquot mensibus assumat.

℥. Pulv. rad. consolid. maj. ℥β. pulv. herniar. ℥i. persoliat. ℥vi. spong. combust. spongiæ, cynosbat. adnascent. an. ℥iii. lap. spong. ℥ii. spod. terr. sigill. an. ℥β. cinnamom. fœnic. d. an. ℥i. F. pulvis.

Aliquando etiam assumpsit de sequenti pulv. contra strumam, qui *Arnoldus de Villa Nova* adscribitur.

℥. Spong. combust. pilæ marin. tost. ossis sepia, piper. long. nigr. zinzib. cinnamom. salis gemmæ, pyrethr. gallar. lap. spongiæ, an. ℥i. M. F. pulvis. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 9. cap. 3. lib. 6.*

Vir quidam Sarcocoele laborans quum cataplasma ex althæa farina fabarum & lacte caprino frustra usurpasset, iussus à *Gassero* decocto lentium in aceto facto locum fovere, deinde suffire cum thure, superponere emplastrum de meliloto cum ficibus contusis mixto; cumque non statim resolveretur tumor, thermas ferinas cogitare cœpit quas ipsi *Gasserus* dissuadere noluit. Sed his ipsis quoque non satis operantibus, quod unicum supererat remedium ad sectionem devenit, quam testiculi iactura, tandem admittere coge batur *Joh. Valtricus, Rumlerus observ. 91.*

Alius quidam hernia carnosâ laborans à Chirurgo quodam curatus fuit testiculo- rum ex vino sublimato, & imposito cata- plasmate ex absinth. malu. chamæm. rad. alch. & sem. lini, an. part. æq. conscissis & in lacte caprillo coctis. Alius etiam eodem affectu laborans, sectionem postulavit, sed chirurgi præsentia territus, mutavit sententiam, & emollientium ac resolven- tium usu continuato, ramice abscessum transeunte, & supposito, fœliciter tan- dem percuratus fuit. *Idem observ. 92.*

Medicus quidam præclarus in literis ad *Prævotium* datis testatus est, visam à se cu- ratam sarcocelen tam contumacem, ut om- nia frustra tentata fuerint, solo emplastro illo *Paracelsi* quod intract. *De Cur. Vul- ner.* Chirurgiæ minori adnexo copiosè des- cribitur, & fodicationis alterum appel- latur: quo scirrhus etiam durissimos & dia- turnos sanatos, idem. *Prævotius* deinde in secretis adnotavit. *Georgius Hieronymus Velschius, observ. 68.*

Ad ramicem carnosum ceratum hoc de- cripsi quo ita imminuta carnositas, & du- rities illa fuit, ut agrotanti & assistentibus admirationi fuerit.

℥. Ammoniac. pinguis & optimi ℥iii. in aceto eas macera, & ad ignem cerati mo- do redige postea illi adde marcasitæ argen- ti & auri in pulverem redactæ ( *ut in Græci Latini Ignarium* lapidem appellare solent ) ℥β. & in aluta ad equiferri figu- ram aut lunæ falcate effigiem extendatur, & loco affecto applicetur. *Amatus Lusitanus, Curat. 69. Cent. 5.*

## SECTIO NONA.

### De Herpete.

**E**PTIS ( ab *επτα* serpo ) tumor est in su- perficies partis alicujus excitatus, cu- tem serpentibus minimis pustulis exaspe- rans ac rodens, duplex est, unus simplex, qui *νεγροπρεξ*, seu miliaris dicitur, alter ferus, qui *εσθίουμ* seu excedens nuncupatur. Si- gna sunt, tumor latus sine omni ferè alti- tudine, durities quædam, dolor, & usti- onis sensus Herpes excedens ruptis pustulis veram cutem exulcerat, rodit; atque de- pascit, serpit in latum & altum, ex eoque ulcuscula manent arida: qui simplex est, summam tantum cutem exasperat, & sub una epidermide consistit, exiguas illic pu- stulas excitans, quæ minimum extant aut prominent, milio haud absimiles. Uter- que in vicina, quasi in orbem quoquo versum serpit, seque diffundit, ac ple- rumque medium sanescit, extremis lon- gius procedentibus. Utriusque herpetis causa est bilis flava, sincera & acris, à re- liquis humoribus secreta, quæ tenuitate qua pollet, partes omnes præcipueque



carneas transgreditur dum densiorem cutem attingat.

## SUBSECTIO SECUNDA.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Herpete Esthiomeno.*

**R**ustica mulier quinquagenaria hinc inde in coxis, brachiis, utroque genu, & cubito, pectore & facie, maculas habebat elevatas, rubras, scabras, asperas, latè serpentes, & de novo hinc inde erumpentes; ad me veniens hoc pacto sanata est.

Præscripsi vinum purgans pro quatuor vel quinque matutinis, quo bene purgata fuit. Deinde iussi scabras maculas semel in die madefacere sequenti aqua penna ea intincta.

℞. Sublimati ℥i℥. lithargyr. ℥ii. borac. ℥℥. camphor. ℥i. F. pulvis, adde aqu. ros. plantag. an. ℥iv. coquantur, ab illius usu dolorem aliquem percipiebat, qui tamen mox remisit: statimque crustis subluteis maculæ hæc obduci cœperunt crassis & duris quæ cremore lactis aliquoties emollicæ deciderunt, remanente subtruncata sana. *Felix Platerus, obs. lib. 2. pag. 544.*

Post corpus decenter purgatum, & venam apertam, iussi hac aqua herpetem madefacere.

℞. Lithargyr. ℥v. ceruss. ℥iii. vitriol. alb. ℥ii. aq. ros. ℥ii. aq. sublimat. ℥℥. aq. virid. (cuius descriptionem vide supra lib. 6. sect. 4.) ℥ii. M. diligenter. Postea hoc unguento inungo.

℞. Unguent. popul. & pomphol. an. ℥i. succ. lapath. & acet. scillit. an. ℥ii. litharg. ℥℥. tartar. ℥ii. rad. serpentar. ℥i. lap. calam. ℥iii. ceruss. ℥℥. laricæ parum ol. de tartaro ℥ii. F. instar nutriti. Hoc facto aliquandiu sanatus fuit. *Idem observ. lib. 2. pag. 546.*

Alteri ad herpes hoc unguentum præscripsi.

℞. Succ. rad. lapath. cyclam. serpentar. an. ℥i℥. limon. ℥i. lithargyr. auri ℥ii. sulph. thur. an. ℥i. crysall. borac. vitriol. an. ℥℥. fugitiv. extinct. in succo limon. ℥℥. terebinth. dissolut. in ol. rosac. q. l. adde ol. tartar. ℥i. F. instar nutriti. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 548.*

*Pro Herpete miliari.*

**I**licò pharmacum hoc illi propinavi.

℞. Syrup. rosat. solut. ℥iv. diaphan. ℥iii. infusion. tamarind. ℥iii. M. F. potio qua multa liquidabiliosa egressit. Postea syrupos alterantes calidam intemperiem exhibuimus per aliquot dies.

Tum hæc topica medicamenta sunt applicata.

℞. Succ. plantag. solan. an. ℥℥. aceti rosac. ℥ii. M. in quibus pannus lineus intinctus superponatur malo, & sæpe innovetur. Sed cum malum perseveraret, cataplasma hoc applicatum fuit.

℞. Plantag. ros. solan. caud. equin. an. M. i. F. decoctio in aq. q. s. facta colatura prædictas herbas in mortario tere, quibus adde farin. hord. lentium, an. ℥iii. vini granator. acidor. ℥iii. prædicti decocti q. ad mediocrem spissitudinem sufficit. M. F. cataplasma, applicetur: at quum exulceratæ pustulæ fuerunt, ad unguentum de plumbo devenimus, quo sanus exacte factus est.

*Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 37.*

Ego in pueris pustulas miliares seu herpes in facie habentibus accipio cretam, oleum olivaceum vini, ex omnibus æquas portiones, & linimenti instar commisceo & felicissimè inungo, quo linimento si utaris, videbis subitanè admodum curationem, & per brevem ac salutarem. Ad Phlyctænasetiam hoc conducit. Mulierem quandam herpes laborantem curavimus applicatione foliorum farfaræ. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 2. Observ. Chirurg.*

Nos (inquit *Kalescus, cap. De Cura Formicæ miliaris*) vidimus & scimus unam mirabilem experientiam qua, sine alia medicina quacunque præter diætam & purgationes, multi tempore meo curati fuerunt gratia Dei.

℞. Lanam succidam ovis vel mutonis, torrefac. in cacabo super ignem, donec sit nigra & arsa: tunc pulverisetur & distemperetur cum aqu. rosar. vel cum aq. peculi, donec sit quasi incaustum cum quo scribimus & de hoc incausto bene spisso cum pluma circumliniatur formica, i. e. herpes, & fiat hæc linitio bis in die aut ter nempe



in diluculo, vespere, & in principio noctis; & panno lineo contineatur non stringendo. Non vidi mehercule medicinam in isto casu magis expertam; constatq; ratione, quia desiccatur & stringit: in quot locis incipit, intot fiat linitio, quia ægram partem curat desiccando & sanam defendit stipticando & roborando. *Idem. schol. obs. 7. lib. 2. Observ. Chirurg.*

Miror cur in herpetibus, inflammationibus in quibus humectandi & refrigerandi consilium est, non potius ad aquam solam recurrimus, quàm ad aquam & succum plantag. & similia. *Guil. Ballonius, lib. 1. Epid. & Ephem. pag. 106.*

*Joh. Heurnius* pro herpete miliari hoc secretum habuit.

℞. Facem vini inter duo lintea, & applica. *Notis ad cap. 4. lib. 7. pathol. Joh. Fernelij.*

Herpetem miliarem aqua calcis vivæ calidè in petiis applicata mitigat: fortius operatur si alumen dulce, vel Saccharum Saturni in eadem ante applicationem dissolvitur. Sudores præterea sunt necessarii. Decoctum Persicariæ; ut & folia rubi idæi in aq. & vino decocta herpes præsertim tiliarum, non tantum mundificant, sed insuper sanant. balsamum sulphuris complementum absolvit. *Joh. Hartmannus. Præf. Chimiatri. pag. 387.*

Ego sæliciter utor aquis thermarum, quæ brevi tempore sanant herpetem miliarem, ubi non adsunt hæ aquæ, sumatis marinam, aut aquæ salitæ adjiciatis sulphur & alumen, & in hac detineatur membrum. Herpes verò exedentes sic curo: quoad totum corpus exhibeo serum caprinum, interdum farsæ decoctum: quoad partem affectam, utor aquis thermalibus *Patavinis*, aut *D. Petri*, & sælici successu hoc applico ceratum.

℞. Succ. tabaci ℥iij. ceræ citrin. noviss. ℥ij. resin. pini ℥iij. terebinth. ℥i. myrtin. q. s. ad formandum ceratum molle. *Hier. Fabricij. ab Aquapend. lib. 1. De Tumor. cap. 28.*

Sæpius expertus sum unguentum enulatum cum Mercurio in hoc affectu curando plus cæteris omnibus præstitisse. *Ambrosius Paræus cap. 14. lib. 7.*

In herpete miliari sequenti decocto rectè uti sumus.

℞. Heder. mural. plantag. ungu. cabal-

lin. an. M. j. ebulliant semel in aq. pluviæ quæ per tecta tegulata cærulea defluit, eaque aqua leviter madefactæ sunt pustulæ. Folia verò integra unguæ caballinæ ex decocto sumebantur, & communi consilio herpeti admodum commodè applicata sunt. Aliquando fiebat inunctio ex mucagine sem. cydon. cum aq. ros. linimenti instar coagulata, antequam folia imponerentur. Uti etiam sumus unguento ros. *Mesue* peciæ enim linæ eo inungebantur, & locis calidiusculis atque infectis apponebantur, ne malum ulterius serperet; prius tamen locis affectis semper inunctis linimento suprâ dicto. Est enim illud unguentum ros. (quod sine opio compositum erat) descript. *Mesue* optimi odoris, & nobilissimum remedium ad phlegmonas erysipelata, herpetas mirum in modum sedat, ut hic quoque experti sumus. *Petrus Forestus lib. 5. De Febris compositis. observ. 22.*

## SECTIO DECIMA.

### De Hordeolo.

**H**ordeolum (Græcè *ὀριον*) tuberculum est in summa palpebra succrescens prope cilia, oblongiusculum, quod suppurascens simile est grano hordei, unde & nomen accepit. Ortum habet ab humore pituitoso & crasso cum sanguine mixto. Cognatum huic malum est grando. Græcè *καλλύριον*, quod est tuberculum rotundum, translucidum, atque huc & illuc mobile, ejus materia durior est, & quasi lapidescens.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Hordeolo.

**C**onsului ut adipe gallinæ calido linitret, & oculum sæpe foveret aq. calida decoctionis hordei & chamæm. Postea cum sanguine columbi vel perdicis linitret: verum cum nec axungiam gallinæ, nec caponis ferret ob salsedinem, sub noctem hordeolum cerevisia colluebat, & manè saliva jejuna inungebat: quo remedio cessavit salsedo quam ex axungia



gia caponis contractam existimabat: existimo axungiam prius lotam aqua ros. false dine amota melius hordeolum curare: at nostra matrona continuando lotionem cerevisie & mane mungendo cum propria saliva ab hac molestia sanata fuit. Prodest etiam si abscisso capite muscæ reliquo corpore fricetur hordeolum, vel si Galbanum cum modico nitri subactum, vel Sagapenum aceto tritum apponantur. *Petrus Forestus, observ. 45. lib. 21. De Morbis Oculorum & Palpebrarum.*

In Hordeolo hordeam jejuno ventriculo sæpius masticatum applicetur. *Joh. Hartmannus. Pract. Chimiatri. pag. 101.*

## SECTIO UNDECIMA.

### De Hydrocephalo.

**Υ**ΔΡΟΚΕΦΑΛΟ seu hydrops capitis nihil aliud est, quam magnitudo capitis aucta ab humore seroso. Hujus causa conjuncta est humor serosus & aqueus, qui quandoque colligitur inter cutem & pericranium, & tum tumor est mollis, pellucidus, dolorisque expers; aliquando rursus inter pericranium & cranium cum dolore affligente; interdum etiam inter cranium & membranas, & inter eas & cerebrum, & tum tumor ad tactum mollis non est dolor est major, totum caput tumidus, & frons ipsis projecta est. Infantibus malum hoc accidit frequentius quam adultis, ex eo quod sæpe sæpius circa partum ab obstetricibus, infantis caput parum dextre tractetur, & incaute comprimatur, tum etiam quod seroso & aquoso sanguine aliquando in utero alatur fœtus ob matris in diæta errores.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Hydrocephalo.

**P**Uerum septem annorum hydrocephalo laborantem, sola olei hyperici continua inunctionem, addito pulv. myrtill. curavimus. Alius etiam eodem modo convaluit.

*Amatus Lusitanus, cent. 1. curat. 60.* puerum quindecim dies natum hoc malo

correptum intra tres dies hoc medicamento curavit.

℥. Pulv. absinth. chamæm & melilot. an. butyr. rec. ol. chamæm. an. ℥iv. ceræ parum, ad ignem F. unguentum, quo inungatur locus, & sic intra tres dies sanitati fuit restitutus.

In hoc casu expertum hoc quoque habetur quod,

℥. Mell. ℥ss. sal. ℥ss. pulv. organ. ℥iii. M. & tepide locus inungatur. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 3. Observ. Chirurg.*

Medicamentis absumentibus aquosum humorem, simulque etiam affectam partem roborantibus utendum qualia sunt sequentia.

℥. Ros. rub. furfur. melilot. an. M. i. flor. anth. chamæm. salv. beton. stæch. an. p. i. bulliant. in f. q. aq. addita vini austeri quarta parte, quo decocto modice calente, infantis caput singulis saltem octo horis irrigetur quinque vel septem diebus continuis, dein.

℥. Ol. chamæm. aneth. an. ℥i. pulv. absinth. ros. rubr. an. ℥vi. sulph. exactè pulver. ℥i. ceræ, q. s. F. linimentum quo ter in die caput infantis liniatur, & lana succida obtegatur: interposito interdum præscribendi nunc cataplasmatibus usu.

℥. Mell. ℥ss. organ. M. j. sal. ℥ss. cum modico vini austeri & croci, gr. iv. vel v. F. cataplasma capiti infantis de more adhibendum. De Chirurgia nihil proponendum duco, quod tumorem hunc præsidii præscriptis ex arte administratis omninò cessurum putem; verum si punctione seu incisione, pro educenda aqua opus erit, aqua sensim ac paulatim, non autem tota simul evocetur, ne infantis vires deiciantur. *Joh. Zecchius, consult. 64.*

*Hier. Fabrit. ab Aquapendente*, in pueris qui infantiam exceßerunt, in hydrocephalo maximo, ut remedium efficacissimum, laudat aquam calcis vivæ, si ea calida spongia inbuatur, & capiti imponatur, ac hoc solo remedio se hydrocephalum curasse scribit. Idem commendat spiritum vini primæ destillationis, cum parte quarta aq. scabios. cum spongia inpositum. Monet autem hic spongiam novam esse recipiendam, & arcte fascia capiti alli-



Alligandam, ac ne refrigeretur, calido linteo superposito moderate calefaciendam esse. Exsiccant & thermæ sulphuræ ubi earum est copia, si spongia in iis made fiat, & capiti imponatur; in defectum vero coquantur in aqua sal, sulphur, & alumen, & eodem modo applicentur.

*Avicennas* usurpat cochleas, quas coquit in decocto artemis. stœch. calamenth. vel ebul. easque ita coctas contundit, & calidè capiti raso applicat. Sed ante usum discutientium & exsiccantium medicamentorum evacuanda est aqua è toto corpore (si per ætatem fieri possit) hydragogis, sudores & urinam moventibus. Adulterioribus pil. coch. exhiberi possunt, vel succus irid. vel gr. ij. elaterii cum pil. convenientibus: per sudorem serosum humorem evacuant decoctum lign. guajac. sarsaparill. sassafras, vel balneum laconicum & sudatorium: per urinam evacuant decoctum betton. rad. scenic. asparag. sem. anisi, & alia. *Daniel Sennertus*, præst. lib. 1. part. 1. cap. 28.

Infans recenter in lucem editus hydrocephalo laborabat, totum caput occupante, cum magna saturarum dilatatione: ego sine ullo medicamento, aut alio remedio hunc affectum curavi sola fascia *Guidonis* in formam cucuphæ concinnata, qua totum caput obvolvebatur duabus extremitatibus in globulos obvolutis: quotidie dicta fascia renovabatur & intra quindecim aut viginti dies tumor prorsus evanuit. *Samuel For-  
mius*, obs. 6.

## SECTIO DUODECIMA.

### De Hydrope.

**Υ** Δρῶ Latinis aqua intercus, in specie accipitur pro tumore abdominis, & triplex est, Ascites, Tympanites & Anasarca. Ascites, (Græcè ἀσцитίς, quod totus venter instar ἀσπίδος, seu utris pleni turgat) præcipua hydropis species, est tumor abdominis ab humore aquoso & seroso in abdominis capacitatem collecto ortum habens, cui & femorum ac pe-

*Burnet Parte I.*

dum nonnunquam & scroti tumor accedit. Hujus affectus causa proxima & continens est humor aquosus & serosus: cujus autem partis vitio aqua in abdomine colligatur non omnes consentiunt. Jecur non semper in vitio esse, docet anatomica hydropicorum inspectio, multò minus culpabitur continuò lien: ex nuper detectis vasis lymphaticis luce clarius est ab horum vasorum obstructione aquam in abdominis cavitatem effundi; dum enim ab humore aliquo viscido & crasso occluduntur, humor serosus qui alias ad chyli receptaculum ferri consuevit, retrorsum ire cogitur, ac reverberatus partes unde veniebat intumescere facit, quæ in dies in altitudinem elevantur, donec nimium pręgravatæ tandem rumpantur, & sic serum in abdominis cavum nullo negotio effluit: ab hepate etiam malè affecto aqua intercus quandoque contigit, si nimirum scirrhus, obstructione, vel inflammatione laboret; tum enim à visceris molesto pondere facile rumpuntur vasorum lymphaticorum tenuissimæ tuniçæ. Rēnes item obstructi, vesica oblata, & uterus malè affectus, hydropem accersere aliquando possunt: aqua, quæ ut plurimum in abdominis cavitatem restagnat interdum vesiculis variæ magnitudinis excipitur. Secunda hydropis species est Tympanites, cui nomen a tympano inditum, cujus sonum refert venter flatibus extensus si manu percutiatur, hydrops etiam siccus vocatur. In hoc tumet abdomen ex multo flatu in illius capacitatem concluso. Sæpe etiam intestinæ in hoc affectu flatibus distenta deprehenduntur: rarò solus flatus reperitur, sed plerumque aquæ permixtus. Generantur flatus in Tympanite ut plurimum inter mēscēterii & intestinorum tunicas a calore debili, vel ab eodem nimio & torrefaciente in chylum crudum & crassum suas partes agente. Anasarca denique quæ & οὐρολεγματία & ἀρχιδιοσπίτις dicitur & cum cachexia affinitate quandam habet, est molis corporeæ præter naturam, per totum corpus aequale incrementum, vito alimenti exortum. Causa est tumor pituitosus in totum corporis habitum effusus, à viscerum debilitate, & intemperie productus, ob-

Z

quam



quam pro bono sanguine, crudus & pituitosus generatur, qui cum substantiæ partium sufficienter agglutinari nequeat, necessario sequitur prava nutritio. Alii causam referunt in vasorum lymphaticorum obstructionem, ratione cujus humor serosus à partibus neutiquam separatur. Ascitis signa sunt, intumescencia ventris, pedum & plerumque etiam scroti, ægro cicumvoluto de latere in latus, murmurantis & fluctuantis aquæ sonitus observatur; urinæ pauca sunt & crassæ, interdum & rubræ; sitis adest magna, tussis sicca, tandemque respiratio difficilis, catarrharum partium extenuatio, & febris continua & lenta. In tympanite venter percussus, instar tympani sonum edit, moles abdominis minus gravis est quam in Ascite, major tamen est inflatio, tormina præcesserunt circa umbilicum, & lumborum dolor, ægro supino jacente, venter distentus ac durus manet, neque dum se convertit æger, ad latera devolvitur, ructus & crepitus crebro prorumpunt, borborygmi & rugitus obmurmurant. In Anasarca denique non solum venter, & crura & tibiæ, sed etiam manus, brachia, pectus, facies, & totum corpus intumescit, vestigiumque impressi digiti aliquandiu remanet, color cutis pallidus & cadaverosus, carnes molles & laxæ, urinæ tenues & albæ, respiratio difficilis, febrisque continuæ & lenta non raro consequitur.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Hydropo Ascite.

**C**olonus quidam hydropo diu laborans, cum nihil opis à Medicis aliis sentiret, me consilii causa accersit, cui imperavi, cum non febricitaret, ut continuo allium comederet, quo factum est, multum aquositate per urinam profuderit, atque ex insperato eo remedio sanus evasit: alii etiam plurimi ita curati sunt: possunt contundi alii capita viridia, succusque per pannum cum jure vervecis aut pulli colatus bibatur. Novi & alios hoc solutivo subinde exhibito, multum aquæ per intervalla per alvum reddidisse, & sanos factos esse.

℞. Fol. sen. ℥ss. sem. anis. ℥i. fol. Me-

zereon. ℥ss. rad. irid. virid. parum contus. ℥iiiss. soldanel. ℥ss. infund. per noctem in ℥ix. feri lactis.

Facta ebullitione mane hujus forti express. ℥℥. ℥vi. Mell. rosat. colar syrup. de eupator. an. ℥i. M. pro duabus dosibus. Ego cum video urinam supra modum tinctam esse, loco mezereon pono ℥ss. rhei opt. addendo spice ℥i. quo sepe cum magna felicitate usus sum in nosocomio *Delpensi*.

*Elideus* præceptor meus hoc utebatur.

℞. Rhab. el. pulv. ℥i. pulv. soldanell. ℥ii. M. exhibebat unica vice cum decocto aut aqua convenienti. *Petrus Forestus, observ. 27. lib. 19. De Morbis hepatis.*

Cuidam hydropo laboranti inter reliqua pharmaca nullum magis juvabat quam sequens medicamentum.

℞. Succ. ireos ℥ss. aq. casei ℥iiiss. mell. crudi, ℥ii. F. leve ebullitio, & coletur, in colat. dissolv. spic. nard. ℥ss. cinnam. ℥j. diagrid. gr. iii. M. detur in aurora, ex eo semper habebat ad minus octo sedes valde aquosas. *Petrus Forestus, observ. 30. lib. 19.*

Quidam hydropicus inflatus ventre, manibus, pedibusque & facie, à Medicis destitutus, & tanquam desperatus, adiit littus marinum, & navicula per aliquot milliaria ascendit in altum maris: & provocato vomitu, post vomitum exercitio, utens sanati restitutus est. *Idem schol. ad observ. 32. lib. 19.*

Ad aquosos humores educendos, imprimis confert squamma aris, vel æsustum: quo *Jacchinus* se primum, quod sciat, nostra ætate usum refert; cum tamen *Bæsdorpius* antea eo usus sit in Imperatore *Carolo* quinto hydropico, qui cum alii Medici desperarent, se unum remedium habere profitebatur *Carolo* Imperatori, sed eo se potius malle uti in Rustico quam in Imperatore, cui Imperator respondit (ut nos à fide dignis accepimus) cogita te Rusticum præ manibus habere, modo Imperatorem ita curaveris; atque eo utens, illum sanavit, addit *Jacchinus*, quod utrumque optimè debet conteri, atque in catapotia conformari ex melle dosis à ℥i. ad ℥ss. admisce cariophyll. vel cinnamonom.



namom. *Idem schol. ad observ. 37. lib. 19.*

Mirabilis est historia vetulæ mulieris ab hydrope curatæ, quæ talis est. Vetula quædam hydropica à Medicis destituta, ab altera vetula edocta capiebat ranas rubetas dictas, easque vivas in ollam novam conjiciebat, superinfuso ol. olivar. illisque sic decoct. eo ol. ventrem inungebat, deducendo manus versus inferiora à stomacho incipiens versus inguina, idque calidè; & secundo die tumor descendit ad inferiora, ita ut mirum in modum intumuerint pedes, sed quum prosequeretur inunctionem, tertio die penitus delituit tumor cum nulla sensibili evacuatione. Laudat *Gradus* si in balneis arte paratis imponatur ranæ vivæ, mirabiliter enim ad se attrahunt aquositate. Sed topica non administranda nisi præcesserint universales purgationes. *Idem schol. ad observ. 35. lib. 19.*

Matronæ cuidam hydropicæ prius bene per pil. tres exiguas ex mezereo descriptionis *Donati ab Altomari*, repurgatæ, post aliquos fatus convenientes pro cruribus inflatis, sequens etiam cataplasma cruribus supra modum inflatis apposuimus

℞. Rad. ebuli rec. M. vi. rad. brion. ℥j. cortic. exter. sambuc. M. iv. fol. cucum asinin. M. ij. caulium rub. M. vi. fol. malv. M. ij. fol. alth. M. iij. furfur. macr. M. v. flor. chamæm. M. iij. flor. melilot. M. ij. absinth. exsicc. M. iij. decoq. in aq. font. q. s. pistentur, addendo unguenti agrippæ ℥iij. farin. hord. ℥ss. F. cataplasma ut artis est hoc cataplasmate crura involvebamus usque ad genu: quo multa aqua effluxit absque corrosione. Est egregium & pro arcano retinendum. *Petrus Forestus observat. 39. lib. 19.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Hydrope Ascite.

℞. Succ. rad. irid. ℥iij. elater. gr. iij. (non transeas gr. v. ad summum) agar. præp. ℥i. lact. caprin. q. s. M. F. potio. Præstat sæpius iterare hoc medicamentum, quam semel validè evacuare. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 259.*

Vidi Venetiis religiosum quendam hydropicum ex ascite & tympanite, qui fuit

curatus, adfuerunt mecum Exc. Medici plurimi, scilicet, *Papiensis, Eugubinus, Trincavella*, & alii. Habebatis, ut dixi, ascitem cum tympanite, & tabem cum febre hectica, oportebat tunc exsiccare & humectare, quare eramus in maxima discordia, ego volebam ut multum biberet, sed quæ aperirent, quia habebat plurimas obstructions, præterea ut humectaretur, quia ad tabem pervenerat: ordinabam ergo syrupum acetosum cum omnibus quæ provocant urinam. *Eugubinus* volebat quicquam esse bibendum, & narrabat de quodam historiam, qui per sicca fuit curatus *Papiensis* ut litem dirimeret, conclusit neque liberaliter, neque omnino nihil esse bibendum res distrahebatur usque ad noctem deducebant Nobiles unumquemque Medicum ad suam cymbam, ibi tum *Papiensis* quod antea dissimulaverat, conversus ad magnificum quendam dixit, si vultis curare hunc Dominum, profectò non aliud erit faciendum quam quod consuluit *Baptista Montanus. Ioh. Baptista Montanus, consil. 363.*

In Hospitali ventre tumente & pedibus agrotabat pauper, cui hoc vino medicato subvenimus.

℞. Rad. irid. ℥ss. cort. rad. sambuc. & ebul. an. ℥i. asinth. sicc. ℥ij. fol. sen. ℥j. sem. carui ℥i. vini mensur. j. coque leviter in duplici vase, bibat mane haustum aliquoties: multum & frequenter inde minxit, sensimque tumor ventris & pedum subsedit sanitatque restitutus est. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 633.*

Hydropico cuidam Sartori propinavi succum ireos ut biberet ad ℥ij. addito melle, unde plurimum & sæpius minxit & deiecit, & postquam repetisset bis vel ter detumuit venter, pedesque subsederunt, ipseque sanatus est. *Felix Platerus observ. lib. 3. pag. 633.*

Ad serosum humorem per urinas & alvum educendum vinum medicatum sequens ordinavi.

℞. Rad. quinque aper. an. ℥ss. rad. irid. ℥ss. rad. asari ℥ij. cortic. rad. sambuc. cortic. ebul. an. ℥i. absinth. sicc. ℥iij. majoran. ℥ii. fol. visc. q. ℥vi. flor. genist. ℥i. sem. fœnic. ℥ii. petrosel. ℥i. sem. ebul. ℥ss. sem. heder. ℥ii. fol. sen. ℥ii. fol. soldanell. ℥ss.



℥℞. rhei ℥. ℥iii. spic. schenanth. an. ℥℞. rarefiant omnia, & incidantur, & sacculo includantur, & infund. in vini albi ℔viii. bibat de eo haustum unum mane duabus horis ante prandium continuando aliquoties. *idem observ. lib. 3. pag. 639.*

Cum seni cuidam hydrope laboranti, pedes mire intumescerent, & vix spirare nisi erectus posset, scarificatio cruribus fuit adhibita, unde mensuræ aliquot seri, pedetentim effluxerunt, liberiusque spiritum duxit; sed rursus recrudescente malo, & repetita scarificatione, fluente aqua, semper melius habebat, donec gangraena in pedibus suborta (uti frequentes fieri solet) cum confecit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 649.*

E pedibus in hydrope ascite tumentibus, sponte aqua è phlyctænis, seu vesiculis illic natis, quæ disrumpente aquam profundebant, vel scarificatione facta, è plagis ad multas sæpe mensuras sensim effluxisse, aliquosque sic liberatos fuisse: licet in aliis, mortis imminens sit indicium, multoties observavimus. Sed quod magis rarum, in quodam hydropico, ex scroto mirè tumefacto, aquaque pleno, nulla apertura facta, supra mensuras tres vel quatuor sensim extillasse vidimus, qui tamen minimè mortem evasit, quod paracentesim in scroto ubi tutius fieret, plurimum profuturam, in illis, qui curari possunt, nobis ostendit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 650.*

In Xenodochium *Basil. ense* adducta fuit puella pauper annorum decem ascitica, ventre in immensum tumente, pedibus item inflatis, reliquo corpore penitus assumpta, summaque dyspnœa laborans, ita ut penè suffocaretur, prominebat illi umbilicus vesicæ instar pelliculæ, quam Chirurgus scalpello leviter descindens, me iubente, aperuit, unde magno impetu aqua profilit, quàm cum sensim aliquot dies emitteremus, ipsaque statim ubi venter parum subsédisset, spiritum facile duceret, eamque tanquam bene habentem. Chirurgus negligeret, factum est ut aqua rursus se colligente, venter denuò intumuerit, vesicaque apparuerit, qua rursus dissecta, cum denuò aquæ effluxus pateret, & turunda immissa foramen ne

coalesceret apertum retineretur, atque indies aquæ aliquantum educeretur, tandem ventre in pristinam formam remanente, pedumque tumore evanescente, marcoreque corporis per cibum & potum emendato, ex Xeno in nosodochium translata, ibique aliquot septimanas permanens, integrè sana cum matre discessit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 651.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Hydrope Ascite.

**V**iro cuidam hydropico singulis quatuor diebus exhibui sequentem haustum; qui miraculosè depellit hydro pes.

℥℥. Aq. absinth. ℥v. extract. diacolocynth. ℥ii. ad ignem dissolvantur, hæc potio multas aquositates, multos flatus, multos quoque alios vitiosos humores quavis vice sine dolore & molestia eduxit, ac mirum in modum profuit. *Martinus Rulandus curat. 3. cent. 3.*

Puerum quendam novem annorum (ut & alios multos hydropicos) sanavi per solam potiunculam hanc.

℥℥. Extract. esulæ quantitatem nucis mosch. aq. ℥iii. M. facta simul ebullitione. Macerentur per noctem. Manè colatum bibit frigide, quo per alvum plurima pituitosa & aquosa excrementa expulit. Pro residuis aquositatibus propellendis exhibui die sequenti iterum eandem potionem, cujus operatio bona & multa confestim sanitatem integram reddidit. *Martinus Rulandus, curat. 63. cent. 3.*

Mulier quædam ascitica à me optimè & brevicurata est taliter.

℥℥. Seri lactis ℥v. extract. esulæ ℥ii. M. pro haustu, quem bibit manè, & tertio post die repetiit, & hoc sanè omnes aquositates ex toto corpore exturbavit, adeo ut paucis elapsis diebus sanitatem iterum obtinuerit. Potus erat serum lactis, sed sitim, meo jussu, perserebat quantum potuit. *Martinus Rulandus, cur. 94. cent. 3.*

Virum quendam hydropicum ita curavi.

℥℥. Aq. terr. sanct. ℥vi. F. potio quàm in lecto.



## SUBSECTIO QUARTA.

## Pro Hydrope Ascite.

lecto benè contactus bibit calidè, ac sudor emanavit è toto corpore per tres horas, & post sudationem, egressit quoque multoties multas per alvum aquositates, & intra biduum annuente Deo, omnibus admirantibus, tumor abdominis, crurum & pedum, & reliqua omnia symptomata evanuerunt. Hæc aqua est optimum medicamentum hydroticum & hydragogon. *Martinus Rulandus, curat. 88. cent. 3.* Descriptionem aq. terræ sanctæ, vide infra sectione *De Potagra* subsect.

Mulierem asciticam brevi tempore ita curavi.

℥℥. Aq. fontan. syrup. ros. solut. an. ℥iij. M. pro haustu, quem frigidè bibit mane, & per duas horas ante cœnam repetiit, atque melius se ex utroque haustu habere aiebat, sed tumor non est imminutus: quare.

℥℥. Extract. esul. ℥i℥. aq. acidulæ ℥vi. M. Macerentur per noctem, manè colatum bibit, quod sedes aquosas plurimas fecit, attamen venter parum detumuit, ideoque post duos elapsos dies dedi spiritus vitæ auri ℥i. syrup. è Sena ℥℥. M. pro haustulo, qui eduxit alvo copiosissimas aquas & exinde omnis tumor remisit, atque ex insperato intra mensis spatium ex toto sana facta est. Pro potu dabatur vinum cui imponebatur absinthium & enula campana. *Martinus Rulandus, curat. 47. cent. 4.*

℥℥. Aq. absinth. capill. ven. an. ℥iij. diaturb. cum rheo ℥vij. M. pro haustu, cujus virtute vir quidam hydropicus excrevit ad libras triginta, ichorum & aquositatum, & melius statim habuit, brevi omninò convaluit. *Martinus Rulandus, curat. 86. cent. 9.*

Mulier quædam gravida ascite morbo correpta, per Dei misericordiam ex toto sanata est spatio decem dierum: sic.

Balneabat & lavabatur jussu meo decem dies continuos in aqua chalybeata: ex quo balneo omnis aqua intercus evanuit sine fœtus detrimento, sed cum matris fœtusque salute. *Idem curat. 79. cent. 4.*

Cum materia hæc nulla indigeat concoctione, ad expulsionem sic orsus sum.

℥℥. Succ. ireos ℥ij. melli rosat. colat. ℥j. M. & jejuno stomacho bibat, quo aqua illius quotidie parum emittebat. Postea vero octo interpositis diebus, catapotia ex nitro *Alexandri* cum troch. alhand. mixta propinavi in hunc modum.

℥℥. Pil. de nitro *Alexandri* ℥ij. troch. alhand. ℥i. M. F. pilul. v. cum quibus multum aquæ egerebat, quibus sæpè interjecto temporis spatio inter unam & alteram propinationem, usus fuit, nam sensim paulatim vacuandus est humor iste, mirum etiam in modum profecit hoc conditum.

℥℥. Rad. ireos per tyrocnestim trajectæ ℥℥. zinzib. ℥℥ mell. quantum ad spissitudinem sufficit. M. quo sæpe utebatur & optimè absque anxietate & dolore aquositatem illam deponebat. *Amatus Lusitanus, curat. 30. cent. 1.*

℥℥. Elect. hydragog. min. *Fernel.* ℥℥ vini albi ℥iij. M. sumat in aurora per intervalla, item,

℥℥. Terebinth. vino albo lotæ ℥ii. sachar. opt. ℥vi. F. electuar. sumat. ℥ii. pro vice. Potest fieri potabile, si cum luteo ovi & vino dissolvantur in mortario: est medicamentum polychrestum quod alvum & urinas movet & calefaciendi vim habet, detur bis in septimana. Inter validiora sunt semina ebuli, cuius pulvis cum cinamomo datur ad, ℥ii. in vino purgat sursum & deorsum validè; estque primum medicamentum, eoque *Boninus* hydropes curabat, exhibendo in jusculo per intervalla, potest etiam absumi aq. quæ est in abdomine iis quæ discutiendi vim habet, inter quæ potissimum locum habent incessus in balneis sulphureis, dum vires valent, præterea in critici acervo insideat, ita enim attrahitur humiditas ut etiam si inspergatur arena fervida ad litus maris sub ardente Sole. Saccharum absinth. pontic. viridis *Matthiolus* proponit tanquam optimum remedium, cuius hæc sunt verba.



Abſinthium ponticum efficacem vim obtinet ad aquam inter cutem, ut mihi jam ſæpe experimento eſt compertum: equidem quosdam novi hydropicos quaſi deploratos, qui ex longo eſu comarum ejus, quæ ſaccharo adſervata fuerant ſanitati reſtituti ſunt. Parandi ratio hæc eſt.

24. Floreſcentium jam comarum rec. abſinth. lbj. ſacchar. albiſſ. lbiii. demptis caulibus & pediculis tundito in mortario lapideo, deinde iis optime tuſis, ſaccharum in pulv. tritum adiecit, rurfus omnia ſimul tantisper tundito, donec in unum corpus redigantur; mox ad uſum recondito. Ex abſinthio ita parato, patienti prius purgato, datur quotidie ꝑ. tribus horis antecibum. *Rodericus a Fonſeca, tomo 2. conſult. 39.*

Purgato prius corpo e, ex cujuſdam conſilio ſingulis matutinis in aurora, unum vel alterum hauſtum propriæ urinæ ebibebat, id cum ſpatio quatuor menſium continuafſet, & interim hydrogogis aliquoties purgatus fuiſſet, tumor ventris & tibiæ paulatim ſubſidit, tandemque pleniffimè convaluit. *Guil. Fabritius Hildanus, obſerv. 51. cent. 3.*

*Cosmus Slotanus* Chirurgus præſtantiffimus virum aſcite laborantem curandum habuit medicamenta permulta, tum interna, tum externa, ei abſque fructu adhibita fuerunt, tandem verò adeò copioſè in ſcrotum delapſu eſt humor ſeroſus, ut extincto calore nativo, ſecuta ſit gangræna, adhibitis quæ ad gangrænæ curationem ſpectant, decidit ſcrotum, ita ut teſticulari nudi conſpicerentur. Hinc tantùm effluxit humoris ſeroſi, ut a morbo liberatus ſit æger, & diu ſupervixerit ſanus, atq; liberos aliquot procreavit. Teſtes autem natura obduxerat calloſa quadam ſubſtantia, quæ eos vice ſcroti obtegebat, & ab externis injuriis vindicabat. *Guil. Fabritius Hildanus, obſerv. 48. cent. 1.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Hydrope Ascite.

**P**ropter materiæ ventriculo & hepati propinquæ tenuitatem, promptitudinem & copiam, non requiro longam

multamve concoptionem; ſed ſtatim ad aquei humoris evacuationem feſtino, & præter alia, hic mihi in uſu eſt gratiola herba, quam licet valde amaram, & propterea minus delicatam in ſubſtantia exhibere queunt alii ad ꝑ. cum pulv. cinnamom. & ſem. aniſi momento, ſaccharo & vini hauſtu; ego tamen in vino decoquo Mi. ejus parvum, ſeu ꝑ. cum uvis paſſis acini exemptis, & a forti expreſſione admixta canella, aniſo & ſacch. hora matutina propino, vel hac ratione apparari poteſt.

24. Gratiol. ꝑ. ſoldanell. ꝑ. ſemin. aniſi. ꝑ. paſſul. enucleat. ꝑ. bulliant cum vino ad remanentiam ꝑ. liquor expreſſus exhibeatur. Potens illud eſt pharmacum, quo ſeroſarum & aquearum ſuperfluitatum libræ non pauciores octo quandoque expurgantur, proximum potentia & bonitate catharticum ſuccedit ſuccus radic. irid. depuratus, qui cum ovi vitello diligenter commixtus, albumine prius effuſo, ex teſta tepidè ſorbeatur, vel paretur ſequens hauſtus.

24. Succ. irid. per reſidentiam defæcati ꝑ. vel ꝑ. ſyr. roſ. ſolut. ꝑ. cinnamom. elect. ꝑ. M.

24. Dantur item pil. aggregat. ꝑ. cum gr. ii. elaterii cortex ſambuci & ebuli interior flavescens vulgò hic uſurpatur, redigitur & ebuli cortex in pulverem, cujuſque ꝑ. cum aq. linariæ ꝑ. propinatur, unde per urinam, veletiam ſedem, aqua cutim ſubiens potenter expellitur, frangulæ à clariff. *Matthiolo* deſcriptæ utilitas non vulgaris: cujuſ interior cortex decoquitur cum eupator. abſinth. romicuſcuta, veron. rad. cichor. ſem. apii & ſœnic. adjecto poſtea cinnamomo. Efficax hic item viris ſylveſtris radix. Sunt qui olei vitrioli guttam in vini cyatho hydropicis propinant, idque magni arcani loco habent, porro hoc obſervandum, ſingulis ſeptimanis ad minimum ſemel tentandam eſſe evacuationis repetitionem ne venter mox denudò ſaburræ aquæ affluxu exundet, quando autem paulatim ventrem & hepar exonerari deſideramus, aut propter humoris delinquentis abundantiam, aut labefactam viſcerum virtutem, aut plurium ſymptomatum concurſum, tunc ex hoc



condito quotidie vel alternis diebus hora matutina sumatur ℥. med.

℥. Succ. irid. ℥. meza canell. galang. an. dr. ii. cariophyll. macis, an. dr. i. zedoar. ℥. ii. soldanell. el. ℥. med. in pulver. trita, M. cum melle despumato ad elect. formam & baccis quoque sambuci & ebulli à semine expurgatis, & per colum trajectis, succus cum paucō melle despumato, vel saccharo coctione inspissatus hic utilis, stillatitia item utriusque aqua artificiosè extracta ad ℥vi. hausta commendatur. Prima adhuc arborum harum germina vel fol. adhuc tenella leviter bullita in acetariis hic cum successu assumuntur, quæ in eundem usum etiam olerum more coquuntur. Urinam scientia hic unicè prodesse constat, inter quæ efficax est imprimis oleum è juniperi baccis purè extractum, & cum vino sumptum. Datur à plerisque petroleum cum vino, quod urinam, sudorem & vomitum movet. Memini adhuc quod *Roma* marito ascite diutius excruciato, pulverem bufonis usti, ut veneno tolleretur, sumptum pertasa uxor exhibuerit, unde copiosum hic lotium reddidit, hinc ipsa denuo eundem propinat pulverem, ut citius ærumnosam sumptuosamque vitam cum subita commutaret morte, qui ab uberiore aqua confertim per vesicam exoneratus, præter conjugis expectationem convaluit. Sunt item qui propinat decoct. rad. aperien. ℥iv. cui admixtæ fuerint sem. lini ℥iii. Correctoria scilicet, & cantharides duæ simul decoctæ, sed prius simul colantur, interim ad viscera roboranda hanc præscribo mixtionem.

℥. Conserv. rad. enulæ ℥i℥. conf. absinth. rom. ℥i. spec. diacinnamon. ℥i℥. dialacc. ℥i. ol. juniper. ℥ii. cum syrup. de eupator. q. s. F. conditum, in usu etiam sint zinzib. conditum, radices pimpinell. conditæ, conserv. absinth. rom. conf. rad. helenii, & rad. eedem conditæ, aliquoties vini sublimati usum permitto maximæ in hypofarca. Caterum duo etiamnum reliqua sunt præcipua totius curationis capita, quæ si ritè observentur, mirè conducunt. Primum est in toleranda siti constantia, quam stricta adeo lege impero, ut agris non ultra ℥i℥. vini in quemlibet diem permit. tam: minori molestia hic obedire queunt,

si ex angustis oris vitro bibant, humectata etenim sæpius vini stillantis momento lingua promptius fallitur sitis, nec ejus copia gravatur ventriculus. Alterum & serè maximum erit sudor; quem quomodocunque, quantum fieri poterit, extorquere oportet. Theriaca postridie purgationis, cum vino calido propinata, huc facit extrinsecus sudoris profluvium multipliciter molior, idque pro ægrotorum diversa conditione, tenuioris siquidem fortunæ hominibus consulo, ut mensæ incubans corpus universum in clibanum, recenti pane extracto, etiamnum tepentem, immittatur, sicut caput extra præfurnium pulvinari inbixum liberè respiret, ne calidiori aere suffocationis periculum subsequatur. Ut is quoque citius promoveatur & tibiæ inflatio simul discutiatur, arenam in lebeo vel cacabo calefactam, sive etiam cineres quercinos eodem modo calentes in sacculum infundo, cui colligato imponuntur crura tumida mane & vesperi. Aliud sudorum exprimendorum modus inire utilis & certior existit, si cupa idonea prius igne vasi imposito incalescat, tecta lodice, aut panno denso, vel operculo ob tumidum corpus commodo, in hac super sedecula insideat æger thorace & collo ita munito, ne quid vaporis exhalet. Deinde sequens decoctum in cacabo vel vasculo aptiore fervidum intra tibiæ collocetur, in quod subinde igniti silices immittentur, ut novus copiosiorque denuo excitetur halitus, qui semper in ventre tumido quam fieri potest calidissime excipitur: ne tamen primi semper fervoris violentia urat cavendum sedulo: quo autem constantius diutiusque hoc sudoris effluvium toleraverit ægrotus, eo suæ valetudini consulat rectius. Postea linteo calido cooperatus, in contiguum lectum calentem deponatur, ne præpediatur sudoris fluxus: interim exhibeatur quod vires roboret, vel reficiat: decocti jam dicti materia esto; rad. & folia sambuci & ebulli, raphanus, absinth. puleg. ruta, abrotan. marthub. hedera, rosmarinus, majorana, organ. salvia, calamenth. lauri folia, thymus, hyssopus, centaur. min. nasturtii species, bacc. junip. anethum, chamæm.



que admixtis sulphure potissimum & sale, in lixivio & vino, aut in lixivio solo bulliant: vel suffitus hic excitetur solo acri lixivio, ex sarmentorum cineribus, vel quercinis parato. *Ioh. Wierus, observ. 5. lib. 1.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### *Pro Hydropè Ascite.*

**I**Nter medicamenta quæ aquam educunt, primum obtinet locum succus iridis depuratus à ℥ii. usque ad ℥ss. bis in septimana cum mell. rosat. ℥ii. in aurora datus: hac lege ut inter has evacuationes jecur corroboretur hoc medicamento.

℥. Spec. diarrhod. abbat. troch. de rheo. hepat. lupi præp. an. ℥i. cum syr. de absinth. F. bolus, in aurora dandus. Succus etiam cucum. sylv. siccatus (quem elaterium vocant) omnium efficacissimè purgat, atque cum minori molestia & violentia, si hujus tria vel quatuor grana cum pilul. aloephang. ℥ss. in bolum cum syrup. absinth. redigantur, & in aurora exhibeantur. Medicament. autem ex cantharidibus paratum, licet ex *Galen*i placitis aquosum humorem hunc per urinam valenter expurget; mihi medicinam facienti semper fuit suspectum.

Hydragogum quod sequitur egregiè aquas subducit.

℥. Soldanell. ℥ii. bulliant in aque scolo-pendr. ℥ix. ad consumptionem tertie partis, in colat. adde pulv. sem. ebuli ℥i. vel ℥ii. vini albi ℥i. hec potio alternis diebus maximo cum successu in aurora felicissimè exhibetur. Subinde etiam iniciantur clyster sequens.

℥. Soldanell. M. i. mercurial. malv. flor. chamem. an. M. ss. sem. anis. fœnic. carvi, dauci, an. M. i. bulliant in aq. q. s. in colat. ℥i. dissolv. benedict. laxat. ℥i. electu. ex bacc. lauri ℥i. ole. rutac. ℥iii. sacch. rubr. ℥i. sal. com. ℥iii. F. clyster. Hic Clyster non solum aquam corruptam expurgat, verum etiam & flatus, qui aquoso humori semper junguntur (unde ventris distentio & dolor) mirificè discutit: propterea & toto etiam curationis tempore alternis saltem diebus utiliter injici poterit, inter

cataplasma ventri adhibenda, quod sequitur maximè valet. Emplastrum videlicet ex cochleis cum testis suis exactè contritis cum aqua ardenti, oleo irino & oleo ex rebinthina destillato paratum.

De Chirurgicis auxiliis nihil habeo quod proponam, quandoquidem venesectio hydropicis omnibus nocentissima censetur, nisi inter morbi initia, ex consueta aliqua sanguinis salubri excretionem pendentis, neque etiam de perforatione, vel ustione cogitandum judico, quoniam præterquam quod opus hoc periculo maximo plenum est, nihil facit ad morbi fomitem tollendum, viscerum nempe tumorem. *Iohannes Zecchius, consil. 77.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### *Pro Hydropè Ascite, ex hepatis scirrho.*

**C**lysterem paravi ex urina pueri imberis in qua modicum fermenti, incoqui jubebam, cum anisi, aneth. & fœnic. femin. adiecta mellis despumati ℥i. hoc clystere mirificè allevabatur, nullo enim magis quam hoc detumescere ventrem, aquosa excerni, & flatuosa discuti sentiebat: estque hic clyster mihi in ejusmodi affectibus familiaris atque probatus. Utebar interdum hoc decocto præstantissimo, cui ego secundum Deum, primas in hac curatione partes tribuo.

℥. Rad. irid. rec. benè purgat. & contras. ℥i. fol. soldanell. ℥ss. cinnom. el. ℥ij. sem. anis. ℥i. infund. omnia in vino albo & aq. capill. ven. per noctem, & F. levis ebullitio, adde in fine rhei. el. ℥i. F. fortis expressio, quàm, semel. in hebdomada sumere jubebam. Fovebam ventrem sequenti fotu.

℥. Rad. irid. rec. ℥iv. rad. ebul. ℥i. fol. ejusd. M. ij. eupator. veri absinth. origan. puleg. calamenth. rutæ, an. M. j. malv. & alth. cum rad. an. M. i. ss. soldanell. M. i. ss. flor. chamem. melilot. anthos, flor. thymi, an. p. i. sem. cuscut. ℥i. sem. lini, fœnugræc. alth. an. ℥i. ss. sem. anis. aneth. fœnic. cum in. an. ℥i. fur fur. p. ij. F. omnium decoctio in aqua marina & vino rubro potenti & cum spongia infusa & expressa foveatur tumidus venter ante cibum.



bum, post fotum ungatur oleo aneth. rutac. & cheirino, adiecto polline cumini, galangæ anisi, & baccar. lauri, interdum emplastro de baccis lauri usus sum, duritiem hepatis curavi, admoto cerato santalino, cui mastix, spica indica, schænanthus, absinth. coma, cum paucis gallinaceo adipe essent conjuncta, & ex oleo mastich. excepta, hoc curationis ordine tantum profecimus, ut Deo opifice, mulier, quæ ab omnibus deplorata habebatur, in integram valetudinem sit restituta. *Franciscus Valeriola, observ. 2. lib. 1.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

*Pro Hydropē Ascite.*

**I**Mprimis usus sum hoc clystere, in aq. f. q. incoquebam fermenti acris ℥i℥. addito salis communis pugillo, facta colatura, urinæ pueri impuberis ℥vi. injiciebam & ol. rut. ℥iii. mell. despumat. ℥i. mirum profectò quantum ab hoc clysmate æger allevaretur, ut à quo ingens aquei humoris & flatuum copia effundebatur: nec mirum, nam urinam hominis acritudine sua hydropicis conferre scripsit *Avicenna*, quod potenter aquas detrahat.

℥. Ad deobstruendum hepar & serosum humorem solvendum hoc sumus apozemate usi.

℥. Cortic. fœnic. petrosell. apii, gram. rusci, asparag. rad. rubiæ tinct. in vino albo & potenti per noctem temperatar. an. ℥ii. rad. irid. rec. ℥ii. rad. asar. cort. rad. tamarisc. & cappar. an. ℥i. sol. agrim. cichor. utriusque ceterach. capill. ven. an. M. j. soldanell. M. i℥. sem. anis. fœnic. ammeos, an. ℥iii. sem. melon. contus. ℥i. passul. enucleat. paria x. cinnam. el. conquassat. ℥iii. cicer. rub. p. ii. flor. trium comm. an. p. i. F. oninium decoctio, in colat. ℔ij. adde syrup. de quinque rad. de byzantiis, & de eupator. an. ℥iv. clarificetur, & aromatizetur cum santal. citrin. cinnam. el. & rad. irid. an. ℥i. hoc apozemate dies totos octo uti agrum jubebam, & tertio quoque die clysterem qualem supra descripsi injici jubebam. Ubi jam abundè meatus infarctu liberatos percepissem, purgans quod sequitur medicamentum dedi.

℥. Decocti præcedentis ℥v. adde rad. irid. rec. & bene purgat. & contus. ℥i. sol. soldanell. ℥i. cinnam. el. ℥i℥. sem. anis. ℥i. rhei el. ℥i℥. infund. omnia simul in dicto decoct. & modico vini al. per noctem, & bulliant unica ebullitione, postea fortiter exprimantur, expressioni adde syrup. de cichor. cum rheo syrup. ros. solut. an. ℥ii. M. F. potio: quæ profectò assumpta plurimum profuisse est visa, aquam enim copiosè absque molestia detraxit, undè mirè se adjutum æger testabatur. Hoc purgationis genere repetitis vicibus ter sum usus, ad tumorem ventris discutiendum post fotum convenientem emplastr. sequens admovebam.

℥. Sterc. vacc. ℔i. sterc. caprin. ℔℔. bulliant simul in aceto fortiss. & in mortario terantur addendo sulph. ignem non experti ℥iv. alum. ℥i. succor. thymeleæ & ebuli rec. extract. an. ℥iii. farin. lupin. & orobi, an. ℥ii. pulv. soldanell. ℥vi. anis. fœnic. cumin. an. ℥ii. sal. communis torrefact. ℥iii. tereb. ℥iv. pic. naval. ℥vi. M. F. emplastr. ventri apponendum, quo mirificè juvabatur: partim enim solutione aquam hydropicorum solvit, partim in halitum digerit atque siccatur, & flatuum copiam exhaurit. Sed inter cætera præsidia primum in curatione locum decocto ligni sancti jure tribuendum censeo, quo totos quadraginta dies vir hic usus est meo consilio, & sic annuente Deo integræ sanitati restitutus est. *Franciscus Valeriola obs. 5. lib. 2.*

## SUBSECTIO NONA.

*Pro Hydropē Ascite.*

**A**Potu omninò quantum fieri potest abstinendum. Novi enim ego non potestremi nominis medicum *Hispanum* publicè *Bononia* profitentem, qui solo esu alimentorum assorum & abstinentia potus omnis per 40. dies continuata, curatus est, absque ullo prorsus medicamento; quod si à potu abstinere omnino non potest, bibat quantum siti remittendæ fatiserit, id tamen parcè. Porro bibendum vinum tenue quod urinam provocet, dulcia ac mustum perinde ac pestis fugienda, acetum miri-



mirificè hydropicorum sitim extinguit & compescit: expertus ego sum acetum aqua chalybeata dilutum, sola oris ablutione sitim fregisse. Cavendum tamen ne quid aqua in viscera descendat, imo quorundam est opinio aquam hydropicis vel solo intuitu nocere. Prandium sit mediocre, cœna parior; secundæ mensæ & fructus omnes vitentur, poterit tamen degustare iuglandem, amygdalas, mala punica, pyra cocta, & caricæ interdum, non tamen quotidie, idque modicè: lectus sit non admodum mollis, præsertim anasarca laborantibus, qui semper satis superque lecti secum circumferunt puta molem illam œdematicam, & in toto corpore humorum colluviem. Si autem fieri posset ut ex herbis exsiccatis conficerentur lectuli, ut ex origano, puleg. calamenth. urtica, hyssopo, & similibus, incredibile dictu, quanto opere prodesse per somnum; quod & Medicorum declarant libri qui multos in acervis frumenti obvolutos, vel arena absconditos, vel fursure calido obtectos, à somno firmos surrexisse narrant, tanta vis est in exsiccantibus medicamentis. Inter evacuantia salutare est quod sequitur.

℞. Hier. picr. ℥ss. rhei el. ℥iij. F. bolus, exhibeatur insuper rheum infusum in succo ireos hoc pacto paratum.

℞. Succ. ireos rec. per residentiam depurati ℥vi. rhei el. ℥i. contund. parum rheum, & per noctem in prædictum succum infundatur, facta forti expressione adde succi cyclamin. depur. ℥iij. syrup. capill. ven. ℥i. aqu. cuscut. ℥iij. M. F. potio, quæ cum valde abstergens est non solum internos sed externos meatus aperit, & primum quidem per secessum copiosissimè evacuat, deinde etiam sudores elicere consuevit. Postea ad paratu facile, & in talibus casibus mihi domesticum remedium devenirem, quo uno curata est mulier quædam, & cujus unius ejus vir tanquam miraculosi meminerit. Remedium tale est.

℞. Milii ex cortic. ℥ij. aq. font. clar. ℔iij. in mundo vase bulliant donec tantum ℥iij. vel ad summum quinque supersint, colentur, & cum aliquali vini meracioris portione misceantur, ut F. potio exhibenda calide, copiosissimè sudabit, si texeris diligenter, ut illam mulier sudavit, cujus sudo-

re permaduit totus lectus. Usa est hac potione per octo dies, & convaluit. Vocatur hæc potio Syrup. S. Ambrosii. Usum sum eodem syrupo in pueris hoc affectu laborantibus sæpè semperque cum successu. Inter externa laudatur epithema ex caprino fimo & urina pueri confectum. Laudat Galenus emplastr. ex cochleis cum suis testis contusis, ventri impositum, quod aquam exhaurit, hoc composito uti soleo.

℞. Limac. cum testis contusor. ℔j. cummin. torrefact. & subtiliter pulver. sem. carvi, ammeos. salis usti, an. ℥. pulv. rad. irid. farin. lupin. an. ℥i. M. F. emplastr. S. A. ventri apponendum, donec sponte decidat, vel ceratum quod ego experientia non solum mea, verum etiam aliorum comprobata mirabile invenit.

℞. Cera, picis navalis, an. ℥iij. alumin. liquid. sulph. vivi: bitumin. nitri rufi (si haberi queat) an. ℥ss. terebinth. ℥iij. ol. veter. ℥iv. aceti q. s. ut fiat ceratum. Medicamentum rurale est quod sequitur, & ruri summo esse usui potest.

℞. Fimmi. vaccin. arid. & tusi ℥ss. sulph. vel salis ℥i. aceti q. s. M. & apponito ventri, cui ex Archigenis sententia, addi possunt ova gallin. rec. cum suis testis contusa, ac brassicæ succus. Ubi autem finum animalis in emplastro apponendum legis, ibi non recentem, sed aridum sumendum esse putabis.

Ubi in hydrope maximum juvamentum per urinæ vacationem speratur, idque in natura imbecilli, tali uti poteris pharmacum, quod & alvum subducit & urinam ciet.

℞. Terebinth. claræ ℥ss. aq. adianth. ℔i. M. & bulliant ad totalem aquæ consumptionem, & adde cantharidum abscissis alis pedibusque & capitibus subtiliter pulver. ℥i. mastich. cinnam. an. ℥ss. rhei opt. pulv. ℥i. cum oleo amygdal. d. rec. F. massa, cujus ℥iij. tuto dari possunt. Hoc experimentum bis hoc anno mihi occurrit: primum quidem in Xenodochio De la vita in puero decem annorum diu tympanite laborante, qui tanquam à medicis derelictus in lecto se continebat: cumque ad ea, quæ per os dan-



tur, propter ætatem & longum morbum, & virium imbecillitatem non admodum aptus esset, tale iussi apponi emplastrum, quotidie affixis sine scarificatione cucurbitulis in abdomine, miraculoseque convalescit intra octo vel decem dies.

24. Rad. cucum. asinin. optimè contus. & in aceto scillitico per viginti quatuor horas macerat. Ibi. mell. despumat. Ibiij. M. & bulliant ad consistentiam cerati, in fine adde cumini subtiliter pulver. ʒiv. singulis diebus, admovebatur emplastrum, & abdomini optimè terfo cucurbitulæ affigebantur, dein rursus emplastrum apponebatur: quumque non sincerus esset tympanites, sed una cum flatu aqua adesset, immodica tamen quantitate, paulatim una discussus est flatus, & in halitum digesta aqua sanatusque est: cujus exemplo motus quidam non infimi gradus vir, cujus nepos ex filio simili morbo vexatus, à primario quodam Medico tanquam deploratus derelictus erat, iussit me accersiri, & simili modo curatus est.

Alium in Hospitali *De la vita*, hoc modo curavi.

24. Brassic. marin. subtiliter pulv. ʒß. rhei el. subtil. pulv. ʒij. spec. dialacc. diacurcum. an. ʒi. hepar. lupi præp. limatur. chalyb. cum aceto scillit. sæpius lotæ, an. ʒß. mell. despumat. q. s. M. electuar. cujus cochl. j. per horas duas ante prandium sumat, & similiter ante cœnam tantundem: alvus inde semel aut bis in die mota: quodque excernebatur aqueum erat. *Victor. Trincavellius consil. 32. lib. 3. & Hieronimus Reserius, consil. 74. lib. 6. consil. loh. Cratonis, &c.*

## SUBSECTIO DECIMA.

### Pro Hydrope Ascite.

**E**laterium apprimè idoneum, at in exigua quantitate dandum, & valde vetus, & cum rebus ventriculo amicis, ut cum hiera pilul. aloephâng. de tribus, & cum rhabarbaro. *Christophorus Guarinonius, consil. 963.*

Hoc hydragogum exhibui quod mirabile est in educenda aqua hydropicorum, & nunquam me fefellit, semper enim felicis-

simo successu sumillo usus: & quoniam forte esse amarum, ideo sapa vel saccharo dulcorandum est: & est hujusmodi.

24. Rad. cucum. agreit. ʒiv. rad. ireos & sambuc. an. Ibi. turbith. ʒi. incidantur radice: lign. sassafr. ʒß. infunde per viginti quatuor horas in vini opt. Ibi. bulliant ad consumptionem medietatis, colatura servetur usui: dosis ʒvii. advertendum, ut sit magis tutum hoc auxilium ponendum esse pulverem corrigentem in historia tympanitis infra describendum: hoc vinum sumebat semel in hebdomada, & semper emovebat Ibi. vel ii. aq. citrin. & tantundem per secessum: & in ascite maximè vomitus convenit. Exhibuimus quandoque radic. mechoac. ad ʒß. in vino maceratam, & benè res cedebat. Est enim hæc radix maximè huic affectui proficua, & crassos & serosos educit humores & memini me quendam hydropicum hac sola radice curasse. Volebam devenire maximè cum semel urina fui suppressa in hoc casu ad extremum illud remedium, quod ponit *Hippocr. lib. 4. De Ratione Viæ, & lib. De intern. Affect.* scil. ad pulv. cantaridum ablatis cap. & alis ad ʒß. in furno exsiccatis & in vino exhibitis; sed quoniam melius habuit de suppressione urinae, ideo non deveni. Nam ad hoc remedium tunc est descendendum cum alia non profuerent remedia, & spes est in angusto, & tunc (inquit *Cappivaccius*) quod desperati à morte ad vitam revocantur. Volebam hominem immittere seu cooperire usque ad collum acervo tritici, sed ratione paupertatis non fuit factum. Est enim mirabile remedium, & à *Plinio* & *Galeno* commendatum: dicit namque *Plinius lib. 22. cap. 25.* tantam vim inesse tritico, ut cados plenos siccet; & refert *Sextum Pomponium Prætoris* patrem *Hispania* citerioris principem, cum horreis suis ventilandis præsidere, correptus dolore podagræ, merfit in triticum totum pedem & tibiam, levatusque siccatibus pedibus mirabilem in modum surrexit. *Galenus* idem confirmat exemplo agriculturalum (*lib. 1. De Nat. Facultat. cap. 14. & 3. cap. 15.*) qui in carristransvehunt frumentum, & cum volunt aliquid frumenti furari immittunt in frumentum vas aliquod fictile aqua plenum, & sic frumentum



tum majus & pōderosius evadit, & aqua ferè tota à vase absorbetur à tritico, & nos quoque hanc experientiam domi fecimus, & verum invenimus, quinimò ab iis qui carros gerere solent, idem accepimus: quare si frumentum hanc habet vim attractricem in rebus inanimatis, & minus porosis, multo quidem magis habebit in corporibus nostris animatis & magis porosis: statim igitur ad hoc remedium est condescendendum, nam satis est præsentaneum, & melius est, ut radiis Solaribus sit triticum excalefactum: habent enim radii solares vivificum calorem; quinimo juvat hydropicos, ut teneant ventrem discoopertum sub calidis radiis solaribus: dummodo non adsit ventus, quod in æstate & canicularibus fieri potest. *Epiphanius Ferdinandus, hist. 38.*

Vir quidam in urbe nostra ex hyemis prægressæ injuriis & sedentaria vita ascitem contraxit, abdomine in ingentem molem elevato: pedibus tumidis, scroto & præputio valde distentis: circa solstitium æstivum, forte tabaci fumum cum amicis per fistulam hausit. Exinde successit vomitus, soluta alvus: serum copiosè per aliquot dies expurgatum sensimque & abdomen detumuit, & pedes, scrotumque ad pristinum statum rediere. *Thomas Bartholinus, hist. 17. cent. 6.*

Generosa quædam matrona annorum sexaginta, in ascitem incidit. Omnia pro aquæ expurgatione tentavimus, sed irritò conatu: tandem solo unicornu nostro non tantum largissimè insudorem est soluta, quem nunquam ferè antea ex voto natura etiam provocata, voluit excitare; sed tumor quoque universus subsedit, & ad consueta munia prompta rediit, & adhuc, laus Deo, benè valet. *Thomas Bartholinus, hist. 46. cent. 5.*

Hiera picra cum speciebus diaturbith. cum rhab. plurimos summi Dei beneficio, ab hydropis rudimentis vindicavit: alternis diebus copia nucis avellanæ ingeritur. *Joh. Heurnius, cap. 26. lib. 2. meth. ad prax.*

## SUBSECTIO UNDECIMA.

## Pro Hydropē.

**S**yrupi mei ex rheo cum mechoac. cui in isto aut simili affectu qui naturalia viscera infedit multum tribuo, descriptio- nem, quæ mihi jam multo tempore usitatissima fuit, hic subjungam.

℞. Rei opt. ℥vi. fol. sen. ℥x. mechoac. al. biff. ℥β. flor. viol. rec. pi. cinn. integ. ℥i. zinzib. alb. ℥iβ. aq. beton. cichor. & bugloss. an. ℥iv. rhab. & mechoac. pulveribus irroratis aqua cinnamomi: infund. omnia S. A. per noctem: mane bullitione & expressione facta colentur, & cum sacch. albiff. ℥v. vel vi. syrup. ros. solut. ℥ii. M. F. S. A. syrupus: cujus aliquando bibat ℥ii. mane in exiguo haustu juris pulli, cui pauca passulæ demptis gigartis, pauca folia roris marini & macis tantillum incocta sint. Hujus syrup. usus tutus est, neque insuavis, nisi dulcedine sua molestus, sit istam molestiam si moderare velit, immiscebit pulv. hier. ℥ii. vel ℥i. *Reinerus Solenander, cons. 6. sect. 3.*

℞. Spec. diarrhod. abbat. ℥ii. diacurcum. ℥ii. limatur. chalyb. vel acuum (lotæ primum aq. deinde vino, postea acet. tum in crucibulo cum aceto in mediis carbonibus coctæ, donec acetum absumptum sit, & chalybs igniatur) subtilissimè in marmore trita ℥iβ. rad. cichor. condit. ℥x. conserv. absinth. ℥i. epithim. rec. ℥i. C. C. ust. sem. portulac. anif. an. ℥β. cinnamom. ℥i. cum syrup. de succo cichor. cum rheo, q. s. F. S. A. conditum: ejus ususest, utumat cochl. i. tribus vel quatuor horis ante cibum: ut alvus interdum utiliter ducatur, & visceribus interim robur accedat, utatur hac mistura.

℞. Passul. corinthiac. select. ℥i. lotar. primum aqua, postea vino, in quo parum macerentur, tum in sterne exemptas linteo panno mundo, ut mador superfluus exsugatur. Postea asperge rhei minutim pulverati ℥β. cinnamom. pulv. ℥i. aut ii. sacchar. albiff. ℥ii. aut iv. passulæ cum istis pulveribus & saccharo tuso confusæ & commistæ indantur in vitrum aut aliud vas vitreum, vel argenteum poculum, & in se se compressæ servantur: dosis ℥β. aut ℥i. è



cochleari prout vel magis vel minus movere velis. Sumantur ante cibum, & diu mandantur, antequam deglutiantur. *Reinerus Solenander, conf. 21. sect. 3.*

Cuidam ascite deploratæ laboranti sequentibus remediis succurrebam.

24. Spec. diaturbith. cum rheo 3ß. pulv. mechoac. nigr. 3ß. Extract. diagrid. gr. iv. sal. chamæm. gr. iii. sacchar. rosat. tab. gr. v. ol. anis. gr. i. M. deturbis: à cujus usu aliquoties alvum exoneravit, cum multa feri ejectione. Postea ad sequentia alterantia & aperientia perventum est.

24. Aq. locustar. sambuc. (quæ in hydrope mihi valde familiaris) urtic. min. 3iv. Aq. cichor. chamæm. agrimon. 3iß. syrup. de cychor. cum rheo 3iß. syrup. de cupator. compos. de soldanell. an. 3i. Tartar. vitriol. 3iv. M. F. Julepus: pro quatuor dosibus.

Tandem hoc apozema, cujus usum in hydropicis alias maximo cum successu sæpius sum expertus, fuit ordinatum.

24. Cortic. inter. rad. frangul. ebul. sambuc. cichor. urtic. an. 3i. levistic. polipod. an. 3ß. liquir. 3iv. irid. 3ß. fol. gratioli. cusc. agerati, agrimon. an. Mi. absinth. rom. M. 8. flor. calthæ, chamæm. cyant. viol. sambuc. an. M. 8. sem. melon. 3iii. petrosel. levistic. fœnic. an. 3ii. fruct. alkikengi num. 11. acinar. sambuc. 3i. medull. sem. cartham. 3iß. cal. arom. 3ß. passul. min. 3ii. incisa & contusa coq. In f. q. aq. ad tertias: addendo in fine spec. arom. rosat. diarrh. abbat. an. 3i. Sacch. Cand. 3iß. iterum bulliant, colentur, clarificentur 3bi. quibus adde arcani vitrioli 3i. usurpetur haustus quotidie bis, duabus horis ante cibum. Hoc apozemate continuato fiant evacuationes intermediæ cum pulvere cathartico præscripto. His aliisque perfecte convaluit æger. *Petrus Crucius. Epist. ad Hortium, post observ. 32. lib. 4. observ. Gregor. Horstii.*

## SUBSECTIO DUODECIMA.

### Pro Hydropse Ascite.

**A** Qua inter cutem cum vehementius urgeretur puer, tantaque intus contracta esset, ut alvum nullam in partem

movere posset omni auxilio Medicorum destitutus, temerariam sibi libertatem vindicavit: quare aqua quantum poterat epota, in ultimum sese mortis discrimen malè sanus præcipitavit. Verùm sive id aquæ contractæ impulsu, sive ope naturæ factum sit, soluta est umbilici unitas: indeque tanto impetu aqua profluere cœpit, ut supra ventrem cubitos tres ascenderet: quo sanè vitam finisset, nisi circumassistentes opposita manu aquam fluere non permisissent: hinc Medico accersito, & aqua paulatimeducta, ac curioso victu, & cæteris quæ ad rem facerent injunctis, brevi tempore in pristinam redactus est sanitatem. *Antonius Benevenius, cap. 12. lib. De abditis Morborum & Sanationum causis.*

Rustico, quem aqua inter cutem malè habebat opem nostram expostulanti, sanari illum, cum morbus jam inveterasset, minime posse respondi; instanti tamen ut aliquod saltem consilium ei præberemus, subridens, inquam, amice, si curari desideras, opus est, ut non ultra bibas, quam ut vitam sustineas: discessit, & anno peracto, iterum interrogat, an ipsum noverim; nego me hominem nosse: ac ille tua ope curatus, inquit, ad te revertor, scire cupiens an adhuc mihi liceat aliquid bibere, cum hætenus nihil biberim: admiratus, interrogo, quare & cujus consilio: cui ille, inquit, tuo; & rem omnem ab initio narrat. Jussi igitur paulatim vino assuescere, sed mero potius quam lymphato. *Antonius Benevenius, cap. 13. lib. De abditis, morb. & sanat. causis.*

Accidit interdum casu & fortuna sanari nonnullos, quos medicina curare non potest. Mulierem scimus, quæ dum ascite adeo laboraret, ut nulla de salute ejus superesset spes, nescio quo spiritu impulsæ, de eminente quodam loco ad terram devolvitur, & utero lapidem eliso dissectoque ita prorsus omnis effusus est humor, ut quæ puerum octimensem gestare videbatur, enixam crederes. Sed nec multo post aut tempore aut laborare idoneis ad hanc rem adhibitis præidiis, penitus sanata est mulier. *Antonius Benevenius, cap. 109. De abditis morborum & sanationum causis.*

In Urbe nostra juvenis quidam Hydrope laborans, spontè natura binis vomitibus



tibus excitatis, ingentem aquæ copiam evomit, quo facto venter detumuit & Hydrope liberatus fuit. *Avisenna* in cura hydropis vomitum maximè laudat; qui tamen si copiosus sponte natura viribus imbecillioribus existentibus supervenerit, mortem accelerare consuevit, quem admodum colligimus ex historia à *Nicolsa* descripta. Meminit enim cujusdam hydropici, qui continuè evomens aquam, extinctus est.

Piscator quidam læsio hepatis non esset insignis, tumore tamen ingenti venter intumesceret, ex assiduo labore soluta hydrops, & detumefactus venter, perfectèq; sanatus, nullis Medicis adhibitis auxiliis. *Marcellus Donatus*, cap. 21. lib. 4. *Histor. medic. mirab.*

Sunt qui veluti arcanum probant lapidem serpentis Colluber aquaticus à cauda funiculo constringatur, atque ita suspendatur, ut sit subjectum vas aqua plenum: evomet coluber lapidem, qui totam illam aquam vase contentam consumet. Lapis alligetur, & apprimatur ventri hydropici paulatim aquam consumet.

Cuidam hydropico Negotiatori in *Angliam* profecto hyeme, tumor cum miraculo quodam subsedit, evanuitque morbus, nec rediit. Cuidam per sudores sponte excitatos, & quasi destillantem aquam, curatio. Cuidam ad vivum resectis unguibus pedum, exercitio & frictibus, paulatim humor illuc defluxit, & convaluit. *Ioh. Hollerius*, lib. 1. cap. 39.

### SUBSECTIO XIII.

#### Pro Hydrope Ascite.

**A** Fide digno Medico mihi relatum est, canonicum quendam ex Hydrope periculosè decumbentem, à Medico suo petiisse, ut halecisesum sibi indulgeret, annuit Medicus, sed hac conditione, ne intra duarum horarum spatium, quicquam potulenti post esum halecises assumeret, & integrum halecem, si posset, assumeret, ægrotus paret. Quid sit? æger tandem ad urinæ emissionem stimulatus, tam largè ipsam profudit, ut per horæ ferè quadrantem nulla mictionis quies interveniret,

ipsumque abdomen sensibilibiter magis magisque subsidere deprehenderetur.

Commendatur ad hunc affectum spiritus vitæ aureus *Rulandi* qui plerisque nihil aliud est, quam essentia troch. alhandal. commodior videtur hæc esse ejus præparatio.

℞. Rad. esulæ præp. ℥i. epith. ʒvi. rad. polipod. ʒiv. zedoar. zinzib. cariophyll. mastich. an. ʒi. cinnamom. ʒß. passul. min. ʒi. alb. sacch. ℥i. trita infund in vase vitreato, in vini alb. rhen. & vini malvat. an. ℥i. adde spirit. vitriol. ʒi. stent. per dies quatuordecim, in infus. quotidie agitando: postea destillentur: destillatum secibus reafundatur, & denuo destilletur, idque tertia vice repetatur. *Daniel Sennertus*, præct. lib. 3. part. 6. sect. 2. cap. 3.

Cave tu ne cauteria inuras Hydropicorum facile corporibus, novi hoc evenisse in Doctore Medico celeberrimo, qui cum ab aqua fatigaretur, inuri suis cruribus ulcera jussit: at illa mox in gangranam abibant, ac hominem abripiebant. *Ioh. Heurnius* ad *Hippocrat. aphor.* 8. sect. 6.

Fieri non potest ut in valida medicina trahatur in intestina humor ille qui natat inter peritonæum & intestina, qui enim succo ireos vel diaturbith, aut brionia vel soldanella existimant se id efficere posse, falluntur, hæc enim venis conceptam aquam facili nifu effundunt, non abdomine natantem: quare elaterio opus est; hujus grana aliquot remiscere cum pil. alcephang. vel euphorbium remixtum in parva copia cum cassia rec. extracta præbeo. *Ioh. Heurnius*, ad aphor. 14. sect. 6.

Ut Hydropi foeliciter medicina fiat, adsit viscerum integritas: non adsit hæctica intemperies, nam significat longa die viscera prostrata esse. Ineunte morbo aqua copiosè expellatur, libereque efferatur, amota omni cruditate: dantur 6. vel 7. grani optimi elaterii cum pil. aleph. ruente nimium alvo, propinentur 2. vel 3. grana opii: cum theriaca & syrup. citri: nam motis sudoribus sedatur immanius profluvium. *Ioh. Heurnius*, ad aphor. 29. sect. 7.

In Hydrope imperare solemnis famem & potus accisionem: ex ipso Epidaurō vix præstantius remedium petas: *Italum* Medi-



Medicum Hydropicus accessit agricola, imperat Medicus, ut toto anno temperet à potu, fecit, convaluit, Præscribitur etiam decoctum lign. guajac. sassafr. & sarsaparillæ. *Joh. Heurnius, ad aphor. 59. sect. 7.*

Mulier quædam *Monspeliensis* sexagenaria Hydrope cum asthmate correpta est, ita ut totus venter, femora & tibiæ valde intumuerint: præscripti, post quædam alia remedia, decoctum guajac. cum sena, agar. turpeto, & hermodactyl. per quindecim dies continuos usurpandum. Postea sequentibus duobus remediis per mensem continuatis integre restituta est.

℞. Rad. enul. camp. apii fœnic. irid. siccar. an. ℥i℥. rad. valerian. gentian. asar. scyll. an. ℥i. cortic. median. sambuc. & lign. sassafr. an. ℥vi. fol. absinth. agrimon. chamæd. cap. ven. siccor. an. ℥ii. sumit. cent. min. & flor. genistæ, an. ℥i. sem. petrosel. ameos, aneth. an. ℥i℥. cinnam. ℥ii. conquiscentur omnia, & infund. in vini albi ℔iv. per aliquot dies. Deinde hujus vini capiat ℥ii. vel ℥iii. singulis diebus manè duabus horis ante pastum: quarto vel quinto quoque die capiat dosim pulv. sequentis hydrotici.

℞. Senn. turbith. gummos. hermodactyl. sem. ebuli, rad. jalap. & mechoac. an. ℥i. crem. tartar. ℥ii. gutt. gumm. ℥℥. pulv. diambr. diarrhod. abbat. & sem. fœnic. an. ℥i. sacch. cand. ℥iii. F. omnium pulvis: cujus ℥ii. infund. per noctem in vini prædicti ℥iv. capiat. *Lazarus Riverius, observ. 67. cent. 2.*

## SUBSECTIO XIV.

### Pro Hydrope Ascite.

**P** Astor quidam Hydrope Ascite laborans, hisce usurpatis, sanitatem recuperavit. Primo die purgans medicamentum exhibitum est ex sena, agar. manna & syr. rosaceo. Secundo die detractus est sanguis ad ℥viii. Tertio sumpsit bolum ex calomelan. gr. xxiv. Jalap. ℥i. cum conserv. ros. Quarto sumpsit calomel. gr. xxiv. cum Jalap. ℥℥. quod septies purgatus est: & primum crassa & nigra excrementa, post-

modum serosi humoris copiam excrevit: crura & tibiæ valde detumuerunt. Quinto die idem remedium iteratum, ut & sexto, eadem fuit operatio, sed paulo minor, crura, tibiæ, & serotum omnino detumuerunt, sed venter in eodem statu permanebat. Septimo, clyster injectus est ex pulv. colocynthid. ℥i℥. furfur. M. i. in vino albo decoctis. Octavo iteratus est idem clyster. Nono, sumpsit dosim pulv. hydrotici præcedenti observatione descripti ex vino albo. Decimo, sumpsit julepum hunc aperientem.

℞. Rad. apii, petrosel. enulæ, camp. an. ℥i. cort. median. fraxin. & tamatis. an. ℥℥. rad. asar. ℥iii. fol. argrimon. ceterach. cap. ven. cichor. chamædr. cent. min. & absinth. utriusque an. M. sem. anisi petrosel. an. ℥iii. flor. genist. & sambuc. an. p. i. coq. ad quart. v. in colat. dissolv. syrup. de limon. ℥iv. F. Julep. pro iv. dosibus matutinis, addendo unicuique dosi salis diuretici (seu salis tartari) ℥i. spiritus diuretici (seu spir. tartar.) ℥℥. Post secundam dosim julepi reitetur pulvis hydroticus; iterum julepus: per alios quatuor continuos dies: sit potus vinum album ex infusione chalybis paratum: convaluit, & ab illo tempore pancreaticæ vixit. *Lazarus Riverius, observatione 23. cent. 3.*

Mendicus quidam hydrope à tribus mensibus laborans, cum propter inopiam Medicis auxiliis uti non posset, ex rusticæ mulieris consilio usus est per mensem integrum decocto rad. brusci: purgatus est bis aut ter simplici senæ infuso; & his solis præsidiiis perfectè curatus est. *Lazarus Riverius, observat. 52. cent. 3.*

Mulier quædam ascite laborabat, cum inops, esset, hunc tantum pulverem ei præscripti.

℞. Sen. mundat. crystall. tartar. & rad. jalap. an. ℥℥. F. pulvis. de quo capiat ℥i. cum jusculo singulis diebus; hoc remedio per viginti dies usurpato integre liberata est. *Lazarus Riverius, observatione 73. cent. 4.*

Puella octo annos nata, hydrope laborans, usa est conserva ex passulis in omni pastu: & intra duos menses liberata est. Illa autem conserva fiebat ex passulis in vino albo decoctis ad putrilaginem, & per



## SUBSECTIO DECIMA QUINTA.

per setaceum trajectis, iterumque decoctis ad opiatæ consistentiam. *Lazarus Riverius, observat. 44. cent. 4.*

Rusticus quidam incidit ex Febre tertiana in hydropem universalem: a quo cum liberavimus succo ireos ad ℥iii. cum mannæ ℥i. intra septem dies ter exhibito: inde venter omnino detumuit, maximaque serosæ illuviei copia per alvum & urinas excreta: alter hydropicus curatus est solo vino juniperino: singulis enim matutinis fumebat ejus ℥vi. *Simeon Jacoz, observ. 28. cent. 4. observ. River.*

Mulier quædam ob suppressos menses hydropica facta sequentium remediorum usu convaluit. Primò sumpsit per quatuor dies ptisanam laxantem ex infus. ℥ii. sen. cum ℥ss. sal. prunell. & gutt. xv. spir. sulph. per campan. deinde sequentium jusculorum usum aggressa est.

℥. Rad. aspar. gram. & cichor. an. ℥ss. rad. chinæ in taleol. sectæ ℥i. fol. agrimon. ceterach. bul. & an. M. ss. crystall. tartar. ℥ii. coq. cum quarta parte galli veteris: in colat. dissolve sal. absinth. & tamarisci, an. ℥i. sacchr. rosac. ℥ii. F. jusculum quod capiat per duodecim die tribus ante prandium horis. Finitis jusculis, iterum sumpsit ptisanam laxantem prædictam per triduum: ac deinde opiatam sequentem, cujus miros effectus sæpe vidimus.

℥. Conserv. flor. tamarisc. & cap. ven. an. ℥i. conf. rad. enulæ camp. ℥vi. chalyb. præp. cum sulph. ℥i. sal. tamarisc. ℥i. spirit. sulph. per camp. ℥ss. cum syrup. condituræ citri F. opiatæ: de qua capiat ℥ii. aut ℥iii. singulis diebus manè: Postea deambulando, & continuando, per quindecim aut viginti dies. *Simeon Jacoz observ. 10.*

Puella quædam hydrope lethali torquebatur, jubentibus nobis potus cujusunque fugam, ut fieri debet; tantam aquæ quantitatem aliquando bibit, ut rumpi videretur. Sed quoniam ut ajunt, fortuna pueris & stultis auxiliatur, alvi fuore oborto, pristinae sanitati restituta convaluit. *Dominicus Panarolus, observ. 24. Pentecoste 2.*

## Pro Hydrope Ascite.

**H**Ydropicus quidam multis vesicatoriis admotis multis partibus, curatus est. *Simeon Jacoz, observ. 21.*

Rusticus quidam triginta annorum à tribus mensibus hydrope laborans, tandem vitam cum morte commutavit: dissecto cadavere, ingens aquarum copia fluxit: jecur optimè constitutum, & naturali temperie præditum invenimus, lienem verò corruptum, & totam ferè ipsius substantiam pici liquatæ similem. *Simeon Jacoz, observ. 6.*

Homuncio quidam veterum calceorum instaurator in hydropem asciten incidit, quo cum à sex mensibus detineretur, & umbilicus prominere ad imaginem ovi gallinacei, paracentesis facta est in medio exomphalos, & aqua per partes educta, admota cannula ex aurichalco confecta, in cujus extremo lamina erat lata, ne in ventrem mergeretur, foraminibus utrinque pervia ut alligari posset: & ita curatus fuit. In hac operatione advertendum, ne hydropici aperiuntur, nisi exomphalos appareat, quasi natura viam ad exclusionem aquarum affectante: alioqui omnes qui aperiuntur, non prominente umbilico intereunt. *Samuel Formisus, observ. 4.*

Sal millepedum à celebri Medico foelicitè usurpatur in hac curatione, quem julepis aliisque remediis aperientibus admiscet, præmissa purgatione cum succo ireos nostratis, quem si æger vomitu rejiciat, pro deplorato habendum esse existimat. Hydropicus quidam curatus est solo usu salis prunellæ in potu ordinario per mensem integrum: cujus sapitio aqua universa in abdomine contenta, evacuata est. *Observ. 8. & 9. inter Observationes Riverio communicatas hinc inde decerptas.*

Rusticus quidam hydropicus factus, abscessum passus est in dextra parte abdominis, eoque aperto, infinitus propemodum vesicularum aqua repletarum numerus egressus est, ut ducentarum numerum excederet, idque per plurium dierum spatium, & sic omnino curatus est, *Obs. 15 ibid.*

Nisi



Nisi viscera interna sana & illæsa fuerint, parum aut nihil ut plurimum, incisionem ægrotis profuisse usus atque experientia edocuit: testantur id quoque viri docti. Evacuatur enim tantummodo aqua; quæ in vacuo ventre continetur: radix verò & origo mali in visceribus remanet. Contra si umbilicus in hydropicis paulatim naturæ beneficio in tumorem elevatur, & tandem erumpit, aut inciditur, commodissimam esse viam expurgandi humorem serosum hydropicorum, ac sæpissimè ægrotos ipsos hoc beneficio à morbo liberatos fuisse, viri docti observarunt: mihi quoque hujus rei exempla occurrerunt. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 47. cent. 1.*

Ego insensibilem aquarum evacuationem molior magna spongia nova, totum abdomen comprehendat, expressa in aqua calcis vivæ, & superligata, quo medicamento pluries hydropem curavi sine ullo aquæ sensibili exitu: viscerum etiam frigidam & humidam intemperiem tollit, ita ut etiam lienem induratum aliquando sanaverit. *Hier. Fabricius, ab Aquapendente, cap. 54. art. 1. Chirurgia.*

Syrupus de rhamno cathartico ad ℥i. exhibitus, aquas mirabiliter educit, Rheum à nonnullis commendatur, quia purgando humores noxios, hepar valde roborat: & *Stoeherus* se multos curasse refert usu rhei ad ℥i. vel ℥ii. tertio aut quarto quoque die exhibitum cum decocto aperiente, tum etiam apud *Scholæzium* in Epistolis, habetur insignis historia cujusdam hydropici solo usu rhei perfectè sanati, quod singulis diebus deglutiebat ea quantitate, quæ necessaria videbatur ad alvum subducendam (historiam vide infra, lib. 15. sect. 8. *De Rhabarbari Elogio*) purgationum vice clysteres injici possunt, quibus flatus discurrantur, aquæ educantur, & ventrem imminuatur.

Sequens clyster insignem aquarum copiam educit.

℥i. Pulp. colocynthid. ℥i. infund. per noctem in vini albi ℥iii. colat. adde decocti intestin. vervecis ℔i. olei communis ℥ii. salis petreæ fusi ℥i. aceti fortis cochl. i. F. clyster. Vel.

℥i. Pulp. colocynth. ℥i. furfur. macr. *Burnet Parte I.*

M. i. decoq. in vino albo & F. clyster. Vel, ℥i. Decocti emollient. ℔i. vini emetici turbidi ℥iv. diaphæn. ℥i. F. clyster.

Inter roborantia, quæ toto curationis decursu nunquam omittenda, præcipuè recenseri debet aqua cinnamomi: cujus cochl. i. manè vel ante cœnam interdum exhiberi poterit. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 11. c. 6.*

Spiritus salis, tartari & vitrioli, justæ dosi exhibitum; cum apozemate aut alio decocto aperiente, per aliquot dies, miranda præstant: quia summa tenuitate præditi in omnes corporis meatus facillè penetrant, eosque aperiunt. Idem præstant sales absinth. juniperi, stipitum fabarum, & similes cum vino albo exhibitum; vel, salium „ defectu, lixivium ex eorum cineribus paratum „ sufficiunt. *Matthiolus ad cap. 87. lib. 1.* „ *Dioscor.* Lixivium, inquit, ex vino albo & „ juniperino cinere paratum, 4. aut 5. unciarum pondere, valentissimè urinam pellit, ita ut nonnullos hydropicos hoc tantum auxilio sanatos. Cæteris remediis palmam præripiunt in hoc casu aquæ minerales acidulæ & vitriolata, quæ viscera potenter deobstruunt, aquas per urinas evacuant, & viscerum intemperiem corrigunt. Unde experientia constat; multos hydropicos quotannis aquarum Spadarum usu percurari.

Narrat *Avic.* Cap. de cura Ascitis historiam mulieris cujusdam, quam hydropisis attrivit; ut ipse loquitur, & magnificata est super eam, & ipsa mulier comedit quantitatem malorum granorum tam maximam; quod ejus relatio est incredibilis, & sanata est *Varignana* refert ex *Plateario*, quod quædam vecula coxit in olla succum plantag. ad medietatem, & dedit hydropico de causa calida ad bibendum quotidie, & sic curatus fuit. Quibus exemplis patet, hydropem aliquando refrigerantibus curari. Hisque addere possumus *Christophori à Vega* testimonium, qui lib. 3. Art. Med. sect. 8. cap. 12. Tympanitum, inquit, vidimus à „ calida jecoris intemperie natum, quem „ refrigerantibus curavimus, jecori super- „ puentes, succum endiviæ & cichor. cum „ paucis aceto, & cichoreum edendum dantes atque endiviam *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 11. cap. 6.*



Ad educendas hydropticorum aquas mixtura sequens *Horstii* mihi singulariter probatur, & vidi effectum in Nosocomio civico *Viennæ* curæ meæ commisso.

24. Herb. absinth. Card. bened. agrimon. soldanell. genistæ cum toto an. M. iv. rad. ononid. petrosel. eryng. aspar. an. ℥iii. summitat. juniper. cum toto. M. viii. Comburentur, & e cineribus fiat lixivium ad ℔.ii. His adde syrup. dialth. *Fernel.* de 5. radic. an. ℥iii. spirit. sal. ℥iv. Dentur ℥v. aliquot vicibus repetendæ. Sed hic diligenter juvandum est naturæ motus: vel enim ob lixivii acrimoniam, vel ob ipsius humoris mordacis commotionem, tormina ventri non vulgaria excitantur, quæ lenientibus clysteribus, vel extra adhibitis anodynis mitiganda sunt *Wolfgangus Hæferus. Herc. Med. lib. 3. cap. 2.*

Aquæ vitæ beneficio extrahitur è jalapio pulverato, nodulo incluso, eique infuso & caniculæ ardoribus exposito, substantia purgans, quæ non extractum ejus sed gummi est: sic enim separari possunt. Si aqua vitæ calidè filtretur per chartam emporeticam, in fundo relinquet gummi, postea verò aquæ desiccatione extractum etiam remanebit. Sed gummi minori dosi, utpote ℥i. miras faciet evacuationes aquarum: est enim specificum ad hydropicos remedium, unicaq; pilula dari potest. *Petrus Borellus, observ. 23. cent. 2.*

Hydropica mulier cùm nullis remediis levare potuisset, sola ptisana herbæ ceterach. curata fuit. Ejus autem ptisanæ valde coloratæ præ copia plantę tres haustus mane quotidie sumebat: sic enim jecur, ubi fons & origo hydropis est, corroboratum & ad pristinam temperiem deductum fuit, adeò ut non aquosum amplius sed bonum sanguinem produxerit. Alios epoto succo satureiæ curatos fuisse pro certo mihi relatum fuit, & suffumigio spissamenti ceræ. Veronicæ aqua mane epota ad ℥vi. per. 3. dies ad hydropicos curandos valdè etiam utilis est. *Petrus Borellus, observat. 53. cen. 2.*

Multæ causæ hydropis ac epilepsię symptomata recenseri solent, sed nusquam legisse memini, quod jam dicturus sum. Mulierem vidit *D. Vignavetus*, quæ dum epilepticum paroxysmum pateretur, instar docti intumescerebat. Curata tamen fuit, &

ab importuno hocce liberata morbo usu facilis absinth. corall. & perl. ad grana 24. in jusculo. *Idem Observ. 34. cent. 3.*

Puella quædam sex annos nata & hydrope detenta sequentibus remediis curata est. Primò injectus fuit clyster sic paratus.

24. Pulpæ colocynthid. ℥i. furfur. macri M. i. Coq. in vino albo ad quartar. iii. f. clyster. Pituitosa & serosa eduxit sine molestia, & continuatus fuit per triduum. Eodem tempore admotum fuit toti ventriculi cataplasma sequens præstantissimum.

24. Rad. cucum. agrest. optimè contusæ & in aceto scillit. per 24. horas macerat ℔.i mell. despum. ℔.ii. M & bulliant ad consistentiam cerati, & in fine adde cumini subtiliter pulverati ℥iv. f. emplastrum.

Cum autem venter detumescere inciperet, & ægra interna remedia sumere nollet, iteratus est clyster alternis diebus ter aut quater, & continuatum cataplasma; Ex quibus major ventris imminutio sequuta est. Tandem præscriptus fuit pulvis ex fenæ, turbit. aliisque paratus (cujus descriptionem vide supra subsect. 13. circa finem) ad ℥i. ex eoque parùm purgata est, cùm medicamentum vomitu rejiceret, & venter adhuc tumidus apparebat.

Postmodum præscribo julepos ex rad. & herbis valde aperientibus, cum sale & spiritu diuretico, ad 4. doses. Quorum usu majorem urinæ copiam reddidit, sed venter adhuc tumidus permanebat. Postmodum præscripsi pulverem ex rad. jalap. gr. xv. scammon. gr. viii. calomel. Turqueti gr. xii. quem sumpsit cum jusculo & septies purgata est, multumque feri ac pituita rejecit per alvum, semel vomuit pituitosa multa; unde tumor ventris dimidia sui parte imminutus est intra horas 24. Iteratus est prædictus julepus per triduum. Quarto verò die iterum sumpsit pulverem prædictum cum eodem successu; & cùm venter admodum imminutus esset, ac ægra è lecto surgere inciperet, cibosque laute appeteret, à remediorum usu ulteriori abstinuit, sicque sensim convaluit. *Lazarus Riverius, observat. 94. cent. 2.*

Novi hydropicam quandam, cui venter in tantam molem excreverat, ut indies rupturus videretur, & ægra à Medicis pro deplorata fuerit habita; quæ tamen peregrina



ni cujusdam fortè transeuntis suasu, ventrem manu demortui adhuc calente aliquoties demulcendo, ab hydrope paucissimorum spatio in totum fuit liberata; profusa tum per alvum tum vesicam incredibili aquarum copia. An hoc factum sit imaginationis vi, an verò effluvio aliquo ex demortui corpore emanante, judicent alii, *Fredericus Lossius, observ. 42. lib. 3.*

## SUBSECTIO DECIMA SEXTA.

*Pro Hydrope.*

**I**Nterdum hydropici patiuntur lotii suppressionem, unde non tantum augetur aquositas in abdomine, sed etiam imminet mors repentina; quare in promptu habere oportet remedium aliquod potens, ut est usus cantharidum. Possumus exhibere cantharidem unam integram, cum  $\mathfrak{D}$ i. vel pulveratæ vel spicæ: superbibendo aliquid pingue, ut juris pulli pinguis  $\mathfrak{Z}$ iv. vel vi. hoc modo utiliter & tutò dantur cantharides in hydrope & aliis lotii suppressionibus. Ego ab omnibus desertos cantharidum usu restitutos vidi. *Hier. Capi vaccius, practic. lib. 3. cap. 19.*

Novi Comitissam de *Falax*, quæ dum juvenula hydrope tumeret, suasu cujusdam Medici, abstinuit ferè per solidum annum à potu, solidiore cibo & jussulis contenta: & evasit sana, vivitque modò septuagenaria. Authores aliquot commendant bufones vivos utrinque renibus alligatos, solvere hydropem per lotium: Saltem vidi rusticum hydropicum sanatum alligata angujum senectæ per ventrem & renes. Mercur. præcipitat. curat omnem hydropem. Observavi si antimonium in liquorem vertatur ac postmodum in pulverem, qui tantum per sudorem purget, haberi remedium, quod omnem hydropem modestè tollit, non frustra commendat fimos *Paracelsus*, cum sint salia ciborum putridorum, quibus datum est resolvere materiam occasionalem hydropis. *Joh. Helmontius tract. cui tit. Ignotus Hydrops.*

Hoc hydropico prodesse vidi, rationem tamen non perspicio. Soleis pedum adhibebat folia hyoscyami, ita ut non solum ex pedibus, sed universo corpore aqueus hu-

morextraheretur. Verùm hoc non velim adhiberi. *Io. Crato consil. 33. lib. 5.*

Ad hydropem mirificè facit succus cochleariæ herbæ ad  $\mathfrak{Z}$ i. quotidie sumptus. Præferunt quidam crudum eo qui saccharo coquitur. *Joh. Crato epist. ad Camerar. lib. 5. Consil. & Epist.*

Pro hydrope & paralyfi pilulas lunares unicè commendat *D. Robertus Boyle*, in auro suo tractat. *De Utilitate Philosoph. Experimentalis*, cum mica panis efformantur in pilulas minoris pisi magnitudine, quarum una aut altera vel etiam tres pro varia ægrotantis constitutione, in potu tosto sumendæ. Descriptionem vide citato libro.

Spiritu aperitivo *Penoti* feliciter usus sum in hydrope, cujus hæc est compositio non nihil à me immutata.

$\mathfrak{Z}$ ss. Vitriol. ungaric. ad rubedinem calcinati  $\mathfrak{L}$ iv. silicum è fluminibus collector, & optimè calcinat.  $\mathfrak{L}$ v. tartar. ad albedinem calcinat.  $\mathfrak{L}$ bi. mista, inque tenuissimum pulverem tusa reponantur aliquandiu in locum humidum, ut per deliquium in liquorem aliquantum abeant, postea destilla per alembicum in arena ter, singuli vicibus, capiti mortuo in pulverem redacto, reasso humore destillato: extremò per retortam igne aperto, sed ab initio lento, primum phlegma destilla, postea verò spiritum acidum auctioribus ignis gradibus elice. Ex capite mortuo calcinato salem extrahe, & cum eo, ablato prius phlegmate per balneum, spiritum acidum circula vel digere: tandem cum argilla in pastillos toto circulato redacto; ex retorta igne nudo, gradibus tamen observatis spiritum alkalisatum provoca, quemadmodum fieri solet cum spiritu tartari: sale proprio fortificato, dosis est à  $\mathfrak{D}$ i. ad  $\mathfrak{Z}$ ii. in vino vel alio liquore convenienti. *Joh. Hartmannus. Pract. Cimiati. pagin. 210.*

Puellam quandam octodecim annorum hydropicam ex febre tertiana intermittente malè curatam, ita curavimus.

$\mathfrak{Z}$ ss. Rad. ireos; petrosel. enul. camp. an.  $\mathfrak{Z}$ iii. cortic. median. sambuc. fol. eupator. cannabin. an. M. j. soldanell. M.  $\mathfrak{ss}$ . bacc. juniperi  $\mathfrak{Z}$ i. semm. fœnicul. d. cinnamom. cortic. citr. an.  $\mathfrak{Z}$ ss. concisa & contusa insuantur sacco & cum pin-



tis iv. vini rhenani per quatrīdium infundantur: hujus ter de die ad ℥iij. instillatis spirit. salis armoniaci gr. vi. assumere jussi. Post octīdium citriciter purgatio fuit instituta haustu purgante simulque diuretico, & subinde pulvere sequente parum diminuto.

℥℥. Rad. mechoac. ℥℥ jalap. ℥i. magist. tartar. vitriol. sal. sambuc. an. gr. viij. ol. caryophyll. junip. an. gr. ij. M. F. pulvis.

Item corroborans simulque diureticum conditum subinde ad nucis moschatæ quantitatem fuit usurpatum.

℥℥. Conserv. absinth. menth. an. ℥i. cortic. citr. condit. ℥i℥. spec. diacalamenth. ℥iij. sal. sambuc. ℥i. spir. nitri ℥℥. ol. still. cinnam. gr. v. macis, gr. x. M. F. conditum. *Fredericus Dechers, observat. ad cap. 4. lib. 4. Præxios Barbettiana.*

Bufo discissus & renibus impositus hydropicorum aquas meatum urinarium expellit. *Ioh. VVierus, lib. 3. cap. 35. De præstigiis Demonum.*

Vir quidam fide dignus, retulit mihi se multos ascite laborantes curatos vidisse sequenti remedio.

Silices colligebantur albißimi, qui circa flumina reperiuntur & fracti aliquantum pellucunt, crystalli instar, illi autem super prunas incalescebant, & candentes in vino albo exstinguebantur, hujus vini cyathum unum ægri sumebant mane usque ad perfectam curationem, quæ intra mensem perficiebatur: hujusmodi silicum calcinatorum sal in vino albo exhibitus scilicet, ni fallor, operaretur. *observ. 8. inter observ. Riverio communicatas.*

Hydropica mulier cum nullis remediis levare potuisset, sola ptisana herbæ ceterach. curata fuit; eius autem ptisanæ valde coloratæ præ copia plantæ tres haustus mane quotidie sumebat; sic enim iecur, ubi sæpe fons & origo hydropis est corroboratum, & ad pristinam temperiem deductum fuit, adeo ut non aquosum amplius sed bonum sanguinem produxerit: alio se potio succo satureiæ curatos fuisse pro certo mihi relatum fuit. Veronicæ aqua mane epota ad ℥vi. per tres dies, ad hydropicos curandos valde etiam utilis est. *Petrus Borellus, observ. 53. cent. 2.*

Inter diuretica quæ ad hunc affectum utilia

consentur, præcipuum locum obtinet succus cheresolii: cuius ℥iij. exhibentur mane cum vino albo plures dies. *Riverius, præx. med. lib. 11. cap. 6.*

℥℥. Aloes opt. ℥i℥. gumm. gutt. gam. subtiliter pulver. & cum malvatico dissoluti & levigati ℥i℥. diagryd. eodem modo præp. ℥j. gumm. ammoniac. ℥i℥. tart. vitriol. ℥℥. cum syrup. ros. solut. F. massa dosis à ℥℥. ad ℥j. educunt aquas potenter, hæ sunt illæ pilulæ ex quibus *Bontius Principis Auriaci* Medicus maximam sibi sanam acquisivit. *Ioh. Schroderus, lib. 2. Pharmacop. Med. Chym. cap. 73.*

## SUBSECTIO DECIMA SEPTIMA.

### Pro Hydropē Anasarca.

**P**Uella quadam trium annorum anasarca totius corporis inflata, penitus abhorrens ab omni medicamento, per usum mercur. dulcis cum gr. aliquot magist. jalap. restituta fuit morti proxima: quæ repetitis vicibus sine molestia copiosè prædictis evacuata fuit; subsequente quoque balnei medicati usu corroborationis gratia. *Gregorius Horstius. Epist. 2. ad. obs. 32. lib. 4.*

In principio Anasarcæ seni cuidam paratum est hoc balneum sudoriferum pro tumore pedum.

℥℥. Rad. ebuli. ℥iv. fol. salv. beton. rorismar. an. Mij. bacc. lauri M. ℥. bacc. junip. Mij. incisa & contrita, coq. pro balneo. *Gregor. Horstius, observ. 35. lib. 4.*

Maximum arcanum in hoc morbo est gratiola, quæ semper in copia tum purgantibus, tum aliis medicamentis admiscenda. Potest etiam ex ea fieri extractum vel sal, ex quibus componuntur pilulæ hydropicæ.

℥℥. Extract. gratiolæ, mechoacanæ, an. ℥j. sal. gr. vi. F. Pilulæ: purgant per alvum & urinam. Si non satis purgant, adde extracti troch. alhand. cum spir. vini malvatici facti quantum visum fuerit. Possunt etiam hic nonnunquam adhiberi scarificationes in pedibus, femoribus & natis. *Ioh. Hartmannus. pract. Chimia. tr. pag. 245.*

In Anasarca sectio venæ commoda videtur, si sit à mensium recenti suppressione.



Sed cum morbus ab ea suppressione natus, jam affectus est, inbecilla ea est quæ à suppressione ista sumitur indicatio: nam contaminata est sanguinis molisque corporis œconomia, succrevitque cachochymia quæ ex se catharsin indicabit. *Guil. Ballonius, consil. 24. lib. 1.*

Vir quidam vexabatur vermibus longis, corpus præterea totum intumescibat, & humore circumluebatur, aderat ciborum fastidium, sitis inexhausta, faciei tumor, & calor albus, urinam reddebat rubeam & pauculam. Cœpi huic mederi in istum modum.

℞. Extract. esulæ ℥ij. juris pisorum ℥v. mixta, colataque potioni dabam singulis tribus diebus; & cum aliquoties sumpsisset, vermes ore longos ejecit, alvo verò aquositates omnes deiecit: & intra mensem, Dei auxilio præter spem omnium integram sanitatem adeptus est. Victus ratio erat tenuis, vinum bibebat subtile & album, frequenter etiam hoc decoctum diureticum.

℞. Baccar. Junip. contus. M. iii. decoquantur in aquæ fontanæ q. s. ad tertias. *Martinus Rulandus, curat. 64. cent. 2.*

## SUBSECTIO DECIMA OCTAVA.

### Pro Hydropē Tympanite.

**O**ptima proposita victus ratione, statim nulla expectata coctione, devenimus ad vinum nostrum *ῥιτιτῆς υἱῶν τῆς ὕδατος* & hydragogum, quod semper mirabile adinveni.

℞. Rad. cucum. agrest. seu asinini, sambuc. ireos, & soldanell. an. ℥iii. incid. optimè, & infund. per duodecim horas in ℔vi. vini albi & clari, deinde bulliant ad consumptionem tertiæ partis: quo tempore adde cumini, anisi, sem. fœnic. ammeos, dauci, seseleos, rutæ, aneth. an. p. j. cortic. citr. ℥ij. cinnam. el. ℥β. tragac. & mastic. an. ℥j. bulliant. S. A. & coletur, & servetur: dosis ℥vi. vel viii. hoc vinum partim est ab *Ætio* desumptum, & partim ex nostra inventione; & ut ingenuè fatear, mirabile est ad educendos flatus, tum per os, tum per secessum, & multoties sum expertus: evacuat per vomitum aquam

*Burnet Part. I.*

citrinam, & quandoque per secessum & tantam ructuum & flatuum copia, movet, ut certè sit incredibile: & testor Deum, quod assumptis à nostra ægrota bis pro vice ℥vij. istius vini, fuerint sequuta evacuatio ad ℔iiij. aquæ citrinæ, & infinitus ructuum & flatuum proventus, & tumor minor satis erat: iterum illud bis exhibuimus singulis quinque diebus, & eadem sequuta sunt cum mira tumoris detumefactione. Est hoc vinum mirabile & innoxium, nam quæ si simplicia sunt in ipso delateria, tamen adfunt corrigentia: quæ retutum est & saluberrimum remedium tum in Ascite, tum in Tympanite. *Epiphanus Ferdinandus, histor. 41.*

Ad serositates una cum flatibus sensim evacuandas, potionem sequentem præscripsi.

℞. Rad. irid. ℥i. cortic. inter sambuc. ebulli, an. ℥β. rad. fœnic. petrosel. an. ℥vi. fol. cent. min. agrimon. marrhub. alb. an. M. j. soldanell. M. β. flor. chamæm. genist. an. p. ij. sem. fœnic. carvi, an. ℥iβ. fol. sen. ℥x. turbith. opt. ℥ij. sem. catham. ponderos. summitat. sambuc. in vere collect. an. ℥iij. fiat decoctio in f. q. vini & aquæ stent in infusione per noctem: manè colentur ℥xii.

℞. Colature ℥iij. syrup. de spina cervina ℥i. M. F. haustus, qui reiteretur per quatri-dum. *Gregor. Horstius, observ. 33. lib. 4.*

Est specificum in tympanitide liquor ex floribus tapsi barbati (eo modo paratus quo liquor ex floribus cichor. de quo infra lib. 13. lect. De Ophthalmia) cujus ℥i. aliquoties & quotidie sumptus in decocto seminis & rad. fœnic. ventositates expellit. Fœlicius id exequemur, si simul fiat fomentatio ventris hoc modo.

℞. Urinæ pueri ℔rv. lapidis prunellæ ℥iij. bulliant in vicem ad ignem lentum usque ad casum tertiæ partis urinæ: hoc modo restitui viduam ab omnibus Medicis relictam: in reliquis progrediendum ut in Ascite. *Joh. Hartmannus, præst. Chmiatr. pag. 237.*

Itatur pilulis nostris de soldanella dictis, in hoc affectu & omni hydropis specie efficacissimis.

℞. Pil. aggregat. ℥j. troch. alhand. ℥β. sumit. soldanell. & gratiolæ & cinnamom.



mom. tenuissimè pulver. an. ℥i. cum succo rad. ireos f. pilulæ ex ℥j. v. sumat duas, ad summum tres pro dosi, circa mediam noctem. Repetantur subinde. Interim ventriculus reliquaque viscera hoc condito erunt corroboranda.

℥. Elect. de bacc. lauri. ℥iv. conserv. rad. helen. ℥ij. spec. dianth. diagalang. diacymin. an. ℥j. ol. iuniper. ℥i. M. & cum syr. de stœch. f. conditum.

Evacuatis humoribus, viribusque refoecillatis, summo studio veniunt flatus excutiendi quod mirificè præstabit decoctum sequens.

℥. Alb. græc. hord. integr. an. ℥i℥. coq. lento igne in vin. alb. lb. iiii. vel iv. ad hordei crepaturam, coletur. Colatura per residuum defæcata, denuo coquantur ad medietatis consumptionem, postea clarificetur & aromatizetur cum cinnamomo & dulcoretur cum saccharo. Hujus decocti propina ℥v. 3 in die jejuno stomacho; emittetque mirabiles bombos & sensim venter subsidet. *Job. Fiennius lib. de Flatibus, cap. 24.*

### SECTIO DECIMA TERTIA.

#### *Pro Hypercatharsi.*

**B**aro quidam post sumptum pulverem diacarthami, centies evacuatus est. Hunc sanum fecimus injiciendo hunc clysterem.

℥. Jusculi capi lb. i. sacch. ros. ℥i. laudan. gr. vitell. ovi numero i. supurgationem statim compescuit: loco laudani addatur aliquando theriac. rec. ℥i℥. *Petrus Pacheguus, observ. 23.*

### SECTIO DECIMA QUARTA.

#### *Pro Hypochondrii dextri duritie.*

**A**D duritiem quæ est in dextro hypochondrio, coquant attriplicem Romanam, quam Sphinchiam vulgò vocamus, in aqua simplici, & admixto oleo amygd. d. F. Cataplasma parti, in qua Scirrhus esse existimatur, applicandum. *Jo. Crato. consil. 67. lib. 7.*

### SECTIO DECIMA QUINTA.

#### *Pro Hypopio, seu Pure sub Cornea.*

**P**Ræmissis universalibus, si in inflammationis reliquæ supersint, auferendæ sunt remediis in ophthalmia descriptis; postmodum leviter discutientia admovenda sunt emollientibus permista, ne, tenuiori parte resoluta, crassior materia fiat, & resolutioni minimè idonea. Fiant igitur fomenta ex decocto flor. camom. melilot. sem. psyll. & fœnugræc. cum pannis lineis vel sacculis applicanda. In progressu verò addi poterunt decocto fol. euphras. chelidon. & sem. fanic. vel sequens collyrium usurpari poterit.

℥. Aq. verben. rutæ, chelidon. ros. & fœnicul. ad. ℥℥. Aloes opt. & tutiæ præp. an. ℥℥. Sacch. cand. ℥i. Pulveris. & misc. addendo lactis muliebris tantillum, & f. collyrium de quobis ter in die guttæ aliquot oculis instillantur. Sequens erit valde efficax, quod *Paulum Aeginetam* autorem habet.

℥. Croci, Aloes Myrrh. an. ℥i. vini ℥iii. mel. ℥vi. Dissolvatur crocus in vino, deinde cum aloe, myrrha misceantur, tandem addatur mell. Hoc remedio oculi illinantur. Denique ea remedia, quæ in declinatione ophthalmiæ, in oculorum maculis & suffusione præscripta sunt, hic etiam conveniunt. Si solventibus medicamentis materia discuti nequeat, ad alia remedia confugiendum est. *Gal. 14. Method.* refert Ocularium quendam sui temporis Medicum concussione capitis multos hypopios sanavisse. Collocans enim eos in sella rectios, ac capita eorum utrinque a lateribus apprehendens, mox quatiebat, adeò ut manifestè descendere pus ipsi videretur. Si neque hac ratione pus visum impediens dimoveri valeat, *Galenus* loco citato ad Chirurgiam confugit, quem sequitur *Ætius* & alii quàm plurimi, quæ oculi punctione perficitur, qualis in suffusione fieri consuevit. Quæ quidem operatio, ut parùm nostris temporibus usitata est, sic peritissimi Chirurgi manum desiderat; & verendum maximè est, ne, aperta cornea, cum pure humor aqueus effluat. *Lazarus Riverius. Prax. Med. lib. 2. cap. 9.*



## SUBSECTIO XVI.

*De Hysterica Affectu.*

*Πρὸς ὁσπικὸν*, suffocatio uterina, affectus est fœminis familiaris, quo suffocari & quasi strangulari videntur. Per unum symptoma definiri nequit nunc enim est respiratio difficilis nunc etiam Syncope, nunc quoque animalium, aliarumque actionum læsio, cum totius corporis refrigeratione, à vapore maligno ex utero ad partes superiores elevato, ortum habens, huic vapori originem præbent non solum semen & sanguis, sed & alii in utero vitiosi & corrupti humores, dummodò malignam ac venenatam naturam induerint. Invadit hoc malum per paroxysmos, qui nunc frequentius, nunc rarius redeunt, nunc breviorē, nunc longiorē, tempore durant, pro materiæ copia, quæ nunc citius, nunc tardius colligitur, nunc etiam citius, nunc tardius discutitur. Familiare est virginibus ætate jam provecioribus & libidinosis, ac in Venerem pronis, ut etiam viduis in quibus semen corrumpitur, & pravam hanc qualitatem induit; quandoque & vetulas cacochymicas sanguine menstruo & semine destitutas hic affectus corripit, ut & prægnantes, quibus nimirum pravi humores, postquam conceperunt, in corpore retinentur; & puerperas etiam, quando scilicet lochia non satis fluunt, aut post partum laboriosum, vel abortum, sanguis, aut pravi humores in utero reliquuntur ex semine corrupto ut plurimum graviora excitantur, symptomata, quam ex sanguine menstruo, aut aliis humoribus corruptis, affectum indicant murmur abdominis cum ructu vel nausea, lassitudine, oscitationes, & pandiculationes, tristis aspectus & pallor faciei ingravente affectu sensus strangulationis urgere incipit, quasi ex grandiori bolo devorato, quem in faucibus se habere putant. Respiratio intercipitur, & suffocatio augetur: ac tandem actiones omnes vitales & animales depravantur, imminuntur vel abolentur. Hinc deliria, convulsiones in facie & artubus, & nonnunquam in toto corpore; vertigo oculorum inversio aut rotatio, aphonia, & *ἄνωξις* cum pul-

su obscuro & nullo, aliaque symptomata gravia: in quibusdam uterus sensibiliter agitur, & quasi conglobatur, & in variis abdominis partibus globi instar percipitur. Declinante vero affectu, seu paroxysmo hysterico, humor quidam è locis muliebribus effluit, intestina obmurmurant, oculi attoluntur, genæ rubore suffunduntur, actiones animales restituntur, corpus incalescit, suspiria profunda emittuntur, sicque ægra sensim restituitur: distinguitur à Syncope, quod pulsus aliquis ut plurimum adhuc sentiatur, sudor frigidus non erumpat, nec facies tam pallida, sed potius tumida, & aliquando rubicunda sit, & odoratis juventur. Ab apoplexia quod sentiant, si pungantur, absit stertor, & post accessionem meminerint eorum quæ dicta aut facta sunt. Ab Epilepsia denique quod primo invasionis tempore motus convulsivi perpetuò non sint conjuncti, nulla circa os spuma reperiatur, & post paroxysmum plerumque actorum recordentur. Quidam volunt non uterum sed hypochondria esse partem in hoc morbo primario effectam, ejusque causam proximam statuunt flatus, halitus, & vapores aciditate & austeritate præcipuè peccantes ob vitiosam succi pancreatici acidioris, bilis acrioris, & salivæ viscidioris in tenui intestino effervescentiam. Alii rursus hic accusans colluviem serosam juxta nervorum originis congestam, undè spiritus animales labe quadam affecti, tandem in explosiones cientur, & sic existimant hunc affectum præcipuè ac primariò esse convulsivum, & à cerebro nervosoque genere affectis potissimum dependere. Alii denique suffocationis hystericae ortum ascribunt sanguini tenuiori & flatulento cum effervescentia quadam in vasa pneumonica & cordis impetuosius irruenti; indeque omnia recensita symptomata deducunt.

## SUBSECTIO PRIMA.

*De Hysterica Passione.*

24. **A**Q. vitæ ex opt. vino semel destill. lbii. infund. cinnam. carioph. pulv. anis. sem. fœnic. cal. arom. an. ʒʒ. persistent infusione per tres dies. Deinde



coletur: adde sacchar: opt. q. s. F. Syrupus de quo sumat i. in aurora per aliquot dies: hic syrupus mirificè confert passionibus hystericis. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 92.*

Virgo quædam nobilis & nubilis frequenter hystericis accidentibus infestabatur, cum incipiente cardialgia, unde valde circa præcordia angebatur, postea delirabat, corpus concutiebatur, inde sine respiratione, ac si expirasset, aliquandiu jacebat; donec vomitu superveniente, somnoque correpta, eoque perfecto, ad se redibat. Cum aliquando præcautionis gratia diacydonites lucidum scamnoneatum illi ut extra paroxysmum eo uteretur, dedissem, illaque cum paroxysmi incipientis præludia sentiret, etsi hoc non jusseram sponte purgans illud quod ob gratiam libenter sumebat, assumpsit, & mox superveniente dejectione per alvum à paroxysmo liberata fuit. Cæterum cum nihilominus post tempus aliquod elapsum, denuo hoc malo corripere, quo iam annos aliquos per vices graviter molestata fuit, sequentibus pilulis aliquoties usa curata fuit.

℞. Pil. de hiera aggregat. an. ℥i. sem. viticis myrrh. castor. an. ℥i. cum syrup. de artemis. F. massula. capiat. ℥ii. pro dosi, in novem pilulas formatos. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 188.*

Alteri mulieri hystericis accidentibus laboranti, hæc præscripsi.

℞. Spec. hier. ℥i. mechoac. rhei. an. ℥i℥. turbith. ℥i. tartar. alb. ℥℥. zinzib. ℥i. Myrrh. castor. an. ℥℥. sem. vrtic. dauci an. ℥i. diagrid. præp. ℥i. cum syrup. de artemis. q. s. F. massa. pilul. capiat. ℥℥. vel ℥ii. hebdomadatim. Vinum hoc in principio mensæ bibat.

℞. Rad. valerian. mei an. ℥vi. imperator. angelic. an. ℥iii. herb. siccar. meliss. majoran. artemis. thymi. an. ℥i℥. absinth. ℥ii. flor. ros. mar. pæon. lavend. an. ℥i. sem. cumini ℥i. sem. pæon. ℥ii. sem. foenic. ℥iii. bacc. lauri junip. an. ℥℥. infund. in mens. xii. vini; & de eo bibat.

Postea sumpsit de hoc pulvere ad præcautionem aliquoties.

℞. Sem. cumini ℥℥. rad. imperator. ℥i. piper. ℥i. M. fumat. ℥℥. pro vice cum vino malvatico Sicque restituta fuit. *Platerus, observ. lib. 1. p. 189.*

Virgo quædam nobilis mensium instanti-um tempore sæpius hystericis accidentibus infestabatur; inter alia quam plurimæ præscriptum est hoc Emplastrum.

℞. Galban. ℥i. styrac. liquid. ℥i. cum ol. nardino F. emplastrum: extend. super alutam conspergatur pulv. cariophyll. & uteri regioni applicetur. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 190. legatur tota observatio.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Hysterico Affectu.

**N**ostrum experimentum quod nunc quam fefellit est, ut devoret moschi optimi gr. v. cinnam. cariophylli nuc. mosch. an. ℥i. vino odoratissimo dissoluta. *Horatius Augenius, Epist. 7. lib. 12.*

Mulier quædam sævissimis symptomatis affligebatur; dolore capitis, ructu, corporis contractione, dolore inguinis, stridore dentium, aliquando in terram cadens, sine voce, ore clauso, ut aperire non posset: atque hæc ex matricis vitio omnia, ut laceraret etiam vestimenta sua & caderet in syncopen. Remediis multis frustra factis: superveniens mulier quædam vetula, dedit tredecim grana moschi, & totidem pulv. sang. drac. vulgaris ex. ℥iv. aq. flor. arantiorum. Sanata est, nec unquam in posterum istos dolores perpeffa est: idem medicamentum in simili casu à me exhibitum, semper profuit: exhibitum autem aliquoties. *Reimerus Solenander, consil. 15. sect. 4.*

Stati m ubi futura suffocationis signa comparuerint, ac imprimis insultus & intumescencia hypogastrii mulieri ebibendus præbeatur sequens haustus tepidus.

℞. Stercor. rec. caballi avena nutriti M. ij. coquantur. in vino rhenano: exprimantur, ac colentur, pro potu. Venter autem circa umbilicum vinciatur, ac subligetur fascia linea latiore, aut cingulo ex corio cervi in ipso coitu cum cerva necati confecto; quod singularis efficaciam esse in hoc casu experientia testatur. *Franciscus Jac. A. pract. lib. 8. sect. 1.*

Priapus & cervi & tauri justo æstus, tempore exsectus singulare secretumque in suffocatione uteri & colica remedium sub-



subministrat: pro hysterica ita procedendum: in ipso paroxysmo pulveris quantum cultri apex capit in cerevisia calente, vel aqua appropriata exhibe bibendum: nisi fallit experientia, brevi sedabitur affectus: ad præcautionem novem orbiculi exinde abscindendi, & terni suo linteo involuti imponantur potorio scypho, ex quo per hebdomadas tres bibat ægra ab alio potu interea abstinens: eo remedii genere quam plurimæ desperatæ sanitatis, & colica passione miserè excruciatæ ad se redierunt. *Thomas Bartholinus, histor. 50. cent. 6.*

Mulier quædam hysterico affectu laborabat, cum vomitu & alvi fluxu summaque virium dejectione, ut moribunda videretur. Post multa remedia usurpata, nempe fomenta roborantia ventriculo admota, pullos cordi applicitos, epithemata eidem parti apposita cucurbitulas femoribus & pubi affixas, clysterem ex jusculo & theriaca injectum, tum aquam cinnam. exhibitam: sumpsit tandem potionem sequentem, quæ mirum in modum ipsi profuit.

℞. Aq. artemis. ros. & flor. arantior. an. ℥i. aq. cinnam. ℥iii. confect. de hyacinth. ℥i. pulv. el. diamargar. frigid. ℥ss. croci. gr. xv. F. potio *Lazarus Riverius, observ. 32. cent. 1.*

Cuidam hoc affectu laboranti præscribo clysterem hystericum in hunc modum.

℞. Oli. rutæ. ℥iv. aq. vitæ. ℥i. vini generosi ℥ix. galban. ℥ii. M. F. clyster. iniiciendus præmissis clystere laxante. Applicui deinde Emplastrum de galbano; & potiuncula exhibui ex aquæ namphæ ℥iii. cum gr. xv. castor. his nihilo melius habuit, imo verò fluxus mensium cohibitus est; sequenti die cum nausea urgeret, exhibeo potionem ex sale vitrioli ad ℥i. cum aqua appropriata, qua ingentem pituitæ viscidæ copiam evomuit cum labore. Tertia die jubeo aperiri venam malleoli, unde multum levata est. Sed quarto die animi defectibus & languoribus afficiebatur, ut se vapores ad cor ascendentes percipere assereret: aperta est vena alterius malleoli sine fructu: quarto demum die exhibita est potio sequens hysterice convenientissima.

℞. Mosch. & sang. drac. an. gr. xiii. aq.

namph. ℥iv. F. potio, hoc remedio maximè levata est: & toto die melius habuit. At sexto, & septimo, redierunt symptomata. Octavo sumpsit pil. foetid. ℥i. quibus optimè purgata est, & ita benè habuit, ut nullis aliis remediis opus fuerit. *Lazarus Riverius, observ. 65. cent. 1.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Hysterico Affectu.

**M**ulier quædam cum hysterica suffocatione premeretur, & faciem haberet rubicundam, injecto clystere ex oxycratu parato, confestim liberata est: ita ut aliis remediis quæ ipsi præscripta fuerant, non indiguerit. *Lazarus Riverius, observ. 83. cent. 3.*

Ancilla uxoris meæ subito correpta est dolore atrocissimo latus dextrum & lumbostam immaniter infestante, ut illa continuè ejulare cogeretur: cum nulla febris adesset existimavi affectum esse hystericum. Ideo statim oxycrati cyatum exhibui, quem post horæ quadrantem vomitu rejecit, cum multa pituita. Sedato vomitu, alterum oxycrati cyathum hausit, & statim dolor protinusevanuit, eaque prorsus liberata est. *Lazarus Riverius, observ. 6. cent. 4.*

Mulier quædam per multos annos variis affectibus hysterice vexata est, qui epilepticos insultus referebant. Multa tentavit remedia à multis Medicis præscripta sed omnino incassum: tandem cujusdam mulieris consilio sumpsit carnem lupi in pulverem redactam, & frustulum ejusdem carnis salitæ semper gustavit, à quo tempore immunis omnino fuit à prædictis affectibus. *Lazarus Riverius, observ. 31. cent. 2.*

Virgo quædam viro natura motibus quibusdam convulsivis affligebatur ex quibus conjeci illam suffocatione laborare sequenti remedio in momento liberavi.

℞. Ass. foetid. ℥ii. castor. fecul. bryon. an. ℥i. sem. rutæ ℥i. croci laudan. Parac. gr. viii. cum syr. de artemis. F. mass. pilul. de qua capiat. ℥i. *Petrus Pachecus, observ. 10.*

In uteri strangulatu habeas singulare remedium; julos sive catulos juglandis in pulverem exsiccatos contunde; datur ad ℥iii. cum



cum gt. ij. ol. succini, in eō affectu nihil unquam novi præstantius. *Thomas Monfetus, epist. 33. lib. 3. consil. & epist. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzia editor.*

Contra matricis suffocationem unguem alci præsentaneum esse remedium & ab aliis audivisse & periculo facto me cognovisse fateor: nam accersitus ut medicam manum adhiberem cuidam mulieri suffocatione oppressæ, data hujus unguis rasura cum radice zedoariæ, aliisque auxiliis ex parte adhibitis, optatum finem cum honore sum consecutus; cum præterea intelligerem eandem sepe numero eo ipso morbo tentari, ut partem hujus unguis collo appensam, jugiter portaret, injunxi: quod cum sedulo fecisset, quamdiu ego interfui, tribus nempe mensibus, ea semper molestia caruit: unde mihi multoties gratias egit. *Appollonius Menabenus, cap. 10. De Aloe.*

Unguentum viride fit ex sclarea (i.e. hormino) in butyro cocta. Utor in hystericis inungendo ventrem inferiorem: addidi interdum tacamahacam, & animadverti esse efficacius, vel post usum unguenti, adhibui emplastrum umbilico. *Joh. Crato, epist. ad Camerarium, lib. 5. consil. & epist.*

Inter cætera, quod omnium maximè solet mulieres præfocatas quasi momento revocare, est evaporatio facta ad nares; ex pulvere verucarum, quæ tibiis equorum adnascuntur, quæ si in calente furno exsiccantur & in pulverem redigantur, & naribus suffumigium fiat, tanquam præsentaneo remedio, magna astantium admiratione, solent mulieres quasi à mortuis revocari; ad præservationem assiduus usus castorei ad ℥i. singulo die exhibitum cum decocto artemis. matricar. aut etiam vino plurimum conducit, ut longo illius usu, non pauca mulieres è tanto symptomate in posterum præservatæ fuerint. *Albertinus Bottonus, cap. 46. De Morb. Muliebr.*

*Nicolaus Florentinus* narrat se pluribus experimentis probasse, ovum antiquum in nido conservatum, si conquassetur, & supra parvum linteam apponatur utero, miro quodam modo restituere uterum, *Hieronymus Mercurialis, lib. 4. De morb. Muliebr. cap. 21.*

Nuper in uxore mea experti sumus, præfocatione matricis graviter laborante, quanta vis castoreo insit, ut epotum repentè cruciatus omnes tollat, jactationes reprimat, matricem in sedem suam retrahat, ibique sistat; morbum denique omnem cum acerbis, periculosisque symptomatibus propellat. *Andreas Dudithius, epist. 16. lib. 3. consil. & epist. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzia editorum.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *Pro Hysterico Affectu.*

**I**llustrissima quædam domina affectibus hystericis multum obnoxia, variis remediis frustra per multos annos usa, tandem usu sequentis pulveris libera evasit per quindecim annos: sumebat autem illius circiter ℥i. cum vino albo vel pane hostiario bis aut ter in septimana, & sæpius etiam, si affectus urgeret.

℥℥. Rad. gentian. dictam alb tormentill. pyrethr. rha pontici, bistortæ, aristol. rot. carlinæ, bacc. lauri, angelic. imperator. semin. coriandr. præparat. semin. anis. gran. junip. mastich. bol. arm. orient. terr. sigill. an. ℥iiss. croci orient. ℥iiss. M.F. pulvis tenuiss. ad usum reservandus.

Utitur præterea hoc pulvere adversus omnia venena, pestem, febres intermittentes, & inappetentiam felicissimo cum successu, ut nos sæpè vidimus. *Simeon Iacoz. observ. 22.*

Fumus tabaci ori & naribus ægrotantis insufflatus, eam à paroxysmo citissimè liberat: quando affectus producitur à sanguinis menstrui copia & retentione, vena in talo, etiam in ipso paroxysmo, aperiri potest. *Philippus Hochstetterus observ. prat. 2.* Nonnullis historiis ostendit, venæ sectionem in pede plurimum profuisse. Ita ut virgo quædam monialis, quæ aphona, & convulsa per biduum fuerat, post duas horas à venæ sectione faricæperit comedere, ac bibere. Existimamus ergo venæ sectionem posse celebrari, si præterea pulsus fuerit validus, & manifestæ plenitudinis notæ appareant, alias abstinendum esse.

Camphoræ gr. iv. dissolvantur in ol. amy-



amygd. d. & umbilico indantur admoto de super emplastro ex galbano liquato vel moschi gr. iij. excipiantur cotone pauco oleo humectato, & intrudantur in foramen umbilici. Deinde admoveatur emplastrum parvum est galbano: hoc quædam mulieres pro secreto utuntur.

Ad vapores malignos, paroxysmum hystericum producentes, discutiendos, multa per os exhiberi solent; è quorum numero est theriaca vetus ad ℥i. exhibita cum aq. artemis. puleg. melissæ troch. de myrrha ad ℥iij. vel ol. succini ad gr. v. vel vi. cum iisdem liquoribus.

Pilulæ in frequenti usu esse consueverunt, quarum præcipuæ ita componi possunt.

℥. Castor. myrrh. ass. fœtid. an. ℥i. fœculæ bryon. ℥ss. sem. rutæ & croci an. gr. vii. cum syrup. de artemis. F. pilulæ xii. capiat tres vel quatuor, quasi ægra devorare nequeat, dissolvantur in aqua artemis. ad vehementissimum paroxysmum sequentes utilissimæ sunt, eumque certò sedare solent.

℥. Ass. fœtid. ℥i. castor. gr. vi. laudan. gr. iij. F. pil. iij. vel iv. capiat statim.

Pilulæ fœtidæ maj. licet purgantes sint, tamen in paroxysmo utiliter exhibentur ad ℥ss. blande enim evacuant, nec nisi sedato prius paroxysmo purgare consueverunt ita ut ab operatione nullum sit metuendum periculum.

Aquæ etiam multæ exhiberi solent in paroxysmo, ut aqua vitæ, cinnam. & theriacalis: hæc potiuncula in communi usu habetur.

℥. Aq. cinnam. ℥ss. aq. naph. ℥vi. castor. gr. iv. M. F. potio oleum succini ad gt. iij. vel iv. exhibitum cum aqu. flor. arantior. vel alia specifica, paroxysmum hystericum citissimè discutit.

In forma pulveris duo parari possunt remedia efficacissima, & à nobis pluries experta: unum fit ex secundina primi partus in camino exsiccata, & in pulverem redacta: cujus dosis est ℥i. in liquore idoneo; confestim liberat à paroxysmo alterum fit ex duabus partibus sulphuris, & una nucis moschata: rediguntur in pulverem, & ℥i. pondere exhibentur.

Pulvis gran. actes seu sambuci *Quercitanicum* vini cyatho sumptus ℥i. pondere

epilepsiam hystericam sub movet, illiusque recursum impedit secunda exhibitio: in pulveris illius defectu, fuligo camini exhiberi potest eadem dosi, in ovo sorbili.

Pro potu ordinario bibat ægra leve decoctum cinnamomi, vel carvi, vel anisi. Vinum ordinariè bibendum non est tempore paroxysmi, sed tantum extra ordinariè: quando scilicet ratione virium summè collapsarum, complicatæ synëopis, vel instantis mortis, cogimur ad presentaneum illud auxilium recurrere, jam omnibus aliis frustra tentatis. *Lazarus Riverius, prax. medic. lib. 15. cap. 6.*

Castorem non omittendum: imò frequenter ejus usus cum aqua mulsa, vel artemis. decocto fugat hoc malum. Nec hic omitti debent pilulæ de sagapeno, tum in paroxysmo, tum extra paroxysmum. *Gul. Bal. lonius, c. 10. lib. De Mulier. & Virginum morbis.*

A Chymicis valde commendatur oleum stanni quod umbilico hystericæ immissum statim suffocationem sistit: intra verò à gt. i. ad ii. ad summum iij. repetitis vicibus exhibetur.

*Mercatus* fœminis quæ ex menstruorum suppressione hoc malo laborant, tutissimū & utilissimum præsidium esse existimat sanguinis è talo missionem. Verum enim verò cum in suffocatione, uterina maxima sit virium prostratio & totius corporis refrigeratio, adeo ut sæpe de vita desperetur, nullo modo venæ sectio tutum est remedium: *Daniel Sennertus, practic. lib. 4. part. 2. sect. 3. cap. 4. & Joh. Hartmannus, practic. Chimiatri.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Hysterico Affectu.

**E**ssentiæ succini, gt. v. vel vi. epotæ, ut & si ea inungatur umbilicus, mira in uteri suffocationibus levandis facient, quod sæpe fœlicissimè mihi successit: hæc autem essentia facillimè retortæ ope, educetur ex succino albicantiore pulverato, & arenæ immixto, intra enim tres horas ignis gradibus successivè adhibitis, copiosè satis fluet in vas recipiens subjectum.



*Petrus Borellus, observ. 66. cent. 2.*

Sequentem mixturam optimo cum successu sapius usurpavimus.

℥. Aq. antihyster. nostr. ℥ii. (ex fol. puleg. menth. rutæ, an. M. ij. flor. lavend. p. ij. sem. levistic. bacc. laur. an. ℥ß. myrrh. ℥ii. nuc. mosch. ℥i. vini gallic. pint. iij. M. post brevem in calore infusionem destillentur per balneum M.) aq. cortic. citr. ℥i. theriac. simpl. ℥vi. spirit. salis armoniac. ℥i. tinctur. castor. ℥i. ol. succin. gr. iv. syrup. de artemis. ℥vi. M. hujus mixturæ subinde assumat cochl. j. alterumve: vel cochleatim in agrotantis os sensim fundatur: tempore & nares inungi jubeo oleo succini, vel naris spiritum salis armoniaci ad moveri curo. Subinde huic mixturæ laudan. opiat. (ex mente *Hippocr.* qui succum papav. hoc in casu præscribit *lib. 2. De morb. mulier.*) gr. j. vel ij. addidi, nec infœlici cum successu.

Pro diversitate symptomatum nonnumquam aliquantulum mutavimus: ex. gr. si calorem universi corporis genarumque ruborem observaremus, loco spir. salis armoniac. & ol. succini, addidimus spir. nitri dulcis (qui non tantum flatus discutiendi, sed quoque bilem acriorem temperandi vi præditus est) ℥ß. si vero corporis frigus, & faciei pallor, superiori mixturæ adhuc olei macis still. gr. iij. admisceri curavimus. Extra paroxysmum sequentem pulverem felici cum successu præscripsimus.

℥. Resin. ialapp. diagrid. an. gr. iv. mercur. dul. gr. iij. tart. vitriol. sal. armoniac. an. gran. vi. ol. mac. gt. ii. M. F. pulvis. *Fridericus Dechers, notis ad cap. 9. lib. 4. prax. Barbett.*

Mulieri cuidam suffocatione uteri vexatæ, ita ut apoplectica videretur, sine pulsu, voce, & respiratione sensibili, dedi potionem salis mei vitrioli cum aqua salviæ: qua potione multa evomuit, & eiecit, & tandem locuta est, & perfectè liberata fuit ab illa suffocatione intra horam. *Petrus Ioannes Faber. curat. 39.*

℥. Spirit. c. cervi gt. xii. ad xv. vel xx. sumantur in haustulo iulapii sequentis.

℥. Aq. puleg. artemis. an. vn. iv. aq. bryon. com. vn. ii. castor. nodulo ligati & in

vitreo suspensi ℥i. M. *Thomas Vvillis, cap. 10. lib. De morb. Convulsivis.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### *Pro Affectu Hysterico raro.*

**I**N senium iam vergente mundo, intemperantiusque quam olim vivente humano genere, non mirum quod præter numerosiore[m] terris incumbentium morborum cohortem, morbi etiam in dies se ostendent, aut novi, aut raris saltem comitati symptomatis, in quorum causis per scrutandis feliciterque enodandis. Hoc opus, hic labor est. Pauci, quos æquus amavit Jupiter, hoc ritè funguntur officio. Multa quippe hoc latent Medicos quantumvis peritos, etiamsi mentis sagaci acumine interiora naturæ usque & usque rimentur. Tredecim abhinc annis mihi contigit casum in Praxi videre, si non unde quaque novum, insolitum tamen ac rarissimum & à nullo, quem hætenus legi, authore observatum; qui talis erat. Anno 1673. dum *Ardachi* 8. miliaribus *Sterlino* distantis apud Nobilem quendam febre putrida laborantem per aliquot dies subsisterem, vocatus sum ad invisendum honestam Virginem, 20. circiter annorum, affectu perquam raro mihi que etiamnum inaudito detentam. Ob subitam & inexpectatam dilectæ sororis post partum mortem marori & melancholiæ nimium indulserat, ita ut, pathemate animi ingravescente, aphonia tandem correpta sit. Omnes nihilominus adstantes agnovit, quæ loquebantur probè intellexit, imò & scripto manu propria ritè exarato respondere potuit. Sed quod mirum mihi videbatur, semel vel etiam bis quandoque in die, incerto tamen spatio, per horæ, vel circiter, quadrantem, toto intremuit corpore, quo tempore distinctè loquebatur, & ad omnia rectè respondit; desinente demum tremore, ut piscis rursus muta evasit. Licet de affectu hoc insolenti mihi non poteram usquequaque satisfacere, symptomata tamen hysterica fuisse non male forsan judicavi: usu enim venæ sectionis, vini emetici, levium cathartorum & medicamentorum hystericorum à me præscriptorum, divi-



divina auxiliante gratia, intra mensem perfectè convaluit, ac etiamnum vivit & optimè valet. Quod tremor, materiam morificam nervos vocis destinatos obstruentem vel comprimentem excutiendo, loquelam restituere poterat, cuius obviū: sed cur eo desinente iterum vox faucibus hæsit, mihi hæret aqua, nec quò me rectam habeo ut pote cui tantæ non sunt vires veritatem in hoc *Democriti* puteo tam profunde latentem superas evehere ad auras. Suspicio tamen ab humore nervos comprimente loquellam interreptam fuisse, ac à tremore subinde recurrente paululū illum inde remorum, unde tunc loquendi potestas, quo tandem finito, humorem fluxilem denuò rediisse & sic ut ante comprimendo aphoniā induxisse.

## SECTIO DECIMA SEXTA.

Pro Humeri tumore laxo.

**A** Dillum digerendum multū valet emplastrum ex cochleis cum testa optimè tritis & contusis parti affectæ impositum: quod quidem magnopere celebratur à *Galeno lib. 11. de Simpl. med. fac. cap. de Cochleis*. sed omnibus maximè præstat emplastrum *Avicenna* in hunc modum.

℥. Aristid. rot. ammoniac. bdell. sem. sīnapi, sulph. ignem non experti, salis, sem. urticæ an. ℥ii. ol. antiq. & ceræ q. s. M. F. cataplasma quod laboranti parti admoveatur. *Joh. Zecchini, consult. 49.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER NONUS.

De Affectibus à littera I incipientibus.

## SECTIO PRIM A.

De Ictero.



**I**κτῆρς (sic dictus, vel ἀπό τῆς ἰκτῆρος). Viverra, quod ejus oculi flavo tingantur colore vel ab ictero ave, quæ & galbulus dicitur, quam si ab icterico spectetur, protinus mori tradunt, agro sanato) Latine, Aurigo, Regius Morbus, & Arquatus appellatur. Est bilis per summa corporis effusio. Causam referro in meatu cystici & pori biliarii obstructionem: hinc enim est quòd bilis cystidi felleæ & intestinis destinata, sed ab illis propter ductus obstructos repudiata in sanguinem regurgitet, è quo in cutem ubique deponitur. Icterus alius est flavus, alius niger; uterque ab una & eadem causa producitur; in hoc differunt, quod in nigro, cysti fellea diutius obstructa, bilis particula tam copiosè accumulatur,

ut sanguini & sero incoctæ colorem non amplius flavus, at saturationem, i. e. nigrum inducant. In Ictero dejectiones albicant, sed non semper: urinæ crassescunt, & ex rubrò ferè nigricant: repentè hominem adoritur, sine febre ut plurimū, & sine magna virium jactura. Fit etiam Icterus ob pravam hepatis diathesin ab intemperie ejusdem calida, cum vel sine inflammatione; fit etiam in febribus per modum criseos, ut & ob eorum venenum, & ob venenatorum animalium morsum, quorum vi sanguis totus pristinam amittens puritatem in citrinum humorem corrumpitur, quo tandem cutis inficitur. Dignoscitur Icterus per colorem totius corporis flavum maximè in albo oculorum conspicuum, corporis item pruritum & segnitiam, linguæ amarorem, vomitum quandoq; biliosum & singultum.

SUB-



## SUBSECTIO PRIMÆ.

## Pro Ictero.

**F**iliola mea unicum annum nata, morbo regio oppressa est, quàm paucis diebus hoc solo decocto curavi.

℥℥. Hord. mund. passul. an. ℥i. fragar. M. ii. coq. ad lentum ignem. in f. q. aq. fontis, quoad rubella fiat ac dulcis potio; quam continuo bibebat. Valet enim optimè decoctum hoc in morbo regio. *Martinus Rulandus, carat. 6. cent. 1.*

Rusticum quendam quadraginta sex annorum ictero laborantem hoc modo brevi curavi.

℥℥. Iuris pisorum ℥vi. pulv. sen. laxat. ℥℥. M. F. haustus mane bibendus, qui fomitem icteri alvo soluta prolecevit blandè. Pro potu utebatur decocto fragariæ. Pertusa est hepatica, & sic convaluit, Deo sit Gloria.

Alteri ex oculis Ictericia remota est aqua rosarum, qua oculos manè, meridie & vesperi lavabat. *Martinus Rulandus, curat. 32. cent. 7. & curat. 30. cent. 8.*

Nobilis quædam Matrona non febricitans & bene valens, subito Ictero correpta est, excrementa alba & duriora erant: ad me, consilii causa accedens, his duobus remediis, miraculi instar statim convaluit.

℥℥. Syrup. infus. ros. pallid. cum sena ℥i℥. diacathol. ℥ii. aqua agrimon. ℥ii. M. detur mane: alvum egregie deposuit: mox quotidie Cerevisiam bibens expresso nodulo infra scripto in Cerevisia dependente convaluit.

℥℥. Marrhub. exsiccat. M. i. rhei opt. incisi ℥i. schænanth. incisi. gr. v. croc. orient. gr. iii. spec. diarrhod. abbat. ℥i. M. F. nodulus filo astrictus.

Cognata quædam nostra solo decocto foliorum buxi in sero lactis, sine aliis remediis, ab Ictero curata fuit.

Scribit *Dioscorid.* succum marrhub. è foliis contusis expressum naribus, Regium Morbum expurgare.

Mulier quædam Nobilis Ictero laborans, ex oppilatione cystitis fellis, admodum diuturno, multis remediis adhibitis per Medicos doctissimos, curari non potuit, illi con-

tinuum usum Syrupi è succo solo marrhubii cum sacch. confecti admodum commendavi, quo cum diu usa esset ab omni flavedine icteri, qua per duos annos & ultra afflictæ esset, curata fuit: ita ut illum syrup. procurando Ictero semper in summo honore habuerim. Sic quoque exsiccata herba in nodulo egregie profuit. *Petrus Forestus, observ. 19. & schol. lib. 16. De Hepatis Affectibus.*

Collige sterco anserculi tempore veris sicca ad moderatum Solem: hujus pulveris dato ad ℥℥. aut ℥i. in inveterato morbo: per hoc remedium omnis Aurigo tollitur, si per tres aut quat. dies exhibeatur. Idem facit pullorum excrementum album pulver. ad ℥i. amygdalæ amaræ numero vi. jejuno ventre manè assumantur. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 34.*

Tempore æstivo potes quandoque haustum aquæ betulæ bene asservatæ sumere; ea primo vere colligenda, arboris betulæ trunco inciso, aut ramo aliquo amputato, nam largè profundit aquam priusquam folia prorumpant, statim autem cum germinare inceperit, nihil humoris extillat, aqua ista limpida est, sapore grata, sitim sedat, interim obstructions tollit, ut & Icterum sanare, & calculum è renibus curare valeat. *Reinerus Solenander, consil. 10. sect. 3.*

Quidam Ictericus sanatus est edendo omni die pugillum unum absinth. *Idem. consil. 15. sect. 5.*

## SUBSECTIO SECUNDÆ.

## Pro Ictero.

**M**ulier quædam post febrem intermittentem tota evasit icterica, alvusque penitus constipata: persuasi ut vino sequenti alternis uteretur diebus.

℥℥. Rad. aper. an. ℥℥. cortic. rad. sambuc. ℥vi. rad. asar. ℥ii. absinth. ℥iii. summit. cent. min. ℥ii. fl. cordial. an. ℥i. sem. fœnic. petrosel. cuscut. an. ℥i. fol. sen. ℥iii. turpeth. ℥iii. agar. ℥℥. zinzib. ℥℥. tartar. vini alb. & limatur. chalib. in nodulo ligatæ an. ℥℥. infunde in vino: eoque parum in duplici vase, & utatur. Dejecit egregiè huius vini usu, in quo aliquandiu permansit, sen-



simque flavities minui cœpit, urinæque ad naturalem colorem redire, alvusque ref. pondere. Postea ut viscera simul roborarentur, obstructionsque solverentur, Ele. ctuarium hoc præscripsi.

℞. Conserv. flor. cichor. flor. bugl. capil. ven. an. ℥i. pulv. pellicul. stomachi & intestini galinæ ℥i. troch. de eupator. ℥i. limat. chalyb. præp. ℥ii. cum syrup. de bugl. F. elect. capiat alternis diebus superbibendo parum vini diluti aq. endiv. sic restituta fuit, & licet gravida tandem esse deprehenderetur, nihil horum usu mali passa est, sed filium mox sanum & benè habitum peperit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 352.*

Urina pueri ad ℥v. aliquoties propinata probatur, quæ saccharo vel melle dulcorari potest. Stercus anserinum decoquant alii in aqua & vino: & colaturam propinat. Salviæ folia sæpius sumpta quendam curarunt. Pediculos alii numero 11. devoratos juvare credunt. Pulvis, quem pro singulari remedio in Ictero quidam laudant, & in tres partes dividunt, tribusque diebus continuis, manè in decocto ciccerum aut pisorum exhibent, talis est.

℞. Sem. aquilin. ras. C. Cervi, croci, or. an. ℥i. M. F. pulvis tenuissimus, dividatur in tres doses. *Felix Platerus, pract. tom. 3. cap. 2. pag. 140. 141.*

Vinum laxativum per triduum in hunc modum ordinavimus.

℞. Rad. cichor. ℥i. liquir. ℥vi. cortic. rad. frangul. ℥ii. fol. sen. ℥x. rhei. ℥i. sem. fœnic. ℥i℥. passul. min. ℥i. macis, cinnam. an. ℥℥. spic. ind. ℥℥. fiat infusio in lib℥. vini, & lib℥. aquæ, post viginti quatuor horas, sumatur pro haustu tertia pars, addendo ℥i. crem. tartar. propter majorem apertionem: hac evacuatione lenitiva præmissa, ad obstructions venarum minorum referandas, sequenti formula portionem aperientem & digerentem præscripsi.

℞. Rad. cichor. ℥i. rad. fœnic. petrosel. an. ℥xi. fol. agrim. marrhub. alb. an. M. i℥. sem. fœnic. anis. an. ℥ii. cicer. rubr. ℥vi. coq. in f. q. feri lactis caprini ad tertias, colaturæ ℥x. adde syrup. de cichor. cum rtheo de eupator. ana ℥ i℥. M. pro tribus vicibus. *Gregorius Horstius, observat. 36. lib. 4.*

Pro referendis obstructionibus, hunc iulepum digestivum assumpsit.

℞. Aq. absinth. cichor. endiv. an. ℥ii. syrup. de cichor. cum rtheo ℥i℥. syrup. cap. ven. de duabus radic. an. ℥℥. spirit. vitriol. gt. iv. M. F. haustus. Sequenti die pro evacuatione bilis, dedi quod sequitur cum malvatico.

℞. Gummi gutt. laxativ. gr. ix. tartar. vitriol. gr. iv. M. F. pulvis, excrevit eo die egregiè. Postea sumpsit M. & v. de sequenti liquore duabus horis ante cibum.

℞. Lumbric. terræ probè lotorum numer. 6. coq. in aq. graminis aspar. hæder. terrestr. an. ℥i. in colatur. dissolv. sacch. Cand. ℥i. spirit. terebinth. gt. iii. M. Pro ultiore obstructionum deoppilatione bibat per biduum de hoc julepo.

℞. Aq. petrosel. apii, gram. an. ℥ii. syrup. de cichor. cum rtheo ℥i℥. syrup. byzantin. & de quinque radicibus, an. ℥i. succin. tenuissimè pulv. ℥℥. spirit. terebinth. gt. iii. M. F. julepus.

Iterum purgetur pulvere priore. Juscula fiebant cum rad. fœnic. cichor. & petrosel. aurigine nondum cedente, de hoc nodulo bibit vino infuso.

℞. Marrub. sicc. M. i. rhei el. ℥i. a. gar. rec. troch. ℥℥. schænanth. gr. v. croci gr. iii. spec. diarrhod. abbat. ℥i. incid. ad nodulum. Vel sic.

℞. Marrhub. sicc. M. i. rad. aperient. an. ℥i. bacch. junip. concis. M. ℥. croci ℥℥. incid. pro nodulo.

℞. Rad. alth. malv. fœnic. cich. enulæ. an. M. ii. fol. marrhub. cent. min. agrimon. absinth. chamædr. an. M. ii℥. flor. chamæm. melil. sambuc. an. M. i℥. sem. cumini, fœnic. an. M. ii. furfur. Miii. Coquantur in aqua communi pro incessu. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 4. & 5. cap. 2. lib. 4.*

Exhibeatur potio digestiva ut ante. Pro potu ordinario bibat de hoc nodulo in vino suspenso.

℞. Rad. cichor. fœnic. polipod. an. ℥i. fol. cent. min. absinth. marrhub. sicc. card. bened. an. p. i. flor. 3. cordial. an. pug. ℥. rhei el. ℥i℥. spec. diarrhod. abbat. ℥℥. fol. sen. el. ℥i. pulv. chalyb. præp. ℥i. spic. schænanth. an. gr. iii. cinnam. el. ℥℥. incid. & cenquass ad nodulum sericeum.

Sequens



Sequens pulvis anti ictericus pro tribus matutinis inferviat.

℥. Pulv. lumbric. terræ præp. sterc. anferin. verno tempore collect. an. ℥i℥. ras. ebor. spec. diarrh. abb. diatrionsantal. an. gr. xv. sacch. finiss. ℥vi. M. F. pulvis dividendus in tres partes. Interdum de elect. sequenti ad libitum capiat.

℥. Conserv. cichor. cent. min. an. ℥℥. conserv. viol. ℥vi. pulv. lumbric. præp. sper. diatrionsantal. an. ℥i. spir. salis rectificati gr. v. M. ad fictile. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 6. cap. 2. lib. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Ictero.

**I**cterum à folliculi fellis obstructione ita vinces.

℥. Rhei ℥ii. cinnam. ℥i. agar. troch. ℥℥. zinzib. ℥℥. infund. vino tenui & aqu. endiv. colaturæ adde mannæ el: ℥xi. F. haustus. Deinde.

℥. Lumbric. terræ pulver. ℥i. diaspoliti, gr. vii. cum syrup. byzantino. F. Pillulæ iii. & superbibat decoctum ab sinth. ex vino, si non febricitet, alioqui ex aqua: & pro potu utatur solo illo decocto. *Ioh. Heurnius, ad aphor. Hipp. 64. sect. 4.*

Vidi quendam statæ ætatis robustum virum, qui sæpè genio indulgebat: hic in pleuritidem tractus fuit: à vena secta expuebat flava admodum & crassa. Quarto die in Icterus abiit, excrementis biliosis nimirum urina & alvi. Septimo, sudavit vehementer purgabatur interdum manna cum rhab. & quia virulenti aliquid adesse videbatur, conquerebatur enim validè de dolore ad ziphoidem cartilaginem, iussimus decocto pectorali, & cichoraceo incoqui scordium & aliquid marrhub. utque interdum ℥i. vel ℥℥. theriacæ sumeret, evasit. *Ioh. Heurnius, ad aphor. Hippocr. 42. sect. 6.*

Puer quidam quatuordecim annos natus Ictero tenebatur fœdissimo huic sequentia remedia præscripsimus.

℥. Fol. sen. ℥℥. sem. anis. ℥i. sum. absinth. pont. fol. agrim. an. M. ℥. liquir ras. ℥ii. flor. genist. cichor. an. p. ℥. coq. ad ℥iii. in colat. dissolv. rhei in aq. absinth. cum cin-

nam. infus. & express. Div. elect. è succo ros. ℥ii. syrup. rosat. solut. ℥i. F. potio, capiat manè.

℥. Rad. rub. tinct. ℥℥. fol. chelidon. maj. M. i. summit. cent. min. p. i. cinnam. ℥℥. croci ℥℥. infund. per noctem in vini albi ℥vi. colat. adde sacch. albiss. ℥℥. capiat mane per quinque dies post prædictam potionem. Deinde reiteretur potio laxans præscripta. His solis remediis perfectè convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 6. cent. 1.*

Infans quidam natus ex matre tebre tertiana laborante, ipse in lucem editus quatuor accessiones ejusdem febris passus est. Deinde factus est Ictericus: erat tantum bimestriscum ad illum curandum vocatus sum. Dubitavi admodum quid fieri posset in tam tenero corpusculo. Tandem hunc syrupum præscripsi.

℥. Rad. rubiæ tinct. & chelidon. mai. an. ℥ii. fol. chelidon. mai. cent. min. & absinth. pontic. an. Mii. cinnam. ℥ii. croci ℥℥. coq. in aqu. fontis ad ℥bj. in colat. dissolv. sacch. alb. ℥bi. F. syrupus, de quo capiat exiguum cochlear manè per viginti dies, & perfectè restitutus est. *Lazarus Riverius, observat. 17. cent. 1.*

Quod ad phlebotomiam spectat, licet ea improbetur à *Galeno*, quemadmodum ratione ipsius affectus non prodest: tamen si multitudo sanguinis in venis contineri videatur illius imminutio utilissima est.

*Gesnerus* laudat radicem urticæ in hunc modum præparatam.

℥. Rad. urticæ ℥bi. croci ℥i. contundantur diligenter, & cum vino albo succus extrahatur. De quo capiat æger ℥iv. per quatuor aut quinque dies mane: postea tegatur ut sudet.

Dum interna remedia exhibentur, illi natur regio hepatis sequenti linimento.

℥. Succor. apii, Petrosel. & cichor. an. ℥i. aceti ℥℥. olei tamaris. ℥ii. bulliant ad consumptionem succorum & aceti. Deinde adde santal. citrin. & spic. nard. an. ℥i. ceræ q. s. F. linimentum. Sublatis obstructionibus flavus ille color brevi evanescet, discusso humore cuti imbibito, per solum nativi caloris ministerium: ut tamen promptius evanescat, parari potest balneum aquæ tepidæ, corpus in eo confricando sacculo farina hordei & fabarum re-



to. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 11. cap. 4.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Ictero.

**C**UIdam Ictérico egregiè contulit quod sequitur.

24. Fol. marrhub. ceterach. cap. ven. cuscut. card. ben. cichor. cum toto, an. Mi. rubiæ tinctor. ʒi. vesicar. alkikengi, numero x. rhei el. cariophyll. ʒiʒ. incid. crass. harum specierum partem ʒ. coq. in mens. i. vin. & quarta parte aq. ad consumptionem aquæ, dentur manè ʒv. calidè, & duabus post cœnam horis totidem frigidè *Hier. Reusnerus, observ. 76.*

Vir quidam amplissimus totus Ictericus, evacuatione facta, hoc pulvere diutius adsumpto, plenè sanatus est.

24. Rhei el. ʒi. alb. græc. ʒii. lumbric. terræ sicce. ʒʒ. spec. diarrhod. ʒiʒ. cinnam. ʒii. sacch. ʒii. M. Solo etiam decocto euphras. in vino plurimi curati sunt, interpositis catharticiis solutivis: & pulvere millepedum siccatur cum ammoniaco & spec. diarrhod. exhibito. *Achilles Gasserus, observ. 77.*

Ego post bilis purgationem sequentibus remediis Icterum ex bilis regurgitatione ortum felicissimè semper curavi.

24. Rad. chelidon. maj. rec. optimè lotar. & concisar. M. ii. gran. junip. M. i. simul in mortario conterantur, contritisque adfundatur vini rhenani ʒbi. quibus simul subactis beneque agitatis, validissimè exprimantur, & colentur, cujus ʒiv. manè & ante cœnam ebibantur. Vel,

24. Croci pulv. ʒi. cujus singuli in ceram novam & mundissimam in tenuissimamque laminam extensam involvantur, & in globulum formentur, singulique globuli in pomum excavatum imponentur, & torreantur vel ad ignem, vel in cacabo, donec cera simul & crocus in pomi carnem resoluti fuerint, ex his pomis unum per triduum manè devoret æger. *Franciscus Joel. sect. 1. lib. 5. pract.*

Nuper mihi communicavit pro secreto infallibili ad Icterum, infusionem lentis

*Burnet Parte I.*

palustris in vino albo per novem dies, ʒvi. manè præbendo. Novi hominem qui prognostico relictus, importuno usu cent. min. in potulentis, & haustu decoctionis fortis in vino omni manè ab Ictero convaluit *D. Bates* referente *Job. Raio*, in catalogo Plantarum *Angliæ.*

Jam diu ægrotaverat quidam toto corpore ex viridi flavescent; dedi pilulas primum aggregat, quæ parum moverunt, itaque præscripti sequens decoctum.

24. Rad. sambuc. & cichor. rec. an. ʒi. limatur. ferri in petia ligatæ instar nucis, coq. in vino & aqua, bibit per triduum atque egregiè fuit purgatus.

Jussi eo absoluto, sudare in balneo, sumendo bis rob. sambuci, & lixivio se abluere.

Cum octiduo exact. ad me veniens, urinam adfert, adhuc ea tincta erat, jussi hoc decoctum reiterare; quod ita profuit, ut mox discedens gratias egerit, *Felix Platerus observat. lib. 3. pag. 610.*

In *Belgio* Rustici sæliciter Icterum curant eupatorii canabini decocto. *D. Regemorter.* referente *Job. Raio* in Catalogo Plantarum *Angliæ*, &c.

A solo cannabis semine in lacte bubulo pingui ad crepaturam circiter cocto & colato, atque bis, terve in die ad ʒv. aut vi. sumpto, plures curavi, ac vidi curatos Ictericos, à quovis etiam Sapone ad. ʒi. circiter in calente lacte dissoluto, & sacchari tantillo edulcorato, atque bis aut semel salcem in die usurpato aliquoties curavi sæliciter Icterum. *Franciscus Sylvius, prax. Med. lib. 1. cap. 46. paragr. 74. & 75.*

Vinum album tenue, in quo medianus ille cortex berberis, qui inter eximum & ligno adherentem est, lineo panniculo involutus per trium horar. spatium maceratus fuerit, mirifice si bibatur purgare, pro secreto *Clusio* communicatum est. In ictero sanando experientia nostra principatum obtinet *Job. Rainus.* Catalog. Plantar. *Angliæ.*

Juravit quidam mihi quod cum isto syr. experimentato plures ictericos curavit. Accipiebat sterces asinini recens, & ipsum ponebat in duobus cyathis vini albi subtilis & puri, & manibus malaxabat. Deinde permittebat sterces facere residentiam,



tiam, & de vino clariori ad mensuram unius cyathi tribuebat in potu icterico, deinde faciebat ipsum in lecto benè cooperire & statim sudabat & urinabat, & sic materia icteri optimè evacuabatur. Hoc experimento dixit se ultra 20. ictericos curasse. Alius curabat ictericos accipiendo ster-  
cus antedictum, & exsiccabat, & exsiccatum permiscebat cum saccharo, & simul mixta in potu cum vino albo dabat manè adbibendum. *Arnoldus de Villanova, pract. lib. 2. cap. 40.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Ictero nigro & flavo.*

**B**inas Infusiones in vino fieri curavi, quarum una præpararet, altera purgaret, primæ infusionis hæc erat formula.

℥. Rad. cichor. aspar. an. dr. i. Rad. fœnic. cortic. sambuc. ebul. dulcis amaræ. an. dr. vi. rad. rubiæ maj dr. iii. fol. absinth. M. i. chamædr. ceterach. chamæpit. an. M. ss. flor. genist. borrag. an. p. i. sem. cuscut. dr. ii. conquass. omnia, addendo limatur. chalyb. præp. dr. ii. adde vini alb. lbiv. stent in infusione benè obturata. Altera infusio sic parabatur.

℥. Rad. apii levistic. fœnic. petrosel. gram. cichor. rad. ireos, rubiæ mai an. ℥ss. cortic. cappar. tamarisc. fraxin. an. dr. ii. cortic. radic. sambuc. & ebul. an. ℥i. fol. absinth. dr. iii. chamæpit. ceterach. eupator. an. dr. ii. sem. petrosel. apii., cuscut. an. dr. i. flor. cordial. pugil. i. foliorum sen. ℥i. F. infusio in lbviii. vini albi addendo agar. troch. & rhei. el. an. ℥ss. spic. ℥i. limatur. chalyb. in panno ligatæ ℥ss. stent per viginti quatuor horas ante illius usum. Sumebat, per biduum infusionem præparantem, tertio die purgantem. Postea has pilulas præscripsi.

℥. Gumm. ammoniac. in aceto scillit. dissolut. dr. i. rhei. dr. ss. rad. asar. gentian. troch. de cappar. an. ℥i. ciner. lumbric. limatur. chalyb. præp. an. dr. ss. cum terebinth. F. massa pilul. capiat ℥ii. atque sic factum est, dum uno die infusionem præparantem, altero purgantem, tertio die pilulas sumeret, ut tandem excrementa tingi croceo & atro colore inciperent, ægraque aliquandiu in horum usu continuando, præter

omnium spem, integrè restituta fuit, successum & laudans, & liberaliter remunerata. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 612.*

Si mulieri utero gerenti accidat Icterus, utatur optima victus ratione, & applicetur sequens medicamentum carpis & plantis pedum, & curabitur.

℥. Fol. visc. q. M. ii. fol. chelidon. mar-  
rhub. an. Mss. contund. in mortario addito paucovino, & applicetur. *Gul. Rondeletius, pract. lib. 3. cap. 34.*

Mictionem supra stercus equinum recens egestum, dum calet, ab ægro factam plures sanasse Ictericos, quidam mihi pro certo affirmavit. *Philippus Grunlingius, pract. lib. 3. part. 5. cap. 1. Felix Platerus, pract. tom. 3. pag. 143.*

*Crato* Lapidem Bezoar exhibiti in Ictero nigro, & minxit æger tam nigra, quam atramentum, hinc rectè indicatur, lapidem hunc esse diureticum, & non semper alexipharmaci vices gerere. *Wolfgangus Hæferus, in Herc. Med. lib. 3. cap. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *De ileo.*

**E**'ίλεος (ab ε'ίλειν, i. e. convolvendo) latinis volvulus dicitur, barbaris verò miserere mei: *Χορδαΐς* etiam nominatur, *ἡ ποτὴς χορδαῖς ὡς πτεταῖ*, quod qui ventri manum admovet, quasi chordæ intensæ, & duriter convolute speciem sentiat. Est verò dolorifica ac peracuta intestinorum, potissimum ilei, passio, ad quam, suppressa omnimodè alvo, convolutions tensiones; & horrendi variorum humorum, ac tandem fecum vomitus succedunt: oritur atrocissimus hic affectus potissimum ab obstructione & adstrictione intestinorum: causæ obstruentes sunt feces lapidis instar induratae calculus aliquando ibi genitus; vermes conglobati, pituita crassa & viscida: adstringentes seu coarctantes internam intestini cavitatem sunt, inflammatio, alique tumores magni, intestini complicatio, & ingressus in partem proximam, ejusdem in scrotum descensus in hernia. Hæc enim omnia, cum excrementis Per inferiora denegant exitum, motum peristalticum intestinorum invertendo,



do, miserandum hoc symptoma inducere queunt: aliquando etiam à flatibus intestina mirum in modum distendentibus originem habet. Hujus affectus signa sunt, vehementissimi circa umbilicum excruciantes dolores, alvi summa adstrictio, ita ut nihil per inferiora descendat, maxima quandoque ventis murmura, inflatio & distentio vehemens, ructus, & assumptorum vomitiones, procedente malo etiam stercoris: brevi moriturus sudor frigidus copiosus, extremorum refrigeratio cordis tremor; inquietudo & animi deliquium.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Ileō.*

**I**mperavi ut ℥ii. ol. amygdal. d. rec. sumeret hoc unice valet & multis profuit dedi autem calidè, non tepidè ne evomeret. *Petrus Forestus, observ. 16. lib. 21. De Mesenterii & intestinorum affectibus.*

Mulier quædam Roma cum deplorata haberetur, & stercus per os evomeret, neque ullis remediis sanari posset, tandem sumpsit omni die jusculum malvæ, & sanitati restituta fuit; ut constat ex arcanis *Cornelii Medici Roterodamensis*: nihil æque stercora dura emollit, quam juscula pingua. *Idem Schol. observ. 21. lib. 21.*

Quidam ileosum conclamatum à summa desperatione liberavit gallinaceo fimo ex vino albo vel syrupo epoto. *Idem Schol. observ. 21. lib. 21.*

Vir quidam ileo laborabat cum vehementissimis doloribus supra & infra umbilici regionem, & gravibus vomitibus non solum ciborum sed & stercorum, & alvi per septimanas octodecim continua suppressione: ego hujus viri misertus, curam ita institui.

℥i. Olei sem. lini. ℥vi. troch. alhand. ℥iiss. M. & fiat ebullitio parva. Postea inunxi umbilicum benè hoc clystere, ac reliquum per siphonem injeci, hoc facto post duas horas capit egere stercora durissima, mucosa, purulenta, fœtidissima, varia & plurima, ac rectè mox habuit; cibum & potum non evomit, non amplius dedit: & quod mirum intra diem sanatus est. *Martinus Rulandus, curat. 99. cent. 10.*

Cum per superiora multa evomeret, per inferiora verò nulla remitteret; post plures injectos clysteres, quibus nihil egessit, ad hoc artificium devenimus, quo scopum obtinuimus & ægrum ab orci faucibus liberavimus. Follem febrilem ano indidimus, & eo flatum in ventrem immisimus, quo extracto infusum emolliens, cum troch. alhand. paratum, per clysterem subito ejaculari fecimus, quo stercora illico dissoluta ac coliquata fuere, & demum educta: sic enim in hoc morbo operandum suadet *Hippocrates, Amatus Lusitanus curat. 100. cent. 1.*

Cum ad consilium biduo ante mortem vocarer, negaretque Medicus Chymicus ipsi sanguine junctus se alterius Medici presentiam passurum, suasi qui me consulebat fratri, darent patienti argentum vivum crebro per corium transitu per purgatum, quod sæpe vidi sine noxa, momento citius, eductis secum obviis facibus per intestina transisse, à cujus usu, ne frigore suo interanea læsisse posset, statim clysterem ex puro cretico vino injiciebam: sicque aliquot coli nimia tensione morituros, cum Dei gratia liberavi. Sed Medicus maluit hominem incerta morte relinquere, quam remedium, quod inexpertus judicabat periculi plenissimum, tentare. Pilas alii in hoc casu aureas, argenteas, aut etiam si illa desint, plumbeas præscribunt: sed argentum vivum pilis omnibus expeditius velocius & intestina percurrit, per purgatque: vivunt hodie multi, qui norunt centurionem non ita pridem mortuum, cui cum princeps commessabundus, in media comotatione, rifum captans, selibram argenti vivi incapaci poculo vino pleno propinandum curasset: ipse obducto amyntide vase, præsentibus omnibus, neque enim, adhuc ferè bibens, fugere poterat, atque in cachinnos effusus, largissimè & cum fanore pridianæ eanæ, per anum innoxie redidit: ultraque triginta annos sanus vixit; dicens cum inter pocula rideretur se clysteris compendium fecisse: aliis idem evenisse scio. *Henricus ab Heers, observ. 2. lib. 2.*



## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Ileo.

**C**Ogente necessitate ad mercurium erat confugiendum, quod à *Massaria Capivaccio*, *Parao* & *Mariano Sancto* ad æthera commendatur, & in hoc morbo est remedium indicatissimum, nam juvat mirum in modum ratione ponderis & fluxibilitatis, & penetrantiæ, neque ejus malitia timenda est, nam non est verè venenum, exit enim facilè e corpore, in & *Gallia Cisalpina*, inquit *Martiolus*, exhibetur mulieribus ægre parturientibus, & pueris etiam in casu verminoso: quare tutò descendere possumus ad hoc remedium urgente necessitate, nam extremis morbis extrema sunt applicanda remedia. *Epiphanius Ferdinandus*, *hist.* 74.

Dux quidam strenuissimuseum post lulum parvæ pilæ, sudore madidus, sitique oppressus, aquæ nive nimium infrigidatæ calicem ebiberet, ilicò ab ejus potu in sublimioribus intestinis torsionem sensit: cum intensissimo cruciaretur dolore, multa que jam tentaret efficacissima auxilia, iisque nec faces, ructum crepitumve emitteret, imò vomitionibus sædis oppressus in malis esset, nullo alio præsidio quam libræ hydrargyri potu potuit: levare à quo & faces excrevit, & ex dolore melius habuit; quo sedato, & clystere ex generoso vino injecto, perfectam consecutus est sanitatem, optimum sane remedium est, nam anodynum est, & suo pondere intestinum aperit, & obstruentes faces deturbat, & cum vehementer sit humidum, tenuibusque constet partibus, & valde mobile, irritat naturam, & sterces valida ventris perturbatione propellit: *Authore Avicenna*. Argentum vivum pluri mi qui bibunt læduntur eo, egreditur enim cum dispositione sua per inferiorem regionem. *Zacutus Lusit. obs.* 35. lib. 2. prax. adm.

Quidam ex castanearum crudarum ingluvie multa, in omnimodam incidit fæcum retentionem, ita ut ventris tumore, doloreque immani oppressus fuerat: hic cum in agone esset, & frigidus sudore madidus, sterces per os ejiceret, variaque interna & externa expertus esset incassum auxilia: tandem duodecim parvas pilulas plum-

beas quibus felopetarii ad enecandos passeres utuntur, devorandas dedi; quibus dolor aliquantisper conquievit; sed post tres horas iterum increvit, cumque iterum octodecim pilulas propinarem, & faces reddidit, & injecto clystere ex aqua vitæ & urina pueri à dolore immunis evasit, nec mireris, nam hoc catapotium transvortum volvulosos juvat, quoniam intestina involuta implicita & vincta explicat suo pondere, & aperit, faces impellit, & obstruentia excludit lenitque dolorem: in quem usum *Mercatus lib.* 3. de morb. intern. cap. 15. chalybis limaturam propinat. *Zacutus Lusitanus*, *observ.* 34. lib. 2. prax. admirand.

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Ileo.

**N**Arrat sanctus *Marianus* multos fenovisse, qui in ileo desperato, ab imminente morte liberati sunt, haustis argenti vivi cum aqua sola lbiii. pondere enim suo intestinum velut vinctum expedit & evoluit, prædurasque & obstruentes faces deorsum deturbat. Addit & valuisse in colico affectu apud alios id medicamentum, lbiii. pondere haustum. *Ambros. Paræus* lib. 17. cap. 65.

Intestinum si elapsum sit in scrotum, ilicò reponatur, antequam febris & singultus supervenerint: si enim illa supervenerint, ac si vi reponatur, ante septem fere horas moriuntur: si in hoc morbo fluant sudores fœtidi, anhelitusque & ructus oleant male, lethale. Si superum intestinum inferiori illapsum sit, clysmis ac glandibus acribus deorsum fiat motio: sin infernum se superno intruserit, globulo plumbi devorato abactio fit. *Joh. Heurnius*, ad aphor. *Hippocr.* 10. sect. 7.

*Pharmacopæus* maximo ilei tertio quoque die dolore torquebatur: quo sæviante febris aderat satis vehemens, & umbilicus una cum circumvicinis partibus in tumorem attollebatur: injecto autem in ipsis doloribus enemate satis acuto, expurgatisque vitiosis, admodum viscidis, crassis, fœtidisque fæcibus, dolor conquievit, febrisque cessavit. Quod sæpius con-



tingeret, & nec desineret huiusmodi tertianæ exacerbationes, nec enemata, nisi cum adhiberentur, prodesse, de aliis remediis deliberatum. Tentata quædam sunt, sed cum nec his dolores integrè sedarentur, pilulæ iliacæ occurrerunt, quæ à *Phasi lib. 9. ad Almanforem* describuntur: harum ʒi. indie quietis exhibitus admodum prævos & vehementer fœtentes humores eduxit: quibus expurgatis, ilei dolor multum sopitus: cum autem in universum non cessaret, eadem in paulò maiore dosi exhibitæ: quibus, reliquis humoribus eductis, ilei dolor omninò conquievit. *Rembertus Dodonaus, observ. 36.*

Medicus quidam longo usu famigeratus, hydrargyri ʒ. iv. cum melle rosac. solutivo propinatis, iliacum dolorem ab inversione intestini deploratum compescuit. *Joh. Rhodius observ. 80. cent. 2.*

Neminem volvulo perire scivi; potandos nimirum dedi aliquot globulos plumbeos musquetarum, ut sui solo pondere durum illud excrementum propellant: quo plures hauriuntur, & majores, eo tutior & celerior sequitur sanatio, modò æger stet, vel ambulet. *Joh. Helmontius tract. cui titulus de flatibus.*

Vir quidam ileo laborans à quinque diebus ut feces per os reiiceret, multis remediis frustrà tentatis, sumpsit Mercurii cum sulph. extincti & in formam pulveris redacti ʒi. in globulo ceræ inclusam. Statim post exhibitionem, fœtus continuò adhibiti, & clysteres frequenter injecti. Post aliquot horas frustula quædam ceræ in rejecto clystere apparuere; quod indicio fuit apertam fuisse viam: & medicamento purgante exhibitò, æger à morbo prorsus liberatus est. *Franciscus Chomel. observat. 1.*

Volvulum hydrargyro propinato plures curatum prodiderunt: nemo tamen hoc modo, quem *Petro Pena* familiarem notavit *Petrus Affelinus Gallus Medicus Venetus*, felici successu commendatum. Purgabat enim primò hydrargyrum à plumbagine sua, coquendo cum vino & aceto, trahendoque postea per alutam: tum tenuissimam membranam in qua aurum extensum erat, in nodum compigebat filo ligatum: ea hydrargyri, ut supra defæcati, sesquiunciam includebat, & glutine extra-

gacanth. factò obserabat, lentòque igne siccatam, eductò filo, melle aut syrupo intinctam pilulam ægroto devorandam exhibebat: sic glutine in ventriculo statim dissoluto hydrargyrum copiosè alvum ducebat: bis autem sumpto tali globulo quemdam sanatum viderat. *Georg. Hieronym. Velschius obs. 43.*

Ventris sævum dolorem ex ileo lenivimus sacculo ex suillo stercore aceto decocto confecto. *Martinus Rulandus, curat. 74. cent. 7.*

A violentis vehementer purgantibus in hoc malo omninò abstinendum erit, quod hæc excitant flatum, & augent malum. Sanguis vespertilionis hypochondriis illitus mirifica experientia ilei dolores sistere creditur. *Franciscus Joel. pract. lib. 4. sect. 3. c. 6.*

Mulier quædam ex hernia umbilici in iliacam passionem incidit, ita ut vomitiones continuæ contentorum in alvo subsequerentur; in quibus sistendis nihil quidquam profuit; excepto elixere proprietatis. *Parac.* cujus gt. v. vel vi. in brodio exhibitis, ad miraculum per viginti quatuor horas, enormes vomitiones sistebantur, quanquam ægra, quod intestina inflammata nullatenus reponi possent, naturæ debitum solvere cogebatur. *Gregor. Horstius observ. 15. lib. 4.*

Si à fecibus induratis, vel à crassa, & viscida pituita obstructio intestinum dependeat, emollientia, & relaxantia, remedia interna & externa erunt usurpanda. Primo igitur iniciantur clysteres ex decocto alth. malv. viol. chamæm. melilot. cum sem. lini & fœnugræ. vel ex oleo communi solo, ad ʒbi. vel ex decocto intestin. & omenti vervecis, in quo dissolvatur butyrum, mel & sal gemmeum: quibus decoctis, si flatum adiuerint, ut plerumque solent carminantia & discutientia addere convenit. His demum clysteribus emolita aliquantisper materia, purgantia prius mediocria mox paulò vehementiora erunt admiscenda; ac tandem ad vehementissima transeundum erit. Interim fomenta & linimenta emollientia toti ventri erunt admovenda, diuq; continuanda, omentum castrati in aqua fervente calefactum, ventri applicandum; & quod utilius multò,



balnea emollientia administranda, quæ efficaciora erunt, si ex solo componantur: ac denique si vehemens dolor & flatuum copia adfuerit, reliqua remedia in colici doloris curatione proposita usurpari poterunt.

Quæ fit ab inflammatione intestinorum, curanda est venæsectione frequenter repetita, si vires ferant tum in brachio, tum in pede. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 10. cap. 2.*

### S E C T I O III.

*Pro imbecillitate virium à nimia sanguinis profusione post partum.*

**E**X vervecum cordibus extrahi succum jussi, qui in hujusmodi virium defectibus instaurandis miras profectò, & excellentes vires habet: extrahendi autem hujusmodi succum hæc est ratio: accepto vervecis corde finditur medium, & probe aqua eluitur, ut qui intro conclusus est sanguis detergeatur & quicquid sordidum in eo est auferatur, ultimo loco aq. rosæ probe confovetur, & in taleolas oblongas dissecatur, inque vitreato vase testaceo cum caryophyllis aliquot imponitur, sine ullo liquore, probeque operculato vase luto sapientiæ, in calentem furnum extracto pane inditur, quoad calore contrahescens in succum eliquetur, ac dissolvatur, inde post extrahitur, & aperto vase, sumitur inventus succus, & ægræ propinatur: mirum profectò quantopere reficiendis ex inanitione viribus valeat: prout & quæ ex ovorum vitellis, vino, sacch. & cinnamomo sorbitio paratur, quam *Italorum* vulgo *Sambaion* vocat (& *Solemanden* ovum *Lombardicum*) qua & ipse uti ægram moribundam, & viribus exhaustam jussi, unde mirificam sensit opem; spiritibus utique & nativo calore sanguineque auctis ac instauratis Vitelli namque ovorum nullo negotio in sanguinem vertuntur, multoque amplius vinum, omnium enim, Authore *Galeno*, velociter & maximè nutrientium præcipuum est vinum, saccharum verò dulcedine sua a natura facile complectitur, & gratum est; prout cinnamomum aromaticitate sua cor

& membra omnia confirmat. *Franciscus observ. 6. lib. 6.*

### S E C T I O IV.

*Pro imbecillitate virium dignoscenda per oppressionem facta ab ea que per dissolutionem fit.*

**U**bi virium imbecillitas ob resolutionem facta est, tunc pulsus continuus est parvus, languidus, ac valde frequens; ubi verò ob oppressionem sive gravationem contingit, tunc pulsus varius est, ac confusus, aliquando funditus perit, aliquando intercidit, aliquando sublevatur; nec minus illi evenit, quam bajulo onus ferenti, qui cum plus à pondere, quam pro virium suarum ratione gravatur, aliquando opprimitur, aliquando intercidit, aliquando sublevatur, interdum in varios torquetur motus: & secundum *Galenum lib. De introd. in pulsus*. Inæqualitates hæ oppressionum virium maximè propriè existunt. *Amatus Lusitanus, cent. 1. cur. 8.*

### S E C T I O V.

*De Immissione.*

**V**ide infra lib. 18. sect. 28. *De urina incontinentia.*

### SUBSECTIO UNICA.

*Pro Immissione ad puerum quendam.*

**S**ingulis matutinis exhibeatur ℥i. hujus pulv. duabus horis ante jentaculum. ʒi. Glandes bene exsic. numero xii. sem. papav. alb. ʒß. portul. plantag. an. ℥ii. ag. cast. melon. cucum. cucurbit. citrull. excortic. balaust. sant. citrin. an. ℥i. liquir. ras. ℥iii. sacch. alb. fss. ʒvv. F. omnium pulvis, quo sumpto ad doses duas cum cerevisia manè, ita sanatus est, ut per menses sex urinam in lecto non reddiderit. Hic proponam medicamentum paratu facile, quo ego in artis operibus felicissimum virum prosperè in hoc casu *Romæ* usum observavi. *D. Gilbertum Holodanum* Medicum, is incipiebat guttur galli, urebat ut non con-



## S E C T I O VI.

## De Impetigine.

consumptum, sed tostum exsiccatumque teri posset, exhibebat pulvisculum sub noctem ante cenam cum tantillo vini rubelli subastringentis, aut si vino uti non posset, in haustu dilutissimæ poscæ: illud nulla manifesta causa, sed proprietate quadam sanat ipsum affectum *Gal.* in medic. localibus; inter alia propinat cerebrum & testiculos leporis combustos. Item cochleam cum sua testa combustam potu dat, sic recentiores sterces leporis præbent, item cinerem murium tostorum ex vino rubro. Laudant etiam cinerem ossium dactylorum; item avellanas assas exhibitas ante lecti introitum: sic pulverem etiam cortic. ovorum potum manifesta qualitate juvare tradunt. Scribunt vesicam scrophæ aut apti tostas in pulvere exhibitas utiles in hoc affectu: *Hier. Brusvicensis*; in libro quem pro thesauro pauperum conscripsit, notat in hoc affectu vesicam capræ tostam pulveratam in vino exhibitam prodesse: verum inter omnia guttur galli exhibitum in pulvere, cujus efficaciam ego vidi, tuo filio probó. Author etiam sum, ut sequens emplastrum pectini & perinæ uno eodemque tempore admoveat, ut naturæ eo modo exterius quoque subveniat.

℥. Ladan. mastich. an. ℥ii. lign. aloes Syrac. calam. cinnam. terebinth. an. dr. i. myrtyl. rad. cyper. an. dr. m. F. empl. s. a. cum succo menthæ & equiseti ejus vino rubro aspersi q. s. applicetur pectini & perinæ. *Reinerus Solenander, consil. 11. sect. 4.*

Lectimigis in nostro Nosocomio familiaris est hic pulvis.

℥. Stomach. gallinæ, mastich. galang. an. dr. i. agrimon. ocul. cancr. alchymill. an. dr. ii. cupul. glandium dr. ii. nuc myristic. dr. i. erinacei cum toto comb. ℥i. sacch. alb. ℥i. Omnia in tenuissimum pollinem redacta misceantur. *Philippus Hæbesheterus, obs. Med. Decade 6. Cas. 2. Schol.*

Præceteris laudatur pulvis agrimonæ, & tunicæ interioris ventriculorum gallinæ exsiccatæ, quæ seorsim vel simul mixta exhiberi possunt cum vino rubro. *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 14 c. 7.*

**I**mpetigo (Græcè ἰμπίγις) cutis est asperitas dura ac sicca cum ingenti prurigine: a scabie distat, quod sicca sit; omnisque humoris & saniei expers, oritur ab humore seroso tenui & acri cum crassiore humore permixto, duplex est; una simplex & mitis, in qua minus & per minimas pustulas cutis exasperatur, tardeque serpit: Altera quam *seram* seu *feram* Græci appellant, in qua cutis magis exasperatur & exulceratur: hæc difficilius curatur & in lepram transire potest.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Impetigine &amp; Serpigine.

**D**uo filii mei patiebantur diu in brachiis, ventre, ac cruribus feras, tristes atque flebiles impetigines, quas manè & vespere juxta ignem illinebam oleo sulphuris: quo intra paucos dies dolor, pruritus, omnisque infectio submota est, nec unquam postea recrudit. *Martinus Rulandus, carat. 83, cent. 1.*

Vide hujus olei seu balsami sulphuris descriptionem infra lib. 16.

Vir quidam in facie & cruribus impetigine laborans, post universalia remedia, curatus fuit hoc lavamento.

℥. Malv. cum toto, fol. salicis heder. arbor. & lappæ, an. M. i. coq. in vino. Laventur eo crura, & apponatur fol. lappæ; ad idem valet & fol. hederæ appositum: sed & hoc commodè usus est, & ego in aliis quam plurimis expertum sum.

℥. Fol. salic. heder. arbor. lapp. unguil. cabal. an. M. i. coq. in vino *Pistaviensi*. Deinde apponatur fol: unguent. caball. valet egregie ut experti sumus, etiam si in facie, sic, sinapi recentem molitum, & supra linitum, quod quidam pro maximo arcano tenuerunt; etsi apud antiquos quosdam authores ejus quoque mentio fiat. *Petrus Forestus obs. 10. lib. 2. obser. Chir.*

Pro hoc malo depellendo quod faciem & maxime mentum deturpabat quidam infallibili remedio utebatur, sinapi recent.



mollito quo loca impetiginosa oblinebat, atque eo remedio tum ipse curatus est tum plurimi alii post eum, quibus hoc communicavit consilium. *Petrus Forestus, observ. 12. lib. 2. observ. Chirurg.*

Mulier quædam impetigine in crure graviter affecta, cum per Chirurgos plurimos curari non poterat, ex consilio cujusdam mulierculæ accepit butyrum & ferri squammam quæ inter cudendum excutitur, quam pulverisabat, & cum pice navali (vulgo *Tarr.*) componebat linimentum, inungens crur leniter, & curata fuit. Sed postea ut ipsamet mihi retulit loco squammæ ferri, accepit carbonem fabriles eosque pulverisatos cribro excipiebat, illumque pulverem una cum butyro & pice navali bulliebat in olla leniter donec in linimentum coiret: quamvis aut foetorem satis molestum ex se remitteretur hoc unguentum, egregiè tamen ad rem faciebat, adeo ut hoc solo remedio à fœda illa impetigine tandem sanata sit.

Dum *Roma* agerem, post febrem, qua corripiebatur, malignam, die septimo in fronte apparuerunt impetigines quasi per modum crisis; inter *Gisbertum Horſium*, & me conclusum est ut incuratus sine rem, juxta *Aphor. 20. sect. 1.*

Tandem tamen cum post aliquot dies viderem eas per se non evanescere, sed turpiores evadere, magisque intumescere, omni manè propria saliva, idque jejune, simul etiam in die sæpius perfricavi; nam hæc contra serpiginem & impetiginem præsertim hominis jejuni valde commendatur; & ita tandem cœperunt sanari ac evanescere absque ullo alio remedio, neque ullum vestigium pustularum in fronte remansit, aut impetigo ista reversa est. *Petrus Forestus, obs. 13. lib. 2. Obs. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Impetigine.*

**P**ost universalia remedia unguento infraſcripto egregiè curatus est.

24. Plumb. uſti minii an. ℥ii. pulv. præcipit. ℥xii. litharg. auri ℥iv. antim. camphor. an. ℥iv. unguent. alb. camphorat. ℥xvi. omnia commiſcendo probè ducantur cum

piſtillo calido quam diutiſſimè in mortario ad unguenti conſiſtentiam; hoc utor fœliciſſimè in ſcabie illa dicta *Haervorm* quæ ſpecies proculdubio eſt impetiginis ac ſerpiginis valde feræ. Leviter autem inungitur, ſed purgationibus & univerſalibus remediis ſemper præcedentibus; appellamus autem unguentum album camphoratum cum antimonio: ſed & *Ale-maria* in officina tale unguentum paratum habebamus ad hanc ſerpiginem *Haervorm* dictam.

24. Picis naval. vulgò *Tarr.* ℥i. butyr. majal. axung. porcin. an. ℥ß. mell. terebinth. an. ℥iiß. aceti vini ℥iß. ſal. vitriol. rom. tartari, carthami: an. ℥i. æris uſt. ſulph. an. dr. ii. fulig. camin. vel cacabi dr. iii. M. F. unguentum ſ. a. *Petrus Forestus, observ. 14. lib. 2. Obs. Chirurg.*

Sulphur. cum aceto fœliciter adhibetur: maximè probatur unguentum hoc noſtrum quod ad omnem impetiginem & ſcabiem tollendam mirificè valet.

24. Terebinth. lotæ ℥ij. ceruſſ. ℥ß. butyr. rec. ℥i. ſulph. ℥ii. ol. roſ. ℥v. album ovar. numero ii. F. unguentum: cui adde camphor. & moſch. an. gr. v. item paretur linimentum in hunc modum.

24. Pulv. lithargyr. pulv. tartar. an. dr. ii. ſulph. pulv. ℥ii. ol. nucum ℥iii. aceri roſac. dr. vi. ceræ q. ſ. F. linimentum. Ubi verò partes jam antea illitas lavare voluerit, aqua utatur chalybeata in qua fraxini folia præbullierint: primum deturbare vitioſos ſuccos oportet, & ſalubri victus ratione uti, mox localia remedia exhibere exſiccantia, incidentia & detergentia. *Jo. Zecchius, conſult. 79.*

Domina quædam laborabat fœda færaque impetigine utriuſque manus propter quam tædio maximo afficiebatur: venæſectionem, cathartica & omnia alia remedia reſpuebat, hanc paucis diebus ſic curavi.

24. Unguenti roſat. ℥iii. præcipitati alb. dr. iii. M. pro litu partium, hoc remedio prædicta Domina Matronam quandam magni nominis, ut mihi retulit, eodem morbo afflictam curavit. *Petrus Pachequus, obs. 48.*

Mulier quædam færa impetigine laborans cum ſummo dolore irritis omnibus reme-



remediis sequenti cataplasmate mirum in modum fuit levata,

24. Putria poma numero vi. per setaceum transmittantur, quibus adde ol. ros. ʒii. lactis muliebris parum F. Cataplasma, parti dolenti admovendum. Longa experientia didici putria poma dolorem magis lenire quam cocta. *Petrus Pachequus, observ. 55.*

Impetiginem incipientem præsertim in facies & collo saliva jejuni superillita loco aliquantulum agitato tollit. Oleum tartari per deliquium factum cum ana olei ceræ diligenter mistum impetigines & mundificat, & curat. *Ioh. Hartmanus pract. Chimiæ.*

Rustici accipiunt domos (seu nidos) vesparum quas terunt, & superponunt, & ita impetigines curant. Ego vero curo puellas cum butyro loto in aq. viol. postea hoc butyrum misceo cum succo plantag. exlinitur ita facies. Infantes crustosi & fœdæ mulieres inunguntur cum lactis flore. Si sunt Boothores (i. e. pustulæ) accipe fructus alexkengi exfrica desuper, & est mirabile. Sola fricatio radicis lapatii contusi aliquantulum, & in aceto bono diu macerati delet impetiginem; expertum à me sæpius. *Marcellus Cumanus, observ. 24.*

Mitem & recentem impetiginem sanat saliva jejuni hominis illita, ut & liquor qui ex viridibus lignis, dum utuntur, exudat; utile est etiam oleum ovorum. *Daniel Senertus, pract. lib. 5. part. 1. cap. 30.*

Perpurgato corpore localia præsidia partibus impetiginosis vel lichenosis hujusmodi adhibeantur. Cum adhuc levis est impetigo, & antequam in serpiginem aut exulcerationem cutis conversa sola saliva jejuna confricata sanari potest aut confractione muræ ex butyro. Ubi autem his remediis non cedit serpigo, præstat loco affecto tale epithema linteolis exceptum singulis noctibus imponere.

24. Succo lapathi acuti, chelidon. an. ʒss. aceti scyllit ʒiii. alum. ærugin. an. ʒi. Mercur. sublim. ʒiii. sal. ammoniac. ʒi. fuffur. filigin. ʒß. Ebulliant omnia ad tertias, deinde colentur & fiat epithema.

In serpigne rimosa & scissa cute præstantissimum est subsequens unguentum.

24. Saponis nigri ʒß Styrac. liq. ʒvi. Ol.

laurini dr.iii. pulv. vitriol. ʒi. Argenti vivi cum saliva jejuni hominis diu agitata mortificati & in pulverem redacti dr.ii. Subigantur in mortario quàm diutissimè f. Unguentum, quo indies bis ungatur ac confricetur locus affectus. Ego autem ad omnem impetiginem tale præsentissimum præsidium excogitavi, omnesque ex Dei beneficio persanavi, potissimum ubi serpiginis scissuræ vel in manibus vel pedibus extiterint. Excrementi ferri tria aut quatuor majora frustra candefacio, unum ex iis in grandem & capacem ollam impono, partemque seu locum affectum supra candens excrementum extendo, & undique ollam culcitra aut pulvinari contego & cooperio, ut nullus vapor exire queat. Deinde vinum rubrum cum particula spongiæ accipio, & subinde ac sensim in candens ferrum exprimendo destillo, ita ut fervor in olla excutitur, eoque vapore elevato locum affectum fomento ac imbuo. Quod excrementi frustum ubi extinguatur & nullum ex se profert vaporem, aliud in ollam impono, & similiter ut antea ago, idque singulis diebus bis per sesquihoram facio, & ita per octiduum omnis serpigo & rimæ confanescunt. Talis enim vapor excrementi ferri humoris vitiosos per sudores elicit, exsiccat, & poros constringit. Ne autem serpiginis vestigia appareant, inungo ac lavo locum rubentem aqua plantag. cujus ʒvi. admixtæ sunt dr.ii. ol. vitrioli. *Franciscus Joel. Practic. lib. 10. sect. 3.*

Damnato acrium falsorumque usu, alimenta concoctu facilia parumque sanguinem generantia commendavi. Hinc reclusis primarum viarum repagulis, alterantia & præparantia ex cicchor endiv. fumar. borrag. liquir polypod. & similibus in sero lactis caprini decoctis præscripsi. Postmodum materiam præparatam exhibita potius uncula purgante subduxi.

24. Decocti nostri solutiv. ʒiiss. pulv. nostri laxativ. gr. x. Tartari vitriolati gr. iv. M. f. potiuntula. Purgato sufficienter corpore, localia quædam partibus impetiginosis applicui.

24. Succo sempervivi ʒii. cret. pulver. q. s. ut f. linimentum. Hoc cum videretur mitius, aliud imposui quod describitur à *Prevotio* in Medicina pauperum.

24. Sa-



24. Sapon. nigr. aceto soluti ℥ii. boracis ℥ij. coq. ad spissitudinem. Deinde adde cortic. fabar. subtiliter pulver. ℥℥. Ol. nuc. persic. ℥ii. Ol. Tartari per deliquium ℥i. M. f. Unguentum, quo inungatur locus manè & vesperi. Cum nec istud intentioni nostræ satisfaceret, tentavi experimentum Joelis excremento ferri, quo per dies 14. continuato, sensim disparuit lichen, humoribus vitiosis per sudores elictis & exsiccatis. *Balthasar Timæus. Cas. 18. lib. 6.*

## SECTIO SEPTIMA:

### Pro Impotentia ad Venerem.

**S**umat ℥℥. pulv. sem. erucæ cum vino dulci ante cibum, vel ℥i. pulv. priapi tauri exsiccati ante cibum cum vino.

24. Formic. alatar. ℥iii. olei de Sefamo & lil. alb. an. ℥i. infund. formicæ in oleis, & per sex dies Soli exponantur, deinde colaturæ adde euphorbii ℥i. piper. rutæ, an. ℥i. sinap. ℥℥. & iterum Soli per dies octo exponantur. Cum hoc virga testiculi & inguina inungantur & est optimum.

24. Salis stinci vel carniū ejus positarum supra renes ℥i. sem. erucæ, ℥℥. M. accipiat cum ovis forbilibus, & bibatur vinum dulce post. *Barthol. Montagnana, consil. 202.*

Utile est linimentum ex moscho & ambra cum oleo nuc. mosch. vel oleo caryophyll. sed omnium efficacissimum est quod sequitur.

24. Ol. sesamini, lil. alb. an. ℥i. formic. alatar. ℥℥. simul bulliant, mox coletur, adde euphorb. ℥℥. sem. rutæ, piper. an. ℥℥. sinapi ℥i. iterum bulliant & colatura utatur pro linimento partium affectarum & vicinarum. *Job. Zecchini, consult. 42.*

In usum vocetur hæc opiata à *Rondeletio* commendata.

24. Testicul. vulpis in hydromel. decoctor. un. i. contusis adde pinear. & avellanar. infusar. in pauculo lacte, & melle an. vnc. ℥. carnis leutræ, stercor. muris, mosc. an. ℥℥. cum syr. conserv. cortic. citri, F. opiata. Sumat præterea sæpe ex hoc Electuario.

24. Zinzib. rec. condit. rad. eryng. rec. condit. rad. pastinac. condit. an. ℥i. pinear. præ-

par. pistacior. avellan. affatar. diasatyrionis an. ℥℥. sem. baucie (i. e. pastinac. sylvestr.) napi, an. ℥ij. testicul. vulpis, cerebellor. passerum, an. ℥℥. cum syrup. conserv. zinzib. viridis, F. electuarium, capiat cochl. j. & superbibat vinum dulce: egregiè profuit hoc electuarium: ut & eryngiorum radices cum melle conditæ, jussu autem ut frequenter comederet castaneas molles, dactylos, erucam, ut & fabas recentes exorticatas, in aqua coctas, aquaque ablata contusas, adjecto oleo amygd. d. pipere albo, & zinzibere exiguo; in usum vocentur cibi delicatiores, quique maximè alunt, vinumque bibatur meraciusculum, Sequens opiata à *Rondeletio* commendatur.

24. Cortic. citri, zinzib. virid. an. ℥j. conserv. eryng. ℥℥. carnis leutræ, testic. vulp. priapi tauri, vel cervi, an. ℥iij. pul. diamosch. d. & diamb. an. ℥i. cum melle in quo ℥j. cantaridum integrarum prius maceratar. in lacte dissolvantur; fiat opiata ad quantitatem avellanæ superbibendo parum vini malvatici; duabus horis ante cœnam, quæ pauca sit. Ego abhorreo cantharides, ob gravia accidentia quæ inferunt, ideo postea paravi sine iis. Lactis pondus cum cinnamomi ℥j. continuis diebus quadraginta si bibatur reficere id infirmitatem virilium tradunt: etiam consumptos Venere reficit: tenuioris fortunæ homines ova cum capis & butyro frigunt: sed regum impensa est, virilitatem opobalsamo: & renum partes cum mero diluto moscho inungere: sed quia opobalsamo caremus, possumus naturalia hoc oleo inungere.

24. Pyrethr. ℥ij. cinnamom. ℥j. euphorb. ℥℥. tunde cum oleo sesamino, adjecto exiguo oleo caryophyll. & mosch. gr. v. *Petrus Forestus, observ. 18. & 19. lib. 16. De Penis & Virga vitii.*

Ad venerem augendam, mummiā Satyrionis per chymicum aliquem conficiendam curet. Hanc *Cesarei* quidam & Regii medici, nuperis Imperatoribus & Regibus multo in usu delitiisque fuisse mihi adfirmarunt in *Spa*. Formula ejus hæc est: ineunte vere, vel autumnio medio, aut exeunte, hoc est floribus foliisque vel nondum natis vel deciduis, radices Sa-



tyrri collectas aquæ puræ injice, duobus quibus constant orbiculis divulsis, quotquot innataverint, ut inutiles abiice; quæ fundum petierint, contunde in mortario lapideo pilo ligneo, sensim, micam panis albißimi & recentissimi addendo; & propter lentoris dilutionem affunde spiritum vini è malvatico extractum, irrorando paulatim suavissimè: dein optimè mixta pone in alembico cæco, clausaque digere in balneo per sex septimanas: tum prælo exprime, expressum iterum per mensem digere in alembico: innatabit liquor rubini æmulus: hunc inclinando cautè collige, abjectisque fæcibus, cuique selibræ adde salis margaritar. ℥ss. olei nuc. mosch. anisi, cinnamomi, an. ℥ss. dosis guttæ xx. in vino, jusculo, vel conserva corroborante. *Henricus, ab Heers, observ. 9.*

Ad ignaviam genitalium expertus sum boracem officinalem ciceris magnitudine in ovo sorbili manè crebro acceptam, erectionem & coeundi potestatem facere. *Hieronymus Mercurialis, tomo 1. consult. 48.*

Præmissis universalibus, tandem & specifica quædam Venerem stimulantia commendavi, succoladam scilicet *Indorum*, tincturam diatrion piperion, essentiam satyrionis, confectionem pacificam *Mynsichti*, & imprimis sequentem mixturam.

℥. Succoladæ *Indorum* ver. ℥ss. Confect. alkerm. *Monspel.* ℥j. ambr. grif. ℥j. ole still. mac. cinnamom. an. gt. x. essentia satyrionis ℥ss. syrup. de cinnamom. q. s. F. quasi opiata.

Ad perinæi, lumborum & testium inunctionem præscripsi balsamum.

℥. Ol. nuc. mosch. express. ℥vi. balsam. de *Peru* ℥ij. ol. still. mac. gt. ix. cariophyll. gt. vii. zibethi ℥j. mosch. gr. v. M. F. balsamus. *Baldassar Timæus, Cas. 51. lib. 3.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Inappetentia.

**I**Nter symptomata ventriculum affligentia præcipuum locum obtinet Inappetentia (Græcè ἀποψέξια ab ἀπεινῶν appeto) quæ nihil aliud est quam prostrata ciborum omnium appetentia ex defectu suctionis sensus in orificio ventriculi superiore or-

tum ducens, defectum suctionis inferunt alimenti in corpore abundantia, crassi & lenti humores sive ex cibis in ventriculo geniti, sive aliunde affluentes, cibi pingues ac viscidi, intemperies tam calida quàm frigida, obstructio vasorum lacteorum consueta evacuatio, ut mensium, vel hæmorrhoidum suppressa, aut consuetum intermissum exercitium, cerebri demum & nervorum vitia, in quibus scilicet facultas animalis vel concidit, vel depravata est ut in Apoplexia, Lethargo, phrenitide, mania, & similibus contingit, in paralyfi etiam propter obstructionem nervorum à sexto pari prodeuntium *Franciscus verò Sylvius in Praxi sua Medica* nuper edita, vult hujus symptomatis causam frequentiore & graviores esse salivam viscidior & pinguiorem adeoque ad promovendam alimentorum in ventriculo reliquiarum fermentationem planè ineptam quinimò pituitam in tenui intestino similem producentem, à qua succi pancreatici aciditas blanda obtunditur, cujus halitus acidiusculi & grati ad superius ventriculi orificium appellentes, famem excitare solent: aliam etiam causam esse bilem pinguiorem ab intestino tenui, ad ventriculum assurgente, atque tum alimentorum reliquias, tum salivam corrumpentem, & sic gratiam ipsarum aciditatem obtundendo appetitum prosternentem, Præterea inter res non naturales abolent famem aer æstuans, somnus nimius, corporis quies & segnities, curæ extremæ & alvi fluxus. Hæ causæ, si leviores fuerint, diminuent, tantum famem, cum gravissimæ, in totum abolent.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Inappetentia, vomitu & ventriculi imbecillitate.

**C**UM materia Catarrhi in ventriculum delabatur, sæpè Inappetentiam. Nauseam & vomitum conciliat: contra hæc mala ita agendum.

℥. Aloes lotæ succo rosar. aliquoties imbutæ, ℥j. rhei el. cum aqua cinnam. aspersi ℥iv. Extract. rhab. ℥ss. Agar. troch. ℥ij. pulv. mastich. ℥ss. dissolvatur agaricum



oxymelitē, & omnia cum syrup. conservationis zinzib. misc. ac fiat massa pilul aloem in exigua quantitate sumpsi, quod hæmorrhoides fluerent. Cæterum Div. alvum quater placidissimè subdlexerunt. Venter de quo querebatur, tali unguento inungi, & subito melius habuit.

24. Ol. nostri stomach. ʒj. nuc. mosch. ʒi. mastich. pulv. ʒj. M. descriptio olei nostri stomachalis hæc est.

24. Ol. absinth. lb̄ss. summitat. absint. M. j. cariophyll. fantak. citrin. an. ʒij. ros. rubr. ʒj. macis ʒss. mastich. ʒiiss. vini odorat. lb̄ss. eaq. ad vini consumptionem, & ætatis tempore collocetur in Sole, hyeme in loco calido. Cum vomitiones molestæ essent, ordinavi sequens scutum stomachale.

24. Ladani puri ʒij. mastich. ʒij. lign. aloes, fantak. citrin. galang. cariophyll. nuc. mosch. an. gr. vii. cl. stomach. & ceræ q. s. aspergatur speciebus arom. rosat. & obducatur syndone. *Ioh. Crato. consi. 13. lib. 5.*

## SVBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Inappetentia.*

**M**iles quidam chronica febre male mulctatus, incipiens jam aliquantisper respirare ab accessionibus, supplex à me petit, ut appetentiam in se planè dejectam revocarem, alioquin intra quatuordecim indubiè periturum ego præscripsi potionem ex. ʒss. diaphanæ. cum absinth. vulgaris & agrimon. decocto, postea sequentibus veluti cote, appetentiam acui.

24. Fol. agrimon. absinth. vulg. cent. min. an. M. ʒ. F. omnium decoctio: de colatur. capiat lb̄ss. cum paucò saccharo, jussi ut novem dies huic decocto indulgeret. Sed post dies quinque rediit ad me, enixè rogans ut caninam appetentiam usu medicamenti nostri excitatam obtunderem, quod præstitimus abstinendo à potione nostra amara, illique consulendo ut butyro & vino generoso uteretur. Plures eodem remedio in talem affectum incidisse testis sum. *Petrus Pachegnus.*

Vir quidam consularis aquid *Delphenses*, cum inappetentia laboraret, ad incitandum appetitum; una cum *Vergetio Me-*

dico *Hagbano*; sequentia præscripsimus.

24. Syrup. de limon. de acetos. citri, an. ʒij. syrup. acetos. simp. syrup. ros. ex multis infus. vel saccharo rosac. an. ʒj. syrup. menth. ʒiiss. M. capiebat omni mane duo coclearia, paucò vino rhenensi, addito egregiè profuit. Verùm post discessum alterius Medici, cum medicamenta abhorreret, mace-rabam per noctem absinth. romani comam, & dentis leonis radicem unam atque alteram, paululum contusam, in vino rhenensi; mane vinum expressum propinabam, & dictu mirum vir septuagenarius vermem mortuum, postea & vivum deiecit, & appetitus miraculi instar, rediit. *Petrus Forestus, De Stomachi affectibus.*

Juvenis quidam macilentus ob biliosos humores cibum averfabatur; eum hoc modo curavimus. Cum mordaces humores biliosi ventriculum lancinarent, & hic nauseabundus, & invomitum satis proclivis esset, statim jejuno ventriculo emeticum blandum exhibui. Deinde pro levi purgatione propinavi syrup. ros. pallid. ʒij. cum ʒiij. feri lactis; qua potione brevi benè exersuit biliosa. Biliosa humore evacuato, & intemperie ventriculi calida syrup. acetos. citri & granator. acidor. alterata; imperavi deinde ut persicam in principio pastus assumeret; hæc enim maxime appetentiam incitat, si à causa calida prostrata sit. Syrup. de persicis hunc modum fit, quo uti possumus in talicafu.

24. Succi persicor. nondum plenam maturitatem assecutor. lb̄rv. decoq. ad dimidii consumptionem; permittantur fæces subsidere: Deinde adjiciantur succi malorum punicorum ʒvi. sacchar. q. s. simul perfectè coquantur, depurentur, adiectisque fantalis citrinis, q. s. suaviore odore reddantur; dantur ex hoc syrupo ʒij. manè & vespèri duabus hor. ante pastum. Si persica desint, pro illis substitui potest succus pomorum acidorum redolentium. Exterius fots & unguenta adhibui, deinde apposui ceratum fantalinum, victu quoq; refrigerante utens, & moderato somno, rectè deinde valuit. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 18.*



## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Inappetentia.*

**C**uratio hujus affectus, si ab aliarum partium vitio dependeat, ab earum curatione desumenda est. Si verò ex proprio ventriculi vitio contingat, ad calidam vel frigidam illius intemperiem cum materia conjunctam reducenda est.

Calida intemperies curanda est primum humoris biliosi expurgatione, blandè & frequenter repetita, eaque componi poterit ex rhab. myrobal. tamarind. syrup. rosac. vel de cichor. comp. cum rheo: aut si æger sit ad vomitum proclivis, blandis vomitoriis provocandus erit. Idem humor alterabitur julepis aut jusculis refrigerantibus, in quibus non omittendus est spiritus vitrioli, aut sulphuris, quandoquidem acida omnia, præterquam quod bilem valde contemperant, appetitum etiam maxime excitare valent. Unde fit, ut acetaria æstatit, tempore ad excitandam appetentiam frequenter usurpentur, vel simul & semel humor ille biliosus alterari & expurgari poterit apozemate convenienti, cui ratione ventriculi addi poterunt absinth. pontic. M. ß. myrobalan. citrin. ʒß. post purgationem ad ventriculum roborandum convenient mira cydonior. aut cydoniatum ipsum, vel syrup. cydon. cum syrup. de absinth. mixtus, tabellæ diamargar. frig. vel triasantal. vel etiam diarrhod. abbat. Si obstructionis suspicio fuerit, vel opiata sequens.

ʒj. Conditur. lactuc. & cucurbit. an. ʒj. Conserv. acetos. ros. flor. cich. & bugloss. an. ʒm. Santal. rubr. corall. præpar. margar. præp. an. ʒm. Troch. de spondio & sem. ace. ros. an. ʒi. cum syrup. de limon. F. opiata, ejus capiat ad magnitudinem castanæ manè & serò, superbibendo parum vini dilutissimi.

Exterius verò sequenti unguento regio ventriculi inungatur.

ʒj. Ol. rosat. myrtini, & cydonior. aceto rosac. lotor. an. ʒii. santal. omnium, corall. rubr. coriandr. præp. ros. rubr. an. ʒi. gran. kermes & spodii an. ʒß. ceræ albæ, q. s. F. linimentum, quo sub tepido inungatur dicta regio bis aut ter in die, ad-

dendo aceti rosac. parum unctionis tempore, vel eidem parti admoveatur placenta rosac. aceto irrorata, aut in eodem parum macerata, quæ removenda erit priusquam incalescat. Denique in perseverante affectu plurimum proderit balneum, vel semicupium refrigerans & humectans bis aut ter repetitum.

Si à frigida intemperie producatur inappetentia, curatio instituenda est per evacuationem humoris morbifici, & ventriculi corroboracionem. Vacuatio potest fieri per vomitum, si æger sit nauseabundus, & facile vomat alias per secessum, idque pilulis præcipue, quæ hic magis conveniunt, quia diutius in ventriculo morantur, ut docet *Galenus, lib. 4. De sanitate tuenda, cap. 7.* qui etiam valde commendat pilulas de hiera, quæ exhiberi possunt ad ʒii. vel ʒi. manè duabus horis ante pastum, vel in hunc modum componi possunt.

ʒj. Aloes elect. succo absinth. diligenter nutritæ ʒi. Agar. troch. ʒii. rhei pul. & vino albo irrorati ʒi. nuc. mosch. spic. nard. an. ʒß. sal. tartar. mastich. & cinnamom. an. ʒi. cum syrup. de absinth. F. massa pilulæ ex cuius ʒi. formentur pilulæ vi. deauratæ: capiat summo manè, si velis integrè purgare: velumat ʒß. horis duabus ante prandium, bis aut ter in septimana. Possunt acui diagrydio, si validius purgare volumus. Validiore pilulæ non conveniunt, quia humores ab aliis partibus ad ventriculum alliciunt.

Si pilulæ devorari non possint, fiat infusio fol. senæ, myrobal. rhei & agar. in vino absinthite vel decocto stomachico.

Terebinthinæ usus opportunissimus est, quia viscera omnia commodè repurgat, maxime si ex ea & rhab. pilulas confeceris.

Post purgationem sufficientem, ad roborantia veniendum est, tam interna quam externa, quæ in sequentem modum præscribi poterunt.

ʒj. Syrup. de absinth. ʒi. capiat mane jejunò stomacho per plures dies, vel illius loco vinum absinthites substitui poterit.

ʒj. Conser. anthos, menth. cort. citr. condit. nuc. mosch. condit. an. ʒß. Myrobal. condit. num. i. Confect. Alkerm. ʒiii. tunicar. interior. ventric. gallinæ præp. ʒii. pulv. arom. rosat. & cinnamom. an. ʒj.



cum syrup. de menth. F. opiata; vel cum sacchar. rosat. F. conditum. Utatur manè superbidendo parum vini generosi. Dictis remediis utiliter aditur sal absinthii; vel oleum menthe arte chymica extractum: vel sal absinth. & cortic. arantior. vel alterutrum ad ℥ss. in vino vel jusculo dissolutum exhibeatur. Sequens etiam Syrupus efficacissimus est.

℥. Syrup. cydon. & condit. cort. citri, an. ℥ii. aq. cinnamom ℥i. ol. sulphur. gt. xii. M. capiat cochl. j. per intervalla. Aqua clara frequentissimo in usu aqua multos habetur, cujus compositio talis est.

℥. Cinnamom. crassiusculè triti ℥i. macerentur in lbi. aquæ vitæ per se in vase vitreo: in alio vase vitreo per se & seorsim macerentur sacchar. albiss. ℥vi. aq. ros. lbi. stent hæc omnia seorsim infusione per duos aut tres dies, agitando quolibet die pluries hæc duo vasa: tandem simul misceantur materiæ in ipsis contentæ, & per manicam transmittantur, colatura fervetur in vase vitreo benè obturato: sumat cochl. j. aut ij. jeuno stomacho.

Aqua *Parisienses* maximo in pretio habetur syrup. de absinthio penæ.

Cujus descript. in hunc modum se habet.

℥. Cortic. citri, sacchar. condit. & in taleol. dissect. lb. β. Coq. in æquis partibus aquæ cichor. & agrimon. usque ad putrilaginem. Expressioni fortiter factæ, adde succ. cyd. & aq. stillat. absinth. Pontic. an. lb. β. quibus simul mixtis infund. per quatrimum scænanth. ℥iv. in vase bene clauso vitreato supra cineres calidos. Express. fortiter facta dissolv. sacch. albiss. q. s. Coq. postea in syrup. perfectum, in quo calente dissolv. ambr. cineritiæ ℥i. Servetur postea in vase vitreo bene clauso.

In maxima frigiditate ventriculi aq. cinnam. sola præstantissima est. Non minoris efficaciam est Syrup. cinnam. cum aqua vitæ confectus prout describitur à *Quercetano* in Pharmacopœa.

Ad idem præstat spiritus mastiches, ita compositus.

℥. Mastich. ℥iii. galang. ℥i. spirit. vini lb. β. digerantur ac destillentur.

Utile est etiam Elixir proprietatis à *Croli* descriptum, cujus gt. xii. aut xv. dum vino exhibita mirè stomachum roborant.

In affectu inveterato plurimum conducit decoctum ligni guajac. aut sassafras, in plures dies sumptum, cum levi sudore, aut sine eo in debilioribus. Aquæ etiam thermales sulphuræ & nitrosæ, quales nostræ Bellilucanæ, magna copia per plures dies sumptæ, crassos & mucilaginosos humores, omnemque ventriculi & intestinorum illuviem potenter abstergunt & evacuant.

*Costaus* vini calidi usum prædicat infrequentem modum. In potu ordinario vinum calidum ebibitum ventriculi imbecillitatem corrigit: non infrequens enim est observatio eorum, qui cum ventris flatibus doloribusque perpetuò torquerentur, ubi calido potu uti capere, omni prorsus ejusmodi molestia soluti, meliorem multos jam annos vitam vivunt. Cum vino aqua potus ordinarii permiscenda est quæ prius cum semine coriandri parùm bullierit. Notandum autem est diligenter, si cum frigida ventriculi intemperie calida hepatis concurrat, ut sepe fit, calida medicamenta esse caute adhibenda, & temperatiora potius adhibenda. Pulvis digestivus ad concoctionem ventriculi adjuvandam in frequenti usu esse consuevit.

℥. Corandr. præpar. ℥ss. fœnic. d. & anis. an. ℥ii. cinnam. cariophyll. an. ℥ss. sacch. ad pondus omnium duplum. f. pulvis, de quo capiat cochl. j. post singulos pastus, nihil desuper comedendo vel bibendo.

Balsamum *Peruvianum* ad roborandum ventriculum præstans & efficax est remedium, si ejus guttæ aliquot cum vino Hippocratico, vel alio, hora una ante cibum exhibeantur.

Vel balsami *Peruvianis* gt. una aut altera cum sacch. permixta in formam pilul. sumatur per multos dies. Magis familiaria medicamenta ventriculo roborando & calefaciendo idonea sunt, vinum *Hippocraticum*, bochetum ex decocto anisi & coriandri cum sacchar. & cinnamomo paratum pro potu ordinario. Pulvis *Ducis* vulgò dictus, ex duabus sacchari partibus & una cinnamomi conflatus omnibus alimentis inspersus; Piperis grana aliquot integra ventriculo jeuno sumpta; Sal ad condiendos cibos confectum, ex pulvere coriandri, piperis longi, galangæ & nuc. mosch.



mixto cum pari portione salis communis ; Nuces juglandes cariophyllis & cinnamomo transfixæ, & sacch. conditæ; Cortex citri & aurant. pariter conditus; Semina anisi, fenic. coriandri, & frustula cinnamomi sacch. incrustata; Quæ omnia ægrotantes ad libitum usurpare poterunt; Ut & nucem moschatam conditam; & myrobal. condit. Essentia anisi, cinnam. cortic. citri, nuc. mosch. & cariophyll. ad ventriculū roborandum efficacissimæ sunt.

Exterius verò admoveantur fomenta, linimenta, & Emplastra in sequentem modum.

℞. Rad. cyper. galang. ireos, flor. cort. citri. sic. an. ℥ii. fol. menth. hyssopi salv. rosmar. & majoran. an. M. j. sem. anis. bacc. lauri, nuc. mosch. cariophyll. cinnam. an. ℥iii. flor. stæch. schænanth. rosmar. an. p. i. incidenda incidantur, & contundenda contundantur, ut artis est, includantur duobus sacculis interpunctis, qui macerentur in vino generoso, & applicentur regioni stomachi calidè vicissim.

℞. Ol. absinth. menth. nardini, an. ℥ß. oleo nuc. mosch. ℥ii. ligni aloes, macis cinnamom. an. ℥i. ceræ parū F. linimentum: quod præstantius evadet, si addideris olei cariophyll. gt. vi. mosch. & ambr. gr. sex, an gr. vii.

Fiat etiam linimentum ex ol. nuc. pulv. & balsamo *Peruviano*, vel ex ol. absinth. mastich. & balsamo *Peruviano*.

℞. Mass. empl. de mastich. ℥i. mosch. arom. rosat. ℥i. ol. nuc. mosch. q. s. F. Emplastr. scutiforme applicandum regioni stomachi.

*Crato* sequens emplastr. miris laudibus effert.

℞. Ladan. ℥ii. ceræ ℥iv. ol. nuc. mosch. ℥iii. Fiat emplastr. massa ad usum.

Admonet *Galenus* hujusmodi emplastr. diutius non esse in parte detinenda, quia tandem calorem dissolvunt.

Inter externa etiam valde laudantur pelles vulturis præparatæ, & super regionem ventriculi gestatæ. Earum defectu pellis leporis, aut pannus scarlatinus usurpari poterit.

℞. Rad. galangæ & cal. arom. an. ℥iii. mastich. & cariophyll. an. ℥ii. nuc. mosch.

num. i. cortic. citr. sic. ℥ß. sem. anis. ℥iß. Ex his contusis fiat sacculus interpunctus cum sindone rubra & cotone moschato perpetuò gestandus supra regionem stomachi. *Lazarus Riverius, lib. 9. Praxi Medic. cap. i.*

## S E C T I O XI.

### *Pro Intestini recti ulcere.*

**B**alsamus quo ulcus in *Spa.* percurabatur, quando a me inventus, & semper cum optimo successu usurpatus, reticendus mihi non videtur. Sumo flor. tapsi, hyperici fol. prunellæ, an. M. i. hos incoquo olei ex sem. hyperi torcularic. expressi, & vini rubri veteris pari quantitate, ad vini omnimodam exhalationem, hoc est dum liquoris gutta igni injecta sine ullo stridore flammam concipit, eoque solo si præsens urgeat necessitas, utor: alioqui eisdem flores sæpius immacero, & post quadraginta dierum insolationem, aut ignis calorem iterum exprimo, quod quo sæpius facio, efficacius multò oleum comperio, cui remisceo lapidem calaminarem septies vino, demum in hoc oleo post ignitionem, extinctum. *Henricus ab Heers, observ. 10.*

## SECTIO DECIMA.

### *De ischiade.*

**Q**ui *ἰσχία* Articulum cruciare solet dolor *ἰσχία* Græcis, Barbaris verò Schiatica nuncupatur. Arthritidis species est, sed omnium vehementissima: hoc sibi præ aliis peculiare habet, quod non in sola coxendice sedem habeat, sed altius ad summam etiam natem, qui nervi a lumbis & osse sacro emergentes feruntur in crura: hinc est quod dolor atrox, præterquam quod in dictis locis se ostendit, in femur quoque tibiamque & extremum pedem exporrigitur; quocunque nimirum ab affecta coxendice deductus nervus pertingit: rarò tumor inest conspicuus rarius calor, aut rubor, quia humores affluentes in partes profundiores multaq; carne contactas sese insinuat: hujus doloris



ris causa eadem est cum arthritidis causa, de qua supra lib. I. sect. 40.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Ischiade.

**P**uer quidam diu ischiade laborabat : cum multis & diversis remediis frustra usus fuisset, me tandem vocari iussit. Imperavi ut ex vena schiatica sanguinis missio fieret è directo coxendicis affectu. Deinde exhibui hoc apozema purgans simul & partes nervosas corroborans.

℞. Herb. paralyf. salv. beton. maior. iv. arthritic. chamæpit. chamædr. an. Mi. flor. rorismar. stæchad. an. pi. fumar. Miß. sem. anis. fœnic. an. ℥ii. fol. fen. ℥vii. agar. ℥i. rhei el. ℥ß. zinzib. alb. ℥i. schænanth. ℥ß. passul. exacinat. ℥i. liquir. ras. ℥ß. coq. in aq. pro ℥ix. fortissimæ expressioni adde syrup. è stæcad. mel. ros. colat. an. ℥i. M. pro iiii. dosibus matutinis, satis eo medicamento alvo soluta, præcepimus ut inungeret locum affectum oleo vulpino & lumbric. quæ cum non juvarent, sequens ceratum apposui.

℞. Oxycroc. ℥vi. picis, sulph. an. ℥iii. ol. lumbric. exiguum F. ceratum, extend. supra corium rotundum, & syndone rubra cooperiatur, & coxendici apponatur. Fuit semel reiteratum cum ℥m. sulph. & istis præfidiis curatus erat, multos alios curavi, ad quos curandos aliud præstantius remedium non inveni, quam ceratum illud ex sola pice & sulphure paratum.

Mulier quædam cum intensissimo dolore ischiatico laboraret, & omnia remedia nihil profuissent; tandem nobis relatum fuit eodem tempore, quod quidam per quatuordecim dies intolerabili dolore schiatico affligtus urticam coctam cum cerevisia cataplasmatibus instar, ex cujusdam consilio, applicuisset & ita ab omni dolore miraculi instar curatus fuerit; quare & huic mulieri idem remedium adhibui, quo etiam dolor in ea sedabatur, verum non statim sed paulatim. *Petrus Forestus observ. 20 lib. 19. De arthritide, & extern. partium affectibus.*

*Guainerius* se expertum pluries ait, si cum urticis mordentibus tam serò quam manè coxa verberetur inductis pustulis, de-

inde aqua salsa lavetur, hoc medicamine plures restitutos esse *Rhases* ex alio & cepe locum confricari jubet, & postea cum aq. salsa lavari. Præceptor meus *Benedictus Faventinus* apponebat quatuor ventosas cum scarificatione supra nates, & cauterium actuale cruri lateris affecti. *Petrus Forestus. Schol. observ. 22 lib. 29.*

Oxycroceum ceratum in aluta extensum admovendum erit, quod solet mirabiliter prodesse Cataplasma etiam ex rad. helenii decocta impositum, usque ad ruborem, quod certe mirabiliter fecisse expertus sum: & quod non videatur ita posse, vidi emplastrum ex semine lini & melle hominem liberasse. *Christophorus Guarinonius, consult. 252.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Ischiade.

**D**olores illi sapientum omnium cordia clysteribus acutis sanantur.

℞. Rad. hermodactyl. ℥i. rad. ranuncul. ℥m. fol. chamæpit. flor. stæch. hyperic. sem. rutæ, cumini, an. M. m. chamæm. melil. sem. aneth. an. Mi. croci non contriti ℥i. coq. omnia simul in lbv. aq. usque ad medietatis consumptionem, in colat. express. ℥xi. dissolv. ol. castor. ℥iii. salis indi ℥ii. hier. colocynth. ℥m. M. F. clyster. injiciatur: inest huic clysteri magna virtus ab hermodactylo sigillata. *Barthol. Montagnana. consil. 257.*

Sicca totum corpus & partes firma, hoc optimè fit, à provisione habita totius corporis, decocto sarsæparillæ & ejus electuario quod alibi descripsimus. Sarsa enim una dolores potenter placat. *Joh. Heurnius ad aphor. 59. sect. 6.*

Utantur priusquam fiat tabes cruris, vel claudicatio. Uredo madorem exhaurit; & laxitatem contrahit: foras trahit materiam etiam phænigmus: cauteria diu aperta fluant: tribus locis admove: cave à tendinibus & nervis: si aliunde influit, purga, sicca totum & partem. Ita in puerorum vacillantibus genibus siccantia emplastra admove. *Joh. Heurnius ad aphor. 60. sect. 6.*

Consiliarius quidam rigido hieme coxendico dolore vexabatur: injectis clysteribus,



bus, sumpto medicamento purgante, & admoto emplastro parti affectæ dolor nihilo secius perseverabat: tandem aperta est vena malleoli è directo partis affectæ, & intra paucas horas dolor remissus est, ac postmodum omninò desit; ut secundo à venæsectione die ad consueta munia transire. & per urbem pedibus ire potuerit. *Lazarus Riverius, obs. 25. cent. 2.*

Si secetur vena malleoli ad exteriorem partem vergens, illincque sanguinis ℥vi i i. vel ix. plus minusve pro ætatis & virium ratione detrahantur, eadem ferè hora (quod mirum videtur) coxendicum dolorem vel etiam vetustissimum delere solet. Quinimò sanguis quoque è venis sedalibus per hirudines admotas evocatus, mirum in modum ischiadicis opitulatur: quippe quod sanguinis in coxendicum venis contenti copia educatur harum enim partium maximus est venarum consensus. In hunc etiam usum cauterium paulò subtus genu in parte exteriori lateris affecti inultum derivationis causa summo opere commendamus quemadmodum & alterum in brachio opposito aversionis causa à coxendice. *Ioh. Zecchius, consult. 43.*

Purgationes fortiores hic locum habent, nam leviores humores magis ad partem affectam præcipitant: ideo conveniunt maximè pulveres arthritici, caryocostinum, pilulæ de hermodactylis, & similia. Mercurius dulcis cum scammonio, vel aliis purgantibus exhibitus satis frequenter; humorem ischiadem potenter eradicat. Vomitaria à multis præferuntur purgantibus per alvum, cum per locum à parte affecta remotiorem, humores vitiosos evacuent: asarum reliquis præfertur à *Rondeletio*.

Post sufficientem purgationem, ad topica veniendum est: & quidem repellentia quod attinet, illa minimè conveniunt, quod metuendum sit, ne humores ad partem affectam magis promoveantur, sed statim initio resolventia admovenda sunt: primò mitiora, & minus calida, postea vehementiora in hunc modum.

℥. Rad. bryon. ℥ii. rad. ebul. ℥i. bacc. juniperi ℥ss. fol. ivæ arthritic. ment. major. talv. aneth. flor. chamæm. melil. an. M. iii. F. decoctio pro semicupio, quod ingredia-

*Burnet Parte I.*

tur bis in die per biduum aut triduum, in principio parari poterit decoctum ex aqua sola, postea ex aqua & vino albo, ex eodem decocto potest soveri pars dolens calidè frequenter: sacculi etiam parari poterunt ex sale milio & furfure frixis in sartagine cum vino generoso, & calidè applicari: vel componi etiam poterunt sacculi efficaces ex foliis granis juniperi contusis, & prædicto modo in sartagine calefactis.

Inunctiones quoque convenient ex oleo chamæm. aneth. lilior. irino, nardino, & rutac. quæ partes exteriores relaxando, motum humorum ad eas conciliabunt, ut sic internæ minùs afficiantur, oleum scorpion. *Matthioli* inunctum, est etiam valde efficax.

Unguentum de alch. partes exteriores laxat & materiam morbificam blande discutit; ideo circa initia eo inungi poterit totum crus & tibia usque ad extremum pedem, juxta ignem luculentum. In progressu sequens potentius & calidius admo- veri poterit.

℥. Ol. lumbric. de later. & de terebinth. an. ℥ii. ol. vulpin. ℥i. gummi ammoniac. & sagap. aq. vitæ solutor. an. ℥vi. castor. ℥iii. euphorb. ℥ii. cere q. s. F. unguentum.

Oleum de lateribus solum post sex cucurbitulas parti dolenti, & in ambitu ejus admotas, calidè impositum, postea tegendo linteis valdè calidis: contumacem dolorem ischiadicum uno die curavit.

*Lacuna in Dioscorid.* unguentum sequens tanquam mirabile commendat.

℥. Succor. rad. & fol. ebuli an. ℥i. ol. chamæm. ℥vi. bulliant ad succor. consumptionem, deinde adde ceræ q. s. aceti guttulas aliquot ad penetrationem: fiat unguentum.

Cataplasma ex iberide multum laudatur ab authoribus: in hunc modum componi poterit.

℥. Iberid. M. iv. decoq. in vino, & contund. addendo farin. lupin. orobi & fabar. an. ℥ii: pulv. rutæ sicc. flor. chamæm., & rad. costi an. ℥i. ol. terebinth. ℥ss. ol. lumbric. q. s. F. cataplasma, non parum etiam conducit panis recenter è furno extractus valde calens, per medium sectus, aqua vitæ irroratus & admotus.

Emplastra verò in frequentissimo usu sunt



& hac in re plurimum possunt : in sequentem modum.

℥℥. Picis navalis ℥ii. sulph. subtilissimè triti. ℥iii. mastich. ℥ii. terebinth. ℥ß. M. F. empl.

℥℥. Picis navalis ℥ii. gummi ammoniac. bdell. in aceto dissolut. an. ℥i. sulph. vivi turbith. hermodactyl. an. ℥ß. castor. ℥i. terebinth. parum ceræ q. s. F. empl.

Si malum pertinaciter hæreat, emplastrum vesicatorium applicandum erit, vel solum, vel ut mitius agat, cum aliquo ex prædictis, æquis partibus permixtum: sic enim per longius tempus in parte poterit detineri, toto curationis decursu clysteres frequenter injiciendi sunt, ut materiæ morbificæ portio ad intestina derivetur; tum etiam ad doloris causam proximam discutiendam, sequens aliquando profuit.

℥℥. Vini generosi ℔ß. ol. nucum, & rutac. an. ℥iv. ol. terebinth. ℥ß. M. F. clyster injiciendus quoties dolor urget.

Clyster verò sequens humores à parte affectæ potenter extrahit.

℥℥. Pulpæ colocynth. ℥i. furfur. macr. Mi. vini alb. ℔ß. coq. ad ℔bi. ex colatura f. clyster, qui servetur per horam. *Lazarus Riverius lib. 16. prax. medic. cap. 2.*

In ischiade prodest, si salvia recens in tegulam cavam ignitam posita, sæpeque ne aluratur, agitata, sic semicocta, aceto perfundatur, tegulaque linteis involuta sub ægri coxa ponatur, vaporque inde suscitatus excipiat. *Felix Platerus, tom. 2. prætic cap. 16. pag. 659.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Ischiade.

**C**Oxendicis dolore intolerabili premebatur quidam: vocatus ego, cubiti & tali venam seco, vomitum moveo, foveo relaxantibus unguentis, per alvum clementer expurgo, applico mirabile unguentum ebulorum *Lacuna*, cucurbitulam magnam cum scarificatione super ancham appono, caustica imprimo, nulla profuere: tandem ex *Pauli* consilio, coxæ octo magnas hirudines impono: tanta ab his animalculis secuta est evacuatio, ut post decem horas sine dolore remanserit quod au-

xilium in chiragra, podagra & gonagra sæpe post vacuatum corpus foeliciter sum expertus. *Zacutus Lusitanus, lib. 2. prax. admirand. observ. 168*

Experimentum alicujus matronæ medicatricis non contemnendæ certum sumitur ab urtica, si ea locus affectus in ischiade ad rubedinem usque caditur, & spiritu vini abluitur. *Vvolfgangus Hæferus, lib. 4. Herc. Medic. cap. 1.*

Quæstio est, Utrum vena malleoli posset incidi. Si excitetur dolor ex solo sanguine, tundatur hæc vena; at si pituita, aut aliquo aliorum humorum, omittatur. Idque in omni dolore ischiadico diligenter notabis. Medicamenta erunt vomitoria & purgantia; eaque vel per os dabuntur, vel per alvum injicientur. Ante omnia laudo vomitum, quem excito non levi sed forti pharmaco, quod stibium est: quod quantum præstiterit, dicent æqui judices, peritique Medici, non prælibati asini & inexercitati solum titulo Doctorculi. *Nicolaus Fontanus, Analect. cap. 26.*

### SECTIO UNDECIMA.

#### De Ischuria.

**I**n *Supra* symptoma est, in quo prorsus urina supprimitur: duplex est, una vesica plena, alia eadem vacua existente: hæc posterior multis de causis contigit; vel ob obstructas ab humore viscido & crasso arterias emulgentes, vel rursus renum vitio calculis obessorum, vel denique ob ureteres à calculo pituita, sanguine concreto, vel pure obstructos & adstrictos: impediunt hæc omnia quo minus ad vesicam urina descendat: quæ vesica plena existente contingit ischuria, pro causa agnoscit vel læsam vesicæ facultatem expultricem ob nervi illius partis paralytin, aut obstructionem; vel colli vesicæ à calculo, crasso humore, purulenta colluvie, sanguinis grumo & tuberculo obstructionem.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Ischuria.

℥℥. **A**Q. malv. ℥iv. spirit. terebinth. ℔ß. M. exhibe postea paravi balneum



neum in quo insideret, ex aq. dulei tepida in qua incoxerint parietaria chamæm. parthenium, beton. apium & petrosel. addito oleo communi antequam balneum ingrederetur, dedimus alterum diureticum ex aq. cortic. fabar. ℥iv. cum gt. viii. spir. vitrioli: sequentidie succum raphani exhibui ad ℥iv. quem evomuit: serò verò aquam capill. ven. ad ℥iv. cum gt. vi. ol. camphoræ. *Rodericus à Fonseca, tom. 1. consultatio 87.*

Mirabile est hoc experimentum quo usus est quidam ex ischuria in lecto decumbens adeo vehementi, ut quinque diebus urina suppressa maneret, qui cum nullis remediis curari posset; tandem duas tresve squibalas sim iequini ponderantes ℥ii. cum vino calido rhenano colabat per pannum lineum, quam colaturam una dosi cum frustra multa tentasset remedia, sumebat, & ex incontinenti mingebat: alius etiam eum laboraret ex calculo, & omnimoda urinæ suppressione, idque per plures dies, eandem potionem sumens, statim miraculi instar lotium excrevit, & convaluit: feliciter etiam idem medicamentum tertio cessit. *Petrus Forestus. Schol. observ. 19. lib. 15. De vesicae morbis.*

Pharmacopœus quidam *Parisiensis* ischuria laborans, post multa remedia per quatuor dies frustra usurpata, sequens sibi ipsi composuit, à quo urina provocata est, & liberatus fuit.

℥i. Vini alb. canarini ℥iv. succ. limon. ℥i. spiritus terebinth. ℥ii. pro uno haustu. *Samuel Formius, observ. 42.*

Efficax remedium ad ischuriam expertus sum in tribus ægrotantibus ex cerebro picæ exsiccatæ & cum vino albo propinato, intra horam urinæ fluxus promovetur. *Samuel Formius, observ. 33.*

Devenimus ad pulv. unius cantharid. integræ cum pulv. pellis leporis combustæ: sed res è voto non successit. *Epiphanius Ferdinandus, hist. 97.*

Post mitiorum usum exhiberem gr. ii. cantharidum cum ℥ii. ol. amygd. amar. *Christor. Guarinonius, consult. 238.*

Mercator quidam ab octiduo stagnantem urinam passus, jam morti vicinus, diureticum sumpsit è succo millepedum & succo consyliorum nigrorum, cui granum u-

num cantharid. incoxerat, integro haustu bibitum. *Joh. Halmontius, tract. cui tit. De Luthias.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Ischuria.

**S** Oleo ego accipere cucurbitam in qua diu conservatum fuerit oleum, & eam curo poni in aqua ferventi, ac deinceps virgam pueri jubeo conjici in os cucurbitæ, & hujusmodi remedium efficacissimum esse expertus sum ad provocandam urinam puerorum. *Hier. Mercurialis, lib. 2. De morb. puer. cap. 20.*

Empiricus quidam in retentione urinæ pudenda aliquandiu in aceto calido dependere jubebat, & mictionem mirè promovebat Medicus quidam in eadem nihil efficacius utiliufve prædicabat sua experientia, quam pulmonem hædi. *Hier. Renfnerius, observ. 93.*

Nobili cuidam *Ægyptiæ* fuit: suppresso urinæ profluvio letargus, de funere cogitatur: largissimè, profluit urina, brevi tamen moritur: unde hoc? quia suppressio omnis excrementi serosi potissimum partes nobiles inquinat: & tametsi ejus cursus redierit, non perinde meliore loco sunt res ægrotantium. *Guil. Ballonius, lib. 1. epidem. & ephem. pag. 10.*

Si omnia desperata fuerint urina hirci calide epota, cum toto omento & intestinis ad ventrem applicatis subito urinam retentam propellit, & calculum simul, si ille obstructions facit foras mittit. *Joh. Hartmannus, Pract. Chimiatri. pag. 270.*

Fuit tempore meo Cardinalis quidam, qui jam per quatrimum urinæ difficultatem passus erat, turgidus, & ut dicitur, desperatus, nullis aliis proficientibus remediis. Is de consilio Medici per potum vini alkeengi liberatus est, & soluta est urina in quantitate, ut impleretur quasi concha una. Ex eo solo experimento Medicus ille cum parva scientia & pauper factus est dives. Ita multis Deus dat gratiam magnam, & affert utilitates; & e contrà. Et totum est, quia judicia Dei abyssus magna. *Arnoldus de Villanova, Tractat. de Vinis.*

Experimentum Magistri mei ad provo-



candum urinam, quod statim facit mingere. Bulliant alliorum capita ii. vel iii. munda in vino albo optimo, & parum theriacæ vel Mitridatii cum illo vino misce, & cyathus plenus ipso detur in potu & statim provocabitur urina. Agrimonia decoctio in aq. aspar. vel alterius rei appropriatæ, vel in aqua sola bibita statim facit mieri, & est expertum. *Idem Practic. lib. 2. cap. 19.*

Puer quintum agens annum diu molestissimo urinæ stillicidio detinebatur, accedentibus plurimis calculis in vesica, à quibus sæpe lotium in totum supprimebatur. Post multa & varia tentata remedia, mater, ut mihi narravit, salviæ & gallitricum in vino *Pictaviensi* decoquebat. Poculum vini capiebat, & ad dimidium coquebat, ex quo decocto colato puer bis in die capiebat cyathum unum, mane

& hora quarta pomeridiana: & mox à suppressione urinæ liberatus reddebat arenulas & materiam pituitosam & glutinosam. Neque alio deinceps remedio utebatur, si puer in idem malum recidisset; quo solo à difficultate, & etiam retentione urinæ semper evasit. *Petrus Forestus, lib. 25. obs. 13.*

Pro ischuria succus limonum pondere trium vel 4. unciarum approbatissimum habetur remedium: sua namq; acutie crassas & lentas attenuat & subtiliat materias; qui quoque pro extinguenda gonorrhœa primatum habet, ut, millies experientia compertum habemus. Cautè tamen limonis acidi succus bibatur, cum impotentem hominem reddat, & ad procreandam sobolem inhabilem, ut cuidam ex Principibus *Italia* superioribus annis in bello *Germanico* evenit. *Amatus Lusitanus, curat. 71. cent. 5.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER DECIMUS.

*De Affectibus à littera L incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

*Pro Labiorum pustulis, decorticatione & fissuris.*



Robatur unguentum *Laurentii Lazari* Medici & Chirurgi excellentis, quod omnes scopos perficere potest, & sic se habet.

℥. Lithargyr. arg. plumb. usli, an. ℥i. Myrrh. Aloes, tutiæ præp. an. ℥ii. pingued. vituli ℥i. succ. solani, plantag. vini granat. an. ℥ss. bulliant omnia ad succor. consumptionem: deinde colentur; quibus adde ceræ alb. q. s. ac reliqua omnia in tenuissimum pollinem redacta, atque per pannum transfusa adde, & fiat unguentum in mortario plumbeo reformatum, quo panni linei subtilissimi imbuti parti affectæ applicandi, & bis in die permutandi. *Hier. Capivaccinus, consil. 50. lib. 7. consil. Craterus, & a-*

liorum Medicorum à *Scholtzio* editorum.

Matrona quædam Nobilis à causa externa vento boreali fissuras labiorum, & siccitatem incurrebat: cui consilium dedi ut unguento pomato albo omni vesperi, cum cubitum iret labia inungeret, quo præsidio utens, alio non indigebat.

Quemadmodum & altera mulier sequenti unguento commodè illinivit, quod ex rec. axung. gallinæ, cera alba, aq. rosac. sæpius lotis constabat.

*Ætius* ovi pelliculam internam fissuras labiorum agglutinare tradit. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 14. De Morb. Labiorum, Gingivarum, Dentium, &c.*



## SECTIO SECUNDA.

*Pro Labro exulcerato & cancroso.*

**L**abro ulcerato subscriptum unguentum, & nihil præterea aliud apponat.

℞. Tutia opt. præp. ℥i. succ. solan. plantag. depurat. an. ℥iii. ol. rosac. complet. ℥iv. teratur tutia diligentissimè in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo: postea paulatim addantur succi, & ol. ros. semper magis & magis confricando cum dicto pistillo per totum diem, ultimo addatur modicum ceræ liquefactæ & F. linimentum quo sæpius utpote decies etiam in die labium inungat, atque imponat fol. plantag. *Job. Baptista Montanus, consil. 116.*

Juvenem quendam, qui ex Lue Venerea labia ulcerata, inflata, nigra, tumida, dura, carcinomatis instar, habuit, curavi universalibus ad morbum venereum & hoc decocto, panneo eo imbuto labiis opposito.

℞. Lign. sanct. p. ii. bulliant in pinta una aq. solan. deinde colentur: add. alum. ℥i. rursusque ebulliant semel, & colentur. *Petrus Forestus, observ. 2. lib. 14.*

## SECTIO TERTIA.

*Pro Lacte deperdito.*

**M**atronæ cuidam in primo purperio, cum propter res adversas in summā tristitiam & mærorem incidisset, mammae ita exaruerunt, ut ne guttulam quidem exurgere posset infans: illam ego sequentibus remediis restitui. Primò, ut se exhilararet, admonui; deinde corpus pulvere Senæ *Brassavole* leniter expurgavi. Postea singulis diebus in aurora ad ℥ii. pulv. lumbric. terrestr. præpar. cum decocto augalacti, liquirit. & summit. scænic. rec. propinavi; & mammae ol. lumbric. bis in die inungere jussi: his per aliquot dies adhibitis remediis, & optima observata victus ratione, lac copiosè ad mammae iterum profluxit: eadem methodo multas alias matronas feliciter curavi. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 27. cent. 4.*

Sunt qui nutricibus ad augendam lactis copiam pollinis lapidis galactitis (qui &

*Burnet Parte I.*

lac Lunæ appellatur, & in montibus *Helveticis* reperitur) ℥i. è jure exhibent. Potest autem commodius ex lacte amygd. cui immixtus hic pollen aliquot horis fuerit, colato propinari, cum paucis saccharo, & aqua scænic. Aiunt enim mamillas evidenter hoc auxilio turgere, & repleri lacte. *Anselmus Boetius, lib. 2. De Lapid. & Gemm. c. 229.*

## SECTIO QUARTA.

*Pro Lactis exsiccatione in puerperis quæ proles suas nutrire nolunt.*

**Q**uædam Obstetrices mammae obliunt melle, aliæ lintheum aceto inculcatum, in quo prius ebullierat crocus hortulanus, commodè applicant. Sunt qui prohibent lactis generationem in mamillis cum unguento populeo, aut panno lineo succo menthæ imbuto. Matronæ *Veneta* inhibent lactis proventum à partu emplastro ex melle, croco terebinth. confecto, & mammis imposito atque eo tempore juscula non sumunt, neque vinum album bibunt, neque tenue. Aqua etiam marina prodest foris. Obstetrices *Delphenses* lac exsiccant in puerperis panno lineo oleo raparum intincto, undique mamillis imposito, aliumque pannum lineum melle illinitum primo panno superimponunt, interim sub parte inferiore incipiendo mamillas debite constringunt, ut minùs propendeant. Illud incognata nostra experti sumus. *Petrus Forestus, observ. 20. lib. 17. De Cordis & Mamillarum Affectibus.*

Tale conficiatur Emplastrum.

℞. Ceræ alb. flav. ping. gallin. axung. cervin. an. ℥ss. M. & liquatis adde camph. myrrh. ass. scetid. an. ℥ss. croci ℥i. in eo tingantur linthea mammarum habentia, sed perforata, ut papillæ exeant. Sic gestentur sex septimanis. Aliæ imponunt chartam cæruleam cum butyro recenti, & lintheamina intingunt in alb. ovi cum pauxillo croci, & camphoræ, & exsiccata superponunt chartæ. *Wolfgangus Hæserus, lib. 7. Herc. med. cap 5.*



## SECTIO QUINTA.

*Pro Languentibus in Venere concessa.*

**I**N hoc affectu à Medicis efficacia censentur hæc simplicia cinnam. selectum ac-re comestum semper ante cibum. Galanga item eodem modo assumpta. Zinziber item conditum ante cibum acceptum. Croci etiam frequens usus in cibis utilis est, ut & erucæ. Porrum pariter aqua coctum comestum ex pauco oleo & aceto, aut quocunque modo in cibis usitatum efficax in hac re compertum. Sic pastinac. sem. pulveris. ex vino bibitum utile inventum. Ad hoc etiam valet eryngium, ut & pastinacæ radices tam sylvestres quàm domesticæ, item siferis radices. Inter cæteras herbas Satyrion est, cujus radices superiores, ut crassiores, succulentiores & pinguiore sumi debent, coqui arte, cum melle defecato preparari ut in annum conditæ asservari possint, ex his quotidie aut quotiescunque lubebit, sumenda una aut altera radix; gratæ sunt stomacho, & roborant interna viscera, tollunt obstructions & maxime effœtas partes excitant, corpusque alendo vegetum reddunt.

Licebit in hunc usum cum magno juvamento hoc tragema ex aromatibus conficere, atque eo uti comedendis ovis salis loco.

℥. Cinnam. opt. ℥ii. salis stinci, vel interioris ejus partis conditi, quæ circa renes est ℥ii. galang. piper. long. an. ℥i. borac. ℥i. F. pulvis subtilissimus.

Quod subscribo singulari efficacia sæpe compertum est valere.

℥. Cinnam. inter. ℥. galang. ℥i. cardam. sem. pastinac. erucæ, an. ℥i. croci ℥i. pulveris sentur quælibet per se. M. servantur ut sit usus cum cibis. Ego quandoque consului ætate potissimum, ut in hoc casu assumerent lac dulce cum sacc. & pipere, & profuit, assumunt una vice lactis ℥i. sacc. ℥i. piper. ℥. externè licebit his uti.

℥. Ol. nuc. mosch. aut macis expressum. affund. gt. ii. vel iii. ol. cariophyll. still. ita molefcit ut illini possit. Deindè additur utiliter *Zibbetheri* quantum placet, cum aliquot granis mosc. efficiturque linimentum odorum gratum, in hunc usum efficax, coili-nantur partes infernæ, virga, scrotum,

perinæum & quæ circumvicinæ sunt magna utilitate.

Sine magna impensa quidam adservant fel apri sylvestris eo si quando illinunt virilia magnam delectationem & efficaciam in congressu experiri se fatentur, diligenter admittendum ne extrema frigescant, aut madeant, potissimum pedes. *Reinerus Solenander.*, consil. 17. sect. 4.

Uxorem duxerat quidam, cum qua rem minimè habere poterat, pulverem sequentem præscripsi.

℥. Sem. eruc. ℥. piper. ℥i. zinzib. cinnam. an. ℥. borac. ℥i. caudar. scinci ℥. cantharid. ablatis alis numero 6. F. pulvis subtiliss. addendo sacch. ℥i. capiat ℥i. cum lacte cubitum iturus.

Hoc unguento utatur.

℥. Rad. pyrethr. piper. zinzib. sem. sinap. an. ℥i. euphorb. ℥. ol. laurin. ℥ii. ol. de spica ℥i. ceræ parum F. unguentum, inungat regionem inter anum & testes, laudabat successum. *Felix Platerus*, observ. lib. 1. pag. 257.

Alteri efficacissimum hoc & extremum exhibui remedium.

℥. Sem. eruc. ℥i. sem. sinap. nasturt. rad. pyrethr. cinnam. zinzib. piper. an. ℥. croci ℥. borac. ℥ii. scincor. præp. ℥. mosch. gr. iv. F. pulvis subtiliss. capiat. ℥. si reliqua non juvent. *Idem.* observ. lib. 1. pag. 256.

## SECTIO SEXTA.

*De usu Laudani Opiati.*

**A**D Generosum Comitem & Dominum *D. Philippum* Comitem à *Sleichen* in *Ochrdorf* vocatus, dum de praxi mea sollicitè perquireret, sciscitatur num laudanium *Paracelsi* mihi in usu esse (erat enim excellens chymicus) annuo ego, & recte quidem inquit ille, perge modo & mirabilia experieris: ego enim nuper habui quendam nobilem aulicum decrepitum ferè: ille ultra anni spatium lecto affixus tantos cruciatus nephriticos & calculosos cum perpetuo urinæ ardore & difficultate perpessus est, ut omnes medici & alii ipsam tanquam deploratum planè dereliquerent. Ego misericordia commotus, in-



inquit *D. Comes*, extremis morbis extrema etiam medicamenta applicanda duxi, jubeo itaque ipsi singulis diebus initio, postea verò, morbo quodammodo mitescente, alternis, hora somni exhiberi granulum saltem laudani opiatum veri, & quidem cum aquis & syrup. appropriatis diureticis & lenientibus, quo facto non solum magna arenularum copia quotidie per urinam excreta & dolores ardentes mitiores redditi sunt; sed etiam totum corpus in dies vegetius apparuit, omnesque vires collectæ, ita ut post mensis spatium ad pristinam valetudinem totus redierit, pluresque annos postea sine omni morbo quietè ac placidè supervixerit. *Gregorius Horstius, obs. 3. lib. 10. De Pharmaceuticis.*

In colicis doloribus vehementissimis, evacuatione per clysterem præmissa, nihil usu laudani præsentius, pro hæmorrhagia etiam narium contumaci præsentissimum est remedium, eadem ratione menstruis superfluis omne reliquum medicamentorum genus eludentibus dextrè per correctum opium succurritur, quod ante sexennium amantissima mea conjux experiebatur, quæ mortis ferè faucibus hoc modo per Dei gratiam eripiebatur, fervore sanguinis ad temperiem usu laudani redacta, quæ tormenta non tantum, sed etiam dejectiones excedentes sanguinis, nonnunquam etiam laudabilis, dysenterix generent notum est: quibus plures naturæ debitum solverent, nisi per opiatorum usum eisdem succurreretur, quod superiori anno nobilis scæmina confirmavit, quæ judicio astantium ad extrema redacta, per gr. iii. vel iv. laudani nostri sic resecta fuit, ut brevi post pristinae sanitati restitueretur, in articulo doloribus vehementissimis totius massæ sanguinæ fermentatione quasi concurrente, nec non affluxu ferventissimo partem affectam affligente, quid melius quam ebullitionem istam transire sistere, somnum amicum introducere, & caloris nativi vim adjuvare, qui alias vigiliis continuis & doloribus dissipatus extrema minatur: at hoc præstat usus laudani; cujus ratione podagricum confirmatum ita resectum memini, ut postea somno juvante, dolores brevi remiserint, & rarius redierint, in phreneticis etiam

& melancholicis ad maniam tendentibus nihil utilius laudano, ut multa quæ poteram producere exempla ostenderunt. *Gregor. Horstius, epist. 2. ad obser. 3. lib. 10.*

## SECTIO SEPTIMA.

### De Lentigine.

**L**entigo (*Cracè* *φκός* à *φκῆ* lens) macula est in facie potissimum: in manibus & brachiis, nonnunquam itis, & in pectore emergens, lentis magnitudine, colore fusco, crebris quasi guttis dispersa: his familiaris qui rufi sunt pilo, sine omni dolore est ac molestia, hieme aliquando deletur, & æstate revirescit: aliquando continuo remanet, oritur ex adusto sanguine in cutem effuso.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Lentigine.

**C**onsului ut aqua è cochleis destillata uteretur; illa enim mirum in modum lentigines delet: quemadmodum panis è forno calidè extractus calatho vimineo contextus olla supposita, si inde rore defluente lentigines liniantur, mirabile enim est, vel solo oleo tartari liniat. *Petrus Forestus, observ. 4. lib. 5. Observ. Chirurg.*

Abluatur, facies aqua flor. sambuci & fabar. cui aliquid camphoræ in spir. vini dissolut. additum sit, efficacissima est aqua scrophulariæ destillata, laudatur etiam oleum ovorum. Vel,

℥. Flor. fabar. rec. q. v. affund. lactis capr. q. s. stent in infus. per diem & noctem. Postea colentur & exprimantur, atque in in colaturam novi flores injiciantur, iterum que per diem & noctem in infusione stent, & colentur, id quinquies repete. Postea adde medull. panis rec. q. s. ut F. instar pulvis & lacte caprino addito destill. aqua ista facies mane & vespere abluatur. *Daniel Sennerthus, practic. lib. 5. part. 3. sect. 1. cap. 3.*



## SECTIO OCTAVA.

## De Lepra Arabum &amp; Græcorum.

**L**epra alia est *Græcorum*, alia *Arabum*. Lepra *Græcorum* nihil aliud est quam scabies crassa quæ cutem altius in orbem disquammatur, à scabie solum differt affectus magnitudine, in psora seu scabie furfures tantum, in lepra hac etiam squammulae decidunt, modò pallidæ modo nigræ, oritur à pituita falsa & bile adusta. Vix cedit remediis; & nisi maturè obviam eatur in lepram *Arabum* seu elephantiasin *Græcorum* degenerare potest: quæ non incommode ita definitur, est cachexia fœda, admodum contagiosa, cancrum totius corporis habitum exadustis atrabilaris humoribus iisque malignis inducens & generans, vel tumor totius corporis cancrum, ex atrabile venenata qualitate infecta, & in totum habitum corporis effusa, exortus, multa symptomata inferens. Interdum est hæreditaria ab impuro parentum vel avorum semine communicata; interdum contagio contrahitur, quandoque etiam spontè proprioque vitio producitur, cum possibile sit ut in corpore humano qualitas venenata generetur, incipientis hujus lepræ signa sunt segnities, difficilis respiratio, alvi suppressio, lotium subjugale, fœtor respirationis sudoris, totiusque corporis eructatio molesta, veneris appetitus inexplibilis, raucedo vocis, mores melancholici, somnia turbulenta & incubus, ubi confirmatum est malum signa alia adsunt, quæ partim univoca sunt, partim æquivoca: univoca sunt, extuberationes in plerisque corporis partibus, sed in facie magis, præsertim secundum frontem, unde aures acuminatæ fiunt, nasus simus, labra crassa, & per consequens facies horrida, satyris depictis simillima, oculorum rotunditas, & color faciei ex rubro livens: signa æquivoca sunt, extremorum & crurum potissimum extuberationes, fœdus cutis color morphæ similis, capillorum defluvi-um, musculorum præcipuè pollicis consumptio, stupor abolitusque sensus tactus in externis partibus, scabies, impetigines, gutta rosacea, extuberationes rotundæ & duræ sub lingua, palpebris, auribus, pun-

cturæ acuum, seu ulcerosa lassitudo sub cute, cutis crispa instar implumis anseris, cutis unctiosa, sanguis thrombosus, niger, livescens, ex his omnibus notis, vel multis simul concurrentibus, vel paucis, sed essentialibus & pathognomonicis explorantur elephantiaci. Incipiens lepra *Arabum* curabilis est licet maxima cum difficultate; confirmata verò & inveterata curationem planè respuit, vocatur elephantiasis, quod cutis ea laborantium tumida, scabra, rugosa, tuberosa, & inæqualis, ut elephantum, reddatur.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Lepra Arabum seu Elephantiasin Græcorum incipiente.

24. **R** Ad acetos. lapat. acut. enul. camp. polipod. q. sem. cartham. passul. mundatar. an. ʒss. endiv. cichor. plantag. bugloss. borrag. lupul. fumar. cuscut. ceterach. chamædr. chamæpit. an. M. i. flor. viol. p. ii. F. decoctio ad ʒxvi. in colat. infund. per noctem epithym. ʒss. fol. sen. mund. ʒv. agar. alb. ʒii. zinzib. ʒii. mane bulliant parum & F. expressio, in qua dissolve succor. depurator. fumar. & plantag. an. ʒiv. sacch. alb. lbss. F. syrupus perfectè coctus, dosis ʒii. vel ʒiiss. cum sero lactis, quinto aut sexto quoque die.

24. Conserv. bugl. borrag. an. ʒii. ras. ebor. &c. cervi an. ʒii. mithridat. veteris ʒii. M. pro duabus dosibus post purgationem horis tribus ante cibum.

Post tertiam aut quartam purgationem vena interior brachii sinistri secetur, detrahaturque sanguis ad ʒx. deinde si qua ratione fieri potest, referentur hæmorrhoides: primum quidem fotibus emollientibus, deinde suppositoriis ex hiera simplici cum succo mercuriali, vel cum felle: aut si foris conspicuæ sint, & intumescant, affixis hirudinibus, ut ita sanguis ater & melancholicus emanet, cum sic corpus diligenter præparatum evacuatumque fuerit, perutilis erit balneorum usus ex aq. dulci, usque ad multos dies continuatus, mane jejuno stomacho; sed ea ratione, ut non admodum calidæ sint, verum duntaxat tepidæ, ut corpus tantum humectetur,

non



ctetur, non autem sudores elicient. Victus observandus refrigerans & humectans: cremor hordei maximè conducit, juscula parentur è pullis gallinaceis, carne vitulina aut vercina cum bugl. borag. oxalide, lactuca & plantagine, si quæ partes in cute existunt nigrantes aut lividæ, nullo vel obtuso sensu præditæ, his affigantur cucurbitulæ exiguæ cum scarificatu, eoque satis alto, ut sanguis promanet, sensusque revocetur. *Joh. Fernelius, consil. 70.*

Cuidam ad elephantiasin vergenti ita consultum est, jussis est in totum abstinere vino, aut eo dilutissimo uti, vescatur carnibus elixis, & pullis nutritis pasta ex carne columborum facta, Theriaca bis aut tern septimana utatur ad ℥i. cum aqua melissæ, bis mense catholico cum ℥iii. Confect. hamech. purgetur aperiatur vena basilica sinistra, balneis aq. dulcis utatur. *Guil. Ballonius, consil. 61. lib. 1.*

Premisso lenitivo aperiatur vena brachii sinistri, & extrahantur sanguinis circiter ℥x. plus minus, tota etiam hac æstate velim singulis mensibus circa novilunium hirudines applicari venis sedalibus, ut inde duæ aut tres sanguinem exugant, quod sponte sua cadant, etenim ferè ex alio nullo remedio majus juvamentum sperare debet: quare ei Author sum, ne ullo modo hoc remedium post primam purgationem intermittatur, sed hac æstate & sequenti autumno etiam singulis ut dictum est mensibus reiteretur. Postquam octo diebus ex ordine usa fuerit præparante & digestivo, assumat hoc pharmacum.

℥℥. Confect. hamech. ℥. m. el. è suc. o. ros. ℥i. m. fol. sen. ℥i. polipod. q. ℥ii. F. infusio in decocto liquir. flor. & fruct. cordial. cum paucis cinnam. q. s. syrup. ros. solut. ℥i. E. potio quæ sæpius prout opus fuerit reiteretur, purgato corpore; volo utatur singulis diebus manè hoc electuario ad quantitatem nucis juglandis.

℥℥. Conserv. flor. borrag. ros. an. ℥i. m. diar. rhod. abbat. theriac. opt. ℥i. cum syrup. de pomis q. s. F. electuar. quo assumpto ingrediatur balneum aqu. dulcis egelidæ in quo incoxerint rad. acetos. vel lapath. maj. fumaria, lupini contusi fur-

furibus mixti, & in panno lineo ligati quo in balneo sordes abstergi velim in balneo moretur per horæ spatium, post decumbat, post horam unam aut alteram, absterfo sudore; crura & cæteras partes infectas inungat hoc linimento.

℥℥. Succ. solani succ. scabios. acet. rosac. an. ℥i. succ. rad. lapath. succ. rad. enul. an. ℥vi. ol. ros. ℥iv. cortic. helleb. nigr. in petia ligat. ℥iii. coq. omnia ad succorum ferè consumptionem, deinde helleborus abjiciatur, adde butyr. rec. ℥i. pingued. viper si haberi possunt, si non loco ejus theriac. bonæ ℥i. plumb. ust. ℥ß. Lithargyr. ceruss. an. ℥ii. Thur. ℥i. styrac. calam. sal. nitri. an. ℥ii. omnia M. & cum succo limonum agitentur tamdiu in mortario plumbeo donec formam linimenti acceperint. Post balneum absolutum, placeret hoc remedium, quod apud quosdam pro experto secreto in hoc morbo conservatur, accipiunt milvum deplumatum, postea abscisso capite, pedibus, atque eo eviscerato, interiora omnia, caput & pedes in ollam rudem conjiciunt, quam testam luto oblinunt, & in furnum calidum imponunt. Ubi omnia combusta sunt, extrahunt, quodque in ea inveniunt, pulverant, atque ex eo pulvere manè in aliquo liquore propinant, quod verò reliquum est avis, partiuntur in tres partes, & quomodocunque coctum, edendum præbent ægroto, eo ordine, ut tertia die postremam partem avis absumat, quo remedio testantur quidam hunc morbum alias novem dierum spatio perfanatum esse. A me verò alias in Italia hoc sequenti experimento curatus est hic affectus. Accipio duas vel tres vipersas, si haberi nequeunt, totidem alios serpentes, conscindo vivos & adjecto multo hordeo decoquo in aqua quoad hordeum tumeat aut crepet, hordeo eo & ipsa serpentum carne pullos gallinaceos multos continuo alo, nec aliud alimentum suppedito; solent pulli postquam aliquot dies enutriti sunt, implumes evadere, & tandem rursus plumis vestiti: ubi igitur per multos dies ita aliti sunt, paulatim incipio ægrum horum carne, & carniū eorum iusculis alere, hoc remedium comprobatum est experientia. *Reinerus Solenander consil. 25. section. 1.*



## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Lepra Arabum.

**V**alefcus de *Taranta* castrationem in hoc casu valde probat, nec ego eam improbandam cenfeo; testium enim amputatione evirantur homines in morbum proni, sicque in femineam naturam degenerant, & hepatis sanguinem assantis ardore restincto, humidi & frigidi evadunt: quæ temperies elephantiorum intemperiei calidæ & siccæ toto est genere contraria, adde quod sublata elephantiorum gignendi facultate, tollitur ea hujus mali contagio quæ per proles propagationem in humanum genus serpit & effunditur. *Paræus, lib. 20. Chirurgia, 15.*

Elephas, lues venerea & struma aliquid habent cognatum & συγγενές, tres has hydras unus alexicacos *Hercules* hydragyrosis vincit & opprimit. *Guil. Ballonius lib. 1. epid. & ephem. pag. 15.*

Lac asininum arcet elephantiasin, caro asinina prurit & advocat, unde hoc: an quia carnes crassum succum generant; lac autem serosum & tenue: hoc autem videtur absurdum. Nam *Hippocr. lib. 2. De Dieta*, ita descripsit: quorum animalium lac tenue est, sanguinis & similiter, eorum etiam carnes sunt consimiles. *Idem lib. 2. epid. pag. 186.*

*Neapoli* cum subsisterem narravit mihi *Marius Schipanus* summus ibidem Medicus, Principem *Neapolitanum Caraffam* pro curanda lepra vesci solitum carne asini pulli. *Thomas Bartholinus, histor. 33. cent. 6.*

Accommodatissimum remedium erit lactis potus, asinini imprimis, velut magis detergentis, & tenuioris substantiæ, quotidie manè ad ℥ij. cum sacch. & cremore tartari, quo dejectorium fiat. *Benedictus Sylvaticus, consil. 100. cent. 4.*

Multi, ut ait *Ætius*, castratione se ab hoc morbo vindicarunt, hac ratione juvenem hoc anno liberavimus, qui incipiebat, & ultra principium fuerat progressus utatur carne erinacei terrestris, exsiccata in forno, hoc non elephantiasin tantum, sed & cachecticis, nephriticis, convulsionibus obnoxiiis, & iis qui aqua inter

cutelaborant, convenit, ut testatur *Galenus*. Potest in locum carnis viperarum substitui, fervetur igitur caro erinacei terrestris, quæ si multa haberi potest, ad formam placentæ reducatur, comedat manè ante alia omnia, vel si velit, elixet cum salvia & borrag. & de ea comedat. *Guil. Rondeletius consil. 53. lib. 7. consil. cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Tanquam certum remedium ulmi usus in curanda recenti elephantiasin à *Iacobo Dayvino*, lib. 1. cap. 7. prædicatur. Vidit enim adolescentem tali affectu laborantem, & decoctionis ulmi usu (factis faciendis) convalescere, ea quidem pro omni potu utebatur in quolibet pastu, cum paucis vin. albo, & tanti sudores movebantur graveolentes, ut vix illos custodes ferre possent, ita viscera purgabantur & magna urinæ copia excernebatur, quibus excretionibus sanus factus est. *Iul. Casar Baricellus, in hortulo genitali Pag. 306.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Lepra Græcorum.

**P**ræmissis universalibus remediis hoc unguento liniantur, quo & altera puella à nobis curata fuit, quæ pro elephantica habebatur.

℥i. Lithargyr. aur. & argenti macer. per noctem in aceto acerrimo, an. ℥i. sulph. vivi ℥ss. hellebor nigr. ℥j. salis nitri ℥ij. succ. limon. ℥j. butyr. rec. axung. porcine an. ℥ss. ol. rosac. q. s. cum modico ceræ F. unguentum. *Petrus Forestus, observ. 9. lib. 4. Observ. Chirurg.*

Cuiquam nobili viro lepre implicito, multa remedia frustra adhibui, secui venam, præparavi, purgavi, tandem helleboro albo usus, topica præclara admovei, theriaca pugnavi, omnia frustra, tandem usu cucumerum evasit, his conditis etiam utebatur toto anno. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 20. sect. 3.*

Curationem quod attinet, cum lepra hæc summa sit scabies, eadem etiam, quæ scabies, medicamenta postulat; fortiora saltem. Imprimis hic utile est sudores provocare decocto farse aut guajaci. *Daniel Sennertus, pract. lib. 5. part. 1. cap. 28.*

Fran-



*Franciscus Gadius* templi collegio præpositus jam biennio & atra bile morbo & *Gracorum* lepra detinebatur: nec ullis auxiliis, quamquam à clarissimis viris curatus, levare, nedum sanari potuerat: adeoque cum morbum molestè ferebat, ut dicere solet, malle se mori, quam tam graviter affligi: hortabaturque me, ut etiam periculosa tentarem remedia, quandoquidem secuta nihil profecissent, verùm felicius fui ego, quam illi expediret, namque ptisanæ usu assiduo, & carniū testudinū, levissimis alioquin medicamentis, salis interdicta consuetudine, cum sex mensium spatio, ita utraque affectione curavi, ut nunquam postea redierint, sed ut dixi, expediebat illi ut potius *Themison* aliquis fuisset, quam *Hippocrates*, septimo enim post aut ad summum octavo anno, qui rex vocabatur apud suos, ab eisdem captus, misera multa primū passus, & sub terram vivus defossus, ut crimina fateretur tandem in vinculis in excelso atque edito loco animam reddidit. *Hier. Cardanus*, cur. 1. lib. De curat. admirandis.

In hoc morbo nihil melius est ptisana hordeacea; quæ sic fit, hordeum infundatur in aqua multa duodecim horis coquatur, donec disrumpatur, tundatur, cribretur, coquatur cum jure pulli vel testudinis, donec non amplius ampullas emit, quod post tertiam hor. vix contingere solet: id autem in vase terreo, testudines etiam in aq. diu coquantur cum modico acetii albi, croco, & borrag. Et perseveret in hujusmodi cibo per sex menses.

Purgato præparatoque corpore, misceatque sanguine, bibat per annum ter, quater; sexies in mense hanc aquam.

℥. Sang. porci rec. ℔iv. plantag. ℔bi. ranar. sine capite & cute ℔bi. cancror. chelas & caudas ad ℔bi. rad. & fol. lapath. acuti ℔bi. destillentur omnia s. a. & de hac aqua capiat ℥iv. singulo manè, & sudet, si potest, nam calide bibenda est. Ex privatis auxiliis est hoc.

℥. Viperas veras & abscissis capite, & cauda ad tres digitos, coq. in pauca aqua, deinde contund. & cum fursure, & farina pinsentur, gallinisque tribus, aut quatuor edendæ præbeantur: cumque id factum fuerit per quindecim aut viginti dies oc-

cisæ gallinæ, exenteratæ, atque deplumatæ, coquantur juxta morem: & jus illud bibat, & carnes edat, & postmodum quiescat in lecto, donec exciderint crustæ. *Hier. Cardanus* consil. 3. lib. 4. meth. med.

## SECTIO NONA.

### De Lethargo.

**L**ethargus (ἐπὶ τῆς λῆθης, καὶ ἀργῆς, i. e. oblivione, & inertia) sopor est præter naturam continuus, inexpugnabilem dormiendi necessitatem, cum omnium rerum oblivione, imaginatione, & ratiocinatione læsa, inducens; comitante etiam lenta febre continua: vel est delirium intermissionis expers, cum febres, sopore, & cerebri oblivione conjunctum. Ejus causam adscribunt antiqui omnes pituitæ lentæ, & viscidæ in cerebri substantia redundanti, & putrescenti unde vapores ad cor continuo delati non impensè calidi lentam illam febrem excitant: sed cum vix fieri possit, ut tota pituita putrescat, pars quæ non computruit, sua frigiditate saporem inducit. Alii volunt hunc affectum à vapore narcotico oriri, febrisque pituitosæ symptomata esse, & non primarium affectum: aliquando à pituitoso sanguine inflammationem faciente producitur. Signa Lethargi seu Veterni hæc sunt; lenta febre torquetur æger, in somnum perpetuò labitur, ignavus est & obliviosus, ad stentoream acclamationem oculos quidem aperit, sed statim iterum claudit, cerebro oscitat, & ore hiantem persistit, velut os claudere oblitus, urinam reddit jumentorum lotio similem, ad mejendum à natura stimulatus matulam expetit, sed manu tenens mejere quandoque obliviscitur. Lethalis ut plurimum est morbus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Lethargo

**J**uvenis quidam viginti quatuor annorum valde pituitosus, cum uno atque altero die capitis gravitate laborasset, adeò fuit somniculosus, ac in somnum propensus, ut quæcunque agens dormire semper



per cuperet: ac assidue in somnum dilaberetur, tandem accedente febre in Lethargum incidit. Cum ad eum intrassem, illico hunc clysterem injiciendum curavi.

℥. Fol. baruc. ursin. alch. an. M. i. fol. betæ malv. mercurial. parietar. flor. chamam. an. M. β. furfur. p. β. F. decoctio in colat. lbi. dissolv. cass. ℥β. diaphan. ℥iii. mell. ros. colat. ℥i. ol. chamam. ℥iii. sal. ℥iβ. M. F. clyster at minimè admittens, glande acuta ex pulv. hier. picr. & troch. alhand. adjecto melle & sale, alvum mox deposuit. Postea juvene satis robusto existente, eodem die, cum adhuc in principio morbi essemus, venacephalica cubiti dextri secta fuit ad ℥vi. qua detractione febris plurimum fuit diminuta. Deinde usi sumus hoc oxorrhodino leviter repellente & nonnihil discutiente.

℥. Aq. chamam. ℥iii. aq. ros. ole. ros. an. ℥i. ol. chamam. ℥i. acet. opt. ℥β. M. fronti tepide adhibui, interim ad ea remedia me contuli, quæ agrum è somno excitarent, ut sunt asperæ frictiones vincula injecta, tractio pilorum pectinis atque barbæ, & castorei odoratus. Post quartum diem pro purgatione dedimus pilul. ex hier. & cochias, cum magis excitatus esset. Tertio die adhibitis cucurbitulis natibus & humeris ad diversionem, ad topica magis discutientia devenimus hoc modo.

℥. Ol. lil. unguent. alabastr. an. ℥iii. cui etiam tandem adjecimus ol. castor. ℥ii. M. per osexhibuimus theriac. ℥i. cum ℥iβ. conserv. bugl. sex horis ante pastum, quæ medicamenta cum juvarent, ab aliis fortioribus abstinuimus; quale est castoreum, quod auctoritate Mesues datur à gr. iiii. ad iv. ex oxymel. Ego sanè (inquit Trallian.) novi multos eo morbo victos, hoc solo remedio mortem evasisse: per se exhibitum proficit, adhuc autem magis cum oxymel. Sed his quibus usi sumus remediis, æger noster post septimum diem sanitati restitutus est. *Petrus Forestus, observ. 9. lib. 10. De Cerebri Morbis.*

Vir quidam crassus desidem agens vitam, crapulæ & inexplibili ingluviei deditus, cum hieme sese multo implevisset, in Lethargum gravissimum incidit. Vocatus ego, sanguinem ex cephalica mediocriter detrahère jussi, deinde clyster injectus, &

ea exhibita quæ excitarent: neque ullo modo sinebam eum dormire, semper in officio sedulus, ut ita hominem morti destinatum ex tenebris in lucem renovarem. Strepitus & inclamationes admisimus. Imò aliqui scropham in cubiculum deferunt; pedibusq; ligatis in altum levatis ad lectum ægr. ugant, ut hoc garritu excitetur, vel tympanis sonantibus, aut ferræ stridore. Cum iam à somno utcunque excitatus esset, purgavimus eum infuso senæ & agar. & frontem capillis crematis adjecto aceti exiguo illinivimus, quod & huic malo antipharmacum est ab hoc sopore cum aliquando evigilasset *Diogenes*, medicusque rogaret, quid ageretur rectè (inquit) nam frater fratrem amplectitur, ipsum affectum mortis germanum innuens. *Petrus Forestus, observ. 10. lib. 10.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Letargo.

**M**ulier quædam honesto loco nata, cum aliquot diebus capitis gravitate laborasset adeo fuit somniculosa ac in somnum propensa, ut quæcumque agens dormire semper cuperet, ac assidue in somnum dilaberetur, à quo initio excitari potuit, tandem verò accedente febre non potuit. Remediorum usum hæc neglexerat, nec Medicum accersiri admittere voluerat: itaque non prius vocatus, quàm omni sensu destituta, in gravissimum soporem delapsa esset. Detractus illi mox sanguis fuit e vena dextri pedis, enemata injecta cucurbitulæ natibus & humeris admotæ, topica multa alia adhibita: verùm his non proficientibus tandem mors supervenit: capitis huius cranii osse sublato, abscessus in anteriore cerebri parte repertus, & pus interiori cranii ossis parti adhærescens, quod & e naribus paulò ante mortem paofluerat. *Rembertus Dodonæus, cap. 7. obs. suarum.*

Si Lethargicis febris superveniat, Letargus solvitur: quod si sponte febris non accedat, licebit eam arte facere, inungendo pulsibus oleum è charabæis factum ad modum olei Scorpionum: sicut enim certo experimento febris excitatur ephæmeram æmulans, & altero statim die disparsens: licebit



cebit tentare secundum *aph. 57. lib. 4. VVolfgangus Hæferus, lib. 1. Herc. med. cap. 6.*

Magister meus iussit suspendi ad caput lecti cuiusdam Lethargici suam unam per pedem, qui audiens continuum clamorem suis vociferanti sin tantum terrebat, quod dormire non poterat. Cuidam alteri fecit caput abradi, & cum melle inungi; quo facto muscæ cœperunt eum in tantum infestare quod dormire non poterat; percutiendo semper muscas, & sic curatus est.

24. Pulv. castor. capill. hominis combust. salv. sabin. an. terantur & temperentur cum succo apii & tepidum occipitio applicabis. Aliud.

24. Ficus siccas, coq. in aceto, si corpus fuerit pingue, in aqua verò si macilentum. Cum decoctæ fuerint, terantur, & cum sem. sinap. F. sinapismus, qui occipitio, raso tepide applicetur. *Arnoldus de Villanova, Practic. lib. 4. cap. 11.*

In Lethargo nihil præsentius spiritu citri ritè præparato, cujus beneficio filium meum morti ~~ovæ~~ creptum memini, qui Lethargo penitus oppressus hoc unico remedio præ cæteris excitabatur. *Gregorius Horstius, observ. 3. lib. 10.*

Super laminam ferream candentem affunde acetum forte cum sem. nigellæ, rutæ, & castoreo coctum, ut nares patientis feriat: sic eum excitabis. *VVolfgangus Hæferus Herc. med. lib. 1. c. 6.*

## SECTIO DECIMA.

### *Pro Lichene seu Impetigine in palmis manuum.*

**J**Uvencula quædam octodecim annorum cum Lichenem in palmis manuum & citra interstitia digitorum admodum fecundam haberet, nec ullis remediis curari posset, tandem universalibus, factis evacuationibus, hoc nostro unguento eam curavi.

24. Lethargyr aur. & argent. per noctem in aceto acerrimo infus. & macerat. an. 3ß. sulph. vivi 3i. pulv. helleb. nigr. 3i. succ. limon. 3i. axung. porc. & butyr. loti in aq. ros. an. 3ß. eræ modicum. F. unguentum molle, S. A. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 5. Obser. Chirurg.*

## SECTIO UNDECIMA.

### *De Lienis Affectibus.*

**L**ien qui velut promptuarium quoddam est pro recipienda terrestri & limosa parte, sanguinis, ut ulterius cocta & exalata, in fermentum habeat effervescentiæ gratia sanguini denuò remandandum, quamplurimis infestatur morbis, quales sunt, obstructio, tumor distendens, scirrhus, dolor, inflammatio vulnus, ulcus, &c. obstructione frequenter laborat, idq; ob eas omninò causas, quas in hepatis obstructione proposuimus. Dignoscitur gravitate & renitentia in sinistro hypochondrio, cum dolore quandoque præsertim à longa ambulatione & cursu, faciei etiam color lividus percipitur, & reliqua melancholiæ dominantis indicia apparent.

Scirrhus Lienis est tumor ejus durus ab humore crasso indurato ortum habens: eandem habet cum hepatis scirrhu causam, utriusque eadem prorsus est diagnosi, nisi quod in lienis scirrhu durities & renitentia in sinistro percipiuntur hypochondrio.

Dolor interdum lienem affligit, citra febrem & duritiem, isque à flatu exoritur, qui non solum lienis substantiam, quæ ferè insensibilis est. Sed etiam membranam ipsum vestientem distendit. Distinguitur à colico dolore; quod gravis sit, & in uno loco fixus.

Inflammatio lienis ejusdem est naturæ cum hepatis inflammatione, in eo tantum differt, quod rarius fit à sanguine puro, frequentius à sanguine crasso & melancholico: easdem etiam habet causas, tam conjunctas quàm antecedentes. Signa ejus tumor & dolor in sinistro hypochondrio, ad diaphragma & sinistram humerum protensus, gravitas etiam & pulsatio in eodem hypochondrio, febris assidua, cibi fastidium, sitis, lentor nigricans linguæ adhærens, molestus dexter decubitus, propter visceris gravitatem ventriculo incubantis; interdum etiam sinister, si tumor ingens fuerit, tumor interdum lienis figuram retinet, interdum totum sinistram hypochondrium implet; interdum etiam infra umbilicum apparet, multiplicata



materia, & inflammatione vicinas partes præcipuè umbilicum occupante.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Lienis dolore, duritie, & inflammatione.*

**D**etur primò vomitus cum vino emeti. co. Deinde exhibe hoc electuarium spleneticum.

℞. Ras. chalyb. præp. ℥i. scolopender ℥i. spic. nard. lap. lazul. an. ℥ii. cinnam. ℥ß. cum melle cocto despumato. F. elect. cujus sumat cochl. i. mane tribus horis antecibum: & vesperti alterum cochl. duabus horis ante cœnam. *Rodericus à Fonseca. tom. 2. consult. 75.*

Multis & variis tentatis remediis æger tandem hoc unguento sanus factus est.

℞. Ol. communis ℔iij. medul. cruris bovis ℔i. butyr. rec. ℔ii. succ. bryon. succ. cyclam. an. ℔i. bulliant ad lentum ignem usque ferrè ad succi consumptionem, colat adde pulv. ceterach. cort. cappar. tamarisc. sem. agn. cast. an. ℥iii. M. F. unguentum. Est hoc unguentum mirabile quo omnes doctissimi Medici *Ferrarienses* usi sunt, inter quos numerare est *Savonarolam*, *Ugonem de Senis*, *Leoniceum*, *Bonaciolam*, *Mannardum*, *Brassavolam*, & omnes hodie ibi artem Medicam exercentes, cum quibus nos per septennium ibidem agentes, eo quoque sæpè usi sumus, & magnum ex ejus usu observavimus juvamentum *Amatus Lusitanus*, cent. i. curat. 86.

Curatur dolor lienis clysteribus carminantibus, purgatione convenienti, fomentisque emollientibus ac discutientibus, aceto adjecto: tum etiam linimentis compositis ex oilil. chamæm. cappar. absinth. cum modico spicæ & aceti.

Si post horum remediorum usum dolor persistat, cucurbitula sinistro hypocondrio erit admovenda, modo nulla inflammationis: aut fluxionis suspicio fuerit. *Lazarus Riverius*, prax. med. lib. 2. cap. 2.

Inflammationis lienis curatio eadem instituenda est, quæ in hepatis inflammatione fuit proposita. Si sequentes tantum adhibeantur differentia. Primo, quod venalectio, liene inflammato, in brachio

sinistro celebranda est, sed non ita frequenter, ut in hepatis inflammatione, quod verò de apertione salvatellæ ab auctoribus circumfertur, quam lienem peculiariter exonerare ajunt, superstitiosum est & jam ferè in usu practico obsolevit. Utilius multò è basilica vena ad omnes implendas indicationes, sanguis detrahitur. Secundo, quod topica, quæ inflammatione hepatis hypocondrio dextro admovebantur, hic sinistro applicentur. Tertiò, quod in dictorum topicorum usu, astringentia non sint tanta cura, & tam diu continuanda: quia cum lien sit pars minus princeps, illius robori tanto perè studendum non est. *Lazarus Riverius*, prax. med. lib. 12. cap. 1.

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Lienis obstructione.*

**M**ulier quædam obstructione Lienis cum levi tumore non admodum duro laborans, sequentibus medicamentis utens egregiè habuit.

℞. Endiv. cichor. cum rad. ceterach. cap. ven. cuscut. scolopender. an. M. i. summit. lupul. M. ß. cort. rad. cappar. tamarisc. an. ℥ß. sem. agn. cast ℥ii. sem. anis. carvi, an. ℥i. fol. sen. ℥iß. epithym. ℥iii. uvar. exacinat ℥i. F. omnium dec. pro ℔i. adde ℥iii. aceti in decoctione, in colat dissolv. oxymel. simpl. syrup. de quinque rad. & de scolopender. an. ℥i. M. F. Julepus. Deinde secta est vena lienaris in manu sinistra, quod egregiè profuit. Postea denuò purgata est, pilulæ iii. ex ℥i. Ammoniac. aceto dissolut. exhibitæ sunt, superforbendo oxymel. scillit. ℥iß. hoc enim solo vidi præceptorem meum *Elidæum Bononiæ* curasse quendam spleneticum tribus annis eo malo detentum. Jussi quoque ut uteretur vino decoct. rad. filicis, quo & idem præceptor meus uti solebat Idem dedit *Amatus*, cent. 6. ad splenis duritiem post universalia remedia, ad viginti dies minuit enim lienem, ut & fatus aceti acerrimi in quo lapis pyrites candens extinctus fuit, quod acetum spongia exceptum ad *Gal.* mentem optimum est remedium,

Utebatur etiam *Elidæus* hoc unguento & cerato.

℞. Succ.



℥. Succ. brion. succ. cyclam. an. ℥j. dialtheæ ammoniac. in aceto solut. ol. cappar. amygdal. d. an. ℥ss. omnia in duplici vase bulliant, adde ceræ q. s. ut F. Unguentum.

℥. Pingued. anser. mucilag. alth. an. ℥j. pulv. tamarisc. ceterach. rad. cappar. rad. filic. an. ℥i. Resin. colophon. ℥ij. Ceræ, resin. pini, q. s. F. ceratum: commendabat pulverem tamarisci in furno exsiccati cum cin. nam. in cibus, & in potu dabat pulv. rad. filicis. *Petrus Forestus, observ. 2. lib. 2. De Lienis Morbis.*

Cum Villicus quidam Lineosus siti maxima torqueretur, jus cum tribus aut quatuor guttulis spiritus vitrioli sumens, ad temperandum immodicæ sitis æstum, ex hac potione ventre soluto plus quam quadragies, siti & obstructo ine lienis liber convaleuit, ita in multis casibus res eveniunt inexpectatæ. *Dominicus Panarolus, observ. 21. Pentecoste 2.*

Curatio eadem huic morbo competit, quæ in hepatis obstructione supra fuit proposita, addendo ea quæ peculiariter lienem respiciunt, & humori malenchonico præparando expurgandoque dicata sunt. His autem pilulæ de ammoniaco sequentes, tanquam efficacissimæ addendæ sunt, & in frequenti usu habendæ.

℥. Ammoniac. pinguis in aceto scillit. soluti ℥j. Extract. Aloes ℥ss. Crysell. tartar. ℥j. Myrrh. croci, an. ℥ss. Mastich. benjoin. sal. fraxin. & absinti, an. ℥i. cum oxymel. scillit. F. massa pilul. dosis ℥ss. bis in septimana, purgationibus interjectis.

Præ cæteris autem remediis, quæ ex chalybe componuntur, ad lienis obstructiones referandas sunt efficacissima.

*Amatus Lusitanus, cur. 61. cent. 5.* Curationem proponit obstructionis lienis, à quartana febre relicta, quæ sublata est decoctio rad. chinæ per viginti dies, post convenientes purgationes usurpato. *Lazarus Riverius lib. 12. prax. med. cap. 3.*

Pilulæ tartareæ *Bontii* hic conveniunt, quæ sic parantur.

℥. Aloes succotrin. el. ℥iii. Gummi ammoniac. cum aceto scillitico depur. ℥ss. Tartar. vitriol. ℥ss. F. massa S. A. dosis à ℥j. ad ℥i. manè, vel ante cœnam ℥ss. maximi sunt levaminis in morbis tartareis ut

sunt affectus hypochondriacus, obstructio lienis, mesenterii, &c. incidunt enim tartaream mucilaginem, eamque per dejectionem expurgant: tantæ sunt apud *Hollandos* æstimationis, ut piaculum habeant communes eas reddere, alio modo etiam ita parantur: recipiunt extractum rhei paratum ex rhei el. ℥ss. & corrigentibus, speciebus diamargar. frigid. & diarrhod. abbat. an. ℥j. in succo citri per noctem maceratis, in colatura dissolvuntur species superiores, fitque S. A. massa, & sic hepar magis respiciunt. *Jo. Schroderus, lib. 2. Pharmacop. Med. Chym. cap. 73.*

Sacratissimus Imperator *Ferdinandus* tertius, pro cura verna, & consilio Medicorum, solius limaturæ chalybis crudæ in vinum passulatum infusione utebatur, quam male colatam & filtratam frigidè bibebat, & in curre vectus celeriter, quia pedibus uti non poterat, sese per horam exercebat. *Vvolfgangus Hæferus, Herc. Med. lib. 3. cap. 3.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Lienis Scirrho.

Post universalia remedia, imperavi, ut hoc arcana Præceptoris mei *Fa. ventini* uteretur ad quindecim dies, quo omnis diurnities splenis dissolvitur.

℥. Rad. filicis ℥ss. rad. cuscuc. ℥ij. M. & bulliant in ℥viij. vini albi potentis ad tertiar partis consumptionem colatura patienti detur. Postea ut hoc unguento regio lienis inungeretur mandavi; quo & alij curati sunt, & magni pretii apud me habetur.

℥. Ol. cappar. ℥j. ol. lil. alb. amygd. d. chamæm. butyr. rec. an. ℥ss. succ. brion. cyclam. an. ℥ss. ebulliant olea ad consumptionem succorum: adde ammoniac. in aceto solut. ℥iiss. pingued. gallin. medull. crur. vitul. æsyp. humidi an. ℥ss. pulv. cort. rad. tamarisci, cappar. ceterach. rad. filicis, an. ℥j. pulver. sem. agn. cast. genist. an. ℥j. ceræ parum. F. Unguentum. *Petrus Forestus, observ. 8. lib. 20.*

Ceratum meum de ammoniaco, quo ego utor, fuit impositum: cujus hæc est descriptio.

℥. Ammoniac. dissolut. in aceto; ℥j. dial.



℥i. dialth. & empl. de melil. an. ℥ss. furfur. ℥j. pulv. radi bryon. sicc. pulv. rad. ireos sicc. an. ℥ss. pingued. anatis, anser. gallin. an. ℥iij. bdeil. galban. an. ℥ss. ol. irini ℥ss. bulliant leniter in mucilagine sem. lini, fœnugræc. q. s. adde ceræ ℥ss. Terebinth. & resini pini, an. ℥ss. F. ceratum S. A. Plurimum emollit & resolvit duritiem scirrhomam, ut hoc ipsum pro arcano habeam, ac in officina per me semper paratum inveniat. Deinde lien fomentabatur cum aceto in quo lapis molaris vel pyrites candens extinctus sit. *Idem observ. 10. lib. 20.*

Virum quendam à multis annis scirrhomienis graviter laborantem, divino favore fœliciter & brevi, his quæ sequuntur medicamentis, sanitati restitui. Instituta itaque prima optima victus ratione, sequens lenitivum exhibui.

℥4. Fol. agrimon. veronic. cuscut. scabiol. fumar. an. M. ss. sem. anis. & fol. fen. an. ℥ii. F. decoctio in colat. ℥iv. dissolv. Confect. hamec. ℥iii. diacathol. ℥ss. M, F. potio.

Purgato corpore, sequens præscripta apozema.

℥4. Rad. fœnic. aspar. lapat. acut. scrophular. polipod. q. saniculæ cort. inter. rad. frangulæ, an. ℥i. fol. agrimon. veron. cuscut. scabios. ceterach. fumar. scolopendr. cap. ven. cochlear. nasturt. aq. an. M. j. flor. genist. sambuc. an. M. ss. sem. fœnic. anis. an. ℥i. liquir. ras. uvar. pass. exacinat. an. ℥ss. fiat decoctio S. A. in colat. ℥vj. dissolv. syrup. de scolopendr. de epithymo, an. ℥ss. aq. cinnam. & aceti, an. ℥i. M. F. apozema pro tribus matutinis. Interim loco affecto sequentem applicui sacculum.

℥4. Rad. alth. malv. cum toto, an. ℥i. flor. chamæm. melil. sambuc. fol. cochlear. nasturt. aq. an. M. ss. incidantur & contundantur, indanturque sacculo, quo filo intertexto; & in aq. cocto, calidè bis aut ter quotidie applicetur. Post fotum totum latus unguento meo, ad splenes induratos inunxi, emplastrumque meum de cicuta supra alutam extensum applicui. Hisce scirrhomemollito, sequentem potiunculam propinavi.

℥4. Confect. hamec. ℥iij. extract. hellebor. nigri gr. vi. aq. cinnam. ℥ss. cum decocto præscripto. F. potiuncula, sumatur

mane. Corpore hac potione tam per superiora quam inferiora (absque tamen ulla violentia) probè expurgato maximum levamen persensit, evomit enim multum humoris adusti, nigri, & melancholici, proculdubio ab helleboro ventriculum versus attracti, quapropter ne imperfectum relinqueremus opus inceptum, denuò apozematis præscripti doses sex vel septem exhibui, interim quoque fomentationibus, inunctionibus & emplastro præscripto usus sumus: per intervalla quoque potiunculam ex confect. hamech: & extracto hellebore propinavi. Sic divino favore plenissimè convaluit, multosque deinceps annos incolumis supervixit. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 49. cent. 2.*

Unguentum ad splenes induratos ex oleo amygd. d. ol. de cappar. pinguedine humana, ursi, caponis & anseris, in quibus succus cochlear. nasturt. aq. & tamarisc. coxerit, conficio. Addo nonnunquam nonnihil gummi ammoniac. dissoluti aut in prædictis succis, aut aceto scillitico. *Idem pag. 657.* Ibi etiam habetur descripto empl. de cicuta.

Mirabile est Emplastrum ex cicuta cum ammoniaco aceto dissoluto. Accipe cicutæ M. iv. ammoniac. ℥ss. infunde aceto acerimodis dies octo. Deinde bulliant dum ammoniacum solvatur, hinc per pannum fortem lineum validè exprimatur, iterumque expressus liquor ebulliat quinquies, & adjecta cera, cum oleo amygdal. dulc. F. unguentum. Hoc sit pro secreto; nam omnem duritiem mollit. *Job. Heurnius, lib. 2. Method. ad praxin. cap. 10.*

In lienis scirrhomem remedium habeo probatum ceratum nimirum compositum ex duabus partibus ammoniaci in aceto dissoluti, una succi tabacci, dimidia resinæ pini, terebinth. & succ. ebuli, una olei de cappar. & ceræ novæ q. s. ad empl. seu cerati formam adipiscendam, quod emolliente & digerente sua facultate plurimos obduratos lienes sanavit: dicam vobis, & aliud quod ostendit aliquando experientia: curabam quendam nobilem, cujus custos domuserat hydrope affectus ex scirrhomem lienis, quem habebat permagnum, cui ergo ordinavi spongiam ex aqua calcis vivæ expressam. Sanato domino non amplius accessi; neque



neque ille me adivit, sed expertus indies magis spongiarum earum utilitatem perpetuò usus est spongiis jam propositis, quousque tum ex hydrope, tum ex scirrho lienis fuerit curatus. *Hier. Fabrit. ab Aquapend. lib. 1. Chirurg. cap. 51.*

Curatio scirrhi lienis eadem omnino est cum ea quæ pro hepatis scirrho fuit proposita: ex remediis pro hepatis scirrho propositis, magno in pretio habenda sunt pilulæ ex aloe, ammoniac. & merc. dulci: quæ tamen non abunde satisfaciunt: opiata sequens utramque paginam implebit: nisi morbus prorsus sit incurabilis.

℥. Gummi ammoniac. opoponac. bdell. an. ℥ii. dissolv. in vino albo, colentur, & coq. deinde confect. hamech. diaphæn. an. ℥ii. cathol. duplicat. ℥ß. pilul. foetid. ℥ii. F. opiata, de qua capiat ℥ß. addendo merc. d. gr. xx. continuando per plures dies consequentes, sicque tumor & durities evanescet: convenit venæ sectio in principio, at morbo inveterato minime prodest. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 12. cap. 4.*

Puella septem annos nata correpta fuit febre quartana, & post curationem ipsius incidit in tumorem durum & scirrhum lienis: curata fuit solo usu aq. stillat. tamarisci, cum oleo vitrioli: sumebat singulis matutinis horis jeiuno ventriculo: istius aquæ ℥iv. cum ol. vitriol. gt. vij. & intra mensem perfecte curata fuit. *Joh. Faber. curat. 67.*

Si aliis malum non cedat, licebit cauterium in regione lienis infigere magno cum successu. Et quod mihi creditum velim, deploratos per hoc me curasse memini. *Nicolaus Fontanus, Analect. cap. 24.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Lienis tumore.

**N**Ovi vetulam quandam (cum viginti annis splenetica fuisset) tumore lienis duriusculo laborantem solo continuo esu capparorum convaluisse. *Petrus Forestus, obs. 2. lib. 20.*

Multos nos tali vitio affectus curavimus; inter quos unum, quem, cum septennio hoc morbo vexatus frustra

*Burnet Parte I.*

multa consilia ac pene infinita præsidia expertus fuisset, solo tandem capparibus qui tali ægritudini aptissimus cibus est, solaque illius aquæ, in qua faber ferrarius sæpe candens ferrum extinguit, annua potione liberavimus: tanta scilicet in ejusmodi aqua contra hoc vitium inest vis atque virtus: unde & compertum est animalia quæ apud fabros educantur perquam exiguos habere lienes. *Antonius Benevenius, cap. 105. libri de occultis morborum & sanationum causis.*

Ad purgandum humorem melancholicum maxime laudantur pilulæ de ammoniaco, quæ pro secreto habentur in hoc morbo: quæ sic fiunt.

℥. Extract. Aloes cum aq. endiv. ℥i. Gummi ammoniac. in aceto scilicet. solut. myrrh. præp. an. ℥i. mastich. spec. trionfant. an. ℥i. croci, ℥ß. sal. absinth. ℥i. cum syrup. de succo ros. F. massa pilul. cujus accipiat per intervalla ℥i. plus minusve: usus harum pilul. non solum in hoc affectu, sed in omnibus obstructionibus ventris, in quartanis cachexiis præcipuus habetur. *Rodericus à Fonseca, tom. 1. consult. 28.*

Suadeo ut sinistra hypochondrii regionem integat hoc emplastro, quod non solum mollit, discutit, humoresque in splene conditos resolvit, & dolorem, si quis leviter sopit, verum etiam viscus roborat & consolatur.

℥. Ammoniac. ping. ℥ii. aceti ℥vii. vini alb. ℥iii. coq. ad humoris consumptionem: tum adde empl. de meliloto ℥ß. Mastich. ℥ii. pulv. ceterach. pulv. flor. chamæ. calam. arom. sem. cumin. an. drß. ol. cappar. partes ij. ol. absinth. & nardin. an. part. j. ceræ novæ q. s. F. emplastr. estend. q. s. super alutam, & applicetur lienis regioni. *Reinerus Solenander, consil. 21. sect. 3.*

## SECTIO DUODECIMA.

### De Henteria.

**V**Idetur supra libro tertio sect. 47. De calculi morbo.



## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Lienteria.

**V**ir quidam lienteria laborans singulo die jejuno ventriculo sumens  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . sequentis electuarii nihil superbibendo curatus fuit.

24. Sacch. rosat.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$ . theriac. opt.  $\mathfrak{z}\mathfrak{vi}$ . cum miva citonior. q. s. M. F. elect. eodem modo fuit curatus teste, *Amato Lusitano cent. 2. cur. 56.*

Nobilis quidam *Anconitanus* senio confectus qui cum per plures dies semicrudum cibum per secessum emitteret, & multa præsidia tentata illum non juvissent, hoc elect. ultimò resectus fuit; & sanitatem obtinuit: usus est sacch. rosato antiquo. *Petrus Forestus, observ. 24. lib. 22. De diversis generibus profluviorum alvi.*

Vir quidam 46. annorum lienteria gravi afficitur, quàm *Dei* auxilio, quod mihi semper desperatis & gravissimis curandis morbis præsto est depello levi hac cura, certa tamen. Potus sit vinum absinthites & aqua chalybeata. Cibus omnis conficiatur ex aqua chalybeata. Manè edat panem benè coctum in vino adusto maceratum. Stomachi regioni accomodet emplastrum ex mica panis secalini & aceto forti conflatum. His remediis bonus ille vir a lienteria exitiali evasit. *Martinus Rulandus, cur. 37. cent. 7.*

## SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

## De Lingua calculo.

**S**ororecula quædam *Delfia* annos nata viginti & tres, & cum circa os maxillæ inferioris prope mentum longo tempore doleret, sub lingua in musculosa carne laxiore versus radicem Chirurgus qui illam quotidie invisebat cum duritiem diu sensisset, abscessum in lingua futurum sperabat: huic sicum aridam per medium scissam continuo, ad suppurationem promovendam, loco dolenti apponit: & præter spem tumore jam emollito, lapillus quidam insigniter durus ultrò exivit absque incisione ad magnitudinem nucis avelanæ formæ tamen longioris ut vidimus alio la-

pillo ex pulso statim omnis dolor cessavit, nulla suppuratione; aut sanie vel pure subsequente; & quod dictum mirum est, labris vulneris per se rursus unitis, absque ullis medicamentis. Istis etiam diebus lapillum ex lingua prodeuntem vidimus paulò ampliore ab illo quoque tandem expulsum: res admiratu digna, lapillo erumpente: nec saniem, nec sanguinem subsecutum fuisse, linguamque ita per se coalitam: fortè cum & vulnera linguæ facilè per se coalescant, ut constat in perjuris, & iis maleficis, quibus lingua clavo perfoditur, facilè coalescit, & conglutinatur ob molli- tudinem carnis. *Petrus Forestus, observ. 26. Schol. lib. 14.*

Intumuerat mulieri cuidam admodum lingua, ita ut eam movere, aut loqui non posset: uti neque aliquid deglutire, rupto tandem spontè abscessu procidit calculus tophaceus, durus & magnus. *Felix Platerus, obs. 3. pag. 896.*

Vir quidam quadraginta annorum graves & frequentes in fauces & tonsilla fluxiones patiebatur: tandem animadversum est lapillum sub lingua concretum fuisse, qui facilè extractus est, ægerque ab eo tempore fluxionibus prædictis vexatus non fuit. *Petrus Estanove, observ. 5.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

## Pro Lingua &amp; Labiorum resolutione.

**N**ondum hic affectus paralyxis dici debet, licet, nisi debitè tractetur, in illum possit terminari. Aer diligendus purus, qui calida & sicca qualitatibus superfluum capitis humorem absumere discutereque valeat. Suffusus in ædibus utiliter quandoque excitantur: ad hoc bene facit ex alvo succino puriore, scilicet, tenuiora ramenta paucis carbonibus injicere minus gravis est & tamen perbellè siccatur roboratque cerebrum odor ex indico succino, animen vocant, excitatus ex cariophyllis quoque admitti potest: utilis & gratus est qui ex sequenti pulvisculo composito movetur, siccatur egregiè, calefacit mediocriter; & roborat internas partes capitis.

24. Benioin.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ii}$ . lign. aloes,  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . storac. calamit.  $\mathfrak{z}\mathfrak{iv}$ . anim.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . thur: sandarach. arab.



rab. (i. e. gummi juniperi) an. ℥ii. cario-  
phyll. ℥β. contusa M. pro suffitu; quo suf-  
fumigetur nocte dormituro tegumentum  
capitis, eundem excitando super carbones  
addo hic aliud quod in id genus capitis af-  
fectibus cavendis sæpè profuisse comperi:  
conficitur ex succini globulis minutis colla-  
ris corona, ea circa cervices collum cir-  
cumdatur aliquot spiris, retineturque con-  
tinuò sub interula ad cutem: hæc enim  
corporis tempore calefacta insensibili la-  
tentique vaporatione expirat, ita cerebri  
humiditates siccantur, absumuntur, &  
retinentur, additurque capiti robur: in æ-  
ris observatione advertendum est, ne expo-  
natur caput æstui solari, multoque minus  
radiis lunaribus vitandus etiam percolatus  
aer & qui per rimam, vel exiguam aliquam  
fenestram quasi luctando inspirat. nam ita  
ad fenestram sedisse, ventumque penetran-  
tem cervice, capitisque altera parte exce-  
pisse, sæpè numero vidimus in ita disposi-  
tis magnum malum dedisse. Victus insti-  
tuendus exsiccans & moderate calefaciens:  
sunt cibi assii potius quàm elixi; condiantur  
rore marino, satireja, serpillio, salvia,  
origano, majorana, arantiorum & limo-  
num corticibus; cinnamomo etiam nuce-  
moschata, macere, cardamomo, & ga-  
langa: observarunt Medici, potissimum ex  
*Arabum* familia celebriores, esum colum-  
borum sylvestrium Medicinam propriam  
esse ad relaxationem omnium membrorum  
(ut loquuntur illi) ad privationem sensus  
& motus, ad tremorem & amissionem lo-  
quelæ: compertum etiam est leporis ce-  
rebrum in frigidis cerebri & nervorum  
morbis utiliter comedi: assum comedi  
potest, conditum cinnam. & nuce mos-  
ch. singulis mensibus semel purgetur his  
pilulis.

℥. Pilul. aloeph. ℥ii. Aloes rosac. ℥ii. A-  
gar. opt. ℥β. rhei irrorandi aq. cinnam. ℥i.  
Zinzib. alb. sal. gem. an. gr. ii. M. cum ros.  
solut. f. pasta ex ℥i. f. pilulæ ix. dosis ℥i. In-  
terea temporis quandoque vesperti horis à  
parca cœna tribus, cum decumbendum  
fuerit, diglutiantur duæ aut tres ex iis-  
dem pilulis ternis nimirum, quaternis,  
quinisve diebus quibuslibet: quod si al-  
vus quandoque astrictior fuerit, hora  
una ante cœnam ex prædictis pilulis una aut

altera diglutienda: vel in usum vocetur  
hæc pilul. massa: etenim tam serofos quam  
lentos frigidofque humores, quibus cere-  
brum gravatum minus expedite sensibus  
internis atque externis utitur, qui itidem  
vertiginis & paralyseos similiumque id ge-  
nus morborum causas præbere solent, sine  
molestia educit, atque evacuat. Novi qui  
vegetam memoriam visumque expeditum  
in multos annos harum usu, quod scilicet  
vesperi à cœna decubaturi, unam earum,  
longo tempore continuantes, diglutierant,  
conservarunt: pilulæ hæc sunt.

℥. Turpeth. gummos. colocynth. agar.  
opt. an. ℥ii. rad. asar. carioph. cubeb. nuc.  
mosch. mastich. an. ℥i. cal. aromat. succin.  
albiss. an. ℥β. sol. sen. epithym: cretens. an.  
℥i. sal. gemm. myrobal. chebul. pulp. sem.  
cartham. an. ℥β. Aloes opt. ad pondus om-  
nium, cum succo salviæ ad ignem depura-  
to q. s. F. massa: & ex qualibet ℥i. pilulæ  
num. 7. vel 8. ex istis singulis diebus alternis  
vel ternis quibusque sine discrimine diglu-  
tienda una vel altera supra vespèram horis  
aliquot à cœna: quod si exquisitius purga-  
re corpus quandoque in animo est, pilul.  
istarum tuto à ℥i. ad ℥iβ. sumere licet. Pur-  
gato diligenter corpore, hoc unum adscri-  
bam, quo assumpto resolutam linguam a-  
liquoties restitutam scio.

℥. Mithrid. vet. ℥i. rad. acor. condit. opt.  
triti ℥ii. nuc. mosch. zinzib. alb. an. ℥β. sal.  
communis ℥i. subigantur omnia in morta-  
rio cum pistillo instillando continuo succi  
salviæ ad ignem defæcati q. s. F. elect. confi-  
stentia solidiusculum: ex eo avellanæ instar  
in ore retentum diu lingua volutatum tan-  
dem deglutiat: interim profuerit ali-  
quando caput per nares expurgare levi hoc  
errhino.

℥. Aq. majoran. ℥iβ. pulv. nuc. mosch.  
℥i. mell. rosac. colat. ℥ii. dissolve: attra-  
hendum manee vola manus in nares: item  
apophlegmatismi loco teneat in ore aquam  
melissæ quæ ex melissa irrorata vino gene-  
roso aspersoque cariophyll. pulvere destil-  
lata erat: in quodam enim generosissimo  
viro comperi aliàs hanc aquam, cum pri-  
mùm admoheretur, in restituenda loquelâ  
vehementer profuisse. *Reinerus Solenander,*  
*consil. 14. sect. 2.*



## SECTIO DECIMAQUINTA.

## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

*Pro Linguae Vulnere.*

**P**Uella quædam exerta lingua in terram cadens, partem illam quæ inter dentes erat ferè ex toto abscidit; vocatus sequentibus remediis curationem tentavi, atque feliciter absolvi.

℥. Fol. & flor. ligustr. plantag. ros. rub. an. M. i. cortic. grana. balauft. an. ℥ss. coq. in ℔ii. aq. chalyb. ad tertiæ partis consumptionem, in colat. dissolv. acaciæ ℥ii. syrup. de ros. sic. ℥ii. M. F. gargarisma, quo sæpius interdum abluatur lingua: in ore continenter tenebat syr. de ros. sic. de cydon. syr. conservat. ceraforum, de ribes; vescebatur jusculis carniū recent. hordeaceis, lacte amygd. d. & similibus: his Dei beneficio plenissimè fuit curata, neque ullo modo depravata fuit loquela. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 28. cent. 1.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

*De Lochiis per alvum expurgatis.*

**L**Ochiorum post partum expurgatio copiosior nonnunquam est justo, parcius nonnunquam, interdum planè intercerta. Pro diminuto vel cessante fluxu lubrica alvus confert, cujus rei causam non rarò admiratus sum: novi puerperas quibus nulla lochia post partum successerunt, magno vitæ discrimine: injecto verè clystere simplici, alvoque soluta convaluerunt, quibus diarrhœa loco sanguinei purgamenti fuit saluti: quum uxor mea charissima feliciter filiolum meum *Casparum* enixa esset, parcissimè præter morem lochia fluxerunt, sed continua ferè aliquot dierum diarrhœa sine ulla virium jactura purgata fuit. Dubitavi per quas vias retracta sit materia ad intestina; longæ viæ sunt, nec hic per alvum cruor decurrit; igitur verò mihi sit simile per alvum revelli & evacuatum quo alioqui diluitur sanguis & impregnatur ad venas uteri patentes deducendus. *Thomas Bartholinus, Hist. 19. cent. 3.*

*Pro Lochiorum fluxu immodico.*

**M**ULIER quædam post abortum à sanguinis fluxu immodico summam patiebatur virium dejectionem: illi præscribo frictions & ligaturas partium superiorum, cucurbitulas sub mammis, epithemata & pullos columbinos, fots manuum cum vino calente, in quo confectio al-Kerm. dissoluta sit, & sequentem potionem.

℥. Aq. plantag. naph. & ros. an. ℥i. syr. corall. ℥i. sal. prunell. ℥i. sang. drac. ℥ss. M. F. potio, quæ statim fuit exhibita, antequam reliqua remedia fierent, & intra horæ quadrantem dolores ventris & lumborum quieverunt, & fluxus imminutus est, ut aliis remediis non indiguerit, *Lazarus Riverius, observ. 69. cent. 1.*

Curatio fluxus sanguinis immodici in illius cohibitione tota versatur: summa tamen cautio adhibenda est, ne quod per hujusmodi purgamenta excerni consuevit: intus retineatur, & gravissimorum affectuum causa evadat. Ideo si affectus non vehementer urgeat, à levioribus incipiendum erit, ad potentiora, si opus fuerit, sensim progrediendo, ac primum sanguinis impetus cohibendus est alimentis incrassantibus, ut panatellis, gelatinis, oryza, amylo, cum jusculis pedum vituli, pyris cydon. coctis, carnib. assis succo granatorum aspersis. Cibus paulò copiosior exhibeatur, non tamen una vice, sed potius frequenter, cum modo calor & spiritus, qui expulsionem in utero adjuvant, ab utero ad ventriculum avocetur, & vires instaurentur. Vitelli ovorum huic usui conveniunt: nam & facile coquuntur, & calorem ad ventriculum avocant: potus sit aqua ferrata, vel extinctionis auri, vel in qua parum mastiches bullierit, venter fascia mediocriter constringatur: quia hoc modo comprimuntur vasa & fluxus immodicus impeditur, lumbis admoveantur lintea oxycrato madefacta, si diutius duret fluxio, pulvis vel opiata ad plures doses præscribi potest in hunc modum.

℥. Lapid. hæmatit. ℥iv. pulv. bol. armen. corall. rubr. margar. præp. an. ℥i. sem. plan-



plantag. coriandr. præpar. & gran. sumach. an. ℥ii. M. F. pulvis tenuissimus, de quo capiat ℥i. cum decocto centinodix & syrup. cydoniorum.

℥. Conserv. ros. rad. symphyt. an. ℥i. bol. arm. troch. de carabe, & corall. an. ℥i. cum syrup. corall. vel de ros. sicc. F. opiata de qua capiat ad magnitudinem castaneæ superbibendo parùm aquæ potus ordinarii.

Exterius verò fots & unguenta utiliter admovebuntur in hunc modum.

℥. Summitat. lentisc. rubr. plantag. cupress. olivæ, polygoni, an. M. i. rosar rubr. p. ii. granor. myrti ℥i. nuc. cupress. numero vi. cortic. granat. p. ii. coq. in aq. chalybeata & vino rubro astringente, & colatura foveantur partes muliebres valdè tepidè & ferè subfrigidè.

℥. Unguenti comitiss. ℥ii. succ. plantagin. ℥i. agitentur simul, & fiat linimentum applicandum post fotum.

Injectio in uterum etiam potest fieri ex succo plantag. à Galeno laudato, vel decocto fots prædicti.

Reliquis remediis non conferentibus, venæsectio in cubito præsentaneum est remedium, si paulatim & per quædam intervalla sanguis educatur; sic enim multas deploratas convaluisse experientia docuit.

De somno peculiariter hic annotandum, dum sanguis copiosè effluit, eum esse penitus arcendum, multæ enim ex eo de medio tolluntur, quia calor ad interiora retractus majorem fluxum efficit: & si aliquando is concedendus sit aliquis ex ministris semper adesse debet, qui ægrotantis pulsum & respirationem observet *Lazarus Riverius, prax. medic. lib. 15. cap. 21.*

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

### *Pro Lochiis suppressis.*

**I**N puerpera lochiis suppressis laborante recte usus sum hoc decocto.

℥. Hord. mund. M. i. liquir. ras. ℥. schænanth. ℥i. coq. in aq. pro ℔i. id quidem vel in febre non obest, & simul purgationes sopitas aperit, debilioribus ℥i. schænanth. in jure pulli bullire jubeo: hoc enim modo *Florentiola Medicus Bononi.*  
*Burnet Parte I.*

*ensis* utebatur: valet & jus cicerum. Mulieres *Bononienses* dant jus columbæ in quo bullierit schænanthum ad purgationes promovendas; estque remedium *Nicolai*, at in robustioribus puerperis, si menses diu retineantur, vena tali incidenda, ut in quadam cum maximo successu fecimus, menstrua purgatione subsequente: etiam sumendo ℥i. pulv. dominarum cum aq. artemis. *Petrus Forestus, observ. 82. lib. 28. De morbis mulierum.*

Hunc potum sibi reddat familiarem aliàs à me expertum.

℥. Flor. chamam. M. i. pulv. cortic. arant. sicc. ℥i. coq. in. s. q. cerevis. cujus colaturæ sacc. finiss. parum misceri potest: ab eo aliquoties assumpto melius habuit. *Joh. Petrus Lotich., observ. 21. cap. 1. lib. 5.*

Purgatio convenire potest septem vel novem diebus à partu, ex infus. rhei, agar. aut senæ; vel cum jusculo laxante ex herbis ac rad. aperient. cum sena parato; vel cum mannæ, ℥i. in jusculo dissolutæ. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 15. cap. 22.*

Nobilis mulier pudicitiam suam prostituerat, uteroque conceperat; conceptus ferè trimestris. Cum de ea re nulli suboleret, fortè cum joco multa faceret patere-turque, in vicinum lectum conjicitur, in ejus ventrem incidit juvenis, qui impetu lapsus, & sua ipse mole opprimens, tantam utero vim intulit, ut illisus fuerit fœtus: ingens copia sanguinis fluit. Qui aderant nil tale de conceptu cogitabant. Advocatus Medicus, de amissa pudicitia ne cogitare ausus, totum id ad pressum istum referebat, ideò rogatus omni ratione sanguinem cohiberet, & supprimentia, & sectionem venæ recens enixæ adhibuit. Sequenti die rheum præscribit, nihil inde alienum con-tectum, an urgente necessitate recens enixas ad solennia remedia adigere audebis. *Guil. Ballonius, lib. 1. Epid. & Ephem. pag. 53.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### *Pro Loquela amissa.*

**P**Uella quædam septem annorum, cum variolis gravissimè correpta fuisset,



circa quartum diem morbi loquelam ita amisit, ut ne minimum quidem vocis articulum, aut sonum aliquem edere posset. Ego cum in consilium adhibitus essem, & hujus morbi causam investigare vellem, ne minimum quidem linguæ vitium inveni, illam enim absque omni difficultate movebat, protrudebatque atque ex una in alteram partem circumducebat. Ex his signis, malum in ipsis recurrentibus nervis esse haud difficulter conjeci: recurrentes enim nervos vocis præcipua esse organa post *Galen.* asserunt Anatomici, quapropter illis interceptis aut sectis mutum statim ut reddatur animal necesse est. In curationem autem sic processit. Primò, syrup. ros. solut. cum rheo, agar. & sena, nec non duobus granis gutt. gamandr. dissolutis in decocto beton. salv. prim. veris, corpusculum ut per intervalla expurgaretur, suasi. Deinde quæ cerebrum partesque roborant, ut sequens, facit elect. præscripti.

℞. Conserv. flor. beton. prim. veris, salv. rorismar. an. ℥ss. confect. alkerm. ℥ii. spec. dianth. & de gemm. an. ℥ii. cum syrup. de beton. q. s. F. Electuar. de quo sumat ægra quotidie ter aut quater præcipuè jejuno sto. macho, & post cœnam ad magnitudinem castaneæ.

Exterius fotum sequentem anteriori parti colli ubi nervi recurrentes descendunt, iterumque recurrunt, bis in die applicare jussi.

℞. Flor. beton. salv. rorismar. prim. veris, summitat. major. hyperic. centaur. an. M. ss. ros. rub. jvæ arthetic. an. M. j. gran. junip. ℥iii. incid. & contund. omnia grosso modo, postea indantur sacco ejus magnitudinis, ut anteriorem partem colli ad sternum usque cooperire possit, is aquæ incoctus applicetur calidè, fomenteturque collum spatio unius horæ; idque bis in die. Deinde inungatur collum sequentibus aquis destillatis.

℞. Aq. beton. prim. veris, salv. lavend. an. ℥ss. spirit. junip. sine vino præp. ℥j. theriac. opt. ℥ii. M. his non diu adhibitis remediis, loquelam paulatim recuperavit, & nunc optimè valet puella. *Guil. Fabritius Hildanus, observat. 14. cent. 6.*

Relatum est *Maximilianum Frederic III.* Imperatoris filium usque ad nonum

sua ætatis annum prorsus elinguem & mutum fuisse, sed tamen beneficio naturæ, non solum sermonem acquisivisse, verum etiam fuisse, sed eloquentissimum: nam in ipso existimandum est vitium originem duxisse ex larga humiditate, quæ ætatis progressu consumpta fuit. *Hieronymus Mercurialis, lib. 2. De Morbis Pueror. cap. 8.*

Græcus quidam Nobilis variis ulceribus à morbo *Gallico* contractis scatebat; à quibus optimo sed subtili constituto victus ordine, & ebibito guajaci decocto ad 40. dies, ac postea à ceratis cruribus & brachiis ex mercurio impositis, & postea iterum repetito guajaci decocto, sanus evaserat; uno tantum ulcere in alta palati parte permanente, quod nullis medicamentis cicatricem duxit; imò ibi perpetuum foramen relictum est, ob quod vir hic in totum usum linguæ & vocis amiserat. Quo tamen modo tanto malo occurrerimus, ut vir commodè loqueretur, attendite. Mirum namque artificium hoc excogito, quo ita rectè & continuè post loquebatur, ac si nihil mali unquam haberet. Habet autem artificium sic. Ex auro capitatum clavum per Aurificem parari jubeo, clavi caput erat rotundum & latum, ut universam foraminis circumferentiam contingeret; cuspis verò parva admodum & rotunda, in cujus medio auricula lentis modo prominebat. In hac igitur clavi cuspide spongiola adaptabatur, quàm intra foramen ægrotus mittebat, quæ humiditate tumida inibi fixa manebat: unde ita eleganter loquebatur, ac si nihil mali haberet. Singulis verò diebus bis, vesperi scilicet & manè, instrumentum deponebat, & spongiolam lavabat, & digitis comprimebat, & iterum reponebat & intromittebat. Eo deposito vox in totum deficiebat quæ eodem intromisso recuperabatur. *Amatus Lusitanus, cur. 14. cent. 5.*

## SECTIO VIGESIMA.

### De Loquela absque Lingua.

**S** *Almuriex Variolis* quidam expuit totam linguam, nec tamen loquendi promptitudinem amisit, quanquam exacte aliqua literarum elementa proferre nesciverit.



verit. Sunt enim litteræ quæ sine linguæ aliusve enunciantur, ut A. vel à Labiis, eduntur ut B. *Thomas Bartholinus, Hist. 21 cent. 2*

sitissimo sensu præditis, & tunc lues immedicabilis est.

## SECTIO VIGESIMA PRIMA.

### De Lue Venerea.

**L**ues Venerea (quæ & Morbus Gallicus Italicus, Siphilis, & Pudendagra dicitur) totius substantiæ morbus est, occultus & contagiosus, tuberculis, maculis, ulceribus, cruciatibus & doloribus sese prodens. Causa efficiens est occulta & venenata qualitas contagione & attractu contracta; & in humore aliquo velut in subjecto inhærens; hæc autem perniciofa labes, licet variis modis se diffundat, venereo tamen concubitu maximè propagatur in genus humanum. Per totum corpus disseminato malo, sæva pullulant symptomata, animum tristitia detinet, corpus lassitudo, pallor faciem, pustulæ circa frontem primò, deinde per totum corpus erumpunt, dolor adest vehemens & vagus, modò in capite, modò in musculis, modò circa artus, ac præcipuè sub noctem molestant, fœda se prodit Gonorrhœa, circa pudenda oriuntur ulcera & bubones, destillationes contingunt praviæ, quæ modò palatum, & uvulam, modò fauces & tonsillas erodunt: Labia quibusdam consumuntur, quibusdam nasus, quibusdam oculi, aliis pudenda tota, languent omnia membra, nullum adest desiderium cibi, nullus somnus, sed mœror & iracundia continua & amor decubitus; febricula, aliquando, sed rarò comitatur, pilorum accidit defluviū, & dentium casus; Cùm denique inveteratum evadit malum, adsunt ulcera fistulosa, callosa, cancerosa, tophi in variis corporis partibus, ossium caries, imprimis in cranio, osse palati & nasi, febris hectica, tabes, cachexia, epilepsia, surditas & cæcitas; exostoses etiam superveniunt, quæ duplici modo fiunt, vel per modum adhesionis materiæ crassiæ & viscidæ ossi affixæ, vel rursus per modum excrescentiæ ossis ab interno medullio: quamvis enim os sua natura, durum sit, tamen virtute veneni extenditur & augetur carnibus in ipsa osse genitis carcinomatosis & exqui-

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Lue Venerea.

**M**ulierum cuidam virulentia venerea affectæ cum nobis & ulceribus in fronte consului ut ab assumpta cassia, vel elect. lenitivo, altero die ex vena jecoraria sanguinem mitteret. Deinde ut hic Syrupus pro digestionem ad octo dies fumeretur.

℞. Syr. de fumar. de succo bugloss. an. vnc. ii. aq. fumar. bugl. an. vn. ij. M. vel melius cum decocto fumar. bugl. beton. & liquir. Deinde ut hoc solutivum caperet.

℞. Confect. hamech. vn. ℥. syr. ros. solut. vn. ii. aq. prædictis, vel decocto fiat potio. Postea ut parum sanguinis detraheret ex venacephalica ob capitis insignem dolorem & gummata in capite. Tandem redeundo ad syrupos, postea ut sic iterum purgaretur præcepi.

℞. Confect. hamech. ℥vj. diaphœn. ℥ij. syr. ros. laxat. vn. j. cum aquis, vel decocto F. potio His peractis, ut ad decoctum ligni hoc modo perveniret consolvimus.

℞. Lign. guajac. circumquaque buxi coloris, intus autem nigrescentis, serra vel lima in scobem redacti ℔bi. Infund. in aq. fontis vel fluviatilis ℔xiv. per spatium vigintiquatuor horarum, & in olla fictili vitreata & bene operata; postea admoveatur lento igni, & decoquatur ut remaneant ℔viii. colatum inde in vas vitreum stricti orificij, & exquisitè operatum, & servetur. Hujus decocti vnc. vj. vel paulo plus bibat horis quatuor ante prandium, atque interim se continebit in cubiculo tepido, è quo non recedet, donec totum tempus potionis transierit: quod si stragulis, & vestibis bene connecta in lecto per vnam horam, vel duas sudaverit, optimum erit; surget deinde vestibis benè munita, & leniter inambulabit, vel aliquo hilari opere se exercebit, & exactis quatuor horis à potione prandebit. Prandium erit primis decem diebus, panis benè fermentati & biscocti vnc. iv. vel v.



aut plus carnis vervecis, vel pulli gallinac. vel perdicis assatæ vn. iv. vel paulo plus. Potus sit cerevisia communis benè defæcata, vel vinum oligophorum probè lymphæum pro consuetudine: quod si poterit ab his abstinere, bonum esset pro potu uti secunda aqua decocti ejusdem ligni, superinfusa aqua ad lbxx. usque ad quartæ partis consumptionem. Somnum diuturnum evitet, & maximè animi perturbationes. Septima hora post prandium totidem rursus uncias ejusdem primi decocti eodem modo potabit, & post quatuor horas cœnabit. Eadem prorsus ratio cibi & potus tam in cœna quàm in prandio esse debet, quidam hic post primos decem dies non amplius carnem, sed ejus vice passul. ℥iii. & in prandio & in cœna assumere jubent, & transactis viginti diebus ab hac strictiori diætâ, rursus ad eandem cibandi normam redeunt, quàm in primis decem diebus observarunt. Deinde ut magis proficua & tutior procedat curatio, singulis octo diebus, sumet una hora ante prandium, cass. rec. extract. ℥x. vel saltem ℥i. quo die à decocto ligni abstinebit quod si interim dum decocto utitur, non egerat, si opus est glande ventrem irritabit, vel alvum enemate ex decocto ligni ejusdem cum ℥iii. mell. ros. leniter solvet. Usus decocti continuandus est, per quadraginta dies. Pustulæ verò, apostemata & ulcera ungantur circum circa cum spuma decocti primi: nam confortat membra, digerit materiam & rectificat, spuma sit calida ungaturque bis in die, aut ter etiam in dolorosis locis, quoniam mitigat dolorem. *Petrus Forestus observ. 9. & schol. lib. 32. De Lue Venerea.*

Magna est controversia de ligni præparatione: dum quidam volunt ut decoctum fiat cum vino, alii verò in aqua: in biliosis & calidis temperaturis decoctio est in aqua simplici, vel endiviæ faciendâ: sed in obæsis, frigidis & pituitosis cum vino fieri potest unde *Augerius* ait, hodie & primum & secundum decoctum cum vino fit, & plurimum confert, præterquam in biliosis & calidis temperaturis, ætatibus & temporibus in quibus præstat aqua. Sed quomocunque fiat, sive cum vino, sive cum aqua, spuma diligenter colligenda est:

hac enim illinenda sunt ulcera, callositates, pustulæ & loca dolentia. Spumæ loco utuntur aliqui ramentis ligni in vino antiquo & oleo veteri coctis: præstat oleum ex ligno ipso, vel juniperi chymicum. *Petrus Forestus, schol. observ. 7. lib. 32.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Lue Venerea.

**P**ostquam satis purgatus esset, sequenti unguento quinquies eum illevimus.

℥i. Pulv. baccar. lauri excortic. ℥iv. argenti vivi sicut decet extincti ℥i℥ ol. laurin. ℥vi. M. omnia bene incorporando: inunximus autem juncturas manuum, pedum, & cum valde robustus esset, etiam eodem unguento penna oblevimus ulcera crurum (habebat enim crus adeo ex Lue ulceratum à genu usque ad pedem ut os denudatum esset, cujus etiam corruptionem metuebamus) & brevi sanitatem is recuperavit, omnibus admirantibus, qui homine prius viderant. Profuit autem ipsa inunctio etiam in loco ulcerato in hominem robusto & prius per universalia remedia benè purgato: quod postea minus mirabar cum Chirurgos, audatior tamen, in Nosocomio *Delphensi* noverim, qui suo unguento gallicano subinde totum corpus inunxere, & potissimum eas partes in quibus dolores infestant & ulcera eminent: in hoc solo tamen homine robusto ulcera oblevi, in aliis suffecit solas juncturas inunxisse.

Conficiatur hoc modo unguentum efficacissimum quod nunquam *Rondeletium* fefellit.

℥i. Unguenti martiatî & aregon. an. ℥iij. axung. porci non salitæ nec liquatæ lbj. oleo chamæm. aneth. an. ℥j. ol. laurin. ℥ij. argenti vivi ℥v. terebinth. resin. an. ℥ii. M. F. unguentum, quo ungantur partes extremæ, & sensim provocetur sudor cooperiendo vel apponendo lateres. Si unà adsint ulcera, cum multis papulis & ulcusculis, addantur thus, mastich. iris, ærugo & alia hoc modo.

℥i. Axung. porcine. lbj. butyr. rec. terebinth. lot. in aq. vitæ, an. ℥ii. resin. & unguentum.



ti martiati, an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . arg. vivi  $\mathfrak{z}\text{v}$ . thur. mastich. irid. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . virid. xris  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . ol. laurin. & irin. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . lithargyr auri  $\mathfrak{z}\text{i}$ . M. F. linimentum. *Petrus Forestus, observ. 12. & schol. lib. 32.*

Multi curati sunt in Nosocomio *Delphensi* hoc unguento quo communiter utebantur.

24. Sulphur. vivi  $\mathfrak{z}\text{i}$ . argenti vivi  $\mathfrak{z}\text{vi}$ . ceruss. tartar. alb. cinnab. an.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . lithargyr. auri & arg. plumbi, an.  $\mathfrak{z}\text{ii}$ . salis  $\mathfrak{z}\text{i}$ . rad. helleb. nigri & alb. baccar. lauri, camphoræ, an.  $\mathfrak{z}\text{ii}$ . ol. laurin.  $\mathfrak{z}\text{iv}$ . Axung. porcini.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . succ. fumar. rad. lapath. acut. enulæ, scabioso chelidon. borrag. an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . bulliant cum ole. axungie ad succorum consumptionem, deinde admisce argentum vivum cum saliva extinctum & reliqua. Hoc unguento indifferenter pro omnibus utebatur quinque diebus semel in die, manè scilicet in cubiculo valde calido & parvo, inungebant brachia, & crura & inguina, & semel umbilicum tantum, & tunc faciebat fluxum. *Idem, observ. 13. lib. 32.*

Hoc unum ante oculos habendum, quod ubi plus gummositatum videtur, plus pinguedinum unguento addimus; ubi verò minus gummositatum & plus pustularum & ulcerum plus pulverum apponimus. In delicatis quoque parum argenti vivi addimus, veluti quando complexio calidior fuerit, multum butyri & ol. rosac. aut succi plantag. res. calidas fugiendo, adjungimus.

Hoc sequenti *Amatus curat. 76. cent. 2.* Monachum atheromate in capite ex virulenta venerea condecoratum curavit.

24. Thur. mastich. myrrh. cinnam. zinzib. piper long. sandrach. græc. minii, an.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . radic. pyrethr. floris salis nitri antiquorum,  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . cineris tamarisc.  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . butyr. rec.  $\mathfrak{z}\text{vi}$ . pingued. porcini.  $\mathfrak{z}\text{bi}$ . argenti vivi cum succo limon. extincti  $\mathfrak{z}\text{ij}$ . M. & in mortario omnibus benè pistis F. unguentum, quod vires habet tum exsiccandi & abstergendi, tum subtiliandi, & confortandi, quæ semel in die jejuno stomacho, ejus juncturæ ac corpus demptis capite, pectore alis ac ventre, illinebantur, fuit hic (inquit *Amatus*) sexies illitus, & multa pituitosa & mucosa per os emi-

sit, in quo ulcera (ut plerumque evenire solet) floruerunt, sed gargarismo ex rebus stypticis confecto sana facta sunt, & ipse ab orci faucibus liber. *Idem, observ. 14. lib. 32.*

Nos experientia didicimus, quod ferè quinto vel ad summum sexto die, etiam si tantum semel in die inungantur, alterationes oris fiunt cum evacuatione, ego multos curavi quos nisi quinquies illinivi semel tantum in die, & rarò ultra quinque dies inungere jubeo. Mirabile est quod *Nicolaus Massa* refert se unum sanasse, qui à pluribus jam inunctus fuerat, & non sanatus, quem per triginta septem dies inunxit & liberatus fuit: & ideo (inquit non potest dari certa regula de numero dierum unctionis: sed valde miramur quod toties ille ausus fuit inungere. Fiat unctio ante focum in cubili clauso, postea juncturæ stupa canabina calida cooperiantur & ligentur, & ingredietur lectum cooperiaturque coopertoriis ut sudet per duas horas: quod si per sudorem nimiam patiatur lassitudinem, detur cyathus unus brodii gallinæ vel carnis: experientia didici quod si in robustis tertio aut quarto die venter non fluat, si levi manu unica vice inungant ventrem, maximè circa umbilicum quod facile illis venter fluat, sed hoc nisi semel in constipatis faciendum putamus, ne venter nimium ex unctione postea perturbetur. *Petrus Forestus, Schol. observ. 14. lib. 32.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Lue Venerea.

**C**UM benè purgatus esset, ad suffitum devenimus: hunc quo Chirurgus alias usus esset, nunc paratum habebat, præscripsimus.

24. Cinnabar.  $\mathfrak{z}\text{ii}$ . oliban. benjoin. myrrh. an.  $\mathfrak{z}\text{i}$ . gall. mosch.  $\mathfrak{z}\text{ss}$ . theriac. el.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . styrac. liq. q. s. ad incorporandum. F. suffitus, omni manè fiebat suffitus, sed cum post tertium diem venter strictus maneret, quarto die hoc pharmacum sumpsit.

24. Confect. hamech.  $\mathfrak{z}\mathfrak{ss}$ . elect. de succo ros.  $\mathfrak{z}\text{i}$ . diagrid. gr. ii. Solvantur cum  $\mathfrak{z}\text{iv}$ . aq. scænic. F. potio octies multa & varia



egerint, quinto die denuo ad suffitum pervenimus, donec egregiè pituita ab ore deflueret, & os ac guttur ulcerarentur: & tunc præscripsimus aq. solan. aquifeti plantag. endiv. an. libb. diamori, mell. ros. colat an. ℥ii. m. M. pro gargarismo: post fumigium adhibitum fœda ulcera quæ habuit in membris genitalibus planè curata fuere. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 32.*

De suffumigiorum usu lege apud *Rondelet. libr. De morbo Gallico.* ubi etiam describitur hoc fumigium ad Ulcera Venerea.

Cinnabar. ℥i. benjoin. styrac. myrrh. oliban. oppopan. ℥ss. mastich. macis, thur. an. ℥ii. excipiantur terebinthina. F. fumigium. At ego (inquit *Rondeletius*) in ulceribus addo sandarac. vel auripigmentum potissimum cum ulcera in pulmonibus vel naribus, vel aliis partibus internis opinor esse.

Fit autem suffitus in hunc modum, æger cubiculo clauso in sellula nudus collocatur; (nos autem ægrum nostrum in cupa ad hoc parata subtus cum tabella lignea perforata, ut fumus ascenderet, capite extra cupam elato & cervice undique pannis recta) sic ut tanquam sub conopæo seu papilione totus pannis optimè circumductus sit, ut ne os quidem extet: tunc accensis carbonibus, uritur cinnabrium cum thure & cæteris correctivis: quo suffitu incalcescit æger mirum in modum ac sudat per horam integram ferè toties autem id tentandum, donec sicut in inunctionibus gingivæ putrescere & os ulceribus affici, & animus deficere quodammodo cæperit. Inter sudores, si deficere videatur, permittetur ut caput tantillum è pannis explicet modo id sæpe non faciat, fiat suffitus semel, bis ter in die, pro anni ratione, ægroantis viribus, & cæteris circumstantiis, ad evitandum animi deliquium, impones prius epithema cordiale: hoc remedium desiderat vires robustas, quia fortè est periculolum. Utimur suffumigio ad curationem ulcerum humidorum quæ difficilè consolidantur, vel etiam cum ulceris consolidationem accelerare volumus, ut fecit *Rondeletius* in quodam Nobili, quem 4. diebus curavit. *Petrus Forestus, schol. observ. 17. lib. 32.*

Quidam utuntur pilul. *Barbaross.* descri-

ptis à *Brondel. lib. de Morbo Gallico*, quas præbent illis qui non possunt ferre decocta. Fiunt in hunc modum.

℥i. Rhei agar. an. ℥ii. Aloes ℥i. argenti vivi ℥iij. extincti cum succo ros. cinnam. ambr. an. ℥i. myrrh. mastich. an. ℥i. cum terebinth. excipiantur & ex qualibet ℥. fiant pil. viii. capiat pro prima dosi dr. i. deinde dr. i. m. postremò dr. ii. possunt etiam aliter fieri ita.

℥i. Ladan. hypocist. an. dr. i. Aloes ℥i. Ambr. mos. an. ℥i. arg. vi. vino loti dr. ii. incorporantur cum syrup. ros. solut. F. pilula capiat dr. i. *Rodericus à Fonsecatoma. 2. consult. 88.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Lue Venerea.

**P**Uella quædam octodecim annorum penes Nobilem Herum Lue Venerea laborantem serviens, & cum ejusdem Concubina lecto communi utens, post varia symptomata nocturnorum dolorum, angustia pectoris, & similibus, tandem undique pustulis Gallicis & Condylomatibus in partibus obscænis inficitur. Hæc in Nosocomium recepta, ita sanitatem obtinuit: per triduum hic pulvis digestivus quotidie bis in brodio decoctionis rad. petrosel. fuit exhibitus.

℥i. Magist. tart. vitriol. ℥ii. pro dosi una Quarto die purgatio fuit instituta per mercur. dulc. ℥i. diagr. correct. gr. vii. tum conserv. rosat. vitriolata F. bolus: quo assumpto bis tantum per secessum operatio subsequuta fuit, corpore per digestivum præmissum mediocriter etiam respectu primarum viarum purificato, mox igitur ad ligni decoctum accessimus hoc modum.

℥i. Lign. guajac. quod singulari proprietate contra hunc morbum pugnat; farsaparill. majoris digestionis & incisionis gratia, an. libm. cortic. lig. ob singularem siccandi vim ℥im. F. decoctio (facta prius infusione per viginti quatuor horas in tribus aq. pluvialis mensuris, quarum quilibet quatuor libras habebat) lento igne, vaseque clauso coque ad consumptionem tertiz partis, ubi tempore medio coctionis majoris



joris incisionis & deterfionis gratia addantur rad. belen. ℥vi. baccar. juniperi, liquirit. raf. ℥ß. hujus decocti bibat ℥vi. cum sulph. aurat. diaphoretic. gr. xij. continuando ejus usum per triduum, eoque sudorem in lecto provocando, postea iterum purgetur hoc modo.

℥. Mercur. dulc. ℥i. diagrid. corr. gutr. gamandr. an. gr. vi. croci metall. ritè præp. gr. iij. M. & cum pauxillo conserv. rosac. exhibeatur haustu calido brodii pisorum superaddito, cujus operatio semel per vomitum absque difficultate, & sexies per alvum successit: intermisso demum unico dies continuos rursus sumpsit decoctum sudoriferum cum gr. xij. sulphur. aurati diaphoretic. subsequente tandem hoc cathartico.

℥. Merc. dulc. g. xxvi. croci metall. gr. v. diag. gr. viii. M. pro dosi, qua sexies per alvum tantum evacuatio facta est, hinc per octiduum reiteratum fuit decoctum sudoriferum, ut supra cum additione; subsequente etiam superiore cathartico, repetitum rursus per aliud octiduum decoctum ut supra; & rursus instituta fuit purgatio per merc. d. ℥i. gutt. gamandr. gr. ix. croci metall. gr. vi. conf. rosac. ℥ii. M. aliquando adhibitum fuit balneum sudoriferum, humectata etiam aliquoties fuere condylomata, externæ pustulæ & exulcerationes aqua caustica mercuriali, atque his remediis tam internis quam externis restituta nostra ægra post duos menses ad suos sana rediit. *Gregorius Horstius, observ. 3. lib. 7.*

Fœmina prægnans ad mensem quintum viginti quatuor annorum, rhagades & fissuras exulceratas in partibus obscænis, exulcerationem in ore malignam, cum præeunte lassitudine totius, & doloribus artuum nocturnis patitur, conclusum est, cum prægnans esset medio gestationis tempore, quo purgatione potius, quam in primis vel ultimis mensibus conceduntur, patientem hanc luis curationem subire posse, mox igitur præparationis gratia, sequens pulvis exhibebatur.

℥. Cremor. tartar. ℥i. sæculæ Aronis, brionæ, an. ℥ß. M. pro dosi, die sequenti purgabatur sic.

℥. Mercur. d. ℥i. diagrid. corr. gr. vii. M. cum conserv. rosac. quo sumpto quater per secessum operatio sequebatur, die seq.

quietem concessimus; corroborandi fœtus gratia balsami embryonum cochlearia aliquot concedendo. Deinde per novem dies potionem sudoriferam ex decoct. ligni ℥vi. cum sulph. aurat. diaphor. ℥ß. Sumebat quotidie sudoris provocandi gratia, postea materiam intus digestam per alvum exturbare conati sumus sequenti bolo.

℥. Merc. d. ℥i. diagrid. præp. gr. vi. conserv. rosac. vitriol. ℥ii. M. hoc septies per alvum operante, sequente biduo sudoriferum reiteratum fuit, exhibitum deinde propter obstructions alvi hoc purgans.

℥. Merc. d. ℥i. diagrid. præp. gr. vi. Aloes succotr. gr. iv. cum aq. beton. F. pilulæ parvæ, quibus assumptis sexies alvus deponabatur, evanescente bilis erustatione, capitisque dolore, consequenter decoctum cum sulph. aurato per novendum fuit continuatum; vicissim postea instituta evacuatione per bolum sequentem.

℥. Merc. d. ℥i. diagrid. gr. vii. conserv. ros. vitriol. ℥ii. M. tandem sudores eodem decocto per octiduum adhuc continuavit, adhibitis interim exterius quoque necessariis remediis, ubi propter oris exulcerationes frequens fuit usus sequentis mundificativi.

℥. Mell. ros. colat. ℥ii. rob. mororum dianuc. an. ℥ß. unguenti Ægyptiaci, ℥iii. M. post usum convenientis gargarismatis frequenter adhibeatur, partibus obscænis sequens unguentum frequenter fuit adhibitum.

℥. Unguenti alb. camphor. ℥ß. Merc. dulc. ℥i. optime misceantur; sic penitus divina benedictione, restituta, sanguinem hætenus tot sudoribus incalescentem, temperare conata fuit venæsectione septimo circiter gestationis tempore instituta, fœtus potissimum gratia, quo faciliiori transpiratu, conveniens partus tempus expectare posset, quod incidebat nono mense, quo puellum sanum & adhuc viventem peperit. *Gregor. Horstius, observ. 4. lib. 7. Vide Guil. Fabricius Hildanus, obser. 97. cent. 5.*



## SUBSECTIO QUINTA.

## De Lue Venerea.

**M**ultas gravidas in quibus erat luis venereæ suspicio, aut quarum fœtus ex patre inquinato susceptus fuerat, decoctoligni sancti, radic. chynæ, ligni sassafras; aut radic. sarsaparill. per quadraginta dies assumpto cum diætâ convenienti feliciter percuravimus: imo plurimas in quibus major erat istius mali labes vidimus inunctiones ex hydrargyro, aut emplastra mercuriata cum sputationibus constanter & impune sustinuisse ab Empiricis instituta ubi enim adsunt causæ morbiicæ, adversus quas valentioribus remediis est pugnandum non est dubium quin natura mediocriter robusta magis levetur ex eorum usu, quam opprimatur: quia concurrat simul cum illis ad conflictum istum, perficiendum, & post partam victoriam feliciter conquiescit, quam si pessimarum illarum dispositionum insultibus ad finem usque impregnationis conflictetur. *Ioh. Varandæus, lib. 2. De morb. Mulier. cap. 2.*

Celebris quidam medicus in Galliis ita procedebat in hujus luis curatione, primo vomitorium per biduum exhibet, tertio die purgatio per extractum catholicum instituitur: quarto aurum diaphoreticum cum theriaca & pulvere serpentum exhibetur, postea totum corpus aqua mercuriali sudorifera inungitur, linteis æger involvitur, & sudor quotidie provocatur, auri diaphoretici descriptio talis est.

℥℥. Mercur. vivi opt. & purificati, ℥i℥. auri puri, ℥i. hoc solvatur aqua regis; mercurius verò aqua forti: conjunge solutiones, & distilla aquositate per balneum: in fundo remanebit præcipitatum quod edulcoretur aqua calida: descriptio aquæ mercurialis sudoriferæ talis est.

℥℥. Mercur. sublimat. ℥ii. arsenic. alb. ℥i. euphorb. ℥ii. spirit. vini opt. ℔ii. aq. ros. ℥xi. i. digere per viginti quatuor horas. Postea toti corpori penna illinatur. *Gregorius Horstius Observ. 13. lib. 7.*

*Dom. Petrus Fuhrmannus* in luis venereæ curatione hunc ordinem servavit, disposuit corpus primùm ad evacuationem per no-

dulum, triduo post, vomitorium suum valde sibi in usu Medico familiare administravit: tum de merc. dulci gr. xxx. plus minus pro subjecti habilitate, in conserv. rosac. & Confect. alKerm. exhibuit, & si postridie salivare cæperunt ægri (quod symptoma ipsis familiare esse solet in materiæ illius vitiosæ commotione) cessat ab ulteriore remedium applicatione, ægros interim tenuissimè aut omninò non cibans donec saliva fluere desit, si verò tertio die à prima mercurii exhibitione nondum saliva fluxit, iterum exhibuit prædictum mercurium, sed aucta dosi ad gr. vi. vel viii. si pariter hac exhibitione nihil secutum est, tertia vice dedit, temporis simul & augmenti observata proportionem: dum fluxit saliva quievit, conquerentibus autem de faucium & palati exulceratione & vacillatione dentium (quod malum nemo adhuc à mercurio arte potuit avertere) gargarismum fecit ex astringentibus aquis, & alumine: ulcera si adfuerunt, curavit elui aquis veronicæ & rosar. in quibus aliquid mercurii sublimati communis solutum fuit finito palati fluxu, decoctum ligni dedit, & sudoribus discussit si quid fuit residuum. Hic *Dom. Fuhrmanni* erat modus. *Andreas Schiling. in epist. ad Greg. Horstium, pro observ. 12. lib. 7.*

Scatebat quidam è grege mendicabulorum lue venerea, aliquot diebus universum corpus equino fimo obruit, ut tantum esset qua respiraret: erat stercus stabularium equino lotio sæpius perfusum, quodque jam computruerat: effecit ille hac arte, ut totum virus exprimeret; addidit aliquoties enchruston ex axungia larigna & hydrargyro, nec alia vitæ sex servata, quam mantica offerebat, atque his remediis curatus est. *Job. Hollerius, lib. 1. instit. Chirurg. capit. 2.*

Ab initio curationis ad finem usque continuus debet esse usus decoctionis sequentis pro potu & pro sudoribus movendis.

℥℥. Rad. sarsaparill. ℥iv. rad. chinæ ℥ii. polipod. q. & cichor. an. ℥℥. infund. in aqu. ℔x. per quatuor horas; coque deinde sub finem addendo pulv. tartar. alb. ℥iii. fol. fragar. pimpinell. an. M. j. liquir ℥℥. cinnam. ℥i. F. ebullitio & paretur s. a. decoctum quod præcipuum est alexiterium luis



luis veneræ, nec ingratum gustui ut olim ex guajaco parabantur: cogatur æger si fieri potest haurire hujus decocti ad lbij. vel vi. in die *St. Jaques*.

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Lue Venerea.*

**V**idi juvenem, qui cum à recenti hoc morbo convalescere per potionem guajaci ex aqua non potuisset, ab antiquo liberatus est per potionem ejusdem ex vino: soleo ego recipere ligni guajaci lbj. aquæ lbvj. & facta maceratione totos tres dies, decoquere usque ad aquæ ferè consumptionem, deinde conicere vini lbiiß. & colaturam facere per torcolare expressum, vinum enim decoctum mutat omnino vires. *Christophorus Guarinonius, consult. 315.*

Ex juniperini ligni admodum odorati & nonnihil acris decoctione pauperes lue hac infectos aliquos sanavi: sumendo scobis vel rasuræ illius non tantum, quantum guajaci, cum efficacius ferè sit, sed medium vel tres saltem illius partes, & cum aquæ lbij. eodem penitus modo uti guajacum coquendo, & utendo: cui & guajacum, china, & sarfa addi possunt: egregium sanè sudatorium & innoxium.

Chymicus & Empiricus insignis felici successu sequenti electuario luem hanc curabat; continuando usum ejus in robustioribus manè & vesperi per quindecim dies.

24. Cortic. guajac. ʒiv. lign. ejusdem, ebe-  
ni, quercus, aut buxi, an. ʒvi. sarsapa-  
rill. ʒvi. hermodactyl. ʒiv. turbith. gum-  
mos. ʒii. cariophyll. ʒii. anis ʒi. sassaphr.  
ʒiii. fol. sen. ʒvi. aque lbvj. stent in cine-  
ribus calidis per diem unum aut alterum,  
colentur, postea iterum affundatur aquæ  
eadem quantitas, bulliant ad tertiæ partis  
consumptionem, expressione facta, prima  
infusio cum hoc decocto misceatur; per  
evaporationem lento igne factam ad syrup.  
consistentiam inspissatis addantur mell.  
opt. despumati & inspissati parum ʒiv. pul.  
verum sarsaparill. fol. sen. hermodactyl.  
an. ʒß. turbith. gummos. rad. jalap. an. ʒiii.  
cariophyll. ʒi. extract. scammon. ʒii. F.

electuar. dosis à ʒiß. ad ʒii. & ʒiii. æger  
quamdiu hoc electuario utitur, bibat de-  
coctum factum ex sarsaparill. china, her-  
modactyl. aniso, cariophyll. & guajaco.  
*Felix Platerus, prax. med. tom. 3. pag. 429.*  
¶ 438.

Auriga militaris uxorem lue venerea in-  
fecit: hæc verò remedii penuria in ulcus ex-  
cedens sese distendit, unum saltem vidi ab  
aure in cervicem, humerum, & cubitum,  
pone per omoplatas, totum latus costarum  
& thoracem devastans, exhibeo corallatum  
*Paracelsi* per albumen ovi paratum, & vi-  
ginti sex diebus tota convaluit, ingentia e-  
nim ulcera festinato impetu pelle tegebantur.  
*Joh. Helmontius tractat. cui tit. De*  
*causis & initiis naturalium.*

Lues venerea facile sequenti remedio cu-  
rari potest absque sudoribus, absque ptya-  
lismo, absque inunctionibus, licetque nec  
cubili nec cubiculo immorentur, modus est  
ejusmodi.

24. Antimonium, & sarsaparill. an. ʒvi.  
antimonium nodulo inclusum in sex a-  
quæ amphoris, in quibus sit sarsaparilla  
cum quadraginta uncum putaminibus &  
hylis, suspensum coque ad tertias, ejusque  
decocto utatur æger, capiendo ter in die,  
manè meridiè & vesperi, haustum sumendo  
longè à cibis: antimonium autem qua-  
ter utile esse poterit. *Petrus Borellus, obs.*  
*29. cent. 2. Videatur Lazarus Riverius obs.*  
*29. cent. 4.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

*Pro Lue Venerea.*

**P**remisso minorativo, consulvi ut san-  
guinem mitteret ex cubito dextro: dein-  
de sequens apozema pro quatuor matuti-  
nis inunxi.

24. Rad. cichor. polipod. enul. an. dr. x.  
liquirit. ras. ireos, an. ʒj. fol. fumar.  
scabios. bugl. cich. dent. leonis, acetos.  
capill. ven. chamæd. chamepit. an. M.  
j. epithymi ʒß. sem. anis. cartam. contus. an.  
dr. iii. passul. enucleat. ʒß. prunor. damasc. h.  
p. x. fol. sen. mand. ʒi. rhei elagar. troch.  
an. dr. ij. rhab. monach. rhapont. an. dr. vi.  
F. decoctio in q. s. aq. fontis ad ʒxi. in colat.  
dissolv. syrup. de polipod. epithym. an. dr. vi  
syrup.



syrop. diſereos roſ. ſolut. an. ꝑiſſ. crem. tartar. ꝑi. aq. cinnamom. ꝑi. M. F. apoxema, bene excrevit, beneque tulit.

Corpore ſic rite purgato, aſſumpſit mane in lecto probè tectus ꝑv. decocti hujus ſudatorii: & ab hora ſexta uſque ad ſeptimam cum copia ſudor motus eſt.

ꝑ. Limatur lign. guajaci ꝑiv. cortic. lign. ꝑiſſ. rad. ſarſapar. ꝑi. aq. fontis ꝑbx. M. infund. per horas viginti quatuor; bulliant ad conſumptionem medietatis, colat adde ſol. cichor. fumar. cuſcut. an. M. j. bull. unica ebullitione: colatura ſervetur pro decocto.

ꝑ. Reſid. dicti decocti; aq. ꝑbxv. coq. ad tertias, adde ſem. anif. coriandr. præp. cinnam. an. ꝑi. paſſul. enucleat. ꝑiv colatura ſit potus ordinarius vitetur vinum ſicut venenum: hora rurfus tertia pomeridiana aſſumat decocti ſudoriferi ꝑiv. expectando ſudores in lecto, & ſic indies provocetur ſudor bis, interim contra faucium & palati ulcera hoc præſcriptum gargarisma.

ꝑ. Diamor. dianuc. an. ꝑvi. mell. roſat. colat. ꝑi. alumin. uſt. vitriol. alb. an. ꝑi. aq. prunel. plantag. & roſ. an. ꝑiii. M. F. gargarisma.

Pro condylomatibus anique ficibus unguentum tale ſubminiſtravi.

ꝑ. Terebinth. ꝑvi. thur. maſtich. an. ꝑj. myrrh. minii. an. ꝑi. ol. nuc. laurin. an. ꝑß. ceræ q. ſ. F. unguentum.

Per ꝑ. ſeptimanas ſudoriferis dedit operam; ſubinde alvum ex ſudore conſtipatam catharticis ſolvendo: cum verò curationis per ſudores pertæſus eſſet, ſemel in die pro diſcutiendis luis reliquiis ante fornacem in juncturis brachiorum, axillarum & lumborum regione inungebatur ſequenti unguento, inunctuſque linteo obvolutus lectoque impoſitus ſudorem ciebat.

ꝑ. Unguenti martiati, axung. porcine pingued. gallin. an. ꝑi. mercur. vivi opt. agitati ꝑvi. thuris, maſtich. an. ꝑii. Lithargyr. minii an. ꝑiſſ. tartar. vini, alumin. an. ꝑi. aq. vitæ ꝑii. ol. laurin. ꝑiſſ. ol. ſpic. gr. vi. camphor. gr. v. M. ſ. unguentum, poſtquam per quatrimum inunctionibus uſus fuiſſet, ſputatio admodum copioſa ſecuta eſt, ita ut unius fere horæ ſpatio pelvim impleret. Interim contra fauces in

inflammatas & tumidas uſus eſt præſcripto gargarifmate: ad reliquiarum evacuationem has pilulas ſumpſit.

ꝑ. Pil. de agar. ſine quibus, an. ꝑi. pil. foetid. de hermodact. an. ꝑß. diagrid. præp. gr. iii. M. F. pilulæ num. 13. deaurentur, & ſic tandem cunvaluit. *Ioh. Petrus Lotichius, obſ. 3. c. 5. lib. 6.*

Quantitas argenti viv. in unguent. hæc ferè obſervatur, ut pro ꝑbi. unguenti excipiantur ejus ꝑii. quæ media erit argenti vivi, pro decenti actione edenda, in corpore non nimium debilitato, quantitas; quam & augere vel minuere pro ratione conſtitutionum atque operationis modò licebit. *Felix Platerus præx. med. tom. 3. c. 4. p. 442.*

Singulis vicibus ꝑii. vel ꝑiv. unguenti uſurpentur: tempus inunctionis commodiſſimum eſt vernum, atque autumnus: hiems & æſtas minus commoda ſunt: inſtituenda eſt inunctio tempore matutino jeuno ſtomacho & incipiendum à partibus inferioribus, & ad ſuperiores tranſeundum. Rarò bis eodem die inunctio inſtituitur: tandiu continuando inunctio donec ſalivatio vel alvi fluxus, vel alia evacuatione ſuccedat, ac ſymptomata minuantur & ceſſent: & quidem ſi alvi fluxus accidit, is non ſtatim ſupprimendus: ne tamen inteſtina aliquid dampniantur, cavendum, infundendo per clyſteres lac chalybeatum, vel ſuccum ptiſanæ cum lacte, vel decoctum hordei, & poſtea ſi opus ſit, veniendum ad aſtringentia.

Sudores nonnulli promovendos cenſent: verum ſi natura ad ſalivationem tendat ſudorem, ciere non convenit, ne contrarii motus fiant. Si verò natura ſpontè ad ſudores tendat, nec id prohibendum: ultra tres dies, una vice vix continuanda inunctio: nonnunquam etiam ſtatim gravia ſequuntur ſymptomata, ut magna oris ulcera, linguæ ac faucium tumores ac inflammatio, deglutio læſa, dentium commotio, maximus virulenti humoris ex ore fluxus, diarrhæa vel diſenteria & tunc ſtatim ab inunctione ceſſandum. Ubi inunctio jam perfectæ eſt, ſputumque bene procedit, partes inunctæ abluantur vino, in quo ſalvia, flor. ſtachad. roriſmar. chamæpit. ſol. laur. calamenth. origan. cocta fuerint: poſtea impo.



imponendum aliquod emplastrum nervinum.

Tandem in unctione peracta danda opera, ne mercurius in corpore relinquitur, & aliquid mali vel ori vel aliis partibus attrahatur: ideoque laconico sudores promovendi auri nummi in ore retinendi, auri ramenta potanda, vel pilulæ ex auri foliis paratæ deglutiendæ imbibitur enim mercur. ab auro, & cum eo e corpore evacuetur, atque ita ne quid mali excitatur, præcavetur: post inunctionem, à curatione non statim desistendum, sed decoctum ligni, utpotè morbi hujus alexipharmacum, ad huc diebus aliquot propinandum; quod si intermittatus, facile recidiva subsequi solet. *Daniel Senertus, practic. lib. 6. part. 4. cap. 21.*

Medicus quidam clarissimus argentum vivum in corpore delitescens feliciter evocabat in plurimis, siue aurifabri fuissent, siue ex lue per unctiones curati, hoc suffumigio; grana juniperi q. v. coquebat in aq. vase probè clauso, ad quartæ partis consumptionem; vapore deinde suffumigabat ægrum, & toto corpore, & ore præcipuè excepto, plura huic intentioni vidi apud *Zacut. Lusit. lib. 2. prax. admir. observ. 136. & Bened. Silvatic. cent. 1. consult. 34. Hieron. Reusnerius observ. 174.*

## SUBSECTIO OCTAUA.

### Pro Lue Venerea.

**A** Me curata est lue venerea in pluribus decocto ex sudoriferis & purgantibus per viginti dies usurpato: si hæc non sufficerent, ad frictiones ex unguento mercuriali veniebam: multi in media hieme, hoc solo decocto curati sunt, quibus diæta sudorifica administrari non poterat propter aeris inclementiam *Lazarus Riverius, obs. 78. cent. 1.*

Puer natus triginta menses lue venerea laborans, & fœda scabie totum corpus occupante, sequentibus remediis curatus est.

℞. Raf. lign. guajac. ℥ii. aq. font. ℔iii. infund. per viginti quatuor horas, deinde bulliant ad tertiæ partis consumptionem; colature capiat ℥iii. singulis diebus mane, duabus horis ante pastum, corpus

tegendo paulo plus solito, & continuando per viginti dies.

℞. Diagrid. pulver. gr. vi. calomelan. gr. v. fiat pulvis tenuiss. detur cum cochleari uno vel altero panatellæ saccharatæ, superbibendo parùm jusculi, continuetur hoc remedium quinto quoque die, augendo dosin utriusque medicamenti juxta operationem.

℞. Residentiam prædicti decocti, aqua fontis ℔iii. F. bochetum pro potu ordinario addendo sacch. & liquir. q. s. ad saporis gratiam hi remediis per mensem continuatis probe convaleuit. *Lazarus Riverius, obs. 95. cent. 2.*

Mercator quidam lue venerea laborans ab aliquot mensibus à me curatus est, sine ullo alio remediorum apparatu, per opiatam *Neapolitanam Renodæi*, cui addebam singulis diebus mercurii præcipitati albi cum spiritu sulphur. præp. ℔ß. & per intervalla exhibebam calomel. turqueti seu merc. d. sexies sublimati ℔i. cum resin. scammon. gr. xij. in forma pilulari, cum usu Bocheti ex decocto guajaci & sarsæ per viginti dies, multos etiam alios curavimus usu solius opiatæ prædictæ cum mercurio prædicto & decocto sarsæ parillæ per longum tempus quibus autem alvus multum movebatur, illi tantum alternis diebus sumebant prædictæ opiatæ ℥ß. *Simeon Iacoz. obs. 91. cent. 4. obs. Riverii.*

Puellæ duæ quarum major vix attigerat quintum, minor verò tertium ætatis annum, laborabat lue venerea per contagium suscepta cum ulceribus multis in ore & pudendis, nec non pustulis & fœda scabie per totum corpus erumpentibus, frustra exhibitum fuerat decoctum guajacini per mensem integrum à perito Chirurgo. Vocatus ego, intra quindecim dies prædictas puellas curavi mercurio præcipitato albo; exhibendo scilicet singulis diebus majori puellæ gr. vi. minori verò gr. iv. augendo tamen utriusque dosin aliquando juxta operationem, quæ talis fuit, ut utraque singulis diebus bis aut ter alvum deponeret, nec vomitus ullus nec pyralisimus unquam subsequutus est, perseverabant per dictum tempus in usu Bocheti. *Simeon Iacoz. observ. 16.*

Mulier lue venerea infecta puellum peperit



perit pustulis & ulceribus in variis partibus affectum qui curatus fuit præcipitato albo ad gr. ij. vel iii. exhibito cum saccharo & lacte singulis vel alternis diebus continuando per mensem integrum, incepta est remedii exhibitio quindecimo nativitatis die. *Samuel Formius, observ. 26.*

*Henricus* tertius *Gallorum* rex lue venerea laborans à medicis ordinariis curari non poterat. Monitus fuit *Penam* tunc temporis *Lutetiae* medicinam facientem multos ab hoc morbo liberare remedio peculiari quod à quodam *Turca* didicerat; illum vocari iussit: ab eoque curatus est. Remedium tale erat.

℞. Rad. bardanæ in taleolas sectæ, ℥. vii. vini alb. & aq. fontis ℔ii. bulliant ad media partis consumptionem, addendo sub finem sem. mund. ℥i. vel ℥i℥. pro dispositione ægrotantis, colaturæ capiat manè ℔ss. sudores provocando cum filicibus majoribus calidis linteis obvolutis, quorum unus admoveatur plantis pedum, duo tibiis, duo cruribus, duo juxta medium parte exteriori, & duo juxta humeros, probè tegendo ægrum sudores copiosi excitantur per horam unam cum dimidia & circa vespam alvus solvitur bis aut ter: hoc remedium præmissis universalibus usurpabatur per spatium quindecim aut viginti dierum. Postea capiebat manè singulis diebus decoctum bardanæ sine sena & sine ullo regimine per mensem integrum aut dies quadraginta. *Samuel Formius, obs. 41.*

Curatus à me est puer quinque annorum præcipitato albo ad gr. iv. exhibito singulis diebus per viginti dies cum panatella, per inferiora tantum purgabat, neque ullus unquam secutus est ptyalismus. *Samuel Formius, observ. 51.*

Chirurgos interdum errare contingit in lue venereæ curatione, quando post ordinaria remedia convenienter usurpata, ægros perfecte curatos non esse existimant quod adhuc quædam symptomata luem veneream comitantia, apparere non desinant unde ægros interdum in nova tormenta conjiciunt, & in atrophiam aut tabem præcipitant, cum tamen illa symptomata sponte dispareant, aut levibus quibusdam topicis remediis discutiantur.

Dum essem *Lutetiae* apud *D. Helotum* Chi-

rurgum peritissimum, Nobilis quidam *Parisensis*, temperamento melancholicus se illi curandum tradidit, qui præter dolores nocturnos, aliaque luis venereæ symptomata, tumorem patiebatur in cervice ex pituita & melancholia genitum: post inunctionem ex unguento mercuriali, copiosus fuit ptyalismus, & omnia luis venereæ symptomata prorsus abolita sunt uno excepto tumore, cujus duæ tertiæ partes discussæ fuerunt: existimabat æger se non esse curatum propter tumorem superstitem: ab alio tamen Chirurgo seniori ad hanc rem vocato confirmatus fuit, & admoto emplastro de vigo quadruplicato mercurio, tumor discussus est spatio unius mensis.

Alter vir Nobilis curæ meæ commissus, absoluta ptyalismo, se non curatum esse putabat, quod ulcus in cervice & regione œsophagi remaneret, hoc tamen ulcus remediis vulgaribus intra mensem curatum est, sine ullo remedio luem veneream respiciente. *Dionysius Pomaret, observ. 16.*

Puerulus quidam duos annos natus à nutrice infectus fuit lue Venerea, quæ se se prodidit primum pustulis latis & rubris in perinaeo acervatis, iisque successerunt ulcera in natibus juxta podicem, mox pustulae in facie, ac tandem ulcera in faucibus & labiis: quibus accedebat corporis consumptio in die progrediens. Vocatus ad eum sequentia præscripti.

℞. Sen. mund. ℥i℥. rheel. & agar. rec. trochisc. an. ℥ii. cinnam. ℔. Infund. in aq. Card. bened. in express. dissolv. ros. ℥i. f. portio, detur manè, & reitetur semel in septimana.

Diebus intermediis utebatur sequenti decocto.

℞. Ligni guajac. ℥i. cortic. ejusd. ℥ss. aq. font. ℔. iij. Infund. & decoquantur ut a. e. ad tertiās. Colaturæ capiat ℥iv. manè sine sudore, propter aeris inclementiam, hyems enim vigeat, tum etiam metuebam nimiam exsiccationem propter corpus tenellum, eaque ratione victum etiam an alepticum concedebam Eodem decocto propotum utebatur, sed diluto æquali aquæ portione. Cum hæc remedia continuasset per viginti dies, omnia symptomata



ta disparuerunt; ægerque in ipso remedium usu refectus & denuò impinguatus fuit, accuratus omnino videbatur. Attamen intra mensem dicta symptomata redierunt, ægerque denuò extenuatus est. Nos iterare iussimus eadem remedia; decoctum tamen efficacius paulò efficiendo, coctione facta ad medias cumque stragulis operiebamus, ut saltem leviter sudaret. Hac cura iterum restitutus fuit intra 15. dies, quam tamen diutius continuassemus metu recidivæ, nisi rigidissima hyems quæ tunc etiam vigeat, obstitisset. Intermissa itaque remedium usu per viginti dies aut circiter, ulcera renovata sunt. Et cum tunc cælum esset satis temperatum, curam iterum instauramus, sed efficaciorē. Exhibemus itaque primū mercur. d. gr. viij. cum diagrid. gr. iv. iusculo, quo valde purgatus est per vomitum & secessum; & quarto quoque die hoc medicamentum exhibebatur. Intermediis verò diebus sumebat decoctum hoc modo paratum. Supradicta guajaci & corticis ejusdem quantitas ponebatur in alembico cum aq. lb. β. Infundebatur per diem naturalem, ac postea destillabatur ad medias, juncturis alembici & recipientis probè munitis. Liqueor superstes in alembico colatus, miscebatur cum aqua destillata, quæ erat acidula. Hujus mixturæ dabantur ℥iv. manè calidè corpus tegendo, & sudores copiosiores effluebant. Per viginti dies continuata fuit hæc postrema curatio ex qua morbus fuit omnino sublatus. Ulceribus narium admovebatur unguentum ex melle rosaceo, vitellis ovor. & terebinthina. Faucium verò ulcera brevi curabantur melle rosaceo cum spir. vitrioli acido reddito. *Lazarus Riverius, observ. 95. cent. 1.*

Mercator quidam per *Poloniam*, iter faciens in lecto cauponis de lue venerea suspecti inscius decumbens eundem morbum contraxit. Is cum non auderet ob desponsatam sibi virginem honestissimam ordinariæ curationi & laconico se committere, remedium petiit, quo absque custodia & clanculum quasi restitui posset. Cum malum adhuc recens esset, purgato corpore cerevisia ex alexipharmacis quibusdam & appropriatis medicata, rem tentan-

dam esse duxi, ad proinde nodulum tonnæ dimidiæ, cerevisia recenti immergendum, & probè fermentandum præscripti.

℥. Ras. lign. sanct. lbii. cortic. lign. sanct. lb. rad. chin. ℥vi. Sarsæ ℥viii. Sassafr. ℥vi. cinnam. acutiss. ℥ii. sem. anis. scenic. an. ℥i. cortic. citr. ℥ii. Grosso modo incisa & conquassata indantur sacco oblongo ex sindone alb. peracta fermentatione: loco potus ordinarii bibit hanc cerevisiam palato non ingratam per menses duos & amplius; interjectis tamen per intervalla purgantibus, & assumpto singulis matutinis & vespertinis hoc Electuario.

℥. Pulv. lign. sanct. ℥iv. cortic. ejusdem ℥i. Sarsæ ℥ii. Chinæ ℥i. conserv. rad. cichor. lb. β. conserv. ros. rubr. ℥iv. confer. flor. salv. roris mar. an. ℥ii. condit. myrobal. emblic. num. 5. rad. scorzoner. condit. ℥iii. cortic. citr. condit. ℥i. spec. diatr. santal. diarrhod. abbat. an. driii. M. cum syrup. cortic. citri q. s. f. Electuarium. Tam paucis & levibus remediis bonæ valetudini restitutus est vir optimus; quæ ipsa deinceps etiam in aliis expertus sum pari successu, sed morbo in prima, quod dicitur, herba suffocato: inveterati enim asperior & laboriosior est curatio. *Baldassar Timæus. Casu 3. lib. 7.*

Juvenis quidam bilioso ac melancholico temperamento præditus, lue Venerea infectus mense Junio, aggressus est dietam sudorificam, eaque peracta frictiones ex unguento mercuriali celebratæ fuerunt. Post secundam frictionem, cum ptyalismus rite procederet, subito correptus est contractione brachiorum & tibiarum, cum tensione ingenti abdominis, & suffocatione, subitoque ptyalismus cessavit. Frictiones vehementes celebratæ sunt in partibus contractis, aqua imperialis & cinnamomi exhibitæ, quæ nihil præstiterunt. Postea aquam nostram theriacalem ex spiritu vini conflata exhibuimus, à qua plurimum levatus est; & injecto clystere acri paroxysmus desit. Post biduum, cum parum spueret, admota fuerunt emplastra mercurialia tibiis, femoribus & brachiis, quæ intra viginti quatuor horas sputum satis copiosè promoverunt. At æger in prædictum paroxysmum incidit. Cum verò frictiones celebratæ fuisset.



fuiſſent, & prædicta aqua exhibita, tum clyſter injectus qui non poterat ejici, ſuppoſitoriis nullo modo levabatur, ſed omnino ſuffocari videbatur. Nos alium clyſterem acriorem ex diaphœnic. & hier. an. ℥iij. injici curavimus, quem ſecuta eſt copioſa evacuationo, & æger à paroxyſmo liberatus eſt. Sequenti die præcedente ptyaliſmo iterum ineundem paroxyſmum, incidit, cæteris multò gravioſiorem: nam nec aqua theriacali, nec clyſteribus iteratis, quibus etiam multum dejecerat, potuerit ſedari. Tandem, cum ab initio cenſuiſſem hæc ſymptomata provenire ex eo, quòd excrementorum colluvies ſuperiora petens in ventriculo colligeretur, & non poſſet per os expurgari ob ſui craſſitiem, vel facultatis expulſtricis imbecillitatem, & magna copia cummulata ac malignitate prædicta ventriculi oriſcium vellicaret, unde ortæ convulſiones per conſenſum generis nervoſi; tum etiam ex prædicta materia à calore exagitata multi vapores elevarentur, qui ventriculum diſtendentes diaphragma comprimerent unde ſuffocatio & tenſio abdominis ſequebatur. Venterculum eſſe evacuandum judicavimus prompto & potenti remedio. Atque in hunc finem exhibuimus ſalis vitrioli ℥i. in aqua diſſolutum, qua intra horæ quadrantem humoris pituitoſi, viſcidi & craſſi cum melancholico permixti circiter ℔iij. rejecit, & ſtatim à paroxyſmo liberatus eſt. Poſtea continuavit ptyaliſmus per multos dies ſine alio ſymptomate, ſicque integrè liberatus eſt. *Lazarus Riverius, obſerv. 77. cent. 1.*

Juvenis quidam robuſtus morbo Gallico infectus repurgato corpore, ac optima inſtituta victus ratione, unguento mercuriali octies inunctus fuit, & ſanitatem obtinuit. Verum ut hic oris ſcæditatem & ulcera effugeret, quum mihi compertum eſſet humores in motu eſſe catapotia ei propinavi. Id autem poſt ſecundam vel tertiam inunctionem facere ſoleo: nam eo tempore humores rebelles, & qui vix medicamentis purgatoriis obediunt, commoti & ad expulſionem acti, à catapotiiſ propinatis facillime foras per inferiora truduntur. Quo fit ut ſuperiores partes immunes & liberæ maneat, nec ita infici ſoleant, ut per conſuetos ſimileſque inunctiones contingit. Cum

ægrific ore infecti ulcera in eo patiuntur, & multa & varia ad multos dies expuunt, non loquuntur, vix liquida deglutire poſſunt, dentes tremulos habent, qui poſtea nigerrimi evadunt, unde oris fœtor certus pullulat. Quæ omnia, vel eorum magna pars, catapotiiſ vel pharmaco præviſivo opportuno tempore exhibitò intercipiuntur, ut ſæpe experientia compertum habemus. *Amatus Luſitanus, curat. 22. cent. 5.*

Qui patiebatur morbum Gallicum, poſt remedia adhibita melius habuit. Cæterum circa cream, i. e. tibiæ anteriorem partem ſemper doluit. Multa & varia topica remedia, aliquando calida, aliquando frigida, admota ſunt, ſed fruſtra imò ad opium perventum eſt, ſed nihil contulit. Proinde conſiderans eo in loco nullum eſſe humorem, nullam qualitatem manifeſtam, in mentem venit, qualitatem venenofam aliquam à maligno humore derelictam tibiæ particulam illam infeſtare, pro qua abigenda theriacam ſummum futuram antidotum conjeſto, & revèra à ratiocinatione hæc mea minimè ſum defraudatus, cum poſt applicitam theriacam dolor ita evanuerit, ut muſ conſpecto fele. In ſimilibus doloribus quoties theriaca non opitulatur, illi adjungendum ſuadeo oleum ex guaiaco ligno paratum. *Amatus Luſitanus, curat. 72. cent. 5.*

Pulvis hic eſt efficax contra reliquias luiſ Venereæ, qua ego ſæpe uſus ſum feliciter.

℥℥. Pulv. ſarſæ ℥iij. Antimon. diaphoret. ℥i. Pulv. viper. ℥iij. M. f. pulvis Doſis ℥iſſ. vel ℥iij. ex paucò vino albo manè.

Sine ptyaliſmo quandoque poteſt hic morbus curari in hunc modum. Purgetur patiens, poſtea balneetur, dein rurfus purgetur. Pro potu utatur decocto ligni, in juſculis ſarſa, & pulvere ſarſæ, & ſem. dauci in pane. Hoc etiam utatur pulvere.

℥℥. Carnis viperin. antimon. diaphoret. ſarſaparill. fol. chamædr. an. part. æq. M. f. pulvis. Capiat ℥i. manè & vèſperi. Tandem tradatur balneo, & rurfus purgetur. *D. Rubertus Cuminghame in M. S.*

Aqua ſequens theriacaliſ valde efficax ad conterendas luiſ Venereæ reliquias & præſervandas nutrices.

℥℥. Theriac. vet. Miſchrid. an. ℥iv. ſucci acc-



acetos. pimpinell. eupator. Card. bened. salv. an. ℥iv. flor. stæch. p. j. puleg. gram. Card. bened. an. p. j. ling. guajac. lbj. Cortic. ejusd. ℥iij. Macerentur in lbiv. Aq. font. ubi prius vino irroraveris, & destillentur omnia simul contusa. Hujus aquæ ℥iij. cum ℥j. syrup. viol. mirificè præservant nutrices. Et ne ex virulento infantis ore nutrix eodem contagio afficiatur, ante lactis suctum papillam abluere oportet aqua plantag. aut aluminosa; post suctum verò aqua calidà. Idque diligenter observandum. *Ludovico Mercatus, lib. 2. De Morbo Gallico, cap. 3.*

## S E C T I O XXII.

## De Lumbricis.

**L**umbrici (Græcè *αὐρίδες*) ex omnibus corporis partibus intestina maxime occupare solent, ex crassa & lenta pituita, quæ in intestinis frequens, corrupta præparataque est, ab uberrimo insito calore suscitantur, vitamque sumunt, eorum animalium exemplo, quæ ex putri materia cœlestis caloris ope vitam habent, pro varia putrescentis materiæ figura, variæ sunt lumbricorum species. Alii sunt longi & teretes, qui in superioribus gracilioribusque intestinis gigni solent, hi omnium frequentissimi sunt, sursum quandoque irrepunt in ventriculum, inde per gulam, os ipsum conscendunt, è quo hiant etiam profiliunt: Alii rursus breviores sunt & lati, qui sæpè mira serie inter se coherant, cucurbitini dicuntur, interdum mutuo adhæsu contextitur latus ille vermis, quem ob similitudinem *veris* appellant, quod fascis & vittis mulierum similis tam longus ac latus existat, ut per omnia præcipuè verò crassiora extendatur, intestina. Alii denique sunt exigui & tenues, Ascariides dicti, quibus ferè sedes est in recto intestino, omnibus materiam suppediat cruditas & crapula, & eorum usus quæ faciliè putrescunt. Pueri quam adulti his sæpius afficiantur. Lumbricorum signa sunt oris fetor ad aciditatem vergens, dejectiones stercoribubulo similes, febres aliquando, quæ pluries in die exacerbantur, cum anxietate, animi deli-

quio, nausea, vomitu, & siti inexplibili; genæ alternatim rubent & livescunt, narium pruritus adest, & dentium stridor, capitis item gravitas & sopor, deliria etiam & convulsiones epilepticæ; tussis adest sicca, dolor in ventre plerumque affligit, inflatur etiam & distenditur venter, horrida est in somno expergiscentia, fames adest nonnunquam canina corpus interdum decrescit, pulsus est inæqualis. Ascariides ex pruritu ani molesto cognoscuntur, & fæces non rarò iis conspersæ apparent, gravissima ut plurimum inferunt symptomata, minùs tamen noxiæ sunt Aschariides.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Lumbricis puerorum.

**I**nter medicamenta interna est oleum hoc quo ego sælicè cum successu uti soleo.

℥℥. Absinth. pontic. santonic. abrotan. hyssopi, thymi, an. ℥j. rutæ, cardui. menth. præstii, cent. min. an. ℥℔. corallin. ℥ij. flor. hyperic. ℥℔. succi glaregi ℥ii. rad. ireos, enulæ, gentian. dictamn. alb. an. ℥i. tormentill. myrrh. C. cervi usti, an. ℥ii. agar. rhei, Aloes, an. ℥℔. cardamom. lupin. an. ℥℔. sem. brassic. portulac. coriandri præp. an. ℥i. amygdal. amar. ℥i. sem. citri ℥℔. sem. fecalæ ℥ii. sebest. ping. ℥ii℔. M. incisis incidendis; & contusis contundendis, omnia in vase vitreo ponantur addaturque olei olivarum dulc. tantum quantum possit omnibus supernatare, & per quadraginta dies vas Soli subiiciatur, vel si citius hoc parandum sit, bulliant omnia in B. M. per duodecim horas continuò deinde oleum coletur absque forti expressione, cujus ego soleo ℥i. pueris exhibere, adultis verò ℥ii. & mirificè prodest, & eo magis si partes etiam pulsatiles inungantur. Vinum etiam infusionis Mercurii miri est usus. *Jul. Caesar Claudinus, consult. 64.*

℥℥. Rhei. agar. troch. an. ℥℔. oxymel. simpl. aq. gramin. an. ℥vi. M. F. potio parva. Vel.

℥℥. Agar. præp. rei el. an. ℥℔. oxymel. s. syrup. de endiv. aq. gram. an. ℥℔. M. F. potio, quantum ad evacuationem non cre-



credo aliud esse præstantius remedium quam agaricum & rhab. Utilis etiam est hiera. Clysteres non facerem nisi ex lacte & saccharo. *Johan. Baptista Montanus, consil. 221. & 222.*

Si Lumbrici molesti sunt, neque ulla febris urget detur puero  $\mathfrak{z}$ i. vel  $\mathfrak{z}\beta$ . ex sequenti pulvere in vino dilutissimo, vel lacte, vel sero ipsius vel jure carniū mediocriter salutarum, vel julepo aliquo & differat cibum in horas duas vel tres.

$\mathfrak{z}$ l. Sem. Santonic. corallin. an.  $\mathfrak{z}$ ii. di-  
etamn. alb. rhei, bistort. tormentill. an.  $\mathfrak{z}$ i.  
F. M. pulvis qui aceto acerrimo irroratus paulatim in umbra siccetur, ferveturque in usus. Remedium est probatissimum, etiam in lenta aliqua febre haud culpandum: Lumbricos interficit, atque ad eos expellendos excretricem facultatem commovet, uno eodemque tempore quod etiam sine huius pulveris usu fieri utiliter poterit, applicetur ventri hoc emplastrum.

$\mathfrak{z}$ l. Farin. lupin. pulv. cent. min. pulv. flor. stœchad. an.  $\mathfrak{z}\beta$ . Aloes, fellis tauri, an.  $\mathfrak{z}$ ii $\beta$ . M. cum ol. absinth. F. Emplastrum, ventri applicetur. Ego sepe numero felicitate usus sum hac arte; à xyphoide cartilagine ad umbilicum usque abluo aut rigo totum ventrem aqua vitæ in qua maduerit absinth. tum madentem locum inspergo pulvisculo myrrhæ, & applicatum duplex catens linteum fascia obliquo. Puerum primum in ventrem decumbere aliquandiu permitto. Lumbricos iste fatus non infelicitate sine incommodo, & non magno negotio excludit, experimento constat optimum esse lapidem bufonis appensum puero. *Reinerus Solenander, consil. 30. sect. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Lumbricis.

**A**D enecandos Lumbricos utatur Vir Generosus per biduum vel quatri-  
duum hoc pulvere.

$\mathfrak{z}$ l. Coriandr. præp.  $\mathfrak{z}$ ii $\beta$ . sem. portulac. citri, limon. an.  $\mathfrak{z}$ ii. zedoar.  $\mathfrak{z}$ i. C. C. usti  $\mathfrak{z}$ i. M. F. pulvis. Dosis  $\mathfrak{z}\beta$ . ut mortui aducantur utendum his pilulis.

$\mathfrak{z}$ l. Aloes rosat.  $\mathfrak{z}$ i. Myrrh. el.  $\mathfrak{z}$ i. cum sy-

rup. ros. F. pilulæ mediocres, dosis  $\mathfrak{z}\beta$ . vel potione hac.

$\mathfrak{z}$ l. Decocti sebest.  $\mathfrak{z}$ iv. rhei el.  $\mathfrak{z}$ i. mace-  
retur in eo prius aqua cinnam. hume-  
ctata; & expressum detur. *Io. Crato con-  
sil. 13. lib. 1.*

Puerulus quidam trium annorum per multos dies vexatus est alvi fluxu & nausea ferè perpetua, cum febre acutissima quæ à Lumbricis in ventriculo & intestinis contentis, exoriri videbantur. Post varia frustra tentata remedia, cum jam æger in summo vitæ periculo versaretur, ipsi exhibui calomelan. turqueti gr. xii. statim cessavit nausea, & toto fere die dormivit; at noctu vomitus & alvi fluxus multo graviores excitati sunt; in excrementis inveniebantur frustula vermium putrefacta in maxima copia, mane dormivit & toto die sequenti; neque amplius vomuit, & intra 24. horas febris expers apparuit, atque ita curatus, ut aliis remediis non indiguerit. *Lazarus Riverius, observ. 28. cent. 1.*

Puer quidam quatuor annorum Lumbricis ita laborabat, ut gravi ventris dolore torqueretur, cum summa virium dejectione, ita ut pulsus non perciperentur. Tertia die quatuor Lumbricos mortuos per os excrevit, cum vomitu humoris nigri præscribo ipsi potentia ad Lumbricos remedia, tum interna, tum externa; quæ nihil profuerunt, tandem jubeo ut exhibeantur calomelan. gr. viii. cum diagrid. gr. vi. quo medicamento alvus soluta est; excrevitque materiam viscidam, glutinosam, putridam, cum duobus Lumbricis; ter alvum deposuit, & maximè levatus est, & inter paucos dies omnino convaleuit. *Lazarus, Riverius, observ. 5. cent. 2.*

Puella trium annorum laborabat febre acutissima cum magna anxietate, & virium prostratione. Vocatus ad eam circa vesperam, judico eam ex Lumbricis laborare & præscribo potiunculam ex hieræ  $\mathfrak{z}\beta$ . syrup. rosac.  $\mathfrak{z}\beta$ . cum aq. portulac. q. s. quæ nocte eam purgavit, & inde plurimum levata est postridie præscribo julepos sequentes.

$\mathfrak{z}$ l. Fol. acetos. portulac. & endiv. an. M. j. summitat. hyper. & scordii, an. pi. coq. ad lbj. in colat. dissolv. syr. limon.  $\mathfrak{z}$ iii. F. jule-



julepus, capiat ℥ij. manè, meridiè, & vesperi intra biduum omnino curata est. *Lazarus Riverius, observ. 16 cent. 2.*

Nostrates mulierculæ putant omnes pueros vermibus laborare, sed cum nullus rejicitur vermis, eos dicunt in humores putridos fuisse conversos nec malè, nam ut vermes in phiala conclusi, & fimo calente obruti, brevi convertuntur in pastam, cur in corpore nostro, cujus calor fimi calori respondet, non idem fiet, vermibus enecatis ab amaris medicamentis: certè hoc videtur mihi rationi consentaneum *Petrus Pachequus, obs. 57.*

Puellus quatuor annorum Lumbricis valdè obnoxius, laborabat inappetentia, nausea, pruritu narium, siti, inflatione ventris, cum ejusdem torminibus & febre: quam cum verminosam esse ex præcedentibus signis esset manifestum, exhibui mercur. dulc. gr. xij. diagrid. gr. v. Post duas horas ab assumpto remedio, viginti circiter Lumbricos simul glomeratos per alvum rejecit, & prædicta omnia symptomata evanuerunt, agerque convaleuit. *Simeon Iacoz. observ. 11.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Lumbricis.

**N**isi magnis experimentis præstantissimum remedium ad puerorum Lumbricos comprobassem, haud auderem hic inter arcana selecta reponere; quippe tanta est ejus virtus & potentia, ut mortuos ferè pueros è vermibus ad vitam trahat, hac industria paratur in libris singulis aquæ fontis, ol. sulphur. vel vitrioli aliquot guttulæ addendæ sunt, ita ut aqua acidula fiat, quæ pueris, natuque majoribus danda est, diu noctuque ad placitum est enim præstantissimæ virtutis. *Jul. Cesar Baricellus, Hortul. Genial. pag. 44.*

In Lumbricis necandis non modò portulacæ aq. stillaticia aptissima judicatur, verum etiam illius semen. Narrat enim *Arnoldus de Villa Nova* quendam puerum, dum esset in mortis periculo constitutus propter Lumbricorum multitudinem, 5℔. sem. portulacæ cum lacte sumpsisse, atque Lumbricos multos emisisse, sicque

*Burnet Parte 1.*

fuisse liberatum. *Jul. Cesar Baricellus, Hortul. Genial. pag. 89.*

Hydrargyrum, quod à multis venenum existimatur, felicissimo successu contra vermes exhibetur: tantæque certitudinis illud in *Hispania* reputatur, ut mulieres tenellis pueris, qui lactis vomitu laborant, ad quantitatem granorum iij. in substantia propinare audeant, hac enim via morbus cessare videtur frequentibus. Ego quidam viduam mulierem curavi, quæ novem dierum spatio vomitibus continuis ex vermibus laboraverat, & ferè triduo non comederat, nec cibum retinere valuerat, huic cum ℥ij. Hydrargyri mortificati cum tantillo cydonii propinasse, absque ulla molestia per alvum centum & plures emisit vermes, & eodem die liberata est, & solita exercuit domi & foris negotio, magna omnium admiratione, cum prius debilis & emaciata esset: aliis etiam exhibui & bono semper eventu: domique continuo aquam habeo, in qua hydrargyrum infusum retineo, illamque puerulis pro vermibus libentissimè concedo, nec adhuc quempiam ex illa noxam recepisse expertus sum. Usus est hoc remedio ad vermes necandos *Matthiolus, Horatius Augenius*, & plerique alii celebres viri, qui omnes hujus auxilii maximè extollunt beneficium: datur pueris in substantia ℥i. grandioribus ℥ii. vel ℥j. corrigitur & mortificatur in mortario vitreo cum sacc. rubro, ubi tam diu conteritur, donec in partes invisibiles dissolvatur: ne autem in pristinam formam iterum redeat ol. amygd. d. gr. ij. addere oportet, cum sacc. violato, rosato, vel cydoniato jejuno stomacho languentibus propinatus. *Jul. Cesar Baricellus, Hortul. Genial. pag. 212.*

Aqua communis bullita cum argento vivo, paucò & innoxio potu omnes interimic vermes tam in intestinis, quam alibi: in ulceribus autem si aqua ista affundatur. *Joh. Helmontius, tractat. cui titul. Sextuplex Digestio Alimenti Humani.*

Quia sæpè non nisi magno labore & longo tempore verminosi affectus in nonnullis pueris expugnari possunt, quam plurima remedia, eaque præstantissima, ab authoribus inventa & usurpata sunt, tum interna, tum externa: inter interna



sunt pulver. quorum præcipui sequuntur.

℥. Sem. contra, seu Santonici ℥ss. corallin. ℥iij. ras. C. Cervi ℥iij. F. pulvis. Vel

℥. Sem. contra, corallin. & C. Cervi usti, an. partes æquales. Vel

℥. Pulv. hier. simpl. ℥ij. sem. contra scord. cent. min. corallin. an. ℥i. M. F. pulvis. Vel

℥. Rhei & agar. an. ℥j. troch. alhand. ℥i. diagrid. ℥ss. corallin. C. Cervi usti. an. ℥ss. myrrh. zedoar. flor. tanaceti, an. ℥i sal. ab. sinth. & tartar. an. ℥ss. F. pulvis tenuissimus dosis omnium erit à ℥j. ad ℥i. pro ætate puerorum in liquore idoneo.

Mulierculæ vulgò pueris à lumbricis malè habentibus exhibere solent semen contra saccharo incrustatum, vel nudum semen cum melle permixtum: quod remedium præstantissimum est: Siquidem Lumbrici dulcium rerum avidi mel devorant, & cum melle semen quo interficiuntur, quia verò illud semen valdè calidum est, temperari potest in aceto infundendo per duas horas, postea verò cum melle cocto misceatur ad formam opiatæ, quam *Amatus Lusitanus* predicat tanquam primum adversus Lumbricos remedium.

Inter topica ventri admovenda, utile est sequens cataplasma.

℥. Fatin. Lup. ℥ii. Myrrh. Aloes, an. ℥ij. fellis bovis, q. s. ol. absinth. ℥ii. F. cataplasma.

Interim toto morbi decursu clysteres frequenter injiciendi sunt, primum attrahentes lumbricos ex dulcibus compositi, qui non solum ex decocto liquirit. passul. & ficuum parari possunt, sed etiam ex jusculo pulli admixto saccharo & melle rosac. vel ex lacte, si febris abfuerit: at si lumbricos in crassis jam intestinis esse conjiciamus, quia tunc vix amplius in tenuia possunt, ascendere, medicamenta illos enecantia per clysterem infundere possumus in hunc modum.

℥. Rad. gram. ℥i. fol. betæ, malv. mercurial. & portulac. an. M. ss. corallin. p. i. coriandr. præp. & sem. contra, an. ℥ii. F. dec. in colat. libi. dissolv. ol. rosac. ℥ii. cass. extr. ℥vi. spec. hier. ℥ii. mell. viol. ℥i. F. Clyster. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 10. cap. 9.*

Vidi quendam protabido habitum &

quasi conclamatum, qui potu pulveris corticum aurantiorum ad dr. i. per tres vices, in vino, curatus fuit, ejectione innumerorum vermium. *Petrus Borellus, cent. 1. observ. 90.*

## SUBSECTIO QVARTA.

### Pro Lumbricis.

**N**on probo consilium vel vulgi vel medicorum verminosis pueris vermes vino lotos, in tegula siccatos, exhibentium; certò enim mihi persuadeo experientia edoctus, materiam illam vermium putrem, putri puerorum pituitæ remixtam à magno illorum calore iterum animari, ut videmus muscas submersas multis diebus mortuas, si non premantur, sed simpliciter extinguantur, soli denuo expositas, novo calore iterum vitam volatumque, ut & pediculorum pelles in puerilibus capitibus & vestibus relictas, amissam interungues & pectinem animam recuperare. *Henricus ab Heers, Observ. 9.*

Inter omnia medicamenta vermes necantia facile principatum obtinet juxta *Sennertum* Corallina herba, sive muscus marinus, ex qua in Italia circum foranei suum pulverem conficiunt, & ad miraculum usque vermes necant, dosis ℥i. Utilis etiam est pulvis ex sem. tanaceti, & rad. primulæ veris, estque hic pulvis agyrtarum nostrorum in Germania *VVolfgangus Hæserus, Herc. med. lib. 7. cap. 8.*

Puer quidam quatuor annos natus in febrem incidit gravem & inordinatam, cum capitis dolore, tussi, siti, tremore in somno, vociferatione; ex quibus verminationi eum obnoxium esse conjecimus, qua de causa tanaceti semen cum syrup. viol. tribus matutinis exhibuimus: unde plures quàm centum, pedalis longitudinis Lumbricos excrevit, & subito à febre, tussi, reliquisque symptomatis fuit liberatus. *Jac. VVecherus. De Observationibus propriis referente Schenkio. lib. 3. observ. medicin.*

℥. Pomum aurantium aut citrium parvum, excava tantam partem, quæ capiat theriac. ℥ii. aloes ℥i. croci gr. vi. assa pomum, & succum exprime, quo regio



ventris inungatur. Utilis & theriaca aceto vel limonum succo dissoluta illita.

Ascarides quia sunt in intestino recto, suppositoriis rectissime educuntur, quibus admiscuntur resinae, iis enim vermes adherent & educuntur. *Daniel Sennertus, pract. lib. 3. part. 2. sect. 1. cap. 5.*

Ad consumendam omnem Ascaridum materiam, nec non delendam intestinorum ad hæc animalcula procreanda proprietatem, vix quicquam utilius excogitari potest quam si aloes succotrinæ & singula quaque hebdomada devoret.

Aloem enim extremas intestinorum partes arcana quadam facultate eluere atque expurgare longo usu probatum est. Sic etiam non parum conferet, si singula hebdomada clyster ex decocto absinth. lupin. horrid. & corallin. iniiciatur, ac frequenter anus lupinorum decocto foveatur. Laudo quoque ut ex linteo tenue collyrium fiat atque ano imponatur hocce linimento inunctum.

℥. Fell. taurin. ℥i. pulv. lupin. ℥ss. ol. absinth. ℥i. vini alb. ℥iii. M. ad ignem. *Hieron. Mercurialis, tomo 1. consult. 13.*

Unguentum ex argento vivo, resina, & axungia factum, & si podici illinatur, vel illud illi imprimatur, aut suppositoriis illitum intrudatur, præ omnibus remediis ad vermes Ascarides dictos delendos efficacissimum est. *Felix Platerus prax. med. tom. 3. cap. 13. pag. 89.*

Puer quidam dum esset in mortis periculo constitutus propter multitudinem lumbricorum, ℥ss. sem. portulacæ tritæ cum lacte sumpsit, & emisit lumbricos multos & liberatus est. Oleum sem. lini bibitum omnes expellit vermes, & unctio cum eo eos molestat valde, si fel tauri vel colocynthidis admisceatur. *Arnoldus de Villanova pract. lib. 2. cap. 33.*

Varias hyperici virtutes aliis fusiùs laudatas non moror. Unius hic meminisse publico ægrorum plurimorum commodo intererit, de qua nemo hætenus adeò sollicitus fuit. Est verò ea præstantissima ad lumbricos pellendos si flores in spiritu vini infusi cum liquore exhibeantur, id quod certa nobilissimæ Matronæ experientia didici. Causam in quadam acrimonia sitam existimo. Oleum ex sem. & flori-

bus cochlearis mensura bibitum lumbricos enecare autor quoque est *Matthiolus*. Ex *Galenocalidum* & siccum est *hypericum*: inde urinam ciere & menses *Dioscorides* tradit, & post eum *Plinius*. *Paracelsus lib. de Lumbric.* Vermes in abdomine recedere locumque mutare scribit, si in eo loco hypericon imponatur. *Thomas Bartholinus in Actis Medicis, observ. 40. anni 1671. & 1672.*

℥. Succ. rutæ ℥iv. capiat per triduum, & certo certius per inferiora vermes tradet. Hoc nobilissimæ Dominae, post multa incassum usurpata remedia, & tantum non morienti mirificè profuit, ut ipsa mihi fassa est. *D. Rob. Gunninghame in M. S.*

In puero vermibus laborante clarissimus & experientissimus *D. Wedderburnus* post bidua nam exhibitionem decocti cent. min. absinth. fol. orient. rhei umbilicali regioni applicuit emplastrum ex myrrha & pice *Burgundica*, & ea nocte sex excreti sunt vermes. Nocte sequenti pulverem bezoar & Dominae de *Kent* exhibuit, tribus inde excretis lumbricis. Enema tandem ex lacte & sem. contra injectum, & quatuor excrevit. Et sic sanus evasit. *D. Robertus Cunningham in M. S.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Lumbricis latis.

**F**ortioribus medicamentis opus est, ut lumbrici lati interficiantur: quapropter etsi in teretibus purgantia cum interficientibus commodè admisceantur; præstat tamen in latis, nulla iis purgantia primum admiscere, cum purgantia non sinant medicamenta vermes interficientia diu in intestinis hære, sed ea citò per alvum secum educant. Si verò prius exhibeantur medicamenta, quæ ipsum debilitent totus rotundus factus ad pilæ figuram exit, & homo sanus evadit. Commendatur hic imprimis filix, è qua recenti aqua destillata datur; vel pulvis ℥ss. pondere, infantibus; natu majoribus dr. i. adultis dr. iii. cum aqua galegæ, quæ sine ullis molestiis vermem & lentè & citò, si velis, enecat. Commendatur & cortex radi-



eis mori, & corallina duplici pondere. Utili est & theriaca aceto vel succo limonum dissoluta. Decoct. etiam cent. min. lupin. scordii: sicut & usus aloes cum croco & myrrha, atque usus hieræ cum scammonio. *Daniel Sennertus, pract. lib. 3. part. 2. sect. 1. cap. 5.*

Mulier quædam viginti annorum, sæpissime dolore ac torminibus ventris, imbecillitate ventriculi, nausea, item eructationibus & cibi fastidio vexata, me in consilium adhibuit, tum pulvere quodam laxativo (qui recipit rheum turbith. & sennam) & syr. ros. solut. compos. cum rheo, agar. & senna exhibito, Lumbricum latum per secessum una cum excrementis excrevit: quem cum mihi monstrasset, attonitus fui. Est enim Spithamas viginti longus, latus grana sex, crassus verò grana duo. Post excretionem hujus Lumbrici, iterum expurgato corpore, & quæ partes principes roborant, per dies aliquot exhibitis, convaleuit fœmina illa, & huc usque bellè se habet. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 70. cent. 2.*

Legantur Observationes tres proximè sequentes ubi plures tales de Lumbricis latis referuntur historiæ.

## SECTIO VIGESIMA TERTIA.

### Pro Lupia.

**P**Uella quædam laborabat tumore scirrhofo nuci juglandis magnitudine, superiorem metacarpi partem occupante, qui discussus est meo consilio: admota super partem affectam lamina plumbea hydrargyro illita, eaque per octo dies gestata tumor disparuit nec amplius est reversus. *Simeon Iacoz. observ. 9.*

Frater quidam Capucinus Lupiam habebat in genu, post longum tempus ad summam mollietatem tandem perducta fuit, cujus ratione a pertionem suadebam, ille verò tenuit, inquiens se Lupias huic similes resolutione curatas vidisse foliis acetosæ charta madida involutis, & sub cineribus coctis; quæ postmodum cum cineribus per cribrum trajectis, incorporabantur in formam cataplasmati: quod ille per plures dies applicuit calidè, & tumor prorsus evanuit; quod ego valde miratus sum, & postea duas alias Lupias in eadem parte eodem remedio curavi. *Dionysius Pomaret. obs. 3.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER UNDECIMUS.

*De Affectibus à littera M incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

### Pro Macilentis.



**Q**uidam jubent corpus verberari cum virgulis quousque rubeant eorum carnes, id enim calorem roborat & attrahit ad digerendum & ad perfectius convertendum nutrimentum attrahendum, non desunt qui easdem virgulas prius inungant oleo olivarum. Dixit *Avicen-*

*na* quod flagellatio corporis cum corrigiis mollibus moderatè facta semel omni die, post cibi digestionem, impinguat corpus vehementer cutem rubificando, & nutrimentum ad membra attrahendo; qui vult impinguari, utatur optimo vino, gaudeat, lætetur, abstineat a sanguinis missione & purgatione, utatur balneo post



eibum completa prima digestionem non toleret famem, multum comedat, parum bibat, & praesertim vinum generosum, non irascatur, neque sit solitus, vel tristis, coitum aversetur, multum, dormiat & in lecto molli: haec omnia ut & vina dulcia & cibi unctuosi hominem pinguiorem faciunt. Puellae Venetae cum matrimonio copulandae sunt, lautè admodum tractantur, ut habiliores fiant; utuntur tritico cum lacte nutrito, longius indiem dormiunt, valde otiosae extra aerem vivunt; ut tandem caponum instar pinguescant, ideo & unctuosius & dulcibus vescuntur cibis, ut ita magis delicatule ac venustae suis sponis dedicari possint. *Petrus Forestus observ. 11. & scol. lib. 31. De fucis.*

## SECTIO SECUNDA.

### *Pro Maculis Infantium.*

**S**olent tenella infantium corpora, dum in utero existunt materno, maculis quibusdam, nevis, lituris, verrucisque quae à matris imaginatione sunt, commaculari: haec porro quasi sigilla imprimuntur, & difficulter post ortum elui possunt pro iis delendis principatum habet cariophyllata, cujus vis & potentia in huiusmodi maculis extricandis mirabilis judicatur: sumitur autem planta haec cum suis radicibus in fine mensis *Maii* atque à terrestreitate emundata in alembico destillatur; ex aqua stillata si infantium liturae maculaeque saepius laventur, absque dubio evanescunt. *Jub. Casar. Baricellus. Hortul. Genial. pag. 266.*

Macula foetui impressa admota manu cadaveris longa tabe extincti, omnique vitae proprietate exuti, donec frigus partem maculatam penetraverit, (quod fit spatio unius miserere) de cætero spontè evanescit. *Ioh. Helmontius tract. cui tit. Demens idea.*

## SECTIO TERTIA.

### *De Madarosis.*

**M**adarosis (à μαδός glaber) nihil aliud est quam defluvium pilorum palpe-

bre oritur à vitiosis & acerbis humoribus ad ciliarum radices confluentibus, & pilorum radices erodentibus: post febres malignas saepe accidit.

## SUBSECTIO UNICA.

### *Pro Madarosis.*

**R**epurgato corpore, ut hoc unguento palpebras liniret præcepi.

℞. Stercor. lepor. & sterc. hircin. an. dr. ii. cortic. avellan. ustar. dr. iij. pingued. ursi vel caprin. q. s. F. unguentum, avellana etiam adusta & cum adipe ursina vel caprina incorporata nasci facit pilos. *Petrus Forestus, observ. 46. lib. 11. De morb. ocul. & palpebr.*

## SECTIO QUARTA.

### *Pro Mammarum Inflammatione.*

**P**uerpera cum lactare infantem inciperet, sensit immensum cruciatum in mamilla dextra, cum rubore & duro tumore renitente, in ambitu papillae; aderatque febris: mox cognoscere potui inflammationem esse: jussi primum inungere hoc unguento.

℞. Mucilag. sem. psyllii ℥ss. armen. dr. ii. olei rosac. aceti rosac. an. dr. ii. M. F. unguentum: die sequenti cataplasma applicui ex farina hordei, lacte & ol. ros. post duos dies addidi huic cataplasma. ol. chamemil. lil. farinae seminae lini & scenugræ. portionem; quia suppurabatur: sequenti die dolor augebatur & febris, pure genito applicui hoc cataplasma.

℞. Farin. hord. fabar. an. p. j. sem. lini scenugræ. an. pss. flor. chamæm. p. j. rad. lil. & ireos, an. ℥ss. coq. & contund. addendo ol. chamæm. ℥ii. croci ℥i. F. cataplasma: sequenti die reiteretur addendo ficuum numero x. farinae orizæ ℥i. caulium malvar. coctarum & contus. unâ cum lardo dr. vi. apparebat abscessus acutus, pure ex contactu fugiente, jussi fermentum cum pulpa caprarum coctarum applicare sequenti die spontè ruptus est abscessus, puris magna copia profluente ad dies binos: im-



posuiturunda cum terebinthina & melle, tandem pauco immisso balsamo integre curata est, *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 521.*

Puerpera alia manna inflammatione laborans, intra paucos dies sanata est his duobus remediis, primis diebus facta fuit embrocatio ex duabus partibus olei rosati completi, & una omphacini: sequentibus diebus admotum est bis in die unguentum de althæa. *Lazarus Riverius observ. 41. cent. 1.*

Juvenis mulier circa nonum graviditatis mensem correpta est tumore mammae sinistrae cumensione, rubore & pulsatione. Vocatus Chirurgus cataplasma de mica panis statim admoveat, unde tumor admodum increvit, vocatus ego cataplasma praescribo ex farina fabarum cocta in oxycrato, saepe immutandum, quia intra paucas horas exsiccat: intra duodecim horas inflammatio ablata est, tumorque admodum imminutus & intra paucos dies omnino evanuit. *Lazarus Riverius, observ. 74. cent. 4.*

## SECTIO QUINTA.

### Pro Mammarum duritie & tumore.

**S**equenti linimento quo ego cum maximo fructu in tumoribus mamillarum tumor, locus affectus inungi poterit.

℥i. Gum. ammoniac. ℥i. ol. amygd. lil. alb. ping. gallin. an. ℥ij. succ. cicutæ ℥iv. acet. scillit. ℥ij. M. maneatque infusione horas viginti quatuor, in loco calido, postea coq. s. a. colatura cum forti expressione fervetur ad usum, in praeparatione autem hujus linimenti, danda est opera ut lentissimo igne coquatur, neque humiditas succi & aceti omnino inter coquendum absumatur, nullius enim valoris esset medicamentum, singularem habet efficaciam in quacunque parte corporis fuerint, linimento isto calide inuncta mamma sequens poterit applicari emplastrum.

℥i. Empl. de mucilag. & de melilot. an. ℥ii. gummi ammoniac. in aceto scyllit. dissolut. ℥iβ. M. F. s. a. emplastr. addendo parum ceræ si opus est. *Guil. Fabric. Hildanus, observ. 52. cent. 2.*

Virginis cujusdam mamma tumuit, indurata fuit, doluitque vehementer: illam hoc modo curavi, mane & vespere inunxi mammam affectam balsamo sulph. nostro. Postea applicavi empl. diasulphuris nostrum (cujus descriptionem vide infra lib. 18. sect. 22. De Ulcere subsect. 4.) quibus indies tumor, durities & dolor diminutus fuit, ac paucis interpositis diebus ad suppurationem pervenit apertaque est in multis locis, & brevi ad optimam sanitatem reducta est, nam haec duo remedia valent ad mammarum omnia vitia etiam ulcera cancrosa. *Martinus Rulandus, curat. 2. centuria 8.*

Cataplasma ex caulibus virentibus foliis & aristoli. rot. oleo communi veteri incoctis super mammam scirrhuso tumore affectam die noctuque gestabit, ita ut singulis octo vel sex horis permutetur: si tumor in carcinoma videatur degenerare, utendum erit oleo rosae completo cum portiuncula lithargyri in mortatio plumbeo diu agitati. *10. Zecchius, consult. 14.*

Mulier Nobilis puerpera laborans tumore mammae sinistrae praeduro ex concretionem lactis, irritis omnibus remediis ex arte per mensem integrum usurpatis, curata est fumendo ℥i. pulv. millepedum praepar. in juscule per triduum: hujus autem pulveris eximias doctes saepe vidimus & audivimus ab expertis in hujusmodi tumoribus ex lacte concreto, nec non etiam in cancro mammarum ac reliquarum partium ut contigit cuidam viro qui patiebatur ulcera multa profunda in multis corporis partibus, praecipue vero in tibiis, a quibus brevi tempore curatus est, fumendo ℥i. praedicti pulveris per septem vel octo dies, alternos praemissis tamen praemittendis. *Simeon Locaz, observ. 29. cent. 4. observ. Riverii.*

Pro tumore mammarum ex lacte retento. Lac retentum absumendum & exsiccandum, coagulatumque resolvendum, quo facto sponte cessabit dolor. Remedia quibus hoc praestet multa sunt & varia; nullum tamen, quantum mihi quidem constat, aequale praesentaneum & efficax est ac emplastrum quod de spermate ceti componitur, & à *Mynsichto* in Armamentario sect. 36. sub finem describitur. Hujus nam-



namque solius usu hæc aliæque plures à tumore mammarum perfectè liberatæ sunt : insignem enim lac copiosum absumendi, concretumque solvendi vim obtinet, unde & post ablactationem, commodissimè adhibetur. *Baldassar Timæus cas. 36. lib. 4.*

## SECTIO SEXTA.

### De Mania.

**M**ΑΝΙΑ (ἀπὸ τοῦ μανίης, ab insaniendo) Latinis furor seu insania, delirium est intermissionis expers sine febre, sed cum furore & ferina quadam rabie conjunctum, oritur à dispositione spirituum fervida & ignea, concomitante forsan maligna & venenata qualitate, hanc dispositionem produci volunt authores à bile atra : qui hoc malo laborant feroces sunt & effrænes, & nisi vinculis cohibeantur, vestimenta propria dilacerant, & in obvius quousque immanis belulæ instar dentibus, unguibus & pugnis impetum faciunt; nec sibi ipsis parcunt, vigilant præterea pertinacissimè, stupendum adest corporis robur, imminentem maniam ostendunt aurium tinnitus, & gravitas capitis, splendores oculis obversantes, tristitiæ & longæ præcedentes, ira ex levi occasione, oculi fixi, in obscænum & ineptum risum nimia proclivitas, consueti hæmorrhoidum & mensium fluxus suppressio, aliquando fit mania à causis externis, quales sunt philtum, solanum, cerebrum felix; canum, vel luporum morsus, aliquando etiam per consensum fit, & uteri imprimis, & tunc dicitur furor uterinus, de quo infra lib. 18. sect. 32.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Mania.

**J**Uvenis quidam dissolutè vivens puellam prædivitem contra parentum voluntatem abductam sibi matrimonio copulavit, ipsiusque bonis mox dilapidatis, eam pessime tractavit, adeò ut sæpe desperabunda seipsam interficere cogitaret : tandem ad insaniam redacta, vestes dilacerabat,

nudaque catenis vineta; etiam stramen in quo eam cubare vidi : minutim unguibus discerpebat, ideoque deventa ad Empiricum quendam rusticum, qui maniacos curare solebat, septuagesies una septimana, venis diversis in locis apertis atque universo pene illi sanguine detracto, ab eo fuit curata. Inde domum reversa debilis & palida, mortuo marito alteri nupsit, cum quo ad quadraginta annos vixit sana, sterilis tamen maleque colorata. *Felix Platerus, obs. lib. 1. pag. 86.*

Vir quidam quadragenarius à multis annis melancholiæ adeo obnoxius fuerat ut administratione rei familiaris ipsi à magistratu interdictum fuerit, tandem in gravissimam maniam incidit cum tanto furore, ut omnia dilacerasset, & frequenter seipsum ex alto præcipitasset, nisi vinculis constrictus fuisset, in istis vehementissimis agitationibus clamoribusque continuo fere sudoribus nunc frigidis, nunc calidis madidus erat, ego cum advocatus essem, clysterem acrem infundi, deinde venam in cubito dextro incidi, eodemque die post cœnam nonnihil laudani in aq. borrag. dissoluti exhibui; frontem & tempora ol. rosac. & viol. inunxi, ea nocte utcunque quietior fuit, postero die ad ℥j extracti melanogogi ex decocto polip. fol. sen. beton. cuscute scabios. aliisque appropriatis exhibui, vomuit bisterve, alvus quin etiam quater aut quinquies subducta fuit, hinc impetus ille maniae aliquomodo remisit, eodem die post cœnam iterum somniferum confectiois alkerm. mixtum exhibui, quievit satis bene ea nocte, & altero die penitus mente constabat, post aliquot dies cum melanogogum aliquoties reiterassem, & extractum hellebori nigri semel atque iterum exhibuissem, ita restitutus fuit, ut ab eo tempore & usque nunc rebus suis domesticis quam prudentissime prospiciat. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 9. cent. 4.*

Retulit mihi nuper quidam vicinæ Ecclesiæ pastor, in suo pago intra triduum sanatum fuisse maniacum, exhibito canis cerebro cocto (addebat unius coloris canem esse debere) affirmabatque sibi præterea alios tres notos esse, qui eodem medicamento sunt sanati: commendatur etiam



iam cerebrum arietis nondum Venerem experti, si nimirum caput uno ictu ipsi amputetur, & totum cum pelle, cornibus saltem abiectis, coquatur, cerebrumque postea cum farina, additis cinnamomi, zinzib. nuc. mosch. macis, cariophyll. an. ℥ss. (forsan. ℥ss.) super prunis misceatur, & in partes tres divisum maneat exhibeatur, ita ut post sumptum medicamentum duabus horis nihil comedat æger, ac in cæteris quoque rectam dietam observet. *Daniel Sennertus practic. libr. 1. part. 2. cap. 15.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Mania.

**F**requentibus phlebotomiis intericienda sunt purgationes in hunc modum.

℥. Lapid. lazul. ℥ss. diagryd. ℥ss. turbith. ℥i. senæ ℥ss. epithym. crem. tartar. an. ℥ii. cinnam. & cortic. citri an. ℥i. croci ℥ss. M. F. pulvis: cujus dosis erit ℥i. vel ℥iv. cum jusculo, vel liquore appropriato.

℥. Ramentor. hellebor. nigr. ℥i. infund. per triduum in aq. pluviae ℥iv. decoq. lento igne ad tertias: colaturæ adde mellis opt. despumati ℥ii. M. capiat cochl. i. cum jusculo pingui. Vel.

℥. Extract. helleb. nigr. ℥ss. syr. viol. ℥i. pro una dosi. Omnia medicamenta ex helleboro confecta, ut vinum, syrupus, & oxymel, ad hujus affectus curationem plurimum conferunt. Unde olim ferunt *Melampium Amythaonis* Medici filium, vino helleborato *Prati Argivorum* Regis filias, quæ se boves existimabant, liberasse.

Balnea aquæ tepidæ frequenter, & post singulas purgationes usurpanda sunt.

Ordo medicamentorum purgantium hoc in morbo talis est, ut primo apozema alterans, & purgans per tres, aut quatuor dies exhibeatur, post venæ sectionem in utroque brachio celebratam: deinde purgantia mediocria ex potionibus, pulveribus, aut syr. magistralibus in septimana exhibeantur; vehementia verò bis in mense, interjectis continuò venæ sectionibus: diebus autem intermediis balnea, julepi præparantes; aut juscula alterantia, tum

etiam opiata roborantes exhibeantur. Præter julepos vulgares, sequens ex succis paratus erit utilissimus.

℥. Succ. borrag. bugl. & pomor. redol. an. ℥iii. aq. fumar. & cichor. an. ℥iv. sacch. alb. ℥vi. coq. depurentur & aromatizentur santalo citrino, capiat ℥vi. mane & serò.

Opiata in sequentem modum concinnari poterit.

℥. Conserv. ros. viol. bugl. an. ℥i. Conserv. flor. tamarisci, & carioph. hortens. caulium lactuc. condit. cortic. citr. condit. an. ℥m. myrobal. emblic. condit. num. i. Confect. alKerm. & de hyacinth. an. dr. iii. pulv. elect. diamarg. frig. & letif. Gal. an. dr. i. Corall. præp. margar. præp. an. dr. m. cum syr. de pomis redol. F. opiata: de qua capiat ad magnitudinem castaneæ, superbibendo parum julepi aut aquæ appropriatæ. Inter specifica hoc unum adicimus, quod in illustri quadam familia *Monspeliensi*, pro secreto gentilitio, hæreditario habetur, illiusque descriptio talis est.

℥. Fol. Meliss. M. incid. minutim, & infund. in spiritus vini ℥iv. deinde adde margarit. præp. dr. m. M. dosis cochl. ii.

Denique cauterium futuræ coronali applicatum maxime probatur à *Gordonio*, ejusque utilitatem confirmat historia cujusdam maniaci; cui cum esset vulnus inflictum capiti cum cranii fractura, quamdiu fuit vulnus apertum; tamdiu bene habuit; vulnere sanato reversa est mania. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 1. c. 13.*

Quidam Adolescens maniacus, ad cujus curationem potentissima remedia usurpata fuerant, ita ut ventum fuerit ad usum antimonii, trepanum, & arteriotomiam temporum, cum hæc omnia nihil conferrent, castrationem consului, qua usurpata, remissa fuere omnia symptomata, & furor omnino cessavit, manente tamen delirio melancholico, ita ut mania in melancholiam versa fuerit. *Samuel Formius, observ. 32.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Mania.

**M**ania cura perfecta talis est, exhibeatur vomitorium ex aq. bened. post vom i-



vomitorium per aliquot dies capiat. decoctum anagallidis flore purpureo (sine omnia additamento) vinum nullo modo exhibeatur. Præparetur lixivium tale.

24. Herbar. cephalic. cum flor. q. v. coq. in aqua fontana. Deinde.

24. Bacc. laur. rad. hellebor. nigr. an. q. s. contund. invicem crasse, & infuantur sacculo interbastato & longiori: sacculum coque aliquantulum in prædicto lixivio: tandem per novem dies continuos accipe singulis diebus istius lixivii lbii. calefac. & cum linteolis in eo madefactis & leviter expressis fove caput rasum per integram horam, postea sacculum istum applica suturæ coronali (quamdiu calet) cum bona ligatura patiens incumbat lecto, & si fieri potest, quiescat, tunc mira expurgantur, per omnia capitis emunctoria; & alvus simul aliquantulum fluit (hinc colligitur à quibusdam usum hellebori apud veteres externum potius fuisse quam internum) sic nimirum fuligines inhaerentes cranio & cerebro mirabiliter dissolvuntur; quod sane nulla alia remedia præstare poterunt, ultimum in hoc morbo refugium est cranii apertio cum trepano.

In infania, mania, melancholia etiam, tanquam specificum laudatur sanguis asini, hac ætate fabrum quendam lignarium restituit hic sanguis ex venis post aures captus, in quem linteola munda, nulli usui antea exposita, macerentur & exsiccentur, usus est talis: ex his laciniis cape quantitatem duos digitos latam & unum pollicem longam, macera in haustu aq. fontanæ, donec color exeat: hanc aquam de epotandam ægrotanti triduo integro mane semel, & quantum fieri potest, sudorem evoca quem elicit hic sanguis. *Joh. Hartmannus, præct. Chimiatri. pag. 55. & 56.*

Faber quidam lignarius amens factus toto anno ita permansit, ut cunque solita implorarentur remedia; cum curru vinctus ad suos rediret, solutis vinculis e plastro desiliit in stagnum profundum: tandem extractus pro cadavere, & in curru depositus, & deinceps per annos octodecim à mania liber vixit, idem remedium in aliis maniacis aliquoties deinceps tentavi, nec me fefellit eventus, nisi quoties formidine præcociter amentes ex aqua

extraherem: fabri exemplo didici perinde fore sive in aqua dulci vel salsa submersio contingat. *Jo. Helmontius, tract. cui tit. Demensidea.*

Aliis non juvantibus tentari poterit hujus morbi curatio per transfusionem sanguinis vitulini, ex arteria vituli crurali, in venam aliquam brachialem maniaci; qualis nuper *Parisis* in maniaco, ope tubuli una parte arteriæ vituli, & altera venæ maniaci accurate inserti, feliciter fuit facta: hæc chirurgia etiam in aliis morbis curandis jam satis frequenter adhiberi fertur. *Henricus Regius, prax. medic. liber. 1. curat. 15.*

Sequenti medicamento, quod miraculosum effectum habet, dixit mihi *D. Abrahamus* vir longe optimus, se bonum sibi nomen in *Moravia* comparasse.

24. Spec. diambre ℥ii. infund. in vino destillato quatuordecim dies, ut latum digitum superemineat, adde opii, ℥vi. mumiæ ℥℥. succi hyoscyami ℥i. corall. rubr. carabæ, an. ℥ii. croci ℥i. mosch. gr. 6. Ambre gr. 12. affuso rursus spiritu vini, ut superemineat latum digitum: digerantur post fornacem per mensem, quotidie agitando, dosis ℥ss. pro ægri constitutione: maniacis, in vigiliis extremis, colicis, in febribus ardentibus, phrenesi & peripneumonia desperata exhibetur. *Carolus Oslevius, epist. 53. lib. 3. consil. & epistol. Cratonis, &c.*

Interdum aliquid salis nitri ex aqua anagallidis flore purpureo exhibui, quatenus illud impuros, fervidos & inquietos spiritus purificat restinguit & figit. Hæc autem specifica quadam proprietate huic malo resistere creditur. *Baldassar Timæus, Lib. 1. Cas. 8.*

Tinctura florum hyperici egregium est medicamentum in mania intro sumptum, *Joh. Rayus, Catal. Plantar. Anglia.*

## SECTIO SEPTIMA.

### Pro Manus icu & Paralyse.

**I**ctum à pede equino in manu amici, ut & alterius dolorem & impotentiam manuum curavi, præscribendo ut sapem manus totas in recens jugulati bovis vultus immitterent, quo peracto bene se habue.



habuerunt, calor enim ille naturalis nostrum excitat & exasperat, vel benignitate sua poros aperit, & humores torpidos fluxiles reddit, qui aliter quasi coagulati residebant, unde corrumpi & gangrænam accersere potuissent. *Petrus Borellus, observ. 55. cent. 2.*

## SECTIO OCTAVA.

### *Pro Marcove.*

**M**edicus quidam meticulosus veritus ob imbecillitatem venam ferire mulieri cuidam acerbissime ex latere dolenti, auxit tantopere febrem, & inflammationem in membrana costas succingente conceptam; ut ex retorridi sanguinis æstu, ipsa non secus emarcuerit ac si laborasset immedicabili tabe, quam etiam non obscure videbantur designare, sputa ita frequentia ac sordida, ut copia, capacem pelvim, & fœtore spatiosum facile replevisset conclave, re autem ipsius jam plane desperata, & morbo ultra quartum mensem in ipsam sæviente; apparuit ipsi quasi ex machina Deus: excitando nescio quod crudorum ostreorum desiderium: quod eoque lubentius concessimus, quo minus hactenus profuissent potiones concinnatæ ex humidis ac frigidis herbis: qua spe etiam minime excidimus. Vix enim comederat cruda hæc ostrea quin protinus imminuerentur non tantum calor ac febris, sed etiam usque eo perniciosissimus hic morbus, ut brevi integre convaluerit; extincto ab algido ac viscido ostreorum succo pertinacissimo illo incendio: quo proculdubio conflagrasset miserrime universum ipsius corpus, non temere itaque *Celsus*; quos ratio non restituit adiuvat temeritas; neque certe inconsiderate agere videtur, qui circumspicte cecidit naturæ inclinationibus, & obliquat prudenter sinus, ubi non licet rectum tenere cursum: satius quippe est anceps remedium experiri, quam nullum: dubia namque spes certa desperatione potior. *Nicolaus Tulpinus, cap. 8. lib. 2. Observ.*

## SECTIO NONA.

### *De Melancholia.*

**M**elancholia morbus, delirium est febris expers cum metu, & mœrore sine causa manifesta conjunctum: vel est imaginationis & ratiocinationis depravatio à phantasmate melancholico exorta quod detentus, uni cogitationi, absque furore & febre, cum tristitia & metu, inhæret. Ejus origo dependet à certa quadam spirituum animalium dispositione ex humoris melancholici permissione producta, ad quam sequitur phantasma tenebricosum dictum, quod intellectui postea objecta obversans, hoc delirium & animi angorem excitat, quos male habet hic morbus tristes sunt & solitarii, formidulosi & pertinaces, quidam phantasias quasdam sibi faciunt, quæ nec sunt nec esse possunt, falsa multa imaginantur, timent non metuenta, sine causa mœrent animumque macerant, sunt taciturni, morosi, & suspicaces, præter solitum in ediam tolerant, crebro suspirant, respiratio est tarda & rara, ut & pulsus, absurda loquuntur. Alia est per primarium cerebri affectum; alia per consensum cordis & totius; alia rursus quæ hypochondriaca dicitur, & per circuitus redit; alia denique est quæ per uteri sympathiam fit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Melancholia.*

**I**llustrissimo cuidam *Anglo* Melancholia laboranti dedi pulverem illum benedictum à *Michaeli Paschalio* & *Pereda* scriptum, quia plurimos juvit, multi Aucthores alienæ gloriæ cupidi, illum suæ inventionis esse volunt. Est autem hic.

℞. Summitat. epithymi ʒβ. lapid. lazuli præp. agar. troch. an. ʒii. scammom. ʒii. (forlan. ʒii.) carioph. numero 20. M. F. pulvis pro 5. dosibus; has ut erat robustissimus, & viribus constantissimus, diebus quinque continuis sumpsit: bibit postea spadanum fontem, sed exiguu cum fructu, quia nec affini medico, nec mihi auscultabat: ad suos enim reversus, crescente ma-

lo,



Io, maniacus factus, locis minutis cohereri debuit. *Henricus ab Heers, observ. 27. lib. 1.*

Sæpius reiteretur venæsectio pro tostis & exustis humoribus alterandis: ad somnum promovendum exterius compositum sperniolæ cum aqua ros. dissolutum applicetur fronti temporibusque linteis humectatis in eo; sed simul etiam interius laudan. opiat. ad gr. iv. vel v. præscriberem. Quid præstent hæc remedia, post universalia pluribus exemplis confirmarem, sed sufficiat unum. Illustris scæmina vidua cum quadragesimali jejunijs sese per septimanas aliquot afflixisset; sub finem *Martii* melancholicas anxietates patitur, alvo simul adstricta, timore metuque penitus oppressa, cum pervigilia & delirio sine febre. Vocatus ego quamprimum clysterem ordino, cujus operatio sequitur optata, qua desinente, circa noctem laudan. opiat. gr. iv. (sat enim delicata erat mulier) exhibeo sine succedente somno. Sequenti die venæsectionem instituo in brachio ad *3vii.* cum successu repetito circa vesperam enemate, cum subsequente laudano opiato, cujus gr. v. assumptis bene dormivit per noctem, postmodum evacuationem quoque tentavimus laxativo minerali cum diagridio permisto, reiteratis aliquoties venæsectionibus tam in brachio quam in pedibus: non neglectis aliis quæ symptomatum leniendorum gratia necessaria videbantur: ut hoc modo menstruo spatio perfectè restitueretur. Deo clementer medicamentorum operationem benedicente. *Gregorius Horstius, in epistol. ad observat. 18. lib. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Melancholia.

**O**peram det ut quotidie beneficium ventris habeat; id si non fieret; quarta uncia pars bonæ terebinthinæ assumenda erit: hujus usu ad multa utilis futurus est. Utatur sæpius facch. rosato maxime matutino tempore ad *3ß.* Item singulis septimanis bis sumat *3ß.* rhei, idque vel mastice atque deglutiat, vel in pulvere redigat, & cum uvis passis aut saccha-

ro rosac. accipiat. *Joh. Baptista Montanus, cons. 24.*

In usum vocetur emulsio nostra margarit. quæ sic fit.

*24.* Margarit. præp. *3ii.* chrysolithi præp. *3i.* commisceantur cum julepo rosato, & addantur aq. borrag. è flor. in vitreo vase destillatæ *3iv.* syrup. de borrag. *3ii.* aqu. cinnam. *3ß.* M. Sumat de hoc singulis diebus tria cochlearia maxime dum malum molestat *Joh. Crato, consil. 34. libro 7.*

Præcautionis ratione purgetur melancholia, venaque secetur, si sanguine circumfluit. Victum qui evincere potest crassitiem succorum instituat. Cum autem in corruptelam rapitur melancholia, quod evacuata non fuit enthusiasmum profert, & spectra miranda ab indicibili qualitate. Cum *δυσθυμία* diuturnam animadverteris quæ zelotypiam facit, cave ne armorum illi copia fiat, admonui aliquando amicos frustra; nam id ridebant, de quodam qui postea se & uxorem interfecit cul tello. *Joh. Heurnius ad aphor. 23. sect. 6.*

*Valescus de Taranta*, & alii valde laudant hunc pulverem *Haly*, quem ipse his verbis commendat: posito, inquit, quod alia medicina non valeant, ista valet nutu Dei mi sericordis, & est medicina coronata quæ secretissime teneatur, ut intellectus humanus deperditus hoc medicamento instauretur. Paratur autem hoc modo.

*24.* Epithym. *3ß.* lap. lazul. agar. an. *3ii.* scammon. *3i.* cariophyll. num. *30.* F. pulvis, qui semel in septimana datur à *3ii.* ad *3iv.* in aqua vel syrup. aliquo convenienti, vix tamen iste pulvis, nisi corpus antea benè humectatum sit, satis commodus est, cum valde siccandi vim habeat. *Daniel Sennertus, pract. lib. 1. part. 2. cap. 11.*

Juvenis quidam triginta annorum melancholia detinebatur pertinacissima: cranium diligenter aperto à *Jul. Casserio Placentino* Anatomes & Chirurgiæ peritissimo, præsentè *Joh. Pravotio*; etiam si nulla esset puris membranæ incumbens suspicio, cerebro tamen eventilato ad sanitatem rediit. *Joh. Rhodius, observ. 43. cent. 1.*

Nonnulli laudant trepanationem; nam casu



casu fortuito multi sic curati sunt, fracta calvaria; quod mihi non videtur omnino rejiciendum. Visa est mulier melancholica & maniaca nostro tempore, cui ob casum apertum est cranium: unde effluxit aqua, & curata est ab insania: quare si pari ratione trepanetur, vapores atri, & si quid est aliud præter naturam in cerebro vacuantur. Cauteria etiam posita supra futuram capitis coronalem multum laudantur; sed oportet diutius remanere, ut os capitis unctionem sentiat. *Guil. Rondeletius, cap. 41. lib. 1. pract.*

Bibat vinum dilutum cum aqua helenii: helenium miram habet proprietatem ad hilaritatem & gaudium excitandum; quod multi pro secreto habent: ideo conservatilius, & aqua destillata plurimum valent. *Guil. Rondeletius, cap. 9. libro 1. pract.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### *Pro Melancholia Hypochondriaca.*

**P**rimum optima in hac affectione tenenda victus ratio, quæ nisi observetur, in medicamentis ipse erit dubia. Utatur itaque cibis bonis succi, ut est vitulina caro, pulli, pipiones, aves nemorales: palustres omnes, ut anates, anseres: carnes cervinas, suum tam sylvestrium, quam domesticarum relinquat: non comedat fumo macerata, non falsa admodum aut aromatibus superflue condita; abstineat à leguminibus, oleribus, rapas tamen bene coctas, & conditas cariophyllis comedere poterit, non misceat multos cibos, sed duobus ferculis, elixa videlicet carne & assa; contentus sit: ante cibum interdum pruna vel passulas sumat, quæ prius in vino vel aqua sacchari maceratæ intumuerint: nimium non ingerat, maximè in cœna, quam parcissimam esse convenit. Nutrimento utatur, neque imbecilli & tenui omnino, neque crasso & fumoso. Pisces ferè omnes, frixa in sartagine, ova cum butyro cocta, & lacticia fugiat. Vinum maturum & tenue bibat, sed parcè. Post sumptum cibum accipiat cochl. i. pulveris peptici, à cibo exercitia, quæ cibum præcedere debent cavenda; etiam graves animi

cogitationes, frictiones matutinae universi corporis cum oleo amygdalino, balnea quoque in aqua dulci maximè commendantur, ut alvus sit in officio opera danda. Quod ad medicamenta attinet, omnium fortiorum pharmacorum usum dissuadeo. Scio probari hieram *Logadii*, qua usum fuisse *Ptolomaum* Regem ad omnia vitia melancholica audivimus. Verum sæpe audacia ista infelicitè cedit. Usus syrupi de pomis cum helleboro non improbo, imò maximè suadeo: ex apertione hamorrhoidum magnam levationem sentiret. Aperientia in hoc malo & obstructions tollentia maximum quoque auxilium ferunt: inter ea primum locum ego tribuo radici centa. maj. quam vulgus *Rhaponticum* vocat. Succus sanguineus è recenti radice exprimitur, cum sacch. in formam Syrupi redigitur, ac de eo singulis diebus manè sumuntur cochl. duo vel tria. Bibat etiam aliquando ante cœnam haustum vini in quo radix centaurii maj. minutim incisa per viginti quatuor horas fuerit macerata. *Ioh. Crato consil. 107. lib. 1.*

Meo atque aliorum exemplo didici nihil esse convenientius, nihil etiam coctioni accommodatius quam gestare ceratum ex una parte ladani purissimi, & duabus ceræ compositum: suavissimè enim fovet calorem innatum, & ad flatus discutiendos, atque coctionum plurimum facit: initio nonnihil molestum videtur, sed temporis progressu plurimum juvat. Ego præpotenti Deo, qui mihi hoc medicamentum ostendit, gratias ago; certe flatulenta melancholia laborantibus nihil eo utilius. *Ioh. Crato consil. 14. lib. 2.*

Et si sciam omnes fere practicos consulere fortissima & validissima medicamenta purgantia; tamen à *Mesue* persuasus, idem facere debile medicamentum repetitum & minore periculo, quod forte semel & confertim facit, sane cur mihi aliud persuaderi patiar, veras causas non video: nihil dico quot & quos similiter affectos curaverim, licet hoc vere possem, sed nunquam me lapide Lazuli vel scamoneatis usum esse vere affirmare possum: itaque in bonam partem accipiant Medici, si nec nunc probem. Senam tutam esse scio, ea ad hunc modum crebrò vel singu.



singulis saltem septimanis semel utatur.

℞. Passul. min. ℥vi. flor. borrag. viol. melist. an. p. j. galang. incis. ℥vi. fol. sen. ℥vi. F. decoctio & infusio per noctem, manè rursus ebulliant, & fortiter exprimantur, in expressionis ℥iv. dissolv. syrup. ros. solut. de pomis, mannæ alexandrinæ, an. ℥β. M. F. potio syrup. de pomis. Hæc est descriptio.

℞. Fol. scolopendr. puleg. meliss. chamædr. an. M. j. flor. borrag. sebest. ceterach. summitat. thymi, stæch. an. M. β. fol. sen. el. epithym. an. ℥j. cort. helleb. nigri. ℥β. succ. pomor. lb̄ss. succi agrimon.umat. an. lb̄ss. F. horum infusio & decoctio, colaturæ adde sacch. q. s. aromatizetur cum cariophyllis. In Pilulis & electuariis quæ nimium siccantia medicamenta habet, exiguam spem pono Pulverem *Haly* scio à multis commendari, verum dictum *Mesue* statuentis esse gradum sapientiæ ad medicinas fortes non devenire, nisi ubi debiles non contulerint, mihi in animo est, utatur igitur qui volet. *Io. Crato. conf. 16. lib. 2.*

Ut humoris melancolici copia minuaturs sequens syrupus singulis, aut alternis matutinis assumatur.

℞. Succ. pomorum redol. meliss. an. lb̄ss. infunde fol. sen. ℥ix. cortic. helleb. nigri ℥vi. sem. ocymi contusi ℥ij. macerentur, & facta fortis expressione, cum sacchar. q. s. F. syrupus: quindecim diebus coctlear. unum prædicti syrupi assumat.

Omnibus vespertinis horis de electuario subscripto nucis, juglandis quantitate utatur.

℞. Amygd. d. excorticat. ℥ij. nuc. jugland. excort. ℥ss. nucleor. per sicor. mundat ℥i. contund. cum aq. meliss. & adde sem. ocymi ℥j. citri ℥ss. margar. ℥j. conserv. meliss. beton. an. ℥iij. M. & cum syrup. de cortic. citri, F. Electuarium. Lixivium fiat è majorana, asaro & verbena, quo quotidie ante cœnam caput lavetur. Potui infundatur anagallis floribus luteis: item incoquatur jusculis & cibis, aut ejusdem conserva à cibo assumatur. *Joh. Crato, confil. 103. lib. 6.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Melancholia Hypochondriaca.*

℞. S Eri caprilli ℥iv. fol. sem. ℥i. cinnam. ℥i. infund. per noctem, manè facta ebullitione exhib. serum, hoc est medicamentum præstantissimum in hoc morbo; quia non solum alvum movet, sed etiam attemperat jecoris calorem præsertim si serum in majori copia bibatur. *Rodericus à Fonseca tomo 2. consult. 82.*

Usitatis medicamentis non proficientibus, ad medicamentum ex calybe confugiendum erit, quale est medicamentum chalybeatum nostrum sæpius feliciter cum successu usurpatum.

℞. Conserv. ros. ℥β. limatur. chalyb. præpar. pulver. ℥ii. spec. diarrh. abbat. ℥j. cariophyll gr. iii. M. & cum syrup. bysantino, F. bolus, capiat quinque horis ante prandium viginti saltem diebus continu. *is Joh. Zecchius, consult. 81.*

Jurium Doctori hoc affectu laboranti sequens consilium dedi.

His pilulis successivè utatur.

℞. Aloes ℥ij. rhei. ℥i. epithym. rad. asar. an. ℥β. gummi ammoniac. in aceto soluti ℥i. spic. ℥i. diagrid. ℥β. cum terebinth. F. Massa pilul.

Frequenter à cibo in fine mensæ, capiat pulverem sequentem, in prandio vel cœna, alternis ad minimum diebus, ut concoctio juvetur, flatus & vapores discutiantur.

℞. Sem. coriandr. præp. ℥ij. sem. anis. fœnic. an. dr. i. sem. carvi ℥β. 3. flor. cordial. an. dr. m. fol. meliss. ℥i. major. dr. m. sacch. ros. tab. ℥ii. Fiat pulvis. Venter item & hypochondria sequenti oleo ter in septimana, mane ungantur.

℞. Ol. anet. chamæm. an. ℥i. ol. de capar. irin. dr. ii. succ. absinth. ℥i. aceti ℥. m. coq. ad succor. consumptionem, ut F. instar linimenti.

℞. Conserv. ros. cortic. citri condit. an. ℥i. Conserv. majoran. anthos, bugl. meliss. an. ℥i. Confect. alker m. dr. ii. pulv. elect. de gemmis, diamargar. frigid. an. ℥i. cinnam. sem. ocymi, an. dr. m. syrup. de papav. ℥i. F. Electuar. capiat tertio quoque die cubitum



iturus magnitudine nucis mosch. vel paulo plus, si vigilæ urgeant, angores & perturbationes quibus egregie resistat. Vindemiarum tempore fundantur multi rec. mensuræ xii. supra sequentia.

℥℥. Cortic. tamarisc. ℥iv. cortic. cappar. ℥ii. sarsapar. ℥iii. flor. bugloss. borrag. an. p. ij. fol. meliss. absinth. an. M. j. incidantur, & effervescent in dolio: hoc vinum bibatur in mensæ principio aliquando etiam manè, post exhibitum prius iusculum; balnei sudatori usum interdum non improbarem, uti nec lotiones capitis ex lixivio, in quo herbæ capitales coxerint caveat à vehementioribus purgationibus, cum irriterent potius malum. Si Hæmorrhoides fluere nullum esset præstantius remedium, quæ sanguisugis admotis, promoveri poterunt, domum reversus post horum usum uxorem duxit, quod illi etiam profuturum suaseram, & sic melancholiam illam deposuit *Felix Platerus observ. lib. 1. pag. 62.*

Pro alio hoc mordo laborante sequentia ordinavi.

℥℥. Rad. cichor. ℥i. rad. scenic. ireos, cortic. tamarisc. an. ℥ss. enul. camp. fol. absinth. an. ℥iii. major. chamæpit. chamædr. an. ℥ij. fl. cordial. an. ℥i. sem. anis. scenic. petrosel. an. ℥ss. fol. sen. ℥ss. sem. cartham. contus. ℥i. contund. & incidantur, & sacculo includantur, qui infundatur in vini albi q. s. usus est per quinque dies. Deinde pilulis usualibus uti iussi.

℥℥. Aloes ℥ii. myrrh. ℥ss. gummi ammoniac. in aceto solut. ℥i. agar. rhei, an. ℥ss. rad. asar. gentian. an. dr. m. mastich. ℥j. spic. sem. petrosel. an. ℥. m. cum succo absinth. instar extracti inspissati, F. massa passul. capiat ℥. m. vel paulo plus semel in septimana, utatur pulvere peptico post pastum.

Pilulæ sequentes multis in hoc casu admodum profuerunt.

℥℥. Aloes dr. m. rhei, agar. an. dr. i. zinzib. mastich. gentian. an. ℥i. gummi ammoniac. in aceto dissoluti dr. m. summitat. absinth. & cent. min. an. ℥i. limat. chalyb. dr. m. terebinth. q. s. F. massa pilul. capiat dr. m. pro vice. *Felix Platerus, obs. lib. 1. pag. 65. & 66.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Melancholia Hypochondriaca.

**A**d obstructions sensim aperiendas, & humorem melancholicum sensim expurgandum ac contemperandum, laudat *Fonsæca* pilulas sequentes quas diatartarum appellat.

℥℥. Sen. mundat. pulverat. & sal. tartar. an. ℥i. cinnam. pulv. ℥ss. cum syrup. de limon. fiat massa cujus capiat pilul. iii. pond. ℥. m. per horam ante cœnam: non minus efficaciter senna infundi poterit cum sale tartari & gutt. aliquot spirit. vitrioli in liquore idoneo. Testantur aliqui decocto absinth. aut vino absinthite per triginta aut quadraginta dies usurpato melancholiam hypochondriacam fuisse curatam. Succus bugl. ad humorem atrabilarium contemperandum efficacissimus est ideo illius ℥ii. cum sacch. dr. ii. vel cum vini opt. æquali portione per decem aut duodecim dies manè utiliter exhiberi poterunt. Ad dictas obstructions aperiendas nonnulli Authores commendant decoctum rad. chinæ, ut in lienis obstructione dictum est. Decoctum rad. cynosbati pro potu ordinario à quibusdam plurimum laudatur; aperit enim & roborat partes omnes naturales. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 12. cap. 5.*

Melancholicis pulvis fumarie sæpius exhibeatur & liberantur. Magni nominis Medici est hæc aqua secreta melancholice hypochondriacæ convenientissima.

℥℥. Flor. borrag. bugl. stachad. an. ℥. m. rorismar. major. meliss. an. ℥ii. m. rad. bugl. dr. ii. pæon. dr. i. aqu. bugl. borrag. an. ℥iii. syrup. granat. ℥ii. m. pulv. cinnam. galang. cariophyll. croci sem. ocymi, an. dr. i. superfunde vini rhen. ℥iiii. stent in infus. per duos vel tres dies, deinde destill. in B. *Ioh. Hartemannus, pract. Chim. p. 59.*

Mulier quædam quum optimè semper valeat, post partum ilicò melancholia morbo afficitur & per mensem insana permanet; sed postea paucis adhibitis præfidiis ad consuetam sanitatem revertitur. Cujus affectionis causa humor melancholicus commotus parturitionis tempore esse videtur *Amat. Lusitanus, cent. 2. cur. 52.*

Mulier Pisaurensis facie nigricans, cum in ute-



utero gereret, melancholia morbo detinebatur & ita varia & multa effutiebatur, ut omnibus admirationi esset. Ob retentos fortè menses, melancholiam præ se ferentes, morbus hic originem trahebat. Memini me aliam *Ancona* vidisse, quæ cum pariebat melancholica quoque evadebat; ita enim varia & multa pro varia melancholiæ miscella evenire contingunt. Oporteret igitur mulierem hanc, de qua curatio nostra agit, ante conceptionem optimè purgare. *Idem. cent. 5. cur. 87.*

## SECTIO DECIMA.

### *Pro Memoria diminuta & pene abolita.*

**V**aria remedia præscripsimus & inter cetera hoc conditum.

24. Rad. acor. veri, seu galang. maj. condit. conf. flor. beton. conf. flor. rorism. an. ʒi. conf. fl. primulæ veris, ʒβ. cubeb. cinnam. nuc. mosch. pulv. an. ʒi. cum syr. de stach. F. conditum. Sumebatur (prius adhibitis universalibus remediis) omni manè ad magnitudinem castaneæ. Deinde inter alia topica hoc sequens experti sumus multum profuisse; omni manè nucham & occiput fortiter fricabat cum aqua hederæ arboreæ, ter quaterve destillata in alembico vitreo calide: qua frictione cum diu usus esset, & longo tempore ter in septimana manè sumpsisset myrobalanum chebulum unum conditum tandem cum admiratione memoriam recepit. Erat hoc experimentum *Ioh. Tyengii Medici Amstelodamenses*, ut in ejus Libro manu sua scripto inveni: quanquam hujus arcani primus inventor fuerit *Nicolaus Florentinus. Petrus Forestus, Schol. obs. 32. lib. 10. De Morbis Cerebri.*

Si aliquis sanus existens memoriam habet imminutam, utatur vino roremarinato.

Quidam hoc exhibent ad memoriam.

24. Pulv. acori, piper. long. an. dr. i. cum melle crudo, inunctis prius manibus butyro, F. pilulæ, exhib. ad dr. β. per aliquot dies. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 93.*

In forma pulveris hic singularis ad memoriam conservandam prædicatur.

24. Thuris masculi ʒm. F. pulvis capiat per se, vel cum vino, aut aqua convenienti frequenter. Si piper addatur, lau-

datissimum erit remedium hoc modo paratum.

24. Tur. masc. dr. xv. piper. dr. v. F. pulvis. Detur omni manè dri. per dies quadraginta: zinziber conditum manè sumptum probatur, pyrethri item radix dum recens est condita zinziberis instar comesta magni fit. Cujus decoctum contra oblivionem *Paracelsus* probat. Confectio anacardina ad memoriam reparandam, præcipuè inventa fuit, præsertim si sine castoreo, ob ingratiam paretur, uti docet *Gordonus*, cujus dr. m. vel dr. i. vel pluseriam cum aqua aliqua convenienti, ut fœnicul. & apii, secundum *Gordon.* exhibeatur, quæ si nimium corpus accedat, sic parabitur.

24. Confect. anacardin. dr. i. conserv. major. & anath. an. ʒm. M. capiat semel vel bis in septimana dri. pro vice. *Felix Platerus, pract. tom. 1. cap. v. pag. 7. & 8.*

*Bened. Faventinus* syrup. suum de aromatibus commendat, quem ita describit.

24. Fol. & flor. sampsuchi, thymi, pulg. serpilli menthæ, calamenth. hort. sifymb. rorismar. salv. beton. an. M. ij coq. in f. q. aq. ad consumptionem tertiæ partis, colat. infund. cinnam. nuc. mosch. macis, spic. nard. folii, zinzib. an. ʒi. ambr. mosch. an. g. ij. bulliant ad quartæ partis consumptionem & cum sacch. f. q. F. l. a. syrupus, cujus ʒm. cum aq. flor. citri ʒiii. misceantur pro una dosi, & sic pro aliis quinque vel sex.

Laudatur hoc electuar. *Mesue* tanquam expertum & utile.

24. Mell. anacardin. thur. rad. cyper. acor. an. ʒi. piper. rot. & long. an. ʒm. myrobal. cheb. ind. an. ʒi. mell. q. s. F. el. dosis à dr. i ad dr. ii. vel.

24. Conserv. lil. convall. beton. salv. anthos, an. ʒi. conserv. lavendul. ʒm. spec. di. ambr. diamosch. dulc. an. dri. sem. carvi cariophyll. cubeb. nuc. mosch. an. dr. m. ol. cinnam. gt. ij. cum syrup. de stach. vel f. q. sacch. in aq. rosar. dissoluti F. elect.

Utilis est aqua sequens *Vidi Vidi*, quam mirificè memoriam confortare, & ingenium acuere scribit, si manè dr. ii. sumantur.

24. Spir. vini opt. lbv. ad. bugl. meliss. beton. stachad. flor. lilii convall. an. lbm. flor. anthos, ros. bugl. majoran. an. M. j. spec.



j. spec. diaphir. diacastor. an. ℥iii. confect. anacard. ℥i. infundantur prius flores, post species, stent in digestionem per mensem. Postea distillantur. Aquæ vitæ duæ pretiosissimæ quas *Gasparus Pencernus* describit in suo tractatu de memoria, & ex aulis principum accepit. Prima.

℥. Cubeb. ℥ii. concid. minutim, & infund. vini sublimati ℔i℔. vel ℔ii. insolentur calido loco, reponantur octiduum vase vitreo bene obturato, adde flor. salviæ min. anthos, borrag. bugloss. an. ℥ii. ros. rub. sic. lil. convall. an. ℥℔. meliss. cort. citr. rec. beton. flor. tunicis, an. ℥℔. santal. citr. rub. an. ℥ii. F. omnium pulvis, & sic infusa tepido loco asserventur, macerenturque tandem, donec liquor injectorum vires omni ex parte exforbuerit, ac combiberit, quod saporeprehenditur, sitque ferè spatio duorum mensium: nihil obfuerit si integram ætatem Solis radiis exposueris, tandem per manicam *Hippocr* trajectantur: si libet adjici possunt moschus, ambra, ut aqua tanto fiat fortior dosi cochlear. j. aut ℔. jejuno stomacho. Altera aqua.

℥. Cinnam. ℥℔. zinzib. ℥ii. santal. omnium an. ℥iii. cariophyll. galang. nuc. mosch. an. ℥iv. macis cubeb. an. ℥℔. Cardamom. ℥℔. Zedoar. sem. nigell. an. ℥℔. anis. fœnic. pastinac. sylvestr. ocymid. angelic. cariophyllat. liquirit. cal. aromat. valerian. min. fol. hormin. thymi calamenth. puleg. menth. serpill. major. an. ℥i. flor. ros. rub. salviæ beton. anth. stœchad. bugl. borrag. an. ℥ii. cortic. citri, ℥℔. spec. diamb. ℥iii. Arom. rosat. diamosch. d. diarrh. abb. an. ℥ii. terenda terantur & infund. ℔vi. aq. vitæ præstantiss. sinantur in vitreo vase per dies quindecim continuos stare; deinde destillantur per alembic. in B. M. arte oclusis commissuris: in aquam extillat. ponantur santal. incis. ℥i. mosch. ambr. in pet. ligat. an. gr. iv. vel v. Iulepi rosati, ℔℔. stentque ita per dies quindecim, postea aqua separetur: præsentanea auxilia sunt aquæ hæc ad reparandam memoriam.

Multum etiam prodest, præsertim apud senes, in memoria deperdita restauranda pulvis *Trithemii*, qui ita paratur.

℥. Macis, cubeb. cariophyll. an. ℥vi. fol. senæ el. chamæpit. zinzib. alb. chrystall.

tartar. an. dr. v. Rad. cal. aromat. gentian. sem. cumin. filer. montan. anis. petrosel. spic. indic. spic. nard. an. ℥℔. Magist. corall. perlat. an. dr. ii. F. omnium pulpis s. a. dosi ℥i. hunc accipiat primo mense manè & vesperi ante cibum horis tribus in vino vel etiam brodio: secundo mense tantum manè: tertio mense, manè ter in septimana, quarto mense bis in septimana, & sic deinceps per aliquot menses.

*Marsilius Fitinus* è tribus illis muneribus, quæ magni Christo obtulerunt, confectionem auream parat, memoriæ conservandæ, ingenio acuendo, sensibus vegetandis, spiritibusque fovendis & roborandis utilem.

℥. Thur. ℥ii. myrrh. ℥i. auri foliati dr. ℔. cum vino F. pilulæ, quarum aliquot sub auroram sumantur. *Daniel Senner-tus*, pract. lib. i. part. 2. cap. 5.

Post convenientem cerebelli expurgationem, memoriam vehementer corroborare & amissam restaurare chimici non sine rationibus asserunt, si quis singulis septimanis bis aut ter ℔℔. olei vitrioli rectificati cum haustu vini generosi jejuno ventriculo ebibat: crassos enim spiritus discutit & clarificat, lentos humores in cerebello extenuat, ipsumque cerebrum ad convenientem temperiem reducit: restituit etiam amissam memoriam aqua vitæ nostra quæ sic conficitur.

℥. Aq. stillat. juniperi ℔iv. flor. lilii convall. M. ii. flor. salviæ, Mi. macerentur in Sole diebus quatuordecim: deinde exprimantur, accolentur colato liquori rursus indantur roris mar. lavend. an. ℥ii. spec. diamosch. d. diamb. an. ℥ii. sacch. candidi in aq. lavend. soluti ℔i. quibus simul mixtis, macerentur per mensem, ac tandem destillantur in balneo arenæ hujus aquæ cochlear. i. per hebdomadam sumptum illustrat spiritus animales, & mirifice corroborat memoriam, præservat ab apoplexia & epilepsia & hisce malis correptos brevi sanitati restituit, si eam vel intra corpus assumant, vel ea foris affectæ partes inungantur; memoriam etiam corroborat, si ea sæpius occiput inungatur. *Franc. Joek. pract. lib. i. sect. 2. paragrapho 5.*



Commendatur in memoriæ defectu oleum myrrhæ temporibus & sincipiti inunctum; quod *Horstius* sic conficit, coq. ova ad duritiem, vitellum exime, & cavitatem imple myrrha pulv. & resolvetur myrrha in oleum quod in cella servabis sub arena, confortatur etiam memoria inunctione fellicis pernici. *VVolsfgangus Hæserus, lib. 7. Herc. Medic. cap. 6.*

## SECTIO UNDECIMA.

### De Mensium fluxu immoderato.

**M**ensium fluxus immodicus, excretum est sanguinolentum ab utero, copio, vel tempore excedens propter vasorum illius nimiam apertionem per anastomosis, diapedesis, vel diæresin: causas easdem habet cum narium hæmorrhagia, procatartica sunt, exercitia validiora, alimenta πολύκιμα copiosius assumpta, vehementes, animi passiones, aer calidior, abortus frequentes, partus laboriosi, vociferatio, casus ex equo, violenta rhædæ agitatio, ponderis gravis elevatio, nimia sternutatio, medicamenta acria intempestivè exhibita, venena denique, caustica, septica, & id genus alia, hujus symptomatis signum certissimum est imbecillitas virium, adest etiam corporis καβέξια inappetentia δυσπείξα, pedum tumor œdematosus, vultus cadaverosus, cordis anxietas, pulsus parvus & languidus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Mensium fluxu immoderato.

**V**ictus rationem præscripsi convenientem, quæ restauraret, & simul alia quæ ad menses sistendos facerent, turturem quoque accepi moderatè pinguem, ab intestinis & facibus repurgatum, cum deplumatum lavari jussi cum vino rubro astringenti & aqua rosac. deinde ℥i. mastich. in ventre ponebam, assuebam ne elabi posset, atque ita veru ad ignem rotabam, & inter assandum loco butyri aceto rosac. aspergebam: pinguedinem ex eo defluentem colligebam, usuque reservabam. Post per-

*Burent Parte I.*

fectam assationem, turturem ab igne & veru depositum in ollam novam vitreata coniciebam luto philosophico obturatam, & in furnum calidum demittendo, ut turtur perfectè exsiccari posset, una cum ossibus & carne in pollinem tenuissimum redigebam: hujus pulveris magno commodo omni modo manè dabam cochl. i. modò cum aq. plant. modò cum alio decocto costringente, & pinguedine reservata in unum ventrem, tum pectinem, inguina, & regionem renum quotidie ut inungeret mandavi, erat hoc unum ex arcanis præceptoris mei *Elidai* practici *Bononiensis* clarissimi, hoc pulvere cum uti vidi scèlicissimè in multis matronis nobilibus; omnem enim diarrhæam sanat, ventris diuturna profluvia, omnemque humiditatem consumit; album tum rubrum fluxum menstruum restringit, matricisque dolorem sedat. Mulier quædam *Romana* longo tempore ex hoc malo decubuerat, nec sanari potuerat, donec tandem consilio vetulæ, nonis vicibus ℥i. pulv. ossium humanorum ex vino rubro assumpta, sanata est. *Petrus Forestus, obs. 10. lib. 28. De mulierum morbis.*

Adhibeatur experimentum illud *Guainerii* quo matronam quandam curavit, quæ ob elevationem gravisoneris diu talem fluxum patiebatur: dabat ille ℥i. tribus vicibus stomacho vacuo cineris stercoris caprarum cum aqua pluviali. Aliam etiam curavit a sinino stercore quod à proprietate sanguinem stringere scribit: succum ex eo recens excreto exprimebat, & dabat cum syrup. myrtino & aq. plantag. aliquot vicibus. *Petrus Forestus, obs. 16. lib. 28.*

Matronæ cuidam quæ fluxum muliebrem & menses copiosos ita habebat, ut in syncopen quasi incideret; nec ullis modis restringi posset, mulier quædam exhibuit tria cochlearia aq. plantag. cum tribus cochl. vini rubri adjiciendo vitellum unius ovi, leviter tandem ebulliendo singulis diebus omni manè totum sumebat superdormiendo: vix duobus diebus aut tribus cum sumpisset, fluxus ille enormis cessavit, & sanitati fuit restituta; hoc eodem remedio postea; & plures à scædo illo malo liberatæ sunt per me Deo adjuvante. *Petrus Forestus, Schol. ad observ. 18. lib. 28.*

Fiat primò n revulsio, quæ fit duobus



modis, aliquando aspectabili, ut emissio sanguine, aliquando inspectabili, ut vinctulis, cucurbitulis. Post cucurbitas adhibitas, danda sunt astringentia, ut pars confirmetur, meatus claudantur, & sanguinis impetus prohibeatur: itaque mammis adhibebimus cucurbitam revulsionis ergo, cum largiori copia, vel longo tempore, ultraque dies septem effluat sanguis: potest etiam sanguis auferri ex brachio, si plenitudo sanguinis adsit, & succus plantag. ad moveri, nos hunc pulverem maximo successu propinamus.

℞. Sem. hyosciami alb. sem. papav. alb. an. ʒj. Hæmatit. corall. rubr. an. ʒss. camphor. ʒss. M. sumat manè & vespere ʒss. *Iohann. Heurnius, ad aphor. 50. sect. 5.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Mensium fluxu immodico.*

**I**Nter alia remedia mulieri cuidam præscripta, quæ ex immodico fluxu mensium ad extrema redacta fuerat sequens julepus mirum in modum profuit.

℞. Flor. chamæleont. spic. nard. sang. dra. subtilissimè pulver. an. ʒj. aq. plantag. & ros. an. ʒss. F. Julepus. Hujus cochl. duo dabantur bis in hora: extractum coralli cum aq. plantag. profuit etiam non parum. *Lazarus Riverius, observ. 32. cent. 2.*

Exhiberi jubeo in inopia aliorum remedium ʒj. pulveris ex putamin. ovor. combustis in jusculo; unde fluxus imminutus est intra paucas horas, ac sequenti die iterato remedio, omnino suppressus est. Alteri suasi ut succi urticæ depurat. ʒiv. manè & sero sumeret per biduum; bis assumpto remedio sanguinis fluxus valde imminutus est & ante viginti quatuor horas omnino cohibitus, eodem tempore admovebat uteri regioni fotum ex spongia in aceto & vino rubro austero ma defacta hoc remedium alias in simili casu cum pari successu à me usurpatum est. *Simeon Iacoz. observ. 86. cent. 4. observ. River.*

Mulier quædam rustica mensium fluxu immodico laborabat; cum remedia non suppeterent, nec ægrotantis fortuna eorum sumptus ferre posset, exhibui statim succi urticæ ʒv. aut vi. & jussi ad moveri

parti hypogastricæ prædictum succum cum farina tritici subactum instar cataplasmat, circa mediam noctem utrumque reiterari jubeo; agra matutinis horis melius habuit, & sanguinis fluxus omnino cohibitus est, ac sensim absque alterius remedii ope convaluit. *Simeon Iacoz. obs. 7.*

Experimento comperi, quod tamen ab aliis annotatum est, decoctum capitum rubentium rosarum quibus semen continetur nunc in vino, nunc in aq. chalybeata factum aliquoties propinatum superfluos mulierum menses sistere. *Dioscorides* in hoc casu exhibet x. vel xii. rubentia grana pæoniaris, & menstruum profluvium istis sistis compertum est, advertendum ne imprudens pharmacopœus pro his semina pæoniæ substituat: sunt enim grana illa rubentia quæ in maris pæoniæ siliquis semina amplexu suo undique stipant & firman; quæque dehiscantibus siliquis gratissimo aspectu malum granatum reclusum æmulantur. *Reinerus Solenander, consil. 4. sect. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Mensium fluxu immodico.*

**D**Iæta sit incrassans siccans cum stipticis, sicut oriza, lac coctum, carnes assatæ, vinum stipticum: injiciatur succus stercoris asinini in matricem, secretum est hoc, & valet à proprietate: ad idem fiat cum eo epithema supra deorsum ad idem valet emplastrum ex stercore asini recenti factum: ad idem etiam valet balneum aquæ decoctionis aluminis pulverati, & est experimentum infallibile vetularum; & etiam potui data stringit menstrua rubra & alba, ceratum ad constringendum menstrua alb.

℞. Resin. pini ʒj. opoponac. galban. an. ʒj. musci ʒss. dissolv. gummi in succo fol. hederæ & cum modico aceti & ceræ q. s. F. ceratum à medietate spinæ usque ad finem ejus, & assidue portetur, & est remedium divinum: ego experientia habeo quod si quasi-letur pulv. gypsi lbj. cum dr. x. gummi Arabici torrefacti & quatuor albuminibus ovorum, & cum faldellis de cotto emplastrantur partes prædictæ, omnem mulierem fluxum abscindit uno die.

Experimentum probatum ad constringen-



gendum omnem fluxum menstruorum, est hoc.

24. Stercoris asini, desicca & pulveriza & involvatur pulvis in panno sericeo vel lineo subtili, & vulvæ imponatur, hoc enim mirabiliter operatur à forma specifica ut puto: bursa pastoris contusa & mulieri supposita experimentum optimum est ad constringendum quemlibet sanguinem à matrice fluentem, ad constringendum menstrua alba, aqua plantag. bibita manè per aliquot dies, est res probata, quæ multæ curatæ sunt ad idem herba umbilicus veneris quocumque modo sumpta, vel in pulvere, vel in aqua, vel alio modo; incomparabilis est in constringendo menstrua alba: dixit mihi mulier fide digna, quod in constringendo menstrua accipiebat herbæ polytrich. M. i. de quoquebat in optimo vino, videlicet in lbiii. usque ad consumptionem medietatis, postea ex dicto vino tepido exhibebat manè patienti ℥iii. & in tribus diebus curabatur; expertus sum & ita inveni ut dixit mihi. Item.

24. Unam bonam pullastram magnam, & depluma, & exenterea bene ab interioribus, & imple eam totam cumino, & bulliat donec caro ab ossibus separetur juris colati capiat mediam scutellam manè & serò per septimanam, & curabitur optime; experimentum bonum est ad constringendum menstrua & maximè alba. Ad constringendum menstruum fluxum est hoc probatum sapissimè.

24. Aq. plantag. in qua lavatus sit lapis hæmatites, usque ad rubedinem aquæ postea cum illa aqua misce elect. Athanasie magnæ, ℥ß. & da patienti manè, reiteretur, & liberabitur. Ad constringendum menstruum expertum.

24. Stercor. caprar. montanar. combure, da bibere in vino rubro stiptico: dosis ℥ß. ad ℥i. & curabitur optime. Ad constringendum menstrua alba & rubra experimentum verum & expertum.

24. Stercor. asini rec. torculati ℥iii. cum syrup. myrtino & aq. plantag. F. potio manè, & continua per aliquot dies, & curabitur, & est verum experimentum. Ad constringendum menstrua rubra & alba da pro vice ℥iß. pulv. ossium dactyl. & dicitur expertum; item comedat omni

die unum ovum recens crudum & post mediam horam bibat ℥iii. olei communis dulcis, & sic continua per novem dies & erit curata, & est expertum sæpe: ad idem fac cingulum ex pilis vel lana asini & cingatur mulier & statim cessabit fluxus, & si ponatur super caput strinxit fluxum narium: ad idem succus porri mirabiliter valet, & stringit etiam hæmorrhoidas.

Experimentum pluries probatum ad constringenda menstrua.

24. Florum nucum quando sunt maturi & cadere incipiunt cochlear. j. vel ℥i. in forma pulveris cum vino optimo calido jejuno stomacho per plures dies exhibeatur: ex hoc medicamine omnes habentes fluxum menstruorum sanantur: specifica etiam vi suffocationibus etiam uteri medetur ad constringendum menstruum rubeum antiquum, accipe succ. plantag. cyatum unum, impone ℥i. Colophonie pulver. & tribue ægræ, id fiat quater & erit curata infallibiliter, Deo dante *Reinerus. Solenander, consil. 8. sect. 4.*

Obstetrix quædam *Cæsarea* conjugis meæ secundinam exsiccatam & pulverisat. intra corpus exhibuit, cum post abortum menses tam violenter fluerent, ut nulla arte cohiberi potuerint, & sic paulo post restiteret: sed si eius pulveris nimium quæpiam sumpserit, ajunt eam sterilem omnino fieri. *Wolfgangus Hæserus, lib. 7. Hercul. Medic. cap. 1.*

Ancilla quædam cum fluxu menstruorum ita laborasset per aliquot dies, ut nullo modo sisti posset, jaspidem rubram femori alligari jussi, quo facto, subito mensium fluor substitit nec rediit. *Anselmus Boetius, lib. 2. de lapid. & gemm. cap. 102.*

Curatio mensium fluxus immodici, eadem fere esse debet cum ea quæ ad immodicum hæmorrhoidum fluxum fuit proposita. Primo phlebotomia revulsione gratia in brachio celebranda est partitis vicibus, & digito per vices foramini admoto: magna copia detrahendus est sanguis, quantum vires ferre possunt: testatur enim *Hollerus comment. ad aphor. 50. sect. 5.* se multas vidisse mulieres, quæ detracto multo sanguine è vena convaluerunt, cum nullis aliis remediis posset reprimi fluxus sanguinis: fri-



Etiones, ligaturæ & cucurbitulæ ad revulsionem etiam conveniunt; præcipuè verò mammis juxta ad aph. *Hippocr.* citatum; mulieri, (inquit) si placet menstrua sistere, cucurbitulam quam magnam ad mammas appone; si tamen admota cucurbitula difficultas spirandi oriatur subito auferenda est. Purgatio pariter eadem, ut in dicta curatione, convenire potest: eaque semel, aut bis in hebdomada erit repetenda, donec impuritati viscerum & venarum sit provisum purgatio etiam per vomitum potenter revellit, & ab *Hippocr.* laudatur 2. *De morb. mul.* blanda autem debent esse vomitoria, & frequenter iterata; aut etiam digito in os immisso vomitus provocari, poterit, deinde ad remedia incrassantia & astringentia veniendum erit, additis etiam narcoticis si urgeat necessitas; inter alia sequentia à doctissimis viris experta sunt.

24. Cortices duorum ovor. recent. ustos, thuris mastiches, an. ʒß. margarit. præp. corall. rubr. præp. carabes, an. ʒii. lapid. hæmatit. smaragdi, præp. an. ʒß. farinæ hordei sine furfure, p. ij. album ovor. numero 2. & si opus fuerit, adde parùm aquæ chalybeatæ, & fiant duæ placentæ, quæ in furno coquantur, ut possint in pulverem redigi: dosis à ʒß. ad ʒi. cum jusculo pedum vervecis summo manè; hoc pulvere multas mulieres, hoc affectu satis antiquo curatas fuisse testatur *Ioh. Michael. Paschalius*. Laudatur quoque solus pulvis corticis ovi ad ʒi. exhibitus in aurora per aliquot dies, & habetur pro secreto.

Nostrates mulieres vulgare remedium habent ex floribus chamæleontis, quibus lac condensare solent: exhibent jusculo, aut alio liquore: aliæ utuntur coagulo hædi, vel leporis ad ʒm. quod & sanguinem fluentem sistit; & concretum in utero dissolvit, succus millefolii hic etiam convenit, si ejus ʒii. vel iii. exhibeantur cum syrup. corall. aut alio convenienti, aqua ex tenerrimis & rubentibus quercus foliis extracta prædictum profluvium sistit. Inter specifica recensentur radix filipendulæ, & cortex radicis mori, quorum pulveres exhibentur ad ʒi. cum liquore idoneo: lac chalybeatum per plures dies epotum in affectu inveterato mul-

tum prodest: humorum enim acrimoniam contemperat, eosdemque incrassat corpus reficit & fluxui resistit: hoc commendat *Avicena*, *Rhasis* aliisque *Arabes*; & *Augenius* ad cælum extollit, aquæ minerales acidulæ, vitriolatæ, vel aluminosæ influxu diuturno cohibendo, causis ejusdem auferendis, & visceribus roborandis plurimum conferunt: chymici tincturam corall. valde comendant, ut & vitriolum matris *Ludovici Septalis* decoctum cortic. arantiorum tanquam remedium certum commedat, ut pote quo infinitas prope modum mulieres ab hoc morbo liberavit, ita parat.

24. Aquæ ʒvi. r. in quibus incoque corticestrium arantiorum acidorum aliquantò adhuc subviridium, ad duarum partium consumptionem ex colatura ʒviii. vel ix. manè potande dentur.

Inter externa, fomenta in hunc modum parari poterunt.

24. Rad. Bistort. tormentill. cortic. granator. an. ʒß. sol. plantag. centinod. burs. pastor. equiseti, an. M. i. nuc. cupress. balauft. gran. myrti, sumach. an. ʒi. bulliant in aq. ferrata & vino austero: colatura foveatur regio pubis valde tepidè: item sponsia marina in aceto forti bulliat, quæ supra pubem mulieris posita menstrua potenter sistit: semicupium ex priori decocto fctus paratum, aucta dosi, etiam convenit; sed cavendum ne calidum administretur, sed potius subfrigidum efficacissimum est balneum decoctionis; aluminis; sed sterilitatem inducit: linimentum post fctum vel semicupium admovendum est pubi, perinæ, & lumborum regioni in hunc modum compositum.

24. Ol. myrtini, de mastich. & cydon. an. ʒi. bol. armen. sang. drac. & carabes, an. ʒi. aceti cochl. j. F. linimentum: vel ad moveri poterit unguentum comitissæ vel ceratum sequens summè efficax.

24. Picis navalis, ʒß. thuris masculi ʒi. mastich. ʒß. terebinth. ʒi. sang. drac. rosar. rub. an. ʒij. F. ceratum renibus applicandum.

Emplastra etiam umbilico & lumbis utiliter admoventur ex massa empl. contraruptur. pro matrice, de mastiche, solis aut simul mixtis: vel ex massa emplastri de *Vigo*



pro fractur. quod præstantissimum est, & absque calefactione operatur.

Benignè operatur & specifica quadam vi potius quàm astrictione; cataplasma ex urtica cocta in sartagine, pubis-regioni admotum.

Suffitu ranarum combustarum testatur *Job. Michael Paschalius* se foeminam quandam curasse, quæ septem ferè mensibus hoc fluxu laboraverat. Idem etiam suffitum ungulæ mulæ hunc fluxum mirificè sistere expertum esse scribit. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 15. c. 3.*

℥. Fol. sen. mund. ℥i. zinzib. ℥i. agar. troch. ℥iij. sacch. ℥vi. passul. ℥ii. Coq. lento igne in feri lactis ℔iv. usque ad consumptionem ℔ss. Hujus decocti capiebat ℥iv. manè & vespèri 3. continuos dies. *Martinus Rulandus, Curat. 34. Cent. 6.*

Mulieri cuidam ex nimio mensium fluxu afflictæ, aliis nihil proficientibus, exhibui pilulas sequentes, quarum usu menses sistebantur, & postea ad justum ordinem se invicem subsequebantur.

℥. Rasi. ebor. corall. rubr. mastich. an. ℥ii. myrtill. ver. nuc. cupress. an. ℥ss. menth. ℥i. majoran. nuc. mosch. an. gr. v. gummi tragachanth. *Arabic.* an. ℥ss. cum succo consolid. maj. f. pilulæ ad modum alephanginarum De quibus exhibui alternis diebus 11. vel 12. prout putavi opus esse pro ratione fluxionis. *Jo. Scroderus, apud Io. VVutichium consil. 52.*

## SECTIO DUODECIMA.

### De Mensium suppressione.

**M**ensium suppressio est sanguinis menstrui ob ejus vitium vel viarum angustiam præter naturam retentio. Causæ ex definitione patent. Sanguis fit suppressionis mensium causa cum peccat quantitate aucta secundum *Gal. 10. method. cap. 2.* in plethora, vel quantitate diminuta, ut in inedia, vel corporibus se nimium exercentibus; vel rursus qualitate, ut cum crassus est vel denique motu, cum qui *αἷμα πρὸς* fluere debet versus uterum, aliò cursum deflectit; ut in hæmorrhagia narium, vomitu & sputo sanguinis. Angustia vasorum per quæ sanguis effluere

debet, alia est & præcipua suppressionis causa angustiam hanc efficiunt, primò & omnium maximè obstructio, secundò, constipatio, tertio, compressio à tumoribus uteri & vicinarum partium, quartò, coalescentia à carne facta, vel membrana aliqua in utero suborta, vel à cicatrice ab ulcere male curato superveniente. Dignoscitur mensium defectus ex ipsius foeminæ relatione.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Mensium suppressione.

℥. **R** Ad. apii, petrosel. valerian. scenic. an. ℥i. fol. meliss. artemis. calamenth. puleg. matricar. an. M. i. sabin. M. β. flor. chamæm. ros-mar. an. p. i. sem. anis. carvi, dauci, an. ℥ss. sem. nigell. (egregiè menses educit, ut & ejus farina in panno ligata & supposita, ut *Gradus & Gattinaria* testantur) ℥i. fol. sen. ℥vi. agar. ℥ii. zinzib. alb. dr. β. liquir. ras. ℥ss. uvar. exacinat. ℥i. F. omnium decoctio in aqua pro ℥iii. stent infusa per noctem manè fortissimæ expressioni adde syrup. de artemis. de quinque radic. an. dr. i. M. pro duabus dosibus. Deinde hoc modo purgetur.

℥. Pilul. fœtid. aggregat. an. ℥i. agar. troch. pilul. mastich. ℥ss. cum syrup. de artemis. F. pilulæ. Dentur post mediam noctem, tandem paulò ante tempus mensium, extrahatur sanguis ex Saphæna: Sumatur etiam subinde ℥i. pulveris dominarum adjecto ℥i. pulv. sabinæ cum vino rhenano, his paractis a perti sunt menses & rectè se habuit. Pulveris dominarum quo tunc utebamur hæc erat descriptio.

℥. Sesel. cumini, scenic. an. ℥iij. curcumæ ℥iii. nuc. mosch. cal. arom. an. ℥m. galang. zedoar. cassiæ lignæ, macis, cario-phyll. anthos. an. dr. ii. cinnamom. ℥m. croci dr. i. M. Sed & hoc modo ab aliis paratur.

℥. Cinnam. el. curcumæ, sacchari, an. ℥ii. zinzib. cario-phyll. macis, nuc. mosch. an. ℥m. baccar. juniperi, lauri, galang. an. dr. ii. sem. zedoar. croci, an. dr. i. M. F. pulvis.

Aliud pulvis Dominarum.

℥. Rhei dr. iij. galang. ℥i. rad. zed. semi-



nis filer. mont. cinnam. nuc. mosch. an. ℥vi. macis ℥β. cariophyll. ℥ii. cumini, fœnic. cal. arom. granor. junip. bacc. lauri, annif. an. ℥β. sacch. cand. ℥ii. F. pulvis *Amstelodami* apud quosdam in usu erat huic ultimus, sed primus mihi magis placet; quo com- modè frequenter usus sum. *Petrus Forestus, observ. 2. lib. 27. De Mulierum Morbis.*

Præmissis universalibus dedi ℥i. pulve- ris dominarum cum vino rhenano, & aperti sunt menses. Hoc modo hic pul- vis parabatur.

℥. Sem. fœseli ammeos, cinnam. an. ℥iib. cumini, ℥iii. sem. fœnic. apii, car- vi nuc. mosch. cal. arom. galang. an. ℥iβ. zinz. mac. carioph. an. ℥i. croci ℥iib. F. pulvis. *Idem obs. 4. lib. 28.*

Post universalia exhibita, instante men- sium tempore accipiat pulv. seq. ℥i. cum cyatho uno decoctionis sabinae, & artemisie.

℥. Pulv. dominar. infra describendi, ℥ii. troch. de myrrha. ℥i. M. sumpsit ca- lidè, & aperti sunt menses. Pulvis do- minarum ita se habet.

℥. Cumini ℥i. curcumæ ℥ii. cinnam. nuc. mosch. gran. paradyf. cal. arom. galang. zedoar. sem. fœnic. levistic. apii, carvi, aristol. rot. baccar. lauri, sem. nigell. an. ℥i. F. pulvis. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 28.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Mensium suppressione.

**M**enses evocantia hæc placent, sal sa- binæ chymicum ad ℥i. ex decocto pu- legii exhibitum; castoreum etiam devora- tum ad idem conducit. Sicut & medica- mentum quod fit ex æquis portionibus bo- racis mineralis & cassiæ lignæ in formam potus cum aqua adianthi exceptis. Oleum item vitrioli romani ad ℥β. in vino deco- ctionis betonicae & matricariæ exhibitum. Postremò est vinum chalybeatum, quod sic componitur.

℥. Vini albi generosi ℔xii. aq. stillat. ma- tricariæ ℔iii. fol. dictamn. cretic. pulegii, calamenth. organ. sabin. an. p. i. forte M. i.) rad. rubiæ maj. cyper. an. ℥i. cinnam. ma- cis, sem. dauci, an. ℥ii. M. bulliant in du-

plici vase ad quintæ partis consumptionem. Deinde addatur limatur. chalybis præp. ℔i. & omnia reponantur in vase vitreo bene obturato, vasque in stupha furnaria per decem dies continuos detineatur, & quo- tidie vas agitetur, dosis est ab ℥iii. ad ℥vi. *Iul. Casar. Claudinus, consil. 128.*

Ubi crassities in vitio est, diætam ineat attenuantem succos, suffitusque, fiat a- romatum, & pessi præscribantur, potio instituat ex vino cui incoxit calamentha vel pulegium, aut ambrotanum. Sed prius purgetur corpus, quod familiari- bus his pilulis ego maximè cum succes- su facio.

℥. Aloes ℥i. myrrh. gentian. aristol. di- ctamn. croci, an. ℥v. rubiæ maj. mithrid. an. ℥i. cum syrup. de artemis. F. Massa. Ca- piat pro dosi pilulas iv. vel v. quotidie mane decem vel duodecim matutinis con- tinuis ante solitum tempus purgationis menstruæ. *Ioh. Heurnius ad aphor. 36. sect. 4.*

Nobilissimam vidi puellam annorum vi- ginti, cui non ex sententia respondebant menses, huic glandula in mamma indu- ruerat. Author eram ut menses excita- rentur, ac mollia imponderentur, illa ad Empiricum abiit, qui cauterium impo- suit, ac mammas cum thorace exedit, ut anima thorace prodiret. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 40. sect. 5.*

℥. Pulp. cassiæ ℥i. spec. hier. simpl. ℥ii. cum sacch. F. bolus. Sumendus tribus ho- ris ante prandium.

℥. Syrup. de absinth. oxym. scillit. an. ℥i. decoct. beton. & rad. petrosel. ℥iv. M. pro uno julepo; & sic pro novem. Postea.

℥. Agar. præp. ℥ii. cass. rec. extract. ℥vi. M. F. bolus dandus in aurora.

Facta evacuatione tunc accipitur coma absinth. quantum scilicet manu capi potest & decoquatur in aq. cichor. cujus deco- cti ℥v. aut vi. horis 4. ante prandium per plures dies accipiet, atque interim bis in septimana accipiet pilul. aloeticam ex aloe pura, & non lota pondere ℥i. hora ante cœnam & iisdem temporibus manè & vesperi ante cœnam abluentur illi crura ex decocto pulegii, majora- næ, fol. lauri & chamam. sitque aqua calida; eodem tempore dum in balneo com-



commoratur ; applicentur ventosæ sine scarificatione, sub utroque poplite, & ita perseveretur per multos dies. Ultimò his non juvantibus sanguis quoque mittatur à Saphænis, qui quidem in hoc casu ultimo loco est mittendus, & non in principio, sicut plurimi faciunt.

Efficacissimæ quoque erunt hæ pilulæ, ubi aloë non satis profecerint.

℥. Myrrh. croci, aloes, agar. an. ℥i. pulveriz. omnia per se, deinde M. postea aspergantur cum succo majoranæ, permittantur exsiccari, & ita iteretur sexies, postea cum syrup. de absinth. F. magdaleon. ex ℥i. F. pilulæ .xx. sumenda tribus horis ante prandium, bis in septimana: hoc etiam utatur suffumigio intra uterum: erit enim remedium efficacissimum ad uterum roborandum & aperiendum.

℥. Cariophyll. nuc. mosch. cal. arom. sem. ocymi: flor. major. an. ℥i. ladan. el. myrrh. styrac. benioin. an. ℥i. pulv. pulveriz. pulverizanda & liquanda liquentur. Deinde cum oleo spicæ odorato & modico ceræ vel picis colophonix. F. trochisci parvi pondere ℥i. servantur pro suffumigiis. *Joh. Baptista Montanus, consil. 307. & 308.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Mensium suppressione.

**M**enses movet decoctio Splenis bovis *Quercetani* in Pharmacopœa, jus etiam pulli in quo coquantur cicera rubra, rad. apii & petros. cum ℥i. sal. tartari & gt. iii. essentix croci.

℥. Pulv. rub. tinctor. sacch. pulv. an. ℥i. M. divid. in tres partes, cujus una detur tempore mensium cum vino calido summo diluculo in lecto, in quo permaneat bene cooperta per horas quinque. Si non fluxerint Menses, rursus in secunda periodo exhibeatur altera pars: Si adhuc non appa-ruerint, rursus in tertia detur tertia pars. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 23.*

Supputando ab eo tempore quo ultimo desierant menses, d. diotiduo prius quam denuo expectarentur, de sequentibus pilulis ℥ii.

℥. Aloes ℥i. rhei ℥i. diagrid. ℥i. myrrh. rad. asar. an. ℥i. spicæ ℥i. croci ℥i. cum syrup. de artemis. F. massa pilul. Post tres dies menses supervenerunt. *Felix Platerus, observat. lib. 1. pag. 245.*  
Sit frequens usus sequentium pilul. hystericarum.

℥. Aloes succotr. ℥iii. myrrh. opt. ℥i. Extract. cal. aromat. Card. bened. an. ℥i. Extract. croci, gr. viii. rad. gentian. aristol. long. dictamn. an. gr. v. cum rob. sambucino F. massa pilul. quarum ℥i. per dies aliquot continuando frequenter in impuritate uteri & mensium obstructione à crassis & pituitosis humoribus proveniente cum successu utor. Plurimum etiam profuturum spero, post convenientem infimi ventris fomentationem & inunctionem, si sequens emplastrum gestetur.

℥. Rad. cyperi, rot. cal. arom. helenii, an. ℥i. rad. levistic. ℥i. fol. meliss. scor. dii, pulegii, an. M. ℥i. mastich. ℥i. thur. ℥ii. myrrh. ℥i. styrac. liq. ℥i. tacamah. ℥i. ladan. opt. ℥i. cum cera & terebinth. F. Emplastrum. *Gregorius Horstius, epist. 3. observ. 4. lib. 5. De Morbis Mulierum.*

Sumat tribus vicibus istam potiunculam alias satis efficacem.

℥. Troch. de myrrha borac. an. ℥ii. cinna. el. ℥i. ol. succini destill. ℥i. aq. puleg. ℥iii. M. h. haustulus tepidè accipiendus. *Io. Petrus Lotichius. observ. 14. cap. 1. lib. 5.*

Innumeris comprobavi experientis mar-  
rhubii albi summitates in vino albo infusas per noctem triduo epotas, mirè ad menstrua provocanda, stomachum roborandum, & cachexiam ac fædos virginum colores arcendos, appetitumque restituendum valere. *Petrus Borellus, observat. 14. centur. 4.*

*Jacchius* Doctissimus lignum Indicum coxit, & dictamnnum adjunxit; unde mulieri toto quinquennio non purgatæ, ac sterili purgationem evocavit: ut & deinde conceperit. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 28. De Morbis Mulierum.*

In ambobus cruribus subtus genua in parte interna duo cauteria magnopere laudarem; quippe quæ & ratione & experientia compertum est, magnam vim habere ad profligandos menses, & ad sanguinem ab excrementis expurgandum.

*Hic.*



*Hieron. Mercurialis, consult. 8. tom. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### *Pro Mensium suppressione.*

**S**I à nimia copia sanguinis suppressio oriatur, illius quantitas minuenda est phlebotomia in brachio larga manu celebrata. Si enim venæ inferiores prius aperirentur, traheretur magis sanguis versus uterum; ubi maiorem obstructionem & distentionem vasorum efficeret. Sublata plethora, sanguis ad inferiora retrahendus est, apertis venis inferioribus circa illud tempus, quo antea laborans purgari consueverat, tum etiam frictionibus, ligaturis, cucurbitulis tam siccis quam scarificatis.

Inter menses moventia, maximè laudantur pilulæ *Montagnana*, quæ ita se habent.

℞. Troch. de myrrha ℥i℥. sem. petrosel. castor. cinnam. an. ℥i. mosch. gr. x. cum succo apii. F. pilulæ xxii. deauratæ, capiat duas manè, vel in ingressu lecti per aliquot dies. Vel,

℞. Troch. de myrrha ℥i. castor. ℥℥. cum succo artemis. F. pilulæ parvæ. Inter familiaria remedia & euporista habentur flores lavendulæ cum melle per multos dies comesti, vel conserva flor. calendulæ ad ℥ii. exhibita. Maximas habet vires sanguis hirci sylvestris, tum etiam domestici, ad menses suppressos educendos, juxta præparationem & dosim in pleuritidis curatione propositam: in calidioribus naturis cremor tartari per plures dies usurpatus in jusculo menses suppressos promovet. Chymici commendat tartarum vitriolatum, spiritum tartari, sales artemisiæ, melissæ, rad. chelidon. & valerianæ, aqua theriacalis sequens ad hunc usum mirè est efficax.

℞. Theriac. ℥v. myrrh. rub. Alexandriæ ℥i℥. cinnam. el. croci Orient. an. ℥℥. camphor. ℥ii. affunde optimum vini spiritum ad eminentiam trium digitorum, & in leni calore tincturam extrahere: cui per inclinationem effusæ adde spiritus tartari sextam partem, dosi coch. i. cum vino aut aqua appropriata.

Purgationes per intervalla repetantur;

pilulæ de hiera simplices & compositæ à *Galeno* maximè laudantur; quia præterquam quod educunt convenienter humores superfluos, habent etiam facultatem vias aperiendi & expurgandi uterum. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 15. cap. 2.*

Utilia hic sunt mercurius d. panchymagogon vegetabile, extractum senæ, mechoacanæ, rhabarbari, & hellebori nigri. Inter specifica sunt essentia croci martis, pulvis cachecticus ex chalybe præparatus, de quo supra lib. 8. sect. 7. subsect. 6. Pro Hepatis obstructione, & extractum splenis bovis, cujus dosis est ℥i. in aqua appropriata. *Joh. Hartmannus, practic. Chimiatri. pag. 281.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Mensium suppressione.*

**A**D Mensium provocationem & alvi quoque humectationem ac solutionem plurimum prodesset, si malvam, parietariam & mercurialem coquerent in aqua, & coctis herbis ac probè comminutis affunderent oleum olivarum recens vel butyrum sine sale, atque hoc quasi cataplasma inferiori ventri & pectini singulis diebus imponent. *Joh. Crato. consil. 99. lib. 7.*

Cum tempus Mensium appropinquet ad fortia aperitiva deveniatur: inter quæ est illud quo ego liberavi duas virgines hoc anno, quarum una curaverat mensibus per annum cum quadrante. Est tale.

℞. Herb. Sabinæ M. ℥. bulliant in vini q. s. & coletur diligenter per filtrum. Deinde.

℞. Terebinth. opt. cypriæ ℥i. lavetur ter decocto supra scripto: deinde semel lavetur aceto scyllitico, postea admisce pulv. rubiæ tinctor. cariophyll. macis, an. ℥i. ol. amygd. amar. ℥℥. M. cum saccharo ad pixidem. De hoc medicamine septem diebus ante tempus mensium sumat quotidie ℥i. sive in oblata, sive in medulla pomi asfati, & superhauriat haustum cicer. rubr. cum paucis croci; advenientibus mensibus vesperi & manè laventur & fricentur pedes cum decocto artemis. puleg. & si opus



si opus est fiat phlebotomia Saphenæ: *Hieron. Herold. epist. 38. lib. 6. consil. & epist. Cratonis & aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Est nobis secretum singulare in mensium suppressione desperata in pluribus feliciter expertum, syrupus nimirum de Sabina quem nos syrup. hæmagogum appellamus.

℥. Puleg. M. iij. artemis. M. iij. beton. calamenth. an. M. β. sabinæ M. iij. fatu. reia, melissa, menth. abrotan. an. M. β. cent. min. M. i. sem. anis. fœnic. an. ℥iij. rad. petros. asari, an. ℥viii. polip. ℥iij. helenii ℥β. zedoar. ℥iij. dictamn. ℥i. macis, nuc. mosch. an. ℥i. cariophyll. ℥β. aq. beton. puleg. artemis. an. ℥iij. saturre ℥iij. coq. S. A. colat. infunde rheiel. ℥vi. Stent per noctem, manè fiat fortis expressio, & cum sacchar. q. s. coque ad syrup. consistentiam. *Hier. Reusner. observ. 194.*

Puella quædam viginti annorum pituitosa, melancholia, ex mœrore in mensruorum suppressionem cum suffocatione hypochondriaca incidit. Curata fuit sequentibus.

℥. Rad. imperator. dictamn. alb. an. ℥i. acori ℥β. fol. artemis. puleg. calamenth. mont. an. M. β. sabin. M. iij. sem. dauci, fœfel. an. ℥β. bacc. juniper. ℥v. cinnam. acut. cort. aurant. an. ℥ii. concisa & grosso modo contusa insuantur sacco, & affundantur vini Gallici pintæ iij. Bis de die assumpsit ℥iij. instillatis gr. vi. spiritus salis armon. Post sufficientem alterationem semel purgationem sequentibus pilulis instituimus.

℥. Mass. pil. fœtid. maj. ℥. m. sal. volatil. armon. gr. vi. ol. macis still. gr. ii. M. F. pilulæ num. 7. *Fredericus Decker, not. ad cap. 11. lib. 4. prax. Barbettiana.*

Mihi maximè probatur aqua quæ fit ex pane ferè ad fermenti naturam redacto & mediocriter cocto & calido, cui ablato cortice, mellis ℥xii. addantur pulv. sem. urticæ, dauci, ammeos, anisi, & fœnic. an. dr. i. troch. Gallia mosch. myrrha, rubia, an. ℥i. cotulæ fatidæ ℥β. quæ omnia infund. in ℥iij. decoctionis (quæ recipit phaseol. rubr. an. p. β. bacc. junip. ℥i. rad. rubia, rusci, raph. sylv.

asparagi, apii oreosetini, an. ℥β. chamædr. rec. M. i. ameos, anis. fœnic. an. ℥ii. coq. S. A.) deinde destill. in B. M. cujus ℥ii. summo manè laboranti exhibe, addito syrup. capill. ven. de duabus radic. an. ℥. m. hoc præsidium maximè momenti esse censeo. *Lud. Mercatus. lib. 1. De Morb. Mulier. cap. 9.*

Molitoris cujusdam uxor 24. annorum octo annos maritum habuit, & illi nunquam fluxerunt menses, nisi cum prægnans esset; & cum fluere inciperent iam certa erat quod esset prægnans. Hydrope tandem mortua est. *Observ. 346. Misc. Curios. Med. Phys. ann. 3. decur. prim.*

Experimentum mirabile ad provocandum menstrua.

℥. Succi mercurial. mell. despumati an. ℥i. farinæ nigellæ ℥i. m. vel q. s. ut possint confici pilulæ. Da mulieri 2. vel 3. singulis noctibus, quando menstrua debent venire, & tunc menstrua venient copiosè. Non solum provocant hæ pilulæ menstrua, sed etiam præparant ad conceptum, & matricem mundificant. *Arnoldus, de Villanova, lib. de Sterilitate cap. 8.*

Filia 20. annorum duobus annis suppressione menstrui laborans, post multorum medicamentorum usum, tandem aqua chalybeata, cum per 12. dies ea utebatur, menses fluxere ex voto. Nec mirum; cum chalybs aperiat, cujus vis sulphurea ignemque sita est in superficie. Experientia compertum habeo, aquam prius chalybe ignitam aperire in initio, sed tandem astringere. *Nicolaus Fontanus, cap. 15. Analect.*

Empiricus quidam in mensibus obstructis cachexia & hypochondriacis affectibus feliciter exhibebat florem sulphuris cum spiritu sulphuris in pilulas redactum; & mirum quantum exinde purgati sunt ægrotantes, ut quandoque in diarrhæam inciderint. Dosis ℥i. flor. sulphuris. *D. Robertus Conninghame in M. S.*

℥. Pomum aurantium, deme aliquid ex medulla, tum inde croci ℥. m. cooperiatur, & apud ignem torrefiat, & pulverisetur, commisceatur cum vino albo, & capiat instantibus menstruis per triduum bis in die, si fieri poterit; si tardè erumpant, ipso eruptionis tempore capiat ter. Hoc



profuit illustrissimæ Dominæ post irrita multa alia. *Idem ibidem.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### *Pro Mercurii sublimati veneno.*

**M**ulier quædam Nobilis argento vivo sublimato epoto, diris cruciatibus afficitur erosione ventris maxima percepta, cum nausea, vomitu, animi deliquiis. Vocatus ego protinus oleum copiosum butyro rec. admixtum mihi dari præcipio, ea invicem commisceo, & miseræ ægrotanti devorandum in manus do, jubeoque ut mox impositis ori digitis, pennaque oleo & butyro imbuta, vomitum promoveat, quod cum ipsa effecisset, concitatus est vomitus: eodem momento clysterem injici jubeo ad acrimoniam in intestinis genitam & tormina compescenda: à clystere injecto & emisso dolores utcunque remitti usi sunt, sed paulò post cum pari acrimonia redierunt, tumque ex lacte & oleo viol. multo clysterem alium parari jubeo, quem iterari etiam sub vesperam jussi: mirè hoc clystere injecto & repetito dolores sedati sunt. Ubi vomitu & clysteribus venenum è visceribus detrussissem potionem hanc dari præcipio ad veneni compescendam vim.

℞. Cathol. ℥i. rheiel. in aq. endiv. cum paucis cinnam. infus. & express. ℥i. elect. de succo ros. ℥iii. pulv. crystall. puriss. ℥i (est enim peculiare antidotum adversus argenti sublimati vim deleteriam) syr. viol. & de limon. an. ℥i. F. potio cum decocto communi medicinæ; quam postridie ab accepto veneno sumpsit, levamenque ab illa non minimum sensit. Ad veneni seminaria frangenda potiones, & antidota quotidie dabam interdum; semel interdum etiam bis. Erant autem hujusmodi.

℞. Pulv. crystal. puriss. Div. pulv. diamarg. frigid. pulv. theriacalis *Guidonis*, pulv. rosatæ novellæ, an. ℥ii. syr. cytonior. & de nymphææ, an. ℥i. interdum violaceum addebam: ex aqua decoctionis scabiosæ, oxalid. & portulac. potionem, quæ vice alexipharmaci esset, propinari jubebam; quoad se vis, & impetus veneni remisisset ad octo continuos dies potionibus iis sum magno, & felici successu usus: porro in

jusculis etiam (quæ ego ex pinguißimis capis, & gallinis, pinguique castrato parari jubebam) crystalli pollinem, diamargar. frigid. tenui panniculo contentum, & illigatum infundi imperabam, ut in jusculum crystalli vis ebullitione transiret; antidotum utique præsens noxæ à veneno illatæ removendæ, & sic tandem Dei clementia, & mea qualicunque opera integrè sanata fuit. *Franciscus Valer. obs. 6. lib. 1.*

Ut virulenta mercurii erosio frænetur, æger frequenter lac rec. mulsum bibat, in quo etiam semina psylli macerari possunt, vel aquam tepidam decoctionis hordei, confert etiam multum butyri recentis sine sale esitare: nonnulli imprimis commendant oleum tartari, vel sal. absynth. ℥ii. pondere sumptum: neque immeritò: ut enim in præcipitatione magisteriorum per oleum tartari, à corporibus solutis omnis vis corrosiva tollitur per præcipitationem; ita etiam dum sal tartari, vel absynth. saltem aqua quæ mercurius solutus est, ad se allicit, argentum vivum in suam pristinam naturam redit, & non plus quàm argentum vivum crudum nocere potest: si retentio urinæ adsit, ut sæpè fit, balneo aq. calidæ utendum. *Daniel. Sennertus, pract. lib. 7. part. 7. cap. 16.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

### *De Mesenterii abscessu.*

**J**uvenis quidam alvi torminibus vexabatur: inque dies magisque dolor vim capiebat: tantumque aberat, ut hujusmodi doloris abditæ causæ comprehendere possent, ut nunquam ullis præstidiis tolli, aut saltem levare hoc malum potuerit: omnia enim in viscera sana videbantur, jecur, lien, & intestina omnia nullam doloris notam ostendebant: sed ille nihilominus, magis magisque indies, quàm ut tolerari posset, urgente dolore ipso, tandem è vita discessit: quare mortui corpore inciso, ut scilicet tanti mali causas dignosceremus, & sanis omnibus, ut putabamus, inventis visceribus jubeo intestina amoveri: quæ dum gla-



dio discindit minister in abscessum magnum incurrit : quo præciso , materia multa nigrior foetensque profluxit , incausto futorio similis : ex quo manifestam ejus mortis causam deprehendimus , atra enim bilis eò confluens hujusmodi abscessum paulatim effecerat . *Antonius Benevenius, cap. 43. lib. De abditis morborum & sanationum causis.*

Vir quidam febre valida correptus cum vomitu , decimo quarto die transacto in alvi cruentam excretionem devenit , ita ut sanguinem nigerrimum corruptum pessimè olentem ad quindecim librarum pondus externeret , unde animi deliquio correptus omnes cum proximè moriturum existimavimus : nihilominus cibus per intervallo optimis refectus vires resumpsit , ita , ut etsi febre continua , licet non ita intensa & uniformi continuo vexaretur , nihilominus suæ salutis spem nobis præberet ; sed tamen cum quotidie fæces conspersas sanguinolenta saniosaque materia excerneret , indiesque magis , ac magis emaciaretur , infinitis propemodum præsiidiis adhibitis ( nam septem medici illius curæ incumbēbamus ) sexagesimo tertio die ( prohi dolor ) occubuit , cum tamen postremis diebus ingens urinæ profluvium supervenisset , ita ut quinque libras urinæ & amplius quotidie per plures dies extramitteret . Cadaver dissectum fuit , ut tanti mali causa innotesceret , atque in mensenterio , in parte superiori , ulcus sordidum ad spithamæ longitudinem adinventum ; unde ea in parte collectum abscessum coniecimus , illoque disrupto putridum sanguinem ea in copia profluxisse non dubitavimus : sed quod mirum est , nunquam antea per totum ægritudinis tractum , præterquam extremo die , quo illi venter intumuit , de illius partis dolore conquestus est . *Marcellus Donatus, lib. 4. Histor. medic. mirab. cap. 7.*

Novimus nos quandam , cui inflammatio in mensenterio nata fuit , & initio malè habuit , sed posteaquam inflammatio suppurata & in abscessum conversa , melius habens , sana sibi visa est : interim singulis diebus per anum bis terve purulenta , admodum foetida , sincera , nullisque

excrementis permixta redduntur , & quidem nunc quartus agitur annus à quo sic se habet . *Rembertus Dodonæus, annotat. ad c. 33. Libri Benevenii. De abditis morborum causis.*

## SECTIO XV.

### De Mictione Lactea.

**C**ontingit mihi dum adhuc puer essem ut frequenter inter mejendum ardor me infestaret , adultior factus rariùs ea molestia divexabat , in virili ætate in matrimonio viventi aliud accessit : sub vesperam cum urinam reddebam , erat ea quæ primum prodibat , valde turbida , & veluti lactea , quæ quiescens nonnihil , materiam albam lactis crassioris instar , in fundo , cochlearis unius vel duorum mensura deponebat ; quæ cum urina agitata confusa , eam turbidam reddebat , accedente interdum ardore & stranguria quadam inter mejendum , hoc accidens plus quam per viginti annos , citra alium renum aut vesicæ affectum duravit , magisque frigoris tempore me afficiebat , dubius qualis hæc esset materia , eam quandoque exsiccavi , tuncque sal quoddam repræsentabat pellucidum , in fibras scissum , quod gustui falsum erat , metuens ego ne calculi essent præludia , cum primario Imp. *Maximiliano* tunc temporis Medico *Cratone* ea de re contuli , qui calculum renum subsequiturum judicabat , mihi que sano & alacri atque ad multos principes praxeos causa vocato , terrorem incussit , verum Dei gratia nihil inde mali secutum ; sed jam pene quadraginta ab eo tempore annos , neque hoc accidenti , aliisve renum aut vesicæ morbis infestor . *Felix Platerus, observ. lib. 4. pag. 836.*

## SECTIO XVI.

### De Mictione Sanguinis.

**M**ictio cruenta est sanguinis una cum urina excretio vel à renibus excidit , vel à spinctere cervicis vesicæ musculo , qui à renibus defluit , urinæ toti exquisitè permiscetur , cujus causa , si neque casus , neque



que ictus præcesserint, omnino ad calculum referri debet, qui per exercitationem validam, renem ejusque vasa obsterens sanguinem profundit, sola sanguinis mictio sæpe renis calculum patefecit, qui aliàs nullis indiciis se prodebat, ut ne subesse quidem putaretur, qui porro sanguis à sphinctere musculo in vesicæ capacitatem instillatus mictionem cruentam reddit, urinam non æqualibilibiter perfundit, ac subsidens in imo in grumos concrevit, ejus portio aut grumus interdum citra urinam excidit, dolor plerumque meiendo premit, & penis radicem quasi adurit, nec ab uretere, nec à vesicæ corpore multus potest emanare sanguis.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Mictione Sanguinis.*

**J**UENIS cum sanguinem serosum & tenue mejeret, consultandi causa ad me accessit: statim iis usus sum quæ renes debiliores factos roborarent, venasque constringerent, adhibita victus ratione proba, & simul lacte caprino utens, postea etiam ovillo, cum nihil melius eo existimet *Avicenna* confirmandis rebus valere; dabam jejunò ℥vi. quibus admiscebam boli arm. ℥i. ac si mictus sanguinis desit, & juvenis tandem sanitati restitutus est. *Petrus Forestus, observ. 10. lib. 24. De renum morbis.*

Rusticus supra lumbos cadens, sanguinem primò satis purum mingebat, postea etiam multum ac crassum, cum doleret citra renum regionem, proculdubio venæ in renibus perruptæ erant; ad hunc accitus, jussi ut statim sanguis ex vena basilica è regione loci dolentis ad aversionem detraheretur: deinde hoc linimentum ad repellendum & constringendum præscripsi, ut eo locus dolens inungeretur.

℥i. Ol. rosac. omphac. myrtini, an. ℥i. boli arm. sang. drac. tragacanth. gummi arab. an. ℥ss. pulveriz. omnia subtiliter, & cum oleis prædictis misce instar linimenti, vel cera adjecta F. ceratum. *Petrus Forestus, observ. 11. lib. 24.*

Sæpius sanguinis mictum solo lacte ovillo sorbendo ℥iv. & ℥i. boli armeni veri curavi; hoc idem expertum à *Gattinaria* qui tamen præcipit ne post ejus assumptionem

aliquis dormiat, neque se exerceat: si longo tempore duret, constringentibus, utendum tam intus quam extra, ut in nobili muliere quæ ultra duos annos laboravit mictu sanguinis, quæque à me curata fuit, longo tempore admoto lumbis unguento comitissæ. *Petrus Forestus, Schol. observ. 13. lib. 24.*

Secetur cubiti vena, deinde ut intercipiatur; & incrassetur sanguis, succum plantag. proposui, & decoctum equiseti per plures dies assumendum, amplius lac ovinum cum bolo armena: exterius convenit in infessus factus cum decocto chalybeato plantag. portulac. equiseti, poligoni, bursæ pastoris, symph. maj. malicorii & sumach. convenit & unguentum comitissæ. *Jul. Cæsar. Claudinus, consult. 36.*

Vesperis sub horam somni capiat has pilulas, & assumat postea lac chalybeatum, vel aq. plantag.

℥i. Succu portulac. incrassat. ℥ss. gummi Arab. q. s. M. F. pilulæ xxi. *Abrah. Seylerus, consil. 93. consil. Cratonis & aliorum Medic. à Scholtzio editorum.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Mictione sanguinis grumosi.*

**G**RUMOS præclare solvit rubia tinctor. cum sem. nasturtii & spermate ceti cum mumia ut fiat pulvis. *Io. Heurnius, ad aphor. 80. sect. 4.*

Dentur remedia quæ grumos ac arenulas solvunt; tale est vitrum viciis ustum ac in terebinthina extinctum potui datum. *Io. Heurnius, ad aphor. 39. sect. 7.*

Pro sanguinis grumosi dissolutione conveniet posca tepida, bibita per intervalla, ex aqua malvæ & aceto non valde acri, acetum verò sit in minima quantitate, at vix gustu sentiatur. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 14. cap. 4.*

Vir quidam quinquagenarius temperamento bilioso & melancholico præditus, cum per multos dies gravia quædam animi pathemata & mœrores passus esset, indeque noctem aliquam insomnem transegisset urinas sanguinolentas reddidit, quæ post equitationem immediate apparuerunt, eodemque tempore urinæ ardorem passus est. Præterea, cum urina arenulas quas-

dam



dam matulæ parietibus adherentes excernit, quas ipse à multis annis excernere solitus est. Quæritur jam, à qua causa proxima & immediata hæc sanguinis mictio dependeat. Cum autem sanguinis mictus in genere à pluribus causis soleat exoriri, in præsentī tamen casu due tantum in controversiam revocari possunt: calculus nimirum in renibus contentus & asperitate sua venulas collidens, ex iisque sanguinem eliciens; vel humores acres, salii aut biliosi prædictarum venarum oscula aperientes. Priorem causam duo potissimum videntur indicare, nempe arenulæ illæ quas æger à multis annis cum urina solet profundere, & periodica illa excretio sanguinis, eo solum tempore contingens, quo æger immodico exercitio utitur, equitandoque renes vehementer concutit. Verum hæc duo signa minimè sufficiunt ad demonstrandum calculum in renibus latitantem. Præcipua enim signa & perpetuo assidentia vel præcedentia omnino deficient: quorum præcipuum est dolor lumborum, qui præsentē calculo abesse minimè potest; stupor item cruris è directo positi, testiculi retractio, nausea & vomitus. Duo verò signa pro calculo stabiliendo proposita ita confutantur. Arenulæ calculum intus latentem verè indicantes in fundo matulæ subsident, & si digitis comprimantur non faciliè comminuntur. Si verò matulæ parietibus hæreant, & digitis compressæ faciliè comminuantur (quales sunt illæ, quæ à nostro ægro tante excernuntur) calculi indicia nunquam esse possunt: neque enim illæ in renibus aut vesica generantur, sed in venis ac hepate ex humorum adustione, quorum particulæ crassiores & tartareæ arenularum formam emulantur, & cum sero in renis contento separantur, ac in renes & vesicam detruduntur. Quod cum à paucis animadversum fuerit, sit ut multi calculosi pronuncientur, qui ab eo malo prorsus immunes sunt. Et quotidiana docet experientia, multos à pueritia huiusmodi arenulas excernere tota vita, qui tamen calculo nunquam laborarunt. Periodica verò sanguinis excretio, licet ex allusione lapidis asperioris in substantiam renis possit contingere; minimè ta-

men dubium est, quin illa etiam ex calore à motu immodico in renibus & tota sanguinis massa excitato, citra calculi præsentiam, generari possit. Humores enim biliosi, vel pituitæ salis naturam redolentes à motu & calore exagitati, ad renes amandantur, unà cum sero sanguinis permixto, & renum venulas aperientes sanguinis effluvium excitant. Et ita rem se habere in præsentī ægrotante prorsus assevero, cum ille bilioso temperamento præditus sit, & ab animi pathematis vigiliisque supra recensitis sanguinis massa maiorem adustionem adepta fuerit. Hanc nostram sententiam doctissimorum virorum placitis esse consentaneam, infinitis exemplis facile esset ostendere. *Hollerius* vir in artis operibus, si quis alius, exercitissimus, *Cap. 52. Lib. de Morb. intern.* Quibusdam, inquit, naturis eodem modo sanguis per vias urinarias excernitur, quo aliis per nares, venas sedit aut vomitum. At experientia constat, huiusmodi sanguinis excretiones in dispositis sæpe recurrere, quando vehementioris exercitio eorum corpora incallescunt. Potest igitur sanguinis mictio, illiusque recursus à sanguinis & humorum calefactione suscitari. Multo apertius rem explicat idem author *Comment. Aphor. 78. sect. 4.* Sunt, inquit, nonnulli, qui si durius equitent, aut sese exerceant immoderatus, excalefactis renibus, sanguinem mejant. Quod ad curationem attinet, ea ad duas intentiones revocanda est; humorum scilicet acrimoniam temperandam & renes corroborandos, ne humores acres aliunde confluentes tam faciliè recipiant. Ad hanc rem faciet primum victus refrigerans & incrassans, quo ferè eger ab aliquo tempore uti cœpit, & in quo diu perseverare debet, utendo præsertim lactuca, plant. & portulaca in jusculis, tum etiam hordeatis, avenatis, oryzatis & similibus, tum etiam in potu aqua ferrata cum vino rubro aliquantulum austero, abstinendo semper à vehementioribus corporis & animi motibus. Licet autem clarissimus eger haud multò abundet sanguine, utile tamen censuerim sang. ex brach. detrahare ad ℥vi. vel 7. ut totius massæ humorum calidior intemperies melius corrigi valeat. Imò verò si



affectus diutinus consisteret, derivatio quædam per inferiora, aperta vena malleoli, aut provocatis hæmorrhoidibus, videretur consentanea. Postmodum verò purgatio blanda maximè conveniet, eaque per intervalla erit repetenda, ut humores ad renes confluentes per alvum educantur, cuius compositio talis esse poterit.

℥℥. Fol. lactuc. portulac. plantag. & summit. malv. an. M.℥. Tamarind. ʒ℥. myrobal. citrin. ʒi. coq ad ʒvi. Incolat. infund. cassiæ rec. extract. ʒi. Colentur iterum, & postea dissolv. rhab. in aq. lactuc. cum santal. citrin. infus. ʒi℥. mannæ & syrup. ros. an. ʒi. M. f. potio.

Post primam purgationem, julepi, apozemata, juscula vel emulsiones, prædictas indicationes respicientes, ad ægrotantis tolerantiam accommodari poterunt; iisque ad tempus aliquod usurpatis, lac ovillum, vel caprillum erit convenientissimum. Et maximè commendatur ab *Hippocr. Avicenna* & recentioribus, inter quos *Gattinaria* & *Forestus* se hoc solo remedio sanguinis mictum sæpe curasse gloriantur. Unicuique autem dosi boli armeni veri ʒi. permiscant, quod quidem ut graviore sanguinis mictui convenit, ita in hoc leviori raro faciendum censuerim. Quia verò sicco atque macilento habitu præditus est, eoque calido & sicco, ante & post lactis usum, balneum aquæ tepidæ illi convenientissimum esse censuerim, & toto æstatis tempore in formam semicupii. Post usum lactis utatur aquis *Meynensibus*. Intermediis temporibus, si ardor urinæ aliquando urgeat, aqua flor. althææ cum aqua ros. vel conserva flor. malvæ vel alth. aut denique emulsiones aliaque prædicta usurpari poterunt. Ac denique pro curationis sigillo opiata roborans: mediocriter astringens & refrigerans, in usum revocari poterit. Neque inutile futurum esset, perseverante affectu, causti cum tibiæ inurere, ad humores acres, in renes & urinas defluentes, sensim derivandos. Toto curationis decursu topica renibus admota erunt maximè proficua, eaque refrigerantia & astringentia.

℥℥. Unguenti comitiss. & refriger. *Gal.* an. ʒii. Abluantur oxycrato diligenter, & inungantur lumbi frequenter. Lamina etiam

plumbea multis foraminibus perforata supra renes diu gestari poterit. *Lazar. Riverrius, obs. 13. cent. 2.*

## SECTIO XVII.

*Pro Mictione puris ex vesica ulcerata.*

**L** Ac asininum hic summè prodest, & emulsio sem. psyllii papav. & quatuor sem. frigid. maj. *Io. Heurnius ad aphor. 81. sect. 4.*

## SECTIO XVIII.

*Pro Mictione purulenta ab ulcere sordido in penis ductu interno.*

**A**D ulceris absterisionem & sanationem hæc tabulas præscripsi.

℥℥. Amygd. d. mund. castan. mundat. glandium mund. orizæ mund. an. ʒi. rad. alth. consolid. maj. liquir. an. ʒii. sem. plantag. portulac. malv. alkekengi, gummi prunor. ceras. & arabici, an. ʒi. succini puri ʒi℥. bolli puriss. oculi cancri, spodii ex ebo-re usto, an. ʒii. terebinth. parum cocti ut pulv. queat. ʒiii. succi liquir. ʒ℥. omnia pulverisata & commixta excipiantur infus. gummi tragac. fact. in aqua ros. & plantag. add. sacch. quart. i. formentur tabulæ pond. ʒi. unam pulveriz. cum lacte caprino alternis diebus; ad minimum bibat; plurimum profuturas experientia me docuit, multaque ejusmodi ulcera & diuturna & sordida iis curata fuisse: quorum loco si ad manum non sint, etiam troch. alkekengi sine opio, & troch. *Gordonii* usurpari possunt: sed hæc compositio est longe utilior. *Felix Platerus, observ. lib 3. pag. 816.*

In alio eodem affectu laborante ad absterisionem purulentæ materiæ & consolidationem hoc ordinavi.

℥℥. Resin. latic. vel terebinth. ʒ℥. dissolv. in vitello ovi ut artis est, adde mellis puris ʒi. sacch. ros. rub. ʒii. vini generosi ʒvii. M. bibat de lacteo illo liquore ad ʒi. alternis diebus cujus operationem ad vesicam usque & ultra pertingere ex urinæ violaceo odore deprehendi potest.

Injectionem dein absterisivam sequentem præ-



prescripti, quam per canalem in ductum penis injiceret.

℞. Rad. liquir. ℥ii. cortic. fabar. ℥i. cicer. rubr. p. i. fol. plantag. sic. M. i. F. decoctio in aqua, addendo parum lixivii, & in colat. Ibi. dissolve laricæ dissol. in melle ℥ii. unguenti ægyptiaci tantum quantum ferre poterit, utatur ab initio, donec pus minuiscentiat, & partem admodum sensibilem fieri, adeo ut ægre injectionem illam acrem ferat. Postea utatur sequenti injectione.

℞. Ramulorum equiseti fol. plantag. sem. hyperici, an. M. i. rad. consolid. bistortæ, bulbor. narcissi, an. ℥i. cortic. granat. ℥iii. coq. in Ibi. aqu. extinctionis, ferri fabr. in colat. Ibi. dissolv. troch. alb. rhas. sine opio ℥ß. boli arm. ℥i. succi attriti à lapide galactite & hæmatite ℥i. pro injectione.

Fumum ut per canalem brevem in virgam obiter intrusum per alembicum eò directum, in ductum penis immitteret suasi ex sequentibus trochiscis carbonibus impositis.

℞. Picis navalis ℥ii. thur. mast. an. ℥i. sandarachæ gummi benjoin. an. ℥ß. cum resina aliqua liquida F. trochisci. Postremò jussit ut candelam ceream tenuem, flexilem & longam sensim in ductum hunc aliquo usque intruderet inunctam balsamo chirurgorum, nonnunquam addendo parum vernicis coctæ. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 819.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### De Mola.

**M**Ola (Græcè *μολα*) est caro quædam inutilis, informis, inarticulata in muliebri utero, ex imperfecta conceptione loco fœtus genita: hujus causa est semen utriusque parentis effectum & debile à sanguinis copia obrutum ita ut nequeat virtus plastica suas agere partes in fœtus formatione & sic loco fœtus emergit rudis & indigesta moles: licet communis sit sententia sine viri congressu non generari molas, interdum tamen, licet rarò in viduis sine virilis seminis concursu eas fieri posse docent medicorum observationes, mo-

lam aliquæ quatuor quinqueve annos, interdum & totam vitam, utero gestarunt: at plerumque levius adhærescens, tertio vel quarto mense excidit: in mola ut in vero conceptu; sistuntur menses, mammae turgescunt, cibi adest fastidium, & venter sensim attollitur: atque his signis à scirrho distat: à fœtu autem vero per frequentia discernitur, fœtus post quartum mensem blandè movetur secus mola, quæ aut gravitate figitur, aut impetu quodam provolvitur lapidis instar, in quodcunque latus se convertat mulier: in mola rursus ad incessum gravior fit mulier, ei que quasi pondus ex utero propendet, artus gracilescunt, dolorque ventrem sæpè compungit, quorum nihil adest in legitimo fœtu: præterea venter præcipue versus umbilicum, attollitur & acuminatur, & versus latera utrinque molli ter coarctatur: in mola verò in omnem dimensionem equaliter attollitur, graviora denique quæ molas quam quæ verum fœtum utero gestant, habent symptomata, si tandem post decimum mensem venter adhuc tumeat, nec hydropis signa adsint, de mola non levis suspicio est, datur etiam mola aquosa & ventosa.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Mola.

℞. **A**ss. foetid. ℥ß. sem. rutæ cass. lign. ras. lapid. dactyl. boracis, an. ℥i. croci ℥m. myrrh. theriac. diatesser. an. ℥i. M. detur ℥j. cum aqu. sabinæ vel vino rhenensi cum hac confectio, quàm de assa foetida vocat *Ioh. Tiengius*, mulierem curavit à mola quàm per annum gestaverat, & aliam etiam mulierem eodem medicamento liberavit à fœtu mortuo, exhibendo manè & vespèri ante cibum ad ℥j. donec ab omnibus fœtus partibus fuerit repurgata: aliquando exhibuit cum decocto artemis. aliquando cum succo verbenæ & prassii mixto cum vino rhenensi, modo etiam cum vino decoctionis verbenæ prassii, & semper (inquit) gratia Dei benè successit. *Petrus Forestus, Schol. observ. 63. lib. 28. De mulierum morbis.*



## SUBSECTIO TERTIA.

*De Mola aquosa, carnea & ventosa.*

Ad molam excutiendam, qua laborabat mulier quædam & symptomata alia satis exitialia eam insequi solita tollenda, machinor ejusmodi.

24. Sabinæ, pulegii fol. senæ, an. Mß. coq. lento igne in feri lactis q. s. manè & vespere ex hac infusione una vice ʒviij. ebibit calidè.

Postridiè præter meam spem mola est expulsa & à multis gravissimis accidentibus liberata fœmina; *Martinus Rulandus cur. 78 cent. 6.*

25. Mirrhæ castor. an. ʒj. sabinæ, boracis, an. ʒj. fellis bovin. ʒi. ol. succini, gr. iv. croci gr. v. cum succo sabinæ F. pilulæ xiv. pro duabus dosibus *Ioh. Petrus Lotichius, obs. 16. cap. 1. lib. 5.*

Hic conveniunt ea medicamenta quæ in mensibus suppressis, partu difficili ac fœtu mortuo usurpari solent. *Daniel Sennertus, pract. lib. 4. part. 2. sect. 4. cap. 9.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*De Mola in vidua.*

**M**olam carnem aliquot annis (plus minus quindecim) in utero olim gestavit honesta quædam vidua: existimabat uterum prolapsum, quod in ostio uteri propendere aliquid sentiret: profluebant statim temporibus menses, & subinde copiosiores quàm par erat: tandem quodam tempore, supervenientibus nonnullis partus doloribus, rudem excrevit & informem carneam molem, pedem ferè longam, latam semipedem, tres quatuorve digitos alatam; sunt verò & aliæ à recentioribus dictæ molæ, per quas venter distenditur non minus quàm gravidis: una collectis in utero flatibus; altera aquosis umoribus uterum implentibus: hanc molæ speciem vidimus nos in vidua quadam, quæ defuncto marito, cum se gravidam relictam existimaret, nonis mensibus adimpletis, supervenientibus partus doloribus, non nisi aquosos humores enixa est, à quibus liberata, lacte ubera repleta haud aliter, quàm si fœtum peperisset. *Rembertus Dodonæus, lib. obs. medicinal. cap. 49.*

**N**obilis urbis nostræ mulier, indubiæ honestatis, matrona quinquaginta sex annos nata, carnofo ac sanguineo corporis habitu donata, cum jam per aliquot annos menstruæ purgationes defecissent, molas tandem plures carnosas edidit, fluentibus velut in naturali partu mensibus copiosè & maximis cum cruciatibus, interposito nonnunquam duorum, aliquando trium vel unius mensis spatio; diligenterque percontata, se nullum feminis profluvium in somnis, nec ullam oblectationem perpeßam constanter affirmavit: fluebant interim menses, albi, erant carneæ molle nonnullæ ad pugni crassitudinem aliæ minores, durissimæ nonnullæ, & aliæ minus duræ.

*Iacobus de partibus historiam refert de mola aquosa per hæc verba, novi quandam generosam dominam, quæ se prægnantem esse credidit, & ita medici visitantes eam existimabant, dum venit pariendi tempus, providerat de bona obstetrice, & comitatibus & commatibus: multa aqua prodiit à matrice ipsius; & sic illa & medici fuerunt illusi, si illicò venter penitus detumuit. Molam ventosam se vidisse *Ulisbone* in quadam *Hebræa* testatur *Valescus de Taranta* in suo *Philonio* cap. de mola, huic enim, cum se prægnantem esse existimaret, præparata sunt omnia, quæ parturienti necessaria esse consueverunt, dumque obstetrices vulvam & uterum pertractarent, tanta ventositas sine alio humore exivit à matrice, ut mirum videri possit. *Marcellus Donatus, cap. 25. lib. 4. Hist. med. mirab.**

## SECTIO VIGESIMA.

*De Morbillis.*

**M**orbilli (græcè *εὐροθύματα*) maculæ sunt aut tubercula perexigua, rubra, cum febre continuâ à facultate expultrice & sanguinis peculiari ebullitione excitati, in cute erumpentia, causam ferè eandem signa cum variolis, de quibus infra, lib. 8. sect. 1.

SUB.



## SUBSECTIO UNICA.

*Pro Morbillis.*

**M**atronam quædam Nobilis febre continua correpta est, cum tussi & raucedine; per triduum symptomata non valde urgebant, quarto die cum febris intensior evasisset, sanguis detrahitur, & iulepus refrigerans exhibetur: eodem die totum corpus morbillis conspersum apparuit: vocatus ego die quinto, præscribo circa vesperam julepum ex æquis partibus aq. ulmarie & card. ben. cum bezoart. miner. gr. xx. duabus horis ab assumpto julepo copiosè sudavit, febris valde imminuta & potio morbillorum discussa est: post sudores alvus soluta est magna excretionem. Postridie mane idem iulepus iteratur est, ac copiosius sudavit post 2. horas ac febris omnino sublata est, omniaq; prope modum exanthemata discussa sunt. *Lazarus Riverius, observ. 76. cent. 3.*

Mulieri cuidam in morbillorum eruptione ingens pruritus & punctio in plantis pedum ac volis manum aderant, pro quo symptomate mitigando, quum maximè eo intolerabiliter affligeretur, ut se potius mori velle diceret quam illum pruritus & punctiorem ferre, iussi ut pedes & manus continuò teneret in aqua calida, quo consilio tum pruritus tum punctio cessarunt, & melius per cutem in volis manum & pedum morbilli emergabant: huius rei experimentum notatu dignum ab ipso *Astario Papiensi* Medico accepimus, quod etiam arcanum à *Nicolao Florentino* Medico sui temporis insigni mutavit, cum scribat de variolis & morbillis; si fuerit punctio plantarum pedum aut palmarum manuum ponantur dicta membra assidue in aqua calida ut dicit *Nicolaus*; & ego vidi multum conferre. *Petrus Forestus observ. 42. lib. 6. De febr. Epidemic.*

Chirurgus cum ad virginem quandam viginti quinque annorum, quæ in Morbillos incidisset, & continua febre acuta laboraret, vocatus esset ad venæsectionem peragendam, fortè, fortuna una simul accitus ædes intrabam, & sanguinis missionem inhibui licet omnia jam ad sectionem parata essent, eo quod sanguis è na-

ribus fluere, & jam per quinque dies Morbilli foras expulsi essent, tamen cum natura paulo segnior sanguinem è naribus profunderet, setis porcinis sub stillum sanguinis ad fluxionem stimulandam censui, cum animadverterem quod natura per eum locum Crisin tentaret: quod cum non posset, id nos perficere hoc modo posse rectè arbitrabamur: & illud quidem non sine auctoritate feci, insequendo Canonem illum quem posuit *Guainerius* suo tempore Practicus insignis incurat. *Variol.* scribens, ita Nota tamen, quod si naturam perceperis sanguinis narium fluxum tentare, ipsam juvare debes cum seta, vel aliquo eiusmodi narium fluxum sanguinis provocante: phlebotomiam, si opus fuerit, dimittendo: quod cum ego fecissem, sanguis bene fluxit, & febris desit, & paucis diebus a morbillis quoque sanata est, postquam statim a prima nostra vocatione usa esset sequenti decocto, *Variola* & *Morbillos* evocante.

℞. Lentium excortic. ℥i. horæ. de cortic. p. i. caricar. numero vii. lacca, tragacanth. an. dr. i. passul. ℥℞. iuiub. numero vii. rad. fenic. ℥m. F. decoctio in aqua communi pro ℔i. m. colaturæ addendo oxy-sacch. simpl. ℥ii. M. *Petrus Forestus, observ. 48. lib. 6.*

Cum in gutture morbilli magis emergent, non sine magno dolore ac calore, ut sese suffocari clamaret, mandavi ut continuò cum lacte caprino & aqua plantag. simul mixtistepidè gargarisaret; quod miraculi instar profuit. Præservat maximè ab angina & suffocatione, estque oris tum gutturis præstantissimum remedium, cum signa exanthematum se produnt. Ad eandem quoque intentionem, ut syrupum granatorum sæpius paulatim deglutiret, iussi; cum huius usum mirabilem in tali casu sæpe expertus fuero. Munita autem cor à putredine ac inflammatione. Deinde ut etiam pulmo, pectus, gula intus à morbillis tuta forent: cum simul angustia ac tussis adessent, ut continuo ex hoc eclegmate lamberet, præcepi.

℞. Syrup. granat. dulc. ℥ii. sacch. penid. ℥iii. syrup. ex infus. ros. & diamor. an. ℥℞. diatragac. frigid. dr. iii. amyli purissimi ℥ii.



M. f. eclegma. Ita profuit, ut in simili casu etiam pro arcano haberem. *Petrus Forestus, lib. 1. obs. 17.*

## SECTIO XXI.

### *Pro Morbis Chronicis.*

**I**N Morbis chronicis & contumacibus nihil præstantius sale tartari, spiritu sulph. per camp. & merc. dulci sexies sublimate, iis enim curantur febres intermittentes, diurnæ, quartanæ chlorosis, cachexia, melancholici affectus & contumaces viscerum obstructions, irritis aliis remediis omnibus; infund. sal. tartari & spir. sulph. cum Zi. vel Zi. senæ (aliquando rad. jalap. 3ß.) in aq. fontis sola aut decocto appropriato, hoc sæpissimè usus est, *Riverius Simeon. Iacoz. obs. 97. cent. 4. obs. River.*

Plurimi morbi inveterati & ferè ad desperationem vergentes, ut puta menses albi, & suppressio menstruum in mulieribus, internæ obstructions, capitis imbecillitas, catarrhus, ventriculi dolor, hepatis refrigeratio, podagra, & alii, roremarino coronario curati fuerunt, si in vindemiarum tempore ipsius tenellæ summitates cum musto (absque igne) bulliant dum imponuntur in doliis. *Dominicus Panarolus, obs. 25. Pentec. 3.*

## SECTIO XXII.

### *De Morbis gravissimis ex levissimis causis ortis.*

**O**perarius quidam in pago quodam circa sepes occupatus, pedem spina sibi punxit: ab initio, cum affectum neglexisset, exortus est dolor maximus, febris, delirium, aliaque symptomata gravissima tandemque gangræna & sphacelus, qui cum ad genu pervenisset, & tibia abscissa non fuisset, extinctus fuit ager.

Matrona quædam honesta cum apicem indicis dextri spina punxisset, & ab initio affectum neglexisset, post gravissimos dolores secutus est sphacelus: cum verò digitum ad carpum abscidisset, restituta fuit. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 2. cent. 5.*

## SECTIO XXIII.

### *De Morphæa.*

**C**utis vitiis annumeratur Vitiligo, quæ nihil aliud est quam fœdus cutis color, ex malo particulæ habitu proveniens: nutrimentum rectè assimilare non valentis. Ejus duæ sunt species, una *Alphus* Græcè, Arabicè *Morphæa* dicitur, in quò summa duntaxat cutis fœdatur dispersis & non continuatis maculis colorem cutis mutantibus Duplex hæc est alba quæ *Alphus*, & nigra *Melas* appellatur. Alia est λευκη Arabicè Albara vocata, quæ macula est continua & cutis & carnis, subjectæ colorem immutans: in hac pilli decidunt, alii que albi & lanugini similes succrescunt; si acu feriat, non sanguis, sed humor aqueus & albus effluit. Omnium efficiens causa est humorum impuritas. Hæc cutis affectiones hoc sæculo non amplius aut rarissimè conspiciuntur & si quando occurrant, iisdem remediis profligantur quibus Elephantiasis seu Lepra curatur.

## SUBSECTIO UNICA.

### *Pro Morphæa.*

**C**um tota viri cujusdam cutis valde maculosa & defœdata esset & ita ut Lepra laborare videretur hoc decoctum eidem præscriptum.

℥. Fumar. virid. M. iii. scabios. lapath. acut. acetos. dent. leon. bugl. borrag. summit. absinth. summit. lupul. an. M. j. coscut. melliss. agrimon. an. M. ʒ. rad. enulæ camp. lapath. acuti, rad. malv. an. 3ß. rad. fœnic. ʒi. sem. 4. frigid. maj. & min. an. ʒi. sem. anisi. ʒij. fol. sen. ʒi. ʒ. epitymi, polipod. q. an. 3ß. rad. helleb. nigri ʒi. ʒ. cortic. rad. cappar. & tamarisci, an. ʒii. prunor. damasc. quart. j. uvar. passar. exacinat. hord. communis, an. M. i. F. omnium decoctio in sero lactis pro ʒi. iii. per noctem infusa fortiter omnia exprimantur & saccharo apozema dulcoretur.

℥. Myrobal. omnium ʒi. agar. opt. & rhei an. 3ß. spic. schænanth. zinzib. an. ʒ. ʒ. F. puppa: pendeat in dicta decoctione, dum potio sumetur: ex qua sumebat semel in die



die aut bis prout alvus responderet: quæ potione optimè deinde se habuit, interim huic consulyimus, ut bis in ann. purgaretur. Quantum enim valeat annua purgatio in atrabiliis morbis docet *Gal. comment. 47. aphor. lib. 6. & in lib. quos purgare oporteat. Petrus Forestus, obs. 2. lib. 5. Obs. Chirurg.*

Mulier quædam vitiligine affecta, insuper faciem habens valdè rubram & pustulosam, ex qua frufures & squammæ decidebant, post plurima præscripta decocta sanguinem depurantia, faciem oblinebat oleo raparum mixto cum aqua: quo remedio crustæ decidebant furfuraceæ tum squammæ; & facies paulatim pristinum, præter opinionem, nitorem recepit. Habetur autem hoc pro arcano, & quod mirabile erat, illud oleum raparum concussum cum aqua fluviali cutem nitidam in facies effecit. Interim non desistebamus nos iterius medicamenta repurgantia & corrigentia sanguinem exhibere. At altero viro qui Morphaeam nigram ex humore melancholico habebat, post humoris peccantis evacuationem, ommissa tamen phlebotomia, quæ augeret causam, ut Præceptor meus *Bened. Faentinus* dicere solebat, mandavimus omnes partes Morphaea affectas inungere sequenti oleo calide omni vesperi cum iret dormitum.

℞. Ol. de tartaro vini albi potentis ℥iv. Deinde etiam hoc sequenti unguento.

℞. Ol. tartar. ℥ii. ol. amygd. amar. ℥i. succi lapath. acuti ℥i. cera q. s. f. unguentum. Vel fiat hoc unguentum.

℞. Tartar. fuligin. oris furni, an. ℥i. sal. nitri sulph. an. ℥ß. auripigmenti, alumin. seissil. helleb. alb. an. ℥ii. omnia ista pulverizata incorporentur cum succo fumar. & lapath. acuti. f. Unguentum mediocriter liquidum. Vesperi fiat inunctio, & sequenti manè abluatur locus cum aqua furfuris. *Io. Tiengius Medicus Amstel.* curavit minorem quendam plethoricum Morphaea laborantem cum magna maculatione cutis livida; cum impotentia eundi vel movendi crura, & brachii impotentia, hoc modo: Corpore decenter purgato, accepit colocyinth. ℥i. & decoxit in aceti & aq. fabar. an. ℥ß. eaque calefacta sponsia illi immersa, balneabat loca hac labe sedata, & brevi tempore ma-

culæ singulæ fuerunt deletæ. Alter etiam cui eandem balneationem exhibuit curatu pariter est. Si istis non curetur Morphaea curetur curatione lepræ. *Petrus Forestus, observ. 3. & schol. lib. 5. Observ. Chirurg.*

## SECTIO XXIII.

### Pro Morsu Humano.

**Q**Uum phreneticam quandam mulierem tractandam haberem, & linguam, an arida esset explorare vellem, illa digitum incauti & nimis curio si Medici dentibus atripuit; atque adeo dentes digito impressit, ut sine violentia eum inde extrahere non potuerit; hinc statim dolor vehemens non solum in ipso digito, sed per totum brachium exortus est: applicatis tamen iis quæ sequuntur paulatim dolor sedatus est: & quinque vel sex dierum spatio digitus convaluit. Primò diligenter sanguinem ex moribus expressi, mox aceto acerrimo, ablui tum morsus, tum etiam totum digitum; postea theriacam dissolutam in aqua vitæ cum gossipio moribus imposui; ac empl. basilico apicem digiti, totam verò manum linteo reduplicato ac in oxycrato madefacto involvi: atque his remediis quotidie bis vel ter reiteratis Dei beneficio convalui. *Guil. Fabritius Hildanus, obs. 85. cent. 1.*

## SECTIO XXV.

### De Mydriasi.

**M**YDRIASIS, i. e. pupillæ dilatatio, oculi affectus est, in quo pupilla seu foramen uveæ tunicæ nimium ampliatur, ut plurimum à primo ortu contrahitur: aliquando etiam oritur ab impuris & turbidis oculorum humoribus, per quos subintrans lumen infringitur, unde copioso opus est, ut aliquatis fiat visio, copiosum vero subire nequit, nisi per deductiorem pupillam. Causæ externæ sunt ictus violenti, casus ab alto, diuturna in loco tenebricoso mora, &c. Dicitur hic affectus etiam *Mydriasis*.



## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Mydriasi.

**P**robatur lotio cum vino subaustero decoctionis rosar. & euphras. in quo modicum aluminis fuerit disruptum. *Iul. Caesar. Claudinus, cons. 72.*

Præmissis universalibus, collyrio sequenti in oculum ter quaterve in die instillato, pupilla dilatata paulatim ad pristinum suum statum rediit, & visum qui antea impedituserat, probè retinuit.

℞. Fl. ros. rub. sicca. ℥ii. croci spic. nard. cortic. thuris, an. ℥ss. pompholig. spodii, acaciæ, an. ℥i. in pollinem redacta; ligentur in nodulo panni linei rari, & nodulus conjiciatur in aq. ros. ℥iii. quando eo utebatur, nodulus fortiter exprimebatur. *Petrus*

*Forestus, obs. 28. lib. 11. De morbis Oculorum.*

## SECTIO XXVI.

## Pro Myrmeciis.

**R**emedium optimum in memetipso experientia edoctus probavi, si myrmecia (verrucarum species sunt) tangerentur sudore illo qui emanat ex lignis quibuslibet dum uruntur, minima est res, sed quandoque ex rebus minimis pulchræ observationes oriuntur. Advertendum autem est quod non subito evanescent, sed cum semel aut bis illas sudore tetigeris, processu temporis intra tres aut quatuor menses ad summum, dum amplius nihil cogitas, Myrmecias ex abrupto fugatas videbis, nec unquam renascentur. *Dominicus Panarolus, obs. 43. Pentecoste 2.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER DUODECIMUS.

*De Affectibus à littera N incipientibus.*

## SECTIO PRIMÆ.

## Pro Narium Cancro.



Orbus hic in naribus vix curabilis est, sed præmissis universalibus, & bile atra evacuata, mitigantia, saltem requirit. Adhibenda ergo oleum rosac. modico camphore addito, solani succus, antiqui dracuntii semen tritum cum melle immittebant. Utile est hoc medicamentum.

℞. Succi Solani ℥iv. pompholig. ℥i. ceruss. lotæ, aq. ros. & iterum exsiccat. ℥ss. M. pauco oleo rosac. adjecto, & cera alba liquata in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo. Chymici, ut ad aliarum partium, ita etiam ad narium cancerum commendant liquorem Arsenici, qui ita paratur.

℞. Arsen. albi, nitri puri, an. q. v. fluent simul in tigillo in igne circulari posito, cavendo fumum (ideoque sub dio ventum observando commodissime fit hæc operatio) ubi refrixerint, tantundem nitri iterum addatur, idque bis vel ter repetatur; arsenicum hoc modo fixum in humido loco resolvitur in liquorem, hujus pauxillum ut gustu saltem sapor parum percipiatur, in aqua plantag. dissolvatur, qua cancer oblinatur. *Daniel Sennertus, practic. lib. 1. part. 3. sect. 4. cap. 2.*

Vir quidam cum nasi rubedine instar Cancra aliquot annis vexaretur, ac frustra Chirurgorum ope usus esset, ad nos tandem venit oratum, ut si quomodo possem; huic turpitudini opem ferrem. Huic con-



consulvi. ut secta vena; & corpore repurgato ab atrabile, à cibis atram bilem gignentibus abstineret, & hoc linimentum præscriptum.

24. Succi solani ℥iv. pulv. diapomphol. ℥i. ceruss. ablut. cum aq. rosac. & iterum ficeat. Diss. ducantur paucio oleo rosac. adjecto, & cera alba liquata in mortar. plumbeo cum pistillo plumbeo, donec ad spissitudinem linimenti concrevant, quò optimè postea se habuit; & miraculi instar curatus est. *Petrus Forestus, observ. 6. in schol. lib. 13. De Nasi Affectibus.*

Rusticus quidam à cancro narium curatus fuit solo succo plantæ vulgaris sibi ab alio edoctæ, qui plures ejus ope curaverat. Hanc cum maxima difficultate ab amico, qui ejus nomen & utendi modum ab eo acceperat, didici. Sed quoniam omnia clarè docere cupio, ut posteris prodesse possim, illam sincerè nominabo. Hæc igitur nihil aliud est quàm onopordi contusi succus, qui sæpe admoveri debet, imò & herba contusa. Plantago etiam non inutilis est, si mammarum cancris applicetur. *Petrus Borellus, cent. 2. observ. 51.*

## SECTIO SECUNDA.

### De quodam per nares vidente.

**D**omine *Mercuriali*, legi quæ scripseras de Rustico, quem naribus vidisse *Carolus* meus affirmavit. Aderant duo Monachi, cum idem attestaret, nemo sibi à risu temperare poterat. Rusticum ipsum non vidi, sed audiivi cum Nobilissimus quidam *Frisius Palatini* Electoris Consiliarius qui actioni interfuerat commemoraret: Cum laboraret ille ex ulcere oculi, chirurgus ei sic adhibuit remedia, ut suprema parte ossa narium erosa, oculus prolongato nervo optico in capacitatem narium inciderit. Itaque naribus sublatis per oculum eundem inversum: ut scribis, atque contortum utrumque prospexit. Sed tandem accusavit Chirurgum de injuria sibi illata, qui lege *Aquileia* condemnatus fuit. *Christophorus Schilincus. Epist. 34. & 35. lib. 6. Consil. & Epist. Jo. Cratonis, &c.*

Si demonstro audire libeat, narrabo; Cæcum quendam utroque oculo orbem

naso pro oculis utentem vidi, cujus beneficio objecta omnia discernebat. Is dextro oculo ante annos multos, cum puer esset, privatus fuerat. Tandem juvenis factus (rusticus erat) ex ceraso in palum dum lignum fastigiatum delapsus, vultum impexit, ut natum unà cum oculo sinistro gena palpebra utraque & supercilio disrumperet, adeò fœdè, ut Chirurgus oculi globum evulsum prorsus crederet, eumque palo inhæsisse. Cicatrice tandem inducta, post annum ab accepta plaga, dum in gramine apricatur, fortè lucem atque florum candorem humi animadvertere cocepit per nasi cavitatem. Et jam per 5. aut 6. annos continuos visionem eo modo exercuit, ut quicquid offeratur naso oculato distinguat exactè, sed despectando: suspetando enim lucem ferre nequit. Medicorum igitur collegio, ut examinaretur, jussu Electoris exhibebatur cum suo enim Chirurgo in jus vocato contendebat. Portentosa itaque hujus visionis modum causamque esse deprehendimus, quod sicut palpebra superior abrupto musculo attolli amplius non poterat, sed conglutinata cum adnata oculi tunica coaluerat, ita etiam avulso musculo, qui oculum versus angulum acutum retrahere solebat, pupilla in angulum nasi se prorsus abdiderat. Et quia oscilla nasi non fracta modò, sed & luxata quodam modo, concinnè restitui non potuerunt, accidit ut nasus pressior latiorque sinistra præsertim parte evaserit, adeoque ejusdem naris meatum patientiorem curatio reliquerit, per quem distorta latitansque pupilla videndi munus obibat, & res quaslibet naso obvias internoscebat. *Henricus Smetius. Miscel. Med. lib. 5. Epist. 13.*

## SECTIO TERTIA.

### Pro Nattis.

**N**uper erumpentes si dentibus leviter comprimantur Nattæ, sensim marcescunt & pereunt, quod bis observatum Patavii, semel in Nobili Fœmina, cujus erumpentem Nattam dentibus vicina mulier apprehendit, & semel in filia summ. iurisperiti. *Thom. Barthol. hist. 40. cent. 3.*



## SECTIO QUARTA.

## De Nephritide.

**V** Ide supra, lib. 3. sect. 3. De Calculo.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Nephritide.

**F** Requenter bibat cyathum aquæ decoctionis rubiæ tinctor. rec. calidæ, cum ʒss. penidii duabus horis ante cœnam: quibus ex tali potu contingit nausea, dare solo ad comedendum radicem prædictæ herbæ rec. longitudine digiti medii: & sanè in oppilationibus renum medicinam huic partem vix inveniens; sed nisi cum magna difficultate meliorem *Bartholomæus Montagnana, consil. 4.*

Ad exterendum & excernendum lapidem exhibuimus syrup. de althea *Fernel.* ad ʒiss. cum aqua fabar. denique curavi ut singulo manè ʒss. Terebinth. lotæ cum aq. raphani assumeret. Est enim optimum medicamentum; quia omnia viscera deterget, & ipsum lapidem egregiè dissolvit & pellit. *Rodericus à Fojetca, tom. 1. consult. 14.*

Doloribus maximè in sevientibus, theriaca cum speciebus elect. *Iustini* data, miri est usus. Exteriorius autem nil præstantius fotu ex parietariæ succo, aqua ardenti, & oleo Scorpionum, embrocha etiam ex oleo Scorp. amygdal. amar. & aneth. maximè proficua esse solet. *Iul. Casar. Claudinus, consil. 7.*

Quidam Monachus articulari morbo & Nephritide corripitur solebat, qui cum nullo remediorum genere ex multis tentatis bene valeret, tandem a meis monitis assiduo terebinthinæ usu, intra 6. menses liber à dictis morbis fuit: erat autem terebinthina nucis magnitudine, quam singulis diebus jeuno stomacho saccharo admistam deglutiebat. *Amat. Lusitan. cent. 1. cur. 63.*

Foris emollit axungia cuniculi cum succo malvæ cocta. Ad vacuandam autem materiam usu terebinthin. cum rheo & pulv. liquir. nihil convenientius: non solum enim materiam ipsam expellit, sed

etiam renibus & ureteribus laxis auxiliatur. *Ioh. Crato consil. 12. lib. 2.*

Singulis septimanis ex sequenti pilulæ massa ʒii. vel ʒiii. sumatur.

ʒl. Terebinth. aqu. simplici & ultimo rosar. novis lotæ ʒi. rhei opt. & subt. pulv. ʒiii. cinnam. el. ʒi. pul. succini alb. ceterach. liquirit. an. ʒi. M. F. magdaleon, de quo formentur pilulæ mediocres: hæ satisfacient ad removendam materiam Calculi, si temperanter tamen vixeris: plurimis profuisse scio, postquam corpus mediocriter pilulis præscriptis purgatum fuerit, cum post medium noctis hanc potionem biberint.

ʒl. Aqu. fragar. ʒv. syrup. viol. ʒi. M. Quidam etiam singulis noctibus aquam frigidam bibebat, atque gravissimos cruciatus Calculi, quos antea perpeffus fuerat, effugit manè verò ne frigida potio noceret, aliquot grana piperis integra assu-me-bat. *Ioh. Crato. consil. 9. lib. 1.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Nephritide.

**I**llud nunquam è memoria exeat nihil præstantius pro arcendis renum calculis esse, quam aqua tepida, vel jus pulli gallinæ, aut vituli, aut vervecis, quinque vel sex uncia rum mensura immediate ante cibum manè & vespere, modicè calidum potatum. Pro excludendo materiam renibus adhærescentem calculis gignendis idoneam quatuor diebus continuis sorbitionem hanc omnium elegantissimam quatuor horis ante prandium absorbeat.

ʒl. Rad. alth. ʒi. summitat. brassic. p. j. liquir. ʒss. cicer. rub. ʒiij. bulliant S. A. in aq. ononid. q. s. colat. ʒvii. adde syrup. cap. ven. ʒiss. mellis cocti & despumati ʒii. terebinth. claræ in eodem decocto cadenti dissolv. ʒii. F. potio, detur modicè calida. Hic unum apprimè necessarium minime prætereundum duco. videlicet cassiæ medullam passim ubique locorum in proposito affectu ab omnibus indifferenter usurpatam non usq; adeo tutam esse, nisi ventriculo primaque regione prius vel inedia, vel vomitu, vel ventris dejectione expurgatis quandoquidem inter medicamen-



ta diuretica hæc non ignobilem obtinet locum. *Ioh. Zecch. conf. 13.*

Vidua quædam dolore nephritico vehementissimo vexabatur, cum urinæ acrimonia & frequenti micturitione: huic neque clysteres cum aqua benedicta, neque cum terebinth. neq; cum laudano, neque semicupium, neque laudanum assumptum quicquam profuere, dolore clamoroso per biduum perseverante tandem aperta fuit vena malleoli, & statim sanguine misso dolor ingens quievit; superstitit tamen dolore obtusiori. *Lazarus Riverius, obs. 15. cent. 2.*

Medicinæ quidam studiosus correptus est dolore nephritico valde urgenti: urinæ erant rubræ & sanguinolentæ primum injectus est clyster ex decocto emmolliente cum diaphæn. ℥i. aqu. bened. ℥iv. qui parum præstitit. sequenti die missus est sanguis ℥x quia erat plethoricus: dolor tamen perseverabat. Tercio die iteratus est clyster prædictus, qui cum toto die purgavit blande, & per dilucida intervalla, eodemque die à dolore prorsus liberatus est, excretis duobus calculis perexiguis. Clyster prædictus ad dolores colicos & nephriticos præstantissimus est; ut in aliis centuriis videre est. In hac autem curatione hoc annotandum, quod si prima vice injectus clyster vocis non respondeat, semel atque iterum repetendus sit. *Lazarus Riverius, observ. 7. cent. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Nephritide.

**V**ir quidam quinquagenarius nephriticis doloribus valde obnoxius: sumpsit per duodecim dies decoctum radices card. asinini & liquir. quo multos lapillos, & arenulas excrevit, postmodum per plures annos ab affectu liber permansit, erat autem radices ℥β. cum liquir. ℥ii. in singulis dosibus. *Lazarus Riverius, observ. 77. cent. 3.*

Quidam nephriticis dolores non alio remedio quàm frigidæ fotu compescuit. *Ioh. Rhodius, observ. 23. cent. 3.*

Convenientius in hoc affectu nihil est, quàm si mercurius dulcis semel atque iterum iusta dosi exhibeatur: quinimò

nephriticus dolor rarò infestare solet eos, qui pilulis mercurialibus singulis mensibus utuntur, hac nimirum ratione ductus amplificantur, & calculi deinceps sponte excernuntur. *Ioh. Hartmannus, practic. Chymiatr. pag. 255.*

℥i. Troch. alkixengi cum opio ℥β. oculi cancri & succini albi, an. ℥j. sacch. penid. ℥i. M. F. pulvis, cujus capiat manè ℥i. in lecto. Deinde istam aquam nephriticam commendavi, de qua præservationis & curationis ergo gustet manè duabus horis ante cibum.

℥i. Aq. parietar. saxifrag. an. ℥iβ. aq. fragor. stillat. ℥i. spirit. sal. rectific. ℥β. spirit. terebinth. correct. gr. iv. sacch. candidi ℥i. M. diligenter fiat haustulus *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 2. cap. 3. lib. 3.*

Observavit *Ioh. Heurnius*, in cadavere *D. Marnixii Alegundij*, cum illud *Leyda* aperiretur anno 1594. in altero rene, calculos parvos septuaginta, in altero octoginta, qui nunquam tamen ullo Nephritidis symptomate conquestus fuerat; ita firmiter carni renum impacti hærebant. *Not. ad cap. 12. lib. 6. pathol. Ioh. Fernelii.*

Mense Julio passus sum colicum dolorem, qui in imo ventre graviter urgebat, & renem dextrum obsidebat. Duobus enematis injectis dolor ventriculi cessavit. Supererat dolor renis qui per ureteris continuitatem exporrigebatur, cum sinistri testis retractione, ita ut vere nephriticus esset. Balneo calente dissolutus est cum tepidum augeret dolorem. Iterum redit dolor, cucurbitulis parti ad motis discussus est. Postridie rediit, & denuo cucurbitulis cessit. Mox sumpsi bolum ex cassia, catholicone, rhabarbaro & crystallo tartari; non amplius rediit dolor. Conjeci hunc dolorem nephritidem factum fuisse à flatibus: nam discutientibus remediis, puta balneo calido & cucurbitulis, solveretur, & nulla materia obstruens, scilicet calculus, arenulæ, aut pituita, à me rejecta sit post solutionem morbi, neque in ipso morbo, neque unquam antea. Neque impossibile est, eosdem flatibus, qui sese intra tunicas intestinorum insinuant, in renes & ureteres posse transferri, ibidemque graves distensiones efficere: cum in omnes cor-



corporis partes flatus interdum deferri soleant; in usque dolores aut palpitationes efficere. Imò verò non pauci existimant, dolores dentium acerbissimos à flatibus exoriri in vasculis ad radices dentium perreptantibus inclusis. Conjecturam meam auxit, quod, operante medicamento cathartico, flatus à lumbis ad alvum sensibilibiter ferebantur, cum sonitu blando, qui ab astantibus facillè audiebatur. *Lazarus Riverius, observ. 58. cent. 2.*

Vir qui Nephritidem patiebatur, & de renibus non rarò lapillos rubentes per virgam mittebat, multum querebatur: lumborum namque & iliorum, imò totius ventris dolores & rugitus sæpe sentiebat. Pro quibus abigendis symptomatis, multis est usus remediis, frustrata tamen. At quum præter spem, ex cujusdam commendatione avellanis in victu uteretur, liber & sanus à tantis affectionibus evasit. Consulverat illi vir quidam, si morbum profligatum vellet, avellanas internis suis membranulis initio prandii & cenæ comederet: Ille remedium considerans familiare & optimum, non solum initio mensæ eas comedit ut Medicus ille imperaverat, sed medio & fine quarum assiduo usu ita valuit, ut nunquam postea morbum persenserit. *Amatus Lusitanus, cur. 78. cent. 7.*

## SECTIO QUINTA.

### *Pro Nervipunctura ab acu in digito.*

**L** *Aurentius Bruninch.*, Chirurgiæ Doctor accitus, applicuit puncturæ linamentum, (plagellam vocant barbari) inunctum cum unguento *Guidonis* de euphorbio, quod ita se habet.

℞. Cera, resina, picis, an. quart. i. euphorb. ℥i. terebinth. ol. commun. an. ℥ss. M. f. a. F. unguentum, inflationi manus apposuit emplastrum ex resolutis & roborantibus, & deinde vinum stypticum in quo coquerentur absint. chamæ & sal. postea inunxit digitos cum unguento dialth. balneando manum cum jure intestinorum, & eam ponendo in bobus aut similibus animalibus rec. mactatis, & ita mulier hæc sanitati restituta fuit. *Petrus Forestus, observ. 38. lib. 6. observ. Chirurg.*

Pro nervorum, ligamentorum & jun-

cturarum torsionibus hoc ceratum valde conducit.

℞. Sigill. solom. ℥i v. rad. alth. ℥i. tol. plantag. M. ii. omnibus bullitis, deinde pistatis, & cribratis ad ignem cum cera alba sufficienti F. ceratum; addendo ol. ros. myrtill. an. ℥ii. Terebinth. claræ, ℥ss. Agrippæ, dialth. an. ℥ss. bol. arm. ℥vi. Sang. drac ℥. 3. thuris, ℥i. santal. omnium ℥ii. valet autem post septimum diem. *Petrus Forestus, observat. 3. lib. 8. Observat. Chirurg.*

## SECTIO SEXTA.

### *Pro Nocturnis Caloribus.*

**N** Ooturni hi calores nullam aliam habent causam quam difficultatem coctionis & distributionis cibi; radices cichor. cum singulari quadam vi ventriculum corroborandi, & jecori obstructions referandi polleant, earum continuum usum commendo: nullum certè in hoc morborum genere nobilius experientia frequèti inveni: bibatur igitur semper hora una ante cibum decocti hujus bonus haustus: qui nisi est sapore amabilis, utilitate tamen acceptus sit, & magnificat: sub noctem verò si vapores ex laboriosa coctione, in ventriculo & corde anxietatem quandam concitent, emulsionis margar. sequentis cochl. duo vel tria assumantur.

℞. Aq. borrag. è flor. in vitreo destill. ℔bi. Margarit. dilig. præpar. ℥iii. aq. cinnam. ℥i. M. in mortar. marmoreo: hanc adeo extollit *Montagnana* ut se hac plurimos & senes exactæ ætatis, & in morbis gravissimis ægros conservasse gloriatur. *Io. Crato consil. 65. lib. 6.*

## SECTIO SEPTIMA.

### *De Nyctalopia.*

**N** Yctalopia affectus est secundum quosdam in quo interdium quis videt, sed noctu aut vesperi nihil: secundum *Hipp.* verò oculi vitium est, in quo è contra noctu melius cernitur, interdium autem deterius: utriusque affectus assignanda est causa: nocturno fit cæcitas, ex eo quod propter oculi humorem & corneæ tunice crassitiem & impuritatem, multum lumen ad visionem requiratur: huic cau-



ſæ aliquando conjungitur pupillæ non naturalis coarctatio: diuturnæ rursus cæcitatæ immediata causa eſt requiſitio pauci luminis ad viſionem cum hoc, quod oculus non poſſit multum lumen tolerare ob cornæam nimis tenuem, & humores nimis raros & limpidos: hanc cauſam adjuvat quandoque pupillæ nimia dilatatio; quam eſſicere poteſt longa mora in tenebricoſo carcere.

## SUBSECTIO UNICA.

*Pro Nyctalopia.*

**I**nter topica utebantur frequentiffimè ſanguine turturis & columbi; quæ ſunt

*Dioſcoridis remedia*; & ipſe feliciffimo cum ſucceſſu uſus ſum ad multos annos; & dicti ſanguines tepidi oculis inſtillabantur. *Epiphanius Ferdinandus, hiſtor. 51.*

Quendam patrem familias nyctalopem factum vidimus, qui poſt occaſum ſolis quotidie cæcus redditus in ludibrium apud domesticos venerat, cum magna honoris & rei domesticæ jactura, qui ſerè ad deſperationem ductus, tandem convaluit, ſumendo aliquoties ante cibum hepar anguillæ ſuper aſſatum: hoc remedio poſtea duos ſimili malo laborantes feliciter ad ſanitatem perduximus. *Domini- cus Panarolus, obſerv. 49; Pentecoſte 3.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER DECIMUS TERTIUS.

*De Affeclibus à littera O incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

*Pro Obesitate.*

Obiliffimæ Dominæ adeo obæſæ ut vix incedere poſſet, à Medicis conſultum eſt, ut iter unius miliaris ſubinde jejuna pedestri itinere abſolveret, ſed cum præ aſthmate ambulare amplius non poſſet, magis ei profuit purgatio frequentior: aurifaber quidam cum extremè obæſus foret, ita ut proximus ſuffocationi videretur, huic ſequens pulvis etiam in cibo datus eſt, & ita liberatus fuit.

℞. Tartar. ℥ii. cinnam. ℥iii. zinzib. ℥i. ſacch. ℥iv. F. pulvis *Gilbertus Horſtius* hoc ſequenti pulvere, modo per ſe modo in conditis, in obæſis commodè uſus eſt.

℞. Tartar. vini albi aut rubri ℥ii. cinnam. ℥iv. zinzib. ℥℔. ſacch. ℥iv. M. hæc etiam ſubſequentia maxime extenuare obæſos expertus erat; cepa, allium, na-

ſturtium, porrum, ſemen rutæ, & poſtiſſimum acetum ſcyllinum: utantur larga ventris ſolutione, urinam ac ſudorem provocent; labore multo tum veloci utantur antequam comedant; famem tolerant, diu vigilent, ſitim patiantur, in balneo aereo ſudent, dormiant parum, & in lecto duro, multum cocant, & morentur ſub ſole: hæc omnia corpus pingue macreſcere faciunt. *Petrus Poſteſtus, obſerv. 10. & Schol. lib. 31. De ſuccis.*

Purgato corpore, quoniam præcipuus ſcopus propoſitus eſt, ut caro & pinguedo deterantur, ſimulque continuo perſpirationi & exinanitioni via paretur, ad eos abſolvendos conducturum id remedium eſſe conſido, quod hæc faciendi inſignem poſteſtatem habet, cujuſmodi eſt ligni guajaci & ſarſæ decoctum pluribus cum tenui & exſiccanti diætâ, ſudoriſque provocatione aſſumptum; hoc enim ( ſi modo



modo prudenter administretur) minimè dubitare oportet, quin blandè exsiccet, sudoremque provocando cutis meatus aperiat, & consequenter faciendæ insensibili transpirationi magnopere auxilietur: post ejus usum non parùm mihi arridet eorum consilium, qui diureticis utendum esse commendant, ut asparago, apio, fœniculo, porro: similiter quoque facere non possum: quin laudem usum ejus lavacri, quod vim habeat exsiccandi, quale est aqua marina qua tepida utatur. *Hier. Mercurialis, tom. 3. consult. 222.*

Abstineat à potatione inter prandium & canam, nam talis corpora multum pinguefacit: laudant aliqui maximè in æstate per plures dies cyathum unum aceti manè, nam potenter corpora siccat & emaciat, sit ejus ergò assiduus maximè in condimentis & acetariis verum hoc fugiant qui imbecillos habent articulos nec non & uterum hyeme ut ejus nimia acredo refrangatur, immiscendæ sunt uvæ passæ: sint in assiduo usu cappares cum aceto conditi, & olivæ: cauteria maximè probantur, præsertim in tibiis, cum sensim evacuent totum corpus, frictiones etiam commendantur asperæ pannis asperis donec cutis rubeat: sit assiduus usus linguæ ovis. i. seminis fraxini, ad 3i. cum vino exhibitæ. Ex *Plinio* hydropicos curat, & corpore obætos ad maciem reducit. *Arabibus* etiam maximè commendatur. *Epiphanius Ferdinandus histor. 83.*

## SECTIO SECUNDA.

### Pro Obesitate.

**N**obilem virum adeo pinguem vidi, ut equo insistere nequiret, quin statim sopiretur, nec loco ferè moveri posset: ille tamen nunc huc & illuc vadit, mole illa deperdita, & pristinum habitum recuperavit, quod sola masticatione folii tabaci peractum fuit, ut ipse mihi asseveravit, pituitosis enim & frigidis corporibus utile est: folium lauri linguæ impositum aquas multas etiam educit. *Petrus Forestus, observ. 11. cent. 2.*

Multi quibus crassior est corporis habitus & pinguior aqualiculus, ejus extenua-

tionem summò pere exoptant, ut deambulationibus, & variis corporis motibus & inflexionibus liberius & absque molestia vacare possunt, tenuis diæta sæpè parum profuit; imo plurima multis intulit damna, humores enim exacuit & inflammat, febremque sæpius excitat, à quibusdam usus aceti commendatur, sed ventriculorum & intestina lædere potest, cum sit membranosis omnibus partibus insensum: eo tamen fœliciter usus est ad corporis sui extenuationem & imminutionem *Chiapinius Vitellius Cetona Marchio* generalis *Castro-rum* præfectus in *Hispaniarum* regis exercitu *Belgico* ut videre est apud *Stradam de cad. 1. lib. 8. De bello Belgico*. Mirum fuit (inquit) hominem obæsitæ prætumidum ea valuisse non modo vi mentis, sed etiam corporis expedite sese inflectentis agilitate: ut in præliis, ad ducis prudentiam non magnopere in illo desiderasses bellatoris dexteritatem quod enim sub mediam ferme ætatem, incrementum adeo mole, ut fascia è collo demissa sustinendus venter esset immodicè projectus, videret tardiorrem quotidie reddi se ad belli munia: homo ad militiam cuncta referens, vino sua sponte sibi interdicto, acetum exinde bibere ad vitæ usque finem perseveravit, effecitque ut detumescente abdomine, defluenteque ventris pelle, qua ipse se thoracis instar involvebat, octoginta septem librarum decrevisse pondus compertus sit. Novi ego hominem qui ex obæso & crassissimo gracilior evasit, detracta scilicet panis portione, quem quotidie copiosum comedebat: huic in panis locum major carnis quantitas ad esum exhibitæ est. *Isaacus Cattierus, observ. 13.*

Notissimus hic Tribunus militaris sexagenario major, sed vivax & vegetus, ita ferè quinto quoque anno abdomine tardus evadit, & pinguedine nimia distentus, ut aliis gravis, sibi invisus sit. Cui malo cum varia quæsierit remedia in ediam, acida, exercitia, frustrante expectationem ingrato eventu, novissimè in mercurio dulci opem sollicitavit & invenit. Progreditur enim pilulis mercurialibus ad eam paulatim dosim, ut apertis gingivarum laxitatibus, ptyalismus consequatur, nec is perfunctorius, sed qualem in adultis *Veneris nepotum*.



nepotulis efflagitant medentes, ut scdam lucem expuant. Per has vias omasum se se exonerat, & latum alacremque Tribunalum ad munia sueta reddit expeditionem. Ex eo triennium integrum exigit ab infesto aqualiculi pondere liberum. Tandem redit sensim malum, & quinto post anno novam curam deposcit. Igitur ille iterum supplicat Mercurio, iterum in palæstram redit promptior. Jamque ter quaterve iterato eodem aquore, vivido faciei colore, toris robustis, corpore alacri ad negotia sua consurrexit. Exploratum hæcenus fuit, scdam pituitam per glandulas salivares excludi. Hoc novum, nimix pinguedinis causam per eisdem ductus foras posse amandari. *Olaus Borrichius in Art. Med. Thoma Bartholini.*

### SECTIO TERTIA.

*Pro obstructione venarum meseriacarum.*

24. **T** Erebinth. cypriæ 3ß. lavetur aq. absinth. & rutæ per vices quater deinde adde pulv. cinnam. nuc. mosc. an. 3ß. ol. amygd. d. rec. 3ii. M. non reperi melius remedium in difficilibus & antiquis tum meseriacarum venarum, tum hepatis & renum obstructionibus. *Hier. Heroldt. epist. 38. lib. 6. epist. & consil. Cratonis, & aliorum à Scholtzio editorum.*

Corollarii loco electuarium quoddam transmittito, quod in obstructionibus viscerum maximo usui est, & præsertim in morbo virgineo: communicavit autem mihi illud Ducis *Bavaria* medicus præstantissimus, & se multa centena eo lucrificasse dicebat, & ferè domi suæ, ne innotescat parare solere: hæc autem est descriptio ex illius αὐτογράφου.

24. Limatur chalyb. 3viii. molatur super porphyrite subtilissimè cum aceto, deinde siccetur ad solem, aut ignem, & sic septies iteretur.

24. Limatur. sic. præp. 3vi. cinnam. nuc. conditæ, an. 3iii. rhei el. 3ii. syrup. aromat. rosat. 3vi. mell. opt. sacch. albiss. an. 3bi. M. cum lento igne, & F. electuar. qui hoc electuarium assumit exercitio utatur; dosis sit instar castanæ vel 3ß. præcedat autem

purgatio universalis. Potest ut ad dies triginta, vel quadraginta: in viscerum, lienis maximè, obstructionibus magnam vim possidet: etiam fœminis & virginibus decoloribus rectè datur: feci ego in una atque altera periculum. *Petrus Monavius, Epist. 33. & 34 libro 2. Epist. & Consil. Cratonis, & c. à Scholtzio editorum.*

### SECTIO QUARTA.

*De oculi cicatrice in pupilla-visionem impedi-  
diente casu deleta.*

**P**Uella cum ex cicatrice in corneæ media sede nata, visus impediretur, Chirurgus sacch. cand. pulverem oculo inspergere volens, ad eam extergendam, errore quodam pixidem eam arripuit, in qua sublimati pulvis continebatur, quem cum imprudens oculo inspergeret, tanta suborta est inflammatio ut periculum esset de oculo: tamen sanata, tantum abfuit ut quid obsuerit, ut potius multum profuerit: nam cicatrice penè universa deterisa remanente levi duntaxat macula, visum recuperavit: quod indicio est, globum oculi, fortia quoque perferre posse medicamenta, cum cornea ipsius unica sit durissima & insensibilis. *Felix Platerus, observat. lib. 1. pag. 113.*

### SECTIO QUINTA.

*Pro Oculi dolore,*

**P**Ræmissis universalibus remediis caseus ovillus recens pluries in aqua frigida lotus, tandem albumine ovi permixtus & oculo appositus mirificè profuit. *Petrus Forestus, obs. 3. lib. 11. De morb. ocul. & palpebr.*

### SECTIO SEXTA.

*Pro Oculorum hebetudine:*

**M**ONTANUS præceptor meus ad hanc intentionem cuidam præstanti viro hunc syrupum præscripsit.

24. Succu verbenæ, euphras. ros. scnic. rutæ,



rutæ; chelid. an. ℥iii. purificentur f. a. & cum sach. F. syrupus: aromatizetur moscho, membranis densatis, & crassefactis (ita enim fieri solet in hebitudine in senibus) valde prodest collyrium quod sequitur, habeoque de eo certam experientiam.

℥. Fol. euphras. rutæ, chelidon. maj. beton. verbenæ, an. M. i. sem. fœnic. filer. mont. an. ℥ß. Rad. cal. aromati ℥vi. Absinth. pontici non tenuifolii, sed latifolii. M. i. flor. cyani rosar. an. Miß. Thuris Aloes, Myrrhæ, an. ℥ii. aq. ras. lbii. vini malvat. aq. rutæ, an. lbii. urin. pueri lb. m. infund. omn. per dies quinque: postea f. a. destillentur in vase vitreo, ac destillatum vitrobe- nè cooperto servetur usui. *Joh. Crato consil. 3. lib. 2.*

## SECTIO SEPTIMA.

### Pro Oculorum rubore & dolore.

**Q**uidam in hoc casu maximopere commendant aquam simplicem in qua vitriolum album & saccharum candidum dissoluta sunt, ego verò plurimum prodesse comperi eam aquam quæ à nive *Martii* dissoluta in vase vitreo provenit: nam hæc etiam absque alia ulla re adhibita in affluxu calido loco collyrii est: ad rubedinem autem peculiariter commendatur, aqua fragorum, illis prius in eo vase in quo destillantur putrefactis in fimo, aqua etiam è tormentilla destillata rubores tollit, & initio fluxionum prodest; laudatur & hoc collyrium.

℥. Aq. fœnic. euphras. ros. an. lb. m. sacch. candidi, ℥i. vitriol. alb. ℥. m. M. & per filtrum aliquoties transfundatur; dolor isto modo sedabitur; noctu totus oculus inungatur isto unguento cujus mirificam efficaciam expertus sum & pro secreto habui.

℥. Butyrum si haberi potest mense *Majo* factum, aut aliud recentissimum diligenter clotum, vel loco illius medullam bovinam è cruribus, vel cervinam; atque huic admisce lapid. calamin. tenuissimum pulverem triti quantum accipere poterit, atque ut dixi hora decubitus applicetur; repeti autem potest aliquoties noctu ista inunctio, si præsertim

dolor vehementer urgeat; manè abluitur aq. ros. & fœnic. in qua particula pomi dulcis sit decocta. *Joh. Crato. consil. 5. lib. 5.*

Aurifaber quidam fluxum lachrymarum ex oculo sinistro diu perseverantem cum rubore, tumore & obscuritate illius oculi, patiebatur; aliquando hæc cessabant, mox iterum revertebantur, eratque antiquus & confirmatus affectus: tandem accersitus, ordinavi pilulas sequentes.

℥. Pil. aurear. cochl. an. 3. m. cum aq. fœnic. F. pilulæ: deiecit admodum, atque eo ipso die lachrymæ cessarunt, & oculum aperire potuit: vesicatorium dein nuchæ applicui: emplastrum pro ruptura ad arcendam defluxionem utrinque temporibus quadrantis thaleri magnitudine admovi: ad cohibendam item defluxionem sequens ordinavi collyrium.

℥. Cortic. granat. contus. ℥i. bol. arm. pinguis, dr. ii. coq. in aq. plantag. & peculi rosar. an. part. æq. in colat. ℥iv. dissolv. lap. hamatit. dr. ii. diu agitando ut penitus dissolvatur adde vitrioli albi ℥i. camphor. ℥ß. M. diligenter ut fiat collyrium: in quo parvam spongiolam madefaciat & exprimat, atque oculo clauso applicet, sæpe repetendo, cum aliquoties usus esset, ut melius operaretur addidi.

℥. Aq. plantag. solan an. ℥iii. tutiæ ℥ii. mucilagin. sem. psyll. fact. cum aq. rosar. M. cum priori collyrio & utatur, & sanatus est. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 377.*

Caro vitulina recens abluta singulare empiricorum in dolore oculorum est remedium: caseus recens non salitus applicatus idem facit: albumen ovi agitaturn donec aquæ instar fluat spuma adempta plerumque ad doloris sedationem usurpatur: tum per se, tum cæteris additum medicamenti pomorum etiam dulcium assorum prius ad ignem, vel sub cineribus, vel decoctorum pulpa, cum dolor sedandus, valde est utilis sunt qui ex semiputridis pomis parum assis pulpam præferunt: quando verò fluxus reprimendus, poma acida, pyra austera vel cydonia eodem modo parata sumuntur. *Felix Platerus, pract. tom. 2. cap. 3. pag. 270.*



In doloribus oculorum folia nicocianæ applicentur. *Joh. Hartm. practic. Chymiatr. pag. 270.*

## SECTIO OCTAVA.

### Pro Oculi rubore & dolore.

**F**Omentum istud meum ophthalmicum (quo toties cum successu usus sum) tepidè applicari jussi.

℥. Sem. scœnugræ. conquass. ℥i. sem. euphras. anis. scœnic. an. ℥ii. flor. euphras. beton. meliloti, chamæm. an. p. i. ℥. tutiæ præp. sarcocoll. nutrit. sief. alb. an. ℥i. incid. & conquass. omnia & coq. in lact. vaccin. rec. q. s. & sacculis includantur pro fotu. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 7. cap. 2. lib. 2.*

*Joh. Heurnius* oculorum rubidinem dolorificam miraculi instar hoc secreto remedio curavit.

℥. Phlegma aluminis, applica, extilatur in balneo, in notis annexis *cap. 5. lib. 5. patholog. Joh. Fernelii.*

Vir quidam doctus destillationem ad oculum sinistrum patiebatur, contra quam hoc usus est remedio, & brevi sanusevasit.

℥. Tutiæ præp. q. v. linteo raro includatur, & filo ligetur. In vino *Cretensi* austero immerge, & ea sic panno excepta oculum lava. Brevi enim, vel intra triduum sanus evasit. Bis autem vel ter in die usurpari debet. *Amatus Lusitanus, curat. 96. cent. 5.*

## SECTIO NONA.

### Pro Oculi macula cum catarrho & metu suffusionis.

**P**RO conservatione oculi, velim utatur hoc collyrio abstergente.

℥. Aq. rosar. ℔iv. sem. scœnugræ ℥i. rad. alch. num. 6. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, fiat fortis expressio, colaturæ adde Aloes opt. pulverizata & sacch. Candidi rosati, an. ℥ii. bulliat iterum cum his ad ignem clarum ad consistentiam mellis: deinde servetur ad usum in vase vitreo bene obturato, usu istius collyrii corroboratur oculus &

*Burnet Parte I.*

mundificatur, & abstergantur humores, hoc mihi habeo familiare, quod semper scèliciter succedere expertus sum. *Joh. Baptista Montanus, conf. 145.*

Aqua mellis oculorum maculas certissime delet, si penicillo illas tangamus; sed oculorum dolor, si quis sit, primo mulcendus; est enim dolorifica quod notandum. *Petrus Pachecus, observ. 43.*

Quædam mulier infimæ sortis maculam habebat in oculo: cui consilium dedi, ut bis in die succi rutæ guttam unicam in oculum instillaret, quod cum satis diu continuasset, macula prorsus assumpta est. *Samuel Formis, obs. 28.*

Puella quædam in oculorum nebulas crassas, ob destillationem à capite, incidit. Pro quibus delendis, à repurgato corpore, hoc remedio usi sumus, & sana evasit.

℥. Mellis ex ipso favo ℔ii. summit. scœnic. flor. sambuc. euphragiæ an. p. ii. Sacchar. Cand. ℥iv. In duplici vase vitreo s. destillatio s. a. Cum hac aqua nebula sæpe inungebantur, & tandem sanata est. *Amatus Lusitanus, cent. 5. curat. 53.*

## SECTIO DECIMA.

### Pro Oculo perforato.

**Q**Uatuor annos natam puellam vidimus, cui dum nodum in panno solvete acuto gladio niteretur, resiliens mucro oculum dextrum percussit: quo perforata ipsius oculi tunica, plurimus statim inde fluxit humor; quare cæsi visum prorsus amisit, ipsum tamen haud multo post ritè curata recepit, tanta enim inest vis tenellæ illi ætati, ut hunc ipsum oculi humorem (quod sæpè accidit) in integrum reficere possit. *Antonius Benevenius, cap. 74. lib. De abditis Morborum & Sanationum causis.*

Quindecim annorum ad adolescentem cum Domino *Iohanne Griffonio* Chirurgo præstantissimo curavi, cui acus sutoria perforaverat adnatam membranam prope iridem: hinc factum, ut humor aqueus statim efflueret, & adolescens illico visum planè amisit. Oculo imposuimus

Hh

in



in primo apparatu albumen ovi cum aqua rosac. & nonnihil croci: fronti autem defensivum ex bol. armen. terra sigill. cum oleo rosac. paucaque cera & aceto in formam unguenti redactum atque injecimus statim enema. Sequenti die catharticum exhibuimus, & amplius, & anodynis ad septimum usque & amplius vulnus tractavimus. Deinde collyrio ex aqua euphras. sacch. & tutia præparata cicatricem induximus, hic curatus fuit nullo superveniente symptomate: haud multò post curationem visum quoque recepit. Curavi etiam puerum cui infixæ sagitta perforata fuit cornea qua parte conspicitur iris; effluxit nonnihil humoris aqueis, unde contracta est cornea; & puer protinus visum amisit. Vulnus curavi ad modum supradictum: puer hic quoque non multò post visum recepit. Omnino his ægrotis crystallinus humor compunctus non fuit: est enim ille humor præcipuum visus instrumentum, ac sua propria continetur membrana arachnoide; qua dilacerata, amplius humor crystallinus officium facere nequit, effluxit autem in his aqueus tantum humor, qui cum sit excrementum aliquando renascitur, præcipuè in pueris. Id autem hic notandum, vulnerata pupilla visum recipi non posse, quamvis humor crystallinus sit illæsus, & aqueus renascatur; inevitabilis enim cicatrix impedit, quo minus radii eorum quæ visui obijciuntur, ad humorem crystallinum perveniat. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 26. cent. 1.*

*Franciscus Plazzonus* duodecim annorum puero medebatur cui cornea pertusa, humor aqueus oculi totus affluerat, Sed intra binos menses spontè sic præparatus fuit, ut oculi usus ipsi omnino fuerit redditus, ob reliquarum partium constitutionem humidam. Idem *Gal. lib. 1. De Symptom. Causis, cap. 1.* annotavit. *Ioh. Rhodius, observ. 82. cent. 1.*

## SECTIO UNDECIMA.

### *Pro Oculi tumore carneo.*

**I**N muliere vetula paupere, tumor in oculi sinistri latere juxta pupillam an-

te biennium exortus; cum oculi immenso ardore, & dolore, adeo accrevit ut medium ferè occuparet oculum, prominabatque ad avellanæ majoris magnitudinem, carnem ex rubro nigricantem repræsentans, adeo deformi colore, ut pavorem inspicientibus incuteret, tandem suppuratione facta per dies quatuordecim, ater ex eo effluxit sanguis, remanente nihilominus carne illa ex atro rubente & nunc virecente. Ad me consilii gratia veniens, jussi ut pomum putridum applicaret exiguam spem sanationis habens, verum cum non proficeret, jussi ut sumeret cortices granat. pulverizaretque & adderet fol. plantag. rec. eaque simul in aq. fabrorum ferrata decoqueret, addendo albumen ovi, simulque decoquendo, sub finem pulv. vitrioli albi ea quantitate, quàm oculus perferre posset, hocque cataplasma noctu oculo imponderet, illiusque usum continuaret. Post duos menses reversa, vidi tumorem media ex parte absumptum, quapropter in hujus applicationis usu, pergendum esse consului: quod cum adhuc mensibus duobus fecisset; tumor omnis præter omnem spem evanuit. *Felix Platerus. obs. lib. 2, pag. 386.*

## SECTIO DUOCECIMA.

### *Pro Oculi Vulnere.*

**L***itbuanus* quidam qui ab omnibus medicis, agyrtis, anubus, veneficis, chymicis, in tota quam obierat *Europa & Asia* secreta ut vocabat prece vel pretio, vel permutatione, plurima collegerat; inter alia gallum gallinaceum, utraque illum manu tenens, mihi obtulit, jussitque me oculum sæpius acutissimo scalpello punctum, interque digitos pressum, orbitæ cranii reponere: affudit illi liquoris guttas duas, obligatoque capite cistæ inclusit; è qua post horas octo eduxit utroque oculo ita sibi simili, ut nec ego, qui secueram, nec adstantium ullus, sectum oculum à sano posset distinguere. Succus ille erat is; ut mihi fatebatur, qui in vesicis ulmorum *Majo* mense inventus, quinque nisi tum colligatur, in granula quædam rubra vermiformia mutatur. Hanc ego artem ludicram,



cram, nullique unquam profuturam dice-  
ns, cum scire non possemus, an cum ocu-  
li externa pulchritudine visus servaretur :  
Cum tamen aliquot annis succum hunc co-  
ligi curassem, est enim vulneribus sanandis  
commodus; casu duabus sororibus à pran-  
dio coludentibus, junior adultioris linteum  
suentis brachium vi elevans; ac in medi-  
am pupillam altè adigit, extemplò, à  
patre principis consiliario accitus, ob-  
servo aqueum humorem, & partem vitrei  
effluxisse: applico oculotumenti vesicari-  
um ulmi succum sub quartam pomeridia-  
nam; jubeo sub mediam noctem linteum ad  
motum novo liquore imbui, quem O-  
thonniam certius, quàm tot ignotarum  
herbarum succos nominarent Botanici.  
Manè testor Deum & Fidem externa sa-  
nam offendi, sed illius oculi luminæ ca-  
ptam, etiam nunc vigesimo ferè post an-  
no, nullus exæcatum oculum à vidente,  
etiàm si curiosè indaget, discriminare po-  
test, imò multis annis cum marito orbita-  
tis ejus inscio vixit. *Henricus ab Heers, Ob-  
serv. 4. lib. 1.*

Ad Oculorum vulnera Beryllum aliqui  
celebrant, sive illa pupillæ, sive alteri  
parti inflicta fuerint. Reducitur Berillus  
contusus & tritus in pollinem exactissi-  
mè ut impalpabilis sit. Deinde lentis quan-  
titate pulvis quotidie manè, supino ja-  
cente ægro, in oculum, donec sanetur,  
infunditur, ac præcipitur ut æger im-  
motus aliquandiu supinus permaneat. Si  
pupilla vulnerata fuerit, etsi commodè sa-  
nari non possit, tamen ita emendabitur,  
ut oculus deformis non fiat. Si læsio ex-  
tra pupillam fuerit; præclare sanat Be-  
ryllus, quem admodum etiam omne ocu-  
lorum contusiones. Suaderem contusiones  
& sugillata, ut infusio fieret aquæ verba-  
sci: Si adjuncta esset inflammatio, aqua  
rosæ. plantag. euphras. vel simili. Si vul-  
nus esset, aqua beton. tormentill. vel plan-  
tag. *Anselmus Boetius, lib. 2. De Lap. &  
Gemmis. cap. 71.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### De Oedemate.

**O**edema (in idèa tumeo) tumor est la-  
xus, frigidus, mollis & doloris

expers; ad digiti compressionem cedens  
nec calor nec rubor, sed genuinus vel al-  
bidus duntaxat color inest. Duplex est,  
unum collectum & circumscriptum,  
quod propriè Oedema nuncupatur; alte-  
rum diffusum & expansum, diciturque tu-  
mor œdematosus. Ejus causa statuitur  
pituita: in omnibus partibus excitari po-  
test, sed præcipuè in manibus & pedibus;  
ut in hydropicis, & cachecticis & phthisi-  
cis videre est.

## SECTIO UNICA.

### Pro Oedemate.

**A**ccitus ad virum quendam qui crura  
œdematosa habebat, materia pitui-  
tosa commodè præparata & evacuata, hoc  
topicum applicavi.

℞. Fol. malv. rosmarin. flor. stæch. mont.  
majoran. flor. chamæm. ivæ an. Mß. sal. nitri.  
Salis gemm. alumin. an. ℥ii. bulliant in f. q.  
aqu. cineris sive lixivii, ad tertiæ partis con-  
sumptionem. Colatura manè & vesperi œ-  
demata fomententur, sed & alteri, cui cru-  
ra maximè œdematosa erant, hanc lotio-  
nem fieri mandavi.

℞. Aquæ cineris ℔bxx. flor. chamæm. rad.  
ebuli, an. M. i. sal. communis, ℔bß. aceti  
opt. ℥iv. M. & bulliant usque ad consum-  
ptionem medietatis: colatura usui servetur  
Aliis etiam sæpius commodè sequens præ-  
scripsi.

℞. Aq. mar. ℔bxx. aceti opt. ℔bii. bulliant  
usque ad consumptionem quartæ partis.  
Deinde ipsa dicto usui servetur. Quod  
si æger noster istis remediis non fuisset cu-  
ratus, pervenissem ad extremum illud re-  
medium quod Præceptor meus *Benedictus  
Faventinus* præscribit, & est cauterizare  
membra affecta cum actuali cauterio in  
pluribus locis: ipso enim non solùm ex-  
trahetur aquositas pituitosa talem pro-  
gignens affectionem, verùm etiam membra  
exonerata confortabuntur, ut inde nutri-  
mentum melius concoquere valeant & su-  
perfluum secernere. Aliquando etiam ap-  
ponit ille parti affectæ emplastrum vesic-  
ans. *Petrus Forestus, observ. 1. lib. 3. Ob-  
serv. Chirurg.*

Victu exsiccante & ad calidum vergente



prescripto, materiam pituitosam commodè præparavimus, mox & purgavimus cum polipod. agar. turpetho, & id genus aliis. Tandem ad localia devenimus juxta *Avic.* qui incipit curationem è frictione cum aspero panno, ponitque exsiccantia super apostema, ut spongia novam adhuc retinentem virtutem aquæ marinæ, infusam aceto aquæ commixto, idque calidè: in ea enim spongia teste *Avic. & Gal. 2. ad Glauconem*, virtus inest exsiccativa & resolutiva, hæc autem à principio fiunt, in augmento adduntur fortiora resolutiva, ut spongia alia nova infusa in lixivio cineris vitis & modico aceto: in declinatione adhuc fortiora adduntur, ut salis gemm. exiguum, nitrum & lixivium cineris sicci & quercus cum alumine & sulphure, & similia. Deligare verò spongiam debes ab inferiore parte incipiens ac supra finiens. Sit autem arctatio mediocris velut in ossis fractura, & primæ quidem injectiones fasciæ, quæ scilicet infernè incipiunt, magis arctandæ, quæ deinceps sunt magis remittendæ; sed ita ut nulla pars deligationis sit laxa, verum cum supradditis non resolveretur, & videretur quod apostema aliquo modo elevabatur, & dolor crescebat, ad maturativa scopum convertimus sic.

24. Radic. alch. lil. alb. cepar. alb. summitat. malv. fenecionis & lapath. acuti, an. part. æq. omnia ista involuta stupis maderactis coquantur sub caldario, deinde addantur carie. ping. num. 10. axung. porcin. q. s. fermenti 3ii. incorporentur & f. cataplasma. Dicit enim *Valescus*, quod res bullitæ in aqua non tantum maturant apostemata frigida, sicut coctæ sub prunis, vel frixæ in patella cum sola pinguedine. Ubi jam maturum videtur apostema, nullo modo tardandum erit, donec sponte aperiatur, quia fortasse nunquam id contingeret: ideo ferro candenti aut caustico aliquo medicamento fiat apertio, qua pus excernatur, aperto apostemate fiat ejus mundificatio, cum mundificativo ex succo apii & melle. Valet etiam unguentum apostol. post verò deterfionem & mundificationem curetur ut reliqua ulcera sordida. Cuidam hoc experimento œdema resolutum est, quo *Benedi.* Præceptor meus commodè uti solebat.

24. Salv. sicc. rosmarin. beton. an. 3ß. carvi, dauci, anisi, fœnic. an. 3ii. pulver. omnia subtiliss. & prædictus pulvis superaspergatur spongiæ siccæ ad quantitatem membr. œdematosi, eamque illi super alligabis, & sic manè & versperi continuando videbis dissolutum œdema. *Petrus Forestus, observ. 2. & schol. lib. 3. Observ. Chirurgica.*

## SECTIO XIV.

### Pro Opii veneno.

**P**ost vomitum ex oleo, & acrioris clysteris infusionem, detur in potu vice una post aliam vinum decoctionis castorei & piperis nam secundum *Guainerium* hujus Bezoar est 3i. Castorei cum vino: & ex conferentibus est bibere optimum vinum, & cum nitro & sapone extrema fricare, & cum helleboro albo, seu pipere naribus immisso sternutationem provocare. Sumat etiam ex theriaca optima. Prodest etiam vinum in multa quantitate sumptum, dicunt experimentatores quod hæc confectio sequens sit ejus propria theriaca.

24. Assa fœtid. fabin. piper. castor. myrrh. an. q. s. trita consiciantur cum melle; detur cum vino generoso, non permittantur dormire. *Petrus Forestus, schol. observ. 10. lib. 39.*

N. N. Optime spei juvenis, felicique ad artes liberales ingenio, ægerrimè ferens, quod egritudo corporis in conformatione tota consistens, vix ulli quam sibi conspicua, pro voto curari non poterat, mæstitiæ solitariæque vitæ jam à longo tempore se totum tradidit. Tandem melancholia, verius pertinacia rationem superante, mori apud se certo decrevit: in quem finem propositi tenax, circa horam decimam diei Mercurii (qui decimus quartus erat mensis Maji 1684.) deglutiit opii erudi grana triginta & unum; suspicione, de veneno assumpto, oborta, circa horam undecimam ad illum advocor. Fessus quidem est ante meum adventum se toxicum hausisse, quod mors ipsi vita longe præferenda videbatur; sed nec minis, nec



nec amicorum conjunctis & ardentibus precibus obtineri poterat, ut quoniam usus esset veneno propalaret. Post tres tandem ab opio assumpto horas; confessus est, sed ægre, tum quid, tum quantum cepisset. Emeticum statim propinavi ex ℥i℥. infus. croci metallorum, quod nonnisi ob minas intentatas coactus ebibit: Multa ad gustum amara & sæpius evomuit, & ut ipse mihi fatebatur, plurima etiam opii frustula. Circa tertiam pomeridianam, & deinceps in somnum valde propentius erat, sed quod somnum omni arte arcendum edixerim, id unice curabant assistentes ne obreperet, ad loquendum continuo invitando, corpusque stimulando. Spiritum cornu cervi ad guttas xv. sæpius exhibui, cum Julapii cephalici cochl. 2. quod.

℥. Aq. ceras. nigr. pœon. an. ℥i℥. aq. antiepilept. Langii ℥i. spir. lavendul. com. pos. & aq. theriacal. an. ℥℥. Castor. in nodulo ligati ℥i. syrup. flor. cariophyll. & de pœon. an. ℥v. M. Clysterem item purgantem hora octava injiciendum curavi, qui optime & pluries per inferiora eduxit. Ptarmi cum etiam ex pulvere florum lilii convallium ordinavi. Tantum habuere hæc præsidia (Deo benedicente) successum, ut nondum absolutis ab assumpto veneno 24. horis (quod mirum & valde notandum) ad integram sanitatem redierit.

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### De Ophthalmia.

**O**phthalmia est adnatæ seu albæ oculi tunicæ inflammatio cum rubore, ardore, dolore & lachrymis. Ejus causa proxima est tum sanguis purus, tum humores calidi, acres & vitiosi, sanguini permisti, in oculi tunicam adnatam sese effundentes. Antecedens verò Plethora & cachochymia. Ophthalmia aliquando contagiosa est. Sub hoc affectu continentur Taraxis. Xerophthalmia & Chemosis Taraxis, i. e. conturbatio, est oculi levis inflammatio cum exiguo dolore & rubore, quæ ut plurimum à sole, igne, fumo, vento, pulvere & vini potu ortum du-

Burnet l'art. I.

cit. Ophthalmia etiam Notha dicitur: Xerophthalmia est inflammatio sicca sine lachrymis, aut materia effatu digna affluente: Oritur ab humore pauco, falso & nitroso. Chemosis vero magna est inflammatio non adnatam solum tunicam, sed & carneam & palpebras obsidens, ita ut quasi invertuntur, nec claudi possunt, albumque supra oculi nigrum intumescit; pueros hæc magis quam adultos apprehendit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Ophthalmia biliosa.

**P**remisso lenitivo, ad humores acres & mordaces contemperandos syrupos incrassantes & infrigidantes hoc modo propinavi.

℥. Aq. solan. plantag. cichor. an. ℥ii. Syrup. de ros. rub. sic. de nymphæa & papav. an. ℥i. M. F. Julepus pro duabus dosibus. Postea etiam purgavi cum infuso rheo, adjecto syrup. viol. oculis verò candidum ovi liquorem instar aquæ concussam infundebam, hoc enim modo acris fluxio sine offensa eluitur juxta Gal. 13. meth. & cum dolor urget, accipiebam aq. albuminis ov. ℥ij. lactis muliebri ℥iii. succi plantag. ℥i. M. panni linei duplicati in eo infuso oculis imponebatur, interea & collyrii alb. rhasis ℥℥. modo cum lactæ muliebri soluti, modo cum aq. rosac. oculis instillabam. Fovebam etiam oculos cum decocto sol. malv. viol. & sem. fenugræc. Medicamento illo ex ovi liquore, quo nos usi sumus, veteres magna consideratione utebantur, cum minime mordens sit & glutinosus, & propterea, lenit asperitates omnes quasunque acris fluxio excitat; deinde cum crassus sit & lentus humor constantiùs quam tenuis & aquosus in loco permanet; cumque absque rosione sit, si modice incalescat, dolorem maximè lenit, Petrus Forestus, observ. 2. & schol. lib. 11. De Morbis Oculorum, &c.

~ Mulier quædam de oculi dolore ingenti cum rubore coquerebatur, & palpebræ non solum inflatæ, sed inflammatæ, rubedine affectæ conspiciebantur, optimo victus ordine instituto post ventris lenitionem



huic venacephalica in brachio è directo oculi affecti secta fuit: postea etiam cucurbitulas cum scarificatione in parte colli qua jungitur cranio, appositæ fuere: etiam sanguisugæ post aures applicatæ, & medulla panis, simul & pomorum dulcium, cum lacte muliebri & aqua rosa. macerata oculo imposita sunt, atque ovi albumen concussum cum collyrio alb. *Rhasis* quod opium recipiebat, instillatum, pillulas quoque lucis devoravit, & à dolore liberata est. Alteram quoque, cum acerbè ab ophthalmia conflictaretur, pomum coctum cum aqua rosarum & lacte muliebri mixtum cum oculo continuò apposuissimus; deinde collyrium *Rhasis* album cum aqua ros. solutum instillassemus, tandem ab omni dolore liberavimus. *Id. obs. 5. l. 11.*

Cum tribus integris mensibus, nempe *Octobri Novembri & Decembri*, constitutis austrina permansisset, multæ inflammationes oculorum cum rubedine, & ophthalmiæ non veræ populariter grassatæ sunt. Omnibus fere purgationes profuere, postea & cucurbitulæ scapulis appositæ cum scarificatione, quibusdam verò propter pruritum & acres humores purgationibus tum cucurbitulis præcedentibus, collyria ex aq. albuminis ovorum cum aqua rosac. egregiè contulerunt. Sed hoc collyrium sequens præ aliis omnibus valdè commodum fuit.

℥. Ceruss. lotæ ℥j. amyli ℥vi. gummi tragac. sarcocoll. tut. præp. an. ℥℥. Camphoræ, opii, an. dr. i. aq. rosar. q. s. F. massa usui servanda, atque huius potio exigua dissolvebatur cum aqua ros. ubi usus postulabat, & collyrii instar pluma in oculum affectum stillabatur, præcedentibus tamen purgationibus, infiniti hoc solo remedio convaluere. *Petrus Forestus, obs. 4. lib. 11.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Ophthalmia.

**A**D fluxiones oculorum valet maximè crocus metallorum in hunc modum.  
℥. Croci metall. dr. i. aq. euphras. ℥iv. crocus tenuissime pulverizetur ut fiat pul-

vis impalpabilis, & misce cum prædicta aqua. Deinde corpore supino existente quater in die instillantur intra oculos quatuor guttæ tepidè. *Rodericus à Fonseca, tomo 1. consult. 1. Pro alia ophthalmia.*

Aq. ros. ℥vi. aloes lotæ, tutiæ præp. an. dr. i. M. F. collyrium, cum linteolo vel spongia foveantur oculi. *Rodericus à Fonseca tomo 2. consult. 55.*

℥. Aq. ros. plantag. an. ℥ii. troch. alb. *Rhasis* sine opio dr. i℥. tutiæ præp. ℥ii. sarcocoll. nutrit. ℥i. M. F. collyrium. Si dolor simul urgeat, addatur præscripto collyrio emulsio sem. papav. & mucago psyllii, & si adhuc non cedat dolor *Rhasis* collyrium cum opio usurpandum. *Jo. Zecchini conf. 69.*

Multis frustra tentatis remediis in patre meo ophthalmia detento, sequenti applicatione curatus fuit.

℥. Album. ovi, & cum aluminis frustro tandiu agitur, donec pultis consistentiam acquirat. Postea linteo subtili involvatur, & oculo clauso palpebræ imponatur sæpe renovando. *Petrus Borellus obs. 31. cent. 1.*

Rusticus quidam ophthalmia inveterata laborans, ex medici præscripto, victu refrigerante & aquæ potu longo tempore usus fuerat, sine ullo levamine, tandem ab alio rustico persuasus fuit, ut victum illum refrigerantem defereret, & meri potui indulgeret. Post assumptum primum meri cyatum, se oculis melius habere sensit, & intra paucos dies eodem potu continuato ab Ophthalmia prorsus liberatus est. Idem aliis duobus contigisse mihi relatum est, quod confirmat aphor. *Hippoc.* dolores oculorum interdum meri potione curari: quando scilicet ophthalmia fit à sanguine crasso & pituitoso oculorum tunicis impacto, qui meri usu liquatur; attenuatur & resolvitur. *Lazarus Riverius, observ. 25. centur. 3.*

Quidam laborabat à longo tempore inflammatione, quæ tum adnatam, tum utramq; palpebram occupabat; effectus non erat continuus, sed recurrens, post varia usurpata frustra remedia, tandem præscripti duo cauteria inter duas sca-



scapulas gestanda, nec non cucurbitulam utraque; amplectentem applicandam, urgente nimirum fluxione, quod cum præstidisset, sani omnino illius oculi evasere, non parum ad curationem contulit unguentum sequens, quo in initio usus fuit, purgato prius corpore, festaque vena.

24. Virid. ægris gr. xii. camphor. & lapid. calamin. an. ʒss. tutiæ præp. ʒss. butyr. rec. aq. ros. lot. ʒii. M. F. Unguentum. *Joh. Marsinus, observ. 7.*

Oculorum inflammationem & exinde exortos dolores nullo alio remediorum genere sedare potuit collega nuper noster inter primos existimandus, quam nivis globulo, quem in horto ambulans applicuit, irruentem enim ad carnem tunicam cruore frigore suo nix repellit, & eodem dolore mitigat. *Thomas Bartholinus, cap. 25. De Nivis usu.*

### SUBSECTIO TERTIA

#### Pro Ophthalmia.

**P**Uella quædam post Variolâs ophthalmia ex utraque oculo adeo laborabat, ut de visu periclitaretur. Multa ipsi, sed frustra, præscripta fuerunt remedia. Ego tandem cum Clarissimo D. Manlio Mediceæ facultatis in Academia Coloniensi Professore primario, ad consilium vocati, setaceum ipsi consulvimus, & applicavimus, cujus beneficio, & Divino favore, brevi curata fuit. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 41. exempl. 2. cent. 1.*

Legantur etiam duo insequentia exempla; ubi in oculorum Affectibus ulterius ostenditur setacei præstantia & summa utilitas.

Aqua aluminis destillata in alembico supra cineres, & oculo cum linteis ea madidis admota, inflammationem efficaciter temperat. *Crollius* & reliqui chymici miris laudibus efferunt sal saturni in aqua ros. dissolutum, cui etiam salis ammoniaci grana aliquot addunt, hujus formula talis esse potuerit.

24. Salis saturni gr. xii. sal. ammoniac. gr. iii. aqua ros. ʒiii. M. instillentur

in oculum manè & serò, in vulgari usu habetur aqua ex vitriolo albo, in hunc modum.

24. Vitriol. alb. ʒi. aq. ros. vel plantag. ʒiv. vitriolum pulveratum in aqua ad ignem dissolvatur, coletur aqua per linteum, & in oculos instilletur, si acrimonia sua nimum eos vellicet, additione aq. ros. vel plantag. ad libitum temperabitur, sequens minoris acrimoniæ particeps est, & magis resolvit.

24. Rad. ireos flor. & ros. rubr. an. ʒi. aq. ros. & plantag. an. ʒiii. bulliant lento igne ad tertias, colaturæ adde vitrioli albi pulver. gr. 8. vel F. collyrium.

Præstantissimum etiam & paucis notum ad discutiendas ophthalmias remedium paratur ex oleo, seu liquore, qui ex linteis accensis, & inter duas patinas suffocatis elicitur; cujus liquoris gutta una cum saliva pueri permiscetur, & pennæ apice oculis admovetur.

Aqua scænic. sola cum vino astringente permixta utiliter admovetur pro foru ad ruboris & inflammationis reliquias discutiendas & oculum roborandum, ovum etiam ad duritiem coctum, detracta testa, & per medium sectum, calidè oculo admotum ruboris reliquias absumat, forus ex decocto hyssopi soli ruboris reliquias etiam efficaciter discutit. Ad ophthalmias inveteratas aqua sequens magnæ est efficaciat.

24. Aloes opt. & tutiæ præp. an. ʒvi. sacch. albiss. ʒi. aq. ros. & vini albi non acidi, an. ʒvi. infund. in ampulla vitrea bene clausa ad solem per quadraginta dies, hujus aquæ non colatæ instillentur guttæ aliquot in oculum.

Vesicatoria quoque in hoc affectu utilissima sunt, tum posteriori parti cervicis, tum ponè aures admotæ, sed ante omnia statim ab initio vena secanda est, præmissoclystere, eaque è directo partis affectæ aperiendæ, sæpeque iteranda phlebotomia, donec sufficiens evacuatio & revulsio facta fuerit docetq; *Avicenna* in vera ophthalmia sanguinem mittendum esse usq; ad leipothyrmiam *Gal.* vero lib. De curat. per sang. missionem, refert historiam cujusdam œconomi, qui à gravissima ophthalmia liberatus est sanguine detractò, primum



ad ℥iij. deinde verò post quatuor horas ad ℥j. moderanda tamen est ista sanguinis missio, juxta temperamentum, ætatis, sexus, virium, & speciei ophthalmiæ rationem. *Lazar. River. prax. med. l. 2. c. 8.*

Vetula quædam in *Italia* oculos habens lippientes, lacrymantes & saniosos cum intenso dolore, prurigine, cum nullis remediis posset curari, tandem raso capiti emplastrum vesicatorium impositum est, quo præsidio perfectè curata fuit; ut ex arcanis *Gisberti Horstii* præceptoris mei *Roma* exaravi, si per venas extra calvariam descendat fluxio in oculos, post universalia remedia, cauterium aliqui in temporibus, vel post aures applicant, remedia, restringentia, & emplastra adstringentia supra tempora, & frontem apponunt, prius tamen corpore, & capite repurgatis. *Petrus Forestus, schol. observ. 12. l. 11.*

In ophthalmia, & plerisque oculorum affectibus secreta est aqua ex fl. cæruleis de chichor. quæ fit hoc modo, collige flores chichor. quando sol leonis principium obtinet, recentes in vitrum inde, illud replendo, etiam fortiter quantum fieri potest comprimendo, postea orificium diligenter claude subere, vel vesicula quintupla, & circumcirca applica farinam subactam, ex qua panis pinfitur, ita ut tres, vel quatuor digitos extet: tandem in clibano pinse instar alterius panis, sed tantum massa illa est super asserculum in clibano ponenda (ne rumpatur vitrum) & pro coctione fortiore relinque, donec panis eximantur, prospice tamen ut hæc massa bene cocta sit exime & exprime, & invenies flores in aquam rubentem & pinguisculum conversos, hanc destilla per alembicum ex B. (aqua hæc nisi destillata non servatur) & hac in affectibus oculorum tantum palpebras externè singulis diebus bis illine manè & serò, albugines, nubeculæ, ungues, suffusiones, caligo, imò ipsa cæcitas mirifice tolluntur. *Io. Hartmanus pract. Chymiatr. pag. 100.*

Aqua fragorum imprimis commendatur, quæ sic fit.

℥℥. Fragor. rec. ℥ix. sacch. alb. ℥iv. M. & per octo dies in B. aquæ tepentis macera; deinde in eodem balneo destillentur.

Oleum item flor. cyami, quod hoc modo parantur.

℥℥. Flor. cyam. carul. ante ortum solis collect. q. v. contundantur in mortario marmoreo. Indantur vitreo, quod bene obturetur, & ad salem per integrum mensem ponatur. Hinc sumatur vitrum, & obvolvatur fermento; ponatur in furnum pistorium, & cum panibus coquatur. Ita proveniet oleum seu liquor quidam, summum oculis à calidis fluxionibus & salsis humoribus auxilium. *Daniel Sennertus, pract. lib. 1. part. 3. sect. 2. cap. 12.*

Ad ruboris & inflammationis reliquias auferendas fofus frequens parari poterit.

℥℥. Fol. euphras. puleg. an. M. j. flor. camom. melilot. ros. rubr. & paleæ avenæ an. p. j. sem. fœnugræ. ℥iii. sem. fœnic. ℥j. F. decoctio, addendo sub finem, parum vini albi, qua foveantur oculi cum pannis lienis, vel sacculis prædictis simplicibus semiplenis. Vel.

℥℥. Vini albi ℥iij. aqu. rosar. ℥ss. tutiæ præp. ℥iii. cariophyll. pulv. ℥j. camphor. ℥ss. M. omnia in vase vitreo bene clauso, & agitentur per duas horas, ac Soli exponantur, per mensem integrum, ea cautione ut singulis diebus ante Solis occasum ab aere removeantur; nec illi unquam nisi à Sole illuminato exponantur. Huius aquæ per filtrum tractæ guttas ij. vel iij. in oculum instillentur hora somni, vel etiam hora una ante exitum è lecto, ruborem oculorum etiam inveteratum tollit, lacrymantes oculos, & fistulos siccant, omnem superfluum humiditatem circa membranas exteriores absumit, & visum acuit. Sequens etiam præstantissima est.

℥℥. Tritici M. ij. sal. triti M. j. Ponantur in vase cupreo, & affundatur vinum album ut materiæ supernatet altitudine duorum digitorum tranversorum. Tegatur vas & simul stent in umbra per sex aut septem dies, donec liquor colorem viridem acquirere incipiat, movendo plures in die cum spacula lignea. Liquor tandem effundatur per inclinationem, & coletur, si opus fuerit, per cartam emporeticam. Ejus gutta una instillerur in oculum. Ruborem discuti fluxionem arcet, oculos abstergit à maculis omnibusque sordibus, & visum acuit. Aliquan-



quando cum ophtalmia pertinacis sordes quam plurimæ puris instar in oculis colliguntur, quæ vix collyriis aliisque remediis curari possunt. Hoc casu maxime confert gossipium optimè carptum, aut digitis discerptum & ad prunas diligenter exsiccatum, ejus Pauca quantitate instar plumaceoli oculi contegantur, fascia superinducta. Manè gossipium auferitur dictis sordibus imbutum. Hoc remedio per plures noctes continuato morbus curatur qui aliis remediis non cesserat, & præcipue succedit in pueris & infantibus tali morbo laborantibus, *Lazarus Riverius, prax-med. lib. 2. cap. 8.*

### SECTIO DECIMA SEXTA.

#### *Pro Officulis & aliis rebus gutturi infixis eximendis.*

**Q**Uam periculosa sit mora in hac re factis constat; subito igitur adhibenda, ut quicquid gutturi infixum est quam primum extrahatur, ideoque statim oleum amygd. d. aut olivarum (cave tamen ne substituas butyrum) in œsophagum infundendum, deinde digito aut penna; aut simili aliquo instrumentum in os immisso vomitus provocandus: hic enim sæpius setum expellit quicquid gutturi inhæret, postea speculo oris lingua depressa (si officulum sese visui præbeat) rostro corvino incurvato apprehendendum atque extrahendum est; si verò profundius fuerit, nec rostro apprehendi possit, nonnulli spongiam novam avellanæ magnitudine, eamque compactam filo longo & forti alligatam & oleo amygd. d. inunctam ægro diglutiendam suadent, filum digitis tenente Chirurgo, fieri enim sic potest ut deglutita ægro spongia, secum simul in ventriculum depellat id quod gutturi inhærebat, aut retracta filo eadem simul nonnunquam extrahatur vomituvè rejiciatur, sed nihil præstantius aut aptius ad extrahenda officula, & spinas piscium è guttore, hoc sequenti instrumento, quo ego feliciter usus sum, tum aliàs, tum præcipue in quodam qui inter cœnandum officulum triangularis figuræ sed crassum deglutivit, hoc profundius œsophago in-

ter ultimam vertebra collis, & primam metaphrenis adeo insinuaret, ut id neque deglutire neque rejiceret posset, penè suffocatus ad me ducitur, ego oleum amygd. d. œsophago satis copiosè infundi, & undique exterius collum eodem oleo inunxi, postea jussi ut ei tenerentur manus & caput; ego interim depressa prius lingua speculo oris in instrumentum inferius describendum in gulam intromisi usque ad officulum, sensimque & modicè circumducto ex una in alteram partem instrumento, donec id paulatim ad latus officuli profundius depulverim, deinde retrahendo officulum simul suo loco amotum & extractum fuit, & brevi convaluit: descripto instrumenti est hæc, est fistula argentea aut ænea incurvata crassitie pennæ oloris, longitudine verò unius pedis cum dimidio aut circiter; est & undique perforata in sua extremitate habent spongiam novam avellanæ magnitudine firmiter alligatam: hac fistula in œsophagum immissa, & circumducta quemadmodum antea diximus, postea extracta, officulum aut quicquid simile fuerit extrahimus, si enim acidit ut foramen aliquot fistulæ officulum aut spinam excipiat; tum simul cum fistula extrahitur, sin minus asperitas ossis spongiæ adhærebit: & suo loco amovebitur; quod & ego experientia comprobavi, antequam haberem fistulam perforatam, non tamen officulum aut spinam prima vice, dum intromittimus fistulam extrahitur, nec propterea ab incepto opere desistendum: aliquoties enim quinque aut sexies fistulam intromittere coactus fui, donec tandem officulum suo loco amotum & extractum, vel (si aliter fieri non potuit) in ventriculum depulsum fuerit, quod & periculo vacat, præstat tamen per os extrahere si fieri possit, in hac operatione circumspicere agendum in instrumentum in asperam arteriam loco œsophagi immittatur, quod valde periculosum esset, itaque ut Chirurgus harum partium anatomicam sciat necesse est; incumbit autem œsophagus vertebri collis, aspera vero arteria anteriorem partem occupat, itaque quàm primum Chirurgus linguam speculo deprefferit, extremitatem instrumenti sui ubi spongia (quæ oleo



## SECTIO XVIII.

## De Ozana.

oleo oliv. vel amygd. d. prius inungen-  
da) alligata est, vertebri imponat, ac le-  
viter leniterque deorsum immittat, sic enim  
ratione spongiæ instrumento alligatæ epi-  
glotis (h. e. operculum laryngis) deprimi-  
tur, & aspera arteria clauditur, usque  
dum instrumentum immissum sit profun-  
dus, si in asperam arteriam quidpiam illa-  
psum fuerit, sternutatorium admo-  
vendum est naribus, & accidis & tussim pro-  
vocantibus, contra opinionem quorun-  
dam omnino abstinendum; tussis enim sua  
sponte satis accidit, acida verò, œsopha-  
gam & asperam arteriam coarctant, con-  
stringunt, & angustiora efficiunt, quapro-  
pter continuò ore teneat syrup. de liquir.  
de polytrich. & viol. aut (quod ego exper-  
tus sum) oleum amygdal. d. saccharo ad  
partes æquales commistum; post extra-  
ctionem ossis, guttur saepe abluendum est  
decocto hord. aut. aq. plantag. cum mel-  
le rosac. & diamorone, si dolor adsit, su-  
matter aut quater interdum cochl. j. olei  
amygd. d. exterius etiam inungendum  
est collum oleo rosac. & myrtino, ante-  
quam verò ego prædictum instrumen-  
tum ex *D. Gualtero Ryffio* ejus inventore  
mutuatus essem, cathetere quo utimur  
in affectibus vesicæ (cui spongiam annexi)  
cum successu usus sum: si catheter quo-  
que ad manus non fuerit, filo fereò non nihil  
incurvato spongiolam firmiter annecte &  
utere hæc in eum finem scribo, ne Chirur-  
gus propter penuriam instrumenti ope-  
rationem (quæ moram non admittit) pro-  
crastinet. *Guil. Fabricius Hildanus, ob-  
serv. 36. cent. 1.*

## SECTIO XVII.

## Pro Offis tutela.

**A** Bradendum est os si superficie tenus à  
natura sua degenerabit, ac ireos Pul-  
vis ossi imponendus: nihil enim æque  
ac solitarius hic pulvis solet os ab om-  
ni putredine tueri. *Ioh. Heurnius, ad-  
aphor. 69. sect. 7.*

**O**zæ (in *ἔξω* oleo) ulcus est narium  
vetustum putridum & graveolens,  
causa est humor acris, & interdum, ut  
in lue venerea, malignus, oritur etiam  
aliquando à suffumigis è mercurio & cin-  
nabrio incautè adhibitis: dignoscitur ex ef-  
fluente sanie & crustis deciditibus; labo-  
rans præterea non solum ipse sibi graveo-  
let, sed & astantibus tetri spiritus conta-  
gione molestus est.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Ozana.

**Q**uod si asini lotium naribus trahere  
placebit, minime damno: quod ar-  
canam vim contra narium foetorem habere  
sit à plerisque existimatum. *Hier. Mercur.  
tomo 1. consult. 69.*

In ulceribus narium post sufficientem  
deterisionem; nihil efficacius inveni suffu-  
migio, quod partes illas profundas attin-  
git & siccet, parandum autem ex potentissi-  
mè resiccantibus hoc modo.

℥. Ladan. puri hypocist. mastich. myr-  
rh. an. ℥iij. styrac. rubr. & calamit. cortic.  
thuris, sandarach. auripigmenti, an. ℥ij.  
excipiantur omnia terebinth. & fiant tro-  
chisci, quibus suffiatur æger serò & manè  
in cubiculò, optimum est etiam parare  
candelas ex cera rubra; nam fuligo talis  
candelæ plurimum juvat exsiccationes;  
maximè si contineatur in cubiculò, bene  
clauso & angusto, quod autem fuligo reci-  
piatur, experimur, cum diutius in stu-  
dio moram trahimus noctu, nam po-  
stea sputum & excrementa narium fuli-  
gine illa denigrata redduntur, hæc ra-  
tione nos ulcus curavimus, quod neque  
ab *Italis* neque à *Gallis* Medicis curari  
potuerat. *Guil. Rondeletius, practic. lib.  
1. cap. 65.*

Præstans est aqua viridis mihi usitata,  
quæ non tantum in Ozænis, sed in omni-  
bus ulceribus foetidis Narium, Palati, U-  
vulæ, Gingivarum, & Linguae mirificè  
valet. Estque talis.

℥. Mell. rosat. ℥ij. sulph. vivi, alum. cru-  
di,



di, ærug. aris, an. ℥i. albi græci, comar. fabina, an. ℥℥. sambuci ℥i. tol. hyperici, rorismar. rutæ, plantag. salu. puleg. an. M. ℥. hæc coq. in vini & aq. ℔ii. ad consumptionem unius digiti transversi (in Aphthis puerorum temperetur aqua tabacci & solani, an. secus acrior est) nota; ærugo æris non simul coquatur, sed in fine addatur, & relinduatur donec refrigerit, postea coletur & usui servetur: hujus cochleas calefiat supra candelam, postea cum penicillo eadem aqua intincto tangatur locus exulceratus: in fœtidis ulceribus palati, faucium uvulæ immittatur aqua hæc cum stupis: mirabiliter non tantum mundificat, sed insuper etiam consolidat imprimis ulcera palati & faucium ex lue venerea orta: mirabilis quoque est scorbuti oris. *Joh. Hartmannus, pract. Chimiatri. pag. 110.*

℥. Succi geranii, solani, sempervivi, an. part. aq. lythargyr. auri, plumbi usti, lap. calamin. ceruss. an. ℥ii. indantur in mortarium, affuso cochl. j. ol. rosac. & succi superioris alternatim probe agitando donec in unguentum coeat: sic habebis in Ozæna etiam malignitatem spirante, unguentum pretiosum, turundæ eo illitæ naribus indantur. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 22. cent. 2.*

Pro ozæna gravissima cum ossis palati erosionem. Præmissis purgatione & venæsectione, naribus sequens medicamentum cum siphone injeci, tum filamentis in eodem imbutis imposui.

℥. Sem. cydon. contus. ℥i. aq. plantag. ros. & ramar. an. ℥ii. Maneant in infuso per horas aliquot & in loco calido. Expressioni mucilaginosæ add. mellis ros. ℥i. pulv. corall. cornu cervi usti lap. calamin. tutiæ præp. nihili an. ℥i. M. Pro majore diversione catarrhi, fetaceum ad tertiam colli vertebra adhibui. Naso extrinsecus, ad humores repellendos partemque affectam corroborandam, de sequenti applicui decocto.

℥. Fol. & flor. beton. rosmar. ros. rubr. equiseti, plantag. summit. rubi, fol. salicis an. M. j. Coq. in vino rubro ad consumptionem tertiæ partis, colaturæ addatur modicum aceti. In hoc decocto lintamenta aliquoties reduplicata & madefacta applicentur, eaque sæpius ite-

rentur. Ab usu hujus decocti tumor nasi extrinsecus paulatim subsidit; ulceri verò palati sequens linimentum impositum.

℥. Rad. angelic. aristol. rot. irid. flor. cariophyllat. lign. guajac. an. ℥℥. cinnam. ℥ii. M. f. pulvis subtilissimus, cuius parum in vase vitreo misceatur cum melle rosac. & ulceri palati cum penicillo indatur. Officulum deinde per os excrevit, & post duos dies aliud magnum corrosivum & fœtidum per nares emunxit. Dehinc ulcus in palato indies auctum, interstitium quinetiam nasi penitus erosum ex quo in naso tanta cavitas relicta fuit, ut aliquando tredecim, imò usque ad quindecim turundas satis magna sequenti unguento illitas indere opus esset.

℥. Succi geranii, succi solani, sempervivi, an. part. aq. lithargyr. auri, plumbi usti, lap. calamin. ceruss. an. ℥ii. Indantur in mortarium; quibus primò cochleare plenum olei ros. affunde, & postquam aliquantum pistillo agitaveris omniaque probe commiscueris, cochleare plenum ex suprâ scriptis succis admisce; quibus item probe agitat & commixtis mox iterum affunde olei parum & agita. Idque sæmdiu alternatim & continuo agitando facito, donec ad ℥iv. ol. rosac. & tantundem præscriptorum succorum impenderis. Sic habebis unguentum pretiosum in ejusmodi ulceribus, quæ aliquid malignitatis sapiunt. *Fabricius Hildanus, cent. 2. observ. 22.*

Præmissis universalibus, sequentia usurpanda sunt.

℥. Hord. integr. p. i. fol. agrimon. plantag. absinth. & cent. min. an. M. i. ros. rubr. p. ℥. Coq. in aqua ferrata, in colat. dissolv. mell. ros. ℥iv. ferrum naribus frequenter attrahendum. Post aliquam deteriorationem, sequens decoctum in usum vocetur.

℥. Balauft. & cortic. granat. an. ℥ii. fol. plantag. caud. equin. pilosell. & herniar. an. M. i. rad. bistort. ℥i. alumin. crud. ℥i℥. f. dec. Aqua aluminosa ad idem etiam est efficax, ut & unguentum *Ægyptiacum* in aqua hordei dissolutum. Si hæc non sufficiant, abluatur ulcus aqua sublimata bis, ter quaterve in die: siccat enim, egre-



egregiè, & citra ullum morsum detergit, illius præparatio talis est.

℥. Aq. plantag. ℥iv. sublimati crudi pulv. gr. xii. Bulliant in phiala vitrea ad mediæ partis consumptionem. Potest augeri vel minui sublimati quantitas,

prout fortius vel debilius medicamentum efficere volueris. Ulcere probè deterfo, ad illius exsiccationem veniendum est, cui rei conferet pulvis ros. rubr. exsufflatus. *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 4. cap. 1.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER DECIMUS QUARTUS.

*De Affectibus à littera P incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

*Pro Palpebrarum scabie.*



Ramissa purgatione, & cucurbitulis cum scarificatione scapulis admotis, jussit ut aq. ros. aloë exigua immixta, collyrii instar, palpebras sæpius obliniret; si neque juvaret, ut myrrham cum lacte muliebri misceret, quo palpebra inungeret: sed & hoc linimento ad pruritus palpebrarum & ruborem commodè sæpè usi sumus.

℥. Cadmiæ lotæ in aq. ros. ℥ss. sang. drac. ℥ii. virid. æris ℥i. Aloes hepar. ℥iii. (fortè ℥iii) F. pulvis ut alkool. adde ol. communis ℥iii. laridi sine sale ℥ii. incorporarentur omnia: postea adde camphor. subtiliss. pulv. F. unguentum. Amicus quidam noster cum palpebras inferiores rubras & exulceratas haberet, sequens illi linimentum paravi ex unguento ros. pauca adjecta tutia præpar. quo, cum petiis lineis ad hoc aptatis appposito, unica nocte (quod mirabile fuit) ab illa molestia liberatus est. *Petrus Forestus, obs. 42. lib. 11. De morbis oculorum & palpebrarum.*

## SECTIO SECUNDA.

*De Panno.*

**P**Annus seu Zebel *Arabum*, ex excrescentia quadam supra adnatam tuni-

cam, non ita dura nec membranosa ut unguis, sed mollior & veluti quadam venularum textura sanguine turgentium: oritur a sanguine venulis adnatæ impactæ, eademque turgesciente, eandem ferè pterygio seu ungue curationem obtinet, & inter utrumque maxima intercedit affinitas: in hoc tamen differunt quod in pterygio excrescentia est membranosa, non totum oculum, sed partem ejus, unguis forma cooperiens, in panno verò totus obtegitur oculus.

## SUBSECTIO UNICA.

*Pro Panno.*

**A**ddam collyrium quo quidam fuit curatus à panno totam conjunctivam cooperiente cum carnositate satis crassa, ut aspectu abominabile idem malum fuerit.

℥. Lapid. hæmatit. ℥ij. vitrioli alb. virid. æris ustor an. ℥iij. myrrh. croci, an. ℥j. piper. long. ℥ss. sacch. cand. ℥ss. pulver. subtiliss. ut alkool & cribentur, ac pyxide ad usum reponantur, de isto pulv. ℥j. accipiat, & dissol. in ℥j. vel ℥ij. aq. raphan. & applicetur bis terve indie, prout æger tolerare possit ad momentum vel tempus exiguum, si remediis non curatur ad opus chirurgicam deveniendum est. *Petrus Forest. schol. obs. 61. 11.*



## SECTIO TERTIA.

hoc certum & indubitatum. *Petrus Forestus, obs. 28. & schol. lib. 17.*

*Pro Papillis absconditis & latentibus.*

**P**hialam vitream (ut *Amatus* jubet cent. 5.) oris non admodum latam circumferentiam habentem, ferventi aqua impleri jubemus; ac illicò ab ea aquam totam deponi, cujus phialæ sic calentis os ad papillam admovemus (mirum in modum attrahit) qua attractione papillæ formæ manent, quamvis hujus phialæ attractio prius dolorem pariat, facilè temen illum contemnunt mulieres, cum tantum inde juvamentum se consecutas videant. *Petrus Forestus, schol. observ. 25. lib. 57. De cordis & mamillarum affectibus.*

## SECTIO QUARTA.

*Pro Papillarum fissuris.*

**P**apillæ aliquando finduntur vel ulcerantur, ut puerperæ & nutrices pueros præingenti dolore sugere non permittant. Mulieris cujusdam papillarum fissuras habentis oleo lil. in quo pulvis tutiæ immixtus esset, papillæ inunctæ sunt, insperso deinde pulvere tutiæ exiguo, & superimposito folio viol. viridi, ne camisia adhereret; quibus præsidiiis sana facta est, uxori fratris mei axungia canina inuncta sola profuit, & anno sequenti etiam pomatum album: sed in alia usus sum fœliciter unguento ex pulv. tutiæ lotæ in aq. ros. & unguento rosac. simul mixtis. Quidam solo saccharo papillis insperso uxorem suam curavit superimposita argentea capsula ad papillæ formam elevata ne camisia adhereret, saccharum enim vim abstergendæ & mundificandæ habet; ideo ulcera levia ac vulnera minuta nequaquam effatu digna, curat; hic etiam vulnera in manu leviter cultello incisa solo sacch. insperso curabat. *Amatus* ad papillarum dolores & fissuras hoc unguentum commendat. cent. 6. curat. 38.

24. Unguenti popul. unguenti de plumbo an. ʒj. opii thebaic, gr. v. M. F. unguentum, & eo inunge papillas: quas cum puero lac dare voluerit mulier vino diluto lavet, & postea iteret: est sanè remedium

## SECTIO QUINTA.

*De Paralyse.*

*Παράλυσις* (ἀπαρλύσθαι, i. e. resolvi) est motus & quandoque sensus in parte una vel pluribus abolitio, ob denegatum spirituum animalium influxum, causæ sunt illæ omnes: quæ spirituum influxum in nervos musculosos impedire possunt; ut sunt humores pituitosi, & etiam biliosi, vapores item narcotici, ut in paralysi scorbutica & in aurifabris & speculorum artificibus, à contactu hydrargyri: præcisio etiam nervorum, luxatio vertebræ & aliorum articulorum, nervos comprimendo paralysin inducere solent: causæ procatacticae sunt aeris & aquæ frigus, medicamenta & vina narcotica, somnus in loco humido, vel ædibus calce recens obductis, mora sub radiis lune, crapula & ebrietas, venus nimia, casus ab alto, capitis vel cervicis percussio: alia est quæ omnes, excepto capite, partes obsidet, & *παραπληγία* dicitur, alia rursus dimidium duntaxat corporis, & *ημιπληγία* nominatur: alia denique unicam tantum partem occupat paralisis particularis dicta: ad partem affectam dignoscendam, requiritur anatomica nervorum cognitio.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Paralyse.*

**F**Amulo *Zythepse* alioqui seni ex debili apoplexia paralytico hæc sequentia adhibuimus remedia: imprimis cum sanguinis copia cum multa pituita commisceretur, & facies rubicunda esset viribus utcunque constantibus ex brachio dextro sano (nam sinistrum & crus paralysi affectum erat) minutionem sanguinis moderatam fieri iussimus, ne corpus calore destitueretur. Nullum enim aptius est remedium circa principium teste *Ætio*, si nihil sit quod prohibeat, quàm venæ sectio à partibus sanioribus; sed moderata, ut idem consulit,



ne refrigerentur ægri: ubi verò paralyſis ſenſim genita eſt, & jam dudum facta venæſectio non ita convenit: deinde clyſtere immiſſo, humorem infeſtum decocto ſequenti concoximus.

℥℥. Fol. hyſſopi, ſalviæ majoran. herbæ paralyſis, ivæ arteticæ fol. lauri, an. M. j. F. omnium decoctio, in colat ſibi. adde ſyrup. de præſſio, hyſſopi, è ſtæchade an. ℥i. M. pro tribus doſibus matutinis interea juſſi, ut hoc melicrato uteretur ad aliquot dies loco cereviſiæ: pro potu.

℥℥. Hyſſop. M. iv. ſalv. roriſmar. an. M. ii. coq. in aqu. pro ſibiſ. addatur mellis q. ſ. F. melicratum pro potu: mox exundantiam materiæ minuebam his pilulis.

℥℥. Pilul. hier. alephang. agar. troch. an. ℥i. cum aq. ſalviæ, F. pilul. v. Hic autem & caſſiam, & mannam, ſerum lactis, & ſyrup. ex infuſ. roſ. ut pote minus efficacia fugere oportet, quamvis non debeamus ſtatim uti validis ad motum purgantibus medicamentis in principio, poſtea hæc pilulas præſcripſi.

℥℥. Pil. ſœtid. coch. an. ℥i. turbith. el. & caſtor. an. ℥ſſ. troch. alhand. gr. ii. cum aqu. ſalv. F. pil. vii. Sumantur ſub ingreſſum lecti. Corpore prius ſatis repurgato, deinde, iis quæ à capite propriè materiæ deducunt uſus ſum ſic.

℥℥. Nuc. moſch. pyrethr. pip. alb. an. ℥i. hyſſopi ℥ſſ. uvar. paſſ. ℥i. cum melle adiecta maſtiche. F. paſtilli manſiles, ſeu maſticatorium & ſuccis betæ, majoran. rutæ, braſſicæ; cum melle deſpumato naribus attractis, fiebant errhina. Poſtea utebar conditis ex rad. acori, præon. conſerv. anth. ſalviæ, mithridatio, theriaca, diamoſcho, & diacaſtoreo valde exiguo, adiectis. Sumat etiam in diluculo theriac. ℥i. cum vino ad ſudorem eliciendum. Ultimo ad topica veniendo, nucham & membra paralytica, prius confricta panno aſpero unguento aregon. marriat. oleo coſtino, nardino, & felino inungere mandavimus, ita conficitur oleum felinum.

℥℥. Præpinguem ſelem in culina ſaginatum, quem detracta pelle exenterato & projectis interaneis, capiteque truncato totam noctem in aqua vitæ merſum

ſinito, manè totam cavitatem foliis laurinis, ſalv. ruta; lavendula, roremarino, infarcito: in ipſam præterea carnem larium deſigito, inſertis quoque affatim cariophyllis; in veru lento igne torreto, quod deſtillat pro commodiſſimo linimento uſurpamus; & membrum affectum deinde diligenter pellibus vulpinis aut felinis involuimus, hiſce remediis tum hic tum alii multi convaluere; etiam in quibuſdam paralyticis commodè utens dec. guajaci, adiectis herbis nervos roborantibus, ut eſt herba paralyſis, ivæ arthetica, betonica, lavendula, roſmarinus: nonnulli jubentes, ubi alia remedia non ſatis conferunt, ut thermas ſulphureas, aut aluminofas accederent. *Auguſtus* (attellante *Svetonio*) quoties nervorum cauſa marinis. Albuliſque calidis utendum eſſet, contentus hoc erat, ut inſidens lineo folio manus ac pedes alternatim jactaret. Solium adornetur ex decocto vulpis vivæ, ſulph. ſalis, ſalviæ, ebuli, menthæ, artemiſiæ, lauri, & ſimilibus. Vulpes viva aut mortua in decocta; diſcutiendi vim oleo conciliat, adeo ut humores alte fixos in cutem extrahat. Nos caniculos vivos in oleo aliquando in partes diſcuſſos decoximus, & ad paralyticum, poſt univerſalia remedia utiliter uſi ſumus. *Petrus Foreſtus, obſerv. 82. lib. 10. De Cerebri Morbis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Paralyſi.

**P**Ræmiſſis univerſalibus, ad ſudoris provocationem utatur decocto rad. bardanæ ſudorem enim egregie novet. *Bettus*, cum agerem *Bononia* in *Italia*, hæc ſequenti inunção in paralyticis commodè utebatur.

℥℥. Lumbric. terreſtr. lotor. in aqua (melius in aqu. vitæ) & in furno exſiccator. & pulverizat. ſibi. pulv. zinzib. galang. an. ℥ſſ. confice cum oleo lil. vel coſtino. Eſt mirabile per eundem expertum. *Petrus Foreſtus, obſerv. 82. lib. 10.*

Poſt univerſalia remedia alienum non erit membra affecta inungere cum pinguedine ex catellis ruſis ad offium ſeparatio-



tionem coctis in aqua collecta poſt refrigerationem: ea enim pingued. ne foelicifſime uſus ſum in Præcetore *Leidano*, qui ex colico dolore inciderat in reſolutionem pedum. Valet etiam decoctum ligni & ſaſſaparillæ, quo nos etiam foeliciter uſi ſumus in Mercatore. *Idem Schol. obſ. 85. lib. 10.*

24. Pulv. pyreth. ʒi. bulliant cum ſbi. olei oliv. ad tertię partis conſumptionem. Cum iſto oleo calido laſa membra quater aut ſaltem ter in die ungatur: magnificè conſert.

24. Rad. pœon hermodactyl. artanitæ, rutæ, an. ʒi. coq. in duabus ſitulis aq. marinæ ad conſumptionem tertię partis: ut fiat ſotus quo benè calido cum ſpongia foveantur partes ſtupidæ ante unctiorem. *Bortholomæus Montagnana, conſ. 48.*

Frequens illinitio facta ſuper membrum affectum cum theriaca diateſſaron eſt de meis expertis. *Barthol. Montagnana, conſ. 244.*

Pro paralyſi trium digitorum manus ſiant inunctiones in cervice ex oleo terebinth. bis in die manè & ſerò, & iſdem utatur ad digittos læſos. *Rodericus à Fonſeca, tomo 1. conſul. 82.*

Inungantur partes: affectæ per menſem unguento de bdellio quo nullum præſtantiuſ aliud pro hac complenda operatione conperitur, ita ſit.

24. Bdell. ʒvi. Euphorb. ʒß. Caſtor. ʒ. iii. Sagapeni ʒß. Ceræ ʒxv. Oleo Sambuc. ʒx. Bdellium & ſagapenum diſſolvantur in aq. rutæ agreſt. deinde addantur cætera, & fiat unguentum S. A. *Amat. Luſitanus, cur. 22. cent. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Paralyſi.

**S**acrificus quidam ſeptuagenarius ſenex optimi habitus & magnarum virium, ſed vino generoſo nimium ſe implere ſolitus derepente ſub noctis medium cum oris tortura in dextræ partis reſolutionem incidit, cruræ dextro; ac itidem brachio reſolutis, ad hunc vocatus, ſtatim hunc clyſterem injiciendum curavi.

24. Fol. malv. biſmalv. viol. bliti mercurial. branc. urſin. an. M. i. fol. hyſſop. cent. min. & ſalv. an. Mß. agar. in petia rara ligati ʒiii. ſem. anif. aneth. carvi, rutæ, an ʒii. Polipod. q. conquaſſ. ʒi. flor. ſtach. & anthos, an. p. i. furfur. macri, p. ii. F. omnium decoctio in colat. ſbi. diſſolv. catholic. ʒi. elect. Indi maj. ʒß. ol. rutæ & aneth. an. ʒii. mell. anthos ʒi. ſalis gemm. ʒii. M. F. clyſter: quo injecto, mira aquoſæ & ſpumofę pituitę copia educatæſt: tum verò ipſo die, poſt duas ab accepto clyſtere horas, è media ſiniſtri brachii vena ſanguinem ad revulſionem detraho, idque moderatè ad ʒiv. tantum: (erat enim licet ſenex, ſanguine plenus) miſſo ſanguine & uno die ægro quieſcere juſſo, altero poſt die pilulas has leves devorandas propino.

24. Pilul. aſajeret & cocciar. an. ʒß. agar. troch. ʒi. maſtich. diagrid. an gr. j. M. & cum aq. ſalv. F. pilul. vii. capiat tribus hor. poſt levem cœnam. Poſtea ſequens apoze- ma nervos calefaciens & pituitam attenuans ſumere juſſi, octo totis continuatis diebus, & mox à ſyrupo elect. diamoſchi tabel- lam devorandam dabam.

24. Rad. pœon. maris ʒi. rad. acori veri, galang. enulæ camp. an. ʒß. ſummitat. hyſſop. ſalv. majoran. prim. veris, chamædr. chamæpit. an. M. ß. cubeb. & ſeſel an. ʒii. bacc. juniperi ʒiii. liquirit. raf. & con- tuſ. ʒß. raf. lign. ſanct. ʒiv. infund. rad. & lignum in aq. & vino albo & ſenſim lento igne decoq. Poſtea additis herbis & ſenibus. F. decoctio, addendo in fine flor. ſalv. ſtachad. anthos & bugl. an. p. i. colat. add. ſyrup. capill. veneris, mell. roſat. mell. anthos, an. ʒiv. ſacch. q. ſ. ut fiat ſyrupus clarificatus & aromatizatus cum cinnam. el. ʒiii. nuc. moſch. ʒiß. pro quatuor aut ſex matutinis. Syrupus hic ſudorem movebat, quem ego naturæ motum adjuvans, ſtragulis bene cooperto ægro promovebam. Finito ſyrupo, & cocti- one jam in lotio apparente, pilulas ſequentes dedi.

24. pil. coch. & foetid. an. ʒii troch. al- hand. & maſtich. an. gr. ij. cum aq. ſalviæ, F. pil. ix. in craſtinum pilul. quæ foeliciter operatæ ſunt conſervam anthos cum mithridatio in aurora dedi, quinque poſt ho-



horis agro abstinere juffo. Poſtea opiata-  
talem confeci, qua alternis diebus uteba-  
tur ad quantitatem caſtanæ magnæ, aqua  
ſalviæ deſuper epota.

24. Conſerv. anth. & ſtechad. an. ʒiſſ.  
Conſerv. acori ʒi. Conſ. ſalviæ ʒß. Zinzib.  
conquaff. ʒiii. pulver. diamoſch. d. ʒi. mi-  
thrid. el. ʒii. pulv. nuc. moſch. ʒi. ſemin.  
pœoniæ & gran. juniperi, ana ʒii. cere-  
bri leporin. aſſati ʒi. M. & cum oxymel.  
ſcillit. F. in modum opiatæ capiat ut di-  
ctum. Mirificè ſe ab hac juvari æger. teſta-  
batur, quod, ut affirmabat, calorem in-  
fundi membris jucundum ab hoc medica-  
mento ſentiebat, à quo maximè juvabatur.  
Ad topica deindè me converti, ubi prius  
errhiais uti ægrum juffi ex decocto ſampſu-  
chi & betæ nigræ cum agarico, & momen-  
to gingiberis; addita in colatura ſucci ana-  
gallidis flore purpureo ʒi. primùm loca affe-  
cta & nervorum radices circa dorſi ſpinam  
inungi juffi ſequentibus oleis, ut à leviori-  
bus inchoarem, ut fieri ſanè debet.

24. Ol. chamam. lil. albor. an. ʒii. ol.  
cheirini & laurini, an. ʒi. M. inungatur iis  
calidè tota dorſi ſpina, Deinde hac effica-  
ciore uſus ſum unctiōe, cujus uſu plenè  
fuit hic vir Dei adjuutorio liberatus.

24. Salv. majoranæ, lauri, beton. ro-  
riſmar. primul. veris, an. M. i. rad. acori  
veri, ireos rec. an. ʒiii. ol. vulpin. de nuce  
indica, & rutac. an. ʒbi. ol. terebinth. ʒß.  
vini potentiffimi ʒbi. aq. vitæ ʒß. coq. ſimul  
ad vini conſumptionem & colentur; colar.  
adde ſagapeni, opoponac. bdell. an. ʒii.  
Caſtor. ʒß. macis, nuc. moſch. ſtyr. ca-  
lam. benjoin. an. ʒiii. piper. long. pyrethr.  
an. ʒi. axungia cati pinguioris, axungia  
ſerpentis, anſer. an. ʒi. propol. ceræ ʒ.  
ii. medull. cruris vaccæ ʒii. ſuccor. ebuli,  
ſalv. & meliſſ. an. ʒiv. M. & cum cera q. ſ.  
in præſatis olei liquata reducantur omnia  
ad formam unguenti mediocris conſiſten-  
tiæ, quo univerſam dorſi ſpinam inungi  
calidè jubebam; deſuper admotis lanis  
mollibus fumigatis ſequenti ſuffitu ad ex-  
ſiccandum.

24. Thur. maſtich. gummi juniperi, an.  
ʒiſſ. gummi hederæ & nigellæ torrefa-  
ctor. an. ʒi. Benjoin. ſtyrac. cal. an. ʒß.  
Coriandr. macis nuc. moſch. an. ʒi. flor.  
anth. ſtechad. an. p. i. ſuffimigium omni-

bus groſſo modo cōtufis quo lanæ pluri-  
mum ſuffiantur, & calidè ſpinæ admovean-  
tur poſt unctiōem: ab hac unctiōe mo-  
tum brachio & cruri affectis reſtitutum fu-  
iſſe inducta ſanitas fidem indubiam fecit.  
Mox enim ubi dies totos viginti unctiōe u-  
ſus fuiſſet, aſſumptis interea uſualibus pilu-  
lis, & confectione ſupraſcripta, optimaque  
victus ratione ſervata, integre valetudini,  
recuperato ſenſu, & motu reſtitutus eſt;  
quod ego proſectò pro miraculo habeo,  
cum ſit ægritudo ipſa ſuapte natura ferme  
incurabilis, & fuerit æger ſeptuagenarius:  
quod ergo in tanta ætate convaluerit à tan-  
to morbo æger hic, id Dei immenſæ po-  
tentix adſcribendum; qui ſit benedictus in  
ſecula. *Franciſcus Valeriola, obſerv. 4.  
lib. 4.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Paralyſi.

**P**Ræmiſſis præmittendis, cervix & arti-  
culi brachiorum quotidie calidè inun-  
gantur ſequenti ungueuto.

24. Unguenti martiati aregon. an. ʒi. ol.  
vulpin. de piper de euphorb. an. ʒß. pin-  
gued. lepooris ʒi. vini malvatici ʒii. M. co-  
que ad vini conſumptionem, ac fiat ungu-  
entum. *Abraham Seilerus, conſil. 6. con-  
ſil. Cratonis & aliorum à Scholizio edito-  
rum.*

Recens quidam ſcriptor vehementem  
iracundiam paralytico ſalutem aliquan-  
do attuliſſe ſcribit; quod de *Tito Veſpeſiani*  
filio memoriæ proditum eſt. Valde nocet  
gravis & attenta cogitatio, animique tri-  
ſtitia. Utilis eſt vomitus, qui hoc modo  
provocetur, perforetur raphanus, in cu-  
jus foraminibus inferantur fruſtella hel-  
lebori albi; ac ſic ſub terra deſoſſus, la-  
teat dies aliquot; deinde abjiciatur helle-  
borus, lavetur, contundatur, ac de ſuc-  
co ſumat ægrotus. Unus è præcticis poſt  
evacuationes ſtuſas ſiccas adhibendas ſua-  
det, poſt quas theriacam dari jubet, idque  
compluribus diebus. Alius quod mihi qui-  
dem maximè ad rem facere videtur, conſu-  
lit, ut à ſtuſa exeunti collum fricetur, nec  
non ſpinalis medula, vel iridis radice recen-  
ti atque incifa, vel capà lilii, donec pars



ea fricando rubefcat, deinde verò longa ſpongia ſoveatur. Spongia autem in decoctum ſequens infundatur.

24. Fl. chamæm. ivæ, ſalv. ſtæchad. majoran. herb. paralyſ. calament. an. M. i. vini alb. lbiv. aceti acerrimi lbj. bulliant, hæc fomentatio bis in die fieri poteſt pro egrotantis viribus; poſt ſpinæ fomentationem inungatur eadem ſpina ſequenti unguento.

24. Ol. euphorb. de piper. vulpini, an. ʒi. maſt. ſabin. nunc. cupreſſ. an. ʒi. cere, q. ſ. quo etiam unguento leſæ partes inungi poſſunt; etſi enim *Gal.* ceterique Medici ſcribunt remedia læſis partibus non eſſe admovenda; ſed eo unde oriuntur nervi; mihi tamen videtur ſic illud accipiendum ut præcipuè adhibeatur remedia nervorum origini; Sed iidem non negant, non nullius eſſe utilitatis, ſi læſis etiam membris applicentur, præſertim cum peccantes humores latè ſeſe fuderunt, atque in concava nervorum influxerunt: itaque eos reſolvere oportet. Aliis probatur unctio viperæ, quæ ego quidem plurimùm ſido, ſi tamen fiat ſequenti modò. Viperæ caput & cauda ſimul amputentur; quæ mox in ollam variè pertuſam mittatur, olla verò ipſa in aliam ollam integram inferatur quæ luto circumquaque obducta, ita accuratè contegatur, ut nihil inde exhalet, moxque in vas æneum aqua plenum indatur, deinde 3. horis bulliat. Unguentum quod inde integram ollam ſtillat, ad ſanandum Paralyſin valet, ſi eo & ſpina & relaxatæ partes inungantur. Sudoris provocatio hic magno eſſe uſui videtur: excitetur ſyrupo *S. Ambroſis* qui nervos & univerſum corpus magna vi, largoque ſudores, peccantibus levat humoribus. Hunc ego multis ſæpè exhibui, ubi videlicet nec ſarſaparilla, nec China, neque lignum ſanctum ſudorem ullo modo provocare potuerunt: hoc verò uno remedio tam largè ſudarunt planè ut convaluerint; quod mihi quidem accidit, qui Præſato cuidam curiæ *Romane*, viginti quinque dies bis in die ſarſamparillam cum exhibuiſſem, nec alio quovis modo ſudorem elicere poſſem, hoc demum ſyrupo tantum ſudoris emanavit, malum ut omne evanuerit. Sumatur igitur

*Burnet Part. I.*

miliū, quod probe purgatum ac decortiatum, primo videlicet involuero depoſito, deinde in ollacum aq. ſq. bulliat, quoad coquendo tumefcat & crepet. Poſtea ʒvii. vel ʒviii. hujus decocti ſumantur, & cum ʒiii. vel iv. vin. græc. miſceantur ut fiat potio: quam calidam totam ſumat egrotus in aurora, mox probè undique tegatur, ac ſudorem expectet; idque octo decemve aut amplius etiam diebus, ſi res poſtulat frequenteretur. *Ioann. Crato. conſil. 50. lib. 6. pag. 204.*

Unguentum ad Paralyſin optimum.

24. Serpentem unum ruſum, & plures etiam ſi vis, & abſciſſis capite & cauda ſpatio quatuor digitorum, reliquum, abjectis interioribus, ponatur in olla in fundo perforata, ſub qua jaceat alia olla ſana, quæ fundum ollæ ſuperioris in ſe contineat & in orificio ſigilletur bene cum luto ſapientiæ, vel cum paſta, ne reſpire poſſit, ne aliud in iis intrare poſſit. Et ſic præparata illa olla ponatur in caldario pleno aqua, cujus calore caleſcant ollæ, & reſolvatur pinguedo à ſerpentibus, quæ per foramen ollæ perforatæ in ſanam deſtillabit: nec conſumetur propter humiditatem aquæ. Et de tali pinguedine, addito ſucco rad. cappar. & centaureæ fac unguentum. Ipſa etiam centaurea cum vino & oleo cocta & membris paralyticis cataplaſmata multum prodeſt. *Arnoldus de Villanova. Prax lib. 1. c. 24.*

In Paralyſi præmiſſis præmittendis, non utere pinguibus unguentis, oleis, emplaſtris. Hæc enim omnia poros cutis obturant & ſic maximè neceſſaria tranſpirato impeditur. Sed præſtat uti fomentis, lotionibus, ſuffitibus &c. ex herbis appropriatis; v. g. roremarino, lavendula, flor. paralyſ. majoran. hyſſop. ſalvia, pœonia, betonica. Hæc omnia vino infundenda eſſe *Senertus* ait, ut ad nervos faciliùs vis medicamentorum deferatur: eſt enim vinum vehiculi loco. Contrarium ſentire videtur *Guil. Fabritius*, quòd vinum nervis inimicum ſit. Conciliantur ambæ ſententiæ, ſi dixeris. Nervis vulneratis extrà vinum nocere, reſolutis verò neque extrà neque intrà, ſi modicè bibatur. *Wolfgangus Hæſerus, Herc. Med. lib. 1. cap. 2.*

Vir quidam nobilis in utriuſque brachii,



## SUBSECTIO SEXTA.

## Pro Paralyſi leviori.

**V**ictus ita inſtituatur, ut calefaciat me-  
diocriter, ſiccet, leviter incidat,  
attenuet & detergeat: itaque abſtinendum  
ab herbis & omnibus cibis humidis, flatu-  
lentis, fructuum raparumque eſu: item  
à cibis lentis & viſcidis, ut ſunt excremen-  
ta animalium, lactes, inteſtina, capita.  
Utilis eſt caro vervecina mediocriter ſalita  
aſſa potius quam elixa. Carnes aſſandæ  
conſigantur cariophyllis, cinnamom. cor-  
tic. arantior. roremarino, ſalvia, hyſſopo,  
majorana, ruta, & ſimilibus; quibus et-  
iam elixæ condiri poſſunt: Columbas &  
maximè ſylveſtres in id genus affectibus  
prodeſſe ſingulari experimento compere-  
runt Medici. Piſcium uſus ſit rarior, ut  
& vini, nam in hoc affectu ſuſpectum eſt.  
Potus ſit hydromel hoc modo paratum.

℥. Aq. puriſſ. menſ. xxvi. mellis puriſ-  
menſ. iſſ. coq. lento igne & deſpuma conti-  
nuo, ubi deſpumata fuerit, & reducta co-  
ctione ad menſ. circiter xx. tum adde, rad.  
ireos, flor. vel enulæ ℥ii. lupul. M. ii. ubi  
colata ferè refrigerit, addendum & immiſ-  
cendum facis cereviſ. aliquid, ita deſæca-  
bitur fermentata, & facè cereviſiæ, ſed gra-  
tum ſaporem repræſentabit. Veſperi inſ-  
pergatur tantillum pulviſculi carioph. ſin-  
cipiti inter capillos ad futuram coronalem.  
Si timetur cariophyll. caliditas, contuſi  
prius craſſè mergantur in aq. roſac. & de-  
inde exſiccati pulverizentur, atque iſtius  
pulveris ſit uſus, manè exerceatur caput  
pectine eburneo, vel quod melius eſt, ex  
guajaci ligno facto; atque inde linteiſ ſiccis  
quidem non admodum calentibus fricetur  
& tergeatur caput. Conducet etiam, ut  
ſingulis ſeptimanis, aut ſaltem diebus qua-  
tuordecim, paucis diebus ante plenilunium  
& novilunium deglutiantur poſt primum  
ſomnum xi. pilulæ ex hac ſubſcri-  
ptæ. Viſcular. maſſa, quæ Div. bene  
Sunt iſtæ in hoc affectu aptiſſimæ,  
ne incommodi aſſumi poterunt.

℥. Pil. de hiera, ℥iii. pil. ſine quibus a-  
gar. rec. troch. an. ℥i. Caſtor. gr. ix. cum  
melle roſac. F. maſſa mollis, & ex qualibet  
℥. pilulæ num. 9.

Utatur

chi, manum digitorum pedumque Para-  
lyſin incurrit. Ad quem accerſitus, obſer-  
vo mala hæc ex nimia provenire repletionem.  
Rationem curandi hanc brevem inſtituo.  
Primo die exhibeo aq. benedictæ ℥i. cui tan-  
tundem admiſceo aquæ fontanæ. Hæc po-  
tio multabilioſa & pituitoſa ore expulit.  
Tertio die extracti eſulæ ℥i. juris piſorum  
℥iv. Mixtum, percolatum & expreſſum e-  
bibit jejunus, recteque purgatus fuit. Quinto  
die uſus eſt, meo conſilio, decocto ſar-  
ſæ in hunc modum parato.

℥. Rad. ſarſæ ℥i. Infund. per viginti qua-  
tuor horas in aq. & vini an. iſſiſ. poſtea ſ de-  
coctio ad medias. Ex hoc manè ſumpſit in  
lecto ℥vii. calidè, & ſtragulis contextus diu  
multumque ſudavit. Poſt hanc ſufficientem  
& optimè convenientem ſudationem,  
baſilicam venam aperui magno cum ſuc-  
ceſſu. Viſtuserat ſiccans & moderatè ca-  
lefaciens. Cæpit autem ex his omnibus re-  
ctè valere, & omnium partium motus in-  
tegroſ recipere. *Martinus Rulandus, cent.  
1. curat. 3.*

## SUBSECTIO QUINTA.

## Pro Paralyſi.

**Q**uidam habent pro ſecreto illinire  
membra affecta pinguedine quæ de-  
cidit ab anſere maſculo antiquo in veru co-  
cto, in cujus ventre prius bdellium, gal-  
banum, opoponax, ammoniacum, & ca-  
ro vulpis fuerint conſumpta: quinimò e-  
go ſinapiſmis aliquando ſœlici cum ſucceſ-  
ſu uſus ſum. *Jul. Caſar. Claudinus, conſ. 70.*

Pelles vulpinæ calcem non expertæ, &  
pulvere nucis moſch. cardam. & ivæ, in aq.  
ardenti prius maceratur, deinde in umbra  
exſiccator. ſuiſ ſumigatæ ac applicatæ ſunt  
maximi uſus. Ad capitis alterationem hæc  
extruſecus adhibita mihi probantur, pri-  
mum eſt cucupha duplicata floribus capi-  
libus, ligno Aloes, nuce moſch. & ſimili-  
bus reſerta. Alterum eſt lotio facta cum li-  
xivio parato ex cinere juniperi & decoctione  
herb. capitalium ſampſuchi & cariopyl-  
lorum. *Jul. Caſar Claudinus, conſ. 135.*



Utatur hoc pulvere ad ℥i. quantita-  
tem in vini vel juscul. modico, vel aq.  
Card. bened. vel intingatur; morsellus  
panis assus vino, atque insperso illo pul-  
vere edatur manè.

℥. Sem. pœon. coriandr. præp. nuc.  
mosch. visci q. an. ℥ss. Galang. cubeb.  
rad. tormentill. an. ℥ss. piper. long. sem.  
erucæ, zinzib. alb. an. ℥i. summitat. ro-  
rismar. ℥ii. sacch. albi ss. dr. iii. m. F. pul-  
vis subtiliss. Potest aliquando sumi ves-  
peri à cœna quantum tribus digitis con-  
tinere poterit æger; ubi hujus pulveris  
fastidium obrepit; utatur hoc electua-  
rio singulis matutinis ad quantitatem  
nucis juglandis, quod & gratus est, &  
minus calidum & siccat.

℥. Conserv. flor. anthos ℥ss. Conf.  
flor. bugl. ℥i. Cortic. citri vel arantior.  
condit. rad. eryng. condit. zinzib. in In-  
dia condit. an. ℥i. rad. cichor. condit.  
℥x. sem. eruc. piper. long. an. ℥ss. spec.  
diambr. ℥ss. cum syrup. conservatarum  
nucum myristicarum. M. F. Electuarium.  
*Reinerus Solenander, consil. 13. sect. 2.*

Primo loco veniat usus pilul. à *Mat-  
thiolo* consignatarum, quas ego in hoc  
affectu & in ipsa vera Paralyti, si mo-  
do longus & continuus earum sit usus,  
in multis agris magno juvamento sum  
expertus: Compositio autem hæc est.

℥. Chamæpit. flor. beton. flor. stæchad.  
rec. flor. primul. veris, an. dr. i. agar. rec.  
troch. ℥ii. turbinth. gummos. ℥ss. rhei opt.  
aq. cinnam. irrorandi ℥i. troch. alhand. ℥ss.  
diagrid. ℥i. zinzib. alb. sal. gemm. an. gr.  
viii. spic. indic. gr. vi. pulv. hier. simpl. ℥ss.  
cum succo chamæpit F. pasta pilul. mollis,  
& ex qualibet dragma pilulæ ix. ex istis  
quotidie vesperi, quando decumbendum  
erit à parca cœna, deglutiendæ pilulæ ii.  
vel iii. quod si hoc singulis diebus fieri ne-  
quit, danda opera ut fiat plurimum. Nam  
illarum usu excrementorum in corpore  
proventus prohibetur, & quid à capite &  
aliunde excrementitius humor ad partem  
affectam & debiliorem continuo affluere  
consuevit, avertitur. Si verò quandoque  
corpus evacuatione ex professo opus habe-  
re judicabis, tum post istas tres vesperi as-  
sumptas pilulas, deglutiendæ summo  
mane insequenti alix octo vel novem;

& differendus cibus in horas quatuor  
vel quinque. Non minusquam præscri-  
ptarum pilul. velim frequentem imò quo-  
tidianum usum esse hujus electuarii.

℥. Galang. zinzib. nuc. mosch. an.  
℥ss. cass. lign. vel cinnam. ℥ii. cubeb.  
rad. pœon. an. ℥v. herb. paralyt (id est,  
primul. veris) sem. abrotan. rad. acor.  
vulg. an. ℥ii. majoran. flor. anth. salv.  
an. dr. ii. beton. dr. ss. piper. long. & alb.  
croci, an. ℥ss. flor. stæch. dr. i. mell. an-  
thos, & rosat. an. ℥ix. syrup. conserv. zin-  
zib. & nuc. myristic. an. ℥ss. aq. chamæpit.  
vel aq. Card. bened. ℥iii. coq. simul lento i-  
gne ad consistentiam, tum adde cætera per  
se quælibet pulverizata & prius mista: F.  
Electuar. S. A. hujus elect. usus matutinus,  
ita ut quotidie post elutum es, expurga-  
tisque cæteris sensoriis, ejus dr. ii. plus mi-  
nus sumantur, horis tribus vel quatuor  
ante cibum, vel per se solidum è cunctello  
deglutiendo, vel solutum in aq. chamæpit.  
vel rorismar. vel betonica, vel Card. bened.  
vel in tantillo vini ex præscriptarum aliqua  
Medicati; Quod ad externa attinent, au-  
thor tibi sum, ut subscribendo oleo calen-  
te; postremam lumborum partem circa &  
paulò supra os sacrum, & deinde extrema  
crura moderatis frictionibus jam calefacta  
diligenter illinas, & ubi ille veris partes i-  
stas pellibus vulpinis, vel pannis, ab æ-  
ris humidioris & frigidioris Injuria defen-  
das. Oleum hoc esto.

℥. Ol. amygdal. amar. ℥ss. aq. roris-  
mar. ℥i. vini malvatic ℥i. pyrethr. tusi dr.  
vi. croci dr. iii. sandar. arab. bacc. lauri,  
an. dr. i. coq. in duplici vase, ad liquoris ca-  
sum; oleo percolato adde ol. castor. ℥ss.  
M. & utere ut præscriptum est. *Reinerus  
Solenander, consil. 16. sect. 2.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Paralyti lingua.

**S**Ublingua teneatur castoreum vel sal-  
via succus, vel ipsum castoreum cum  
pœoniæ succo, prodest etiam castoreum,  
cariophyllus & nux mosch. cum vino hau-  
sta; utilis est etiam linguæ frictio, ac pa-  
lati, adhibitis theriaca & mithridatio;  
narratur quidam scæminæ, quæ usum lo-  
quen-



quendi amiffisset, gr. xxx. pœoniæ, depositis corticibus exhibuisse, moxque illam loqui cœpisse; prodest etiam sanguinis missio è venis sub lingua, quæ fricetur postea nasturtio & castoreo: emplastrum quod è canino stercore & adhibito aceto sit, occipiti impositum usum loquendi restituit: *Jo. Crato. consil. 50. lib. 6. pag. 229.*

Post apoplexiam Mercator quidam senex resolutus aliquandiu permansit in uno latere, & paralyfin lingue passus est: curatus postea aliquomodo, ut ambulare denuo potuerit, remanente tamen linguæ resolutione, loqui ut intelligeretur, quid vellet, minimè potuit, eratque jam inveteratum malum: à me consilium efflagitans, has pilulas præscripsi.

℞. Pil. coch. fœtid. an. ℥i. cum melle scillit. F. pilulæ; postea ut sequentibus per vices uteretur jussit quaterve in mense ℥i. fumendo.

℞. Agar. troch. ℥ii. turbith. gummosi in hydromel. infus. ℥ss. myrrh. sarcocoll. in succo rosar. nutritæ, an. ℥ii. Castor. ℥ss. Mastich. sal. gem. an. ℥i. Aloes, ℥ss. cum melle scillit. F. massa: masticatione sequenti manè utatur sæpè.

℞. Cubeb. nuc. mosch. semin. sinapi an. ℥i. Cariophyll. galang. piper long. ℥ss. salis communis ℥i. excipiatur cera F. formulæ: abluit postea os aqua salsa; nares intrinsecus unguento hoc ad eo divertendam materiam illinere jussi.

℞. Troch. alhand. diagrid. an. ℥i. rad. hellebori alb. ℥j. Castor. ℥ss. mell. scillit. q. s. F. Unguentum, ungatur pars posterior capitis rafa & cervicis nuda hoc modo.

℞. Ol. de piper. de euphorb. an. ℥ss. cere rubr. q. s. F. linimentum; postquam bis aliquandiu usus fuisset, jussi postea frequenter laborare elect. ex melle scillit. & anthos, & invicem mixtis, colluere deinde hoc decocto os, atque aliquandiu in eo retinere.

℞. Nuc. mosch. ℥i. rad. galang. costi, an. ℥ss. zinzib. ℥ii. sem. sinapi, ℥iii. decoq. in vino & melle, pro oris collutione, victus rationem idoneam præscripsi, & ut interdum jejunos in balneo sudaret, nitereturque loqui; hac ratione, et si

non perfectè verba proferre posset, tamen ut intelligeretur, balbutiendo loquebatur. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 133.*

Balbuties, lingua stupore affecta, quendam molestavit, quod clysterem sumpserit, in quo fuerit parùm opii dissolutum; verùm ut in ebriis remittente narcosi vini, loquelam rursus integram redire videmus, ita in hoc agro, postquam opii vis discussa fuit, balbuties cessavit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 136.*

Mulier quædam octo supra sexaginta annos nata linguæ paralyfi laborans, meo consilio infundebat per noctem flores lavendulæ in vino adusto vel sublimato; postea per aliquot dies manè, & ante introitum lecti assumebat unciam: unde statim loqui indies rectius cepit. *Martinus Rulandus, curat. 55. cent. 4.*

Viro quidam paralyfi linguæ cum inquietudine totius corporis tentato talia exhibeo auxilia.

℞. Aq. fontis ℥vi. ol. vitrioli q. s. ad aciditatem aquæ conciliandam: ex hac aqua singulis horis lentè absorbeat cochlear unum: & quia inde articulatè loqui cunctaretur, ad mineram mali exhauriendam potionem hanc cathartica præscripsi.

℞. Extract. colocynthid. magnitud. nucis avellanæ; feri lactis ℥ii. M. & calidè bibat; infecuta est copiosa per alvum evacuatione, permanente nihilominus linguæ impedimento; quare altero, à purgatione prima, die evacuationem corporis caco-chymici iterum repeto sic.

℞. Spiritus vitæ aurei ℥i. syrup. liquir. ℥i. M. hoc mira aquosæ & serosæ superfluitatis copia educta est; sermone in integrum restituto: ante tamen purgationem hanc ut & in ipsa operatione, linguam paralyticam guttam perlino oleo nostro heracii, cum fœlici sanitatis successu. *Martinus Rulandus, curatio 53. centuria 7.*

Cum subito quis sit sine voce, vel propter Paralyfin, vel aliam quæcunque causam, detur in potu cum vino calido pulvis castorei, cariophyll. & nuc. mosch. & recuperabit loquelam. Quidam amissit loque.



loquelam, & stetit per octo dies quòd non fuit locutus. Tunc quædam mulier dedit ei triginta grana pœoniæ à cortice exteriori mundatæ, & statim recuperavit loquelam. Item phlebotomare duas venas quæ sunt sub lingua, & postea linguam cum semina nasturtii & castorei fricare, loquelam recuperabit. Item pulvis ex castoreo factus sub lingua teneatur, quousque per se dissolvatur: miro enim modo loquelam restaurat. Item emplastrum factum de stercore camis in aceto mixtum & occipitio appositum statim loquelam recuperat. Experimentum ad paralyfin linguæ. Succus salviæ & oleum nucum, an. M. & addito paucò castorei sub lingua ponatur cum penna. Multum confert ad loquelam deperditam restaurandam. *Arnoldus de Villanova. Practic. Medic. lib. 1. cap. 24.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

*Pro Paralyse.*

**R**emedium singulare atque insigne exercendum in hoc languente curabamus, quod erat, optime purgato corpore, admoveere pungentes urticas, seu corpus lacerare urticis, maximè totum corpus, quod non est nostrum inventum, sed à *Celsio* proponitur, *lib. 3. cap. 27.* & testor Deum me hoc genere remedii pluribus esse usum, & semper maxima cum fœlicitate, & nunquam votis sum deceptus. *Epiphanius Ferdinandus, bistor. 47.*

Vulgare hoc est quod multis profuit.

℥℥. Aq. vitæ simpl. in ea macera aliquandiu flores calendulæ, macim, castoreum, cum momento croci; ejus exhibent cochli. i. eodem liquore resoluta membra perfricare juvat: accipiunt alii fol. salviæ aliquot M. incoq. diligenter vino, donec dimidium eius, aut ex tribus partibus duæ absumptæ sint, hujus colati vini exhibent manè ℥i. aut ℥ii. dissoluto in eo castor. ℥i. aut ℥ii. spina dorsi ad partem affectam, cum frictione incalverit, inungantur manè oleo costino bene præparato, cui adderem aliquantulum ol. stillat. nuc. mosch. & cariophyll. conveniet etiam oleum laterinum petroleum, & terebinthinæ & junipe-

*Burnet Parte I.*

rinum. *Reinerus Solenander, conf. 20. sect. 2.*

Fiat frequens inunctio partium affectarum cum oleo vulpino facto per decoctionem vulpinis in aqua colligendo ipsum cum supernatat, & hoc est singulare remedium. *Bartholomeus Montagnana, confil. 244.*

Comes quidam post nationem ab aqua exiens, in pedibus & manibus sine sensu & motu remansit: vocatus ego, pro tanto malo, post plurima incassum adhibita præsidia, unguentum paro præstantissimum, cujus efficacia plures resolutione universali, & particulari vexatos ad sanitatem (Deo duce) perduxì; hoc applicito per mensem a paralyse liber, perfectam consecutus est sanitatem, hujus remedii descriptionem sic accipe.

℥℥. Sal. major. laur. beton. rorismar. organ. calamenth. serpill. an. M℥. rad. acor. veri, ireos rec. an. ℥i℥. bacc. lauri, pyrethr. cubeb. nuc. mosch. trion. piper. an. ℥℥. carnis scillæ ℥i. rad. cucum. agreit. ℥ii. chamæpit. chamædr. an. p. i. sulphur. vivi pulver. ℥℥. ol. castor. ℥℥. ol. lauri rutac. an. ℥ii. aq. vitæ ℥℥. aq. flor. arant. ℥iii. vini potentiss. ℥ii. coq. omnia ad vini consumptionem colat. adde sagapen. opopon. bdell. an. dr. ii. castor. dr. ii. mac. nuc. mosch. styrac. calam. cariophyll. agallochi, an. dr. ii. piper. longi, pyrethr. an. ℥℥. Balsami ℥ii. ol. de liquidambr. ℥i. Unguenti martiar. aregon. agripp. an. ℥i. ol. de lateribus, terebinth. an. ℥ii. ol. macis, de ligno guajac. an. ℥i. ol. de piper. rorismar. anis. salis angelicæ, sulph. de thymo, an. ℥i. ol. de euphorbio ℥i. m. Axung. cati sylvestr. axung. anser. an. ℥ii. pingued. taxi ℥iii. pingued. viper. ℥i. ol. vulpin. ℥i. medull. crur. vaccæ ℥ii. succ. ebuli, salviæ, meliss. an. ℥ii. M. omnia, & cum cera q. s. in præfatis oleis liquata reducantur ad formam unguenti mediocris consistentiæ. *Zacutus Lusitanus, observ. 37 lib. 1. prax. medic. admirand.*

Inter externa maximè laudabilis est essentia foliorum tabaci viridum cum malvarum co facta sola infusione sine destillatione, si præmissis sudoribus membra paralytica ea diutius fricentur; spina etiam & partes affectæ inungi possunt galbaneto *Paracelsi* quod sic fit.



24. Galban. lbj. inde in cucurbitam satis amplam, & ei affunde spiritus terebinthin. Ibi digerantur in loco calido per octo dies: postea per alembicum ex cucurbita non nimis alta destillentur ad siccitatem, quod si odoratus & præstantius desideres, re-ctifica ab aromatibus nuc. mosch. & canella. *Ioh. Hartmannus*, practic. Chimiatr. pag. 85.

Viro quidam paralytico sequentia præscripsi, quibus etiam convaluit; singulis diebus bis, ter quaterve assumpsit sequentis decocti, §iv.

24. Rad. lign. gujac. §iii. cortic. ejusdem §i. lign. junip. §ii. aq. font. lbvii. coq. s. a. per horas tres, tum adde bacc. junip. §i. rad. angel. §ß. fol. major. salv. anthos, an. Mß. sen. mund. §i. hermodactyl. §vi. coq. ulterius, vase optimè clauso ad colat. lbiv. quibus adde aq. antiparalyt. theriacam §iß. spirit. sal. armoniac. §i. M. servetur in cantharo lapideo optimè clauso: singulis fere septimanis sequentes assumpsit pilulas.

24. Mass. pil. fœtid. maj. §ß. resin. jalap. troch. aland. an. gr. iv. ol. rorismar. gt. iii. M. F. pilulæ vii. bis etiam de die calide inungi sequenti linimento curavi nucham, cervicem spinamque dorsi.

24. Unguenti martiat. §. m. ol. fl. chamæm. hyperic. an. §i. bacc. junip. castor. & laurin. an. §ii. succ. express. cochlear. dr. iii. alum. in plum. dr. i. spir. sal. armoniac. dr. ii. aq. vitæ *Matthiolus* §. m. M. F. Linimentum; hisce omnibus per duos circiter menses usurpatis; linimento parum aliquando mutato, additis nimirum ol. spic. §ii. succi urtic. urent. min. §ß. seq. præscripsi vinum medicatum.

24. Fol. chamædr. chamæpit. an. M. i. fol. prim. veris M. ß. rorismar. salv. flor. an. p. ii. rad. imperator. angelic. reos flor. helleb. nigr. sem. cartham. an. §ii. hermodact. §i. (omnium nervosarum partium anima vacatur ut crocus pulmonum) agar. albiss. dr. iii. Card. cubeb. an. dr. ii. sal. tartar. dr. i. m. concisa & crasse contusa infusa in sacculo, cum vini gallici pint. vi. F. vinum medicatum; cujus, post justam infusionem tepidam ter quotidie assumpsit §. iii. quibus semper instillavit, spir. sal. armoniac. gt. viii. quibus omnibus quarto

menſe curatus. *Federicus Deckeres, observ. ad cap. 3. lib. 1. prax. Barbettiana.*

Exemplum paralyſeos antiquæ metu & ita curatæ habetur apud *Valeriol. observ. 4. lib. 2.*

## SECTIO SEXTA.

### Pro Paraphimofi.

**S**ponsus quidam juvenis cum prima nocte sponſam ſuam nimis arcte amplecteretur, tanta cum violentia frænũ ei abruptum, & præputium retrorſum fuit detrufum, ut maximus dolor & intumefactio totius membri virilis inde ſecuta ſit; ſymptomata indies ingreſcerent, me tandem in conſilium vocavit: primò itaque victus rationem tenuiſſimam & refrigerantem præſcripſi, deinde corpus cholagogis medicamentis expurgavi; & venam in brachio incidi ſanguinemque ſatis lautè extraxi, aderat enim maxima plethora; regionem renum unguento refrigerante bis in die inungere juſſi; loco verò effecto ſequens cataplaſma applicui.

24. Farin. hord. §iv. pulv. roſ. myrtill. an. §ii. balauſt. nuc. cupreſſ. an. §i. coq. in aq. roſ. & plant. parumque aceti roſac. & F. cataplaſma, addendo vitellum unius ovi: applicetur tepide & bis in die; his per dies aliquot adhibitis remediis, cum dolores qui ab initio acerbi & magni erant remiſſiſſent, appetitus ad venerem, & erectio membri ipſum adeo vexavit, præcipuè noctu, ut tota curatio inde impediretur, quotieſcunque enim membrum virile erigebatur, præputium adeo conſtrangebatur balanũ, ut mirum in modum inde auctus; ſit affectus cum itaque hac de re anxius eſſem, juſſi ut per dies aliquot confortium atque familiaritatem uxoris, imò ipſius præſentiam plane evitaret, deinde corpus iterum cholagogis purgavi, & lumbos oleis ſequentibus inungere juſſi.

Ol. viol. nymph. roſ. an. §i. ol. hyoſc. per expreſſ. dr. iii. camph. in aceto roſ. diſſol. §i. M. in mortario, his ita peractis, poſt eam cum dormitum iret, doſin laudani exhibui, melius ea nocte quievit minorque fuit membri erectio; quum itaque aliquoties exhibitionem laudani

ite.



iterassem, inunctiones quin etiam lumborum, & applicationem cataplasmati continuassem, tumor membri brevi remisit, ut non diu post præputium & retrorsum detrahere, & antrorsum reducere, balanumque obducere posset ager; convaluit, & ab eo tempore liberos aliquot ex uxore sua recepit. Vide atque etiam vide, candide lector, ne prædictum cataplasma applices, si paraphimosis ex impuro congressu cum scorto, acciderit materia enim maligna ad interna viscera repelleretur, hinc maligna ulcera sequerentur. *Guil. Fabritius Hildanus, observ. 56. cent. 5.*

## SECTIO SEPTIMA.

### Pro Paraphimosis Infantium.

**A**ccidit nonnunquam ex prava victus ratione nutricis, ut humor acris ad genitalia infantis decumbat, ibique pruritus excitet: mox propter confricationem genitalium, & acrimoniam urinæ confluunt humores circa balanum & præputium, qui ut plurimum flatulenti & pituitosi sunt. Cum itaque penis sit pars corporis porosa & mollis, facillimè humorem istum excipit, & quidem adeò copiosè ut mirum in modum extendatur præputium. Placet hic adscribere remedia, quibus ego multos Infantulos hoc malo laborantes feliciter per Dei gratiam sanitati restitui. Primò nutrici victus rationem quæ tenuis sit, & refrigerans præscribo. Deinde secundum humoris prædominantis naturam ipsam expurgo, ut plurimum tamen sequenti potiuncula,

24. Rad. cichor. lapath. acut. polipod. an. ʒi. corticis rad. trangul. ʒii. sol. scabios. veronic. agrimon. an. p. i. flor. cordial. an. p. ʒ. sol. sen. & sem. anis. an. ʒii. coq. in aq. ut colat. redeat ad ʒii. in quibus dissolv. el. de succo ros. solut. compos. cum sen. rheo & agar. ʒʒ. M. F. potio: si pituita in corpore prædominium obtinet, loco el. de succo ros. ʒiii. elect. diacarthami substituo; si plethora adest, venam in brachio incido: hujus medicamenti beneficio, infans quoque purgabitur: si vero ablactatus fuerit à dr. i. ad dr. iii. syrup. rosat. solut. compos. ipsimet infantulo cum ptisana aut decocto a-

grimon. & veron. exhibeo; ab initio si dolor & inflammatio adfuerint, sequens applico cataplasma.

24. Micæ panis alb. ʒiii. pulv. ros. rub. balauft. an. dr. ii. croci ʒi. butyr. rec ʒi. ex quibus omnibus cum lacte vaccino F. cataplasma: sub finem addendo vitellum ovi: hisce remediis adhibitis, & prout necessitas urgebat, iterata portione purgante, aliquot infantulos paraphimosi laborante sanitati restitui; si verò morbus adeo fuerit, contumax ut prædictis præsidis non cessarit applicetur sequens cataplasma.

24. Farin. fabar. ʒii. pulv. summitat. absinth. flor. chamæm. sambuc. an. dr. iii. pulv. sem. fanugrac. dr. ii. cumini dr. iii. coque cum vino rubro austero ad formam cataplasmati quod calidè applicetur bis in die: si excoariatio aliqua adfuerit, loco vini accipio decoctum flor. chamæm. me. lil. sambuc. & ros. excoariationem quin etiam sequenti unguento iungo.

24. Ol. rosac. ʒiʒ. ceruss. lotæ, tutiæ præp. cor. cervi usti præp. corall. plumbi squammosi, an. dr. i. m. camphor. dissolut. in aq. rosar. dr. m. M. & agitentur in mortario donec formam linimenti acquirant. *Guil. Fabritius Hildanus, obser. 58. cent. 5.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Paronychia.

Παρωνυχία (ab ὄνυξ unguis) latine panaritium, est tumor calidus ex sanguine adusto, & atrabilario, in extremis digitis ad latera unguium ortus, & propter vicinam nervorum gravissimos dolores excitans.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Paronychia.

**I**N principio post phlebotomiam & universalia remedia, ponatur digitus per longum tempus in ovo putrido; id enim plurimos curasse experientia constat: alii eum in musculis putribus tenere optimo cum successu & magna cum laude; ut audio, cum apostema jam perfectum esset,



esset, & incisionem admittere nollet, quod optimum est remedium, adhibui est unguentum apii seu hyperici *Philippi Hermannii*, quod propriè educit materiam viscosam ex ossibus, & panaritium per se curat, & est nobile experimentum non solum ad panaritium, sed & contra vulnera & omnia ulcera: cujus hæc est descriptio.

℥. Succ. hyperic. & apii, an. ℥ii. succ. fenecion. vulgò cruciatæ dictæ, millefolii, absinth. an. ℥i. succ. chelidon. persic. an. ℥ss. mell. despumat. ℥v. ol. hyper. ℥ii. terebinth. ℥i. farin. tritici, q. s. alumin. usti ℥i. succi coq. s. a. & reliqua addantur, & coq. ut artis est, ad consistentiam unguenti mollioris, & usui reserveatur, arcanum est contra paronychiam; quo solo aromatarius quidam ab hoc morbo curatus est. *Petrus Forestus, obs. 16. lib. 4. obs. Chirurg.*

Mulierem quandam paronychia gravissimè laborantem cum febre, lipothymia, aliisque symptomatis in sequentem modum curavi. Primò quidem digitum lacte vaccino, in quo flore, chamem. meliloti, semen fœnugræc. & cydon. incocti erant, aliquantulum fomentavi, deinde superficiem cutis paulatim dissecui; abrafa cute, maculæ quædam rubicundæ apparebant, quibus acie cutelli incisis, guttulam unam aut alteram aquæ rufæ sub cutæ inveni, illa vacuata, linteam madefactum aqua vitæ, ubi nonnihil theriacæ dissolutum erat, applicui: his statim sedatus est dolor: atque hoc unico remedio altero sanatus fuit digitus: reliqua quoque symptomata, purgato leviter corpore, sopita fuerunt, hujus curationis cum primùm periculum in uxore mea fecissem, & ex voto successisset, postea in supradicta matrona, ac multis aliis, maxima cum utilitate ægrorum administravi; & semper ad ungulam sub cute nonnihil ichoris inveni: sed necesse est, statim ab initio fiat incisio hæc; alioquin ex doloris vehementia cito concurrunt humores, qui inflammationem ac tumorem excitant, atque subjectam carnem, imò etiam ossa erodunt, vacat autem eo modo facta incisio omni periculo, nec est dolorifica, neque nervos aut tendines offendit, quum sit superficialis: alius verò modus apud practicos passim usurpa-

tus, incisio nimirum quæ fit à superficie ad centrum & versus os valdè periculosa est: *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 97. cent. 1.*

Puerulus quidam angebatur à duabus paronychiis duos affligentibus digitos cum acerbo cruciatu; pro his sanandis talis per me curatio est adhibita; manè & vesperi inungebam hos abscessus oleo sulphur. & desuper applicabam emplastr. diasulphuris: per quæ citissimè maturati, ruptique sunt ac iisdem remediis iterum consolidati ac sanati in paucis diebus. *Martinus Rulandus, curat. 87. centur. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Paronychia.

**V**Idi cui paronychia digitus obscessus erat, distinctus fortè ad brachii amplitudinem, perque noctes aliquot Insomnes torserat miserè: huic cruor & recens pellis talpæ circumdata, manè crastino die digitum cum nocturna quiete restituerant. *Joh. Helmontius, tractat. cui titul. Butler.*

Virgo quædam paronychiam patiebatur in indice manus sinistræ, quæ ipsam vehementer afflixerat per quatuor dies, jussit ut digitum immitteret in aurem felis, & intras duas horas doloris exper fuit; sentiebat per intervalla attractionem digiti in cavitationem auris, ac subinde dolor totum brachium invadebat usque ad humerum: eo denique tempore felis vociferabatur, ut credibile sit, cum dolore affici à veneno attracto: tota manus intumuit, ac postmodum detumuit, excepto digito, qui tumefactus remansit, sed doloris expers: sublato dolore, digitus extractus est, & suppuratus apparuit, ac deinceps solo empl. diapalma curatus. *Lazarus Riverius, obs. 63. cent. 4.*

Mulier alia eodem remedii à panaritio curata est, hinc colligere licet in capite felis esse vim quandam magneticam panaritii qualitatibus familiarem, cujus beneficio venenum in tumore illo latens ad se trahat. *Idem observ. 19. centur. 4.*

Vocatus fuit ad mulierem quandam quæ



jam duodecim noctes cum clamoribus duxerat infomnes occasione paronychiæ in pollice manus prope unguem lateraliter, nullo tumore, nullaque digiti inflatione existente, quidam chirurgus curam hujus passionis penitus ignorans, bis fecerat quasdam superficiales incisiones, in quibus excreverat, rogavit me instantissime, ut ejus curam susceperem, crastino die feci incisionem cum rasorio lateraliter ab ungue usque ad os, à summitate digiti ad juncturam exclusivè: deinde applicavi album ovi cum vitello agitatum intus & extra vulnus, statim cum recessi, cœpit dormire: & dormivit toto die usque ad noctem: cessavit omnis dolor, neque unquam postea doluit ex causa, sed brevi temporis spatio, Deo favente, fuit sanitati restituta, absque digiti deformitate, vera igitur curatio hujus ægritudinis est facere incisionem secundum modum dictum, usque ad os inclusivè: quia statim cessat omnis dolor, neque est aliud remedium, quin os & junctura perdatur. *Petrus Bayrus, practic. lib. 20. cap. 9.*

*Chalmeten.* expertus est ovi albumen cum oleo violato mixtum magis dolorem arcere, quam narcoticum.

Frater meus cum *Galliam* peragraret quendam paronychia laborantem sub cura habuit, & sequenti modo curavit, primò, secundum method. clariss. *Hildani* lacte vaccino in quo flor. melil. chamæm. fem. lini, sænugræc. & cydon. cum rad. al. th. incocti erant, aliquoties fomentavit, deinde superficiem cutis paululum dissecuit, qua ablata, rubicundæ nonnullæ conspectæ maculæ, quibus incisis; una aut altera guttula aquæ emanavit citrinæ: cum verò materia copiosior profundius & altius esset posita, ad os usque cultello vulnus incidit, maximaque copia puris benè cocti altero die effluxit, statim linteam in aqua vitæ theriaca permixta, madefactum applicuit; deinde folia brassicæ (sequenti decoct. imbuta, & ex illis tentas factas vulnere immisit) superimposuit.

24. Rad. apii ʒβ. mell. opt. ʒi. vini alb. generosi lb̄ss. coq. simul, donec mel. sic despumatum, & tertia pars consumpta. Postea fumantur brassicæ ac carbonibus superimponantur, statimque ne comburantur, a-

moveantur, inde enim molliores & humidiores quodammodo; & quo decocto facilius & commodius immergi possint, redduntur, hoc medicamentum (ut frater refert) Chirurgorum in *Galliis* primariorum secretorum omnium est secretissimum: manui verò & carpo defensivum ex oleo rosato, bolo armena, & albumine ovi cum stupa canabina apposuit digitumque affectum oleo ros. indies inunxit, paulatim vulnus adhibitis sarcoticis incarnari cœpit, ad inducendam cicatricem unguentum aureum imposuit, & diapompholigos applicuit, atque ita, divina favente gratia, quam brevissime feliciterque curam absolvit. *Matthias Glandorp. observ. 9. & cap. 23. Method. cur. Paronych.*

## SECTIO IX.

*Pro Parotide è qua calculi exempti fuerant.*

**N**obilis quidam puer tumorem juxta aurem ovi magnitudine, jamdiu habebat, in ambitu durum, inæqualem, in medio mollem, ubi pressus cedebat, ex quo materiam quandam inesse deprehendi: dolor alioquin nullus, nisi quod pruritus interdum sentiebat. Corpore purgato, usus est sequentibus: Fodus fiebat ex decocto rad. ireos, brionix, indies bis. Postea applicabat sequens emplastrum.

24. Gummi ammon. in aceto fortiss. dissolv. empl. diachyl. ireat. an. ʒi. malaxentur, quo facto duodecimo circiter die, sponte se aperuit tumor, purulentamque & spissam admodum materiam copiosè tota septimana reddidit, multumque subsedit. Restabat adhuc in humiliore sede, exigua durities, cujus causa, cum Chirurghi maturantia adhiberent, tentaque immissa ulcus apertum servarent, tandem tentæ fundo cum extraheretur, fabulosa materia penitusque terrea, grani milii majoris instar adhærens apparuit, posteaque plus quam triginta ejusmodi grana terrea, ejusdem magnitudinis, aliquando etiam majora prodierunt; sicque repurgato ulcere, cessanteque duritie, ulcus consolidatum fuit. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 707.*



## SECTIO X.

## De Partu difficili.

**U**T partus naturalis dicitur, qui salvis foetus & foetæ rebus facile, celeriter, & sine symptomatum vehementia, statuto tempore perficitur: sic contra, ille non naturalis & difficilis censetur, qui cum matris; vel foetus, aut utriusque periculo, tardè & difficilè fit. Causæ autem difficilis & laboriosi partus, vel sunt in matre, vel foetu, vel in viis per quas egreditur infans. Mater accusari potest, si debilior & imbecillior sit, ita ut vires non sufficiant ad ferenda partus tormina, & ad exprimendos conatus. In foetu causa est, si mortuus est, aut ita debilis, ut nihil vel parum præstare possit ad promovendum partum; si rursus magnus est, vel secundum totum corpus, vel secundum caput; adhuc si non unus, sed gemelli vel plures sint, vel foetus molam coherentem habeat; vel denique si in depravata & non naturali figura sese offerat. In viis verò causa est, cum vel membranae sunt crassiores & densiores, quam ut infans eas facile disrumpere possit; vel partes muliebres angustiores sunt. Partus difficilis signum est, si dolores partus sunt languidi, & per longa intervalla recurrant; & dolores ad dorsum potius quam versus pudenda vergant.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Partu difficili.

**M**Ulieri cuidam circa tres dies in partu difficili hærenti, hic pulvis ad provocandum partum per tres vices exhibitus est.

℥. Cinnam. el. dr. i. m. ossium dactyl. dr. m. sem. viol. ℥. i. rad. dictamn. alb. ℥. m. F. pulvis subtiliss. in partes tres divisus, quotiescum vino assumpto, & admotis linimentis & sacculis appropriatis, feliciter tandem peperit. Alia cum octo diebus in difficili partu valde angeretur, à Tiengio Medico curata fuit, ubi nono die accepisset dr. i. pilul. de assa foetida (de quibus supra lib. 11. sect. 18. subsect. 2. Pro Mola) cum

cyatho uno decoctionis sabinæ, idque ter, post prandium, hora quarta, & sub noctem hora octava, quibus eadem nocte, Dei nutu peperit filiam, & salva mansit, eodem modo & aliam ægrè parientem liberavit, & alteri etiam cum iisdem secundam eduxit, singulis tribus horis ad dr. m. exhibendo. *Petrus Forestus, observ. 73. lib. 28. De Mulierum Morbis.*

Mulier quædam cum filiam peperisset, & secundam prolem parere non posset, his infrascriptis remediis per me, nutu Dei, aliam foemellam peperit.

℥. Cinnam. pulv. dr. i. cass. lign. doronic. roman. an. ℥. m. nucleum unum dactyl. sabinæ ℥. i. perlar. finissimar. ℥. m. F. pulv. partiat in duas partes. Detur cum vino malvatico.

℥. Ol. amygd. d. lil. alb. sesamin. butyr. rec. pingued. gallin. anatis, an. ℥. m. M. inungatur venter inferior. Sumpto pulvere, & prius una dosi, & hora post altera, post horas quinque peperit. *Idem obser. 76. lib. 20.*

Cuidam pro partu facilitando, partu instanti, consilium dedi, ut quinque aut sex grana juniperi cum ficibus sumeret, quibus cum quinquies, aut pluries usa esset, mox conamina partus apparuere, adeo (quod & dictu mirabile est) ut illa ipsa cum maxima facilitate gemellos peperit. *Petrus Forestus, schol. observ. 69. lib. 28.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Partu difficili.

**M**Ulier quædam cum toto biduo parere non posset, & ob tantam difficultatem & angustiam, foetus stercus emitteret; Ego in consilium adhibitus, exhibui olei succini gr. xxx. cum vini ℥. m. umbilico simul ol. lign. heracl. calentis gr. xx. imposui, hoc facto, intra mediam horam, alacri, & erecto animo facile per Dei præsens auxilium, peperit infantem integrum & incolumem. *Martinus Rulandus, curat. 66. cent. 3.*

Medicamenta partum facilitantia, dicuntur quæ vel facultatem sopitam excitant, vel impedimenta remouent, quæ facultatem irritant intus assumpta plura esse possunt.



possunt. Inter cetera hæc mihi probantur. Primum paratur ex pulvere boracis mineralis, cortic. cass. fist. cinnam. & croci, cum aq. artemis. dato, alterum ex theriac. diatessar. fruct. sabin. pulverat. cum syrup. de artemis. in bolum accept. quibus addo troch. de myrrh. cum pulv. cinnam. & croci in lixivio dulci, vel vini Hisp. exhibitos. Et si ab his medicamentis dolores non promoveantur, laudo potum aquæ tepidæ cum melle crudo. In usum etiam vocetur pulvis castraturæ scrophæ, vel testiculor. equi siccator. ex aq. matricariæ, exterius etiam ad irritationem convenit cataplasma ex artemis. & satureia in vino cretico coctis, ac imo ventris adhibitis, adjecta pulpa colocynthidis. Linimentum quoque quo pro pectine, dorso, & locis interfemineis maximè conveniens, paratur ex succo colocynthid. rutæ, felle tauri, ac oleo cheirino. Huc etiam referenda sunt aliqua, quæ à proprietate indita operantur; inter quæ seligo cetrigiam ex pelle cervi Illustrissimæ Patienti cinctam, lapidem ætiten à brachio ad femur tempore pariendi trans latum; sed & cinis quoque ungulæ asini, vel equi, partibus infernis illitus ad idem valet, quæ impedimenta remonent, i.e. viarum angustiam & siccitatem, sunt emollientia & relaxantia, quæ satis nota sunt. *Iul. Cesar Claudinus, conf. 107.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### *Pro Partu difficili.*

**N**uper cum muliereculæ quædam parere non poterant, in ipsa parturigine iussi plurimis mollem clysterem injici intestinis, ac illicò peperere: ita ut jam apud nos id agere incipiant mulieres Nobilissimæ. Clyster fit ex decocto herb. emollient ut malv. alth. parietar. thapsi barbat. chamæm. artemis. colat. adde sacch. oleum amygd. d. & Zi. sal. *Ioh. Heurnius ad aphor. 34. sect. 5.*

Ubi parturigo non succedit ex sententia, salutaris est sternutatio, etenim ad interna validè propellit diaphragma, compresso epigastrio: hinc ad interna pellicur valido nisu uterus. Nos parum piper. & galang.

naribus ut sorbeat jubemus: miscemus interdum parum hellebori alb. maxime quid euphorbii. Sed antea propinamus hoc remedium, quo summi Die beneficio plurimas liberavi.

℞. Cinnam. el. Ziij. Myrrh. opt. ℥ij. succ. cini albi Zi. rubiæ tinct. castor. an. ℥j. boracis ℥. croci gr. v. M. pulvis subtiliss. capiat ℥j. cum vino albo & saccharo, eliso sætu, cum secundinæ retinentur, hoc pulvere propinato, illicò redduntur, nam tunc hæmorrhagiæ metu, non fovemus. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 35. lib. 5.*

Vxori gregarii militis difficili partu pene enectæ, dedi pulverem testium equi, in aqua lilior. alb. cum croco, pudendo saporem nigrum applicandum curavi, dimidio quadrante citius puerum croceo colore tinctissimum enixa est. *Henricus ab Heers observ. 14. lib. 1.*

Non præteribo auxilium præstantissimum, cujus ope plures in agone positæ, fetus vivos vel mortuos sceleriter excluderunt laborioso partu oppressæ. Hoc constat ex boracis officio. ℥j. tenuissimè pulverizata; quam si cum ℥ij. aq. artemis. aut sabin. aut generosi vini bibas, miram inveniens utilitatem, debilibus sufficit ℥. aut ℥j. *Zacutus Lusitanus, observ. 158. lib. 2. prax. admirand.*

Sæpius compertum est, quod olei oliv. potu ante partum facilitatur mirà partus, nec tormina ulla patiuntur puerperæ, vias enim lubricas & molles reddit oleum. Debet etiam topicè extra idem oleum admoveri. *Petrus Borellus, observat. 25. cent. 2.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### *Pro Partu difficili.*

**N**Ovi remedium, quo fœtus alioqui per diem & horas in partu staret, eoque potu sumpto, mox infra horæ quadrantem mulier parturit hoc autem remedium in jecore & felle anguillæ siccatis & pulveratis consistere scripsi alibi. *Ioh. Helmontius, tract. cui titul. Astra necessitant non inclinant, nec significant de vita, corpore vel fortunis nati.*



## SUBSECTIO QUINTA.

## De Partu difficili.

**P**artus tempore sumat  $\mathfrak{D}$ ij. boracis ex aqua matricariæ. *Horatius Augerius, tomo 2. lib. 8. Epist. 3.*

Nobilis mulier pleuritica prægnans, habuit aliquid commemorabile, doluit latus, febris continua erat. Uterum ferebat jam octo menses cum dimidio, dubitabamus an partus accelerandus foret; alii a malleolo tudendam venam putabant, tamen ex brachio sanguinem detraximus planè corruptus erat tandem pariendi se se occasio obtulit, vires erant infirmæ, dolores suos & tormina (ut politico verbo utar) devoraverat. Dedimus decoctum fol. senæ, folia erant pauca quantitate, ut non tam alvum subduceremus, quam cum leni alvi subductione tormina excitaremus, excitatis ita torminibus feliciter peperit. Folia senæ exhibere solemus.

$\mathfrak{Z}$ . Matricar. artemis. nepetæ an. p. j. hyssop. p. iß. mercurial. p. j. sem. citri, pœon. an.  $\mathfrak{Z}$ ß. cinnam.  $\mathfrak{Z}$ j. F. decoctio, in qua bulliant fol. sen.  $\mathfrak{Z}$ ij. F. fortis expressio, adde vini albi parum, tormina excitat. *Guil. Ballonius, cons. 20. lib. 2.*

Si partus tardior est, fel. gallinæ sumatur, maximè nigre, & umbilicus ungatur item in vino detur consolida regalis: ne sint in eo loco, ubi paritura est, pyra, impediūt enim partum Artemisia cocta in vino, dextro femori probè muliebria applicetur; magni sit & lapis aquilæ, si sinistro cruri applicetur, sed statim à partu removendus est. Idem scribitur de matrisylva & polipodio, si pedibus alligentur, vehementia verò ut est borax non probo; nisi vel foetus mortuus sit, vel mola adfuerit. Si foetus sit mortuus, sume oleum lini cum pinguedine aliqua in qua castor coctum sit, & unge ventrem. *Ioh. Crato. consil. 40. lib. 5.*

Hoc expulsiuum præscripsi, quo alias feliciter usus sum.

$\mathfrak{Z}$ . Troch. de myrrh. rad. dictamn. alb. succid. an.  $\mathfrak{D}$ i. borac. sem. viol. an.  $\mathfrak{D}$ i. Magist. perl.  $\mathfrak{D}$ ß. M. F. Pulvis tenuiss. in tres partes dividendus: assumatur cum aqua arthemif.

Mulieres observavi in partu difficili aliquot dies periculoso, oblato poculo, mox ad summum ante semihoræ spatium enixas, idque ducenties & amplius probatum. Pharmaco nimirum adhuc in stomacho existente apertum est os pubis, & valvæ ossis sacri in lumbis, foetusque statim propulsus. Notavi scilicet stomachum claves uteri gerere. Hoc medicamentum lubens in bonum proximi evulgavi, ne deinceps parturiens periculum vitæ subeat. Est autem jecur simul cum felle anguillæ siccatum pulveratumque in vino potum, magnitudine avellanæ, donum Dei in hoc simplici, ut cum mulier jam parere debuerit, in dolore propter serpentis invidiam; Deus anguillæ aquæ serpentis visceribus pacare voluit illius maledicti rigorem, idem foret atque melius hepar serpentum efficeret, sed in anguillæ experimento nunquam fefellit eventus. *Ioh. Helmontius, tract. cui titul. Ius Duumviratus.*

Nos remedium optimum dabimus experimento pluries comprobatum dono receptum à Serenissimo Duce *Guisano*, videlicet anguillæ jecur in furno panis exsiccatum, ut in pulverem redigi possit, dosis ipsius est medietas ponderis unius aurei, detur in liquore convenienti prout medico libuerit, mirificè partum facilem reddit. *Dominicus Panarolus obs. 21. Pentecoste 3.*

Jecur anguille ad partum facilitandum ab *Helmontio* & *Panarolo* valde commendatur. Novi famosum Empiricum qui hoc solo ferè secreto magnam sibi famam acquisivit; illud exhibui Medici cujusdam uxori agræ patienti, & à marito & obstetricibus pro deplorata habitæ, unaquæque dosis plurimum auxit conatus parturiendi antea ferè consopitos; ita ut tandem feliciter pepererit. Coactus fui ad duplum dosis *Helmontii* pervenire, nimirum ad magnitudinem nucis juglandis in vino rhenano. *D. Robertus Boyle, lib. 2. De Utilitate Philosoph. Experimentalis cap. 18. sect. 5.*



mis. & puleg. an. ℥ii. *Joh. Petrus Lotichius, obs. 18. cap. 1. lib. 5.*

Cingat se nudat mulier spolio serpentis, & pariet facillimæ. Rasura ossium dactylorum cum vino pota, mirabiliter liberat parturientes. Dore parturienti lac alterius mulieris faciliat parum, corallus coxæ appensus idem facit. *Petrus Byarus, pract. lib. 15. cap. 9.*

Inter alia ab authoribus commendatur secundina siccata, ut & vasa umbilica, quæ hoc modo præparari possunt.

℥. Secundinæ vel chordæ umbilicalis in furno siccata & pulverizata ℥ii. cinnam. ℥i. croci ℥ss. cum succo sabinæ. F. trochisci: dosis dr. ii. in convenienti liquore. *Daniel Sennertus, pract. lib. 4. part. 2. sect. 6. cap. 4.*

*Hippocrates lib. 1. De Morbis Mulierum,* in difficili partu sanguinis missionem ex talo ut extremum auxilium commendet, viri-um habito respectu: quamvis à practicis nostris nunquam in usum revocetur hujusmodi remedium, & videatur maximè reformidandum, cum in partu vires unice necessariæ sint, quæ à venæsectione infringi possunt: tamen si à plethora difficultas pariendi oriatur, quod innuere videtur *Hippocr.* non est dubium quin maximè conferre possit, cum venæ plurimo sanguine refertæ omnes vias interiores angustiores efficere soleant. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 15. cap. 18.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Doloribus à Partu.

**S**I partum ingens dolor sequitur, coque roris mar. & ventri impone calidè; vel muniatur venter pelle agnina vel arietina, dum adhuc calet, recens detracta est. Item emplastr. hoc sedabit dolores.

℥. Tres vel quatuor cæpas benè coctas in aqua, eas in mortario comminuè, adde cumini contus. M. j. flor. chamæ. M. j. farin. hord. q. s. ut fiat puls; & si materia id requirit, adde parum aquæ in qua cæpæ incoctæ sint. Extendatur in linteum. & umbilico applicetur, quod si sic etiam dolor non desinat, adde farin.

sem. lini M. j. & minus farinæ hord. cum vero exsiccatum est, mutetur de novo. *Joh. Crato consil. 40. lib. 5.*

Exhibuimus cerevisiam in qua flores chamæ. decocti erant: hoc enim licet simplici remedio, tanquam arcano uti soleo, semper maximè cum successu. Miraculi enim instar dolores post partum compescit. Matrona quædam dolores post partum mitigabat bibendo ℥iv. olei amygd. d. rec. expressi cum sacchar. *In Italia* Matronæ cupiunt ℥iii. ol. amygdal. d. Hoc illic vidi à dolore post partum liberatas, & commodè eo in multis usi sumus. *Petrus Forestus, observ. 75. & 81. lib. 28.*

Mulier quædam sevimis à partu exercebatur doloribus, qui post alia remedia huic præsidio cesserunt.

℥. Galban. ass. foetid. an. ℥i. paretur emplastr. rotund. cum quatuor granis moschi in medio, admoveatur paulò infra umbilicum, & dolor evanuit. *Petrus Pachygnus, observ. 11.*

℥. Nuc. mosch. anis. cinnam. an. i. M. F. Pulvis detur cum vino albo.

Sequens Pulvis statim post partum sumptus, à torminibus mire perservat: ita ut si primiparæ exhibeatur, in sequentibus partibus nullo modo à dictis doloribus torqueri credatur.

℥. Rad. consolid. maj. exsicc. ℥i. nucleor. persic. & nuc. mosch. an. ℥ii. succ. ℥ss. Ambr. grif. ℥ss. M. F. Pulvis, de quo capiatur ℥i. cum vino albo; & si febris ad fuerit, cum jusculo. *Lazarus Riverius, prax. Med. lib. 16. cap. 23.*

Comitissa quædam postquam primo partu filiolum enixa esset, vehementibus doloribus circa imum ventrem per intervalla corripiebatur, quasi denuo paritura. Lochia enim minus rectè & parcius fluebant. A grumoso sanguine in utero detento dolores hosce produci facile conjiciebam. Ad hunc itaque attenuandum & dissolvendum fluxumque lochiorum promovendum exhibui pulvisculum.

℥. Sem. fæsel. cumini; zedoar. galang. croci, castor. an. ℥i. ol. cinnam. gt. v. M. F. Pulvis pro tribus dosibus ex aqua pulegii & vino *Rhenano* albo invicem mixtis, & cum ovi vitello & macere paucoque saccha-



charo in formam jusculi redactis. Extra infimo ventri sacculum ex artemisia, pulgio, matricaria, chærefolio calamintha, floribus chamæmeli cheiri, baccis lauri, semine anethi, carvi, cumini, &c. in vino coctum & expressum actu calidè imposui. His nondum juvantibus, præscripsi enema.

24. Rad. rub. tinctor. alth. lil. alb. an. ʒʒ. fol. artemis. chærefol. puleg. matric. an. M. fl. camom. p. ii. cheiri p. i. sum. aneth. M. fl. bacc. lauri ʒʒ. sem. fœsela carvi cumini, dauci, an. ʒii. coq. in aq. font. in colat. ʒx. dissolv. ol. camomil. ʒiʒ. aneth. ʒi. fœl. gem. ʒi M. F. enema. Postmodum sperma ceti, quo nihil unquam ad dissolvendum grumos sanguinis potentius deprehendi, ex cerevisia calida per vices exhibui. Et sic, profluentibus decenter lochiis, dolores ex toto remisere. *Baldassar Timæus, Cas. 30. lib. 4.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### De fluxu sanguinis ante partum.

**U**XOR veterinarii patiebatur fluxum sanguinis magnum ante partum, & in ipso pariendi tempore. Quæsitum, An partus accelerandus. Quibusdam videtur æquum: quia tamdiu molietur natura symptomaticè istam excretionem, quamdiu frustra conabitur fœtum excludere. Aliis non videtur. Hic Medicorum prudentiam desidero maximam, quoniam nondum de ea re definitum est. Uxor Pistoris, & pleræque aliz animam efflarunt, non excluso fœtu, ob istam evacuationem præeuntem. *Guil. Ballonius, lib. 2. Epid. pag. 141.*

Scribæ cujusdam uxor ante octavum partum circa noni mensis medium, enormem sanguinis per uterum patiebatur fluxum, qui 6. diebus continuis illam pessimè habuit & afflixit, ita ut ab omnibus prodeplorata haberetur. Plurimis incassum adstringentibus a plus satis efficiosis mulierculis tam intus exhibitis, quam extra admotis, tandem ad suppetias illi in tantis angustiis constitutz ferendas advocor. Accedens, agram reperi animo sapius deficientem, summe debilem, viribusque

dejectis, ac de se saluteque sua prorsus desperabundam. Omnibus seriò apud me perpenis, in eam demum deveni sententiam, hæmorrhagiam hanc non nisi fœtu excluso reprimi posse, totamque salutis spem in eo sitam, ut quamprimum omni-que arte acceleretur partus. Remoto igitur, quod lumbis applicitum erat, emplastro, ut hunc statim julepum ebiberet, imperavi.

24. Aqua artemis. & cinnam. sine vino, an. ʒiʒ. borac. miner. ʒi. syrup. de artemis. ʒi. M. F. julepus. Quo epoto adeo promoti sunt dolores & partus tormina, ut intra tres horas, summi *Dei* beneficio, feliciter pareret, suppresso paulatim à partu sanguinis fluxu, pristinamque exinde sanitatem recuperaret. Idem consilium Nobili cuidam Matrone in consimili casu salutare proficuumque deprehendi.

## SUBSECTIO OCTAVA.

### De Partu per os.

**I**UVENIS quædam Fœmina in Civitate Imperiali Infantem digiti longitudine, maximis cum doloribus, summoque vitæ periculo per os enititur, mortuum mulieres adstantes scatulæ includunt, & sepe. lunt. Amplissimus verò Senatus postquam hoc rescivit, refodere Infantem, eumque in honestorum quorundam virorum præsentia aperire jubet: quem omnibus membris humanis, tam internis quam externis verè constare cognoscunt. Puerpera ea de re interrogata & examinata, constanter affirmavit, maritum semper cum illa per os coluisse, & sperma in fauces immisisse: sibi (utpotè à natura planè simplici, sicque à marito facilè persuasa) primo quidem de alio coeundi modo nihil prorsus constitisse, donec a vicina, quacum de eo aliquando communicasset, aliter edocta fuisset, atque se ita à marito, delusam postmodum animadvertisset. Maritus, seu impurus potius & sceleratus nebulo, (qui sutor fuit) iuga sibi consulens, decem septimanas ante Infantis exclusionem clam uxore militatum abiit; aliàs rogo forsan impositus fuisset. *Philippus Salimuthus, observ. 94. cent. 3.*



## S E C T I O X I.

*Pro Pectori abscessu.*

**T**Umores ad suppurationem verso pus attraximus beneficio sequentis empl.

℥. Resin. pini rec. claræ & odoratæ ℥i. ol. laurin. & cerebinth. an. ℥ii. gummi elemi ℥iv. F. empl. S. A. extendatur q. s. super alutam, & vulnere apponatur. Mutetur hiemis tempore semel tantum in die, æstate verò bis, & mirabilia videbis. Vide *Paracelsi lib. 10. De Vulnerebus Pectoris & Thoracis cap. 32.* Debet emplastr. in medio perforari incisuris duabus aut tribus longis, ut pus attractum facile effluat. *Leerus Pachegus obs. 54.*

## S E C T I O X I I.

*Pro Pectoris conquassatione ex nimio pondere elevato.*

**V**ena seſta, loco dolenti appositum eſt oxycroceum, & brevicuratus fuit. Quidam pelle ovina recens dilaniata sale conſperſa, ægrum calidè apud ignem involvunt, & dimittunt ut ſudet, quantum ferre poteſt. Sed mox depoſita pelle, oblinunt oleo roſac. myrtill. & chamæm. & antequam pellem deponant, dant hanc Potionem.

℥. Rhab. el. ℥i. mummiæ ℥ß. rub. tinct. gr. iii. F. Pulv. diſſolv. in aq. endiv. ℥iii. vini albi ℥i. adde ſyrup. acetof. ſimpl. ℥i. vel ℥ß. F. Potio. Sed & hæc Potio egregie conferre traditur iis qui ex nimio pondere levando quid mali ſentiunt in corpore.

℥. Butyri rec. ℥ii. caſei virid. ovilli ℥i. liqueſiant ſimul ſupra ignem, & exprimantur per pannum, aut ſetaceo excipiantur. Tunc.

℥. Cereviſ. Godane aut alterius optimæ ℥b. i. ſpernat. ceti, nuc. moſch. ana ℥i. M. cum but. ſupraſcripto, & F. Potus, capiat bis in die. Deinde & hæc applicentur loco affecto.

℥. Fol. viol. M. ii. contund. adde furfur. tritici macri, M. i. axurgiæ porcin. ℥i. aq. vitæ ℥ß. vel parum plus. M. & appo-

ne. Hæc potione feliciffimè in conquaſſatis uti ſoleo.

℥. Fol. ſen. ℥iii. infund. in ℥v. decocti communis, fort. expreſs. adde el. de ſucco roſ. ℥iii. mummiæ, nuc. moſch. an. ℥i. oxymel. ſimpl. ℥ß. F. Potio. *Petrus Foreſtus, obſervat. 32. & ſchol. lib. 6. Obſerv. Chirurg.*

## S E C T I O X I I I.

*Pro Pectoris dolore.*

**C**ontra Pectoris compreſſionem doloremque per vices de ſequenti hauſtulo expectorante aſſumpſit.

℥. Aq. hyſſopi, anif. & tuſſilag. an. ℥vi. ſyr. jujub. ℥i. oxymel. ſcilic. dr. vi. ſpecul. diaph. ol. dr. i. Sol. anif. gt. v. ſacch. cand. dr. ii. M. diligenter, colatura detur pro hauſtulo: interim regio pectoris externè inungebatur unguento reſumptivo ad ℥i. cum ol. ſcænic. gt. iii. Pro Potu ordinario bibat decoctum C. Cervi uſt. præp. cum ſacch. in hunc modum.

℥. C. cervi uſti præp. ℥i. hord. p. ii. coq. in aq. menſ. iß. decoctum efferveſcens ſuper aſtunde paſſul. min. ℥i. ſacch. cand. dr. iii. cinnam. integr. dr. i. ſemin. anif. dr. iii. ſinatur ſponte refrigerari, & ſervetur potui. *Jo. Petrus Lotichius, obſerv. 1. & 2 cap. 3. lib. 3.*

## S E C T I O X I V.

*De Pectoris vulnere admirando.*

**V**ir quidam melancholia, tentationibusq; variis diu vexatus, tandem proprio gladio ſe confodit, infra quartam coſtam in thoracem adacto, & ſub nona coſta in tergo exeunte: quod vulnus tamen intra menſes duos ſanatum eſt. Verum accidit, ut poſt menſes aliquot, iterum de abſurdis cogitationibus conquere- tur, & poſtea malè haberet, primò aq. & quicquid cibi aſſumpſiſſet, poſt viridia, tandem nigra quater, eaque magna copia reiiciens vomitu, cum ſudoribus frigidis & leiſothymia, ac deinde poſt ultimum vomitum expiraret: corpus apertum eſt, deprehenſumque vulnus per pulmo-



pulmones & diaphragma penetrasse; pulmonis ferè nihil repertum est in sinistro latere confosso. Venter totus ascendit in sinistrum thoracis latus, & cor cum capsula de sede sua depulluerat in dextrum latus, ubi & vivus ille jubebat observari cordis pulsum. *Daniel Sennertus, obser. 33. cent. 2. Observ. Chirurg. Hildani.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### *Pro Pœnis ulcere.*

**D**edi illi ab initio trochisc. alKiKengi sine opio, ut Zi. continuatis diebus cum lacte biberet: post dies quatuordecim reverso, cum nondum cessaret, hoc decoctum ordinavi.

℞. Rad. petrosel. Zi. alth. Ziß. liquirit. consolid. an. Zi. bistort. ℥ß. fol. plantag. alchymil. an. M. i. flor. malv. arbor. p. i. sem. lini, cydon. an. Zi. glandium Zi. nucleor. persic. Ziß. coq. in vini mensur. i. (rectius enim sic ad vesicam penetrat vis medicamenti) bibat noctu haustum cubitum iturus, præcedenti levi cœna: manè bibat lac caprinum vel ovillum; comedat orizam hordeum, ulceri in glande adhibeatur hoc unguentum.

℞. Cadmiæ fossilis Ziß. sulphur. argenti vivi, an. Zi. cum terebinthina ducantur in formam unguenti, addendo parum axungæ porci: & sic restitutus fuit. *Felix Platerus, obs. lib. 3. pag. 779.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### *De Peripneumonia.*

**P**eripneumonia phlegmone est pulmonum cum febre acuta, spirandi difficultate, & tussi, pars affecta est pulmo, vel totus, vel ejus pars dextra vel sinistra, causa est sanguis in pulmones copiosius irrumpens, ibidem inflammationem concipiens, externæ sunt, exercitium vehemens, præsertim post quietem longam, & corpore repleto; clamor & vocis intentionimia, ira, aer frigidus & aquilonius, australem præcipuè sequens, aquarum etiam lacustricum & stagnantium usus: huc etiam pertinent medicamenta vene-

nata, & humorum aliquando malignitas, ut in peripneumoniis epidemiis, signa sunt, pectoris angustia cum dolore gravativo & spinam attingente, spiritus difficultas, & quidem major quàm in pleuritide, febris acuta, tussis molesta, & genarum rubor, sputum in principio nullum processu autem temporis, aut cruentum; aut biliosum, aut spumosum.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Peripneumonia.*

**V**enam aperire (quod ab initio admodum conduxisset) cum jam quartus esset dies, & non amplius cruenta expueret, nolui: jussi itaque hoc julepo tribus uti vicibus statim mane, iterum sub vesperam, & circa medium noctis.

℞. Iulep. violar. Zi. syr. de jujub. Zi. aqua violar. ℥ß. manus ch. ℥ß. M. F. julepus. Unguentum etiam resumptivum in panno lineo extensum lateri dolenti applicavi quinto die quia excretio fuit nonnihil cocta & urina tincta; hunc julepum præscripsi.

℞. Iulep. viol. Zi. syr. de jujub. oxymel. simpl. syr. de tussilag. an. Zi. aq. tussil. viol. an. Ziß. M. utatur frequenter pulver. quoque hunc exhibui.

℞. Oculi Cancr. Zi. m. manus ch. perlar. Zi. F. pulvis subtiliss. capiat mediam partem manè, cum julepo, alteram sub vesperam, unguento resumptivo mane & vesperi inungatur latus dolens; quia tenax erat materia quam expuebat hunc syrup. præscripsi.

℞. Oxymel. simpl. Zi. oxym. scilit. ℥ß. M. capiat frequenter lambendo, ob dolorem hunc fotum in usum vocavi.

℞. Rad. alth. Zi. lil. rec. Zi. flor. cham. melil. ros. an. p. i. sem. lini fœnugrac. an. ℥m. sem. carvi Zi. F. decoctio in vino & aqua; infundatur colatura in vesicam, quæ semitimpleatur, & strictè ligata ne quid effluat, loco dolentit tepide applicetur, cujus usu mitigatum malum sequenti die, quo & continuavit fotum. Ut promoveretur expectoratio purulentæ materiæ, & coqueretur eclegma hoc ordinavi.

℞. Tab. diatr. diamargar. frig. an. ℥ß. lohoch.



hoch. sani & experti ℥iij. facc. cand. ℥ij. syrup. de liquir. q. s. F. lohoch capiat cum baculo liquirit. lambendo. Item.

℥. Ol. amygd. d. rec. expr. ℥ii. sacch. cand. ℥i. oxym. scilit. ℥ij. M. capiat aliquoties, pectori cataplasma hoc ad concoctionem materiæ applicandum prescripti.

℥. Caricar. incis. paria ii. mic. panis p. iij. coque in lacte, adde farin. sem. lini ℥ii. contulis adde ol. viol. amygdal. d. an. ℥iβ. croci parum. M. illinatur eo pannus linteus, tepideque applicetur, quia postea excretio, non tam prompte succederet mutavi eclegma hoc pacto.

℥. Tab. diatragac. frigid. oxym. scilit. syrup. liquir. de hyssopo, penic. an. ℥β M. item teneat in ore sacch. penidium. *Felix Platerus observ. lib. 2 pag. 424.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Peripneumonia.

**T**ertio die vocatus statim venæsectionem præscribo: hinc si alvus non est aperta, lenitivum præmittatur, alias statim ad usum illorum procedendum quæ materiam ad expectorandum præparant, ac febris ardorem temperant qualis est hæc potio.

℥. Aq. beton. fragar. ungu. caballin. an. ℥i. syrup. viol. liquir. an. ℥β. spirit. vitriol. gt. iii. M. F. haustus: post hanc potionem refrigerantem & præparantem, addatur lambile pro majore maturatione materiæ quod.

℥. Syrup. viol. de liquirit. de jujub. hyssop. an. ℥i. syrup. de prassio ℥β. aq. hyssop. fragar. an. parum. F. lambile quibus post biduum continuatis, tertio die post venæsectionem, purgatio lenitiva instituat diluto agar. hoc modo.

℥. Agar. ℥ii. zinzib. ℥i. sal. gemmæ, gr. iii. affunde aq. veronic. & vini q. s. tene in loco calido per noctem manè leviter bulliant, & exprimantur ℥iβ. in quibus dissolve el. diacarthami ℥ii. oxymel. scilit. ℥β. M. F. haustus, post purgationem materia magis præparetur per continuum usum incidentium & alterantium, quotidie bis usurpata potione pectorali.

℥. Rad. ireos, alch. an. ℥β. liquir. ℥v. sem. *Burnet Parte I.*

anif. fœnic. urtic. an. ℥i. fol. prass. hyssop. major. an. M. j. tragacanth. ℥i. cubeb. passul. an. ℥i. nucleor. pinear pistach. an. ℥β. dactyl. caryc. an. num. 6. fiat decoctio s. a. colatura dulcoretur cum sacch. cand. q. s. F. potio ad vices aliquot *Gregorius Horstius observ. 7. lib. 3.*

Quidam sexagenarius laborabat peripneumonia pituitosa: cum multa pituita refertus videretur, clystere injecto, & semel tantum venæsectione celebrata, purgans medicamentum fuit exhibitum ex infuso rhei cum manna & syrup. ros. quo optimè purgatus est quarto die morbi; & postridie à febre aliisque symptomatis liberatus apparuit. Unde patet purgationem in peripneumonia interdum convenire quamvis ut plurimum ante septimum diem usurpata perniciofa sit. *Lazarus Riverius, observ. 8. cent. 1.*

Peripneumoniæ curatio pleuritidis curationi simillima, in ea utramque paginam implet phlebotomia, quantum vires ferre possunt, semel aut bis in die, donec morbus mitescat; cum enim pulmo multo sanguine abundet, & à corde æstu. ante magnam illius copiam attrahat; minime verendum est, ter, quater, quinquies, & sexies sanguinem detrahere, mitti vero debet sanguis à basilica utraque, si totus pulmo æqualiter efficiatur; vel ab alterutra quæ lateri affecto magis respondeat: mulieribus peripneumonitis, quibus sanguis menstruus actu fluit, à talo primo, & mox intra sex horas à brachio sanguinem mittere oportet; nisi adeo urgeat periculum, ut cogat primo accessu sanguinem à brachio fundere: quo in casu, toto venæsectionis tempore, & parum ante illud, cucurbitulæ famoribus sunt affigendæ. Posteaquam verò non videntur vires ulteriorem venæsectionem ferre posse, cucurbitule admoveendæ sunt scapulis & dorso, tum sic, tum maximè scarificatæ, quantum vires ferre possunt, clysteres etiam emmollientes & lenientes revulsorii sint: ne tamen in iis vehementiora cathartica misceantur, metu alvi fluxus, qui in hoc morbo periculosus est: si humor crudus & pituitosus à capite irruens morbum efficiat, vel foveat, vesicatorium nuchæ admotum summopere proderit,



purgato in hoc affectu non convenit, nisi declinante morbo. *Lazarus Riverius, prax. Medic. lib. 7. cap. 3.*

## SECTIO XVII.

### Pro Pernionibus.

**P**erniones (Græce *Χείματα*, in *βέρναι* hiems) sunt tumores tempore *Hiberno* in calcaneis digitisque pedum ac manuum exorti: causa est frigus *Hibernum* partem debilitans, & ratione doloris quem infert, sanguinem attrahens: dignoscitur, quod præcesserit ab aere refrigerato, adsit pruritus & dolor cum rubore, tumore & aliquando exulceratione, diuturnum est malum, & quamvis æstate cesset, & hieme tamen recurrit.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Pernionibus.

**F**otus calidi cineris maximè laudatur, quo remedio testatur *Fallopins* se liberatum fuisse à pernionibus quibus singulis annis vehementer affligebatur: fovebat pedes cum ibat dormitum, alii solent inungere locum effectum oleo ceræ & terebinth. frequens usus est, ut excavetur rapa usque ad fundum; infunde ol. ros. & terebinth. an. ʒi. supra calidos cineres ponatur rapa, bulliat ad medietatem & inungantur loca hoc liquore bene calido: sed prius pedes apponat ad fumum aquæ ferventis: si ulcerentur perniones, imponantur unguentum de tutia magistrali, vel etiam diapalma. *Rodericus à Fonseca, tomo 2. consult. 12.*

Consilium dedimus ut rapam ferventem contusam imponeret: vulgares apponunt cutem extractam ac hallece fumo induratum, curantur etiam cum decocto raparum, si in eo immergantur: curantur & appposito diapalma. *Petrus Forestus, observ. 15. & Schol. lib. 5. Obs. Chirurg.*

## SECTIO XVIII.

### De Pede sponte deceduo.

**P**Es puellæ cuidam sphacelatus media linea à sana distinguebatur. Chirurgis

in rescindendo crure difficilioribus, siquidem tenuioris fortunæ puella laboris pretium non posset solvere, natura operarii vices supplevit: pes enim sua spontè secundum lineam à natura designatè ductum, decidit: nullaque hæmorrhagia subsequente, optimè convaluit: quemadmodum mihi testis est. *D. Olaus Wormius* nunquam satis laudandus. *Thomas Bartholinus. histor. 69. cent. 1.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### Pro Peste.

**P**estis (Græcè *λοιμός*) morbus est communissimus, peracutissimus, perniciosissimus & maximè contagiosus ex maligno & occulto spiritibus calorisque nativo tota substantia infestissimo inquinamento ortus, à quo omnium viscerum & imprimis cordis functiones læduntur: tres habet causas, quarum secunda à prima tertia à secunda descendit: prima & primaria pestis causa est iustissima summi Dei ira, à qua promanat illud τοῦ Θεοῦ, quod huic morbo inesse animadvertitur, cuius *Hippocrates* sæpè mentionem facit: secunda causa quæ à prima originem sumit, est malignissimum occultum venenosum & naturæ humanæ infensissimum pestilens seminarium cælitus demissum, quod minima quantitate aeri infusum, instar subtilis cujusdam fermenti sese per aerem dilatat, cumque inquinat; tertia causa est contagium, quod morbi est primò soboles, postea causa, causæ secundariæ seu corpora ad pestem disponentes sunt, malignæ siderum conjunctiones, aeris & cæli maximi ardores & squalores, siccitates diuturnæ, hiemis & veris tepores putridarum rerum foetidissimæ exhalationes, aliæque similes. Pestis symptomata sunt, exantemata, bubones, carbunculi, capitis dolor, phrenesis, sopor; vigiliæ, anxietas: magna virium prostratio, visus turbulentus, cordis palpitatio, linguæ siccitas, vomitus, singultus lumbrici, fluxus alvi, hæmorrhagia narium, mensium profluvium, sanguinis miæctus, sputum cruentum, dolores lateris, hepatis, renum aliarumve partium, licet.



licet febris de essentia pestis non sit, ejus tamen sæpius est comes. Aliquando pestis sine præviis indicibus invadit, nonnunquam etiam signis evidentibus adventum suum prænunciat, qualia sunt, plurima & ferè continua nocturna fulgura, sine pluviis & tonitruis, cælo non nubiloso existente, venti austrini diuturniores, maximæ æstatis fervores, & siccitates diuturnæ, hiemem tepidam & humidam consequentes, avium fuga, insectorum maxima copia, mulierum gravidarum frequentes abortus, morbi epidemici moris, ut varioli, morbilli, febres malignæ & purpuratæ, & dysentericæ contagiosæ; pueri in lusibus suis mortuorum sepulturam agentes: maculæ purpureæ, nigræ, virescentes, violacæ, quocunque morbi tempore appareant, semper lethales esse solent.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Peste.

**A**ntidotum contra pestem quamvis vulgare, attamen saluberrimum tibi mitto, quod etiam pueris ad fabæ magnitudinem, vel paulo amplius tunc exhiberi potest; estque illud quod in sanctuariis *Mubridatis Cn. Pompeius* invenit, de quo eleganter sanè cecinit *Serenus Poeta*. Ego ut in meliorem formam compositio redigatur, accipio pondera æqualia tum rutæ, tum ficuum ac juglandium, & jubo prius unumquodque simplex per se fortiter pistillo ligneo in mortario lapideo contundi alioquin durior sit mixtura, non lenis sed inepta propter ficuum resistantiam, ut experti sumus: mox unumquodque per se contusum, iterum fortiter cum pistillo in mortario commisceo, superinfundendo syrup. de acetos. citri q. s. donec compositio delicatior, meliorque ac mollior fiat, adjectis deinde in fine aliquot grumulis salis etiam tritis: hæc mixtura licet simplicissima ac paratu facillima, saluberrima tamen existit, experientiam enim didici ram in meipso, quam in omni mea familia, hoc tempore pestis, egregiè ad pestis præcautionem valere; qua antidoto tum ego ac mei singulis diebus usi sumus. Ego

omni manè lecto surgens, cum multos infectos inviserem, antequam domo exirem ad parvæ nucis magnitudinem ex hac sequenti confectioe sumebam.

24. Confectionis nostræ superscriptæ de nucibus, ℥i. ss. theriac. antiq. & michridat. an. ℥ii. boli armen. veri, terræ sigill. veræ, an. ℥ss. cum syrup. de limon. & hieme, cum syrup. de cortic. citri, q. s. F. mixtura: aliquando addebam aliqui aq. theriac. *Guidonis*, & iis dabam ad præcautionem in quorum ædibus aliqui peste obissent, ad ℥i. in hieme cum vino, in vere cum aqua scabios. Card. bened. in æstate cum aqua acetos. vel post assumptum antidotum hæc aqua superbibendo. *Petrus Forestus*, observ. 16. lib. 6. De Febribus Epidemicis.

Nos imperavimus Pharmacopæo nostro ut talem pulverem nobis pararet, quo felicissimè usi sumus in peste *Delphica*, tam ad præcautionem quam curationem in multorum salutem, & quanquam hunc pulverem pro maximo secreto habeamus nefas tamen esse duximus ejusdem descriptionem nobis solis retinere, quin potius volumus omnibus communem facere, ut quivis junior Medicus, tum alii omnes ad mortaliū utilitatem eo rectè uti possent, descriptio pulveris hæc est.

24. Rad. dictamn. tormentill. bol. armen. veri, præpar. præparatur autem cum lotionē aq. scabios. terr. sigill. veræ, an. ℥vi. rad. gent. an. rad. petasid. beton. an. ℥ii. santal. rubr. ℥i. ras. ebor. cort. citri, corall. rubr. ossis de corde cervi, rad. zedoar. an. ℥ss. Margarit. puriss. ben. utriusque, an. ℥i. succini, ramentor. unicornu. veri, an. ℥ii. fragmenti s. lapidibus pretios. ana. ℥ss. fol. auri & argenti, an. num. 3. M. F. Pulvis tenuiss. ad præcautionem dabam ℥ii. usque ad ℥i. modo cum vino diluto, modo cum aq. oxalid. vel scabios. aut Card. bened. aliquando adjiciens syrup. de limon. vel acetos. citri, in peste ad curationem dabam ℥i. vel ℥iv. plus aut minus cum iisdem aquis & syrupis, at frequentius tantum dedi ℥i. idque calidè ut sudor provocaretur, interea imperabam ne dormirent saltem per quatuor horas ab hausto medicamento, pauperibus dabam pulverem radicis petasitis cum magno juvamine *Petrus Forestus*, schol. obs. 16. lib. 6.



## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Peste.

**I**llico peste correptis sunt remedia adhibenda, morbi enim malignitas nullas dat inducias, frustra ferè auxilia omnia adhibentur, si malum diem naturalem fuerit transgressum, id quod experientia, pro dolor vidimus, & pro compertissimo habuimus: ubi igitur vires, plethora, ac ætas consentirent, si malum jam primo invasisset, neque septem vel octo horas præterisset, venæsectionem adhibebam: quibus verò malum duodecim horas vel diem naturalem petransisset, nullo modo sectionem venæ adhibendam: experientia enim vidimus, quibus post duodecim horas vel diem naturalem venæsect. fieret, quod comorerentur: ante 7. vel 8. horas sectione venæ tempestivè adhibita melius curabantur: si ætas non admitteret venæsectionem cucurbitulas cum scarificatione satis profunda, collo, homoplatis, lumbis, natibus, cruribus, semper loco proximè affecto apponere jubebam: quæ etiam in pestilentibus febribus à quibusdam magis laudantur: post sectionem venæ, illicò dabam pulverem meum contra pestem, ad sudandum: quo remedio aliquando in ipso initio tumor pestilens si non esset magnus delitescibat, veneno per sudorem foras expulso: ita ut aliis remediis topicis ad tumores opus non fuerit: quod si pulverem vomitu rejicerent, sine mora, abluto ore cum aqua & aceto, alium ingerebam, idque aliquando bis vel ter, donec retinerent, qui enim retinebant facilius evadebant, qui autem rejiciebant, vitæ periculum subibant: interea semper vires corroborabam cum conditis, electuar. putredini resistentibus: epithematis cordialibus nequaquam neglectis; non purgabam ante tertium diem, & hoc rarius, sed in quarto frequentius, idque medicamentis levioribus. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 6.*

Mulier quædam ex peste decumbens sub ala sinistra bubonem habebat: eodem die quo febre pestilenti correpta esset, ad eam acutus, venam è directo bubonis in brachio sinistro aperiri jussi: mox pulverem meum liberantem post duas horas à ve-

næsectione, hoc modo præscriptum exhibui.

℥℥. Pulv. nostri contra pestem, ℥i. aq. acetos. scabios. Card. bened. an. ℥i. M. sudores vestibis coopertæ satis emanabant, secundo die hos syrupos ebibit.

℥℥. Aq. scabios. borrag. acetos. an. ℥ii syr. de limon. de acetos. citri, de succo acetos. an. ℥i. M. F. Julepus, pro ii. dosibus.

Tertio die ita fuit purgata.

℥℥. Fol. sen. ℥iii. rhei el. ℥i. sem. anis. ℥ss. schænanth. ℥ss. infund. per noctem facta prius levi ebullitione, in aq. acetos. ℥v. manè fortissimæ expressioni adde syr. infus. ros. ℥i. M. F. potio brevis: qua alvum ter quaterve deposuit, pro roboratione conditum sequens est præscriptum.

℥℥. Conserv. bugl. borrag. & ros. an. ℥ss. spec. liberant descript. *Cordi* ℥ii. spec. diarrhod. abbat. ℥i. manus ch. perl. ℥i. cum syr. de limonibus, acetos. citri an. q. s. F. conditum, quo continuò utatur.

℥℥. Theriac. ℥ss. terr. lemn. santal. rub. an. ℥i. aq. ros. & aceti parum, fiat ad modum unguenti pro regione cordis; roborat enim, cor munit, & venenum à corde propellit. Interim statim buboni applicari jussimus maturativum simul & attractivum ex rad. lil. alb. enulæ camp. scabios. cœpis simul coctis & contusis adjectis butyro, theriaca veteri, diachylone & ammoniaco in aceto scillino soluto, & galbano simul mixtis; unde factus est abscessus, eoque citius per chirurgum aperto, ac fanie probe effluente, mox adhibitis mundificativis aptis, hæc ipsa brevi convaleuit. *Petrus Forestus, observ. 19. lib. 6.*

Erant in hac peste lenticulæ istæ nigre (quæ quod minutæ erant, & piperis instar nigri vulgus appellabat *Pepercoons*) adeo lethales, ut ubicunque apparerent, non diu post mors subsequeretur; ut sæpissimè observavi, mortem, iis apparentibus, sine errore semper prædicendo. *Idem observ. 36. lib. 6.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Peste.

**N**eminem (quod notandum) eorum qui foniculos in brachiis & cruri-



bus habuerunt (præter unum aut alterum summè cacochymicum) peste obiisse meminî: & proinde præsentaneum præservativum esse tempore pestis cum in aliis multis, tum etiam in memetipso observavi. Ego enim duos habeo, alterum in brachio sinistro, alterum in poplite dextro: in hac etiam *Lausanensi*, nullum eorum qui aut vomitu, aut fluore alvi laboravit, evasisse scio, sic & omnes ferè, quibus vena secta fuit, obierunt. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 22. cent. 4.*

Amuleta ex arsenico, pulvere busonum aliisque confecta, & tempore pestis collo appensa maximam ad præservationem vim habere, non est quod dubites. *Cosmus Slotanus* Chirurgus longe celeberrimus, Præceptor meus, magni semper ea solebat facere, maximamque ac longa eorum se habere experientiam, non rarò mihi affirmavit, eaque cujusvis ætatis hominibus, appendebat. Ego quoque postea non rarò cum fructu is usus sum. Sed quid sentis de usu muriæ in peste? *Novissia* ad *Rhenum* Jurisconsultam quendam cognovi, qui me præsentè retulit se maximo cum fructu domesticis suis, amicis muriam in peste sæpissimè exhibuisse: accipiebat autem muriam carnis porcinae, eamque ad ignem in lebetè coquebat, & probè despumabat, donec ab omni immunditie & sordibus expurgata esset. Postea in vas fictile infundebat, in eoque relinquebat, usque dum refrigisset, tum in ampullis bene clausis eam conservabat, & non nisi post annum exhibebat, quam primùm autem aliquis peste correptus esset; haustum hujus muriæ ei propinabat, & ut in lecto sudaret, ab omni quæ alio potu per aliquot horas abstineret, injunxit. Retulit hoc genus remedii in nonnullis per sudores, in aliis per vomitum, in reliquis per alvum, aut per vomitum & per alvum simul, tum affatim evacuare, ut major parseorum qui illud sumpserint, sanitati restituta fuerit. Ego etsi nunquam periculum fecerim, neq; facere auderem, nisi tuam sententiam hac de re prius intellexerim, attamen in robustioribus corporibus remedium hocce forsitan non omnino rejiciendum esse arbitror, quandoquidem ratione salis, putredini humorum sum-

*Burnet Parte I.*

moperè adversari, nullum est dubium; referat præterea obstructions viscerum, noxiosque humores, nunc per alvum, nunc per sudorem, nunc vero per urinas educit. *Guil. Fabricius Hildanus, observat. 34. ad Sennertum. cent. 2.*

Quid de Lapidis Bezoardici usu in peste censeam, scire cupis? scio quoddam esse qui non usque adeo magni faciunt medicamentum hoc, præsertim in Peste. Ego tamen illud non solum in hoc morbo, verum etiam in Variolis, Morbillis, febribus malignis, imò & in contumacissima quartana, præstantissimum esse, cum in memetipso, tum in ægris meis, non rarò expertus sum. *Guil. Fabricius, Hildanus, observ. 29. cent. 6.*

Non tacebo maximum & præstantissimum remedium, quod & præservat, & maximè curat omnes Peste affectos, de quo multi scripserunt & experientia comprobarunt. Remedium tale est.

℞. Vitriol. alb. præp. (i. e. pulv. & ter infusi in aq. ros. totiesque ad Solem exsiccati add. aliquid camphor.) diætamn. alb. rad. tormentill. an. ℥ii. M. F. pulvis tenuissimus. Detur ad ℥i. cum ℥ii. aq. plantag. vel rosar. vel acetos. manè & vespèri. *Rodericus à Fonseca, tomo 2, consult. 10.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Peste.

**V**irgini cuidam Peste laboranti propinavi illicò sequentem Potionem.

℞. Aq. theriacal. nostræ ℥ii. Elect. de ovo ℥i. M. bibit, nec eam vomuit, quod pro bono signo habetur: multumque postea sudavit. Sudore peracto, jussi ut cochl. i. vel ii. syr. de limon. cum æquali portione syr. de acetos. citri, permixti, per se, vel cum aqua cocta diluti, biberet, sæpeque ut reficeretur, repeteret: jusculeque efficacia & congelata sumeret. Sequenti die bubo in inguine apparebat, anthraxque paulò subtus in femore erupit; denuo igitur expulsivam hanc Potionem illi propinavi.

℞. Aq. theriac. nostræ ℥vi. Julep. ros. ℥i. syrup.



syrup. de limon. ℥ss. de agreſta ℥ii. M. bibit, rurſumque ſudavit. Sudore peracto, tab. diamarg. frigid. ſumpſit. Epithema pulſum & cordis regioni tale cum ſerico cher. meſino, admotum fuit.

℥. Aq. roſ. ℥ii. aq. ſcabioſ. acetof. an. ℥i. aq. meliſſ. acet. roſ. an. ℥ss. pulv. diamarg. frigid. ℥ss. ſucci pomor. ℥ss. M. ſæpe iteretur; anthraci cataplaſma hoc impoſitum.

℥. Fol. ſcabioſ. pulpæ ficuum, an. ℥ss. contund. adde ol. lil. ℥ss. M. Cum adhuc periclitaretur, Potionem cordialem, & quæ veneni vim infringeret talem exhibui.

℥. Aquæ theriac. bugl. ſcabioſ. calend. ſyrup. de agreſta, an. ℥ss. pulv. diamarg. frig. ℥ss. M. ad ſuppurandum bubonem, cum ad ſuppurationem tenderet, hoc cataplaſma præſcripſi.

℥. Herb. malv. M. i. flor. chamæm. p. i. ficuum ℥ii. coq. Piſtentur, adde pulv. rad. alth. ℥ss. farin. ſem. lini & ſcenu-græc. an. ℥ii. vitell. ovor. num. 2. emplastr. diachyll. diſſolut. in ol. lil. ℥i. ſal. ℥ii. F. cataplaſma. Poſtea ſenſim cœpit convaleſcere. *Felix Platerus, obſerv. lib. 2. pag. 333.*

Aqua theriacalis noſtra quæ tantopere profuit, ita paratur.

℥. Rad. tormentill. lappæ maj. pimpinell. ſuccifæ, valerian. maj. an. ℥iv. rad. imperator. angelic. diſtamn. gentian. ſerpentar. an. ℥i. cæpar. mundat. à cortice, nuc. virid. ſcabioſ. verben. calend. cum flor. rutæ, acetof. Card. bened. an. M. ii. camphor. ℥iſs. aq. vitæ ℥i. vini albi generoſi menſ. iſs. ſeu lbvi. acet. roſ. fac. ℥ii. Mithrid. ℥i. deſtillantur: doſis maxima ℥ii. *Felix Platerus, obſerv. lib. 2. pag. 340.*

Ad præſervationem ſequentibus Pilulis per vices utantur.

℥. Aloes rhei, an. ℥ii. agar. myrrh. an. ℥i. rad. gentian. zedoar. an. ℥i. croci, ℥ss. pulveriz. & cum ſyr. roſ. ſolut. cum ſena, fiat maſſa Pilul. *Felix Platerus, obſ. lib. 2. pag. 399.*

Presbyter *Vesantinus Ydeleyus* ſæpius Peſte infectis inſerviens in ſuo Libello *De Peſte*, mirè propria experientia inductus, ad præſervationem laudat urinam propriam, mane, jejuno adhuc ſtomacho,

ſemper poſt quintum aut ſextum diem, ad cyathum unum epotam: cujus multis nauſeoſi remedii vices ſupplere poſſet baſſamum urinæ, à Chymicis tanquam remedium *εὐπνόριον* deſcriptum. Pulvis ſequens *Hiſpaniarum* Regis ſecretum eſſe dicitur.

℥. Myrrh. ſelect. maſtich. bol. arm. terræ ſigillat. lign. aloes, cariophyll. maceris, croci an. part. æq. F. Pulvis: capiat ſingulis matutinis. Amuleta pro præſervatione magni quoque ſiunt, ut avellana perforata eoſq; ut nucleuſ eximi poſſit, repleta argento vivo, obturataque & collo ſuſpenſa: quod mire juvare à *Marcilio Ficino* exemplis adhibitis probatur; quàm aliqui appenſam, ita ut cordis reg. o-nem attingat, eſſe volunt. *Felix Platerus prætic. tom. 2. cap. 2. pag. 163. 166. 171.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### De Peſte.

**I**mprimis valent quæ ſimul malignæ putredini reſiſtunt, & materiam ad cutem pellunt, atque ſudores movent, ut hic Pulvis.

℥. Sem. napi, citri an. ℥i. C. C. offis de corde C. an. ℥ss. zedoar. ℥i. M. F. Pulvis: de quo detur ℥i. in aqu. ſcabioſ. cum ſyrup. de ſucco ſcordii: nec dediſſe hunc pulverem ſemel ſatis eſt, ſed continuò in cibo & potu, & ſerculis aſpergatur Pulvis margarit. corall. terr. ſigillat. & bol. armen.

*Hippocrates* ab *Athenarum* Urbe Peſtem quæ ex *Æthiopia* in *Greciam* pervasiſt, incenſis ſylvis, & ignibus factis odoriferis depulit. Siccus enim aer ſive conſtitutione cœli ſicca, ſive arte ſiccior redditus, admodum progreſſioni hujus mali adverſatur. Aer ergò non modo omni excrementorum publicorum amotione, verum etiam igne & fumo publicè privatimque omni ſtudio purgandus, hoc rectè quibuſdam fieri videtur, ſi ex tormentis bellicis majoribus Pulvis ſulphureus incenſus vespertinis ac matutinis horis, multis in locis emittatur, eſſeque rationi conſentaneum apparet, neque experimento caret: privatim verò ſuffitus ex ligno & baccis juni-



juniperi, rorismar. lauri fol. & absinthio fieri possunt.

Si cum agro nobis est negotium; faciem ex tada vel lychno cereo cum resina facto, ut uberior sit flama, præferre utile est. Faciem autem atque manus aceto rosac. aqua mixto abluere debemus, ori atque naribus admovenda spongia magna quæ prius aceto rosac. in quo ruta cum uno & altero grano camphoræ affusa aq. rosac. macerata fuerit, imbuta est: ea semper nobiscum circumferenda, nocturnumque ad lectum collocanda erit. In ore quidam continuò gestant rad. zedoar. sive angelic. in aceto macerata; sed cortices citri exsiccati tutissimi sunt atque suavissimi: vel isti orbiculi in ore retineantur.

℥. Sem. citri excortic. ℥iii. cortic. citri sic. lign. aloes, santal. citrin. an. ℥i. cariophyll. zedoar. nuc. mosch. an. ℥i. sacch. ℥i. aquæ ros. moschata in qua parum tragacanth. solvatur q. s. F. orbiculi parvi. Quidam cordis regionem isto unguento inungunt mane.

℥. Theriac. opt. ℥vi. croc. camphor. an. ℥. cum succo limon. F. linimentum. Sunt qui existimant venenum veneno pelli, & corpora ad venena posse assue fieri, ut *Carpus Chirurgus Bononiæ* faciebat, qui Arsenicum in linteolo circa cordis regionem gestabat Præterea tutissimum semper est curare, ut corpus excrementis vacet, & quantum fieri potest, sit à superfluis humoribus mundum, quod præstabunt pilulæ *Russi* ad ℥i. in septimana bis sumptæ. Sed mihi magis istæ probantur.

℥. Aloes rosat. ℥i. myrrh. croci, an. ℥. agar. troch. ℥ii. rhei. el. ℥i. bol. arm. ℥. ii. lign. aloes, dictamn. alb. margarit. an. ℥. i. M. & cum succo citri, F. pil. parvæ, sumantur bis in septimana ad ℥i. Hoc etiam in loco medicamentum planè regium, quod in pervetusto Libro scriptum, ac valde commendatum reperi, vere quæ commendari posse potu, recensebo.

℥. Vini malvatici mens. viii. destillentur suavi igne per cineres octies: huic spiritui vini injiciantur rad. tormentill. serpentar. ana. ℥i. angel. zedoar. ana. ℥. m. cort. citri opt. cinnam. ana. dr. i. stent. ita per biduum vel triduum in vitro benè clau-

so; locoque calido, deinde abjectis istis prius expressis, ac per linteolum triplex fufis, infundantur hic spiritus vini vitro in quo imponantur hæc linteolo subtili ligata.

℥. Spermat ceti recentiss. ambr. el. rhei opt. an. ℥ii. mosch. puri ℥. vas optimè claudatur & divinum medicamentum usui servetur. Ejus autem gutta una æstivo tempore cum sacch. rosato ad præservationem sumitur; hieme verò gutta una cum mica panis deglutitur. Hæc etiam aqua in præservatione & curatione *Uratilavia* & multis aliis profuit.

℥. Carlin. zedoar. gentian. ang. tormentil. boleti cervini, an. ℥ii. trium santal. ℥i. camph. ℥ii. mosch. ℥i. theriac. opt. mithr. præstantiss. an. ℥iii. affund. ℥iiii. spiritus vini, ubi per mensem integrum in loco calido vitro bene clauso steterint, colentur per triplicem pannum lineum, & in alio vase optimè clauso aqua ista usui servetur: hæc præstantissima aqua etsi ad præservationem cum aliis commista, ut cum aqua card. ben. scabios. scordii, sumi potest, tamen in curatione magis est illius usus. Hiberno tempore guttæ duæ vel tres sumi possunt.

Præservativa quibus alios scilicet usus esse, scio, plurima rectare possem, sed duo Electuaria quibus me bis in Pestilentia beneficio *Dei*, conservavi, alternis diebus ad magnitudinem castanæ de iis sumens subiiciam.

℥. Succu cydon. ℥iii. conserv. borrag. ros. an. ℥i. mitrid. opt. ℥. Margarit. dissolut. ℥i. hyacinth. spec. elect. de gemmis, liberant corall. dissolut. ana ℥iv. extract. card. bened. scabios. veron. scordii, an. ℥ii. M.

Alterum Electuarium.

℥. Maceris ℥i. iniiciatur aceto fortissi. vini opt. vel quod melius est, limonum succo per viginti quatuor horas, siccetur rursus, & minutim incidatur, huic adde theriac. opt. ℥. conserv. borr. ℥ii. cort. citri conditi ℥i. sem. citri excortic. card. ben. rec. an. ℥i. spec. liberant. ℥i. extract. xyloaloes ℥. M. Pro curatione nihil esse efficacius duabus istis aquis hætenus propositis certissima mihi experientia edoctus persuadeo; prima aqua da-



tur ad ℥i. cum aqua card. scabios. vel scord. addito pulvere sequenti ad ℥i.

℥. C. C. unicornu, an. ℥i. terr. sigill. ℥℥. margarit. splend. smaragd. ignem sustinentis, an. ℥℥. camphor. gr. vii. lapid. bezoar. gr. v. Altera aqua datur infectis ab ℥i℥. ad ℥i℥i. cum iisdem aquis. *Ioh. Crato. Consil. 28. lib. 5.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Peste.

**C**ertum est Deum sibi reservasse soli re. medium contra Pestem. Multa usu tot annorum didici, sed nulli rei præter divinæ benignitati commendare salutem meam in tali periculo possum: quare de expertis remediis in hoc casu non libenter scribo. Pueris nihil utilius quam armena cum pauxillo tormentill. & corticibus citri in pulverem redactis, qui inspergatur cibo, pultibus & potui: quoties exeundum est domo particulam corticis citri in ore gestare profuerit, quisquis ex poculo suo bibat, non cum alio: Famulis aliquot baccae junip. in aceto maceratæ dentur eas mastigent: odorent etiam acetum cui camphora & ruta sit injecta. In curatione plurimum potest camphora cum theriaca vel mitridat. sed ne fortissimo quidem homini ultra tria grana camphoræ dentur, nec qui infectus est ulli remedio soli fidat, sed singulis sex horis mutet. *Jo. Crato. consil. 23. lib. 4.*

Certissimo experimento didici infundere supra ambram optimum vinum malvaticum destillatum, & diligenter obturare, & manè aliquot guttas cum pane sumere, esse excellentissimum remedium præservativum in Peste. *Ioh. Crato. consil. 30. lib. 4.*

℥. Cortic. citr. santal. lign. aloes, an. ℥℥. styrac. calam. ladan. an. ℥i. gall. mosch. alipt. mosch. an. ℥m. amb. gris. gr. iii. M. & cum mucilag. tragac. Forbiculi redolentes manibus gestandi, quam minimum in publicum prodeat, & cum exeundum est, corticem citri, vel angelicam in aceto præparatam in ore gestet, licet vera Pestis antidotus soli Deo nota sit, ideoque divinum auxilium præcipue imploran-

dum, ad præservationem tamen imprimis utile puto elect. de nucibus hoc modo factum.

℥. Nuc. jugland. numero 20. carie. ping. numero 15. rad. tormentill. pimpinell. bacc. lauri, an. ℥i℥. cortic. citri galang. macis in aceto præpar. ℥i℥. fol. absinth. rutæ, scabios. an. M. i. flor. borrag. M. ℥. C. C. bol. armen. terr. sigill. an. ℥ii. Myrrh. el. ℥i. Croci ℥℥. cum ℥i℥i. mell. despumat. F. Electuar. de quo sumat manè, vel cum in publicum prodit, ad magnitudinem castaneæ. *Jo. Crato. consil. 20. lib. 1.*

Cibi omnes aceto, succo limonum, & citrior. condiendi, potui quoque citriorum cortices imponendi, & cum cibus sequens Pulvis in aceto aut vino dissolutus usurpandus.

℥. Margar. alb. præp. ℥ii. corall. rubr. præpar. bol. arm. Orient. an. ℥i. cinnam. el. ℥i℥i. sacch. q. s. F. Pulvis. Caveantur vina fortia, dulcia, & crassa. Ad evacuationem putridorum & excrementitiorum humorum sufficiant Pilulæ sequentes ad ℥i. semel in septimana.

℥. Aloes ℥vi. Myrrh. ℥i℥i. Croc. ℥i. rhei. el. ℥ii. agar. troch. ℥i. cariophyll. sem. citri, an. ℥i. tormentill. santal. rubr. an. ℥i℥. bol. arm. or. ℥i℥i. Camphor. ℥℥. pulveriza. Excipiantur syrup. acetos. citri, & F. massa pilul. Antequam domo quis egrediatur, sub sinistra mammilla hoc unguentum illinendum est.

℥. Theriac. opt. ℥i℥i. croci, camphor. an. gr. xv. cum s. q. succi limon. & acet. rosac. F. linimentum. *Jo. Crato. consil. 17. lib. 3.*

Pluribus, duobus istis electuariis profui, quorum primum quod electuar. liberantis nomino, ita fit.

℥. Conserv. ros. opt. ℥vi. Conserv. nymphaeæ ℥i℥i. Mithrid. opt. theriac. an. ℥vi. pulv. tormentill. sem. citri, an. ℥i℥. Margar. præp. ℥i℥i. Succin. alb. præp. hyacinth. præparat. an. ℥iv. bol. arm. præpar. ℥i℥i. croci torrefact. ℥℥. Extract. angelic. ℥℥. succ. cytonior. ℥i℥. M. F. Electuarium.

Secundum voco Elect. Salutis, & ita fit.

℥. Macis præp. in aceto vel succo limon. ℥i℥. Mithrid. opt. ℥i℥i. theriac. el. ℥ii. Xyloaloes ℥i. spec. liberant. *Ferdinand. di. terr. sigill. pulv. succini alb. præp. an. ℥i℥. Cor.*



Cortic. citr. sicc. & pulv. ℥i. Conserv. ros. borrag. nymph. an. ℥i℥. cum syrup. acetos. citri, q. s. F. Electuar. Pro curatione illud subijciam in gratiam vulgarium, infectis utiliter dari tanaceti decoctum.

24. Flor. tanaceti, q. s. bulliant in aq. & aceti æquis partibus optimè; bonum subinde haustum ebibat; camphora adjecta idem efficacius reddit. *Ioh. Crato consil. 46. lib. 7.*

Imperator *Ferdinandus* hoc tabulatum magnificet, & multis communicavit, & ex eo Liberantis Divi *Ferdinandi* dicitur.

24. Cinnam. el. ℥ii. ros. rubr. sem. portulac. ras. ebor. coriand. præp. an. ℥i℥. ras. C. C. sem. citri, excortic. arantior. limon. an. ℥iii. lign. aloë, nuc. mosch. marathri, anis. sem. bombac excortic. serici crudi, granor. juniper. in aceto, rad. tormentill. rad. herb. tunicæ, rad. morsus diaboli, an. ℥ii. dictamn. cret. & vulgar. scabios. borrag. bugl. an. ℥℥. oss. de corde C. ℥ii. bol. orient. præp. vn. ij. santal. trium, an. ℥i. margarit. smaragd. saphyr. fardonii, hyacinth. granat. an. ℥℥. pulveriz. omnia S. A. & facc. dissolut. in aq. acetos. q. s. F. confectio in tabulis quadratis possunt quovis tempore usurpari.

*Maximiliano* Secundo Imperatori laudatiss. memoriæ à me præscriptæ sunt hæ tabellæ, quas multi magni Nominis & Dignitatis Viri sibi plurimum profuisse testantur.

24. Bol. armen. in aq. scabios. lot. ℥℥. margarit. præp. corall. præp. an. ℥iv. sem. Card. bened. excortic. citr. excortic. an. ℥℥. hyacinth. præp. ℥ii. smaragd. præp. ℥i. spec. liberant. terr. sigillat. C. C. an. ℥ii. fol. auri, numero xv. ambr. gr. vr. sacch. ℥℥. in s. q. aq. ros. & cinnam. dissolut. addita conserva ros. parum. F. confectio in tabulis quadratis.

Ad curationem prodest hoc Electuariū.

24. Scord. ℥iii. tormentill. dictamn. alb. zedoar. gentian. angelic. cariophyllat. an. ℥i. croci, camphor. an. ℥ii. Pulveriz. omnia seorsim, & commisceantur, & aspergantur aq. card. in qua dissolv. theriach. ℥ii. & cum syrup. de succo scord. & cardui, F. electuar. detur in aqua cardui ad dr. i. vel plus etiam efficaciam ejus possem verissimis testimoniis ostendere, & fa-

cili sumptu paratur, & facile est. *Ioh. Crato, lib. De Pestilentis Febris curatione.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Peste.

**A** Udi verò quo de venæsectione in hoc casu ex *Victorio Faventino* celeberrimo practico memoriæ causa aliquando annotavi, in febre (inquit) pestilentiali, si non apparuerint signa sanguinis abundantis, cavè à phlebotomia sicut à diabulo; si verò ea apparuerint cum robore virium & ætate commoda, si tu non phlebotomabis; sanguis justus erit super te & filios tuos. *Ioh. VVolfangus, epist. 10. ad observ. 33. lib. 7. observ. Greg. Horstii.*

Genuinum Alexipharmacum pestis apud Deum solum repositum cum *Cratone* credo, & cum *Heurnio* ingenuè fateor, quod in peste nihil pestilentius multis remediis. *Gregor. Horstius pract. lib. 7.*

Ad præservationem sumatur singulis matutinis ad minimum cochl. j. sequentis antidoti.

24. Nuc. jugland. excortic. num. 10 ficum num. 10. fol. rutæ, M. ii. bacc. junip. M℥. concisis & contusis affunde aceti vini opt. q. s. ad eminentiam duorum aut trium digitorum; stent per 24 horas quibus verò amara non sapiunt, vel etiam qui colicis doloribus & suffocatione matricis conflētantur, item prægnantes & pueri, hi omnes ex rotulis his meis contra pestem mane duas, interdum aliquando unam deglutiant.

24. Cortic. citr. ℥ii. Ossis de corde C. Margarit. præp. an. ℥℥. Saphyr. præp. gr. iii. ol. macis gr. ii. ol. cinnam. gr. v. spec. liberant. ℥. m. diarrhod. abb. dr. ii. sacch. clarific. ℥bi. aq. scord. Card. bened. an. ℥ii. aq. cinnam. ℥. m. coq. sacch. ad aq. consumptionem & F. rotulæ, s. a.

Si de infectione cuidam constat, ille mox de antidoto mea, quæ sequitur, accipiat dr. i. m. in aceti vini cochl. vr. quod si vero infra viginti annos constitutus sit,umat. ℥i. in cochl. iv. annos autem natus decem, ℥. m. in cochl. iii. quem asiditas aceti offendit, misceat acetum cum aq. Card. bened. sudoremque provocat pro virium



tolerantia, ad minimum usque ad unam horam, ad summum verò ad tres; sudoremque faciei semper abstergat, lectumque mutet, viresque syrup. acetos. citri, & post semihoram jusculo jucundo restauret.

24. Pulv. scord. sem. rutæ gentian. an. ℥iv. theriac. mithridat. an. ℥i. m. Conserv. ros. ℥i. cum syrup. acetos. citri q. s. F. Electuar. dosis ut supra, quivis antidotum tum hoc ad duas vices in promptu habeat, ut si prima vice illud vomitu rejecerit, aliam dosim substituere queat, præterea duabus horis post cibum, aut septem horis post invasionem pestilentiae antidotum meam, aut theriacam secunda vice reassumat infectus, denuò sudet, viresque ut antea reficiat tandem ad reliquiarum pestilentium omnimodam discussionem altero vel tertio die singulis sex horis, sumat duas aut tres ex rotulis nostris contra pestem supra descriptis.

Accidit verò ut peste correpti communiter in principio somno profundo indulgeant, quod malignitas ad cor retrahitur, ipsumque infecti in summo vitæ discrimine versantur, quo tempore ruta & acetum naribus adhibeantur, omnique ingenio somnus excutitur, prorupte bubone, opus est accersere Chirurgum, qui localia modo debito administret, in ejus defectu, præparentur sacculi ex fol. alth. Mii. rad. alth. & lil. alb. an. ℥ii. fol. agrimon. scord. an. M. β. ficuum num. 2. & duo decocti alternatim parti affectæ imponantur, in promptu quoque sit diachyl. compos. post fomentationem tribus vicibus in die, applicandum, post emollitionem bubonis aliqualem, accipiatur cepa theriaca impleta, & affata, quæ contusa cum ficubus, melle & farina permisceatur & adhibeatur: qui si apertus fuerit, huic mixturæ vitellus ovi adjiciatur, corrosiva & incisoria non nisi summa necessitatis urgentia in actum ducantur. Anthraces egregiè tritico à sanis masticato & illito mitigantur; si deinde saphyrus ipsi eminus admoveatur, & in orbem circumtrahatur, carbunculos eisdem tandem maturat, & ad suppurationem perducit, ambesioneque inhibet unguentum meum, quod hoc modo se habet.

24. Terebinth. lot. in aq. ros. ℥ii. butyr. non saliti ℥iii. theriac. opt. mithrid. an. ℥β. vitell. ovi numero 2. M. F. linimentum, tempore bubonum & exanthematum, rotulæ meæ alexiteriæ, & viribus non obstantibus, purgationes lenitivæ in usum veniat. Deus omnium verè resipiscentium Christianorum clementissimè misereatur. *Jacobus Horstius, observ. 28. lib. 7. observat. Gregor. Horstii.*

Præter communia consueta, magno cum successu in principio syrupus emeticus exhibeatur, quem describit *Angelus Sala* libello suo de peste, vocatque oxyfacch. vomitivum contra pestem; cujus descriptio talis est.

24. Vitri antimonii hyacinthini more *Mathiol.* præp. & subtiliter pulver. ℥i. cinnam. el. zedoar. lign. aloes resinosi opt. sem. angelic. an. dr. ii. croci angelic. opt. dr. m. aceti rosac. ℥xvi. omnia hæc vitro capaci infundantur, optime claudantur, ut nihil expiret; & digerantur in *B. M.* per viginti quatuor horas. Postea balneo refrigerato coletur diligentissimè, vel per chartam bibulam filtretur, ut fiat pellucidum, postea tantum sacch. cum aq. ros. solvatur quantum est pondus prædicti liquoris, coque saccharum ad consistentiam confectio- nis man. ch. & postea calidum adhuc pedentim cum dicto liquore permisce, & servetur ad usum, longo enim tempore conservatur, quanquam verò à dr. ii. ad ℥vi. vel ad summum ad ℥i. author hoc ipsum medicamentum præscribat, nos tamen observavimus, tutò in adultis ℥i. dari posse, primis viis hoc modo per tolerabilem vomitionem purificatis, citius alia medicamenta malignitatem per sudorem expellentia retinentur. Medicamentum est tutissimum, cujus beneficio plerique convalescerunt, qui primis statim diebus, eod. cachocymiam circa primas vias evacuerunt; superaddito postea diaphoreticorum usu: inter quæ duo potissimum experta notavimus, nimirum aquam alexipharmacam *D. Plateri* (de quasi supra subsect. 4.) & bezoardicum minerale, cujus efficaciam non tantum in febribus malignis, sed etiam in ipsa peste præsentissimam observavimus; cujus ℥β. ad summum, ita malignitatem pestiferam expugnasse recordamur.



mur, ut anthraces & bubones postea natura protinus separaverit, oxyfacchar. etiam *Sala*, ipsius infantibus minimè noxium est, modo cum prudentia Medica præbeatur. *Greg. Horstius, obs. 30. lib. 7.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

*Pro Peste.*

**C**elebratissimus, & in Xenodochiis multa laude conspicuus est hic pulvis *Dri. Hesse* adscriptus.

℥. Sacch. Cand. ℥iii. Zinzib. alb. ℥ii. Camphor. ℥i. M. F. pulv. dosis ℥i. ex liquore convenienti, ego pro zinzib. zedoariam substituerem, sanè camphora mirabile est & efficax pestis alexiterium, & meo quidem iudicio plus tempestivè data virium obtinet, quam vel pretiosa quælibet medicamenta bezoardica, attamen in magnis capitis & ventriculi doloribus hac cautè utendum: hoc insigniter, ac momentanea quasi vi semel admirabunde profuisse vidi.

℥. Smaragd. præpar. lap. bezoard. or. an. gr. vii. hyacinth. præp. gr. iii. M. F. pulvis, correctus fuit à me ex liquore convenienti, mulieri cuidam pestilenti febre correptæ, omnia alia remedia averfanti: quo assumpto, abactis sævorum symptomatum seditionibus, & in salutem converso morbo, evasit. Inter approbata pharmacæ quibus debellandi facultas à Deo concessa est, primas tenet aqua illa theriacalis Clarissimo *D. Stapedio* inventore, cujus tam in præservatione, quam in curatione tanta vis est, ut nobilia quantumvis medicamenta alia, multum superet, ac longo post se intervallo relinquat, ejus hæc est descriptio.

℥. Theriac. Andromach. mithrid. Damocratis an. ℥vi. pulv. elect. de bolo apud *Robertum* bezoard. apud *Nicolaum*, an. ℥ii. aq. vitæ per balneum bis destillatæ, vini malvatic. aceti rutac. an. ℔i. succ. rad. pimpinell. limon. an. ℥vi. simul in balneo rorido destillantur lento igne, ac stillaticio huic liquori in phiala vitrea conservato immisce ther. veteris ℥vi. maneatque sic simul omnia, ut in fundo theriaca quiescat, hæc aqua quo vetustior eo melior

existet, datur adultis ℥i. & ut ab ejus assumptione sudent præcipitur, reiteraturque die sequenti, & tertio, quousque bubo aut carbunculus erupuerit, aut is ipse maturior factus vel apertus sese expurgaverit, junioribus dimidia dosis suffecerit; quandoquidem verò hæc aqua ob magnam theriacæ quantitatem satis pretiosa existit, ideo ejus author aliam hac viliores altruxit, quæ sic habet.

℥. Conditum pro familia *Stapediana* ℔ii. aq. vitæ semel in balneo extractæ, vini malvat. aceti rutac. succ. rad. pimpinell. limon. an. ℔i. è balneo liquor evocetur; cui permisceantur theriac. veter. ℥iv. resideatque per quietem in fundo theriaca, datur paulo majore pondere si corpora robusta sint, alioquin æqualis usus fuerit, conditum pro familia *Stapediana* hoc modo concinnatur.

℥. Granor. juniperis ℥vi. crac. ping. num. 12. nucleor. nucl. jugland. ℥viii. Conserv. flor. borrag. buglos. an. ℥ii. Theriac. veter. mithrid. opt. an. ℥ii. rad. tormentill. gentian. pimpinell. angelic. zedoar. an. ℥i. cum syrup. de limon. F. conditum, ex rad. bardanæ & vincetoxic. unà cum corticibus fraxini liquor sudori eliciendo per commodum Distillatione provocatur, quem aquam bardanæ compositam nominare consuevimus: medicamentum sanè insigne quo Chimici ad Medici *Genevenses* summa cum utilitate usi sunt, seseque ejus assumptione à pestilentis morbi insulcibus tutos reddidere, ea sic componitur.

R. Rad. bardan. rec. vincetoxic. rec. cortic. median. fraxini, an. ℔ii. minutim incisa infundantur horis vigintiquatuor in vini albi odoriferi & aceti rutac. an. ℔v. postea destillantur in *B. M.* addendo post distillationem liquori in excipulum transfuso, ol. sulph. acidi rectificati q. s. pro manifesto acore; adjiciendoque in singulas libras camphoræ in nodulo ligatæ ℥ss.

Cognita sunt mihi ac jamdudum perspecta sulphur. ac vitrioli in peste pellenda remedia; quæ in diræ hujus luis emollitione supremam laudem merentur, cum nulla sit putredo, cujus vires horum spiritus non frangant, nulla infectio quam illi non superent, nulla humorum depravatio, quæ



per illos non corrigatur; sanè ( ut liberrimè loquar ) si mihi vitriolatorum medicamentorum usus vel interdiceretur, vel inhiaberetur, ego ad pestis curationem nunquam vel saltem inermis accederem, pro præservatione hoc vino ego usus sum.

℞. Fol. absinth. Miß. scordii Card. bened. an. M. i. dictam. cret. Miß. cortices citri ℥ss. radic. pimpinell. ℥i. incis. grosso modo M. F. nodulus, qui immergatur vino, de quo potetur haustus unus post sumptum jentaculum. *Raymundus Mindererus, libr. De pestilentia, cap. 15. & 20.*

Nihil æquè prodesse visum est, acetum meum theriacale, mox inter initia cum tantillo diascordii vel theriacæ ad eliciendos sudores exhibitum. Plurimi namque solo hujus aceti usu Deo juvante restituti sunt. Descriptio ejus hæc est.

℞. Confect. orvietan. ℥i. diascord. ℥im. theriac. ℥i. rad. angelic. contrayery. enul. pimpinell. tormentill. scorzonæ. dictam. alb. petasit. an. ℥vi. fol. scord. rutæ, millefol. an. M. i. flor. calend. tunic. an. M. m. cortic. fraxin. citri, an. ℥m. bacc. junip. ℥issm. macer. zedoar. an. ℥iii. camphor. ℥ii. Croci Orient. ℥i. Myrrh. el. puriss. ℥m. aceti ex succ. rub. Idæi q. s. M. stent in infusione loco calido bene tecta, donec extrahatur tinctura. *Baldassar Tirmans Cas. 32. lib. 8.*

## SUBSECTIO NONA.

### Pro Peste.

**E**Go sacculos ex arsenico hic pro multis ordinavi: etiamsi *Crato* noster valdè repugnet. Multi proceres in aula cordis regioni applicatos continuò absque ulla noxa circumferunt. Retulit mihi quoque nuper Chirurgus Aulæ nostræ jam senior, se in multis pestilentibus constitutionibus fuisse, & sua manu infectos plurimos tractasse; semper tamen à contagione immunem permanisse, quod secum gestaverit radicem plantag. maj. sacculo inclusam, & cum filo regioni cordis adaptatam, ut res coletur pulveris laven-

dulæ aliquid admiscere solet; & hinc inde distribuere, quicquid sit, sæpe etiam parvis gratia rebus inest. *Petrus Monavius, epist. 37. lib. 2. epist. & consil. Cratonis, &c.*

Insigne præservativum paratur ex sacch. candido & spiritu salis dulcis hoc modo.

℞. Sacchar. cand. albi pulv. ℥iv. imbebe cum spiritu salis dulcis ad formam elect. cujus dosis omnibus diebus mane jejunò ventriculo dr. i. omnem putredinem abarcat, & ventriculum cum visceribus reliquis in optima conservat dispositione.

Spiritus Salis dulcis sic fit.

℞. Spiritus vini & spiritus salis, an destillentur ter vel quater, unientur inseparabiliter & edulcescent. *Job. Hartmanus, practic. Chimiatri. pag. 366.*

Antidoti non inutilis hæc forma esto.

℞. Theriac. el. ℥i. bol. armen. ver. cum aq. Card. bened. aliquoties loti dr. ii. spec. diamargar. frigid. ℥iv. sem. citri, scordii scabios. an. ℥i. ras. monocerot ℥i. cum syrup. de succo acetos. F. conditum, com aq. card. bened. usurpandum. Celebratur quoque in morbis pestilentibus non inidoneum Canonici cujusdam, qui contra Pestis sævitiam eo usuram haud vulgarem fecit apud Principes, & Civitatum Respublicas insignes, quod sic se habet.

℞. Spec. lætific. *Galenii*, terr. sigill. an. dr. i. bol. armen. præp. ℥m. theriac. ℥iii. conserv. ros. borrag. bugl. an. ℥i. syr. viol. q. s. F. electuarium. *Io. Vierius lib. 1. Observat. obs. 3.*

Quidam, cui demandata erat cura tertiz partis Urbis Peste afflictæ, omnes ferè curavit vomitorio composito ex dr. ii. cuiuslibet vitrioli mellis ℥ii. & aq. ℥vi. simul mixtis, quod exhibebat statim, ac apparebant aliqua signa morbi imminantis, vel præsentis; ita ut vix decem aut duodecim obierint in suis partibus cum in reliquis pauci evaderent, quod denotat vires & necessitatem vomitus in tali casu. *Simeon Iacoz. observat. 99. centur. 4. Observat. Riverius.*

Cum Pestis sævissima grassaretur *Monspeli* anno 1630. duo ægrotantes Peste correpti, ad me miserunt, ut quid acturi essent, præciperem. Ego in memoriam revocans me legisse apud *Paracelum* muriam encrasicholorum piscium (*Anchoes* vulgò di-



dictorum) nonnullos Peste affectos liberaſe; conſilium dedi, ut eandem ſumerent. Unus muriæ ſcutellam ſumpſit ſolam, alter eam urina permixtam, & uterque liberatus eſt, oborta evacuatione vehementi per vomitum & ſeceſſum. *Samuel Formius, obſerv. 37.*

In eadem Urbe, tres ejusdem familiæ, maritus nempe, uxor & ſoror illius, Peſte correpti ſunt, ſtercus proprium cum propria urina diſſolutum & linteo colatum hauſerunt i unde graviffimus vomitus & alvi fluxus obortus eſt, & omnes à Peſte immunes evaſerunt *Samuel Formius, obſ. 38.*

Chirurgus *Hispanus*, cognomento *Guardiola*, Xenodochii infectorum Præſectus in obſidione *Oſtendana*, oſtendit, mihi fruſtrum ſuccini rubentis, quod ſibi toto triennio dixit unicum fuiſſe Xenexton, cujus arcanum erat; quod ſcilicet ad ſeptem pulſus principales fuiſſet conſrictum uſq; calorem: nimirum utrinque ad tempora, ad carpos, malleolos, & ad ſiniſtram mammam. Ego vidi illum ſemper præſervatum, cæteris coadjutoribus è medio ſuolatis. Vidi etiam frequenter venenatorum vulnecum, diſſoluto in ſpiritu vini ſuccino, factas ſanationes alioqui penitus deſperatas. Nil ſtomacho, inteſtinis, nervis, imò & cerebro gratius eſt ſuccino in vini ſpiritu reſoluto.

*Hibernus Butlerus* me conſcio *Londini* aliquot millia à Peſte curavit: juffit enim Buſonem magnum menſe *Junio* poſt meridiem captum, tibiis ſuſpenderem propè focum, illique ſubtenderem patinam è cera flava, tandem à triduo ſuſpenſionis Buſo evomuit terram & aliquot infectas ambulantes, nimirum muſcas nitentibus alis ſua viridi colore quaſi deauratis, mox autem à vomitu Buſo obiit; nec ante triduum evomuit; licet pronus penderet. Dixit autem mihi quod ſat remedii haberem curandis 40. millibus Peſte correptorum, promiſitque mihi ſe oſtenſurum rei cardinem; ſed repente in exilium proſcriptus abiit, ſaltem ego has ſordes vomitus rejeſtas, itemque exſiccatum Buſonis cadaver ſeparatim in pulverem tundi juſſi; & cum tragacantho trochiſcos formavi: quibus feliciter uſus ſum tam ad præcautionem

Peſtis, quamejuſdem ad ſanationem. Dein *Julio* menſe decreſcente Luna veteres Buſones cepi, quorum oculi ſcatebant albis vermibus, nigrisque capitibus prominentibus, adeo ut uterque oculus totus in vermes transformatus eſſet, forte quinquaginta numero, in ſingulo oculorum foramine. Vermes erant denſè compacti, quorum capita, foris eminebant, & quoties aliquis egredi conaretur, ſtatim Buſo appoſita manu egreſſum vetabat. Hos Buſones ad vomendum coactos, ut dixi, per ſuſpenſionem reperiri, dare Excellentiſſimum Zenexton. Vermes enim in patinam ceream deciduos, ſimulque cum eo quod per vomitum rejecit in trochiſc. parvulos redegi, addito cadavere Buſonis, & cerea patina, geſtati autem trochiſci ad mammam ſiniſtram, arcebant contagium, & loco infecto alligati, ſtatim virus extrahebant, erantque trochiſci promptiores ac validiores, ſi in uſum aliquoties recidiſſent, quam recentiores.

*Hippocrates* omne vinum quod in Peſte dabat, ſuffiebat hoc modo, poculum ſtricti colli lychnio ardentis ſulphuris ſuffiebat, vinum ad tertiam partem aſfundeſcit, ac poculum arctè concludum agitabat, dudum conquaſſando ſurſum & deorſum; donec vinum omne gas ſulphuris in ſe combibiſſet. Dabat etiam vinum ſalfum fervidum, non autem tepidum, ut nauleam compelleret, & ſudores potenter ciceret; addebatque ſulphur, ad gr. xxiv. ut ſuo velut odore Peſtem interimeret, quia ſal abſtergit, a putredine præſervat, & ſulphur venenum cohibet, hinc ſudorem præſcribebat triduo ad minimum quotidie autem ſudabant bis, & vice ſingula per diei ſextantem, ſi poterant: primis diebus plus ac deinceps conſequenter minus. Inter ſudandum tollebat omnem potum, peracto ſudoris termino, hordei cremore cibabat, & pro potu exhibebat vinum græcum picatum, cui inerant pauca grana ſalis, & ſulphuris, folia autem aſari, aceto macerata, calida ſuperponebat Buboni, plantis pedum, & manuum, quæ poſt horas 12. ſingulas, ſepeliri juſſit. *Hispania* rarò Peſte affligitur, ex eo quod utatur picato vino, cum enim



enim doliis careant; plerumque vina coriis picatis conservant. Odor picis suffumigio plurimis provinciis Peste contaminatis familiaris. Hodie magni sit antidotus *Orvietani* pro Peste. *Ioh. Helmontius*, tractatu *De Peste*.

Memini me haud infrequenter in *Germania* Rusticos quosdam observasse, qui quotquot in campis Bufones deprehenderent, eos mox stipitibus infixos Solis estu torrefacerent, pellemque servarent: cum itaque facti rationem instantius vrgerem, dixerunt se pelles Bufonum exsiccata in tempus Pestis conservare; hoc enim vnicum ijs domesticum contra Pestis virulentiam remedium superesse; siquidam ulceri pesti, ferro applicatis pellibus bufonis, statim se extracto veneno à morte liberari. *Athanasius Kircherus lib. De Peste*.

## SUBSECTIO DECIMA.

### *Pro Peste.*

**A**ncillæ peste correptæ cum duobus anthracibus incipientibus, præscripti hunc haustum sudoriferum, à quo bene & tota ferè nocte sudavit cum magno levamine.

℞. Extract. card. bened. sal. absinth. an. ℥i. sal. card. ℥β. theriac. ℥i. aqu. nostræ theriacal. ad. car. ben. an. ℥i. ol. vitriol. gt. xv. M. E. haustus.

Ad sitim hoc julapium præscripti.

℞. Aq. card. bened. ℔i. aq. scabios. acetos. an. ℔β. syr. de succo citri ℥ii. ol. vitrioli q. s. ad gratum acorem. M. F. Julep. statim post meridiem reiteratus fuit prior haustus sudoriferus, à quo cum rursus optimè sudasset, anthrax qui in medio ossis sterni erat se extendit ad latitudinem semidaleri. Imperialis, tunc pulticulam nostram ad carbunculos illi imponere, & ter in die renovare jussi, quæ ita se habet.

℞. Rad. consolid. maj. sicc. fol. scord. sicc. an. ℥ii. rad. althææ sicc. farinæ, sem. lini cribratæ, pollinis farinæ tritici, an. ℥β. F. pulvis subtilis, cui affunde aq. q. s. coq. aliquantulum ut mucilagines solvantur, & compositio ad pulticulæ crassioris formam deveniat, cui adde mell. terebinth. unguenti Apostol. an. ℥iii. picis liq. un-

guenti basilic. an. ℥ii. vitell. unius ovi, croci or. ℥i. M. interdum addebantur theriac. ℥ii. hanc pulticulam ob eximiam utilitatem in frequenti usu habuimus, & ex multis tentatis nihil invenimus, cum quo carbunculorum separatio & curatio citius ac melius perageretur, super lintum pinguiusculè extendebatur, & imponebatur, anthraces tandem è vicinis partibus separati sunt; quibus extractis, unguentum mundificativum de apio cum unguento Apostol. mistum ter quaterve impositum fuit. Deinde cum unguento aureo cavitatibus carne repletis, & emplastris ad cicatrizationem perductis, agra convaluit.

Aqu. theriacalis qua semper cum scilicet. simo & admirabili successu usi sumus ita parabatur.

℞. Rad. Imperator. petasitid. angelic. carlin. valerian. an. ℥iib. rad. enul. camp. cort. arant. sicc. an. ℥iii. fol. scord. absinth. an. ℥ii. card. ben. ℥iii. flor. ros. rubr. ℥β. stach. ℥iii. bacc. junip. ℥iib. granor. cardamom. min. ℥v. cinnam. el. ℥i. hæc omnia sumantur siccata, conscind. simul & grosso modo contendantur, iisque affundantur in cantharo lapideo vini albi Rhenani vel Gallici tenuiss. ℔x xii. aq. ros. ℔ii. vase bene obturato stent in infusione decem diebus, tunc addantur hæc virides herbæ & recentes conscisæ, fol. rutæ, M. vi tana. ceti, M. iv. meliss. rorismar. pimpinell. an. M. iib. Maneant simul in infusione adhuc per octo vel decem dies quotidie baculo commovendo: postea affunde succi citri ℔ii. & stent adhuc per quatriddum, postea super ignem leviter semel ebulliant, & colentur, & in torculari fortissimè exprimantur; colatura expressa destilletur in B. M. per Alembicum vitreum. Hæc est nostra aqua theriacalis, quæ maximarum est virtutum, quæ non tantum veneno pestilenti resistit, cor à malignitate defendit, & sudores movet, verum etiam debilibus jam labescentes vires mirro modo corroborat. Mirum dictu quam insignes ejusdem affectus in hæc Peste, aliisque febribus malignis comperti fuerimus. Illud quod post destillationem in fundo cucurbitæ remanet, adjecta aqua card. ben. attenuandum, & per char-



tam emporeticam colandum est, quæ colatura lento igne exsiccanda est ad extracti consistentiam, quod usui servandum. Hoc extractum Magistrale vocavimus *Isbrandus Diemerbroeck. hist. 1. lib. 4. cap. 3. & 13. & 5. lib. 3. De Peste.*

## SUBSECTIO UNDECIMA.

### Pro Peste.

**M**ulier quædam triginta annorum Peste correpta, carbunculum habuit in latere dextro supra costas spurias, adebat etiam febris cum maxima anxietate & inquietudine, sumpsit varia sudorifera & antidota, quibus non obstantibus morbus in eodem statu continuavit usque ad diem quartum: tuncque menstruorum fluxus copiosior accessit extraordinarium periodi tempus, quo cum mihi indicasset, statim tale sudoriferum exhibui.

24. Corall. rubr. præp. terr. sigillat. C. C. usti, an. ʒi. diascord. ʒi. aqu. theriac. aceti vini rubri, an. ʒi. M. pro uno haustu. Jussi etiam ut sæpius de die comederet particulam hujus conditi.

24. Spec. diatrium santal. ʒii. troch. de terra sigill. ʒi. flor. sulphur. ʒi. conserv. anthos. ʒiii. conserv. ros. rub. ʒv. diascord. ʒi. syr. granat. acid. q. s. F. electuar. his duobus medicamentis fluxus ille paulatim rursus imminutus est, sed tamen ante diem quintum non omnino substitit, carbunculus impositione pulticulæ nostræ ad anthraces; brevi separatus, & ægra pristinae sanitati restituta est, in hac peste *Noviomagensi*, menstruorum fluxus criticus (qui alioquin salutaris esse solet) periculosus erat, nam multoties observavimus, si in ipso principio antidotis astringentibus (statim enim ad ea confugiendum erat) paulatim non cohiberetur, quod postea ut plurimum nullis remediis coerceri posset, sed ægras dejectis viribus citissime occideret. *Isbrandus Diemerbroeck histor. 10 lib. 4.*

Dominus Coiberry Nobilis *Anglus* cum *Noviomagum* venisset, simul ac urbem ingrederetur, insolitum quendam fœtorem percepit, à quo ipsi nausea facta fuit, & caput doluit. Postridie manè somno

expergestus valde nauseabundus fuit, & dolorem cum dura tensione in parotide post aurem sensit, ipso pestem metuens. summo manè ex massa piluli. *Russi*, quàm semper secum portabat, quatuor pilulas confecit, easque deglutivit: à quibus post sex horas alvus ter quaterve dejecit & simul etiam cessavit dolor post aurem. Meridie tamen prandere non potuit, circa vesperam rursus tres quatuorve spontaneos secessus habuit, quos magna cordis anxietas cum debilitate insecuta est, sequenti nocte magnus alvi fluxus una cum febre supervenit, mane consilium meum expetijt. Exhibui hoc sudoriferum hora sexta matutina.

24. Terr. sigill. bol. arm. corall. rubr. præp. C. C. usti, an. ʒj. extract. rutæ ʒi. salis scord. ʒj. theriac. diascord. an. ʒij. aqu. theriac. ʒij. M. F. haustus, hinc per tres quatuorve horas fortiter sudavit cum levamine, & alvi fluxus usque ad meridiem substitit, statim post meridiem alvus rursus commota est, tunc eundem haustum rursus assumpsit & multoties illo die ad sequenti nocte particulam hujus conditi comedit.

24. Troch. de ter. sigill. flor. sulph. C. C. usti, an. ʒj. spec. diatrium santal. ʒij. diascord. conserv. ros. rub. mixtæ cydon. an. ʒij. syrup. granat. acid. q. s. M. F. conditum.

Ad sitim usus est hoc julepo.

24. Aq. card. ben. lbj. aq. scabios. lbj. conserv. ros. ʒi. rob. acatiæ ʒij. ol. vitriol. q. s. ad gratum acorem M. & post horam colentur per linteum, & fiat iulepus. Verum his nil imminutus est alvi fluxus. Postea sudori feruntali modo præparatum est.

24. Radic. tormentill. ʒß. ras. santal. rubr. ʒi. cortic. granat. ʒj. fol. pimpinell. virid. M. m. rutæ, card. ben. & scord. sicc. an. p. j. sem. card. plant. g. an. ʒj. flor. balaustr. rosar. rubr. an. dr. im. aq. quant. sat. F. S. A. decoctio ad lbj.

24. Hujus decocti ʒij. troch. de terra sigill. ʒi. C. C. usti ʒj. theriac ʒi. diascord. ʒß. M. F. haustus, quo assumpto, fortiter sudavit, & alvi fluxus aliquantum imminuivise est, qui tamen statim post sudorem equè magnus reddit: atque tunc primum sanguinolentæ dejectiones, postea sanguis



guis purus absque dolore defluxit, hinc viribus totaliter prostratis, ipsius animæ effluvium insecutum est. *Mercurialis* & alii magni Medici ex decreto *Avicenna*, Pestis curationem à purgatione incipiendam esse statuunt, verum minimè recipiendum est illud consilium; cum ratio & experientia contrarium doceant. Ratio quia salutaris naturæ motus hoc pacto interturbatur, ac vires maximè dejiuntur: Experientia, quæ hætenus docuit omnes ægros pestiferos, qui purgantia sumpserunt, subsequenti ut plurimum lethali diarrhœa, vel exitiali virium prostratione, fuisse extinctos. Si parva pilul. *Ruffi* quantitas in prædicto ægro naturæ motum adeo interturbaverit, ut ad veneni expulsionem per commodas vias reduci non potuerit, quæ non mala à purgantibus fortioribus metuenda sunt; *Isbrandus Diemberbroeck* *K. hist.* 13. lib. 4.

## SUBSECTIO D VODECIMA.

### *Pro Pestis præseveratione.*

**A** Peste afflictum invisendum vocatus, simul ac cubiculum ejus intrarem, statim pessimum excrementorum (alvi enim fluxu laborabat) fœtorem naribus percepi, à quo graviter affectus fuit. Post brevissimam visitationem domo rursus egressus, illicò me vertigine, nausea, & cordis anxietate affectum sensi, ita ut pestilens contagium me concepisse non dubitarem, quapropter postpositis omnibus negotiis, statim me domum contuli, atque tabaci optimi quinque sexve fistulas fumifunctione exhausti; cujus usu omnia prædicta symptomata ita penitus evanuerunt, ut ne minimum quidem maliamplius sentirem, tunc rursus foras prodire, & reliquos ægros invisere volens, theriaca 3j. præsumpsi, atque ita deinceps optimè valui, illud ipsum durante hac Peste mihi ter quaterve accidit, ut statim simulac me aliquam contagionis labem concepisse arbitrarer, eodem modo ad copiosorem tabaci usum confugiens, liberatus fuero. Tabacum pro insigni præservativo remedio semper habui, eiusque fumum in ipso conceptæ luis principio mihi aliquoties in-

signiter profuisse comperi, referunt etiam quondam *Londini* ab horribili peste illic sæviente immunes fuisse omnes illas domus in quibus tabacum vendebatur. verum *Noviomagi* illa felicitas omnibus tabaci Mercatoribus non contigit; nam aliquos ex iis peste correptos fuisse novimus, in ædibus tamen primarii tabaci Mercatoris *Thoma Pieters Angli*, qui numerosam liberorum, famulorum & ancillarum, familiam alit, neminem, quod scio, pestis invasit præter unam ancillam, quæ & ipsa brevi convaleuit. *Isbrandus Diemberbroeck* *hist.* 17. lib. 4.

Durante hac peste, mirabantur multi, quomodo fieri posset, ut ego, qui quas libet ædes infectas, & omnes ægros indiscriminatim invisebam, à tanta malignitatis & contagii violentia non læderet, ac proinde meum vivendi ordinem plurimi diligentissimè considerabant, quem ut omnibus cognitus esse possit, hic describam, omnes animi vehementes motus, quantum poteram, inhibebam ac fugiebam, intrepidus plane vivebam, nec pericula, nec mortem, nec aliud quippiam timens; mihi eodem redibat, ædes ne, infectas, an non infectas adirem, nec terrori, nec iræ, nec mœrori locum concedebam, si fortè meipsum aliquomodo contristatum perciperem (quod tristi illo tempore interdum fieri non erat alienum) tunc tribus quatuorve vini haustibus assumptis cor exhilarabam; atque ita citissimè omnem melancholicum luctum fugabam, in victu utebar cibus euchymis, abstinendo studiosissimè ab iis quos aliis noxios fuisse animadverteram, quales erant carnes porcine & haleces, semel aut bis in septimana cubitum iturus deglutiebam unam aut alteram pilul. ex antipestilentialibus nostris potus mihi erat cerevisia ordinaria, ut & vinum tenue album, quo interdum usque ad hilaritatem, nunquam ad ebrietatem utebar, mane inter horam quartam & quintam ægros invisurus, nihil omnino assumere poteram (quod tamen ipsemet valde improbabam) nec cibi, nec potus, nec medicamenti, sed ad omnia nauseabam, ac proinde præmissis piis precibus, me meamque sanitatem Deo optim. max. commendabam, & solummodo aliquot grana cardamo.



damomi minoris, masticando, jejunus primo ægros invisebam usque ad horam sextam, tunc vel theriac. vel diascord. pauxillum, vel corticem aurant. conditam, vel ut plurimum rad. heleni condititria quatuorve frustula assumebam, post horam septimam frustum panis, cum butyro & caseo ovillo viridi jentabam superbibendo haustum cerævisiæ, inter octavam & nonam sæpe quidem, sed tamen quotidie, data occasione, haustum vini absinthitis bibebam, circa decimam: si per otium liceret, fistulam unam tabaci exsugebam: statim post prandium duas tresve fistulas, nec pauciores post cænam; sæpe etiam intermediis horis post meridiem hic illic, ubi occasio dabatur, adhuc duas tresve fistulas sumebam, si vero ab ægrotorum fœtore me vel tantillum alteratum sentirem, statim postpositis omnibus negotiis quantumvis necessariis, qualicunque diei hora foret, duarum triumve tabaci fistularum fumum suctione trahebam, nam ut verum fatear, tabacum pro primario præservativo in peste semper habui, neque aliud melius pro ordinario usu hactenus inventum fuisse existimo, dummodo illud sit melioris notæ ex maturioribus foliis in funes coactum. *Isbrandus Diemerbroeck K. cap. 12. lib. 2. De Peste.*

### SUBSECTIO DECIMA TERTIA.

#### De Peste.

**Q**uidam pestilenti febre, absque ullo externo pestis signo, correptus est, cum summa anxietate, siti & capitis dolore, statim in ipso principio Advocatus Chirurgus, sanguinis uncias aliquot extraxit, æger inter Chirurgi manus animi deliquio correptus est; quod cum diutius perduraret, advocor, inveni ægrum sudore frigido perfusum, prædixi mortem; intra horæ quadrantem expiravit. *Forestus* scribit in peste *Delphensi* venæsectiones profuisse, si intra duodecim vel viginti horas celebratæ fuissent, alias noxias fuisse, nos verò in hac peste omnes venæsectiones etiam in ipso morbi principio factas valde noxias fuisse non tantum in prædicto agro, sed in plurimis et-

*Burnet Parte I.*

iam aliis observavimus. *Isbrandus Diemerbroeck hist. 33 lib. 4.*

Vir quidam fortis peste correptus vomuit, capite doluit, ingenti sopore & cordis anxietate pressus est, hunc haustum statim exhibui.

24. Theriac. ℥i. salis communis ℥ij. acet. ti vini fortis. ℥ij. M. F. haustus, ab hoc assumpto per sex horas vigilare jussi, vehementer sudavit, simulque bubo in inguine dextro erupit. Postridie eodem haustu reiterato, iterum copiosè sudavit, atque ab anxietate & capitis dolore in totum liberatus fuit, duo carbunculi satis magni sinistrum femur invaserunt; quibus à Chirurgo s. a. tractatis æger brevi convaleuit, tumore inguinis sensim evanescente, eodem modo cum scelerissimo successu multis pauperioribus in ipso morbi principio exhibui solius acet. ℥ij. vel iv. cum salis marini p. j. & optimè sæpius profuit, interdum etiam theriac. dr. j. admiscui, sed notandum, non omnibus promiscuè acetum esse exhibendum; ab ejusdem usu arcendi sunt illi qui per pectore aliquod vitium habent, ut sunt tussiculosi, astmatici & similes, qui ab aceto pessimè afficiuntur. *Isbrandus Diemerbroeck, hist. 42. lib. 4.*

In hac peste semper lethale signum erat si fonticuli exsiccarentur, nec ullus, quod scio, evasit, in quo exsiccatio hæc visa fuit. *Idem annotat. ad hist. 51. lib. 4.*

Et sit *Niddanus*, *Simonius*, *Mercurialis*, alique Clarissimi Medici amuleta ex arsenico & sublimato confecta, tanquam divinum remedium ad pestis præservationem extollant, nos tamen in hanc pestem nemini illa profuisse animadvertimus. *Idem annot. ad hist. 44. lib. 4.*

Fonticulus ad præservationem à peste inter præstantissima subsidia semper habuimus & multoties observavimus, si quid veneni jam intus conceptum esset, illud per eisdem vel spontè naturæ, vel medicamentorum ope insigniter & citò evacuatum fuisse. *Idem annotat. ad hist. 110. lib. 4.*

Eques quidam audax & maximè temerarius, peste cum magna febre ac debilitate correptus, bubonem in inguine, tres anthraces in corpore habuit, à quibus omni-



bus malis, cum optimè summi Dei auxilio sanatus esset, & jam rursus foras prodiret, nullas Deo gratias egit, sed satis impiè gloriatus fuit; se ipsa peste nequiorè & fortiorè esse; imò se neque pestem neque diabolum curare, audivit. Altissimus, impia impiissimi hominis verba, quid sit, tandem quinta circiter post perfectam sanationem hebdomada, rursus de novo peste correptus est: & ante diem sextum victrici pesti duram subjecit cervicem: multi negant illos qui à peste semel evaserunt, rursus peste corripi posse inter quos est *Matthias Untzerus*, qui & has subjungit rationes, quia humo ille pestifero veneno somitem substernens habilem, totus in illo morbo evacuatus & dissipatus fuit, ut non facilè contagionis labem suscipere queat vel quia cor antidotis in prima peste munitum porrò qualitate alexiteria perfruitur, qua venenum pestis à se longe propulsare valeat, vel quod cor pugnae priorum cum pestilenti veneno assuetum, nunc iteratos crudelis tyranni insultus eludat, minasque despiciat, verum has omnes rationes ipsa experientia facillimè evertit. *Isbrandus Diemerbroeck. hist. 37. lib. 4.*

*Avenzoar* inter alia commendat, adversus pestem odorem urinæ hirci à proprietate: & ego cum annis præteritis pro *Cæsaris Maximiliani* valetudine *Viennam* ivissem, & quadam die pranderem apud Reverendissimum *Hungaria* Cancellarium, vidi in ejus ædibus servari magnum hircum; hujus reicum causam quæsissem, mihi responsum, est id fieri pro Peste. Unde adnotavi hoc remedium *Avenzoar* etiam tempestate nostra alicubi adhiberi: sed magis laudo, ut odores grati quærantur: auctor est libro primo *Herodianus*, *Commodum* Imperatorem, quo tempore maxima illa peste *Roma* affligebatur, Medicorum consilio, *Laurentum*, ubi silvæ è lauro complures viscebantur, secessive: valere enim plurimum ad evitandum aeris contagionem, tum odores laurorum, tum ipsarum amœnitatem umbrarum; addit, in ipsa quoque urbe de medicorum sententia plerosque unguentis suavissimis nares atque aures opplevisse, suffituque & odoramentis usos esse, quod mea-

tus sensum odoribus illis occupati non admittant aerem tabificum, vel admissum majore vi longe superent.

Commendari cauteria ad præservandum à peste, invenio apud *Nicolaum Florentin.* sed dicam quod ego vidi experientia; possum testari, me innumeros extinctos vidisse, nec unquam vidisse, quemquam qui haberet cauterium, præter unum tantum, atque ille erat sacerdos. Interrogavi etiam hac de re multos Medicos, qui testati sunt neminem se vidisse quod quidem argumentum esse potest, hoc genus auxilii magnoperè conducere, & summa cum ratione; quandoquidem per cauteria, tanquam per cloacas, continuo ichores pravi & putredini obnoxii educuntur. *Hieron. Mercurialis, lib. De Peste, cap. 22. & 23.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

### Pro Peste.

**I**Mprimis celebranda venesectione necne merito ambigendum: quam revera hic pede sicco transissem, utpote exitiosam, nisi quidam, nescio audaciæ magis, an imperitiæ per vicaces, non solummodo parca manu sanguinem mitti curassent, sed & iteratis vicibus copiosam ejus educationem usque ad deliquium nuper suassent.

Siquid veterum autoritas, siquidem Neotericorum experientia valeat, si denique calculum nostrum adjicere liceat. Phlebotomia in vera & exquisita peste semper suspecta, ne (quod abunde comprobatur) una cum cruore purpureo anima effluat; tam ingens discrimen concomitari experti sumus hanc evacuationem: proinde satis mirari nequeo qua acti insania hi vitæ humanæ proditores, carnificinam exercentes, deliramenta sua alieno damno firmare audeant.

Verum non is sum qui inficior, phlebotomiam in febre maligna & pestilentiali aliquandò locum habere, & re deplo-rata ob nimium mensium vel lochiorum fluxum revulsionis gratia consulto tentandam; summo tamen sit piaculo illam in peste vera, & exquisita, celebrare; unic-



custantum ( uti memini ) omnium quotquot, agrè evasit, qui dominante peste nuper a sanguinis detractionem subivit.

Quod ad vomitionem attinet, crapula præcedente, in ventriculo saburra noxiorum humorum congesta, urgente nausea, ore etiam amaricante, consentiente thoracis, & cervicis conformatione, in morbi infantia prodesse queant emetica remedia; inter quæ illa eminere videntur quæ ventriculum abunde nimis sarcinatum citri catharsin subvertant, viz. syr. *Diasari Fernelii*, syr. scabios. compos. oxym. scilicet. sal. præsertim vitrioli, &c. Antimi præparationes non æque arident.

Qui de meo consilio serum cerevisiale, foliis cardui, scordii, ulmaria, petasitidis, &c. incoctis, addito oxymelite simplici, nullo licet emetico prævisio affluenter hausere, levamen inde, & emolumentum illico experiebantur.

Sin verò vomitio urgeat symptomatice, omnino exulant remedia emetica ( agyrtarum more qui theorematum medicinalium ignari ) symptomata promoveat, quæ vires ob irrita conamina prosterne possent, mineram morbi etiam aliunde in ventriculum alliciant, illamque inibi figant, unde mox vomitionis impetus immaniter procellosi, nullo quidem artificio compescendi.

Solvenda alvus necne, res quidem magis nodosa, & inter Medicos dissentionis plenior: reverà pestium quarumcunque varietas, temperamentorum dissonantia, morbi complicationes variae, tempestatis incertitudo, quò minùs regulas tradam hac in re generales, quàm maximè obstant.

Ego autem alvo suppressam satius duxi illam glandibus educere, quorum usum purgationi intestinorum commodiorem, & tutiorem comperi.

Cæterum medelæ cardos ex omnium quotquot Authorum, & practantium placito, & consensu, in hoc præcipue vertitur; nimirum in citissima veneni pestilentialis expulsionem, quàm mirè, & unicè præstare valent Alexipharmaca: scæcibus itaque prius ablegatis, ad hæc correpti, tanquam ad sacrum Asylum, confugiant.

Inter simplicia vegetabilia, supereminent radices Asari *Virginiani*; sive Serpentariae *Virginianæ* Dosis radicum in alkool. v. e. a. reductarum à gr. iv. ad ℥ii. ex vehiculo idoneo.

Secundum jure merito locum merentur radices Contrayerva, è quibus etiam lapis oppido celebris conficitur, cujus descriptionem paulò post tradam: dos. harum radicum subtilissimè pulveriz. à ℥i. ad ℥ii. ex aq. angelicæ, scordii, calendulae, vel vino, &c.

A me autem gratitudo exigit, ut pauca hic de zinzibere subnectam, cuius pulverem; atque condituram, multoties cum faustis agrorum rebus exhibuimus; nempe hunc ad provocandam diaphoresin, atque illam ad vim contagii pestilentialis præcavendam.

Ad nos misit trochiscos ex *Anglia Americana* vir dignissimus, è carne anguis cauda crepitante, nostro idiomate *Kattle Snake*, confectos, à quibus commodi, & levaminis plus ægris, quàm à nostris domesticis obtigit.

Ex voto etiam cessit spir. cornu cervi ad ℥ii. vel ℥i. ex aq. epidemica.

Spiritus hic prout flammifer, aëturum se per universum corpus diffundere potens est, ratione volatilitatis salinae qualitatem pestis salino malignam corrigendi vim habet.

Quotiescunque res in angustum adducta ad mineralia confugiendum; quæ vi, & armis hostem pestilentialem foras projicere perhibentur, inter quæ agmen ducunt bezoarti cum minerale, sulphuri auratum, atque aurum vitæ, &c. præparationes ex aliorum chartis depromantur.

Sequuntur Medicamenta quædam composita.

#### *Spiritus Theriacalis.*

℥l. Rad. asari *Virgin.* ℥ss. contrayerv. ℥i. torment. scorz. petasit. an. ℥i. p. sem. cardui, calend. angel. citri an. ℥iii. quibus præp. affunde spir. vini, aceti opt. an. ℥ss. dissolve theriac. yen. ℥ss. adde croci Ang. ℥ii. M. indantur organis vitreis, & post octiduanam super cineres digestionem, destilla in rostro alembici suspenden-



dendo camphoræ ℥iii. dof. ad cochl. v. vel vi.

*Oleum Diaphoreticum.*

℥. Salis absinthii, sine scordii, five rutę ℥iii. flor. sulphurister, quaterve subl. ℥i. junip. ℔i. invicem M. per biduum calore mediocri benè occlusa relinque, dein per retortam destilla, etiam altera vice destilla, digerendo per biduum, addendo salis absinthii ℥i. dof. ad cochl. i. vel ii. ex aq. angelicæ, vel scordii, saccharata, ad olei v. a. e. commixtionem.

*Acetum Anti pestilientialem.*

℥. Radic. scorzon. *Hispan.* chelidon. maj. an. ℥ii. contrayerv. ℥i. angelici torment. an. ℥i. p. fol. scordii, melissæ, scabiosę, an. M. ii. summit. rutę p. ii. dictamni cret. M℔. flor. sambuci, calendulæ, an. p. iii. gr. junip. ℥ii. raf. c. c. eboris an. ℥i. sem. rutæ, cardui, citri an. ℥ii. protulac. ℥v. cinnam. opt. ℥℔. carioph. ℥iii. theriac. Androm. ℔℔. quibus f. a. præp. affunde aceti ex vin. albo acerrimi ℔v. vitro opt. obturato digere per triduum bis, terve de die conquassando, tum cautè distilla, suspensis camphoræ, & croci an. ℥ii. in rostro alemb. dof. ad cochlear. v. vel sex.

Ceterum quia correpti plerumque erant nauseabundi, & ad vomitionem proclives, sicuti & potabilium quantitas ventriculum farcinando, jus subversionem irritare consuevit; remedia solidæ formę locum habent, & hac ex parte potiora videntur, vomitu nimirum agrè excutienda, ut pote ad hærentia ventriculi parietibus, velut iis agglutinata: hujus generis præ manibus sit massa sequens, unde ex tempore boli conficiantur.

℥. Elect. de ovo minerali ℥i. theriac. Androm. ℥℔. pulv. serpentar. virgin. ℥v. cuchianellæ ℥iii. croci pulveriz. ℥℔. cum syr. è succo melissophyl. vel citri coagmentetur massa, dof. ad ℥ij. addendo salis cardui, absinthii, vel scordii ℔j. plus, minusve pro symptomatum vehementia.

*Clariff. & toto terrarum orbe Celeberr.*  
Teodori de Mayerne. preparatio  
*Elect. de ovo Mineralis.*

℥. Ovum vulgariter ut in *Pharmacopœia Londin.* præp. de quo fume & sem. sinapios vel erucæ an. ℥j. antidoti Saxonicæ ℥℔. lapid. prunellæ dr. v. Antimonii diaphoret. fixissimi, & croci metallorum simul ustorum ℥ij. pulv. scordii, rutæ, zedoar. an. ℥i℔. theriac. ven. veteris ℥iv. philonii *Turneri* ℔vij. gr. ij. M. & cum spir. theriac. ℥ij. & melis despumati q. s. F. Elect. molle, dof. ad ℔iv. vel ℥ij. ad vires præsidii hujus promovendas adjiciantur corda, & jecinora vj. viperarum v. a. e. præpar. *N. B.* in hac similiter; ut & in cæteris antidotis, diuturna fermentatio perquam necessaria, ut se invicem penetrant, & intimiùs associantur tot simplicia.

Sin verò alvus fuerit nimis cita, & lubrica, commodissimè exhibeatur lapis contrayerva, qui sic conficiendus.

℥. Pulv. radic. contrayerv. rec. ℥j. serpentar. virgin. ℥i℔. Extract. rad. angelic. tormentill. an. ℥ij. pulv. c. c. Philosophicè calcin. chelarum cancrorum præpar. pulv. corall. rubr. an. ℥i℔. Antimoni. diaphoret. vel potius diaphoret. *Jovis* ℔ij. cuchianellæ dr℔. croci ℔j. aliqui addunt lapid. bezoar. Orient. ℔ij. Ambra grif. ℔℔. cum gelatina spoliolum serpentum, vel c. c. fingantur globuli f. a. exsiccandi, dof. ad ℔ij. vel ℥j. è vehiculo idoneo, &c.

Huc insuper spectant *Orvietano*, cujus confectio hæc.

℥. Cardui bened. totius eupatorii maj & min. an. ℥℔. Scordii, aristolochiæ utriusque, an. dr. v. Viperinæ, h. e. echii, gentianæ, bacc. junip. bistortæ an. ℥j. Bacc. lauri, tormentillæ, dictamini albi an. ℥℔. Carlinæ, angelicæ, an. ℥i℔. Rhabarb. imperator scorzon. *Hispan.* valerianæ an. ℥℔. morsus diaboli, calami aromat. an. ℥iv. Theriac. Androm. opt. ℥ij. Corda, & jecinora duodecim viperarum, terantur terenda subtilissimè, & cum s. q. mellis despumati fiat Elect per tres menses fermentand. dof. ad dr. j.

*N. B.*



## SECTIO XV.

## Pro Peste.

## Remedia Externa:

N.B. Hæc & cōsimilia medicamenta, siue *Galenica* siue *Spargyrica* quorum præparatio, & digestio non citius, quam cœquantur asparagi, absolvi queant, ut sint in promptu, & præmanibus expedit, ille enim τὰς μηχανὰς κατὰ τὸν πόλεμον καὶ ζῆν, qui in morbum peracutissimum arma parat, haud ante spatium semestre acienda.

Insuper non minùs sudoris, quam typorum qualiumcunque spiramentis ad vires multum prostratas, & propè deficientes focillandas (modo non impediatur fastidium) idonea administrari alimenta jussi, viz, panem vino ferè inebriatum, ova sorbilia (nisi stomacho aliena erunt) succo citri, granatorum, vel aceto sambucino immersa, item aquas Analepticas, iuscula, gelatinas, atque etiam vina generosa.

Jusculi præparatio, viz, & pulli galinacei brodio, incoctis rad. scorzon. fol. pimpinell. ulm. lujul. summit borrag. rasc. c. dactylis cum frustulo pans albi & cantil. lo croci in nodulo, pinguedo non separanda, nisi diarrhœa urgente, vel nauseante stomacho: è dicto jusculo quandoque emulsio parabatur, viz. cum sem. citr., plantag. & amygd. excorticatis addendo sacchari perlati q. s.

*Aqua de Cordibus Cl. Mayerni prius laudati.*

℞. Radic. carlinæ ℥vj. zedoar. scorzon. imperator. gentian. vincetox. valerian. tormentill. bistort. petasitid. dictamni, bardan. pimpinell. totius an. ℥iv. fol. cardui oxytriphyll. scordij an. M. v. ulmar. scabios. mors. diaboli, meliss. pentaphyll. menthæ, rutæ, bugloss. flor. calendul. hyperic. an. M. iv. limones & aurant. cum corticibus an. numero 20. flor. salviæ, rosm. an. M. ij. corda vervecina num. 6. corda viper. numero 20. vini generos. *Hispan.* lbxx. infusione debita peracta, fiat distillatio cauta in *B.M.* hujus aqua dos. ad cochl. iv. vel v. dulcor. (si ita visum) cum sacchari perl. q. s. *Nathanael Hodges. De Peste sect. 7.*

**I**Nter præsidia externa eminent Ψυδράνια siue vesicantia; horum frequens: & prospera applicatio, de eorum usu controversias varie agitata diremit.

Vesicantia partibus variis admovebantur, viz, vertebri colli, brachiis versus humerum, cruribus, & suris internis: vasa cuiuscunq; generis calefacientia liquores reddentia magnè obsequaces, & fluxiles, naturæ segnitiei extimulantia, & unæ cum serosa colluvie, noxiisque humoribus per ulcerum portas sat amplas miasmata pestifera vi quid inexpugnabili eductentia, ut hic taceam à partibus nobilioribus revulsionem insigniter præstitam, atque derivationem à vicinis.

Ut celeriter, ut certo remedia vesicantia excitent vesicas, sint acerrima omninò expedit: massa sequens in praxi nostra fuit admodum familiaris & efficax.

℞. Picis navalis ℥v. galbani colat. ℥i. ceræ ℥i. quibus simul liquatis, & ab igne semotis, adde pulv. cantharidum præp. ℥vii. vel ℥i. fermenti veteris, sem. ameos an. ℥iii. euphorbii ℥i. cum aceti scillit. q. s. incorporentur, assidue agitando quousque cogantur in emplastri massam: eventus ab hujus emplastri applicatione semper exsententia cessit; parte cui admovendum erat hoc emplastrum aceto ad ruborem prius fota quò potentius se exerceret vis ulceratoria.

Non tamen omnibus indiscriminatim admoveantur emplastra hæc, putà ubi urget urinae ardor ejusve incontinentia, ubi adest sphincteris vesicæ inflammatio, vel ulceratio, ubi hæmorrhagia; si mulier in utero habeat, vel si instet fluxus menstrualis; postremò vesicantia non applicanda in summa virium exolutione. Hoc insuper memorabile, scil. bubonibus, vel carbunculis ad suppurationem vergentibus summa cum cautela vesicantia esse administranda, ne forsan avocatione, deprædatione, vel nimia liquoris colliquatione & tantum non fusione, è quibus confici solet, cætera medendi conamina,



& naturæ studia se liberandi, in irritum cadant.

Præter remedia vesicantia, haud perditionis operis erit emplastra applicare subpedanea, ego usus sum empl. sequenti, quod constabat è massa empl. de beton. comp. adjecto frequenter duplo euphorbii, pulvere croci, & theriaca *Londin.* empl. hoc plus commodi agris præstitit quam cataplasmata, quæ tamen nonnullis magis placuere. Verùm hæc, & reliqua ejusdem ordinis remedia non eo consilio applicabantur quasi virtute attractiva seminari. um pestilens allicerent, quin potius benefica apud saniores habita erant, eo quod in plantis pedum, ubi eximia vasorum omnifarium conglomeratione; calore partes fovere valent extremas liquores reddunt magis fluxiles, & fermentabiles, calorem nativum ferè morientem & extinctum exuscitant; atque hinc corpus universum ob consensum amicissimum vivificis delibutum influentiis: Epicarpia etiam iisdem de causis non omittenda.

Quod ad Bubones attinet, explorandum imprimis, an Bubo mobilis, vel stabilis? an durus, vel mollis, & tactui cedens an depressus vel in mucronem elevatus; an parvus magnusve? an contractus, vel patulus, latiusque serpens? an cum cruciatu, & punctione, vel indolens? an denique cum inflammatione, vel sine illa? Varietasque hæc varium exigit medendi modum.

Cataplasmatum licet usum commune omnium suffragium egregiè beneficum fore persuaferit calorem nempe naturalem languentem & propè extinctum mirè excitantium, partes circumquaque vicinas humectantium, cutim insuper dilatantium, humores denique acres contemperantium, & demulcentium; quoniam verò ab iterata eorum renovatione plurimum detrimenti agris accidisse observavi, sequens ceratum illorum vice substituere placuit.

℥. Empl. oxycroci ℥iij. galbani colat. gum. carannæ, an. ℥i. picis navalis ℥ii. è liquatis simul cum oll. chamæm. & liliorum, v. a. e. F. massa pro Empl.

Ausus sum asserere empl. hæc plus milles. Chyrurgicæ manus vicem supplevis-

se, quæ spatio triduanò, aut sæpius immutabantur. Quocunque modo disruptis, vel incisis bubonibus, ad ulcus ablucendum, & detergendum, lixivium paratur, è cineribus scordii, betonicæ, bugulæ, faniculæ, &c. dissolvendo q. s. theriac. *Londin.* Mixture autem sequens huic muneri accommodatissima, constans sit è rad. aristoloch. rotund. myrrha, aloe, & croco infus. & solut. in spirit. vini q. s. colaturæ addendo tantillum ole. terebinth. Porro ad promovendam digestionem, & putrefactionem inhibendam, Cataplasma sequens conficiatur, viz.

℥. Mellis ros. ℥i. terebinth. cum vitello ovi solut. ℥ss. theriac. *Londin.* ℥iij. farin. trit. ℥iij. cum ol. hyperici & sambuc. an. q. s. coq. in Cataplasmatibus consistentiam. Vel.

℥. Ung. basilic. p. duas, linimenti *Arcaei* p. tertiam, ole. terebinth. ℥ss. M. S.

N. B. Detergentia ne utiquam usurpanda nisi ulcus sit sordidum.

N. B. Ad sedandam doloris vesaniam, & inflammationem tollendam, opiata & repellentia censenda omninò perniciosissima, viz. venenum pestilens tergiversari, & si intus recipere cogentia; quin & partibus ab eorum usu plus nimis refrigeratis impendere sphacelationem quis ignorat?

Ulcus non prius claudendum, quàm ab omni sorde penitus expurgatum fuerit, & cuncta prorsum cessaverint symptomata.

N. B. Multiplici quidem observatione mihi constitit ulcera hæc veneno devicto & extincto, citius multò tutiusque sanata fuisse, quàm cætera à causis aliis quibuscunque oriunda: Incurationis interim administratione benè cautus sit Chirurgus, ne tumor callum labiis obducatur haud levi negotio extirpandum, ulceris probè mundati foveæ hiantes sarcoticis repleantur juxta methodum vulgarem. Ne eandem cantilenam sæpe occinam, parotides similiter, ac Bubones tractandæ.

Quod superest, id carbunculorum medela ad tres potissimum scopos collimare Chyrurg. interest.

1. Vigilanter prospiciendum, ne latè nimis serpat Carbunculus, gangrænæ instar



instar superexcurrentis, & nesciens cancellos.

2. Tentanda quamprimùm Carbunculi separatio,

3. Ulcus dextrè consolidandum.

Primæ satisfaciunt intentioni remedia, quæ fortuitam pororum referendo constrictiorem aliqualem egressus veniam particulis veneficis concedunt, item quæ ardorem lenire, & calorem naturalem sufflaminare, & tueri valent.

Verum Curatio Anthracum juxta illorum indolem, progressum, & partis affectæ situm instituenda alia, atque alia; nunc mitius, nunc asperius eo tractare expedit.

Minimè incommodum erit cataplasma ex allio sub cineribus assato, cum fuligine, theriac. *Rond.* & ol. terebinth. vel,

℥. Fermenti veteris ℥ss. allii assati ℥ii. stercoreis columbini ℥i. confect. sinap. dr. v. euphorbii ℥. ii. cum s. q. saporis nigri, F. Cataplasma.

*N. B.* In horum Cataplasmatum applicatione utpotè accerrimorum, cautela quidem summa adhibeatur, ne dolor ab eorum usu auctus sit impatibilis, ne humores colliquantur, & in partes debiliores secerantur, & deponantur, ne demum hoc pacto eschara figatur.

2. Eschara nondum decidua, ubi etiam nulla inchoatæ separationis vestigia, ung. & oleaginosa neutiquam probanda: Carbunculo autem scintillante, & latius diffeminato, ad remedia acerrima transire haud in consultum.

Cæterum in eschara amovenda, tum igne, tum cultro res peragatur: Cauteris actualibus nil sane efficacius comperi.

Seperatione quocumque modo inchoata, nimirum vel suapte sponte, vel ignis, aut cultri ope; pensi sit proximi carbunculum delibrare, frequentissima itaque ex butyro rec. oleo sambuc. vel lil. alb. illinitio instituatur. Eschara gradatim, & non præproperè laxanda, scilicet expectata aliquandiu ejus maturitate. Post anthracis decorticationem, cibi evacuationem, usumque mundificantium remediorum, & ulceris digestionem auspicari rerum ordo suadet cæteris juxta methodum in-

bubonum curatione traditam caute præstitis.

Postremò incarnatio sensim inducenda, & ulcus tardè consolidandum, quo festinantius clauso; haud infrequens veneni Pestilentialis reliquias quasdam subinde vagas & plerumque exitiosas evadere.

Quoniam verò loca Carbunculis adornata à confluentibus affatim humoribus mudari nequeant: unde curatio tarda, & quandoque improspira, remedia circumquaque defensiva affingantur, quæ partim constringere laxitatem vasa obstructa referare, & pristinum liquoribus transitum præbere; quæ demum spirituum & caloris fugam sistere possent: quod si, caula licet adhibita, sphacelatio imminuat ad seq. illicò embrocationem confugere oportet.

℥. Cinerum absinthii, scordij, cardui, centau. min. an. ℥iii. è quibus paretur lixivium, indendo flor. chamæ. sambuci, meliloti, an. M. j. liquoris limpidi ℔ii. adde spir. vini opt. ℔ss. dissolve theriac. *Lond.* ℥ij. M. S. pro fotu p. affectæ bis de die, quàm calidissimè, exin. Cataplasma conficiatur è theriac. *Lond.* cum Elix. proprietatis; *Nathanael. Hodges.* *De Peste, sect. 7.*

## SECTIO XVI.

### Ad Pestem.

**M** Atrona quadam familiæ roti superstes, integra adhuc valetudine, pectoris regionem lustravit, quam maculis, fatalibus obsitam prospiciens, nihil minus, quam Luis invasionem ex hisce indiciis hariolata, brevi exanimata erat, nullo alio symptomate morbum, vel mortem præmonstrante.

Juvenis insuper habitu eufarco & valenti corpore, postquam ex improvviso stigmatibus pestiferis inustum detexerat, id genus fucata, & ementia conjiciens signa, quod bellissimè valeret; quem tamen intra trihorium succubiturum verissimè Medicus judicavit,

Civis quidam, actis *Londini* negotiis, rurale præsidium petiturus, equum subi-



tò languescentem & succubitum persensit, apertis itaque faucibus, quo studiosius os, & linguam contempleretur, & morbi tam repentini causam detegeret, vir bonus incautè anhelitum equi foetidissimum hausit, mox ægrotare cepit, & intra biduum expiravit *Nathanael Hodges. De Peste sectio secunda De Pestis Aitiologia & Contagio.*

Puella quædam quindecim circiter annorum admodum extenuata, ut ossa præter, ac cutim, vix quid superesse videretur, hæc cum nil alimenti per spatium quatuordecim dierum sumpisset, diu habebatur ab omnibus pro deplorata; ego ad matrem ipsius; duosque alios in domo illa Peste laborantes vocatus, correptorum in me curationem suscepi, quibus statim convalescentibus, tandem hanc semimortuam Lues invasit; quæ modò velut extincta jacuit, calore febrili mirè animata, artus movere cepit, & remediorum ope alexipharmacorum, quæ tamdiu elugis, de tumoribus hic illic dolorificis conquerebatur; Bubones autem emersuri (quantum conjectura assequor) ob succi defectum, minimè suppurati erant, sed ob copiosissimam traspirationem valdè beneficam subsidentes evanuerunt; intra duas septimanas (Deo annuente) puella præter spem, & opinionem omnium, in integrum restituebatur, tabe indies discedente.

Virgo altera ultra decimum sextum agens ætatis annum, a teneris unguiculis tam scrophulosa, ut strumæ multiplices & obstinaces, nullo remediorum genere tolli potuerint; hæc tandem Peste afficiebatur, tumoribusque strumosis supervenere Parotides, quibus suppuratis, & pus affectim effluentibus, tam à Luc, quam à morbo contumacissimo, & diuturno liberabatur ægra.

Quidam Podagrici, aliisque affectibus inveteratis vexati, auspiciata hac associatione, restituti erant: revera omnes ferè Luem perpeffi, curatione v. a. e. administrata rectius postea valere; planè ut non modò venenum aliquando, sed ipsa Pestis vim obtinuerit medicamento. *Idem, sect. 4. De Luis cum aliis morb. complicat.*

In Juvene quodam utramvis pone au-

rem amplissimam emerfit Parotis, è quibus suppuratis, sectisque, sanies ubertim emanavit, ulceribus brevi à manu Chirurgica dextrè expurgatis; carne interim musculosa penitus absumpta, visu quidem non minùs jucundum quam mirabile, venas jugulares externas cum subjectis arteriis, nervum recurrentem, tendines, œsophagum omnimodum denique vasorum apparatus nudum, & illasum conspicerè, ægrotus tamen (favente Numine) & carne foveas adimplente integræ sanitati restituebatur.

E mulietis ubere mox a partu Carbunculus prodiit, infans tamen toto morbi stadio lactens, nil hausit incommodi, puerpera etiam (cœlo annuente) omnibus v. a. e. fide præstitis brevi convaleuit.

Ad puellam correptionis perendie accersitus eram, quæ citra difficultatem spiravit, extrinsecus calor mitis, & admodum blandus, interiora utique manifesto non conflagrarunt incendio, pulsus haud inæqualis aut irregularis, nullus denique eam torfit cruciatus; è contra verò omnia tam pacata, tam serena, perinde ac si nulla ægritudinis procella jactaret, nedum impenderet vitæ jactura: revera mihi non constitit de causa ægritudinis, quam simulasse morbum suspicabar, donec thorace nudato indubia hic illic stigmata pro more compuncta partem sensu vacuasse indicaverint, meritò habita properantis fati arrhabones: eadem nimirum nocte puella expiravit, vix dum vel suo, vel astantium judicio valetudinaria.

Paulò post viduam invisi sexagenariam à qua (confecto ferè prandio haud parco, quippe præter carnes ovillas stomachus adhuc latrans pullum gallinaceum expectivit) tolli mensam jussi: posteaquam nonnulla de statu ipsius præsentis percontatus fuisset, se nunquam toto vitæ curriculum saniolem asseveravit, ad motis exindigitas arteriæ, intermissionem crebram cum fornicatione deprehendi, collo demum & pectoris regione lustratis, innumera detexi ecchymata, signa prohi nimium manifesta mulierem bene pransam apud inferos cœnaturam. *Nathanael Hodges, sect. 5. De Pestis signis manifestis.*



## SECTIO XVII.

*Pro Pestis præcautione.*

**S**equuntur Antidota quædam ad Pestis præcautionem.

*Electuar. Antipestilentiali Insignissimi Mayerni.*

℥. Jugland. virid. ℔ii. ficuum Prunor. an. ℔i. macerentur in aceto, & pulpa trahatur, cui adde pulv. subt. rutæ ℔ss. viperinæ virg. ℥ss. rad. contrayere. ℥iii. petasit. zed. an. ℥iiss. sacch. perlat. ℔i. syr. è succo Kermes ℥i. syr. calendul. cariophyll. an. q. s. ut F. Elect. molle, addendo fol. auri quadraginta: dos. ad quantitatem nucis juglandis maj. manè & vesperi.

*Elect. aliud in usum pauperum.*

℥. Conserv. lujul. galeg. an. ℔ss. calendul. ℔i. theriac. Lond. bol. armen. vitriol. ℥iv. cum syr. limon. q. s. F. Elect. dos. ad ℥ii. vel iii.

*Confectio Antipestilentialis.*

℥. Rad. scorzon. Hispan. petasitid. contrayerv. an. ℥ii. helenii. torm. an. ℥ss. angel. chel. maj. an. on. i. m. bacc. junip. præp. ℔. m. summitat. rutæ, p. i. sem. card. citri, an. dr. ii. quibus præp. affunde p. duas acet. sambuc. & terriam spirit. vini opt. infusione peracta & expressione, liquor igne lento evaporetur ferè ad mellaginem: extracti ℔i. adde theriac. Londin. on. ii. m. bol. armen. terr. sigillat. an. on. i. flor. sulph. dr. v. succi Kermes, on. ii. conf. lujulæ. ℔i. cum syrup. limon. q. s. F. Elect. molle, dos. ad quantit. nucis myristicæ mai. ter. vel sæpius de die.

*Pilula Antipestilentiali.*

℥. Extract. rad. helenii, angelic. contrayerv. an. ℥i. adde extr. alb. glycyrrh. ℥iii. flor. sulph. ad quatuor saltem vices sublim. ℥ii. C. C. philosoph. calcin. sem. citri pulveriz. an. ℥iiss. salis scordii, absinth. an. ℥ii. cum s. q. picis liquidæ, F. massa pro pilulis, dos. ad ℥ss. vel ℥ii. manè & hora somni.

*Elixir Proprietatis Antipestilentiale.*

℥. Croci Angel opt. ℥ss. extrah. tincturam cum aq. ulmarix, scabios. cardui, vel meliss. f. q. additis spirit. sulph. aliquot guttis ad leviusculam aciditatem: liquor per chartam agatur, in colatura ad lentum B. calorem dissolve Aloes pellucidæ è vesica ℥iv. per setaceum linteum haud ita rarum trahatur liquor; deinde F. condensatio ad eundem calorem, acquisita pilularum molliuscularum consistentia, adde myrrhæ purissimæ ℥vii. flor. vel magisterii præcipit. Benjoin. ℥iii. salis C. C. ℥ii. cum syr. sambuc. q. s. F. massa unde pilulæ formentur: dos. ad ℥ii.

*Tabella Sublinguales.*

℥. Extract. rad. angelic. & contrayerv. extr. alb. liquir. dr. iii. flor. sulph. myrrhat. h. e. cum myrrh. sublim. dr. v. oleo cinnam. gutt. viii. saccharum cristallin. ad duplum omnium pondus, cum mucilag. gum. tragacant. aq. scordii parat. q. s. F. tabellæ parvæ sublinguales.

*Haustus sequens magnarum virium habitus.*

℥. Aq. ros. rub. camphoratæ ℥ii. aceti opt. ℥i. in quibus dissolve bol. arm. opt. ℥ii. adde syr. scabiosæ simpl. dr. iii. M. S. F. haustus. Nathanael Hodges, sect. 8. De Pestis præcautione.

## SECTIO VIGESIMA.

*Pro Philtis.*

**B**aroniscus ejusdam Bohemi filius accepto Philtro totus contabuit, tandemque mortuus est. Cadavere secto, inventum est in ejus stomacho quiddam durum cornu assimile, unde pater in filii memoriam cochl. fieri curavit, quo longo post tempore usus est: tandem illud casu quodam in succo nasturtii aquatici dissolutum fuit, inde experientia comprobatum, Nasturtium illud magnam vim contra philtro habere; eodem præsidii genere alius quidam.



dam nobilis usus est, atque ex simili morbo restitutus. Omnia philtrea etsi inter se variè differant, hoc tamen commune habent quod humorem efficiant melancholicum, quæ igitur medicamenta humorem illum clementer evacuant, & spiritus tristes recreant, haud dubiè in tali affectu proderunt plurimum. *Petrus Monavius, Epist. 23. lib. 7. Consil. & Epist. Cratonis & aliorum à Scholizio editorum.*

Nobilem præcipuam filia Hospitis cuiusdam deperit: abeuntique pomum pulcherrimum offert: illi suspectum est hoc donum, ac à se proicit: post triduum recordatur illius, & aspicit, tunc illud prorsus nigricans apparet, expectat per aliud triduum, tum ranulas per plures ibi reperit, redit ergo in hospitium illud, morbum simulat & ingentia tormina; virgo lacte calido uti jubet, ille illud ranis affundit quod avide assumunt, ac paulatim inerescunt: ille verò indies majores cruciatus simulat; unde virgo miserta, jubet urinam equinam jam jam excretam & adhuc calidam ebibere: ille illam ranis affundit, & moriuntur. Post aliquod tempus serva alterius Nobilismiserrimis cruciatibus conflictatur, ac suspicio est de Philtro ab equite quodam exhibito; propinatur urina equina, & removit duas lacertas, itemque duas ranas. *Philippus Salmuthus, obs. 70. cent. 1.*

Experientia didici Calculum microscopico exsectum, & in pulverem comminutum, cum aqua vel succo Nasturtii aquatici propinatum Philtro potatis, vel erotico amore fruentibus multum profuisse. *Henricus ab Heers, obs. 13.*

Studiosus quidam accepit à quadam malefica placentas quas comedit, ab ea autem discedens mox in itinere delirare cœpit, & domum abductus magis insanivit, & in maniam devenit: pro hac levanda infania ad me studiosi veniunt maniam significans, Philtrum enarrant: contra quod ego dedi aq. benedict. ℥vi. quàm jussi ei statim exhibere qua assumpta, statim rejecit Philtrum sive venenatas placentas devoratas, quæ projectæ in terram cum astantium admiratione effervescebant & ebulliebant veluti cibus ad ignem effervens & ebulliens. Rejecto ita veneno hoc ex in-

sperato continuò infania depulsa est, & intra biduum intellectus ex integro restitutus est, recteque Deo omnipotente annuente convaleuit. Vinum absinthiacum bibit aliquot dies. *Martinus Ruiland. cur. 91. cent. 3.*

In Philtris necessaria sunt emetica. Postea exhibe à ℥i℥. ad ℥i. pulver. Secundinæ cum aq. theriac. addendo coch. i. aut alterum succi Nasturtii aquatici, bis duobus diebus continuis. *Io. Hartmann. præct. Chimiatri pag. 60.*

In Montibus *Pirenaïs* fuit Nobilis quædam mulier quæ Sagarum incantamento pomum acceperat venenatum, cujus esu remansit per tres annos integros tabida, summo dolore ventriculi, & nausea perpetua, absque tamen vomitu ullo. Multos convocavit Medicos in consilium, tum Civitatis *Tolosa*, tum *Monspeli*, ut sanitatem amissam restituerent, sed in vanum omnia: tabidam & hecticam in ultimo gradu judicabant omnes; advenit tandem ut Saga illa à qua pomum venenatum acceperat, mortis supplicio adjudicata fuerit, variis convicta criminibus, palamque facta est, se prædictam dominam pomo venenato à Damone sibi tradito in incurabilem morbum perduxisse, ni Summus Deus opem ferret: itaque post mortem Sagæ illius & notitiam sui mali vocavit me, historiamque narravit, dixitque mihi se semper in ventriculo sentire motus varios & diversos animalium quorundam morsusque eorundem. Miseram hanc agrotantem benignissimis ego refocillavi verbis animumque titubantem, & de sanitate despondentem, ad quandam spem salutis reduxi. Postea dedimus medicamentâ chimica sequentia. Dissolvimus salem vitrioli in aqua salvia, & potandum dedimus summo mane; à cujus sumptione post duas horas vomuit nigra multo cum verò sabulo nigro, & tandem vomuit ranam vivam & squammosam, maxima cum difficultate & deliquio animi. Sequenti die, iterata dosi eiusdem salis vitrioli vomuit eadem nigra & sabulosa, & tandem summa cum difficultate & animi deliquio vomuit Serpentem squammosum parvulum, & crocodilum parvulum magnitudinis



digiti, & longitudine palmi: refocillata fuit portione aq. cinnam, & postquam vires recollegit, a dolore ventriculi & morfu se sublevatam esse dixit; & indies deinde melius se habuit, & sanitatem recuperavit pristinam, habitumque tabidum relinquit, recuperato vivido & florido corporis colore *Ioh. Faber. curat. 94.*

## SECTIO XXI.

### De Phlegmone.

Φλεγμῶν (in φλεγῶν uro) Latine inflammatio, tumor est partium carnosarum à sanguine præter naturam affluente ortum habens, in quo dolor est vehemens, rubor per summa vicens, calor veluti deurens, tensio & renixus, & cum malum increverit, pulsationis sensus: causa proxima est sanguis per modum fluxionis in carnem impactus; antecedens verò ejusdem exuberantia, ob immoderatam vasorum repletionem; evidentes denique causæ sunt occasiones externæ, ut contusio, disruptio, fractura, vulnus, ulcus spontaneum, luxatio &c. quæ quatenus dolorem in laborante particula excitant, fluxionem accersunt: phlegmone alia est vera & pura sanguinis naturalis & benigni soboles; alia spuria ex sanguine illaudabili per aliorum humorum admixtionem facta: cujus tres sunt differentiæ, phlegmone nimirum erysipelatodes, œdematodes, & scirrhomodes: judicatur per resolutionem, vel suppurationem, aliquando etiam per corruptionem; vel in scirrhum denique abit.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Phlegmone.

**R**ustica quædam mulier magnam phlegmonem in brachio habebat, huic cum menstrua deficerent, facta est phlebotomia in crure ex loco opposito. Postea applicuimus parti affectæ quæ repellerent.

℥. Aceti opt. ℥iii. album ovi ℥i. aq. ros. ℥i℥. ros. rubr. pulv. ℥℥. M. & petias lineas in hoc liquore madefactas loco affecto ap-

plicato: hoc utebatur *Benedictus Faventius* Præceptor meus, Vel

℥. Unguenti de cerussa ℥ii. succ. plantag. succi semperviv. an. ℥i. aq. ros. ℥ii. M. & cum petiis lineis apponito; at cum hæc valde repellentia ob insignem dolorem minus juvarent, apposui emplastrum ex mica panis cribellati, oleo rosac. & lacte, quod in omnibus inflammationibus cum rubore sæpe experti sumus, & dolorem sedare, & fluxum materiæ inhibere; dolor verò illo appposito mitigari cœpit, & inflammatio cessare. Interim statim post sanguinis missionem corpus purgavimus; in alia ad inflammationem brachii, inunximus primò unguento ros. Postea cum dolor intenderetur, cataplasma sequens imposuimus.

℥. Malv. M. iv. pistentur ad mollitudinem, add. farin. hord. ℥℥. Ol. viol. ros. unguenti popul. an. q. f. F. cataplasma: septies fuit reiteratum. Postea etiam brachium inunximus unguento populeo, oleo viol. amygd. d. ros. an. part. æq. imposito deinde iterum cataplasmate superscripto, tandem benè habuit & à phlegmone curata est, alteri hoc cataplasma egregiè profuit & dolorem sedavit.

℥. Farin. tritic. q. f. coq. in aqua addendo ol. ros. q. f. & parum croci: hoc etiam maturat; hoc item emplastro commodè sæpe usi sumus ad dolorem sedandum, & tumorem & tensionem remolliendam, & materiam insensibiliter resolvendam.

℥. Farin. sem. lini fœnugræ. sem. aneth. flor. chamæ. melilot. bismal. coq. pistentur & corporentur cum mucilag. sem. altheæ & butyro recenti potest addi in processu farina fabarum. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 1. Observ. Chirurg.*

Ubi cognoveris resolventia non comple-re opus suum, statim debes sollicitare ipsius phlegmones supurationem, quam com-plebis sequenti emplastro.

℥. Rad. malv. fol. viol. an. M. i℥. rad. alth. minutim incis. ℥ii. rad. lil. alb. ℥i℥. bulliant omnia in aq. ad medietat. consumptionem: deinde adde mucil. sem. caulium ℥i℥. farin. frumenti ℥i℥. fermenti ℥i. pingued. porc. butyr. rec. lact. mulieb. an. ℥i. ol. lil. alb. amygd. d. an. q. f. ad simpin-



impinguendum emplastrum, quod calidum loco dolenti apponatur: ad idem egregiè maturans & suppurans.

24. Lactis vaccini libi. medull. panis subtiliter trituratæ libi. succi caulium ʒiii. croci ʒß. ol. lil. alb. ʒiii. M. & calidè apponito: maturata verò phlegmone (cujus indicia erunt mollities cum undositate apparens carentia doloris, & tensionis privatio;) debes te præparare ad illius disruptionem, quod si patiens ferro vel igne terretur, dirumpatur sequentibus.

24. Diachyl. simpl. ʒii. fermenti ʒi. ol. amygd. d. ʒiß. M. grosso modo, extend. supra corium, & in medio pone stercor. columb. subtiliter pulver. ʒi. & phlegmoni applicato, stercore appposito in loco in quo habilior erit eius disruptio: secundum ingenium est hoc ruptorium.

24. Fermenti ʒß. salis ʒi. aceti opt. ʒii. pulv. cantharid. ʒiv. omnia simul bene misce, & in mortario benè ducantur, quousque fiat pasta, cujus ʒß. vel secundum quantitatem phlegmone dirumpendæ applicabis apostemati, superposito emplastro supradictò: rupto apostemate, sic ut plurimum medicaberis.

24. Terebinth. ʒii. vitell. ov. num. i. optime agitentur simul quousque F. forma unguenti in quo tentam factam ex pecia vel ejus filis ad quantitatem foraminis affecti intinges, & foramini impones; totum verò ipsum unguentum extends supra peciam, & totum apostema teges: factaque idonea ligatura non multum stricta, ne prohibeatur eventatio spiritus & calor ad membrum, & materiæ residuæ maturatio: sic continuabis per dies, donec materia fuerit sufficienter evacuata. & labia vulneris optime digesta. Postea ad majorem mundificationem & abstersionem, appones unguentum sequens, & tentam intinctam in eo.

24. Terebinth. ʒii. mell. ʒi. M. & usui serva; semper superponendo unguentum digestivum prius factum: mundificata phlegmone, quod poteris videre ex privatione generationis saniei & alterius malæ materiæ currentis ex ulcere & sufficienter absterfa, indigebit tunc ulcus incarnatione & consolidatione: ideo cum sequenti unguento procedes,

24. Terebinth. ʒii. mell. ʒiß. thur. mastich. myrrh. aloes, an. ʒi. sarcocol. ʒ. m. pulverizanda pulver. & omnia in mortario benè ducantur & agitentur, quousque F. unguentum: & sic continuabis usque ad veram ipsius consolidationem: hæc Præceptor meus *Faventinus* admonebat: si verò vehemens dolor inflammationi accesserit, modis omnibus is mitigandus est, quod si nodynis demulcetur ad narcotica transeundum erit: inter quæ hyoscynam admirandam opem sæpè contulisse frequenti experimento præter quorundam auctoritatem comprobatum est: itaque folia ejus sub calidis cineribus coquito, recenti exungia misceto & admoveto; hoc vehementer dolores mulcet, & phlegmosos tumores ad suppurationem perducit. *Petrus Forestus, schol. observ. 5. lib. i. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECUNDA:

### Pro Phlegmone.

**V** Ir quidam vexabatur in metacarpiò & gibbo manus phlegmone seu apostemate calido: exhibui balsamum sulphur. ut eo manè meridiè ac vespere apostema probè illiniret, & linteola superimponeret cum levi ligatura, quod cum fecisset, statim maturationem, mox disruptionem & tandem per paucis diebus consolidationem & optatam curationem consecutus *Martinus Rulandus, curat. 90. cent. i.*

Plurimos, cum paterentur apostemata, seu phlegmones, sanos feci intra paucos dies solo emplastro di sulph. (cujus descriptionem, vide lib. 18. sect. 22. subsect. 4.) admovi autem illud manè & vespere, unde citissime ad suppurationem venerunt. Deinceps ultra rupta; & indies bis mundificata mox ad consolidationem perducta sunt: quia in hoc emplastro miranda & celeris inest vis emmolliendi suppurandi, rumpendi; abstringendi & conglutinandi. *Martinus Rulandus, curat. 94. cent. 2.*

Cuidam laboranti phlegmone erysipelato in facie, folia hederæ arboreæ in aqua quæ à tectis regulatis cæruleis defluit cocta, & humida supra faciem profuimus: hoc experimentum habuimus à Chirurgo quo-



quodam seniore, quod in seipso, tum sua uxore sapius, ad guttam quoque rosaceam in facie expertus fuerat; & ego in quam plurimis: semper enim mihi foeliciter successit applicatio fol. hederæ post universalia adhibita remedia: eodem modo & fol. ruffilag. cocta in aq. & apposita egregiè profunt, ut expertus sum, quanquam in herpete magis conveniant. *Petrus Forestus, obs. 6. lib. 1. Observ. Chirurg.*

## SECTIO XXII.

### De Phlyctænis.

ΦΛΥΚΤΑΙΝΑΙ & ΦΛΥΚΤΙΝΕΣ (in ΦΛΥΩ bullio: ) pustulæ sunt & vesiculæ à ferventibus & acerrimis humoribus in cute excitatæ, iis similes quæ ab igne vel ferventi aqua excitantur: ignis sylvestris nomine à quibusdam donantur; infantibus interdum in toto corpore erumpunt, rarò viros infestant; proveniunt à bilioso & fervido humore, cum salso & seroso mixto mulieribus nonnunquam accidunt ob sanguinem corruptum & retentum.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Phlyctænis.

**I**Nfantulus cum haberet phlyctænas in facie, succo plantag. & solani eas oblinire jussimus; postea adhibita etiam creta & aceto linimenti instar, & decocto rosarum ablui jussimus, interim ut nutrix cibis frigidis alteratis cum succo acetos. vel agrestæ uteretur, mandavimus; & ut serum lactis biberet, quo & puerulus postea alvum exoneravit; atque his remediis infantulus brevi convaleuit. *Petrus Forestus, observ. 8. lib. 2. Observ. Chirurg.*

## SECTIO XXIII.

### De Phrenitide.

**P**hreniticis delirium est perpetuum & continuum cum febre continua ab inflammatione membranarum cerebri originem petens; ejus causa est sanguis biliosus è vasis elapsus, & in membranis cere-

bri intercepta transpiratione putrescens; causæ externæ effusionem adjuvantes, sunt aeris fervor, radii solares, meri potus, ira, percussio, contusio & vulnus, signa sunt delirium perpetuum, vigiliæ, febris continua, respiratio parva & frequens, si ex septi transversæ inflammatione proveniat sed magna & rara in vera phrenitide, alia est vera, quam hætenus descripsimus, alia spuria, quæ paraphrenitis appellatur, quæ est dum calida intemperies cerebro communicatur, vel à toto corpore, ut in febribus ardentibus vel ex cujusdam partis inflammatione, ventriculi v. g. hepatis, pulmonis, & potissimum diaphragmatis; quod inflammatione affectum delirium veræ phrenitidis æmulum excitare solet, est phrenitis acutissima affectio, quæ ut plurimum in septem diebus interimit.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Phrenitide.

**P**uerpera juvencula non benè post partum purgata, in grave delirium subito incidit, cum febre acuta, phrenitidem veram esse statim judicavi, venam ut aperiret suasi, sed ob inquietudinem fieri minimè potuit; itaque scarificationem scapulis & humero adhibere jussi; dein ob vigiliæ & inquietudinem dedi sirup. de papav. oxorrhodinum item fronti apposui; postea gallinam per medium dissectam reptentem & cruentam capitis vertici imponi jussi, quo facto, vapor copiosus & spissus, ita ut conspici posset, mox ab ea sede evaporabat, & cum gallina removeretur, tota esse videbatur, quod mirè profuit; nam sequenti die ad se redire cepit, & adstantes agnoscere, & rationi consentanea loqui: itaque julepum refrigerantem & humectantem, nam adhuc febricitabat; præscripsi, quo bis terve usa, accedente idonea vivendi ratione, mox convaleuit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 93.*

Vir quidam per aliquot dies strenuè vino generosiori sese ingurgitans, paulò post subito grave delirium patitur cum febre continua vigiliis perpetuis; sexto die morbi sero nimis, quod vulgi proprium, medi.



medicam implorabant opem adstantes, ipsumque laborantem ab eo tempore dies noctesque insomnes habuisse referebant; mali procatarcticam causam intelligens non desperandum esse duxi, sed eo ellaborandum ut primo somnus conveniens procureretur, deinde ut intemperies calida & sicca corrigatur, & tertio ut principalium viscerum corroboratio non negligatur; pro primo statim ad narcotica confugi propter nimiam caloris, & spirituum effervescentiam & nobilitatem in subiecto calido sicco, quam ob causam sine ulteriore deliberatione, mox sequentem syrupum exhibui.

24. Syrup. papav. errat. ʒi. laud. opiat. gr. iiii. aq. lactuc. ʒß. M. detur una vice, quo assumpto, somno & quiete prehendebatur æger, quam continuabat per noctem integram; die sequenti expergefactus sua sponte, mentis omnino compos erat, nec actorum recordabatur; desiti verò conquerebatur, quam ob causam, pro secunda & tertia intentione, pro refectione & alteratione, emulsionem sempapav. alb. amygd. d. cum aq. acetosi & similibus ordinavimus, victumque refrigerantem & humectantem instituimus, quibus intra paucos dies perfectissime convaleuit. *Gregorius Horstius, observ. 25. lib. 2.*

Sub phrenitidis finem gallos exenteratos applicabis capiti, valent enim ad digerendum: at cum humores adhuc moventur ac sursum rapiuntur, nocent plurimum. *Guil. Ballonius, lib. 1. epid. & ephem. pag. 5.*

Dux strenuus cum phrenitide magna laboraret, & ob ferocissimos validosque corporis motus, illi nulla revellentia possent administrari auxilia, quidam ex adstantibus suaviter eum demulcens, pennam ad radicem multum fissam, nostro consilio, & in stellæ effigiem paratam intra nares ex improvviso intromisit, ac fortiter circumduxit: quo facto tanta ex nare dextra secuta est hæmorrhagia (erat juvenis, quadratus & sanguine turgens) ut copiosissimam aquaret phlebotomiam, qua copia excreta, natura à sarcina levata, residuum humorem per sudorem, alvi que fluxum destruxit, & æger paulisper ad se rediens con-

valescere cœpit. *Zacutus Lusitanus, observ. 13. lib. 1. prax. admirand.*

Mulier quædam in phrenitidem incidit, cui opem ferens, cucurbitulas dorso, occipitique scarificatas apponendas impero, ex fronte, nasique venulis sanguinem exhaurio, & alia revellentia auxilia procuro, sed cum debilis esset, nec ad ferendam cephalicæ sectionem, aut purgantium medicamentorum usus vires essent satis, & nullus videretur esse remedio locus, in casu conclamato, ad cucurbitulam, in sincipite scarificatam accessi, ex qua cum sanguis copiose emanaret, contra medicorum vota sana evasit. *Zacutus Lusitanus, observ. 14. lib. 1. prax. Medic. admirand.*

Ad effervescentiam sanguinis, & spirituum optime profuit oleum perlarum, de quo *Petrus* in „*Nosologia* „*lib. 1. Dissert. 2.* Præstantissimum est „*oleum perlarum verum*: sicut enim „*pauculæ ejus guttæ mirabili spectacu-* „*lo ardentissimum, vini spiritum in bu-* „*tyrum scissile coagulare possunt, ita* „*quin spiritus effervescentes & volatiles* „*ipsius cerebri fixiores & stabiliores red-* „*dere queant; nullum est dubium.* „*Baldassar Timæus, Cas. 6. lib. 1.*

Sedum majus contusum & cum lacte muliebri mixtum sincipiti admotum mirè sedat phrenitidem, & somnum conciliat. Sed statim ac dormire cœperit æger detrahendum, ne in coma precipitetur. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 1. cap. 11.*

## SECTIO XXIV.

### De Phthiriasi.

Φθίριος (ἄ φθίσις pediculus in φθίσι corumpo) Latinis pediculatio, est pediculorum acervatim proventus, qui ut plurimum in sordidis capitibus generantur: pediculorum causa efficiens est vis seminalis in materia idonea latens, quam calor ut causa adjuvans excitat & in actum deducit: materiam suppeditant ciborum promiscuorum & variorum usus, ficuum esus, vestium sordes, corporis mundatio neglecta, & omnia capitis peccatio.



## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Phthiriasi.

**Q**Uendam Phthiriasi totius corporis laborantem ita curavimus. Primò ejus causam venæsectione & purgatione deposuimus, non solum semel, sed bis & ter: ac postea sequentibus topicis remediis brevi ab hac fœda Lueliberatus fuit æger.

℥. Lupin. amaror. p. iii. sem. staphysagrar. p. ii. F. decoctio in aceto acerrimo, quo decocto universum corpus à capite ad pedes usque lavetur, ac postea linimento sequenti corpore benè terso & exsiccato illinatur.

℥. Sem. Staphysagr. part. ii. sandarach. græc. part. i. nitri fini part. β. in aceto acerrimo, cum oleo raphanino omnia accuratissimè pista misceantur, & ex iis fiat inunctio, quibus brevi assecuti sumus scopum, nec amplius in eandem fœdationem æger devenit. Ex hac fœda labe multi sunt mortui, ut *Scylla*, *Pherecides*, *Ennins*, & ut nonnullis placet, *Plato* iis quoque adjungendus venit. Novimus autem nos *Olyssipona* hominem quendam non ignobilem ex hoc morbo miserrimè obiisse, ita enim per universum ejus corpus pediculi scatebant, ut duo ejus servi *Æthiopes* nihil aliud curæ haberent, quam ex ejus corpore pediculorum cophinos plenos ad mare, quod prædictam civitatem præterlabitur, portare. Porro apud *Hiberniam* & *Islandiam* scimus homines semiferos subuculis croco infectis vestiri, ut pediculos fugent; quas per sex menses & amplius gestare solent. *Amatus Lusitanus*, curat. 58. & *Schal. cent.* 3.

Cum puer quidam valde pediculis scateret in capite, huic primùm consului, ut caput ablueretur aqua marina, deinde decocto absinth. lupin. cent. min. & propria urina admixta. Postea superraddidi hoc linimentum quod ex axungia porcina succo absinth. pul. lupin. staphysagria exigua adjecta, & oleo veteri constabat: quo illito capite, omnes pediculi fugati sunt, si verò cimices seu morpiones in barba, aut locis secretioribus sint propriè virilia, vel

muliebria, hoc infra scripto unguento commodissimè uti solco.

℥. Axung. porcine. ol. laurin. saponis nigr. an. ℥β. argenti vivi extincti cum saliva hominis jejuni ℥i. (ad omnia enim pediculorum genera occidenda nullum est præstantius remedium quàm argentum vivum in quacunque parte fuerint) myrrh. aloes an. ℥β. staphysagr. ℥ii. sapon. gallici, ℥ii. in mortario reducantur ad formam unguenti. *Petrus Forestus*, observ. 14. lib. 6. De externis capitis vitiis.

Panno quo aurifabri vasa deaurata extergere solent, si caput confricetur statim pediculas enecat, *Franciscus Joel*, pract. lib. i. sect. 4.

Inter omnia optimum mihi auxilium fuit zona linea argento vivo imbuta, non solum in hoc rustico, sed quamplurimis aliis hoc malo tentatis, nam hydrargyrum est antidotum eorum. Idem etiam præstat unguentum quod sequitur.

℥. Unguenti ros. ℥ii. pulv. staphysagr. ℥ii. argenti vivi saliva extincti ℥β. M. F. linimentum. *Nicolaus Fontanus*, Cap. 9. Analect.

Puerulus quidam quinque circiter annorum per integram ætatem phthiriasi affectus, ingruente autumno tanto pediculorum agmine infestabatur, ut non tantùm sub capillitio & in cute capitis, sed & per faciem catervatim quasi reptantes insignem molestiam & pruritum excitarent, somnumque de nocte impedirent. Post varia incassum tentata, jussi caput lixivio: acri ex cineribus fraxini, in quo staphysagria ebullierit, lavarent, postmodum aqua meoletica sæpius de die inungerent. Quo per novendium continuato, terra hæc animalia immani strage fusa penitusque deleta sunt. Eodem remedio & alii plures, cum à turpissimo hoc morbo, tum à scabie aliisque vitiis cutaneis feliciter liberati sunt. Descriptio aquæ aloeticæ.

℥. Aq. absinth. ℔i. Dissolv. in hac aloes purissimæ ℥ii. M. *Baldassar. Timaus*, Casu 4. lib. 5.



## SECTIO XXV.

## SUBSECTIO PRIMA.

## De Phthisi.

## Pro Phthisi.

Φθίσις (in Φθίσι corrumpo) Latine tabes, in genere pro omni totius corporis extenuatione, quacunque de causa id fiat, accipitur, verum usus obtinuit apud Medicos, ut in specie & frequentissime pro ea corporis consumptione sumatur, quæ ulceris pulmonis soboles existit, ita definiri potest calamitosum hoc symptoma; est pulmonis exulceratio, qua sensim corpus universum liquefcit; vel, est pulmonum à materia acri, erodente, cum febre lenta, tussisputo cruento & purulento, exulcerato, qua sensim totum corpus consumitur & extenuatur. Phthiſeos causa est, præter viciosam pulmonum constitutionem, tum acris & falsa è capite destillatio, tum etiam humor acer à vicinis partibus in pulmones ejectus, ut in pleuræ, mediastini, diaphragmatis & asperæ arteriæ inflammatione suppurata, quæ in empyema convertitur, ex ipso item pulmonis vitia pravi humores generantur phthiſin inducere valentes, ex rupto præterea veleroso illius vase, aut ex vulnere aperto, sanguine in pulmonem effuso, ibidemque putrescente, hoc malum quandoque contrahitur, antecedentes causæ sunt humores vitiosi in toto corpore collecti, qui ubi à causis externis commoventur, ad cerebrum transmittuntur, & inde in pulmonem defluunt huc pertinet mensium, hæmorrhoidum, aut alterius evacuationis consuetæ suppressio, causæ externæ sunt contagium, aer impensè calidus aut frigidus, aer item autumnalis, ad phthiſin disponuntur, qui pectus habent angustum & depressum, collum oblongum, & scapulas altas, ejus signa sunt, tussis diuturna, sputum primo cruentum deinde purulentum, febris lenta & continua quæ tamen noctu exacerbatur, totius corporis extenuatio, respiratio difficilis, confirmato malo pus foetidum redditur, fauces sono implentur, capilli defluunt, ungues incurvantur, malæ livescunt, extrema & pedes intumescunt, supervenit denique diarrhœa.

**U**lcus in hoc morbo abstergendum est, abstergit autem lac asininum & humanum, sed magis nutrit humanum, asininum magis abstergit; & ideo *Galenus* ubi curat ulcus, laudat magis lac asininum, ubi tabem, humanum. *Joh. Baptista Montanus, consil. 181.*

Costarum regionem, inunximus hoc unguento de lacte dicto quod optimum est, nec quicquam foetet.

℥. Gummi tragacanth. gummi arabic. an. ℥i. infund. in aq. rosar. per diem & noctem addantur ol. viol. ℥i. butyr. rec. ℥. camphor. ℥i. M. & in mortario cum lacte muliebri F. unguentum. *Amatus Lusitanus, cur. 92. cent. 1.* isto unguento uti etiam consuevit in hecticis *Joh. Crato. consil. 98. lib. 7.* camphoram ad ℥i. duntaxat admiscendo.

Pro derivatione fiat Cauterium vel Setaeum in occipite, postea etiam in brachio. Præterea aliquod decoctum exhibendum quod sine caliditate exsiccandi vim habeat, & inter cætera præstantissimum est decoctum santali citrini: nam mirabiliter præcaverit erosionem pulmonis antequam fiat, & postquam facta est, quantum fieri potest corrigit, ita conficitur.

℥. Aqu. cichor. acetos. an. ℔iv. santal. citrin. minutim concis. ℥i. F. infusio per unum diem, deinde fiat coctio in balneo M. ferventi, obturato vase per tres horas, postea auferatur ab igne, ut refrigeretur & coletur, cujus decocti sumat quovis manè ℥i. & bibat in potu per quadraginta dies, solet enim præcavere fluxiones ad pulmones. *Rodericus à Fonseca, tom. 1. consil. 58.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Phthisi.

**R**efert *Valescus* se Monachum quandam phthiſicum curasse cum pulvere *Haly*; quo & nos usi sumus in fratre meo ex tabe & hectica laborante, qui & eo curatus fuit, cum pus longo tempore subinde expec-



expueret. *Avicenna* narrat historiam de muliere phthifica, cujus jam parabantur funeralia, quam curavit cum sacch. ros. *Petrus Forestus*, observ. 55. lib. 16. De pectore & pulmonis morbis.

Aqua ex cochleis, testudine, cruribus ranarum destillata efficacissima ad hunc morbum perhibetur. *Idem*, observ. 53. lib. 16.

Monacha quædam phthifica pro deplorata habita sequenti remedio intra duos menses sanitati restituta fuit. Pullum exenteratum capiebat, ac in ventre 3iii. sacch. ros. fac. ponebat, demum aqua, lento igne in olla cooperta coquebat, illoque decocto, supra cineres per totam noctem ollam relinquebat: manè verò ex pullo contuso cum suo jure manens in lecto sumebat, superdormiens, quo quidem remedio sana evasit. Alius Monachus, cui ossa præ macie crepitabant, ut postea lecto decumbere coactus fuerit: is quoque à Medicis pro deplorato habitus, duo ova recentia igne ad verso assabat in foco calido tantum, ut albumina vix coalescerent, albuminibus rejectis, vitella in scutella ponens, addebat pulv. sulphur. vivi ad fabæ majusculæ quantitatem, sacch. cand. asperso eadem mensura, & salis momento; quæ simul mixta cum vitellis ovorum capiebat hora una ante cibum, & desuper bibebat vini optimi dulcis cyathum unum; modo sumebat aquam roris solis unâ cum vitellis ovorum; interim & pro tussi utebatur syrup. de liquir. viol. diatragac. frig. eclegmatis modo: & aliis confectiionibus destillationem inhibentibus. *Idem* destillabat limaces teneros ante ortum solis in vinetis collectos, cujus & cochlear cum duobus vitellis ovorum subinde capiebat: ita ut macia consumptus pinguis paucis mensibus evaserit, præter spem sanus factus sit. *Forestus*, obs. 58. lib. 16.

Pulvis descriptionis *Haly* contra tabem valde commendatur; qui ita se habet.

℞. Sem. papav. alb. 3x. Gummi Arab. tragac. & amyli, an. 3iii. sem. portulac. alth. malv. an. 3v. sem. cucumer. melon. cucurbit. citrull. sem. cydon. munda. an. 3vii. spodii, succi liquirit., an. 3iii. penid. ad pondus omnium F. Pulvis. Felicissimè ego & diverso modo hoc pulvere in multis

*Burnet Parte I.*

usus sum; modo cum vitello ovi, modò cum syrupo papaveris, vel jujub. cum eo etiam conficio morsello, & confectiiones in tabulis. Hic pulvis complet omnes intentiones; prohibet enim descensum pituitæ ad pulmones incrassando obsem. papav. alb. in magna quantitate admixtum, ratione gummi arab. & tragac. lenit. pectus, & materiam humectat, ut facilius per tussim extrahatur, exsiccat autem pulmo à spodio. *Petrus Forestus*, schol. obs. 58. lib. 16.

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Phthisi.

**C**uncta illa quæ acerrimum catarrhum obtundunt in usum ducuntur: modestè purgentur rhab. agar. ac syrup. ros. solut. Dein pulvis *Haly* in usum ducatur, qui Pulvis inscribitur ad tabem. Utantur ptisana colata cum conserva ros. dormituri, & emulsionibus sem. frigid. & aqua destillata ex cancris fluviatilibus, abstineant à salis & acribus. Lac caprillum in usum veniat. *Ioh. Heurnius*, ad aphor. 10. sect. 3.

Plurimos a rupta vena partium spirabilium Phthificos tractavi juvene, sed maxima eorum pars interit. Unus servabatur usu rad. Chinæ & sarsæ, quarum decocto miscebamus guttulas sex vel septem ol. sulphur. sed in aliis non successit. *Idem*, aphor. 9. sect. 5.

Summa religione tabidis pharmaca præscribantur. Cave ne validis alvum moveas, sed da illis potius aq. cancr. cum gutt. quibusdam ol. sulph. *Job. Heurnius*, ad aphor. 13. sect. 5.

Magno successu quidam utebatur in potu & omni cibo conserva rosar. rubr. solaque ea victitabat nonnunquam; adeo ut *Venetorum* Pharmacothecas omnes ea inanierit. Quædam (inquit *Arculanus*) comedit quadragintas libras sacch. rosat. & curata fuit. Potiones fiunt ex capill. Veneris, marrhubio, hyssopo, iride, liquir. & passulis, hoc mihi sæpe id usus feliciter fuit.

℞. Brassicam rubram conscissam, inde poculo, & diu in balneo coque, mane

M m

eo



coliquore utatur; sed hic succus alternis diebus recentari debet, nam facillimè putrescit. *Idem, cap. 7. de Morb. Pectoris.*

De hoc syrupo singulis matutinis, vel saltem alternis diebus, mane cum è lecto surgit, ad ℥i. plus minùsve per se sensim deglutiendo sumat, vel dilutum aqua limacum & portulac. julepi instar bibat.

℥. Succ. depurat. portulac. ℔ss. plantag. bugl. utriusque an. quart. j. aq. destillatæ è vivis limacibus & ranis, an. ℥iii. aq. scabios. viol. ros. an. ℥i. sacchar. puriss. ℔i. coque ad syrup. consistentiam. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 738.*

℥. Rad. consolid. ℥ii. rad. alth. ℥i. rad. liquir. ℥iii. sem. plantag. ℥i. sem. hyoscyami ℥ss. oculi cancri ℥i. gummi Arab. traga. canth. an. ℥ss. sacch. rosat. tab. ℥iv. F. Pulvis, capiat ℥ss. mane & vespere cum lacte caprino *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 737.*

In Phthificis summopere commendatur lac muliebre; quod iisdem viribus cum lacte asinino & caprino instructum, peculiariter etiam præiis ad nutritionem & refectiorem corporis tabidi feliciter operatur. utpote quod naturæ nostræ magis simile & familiare, in corporis substantiam citius & melius convertitur, à muliere sana agro sic propinari debet, ut illud è mammis ipsius indies bis terve bona mensura exsugatur, hac ratione aliquos restitutos novimus, ex iisque unum non solum convaluisse, sed tantas etiam vires recepisse, ut ne lac sibi in posterum deficeret nutricem de novo imprægnaret. *Felix Platerus, praxeos tomo 3. pagina 449.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Phthisi.

**P**ost omnis generis lenientes purgationes, varia expectorantia & alia quæ adversus maciem celebrantur auxilia, cum febris hectica & colliquans iugiter corpus absumeret, lac muliebre, ut affatim ex ipsis mammillis sugatur, consului, tantum ex eius potu per mensem exhibito, persensit utilitatem, ut eo, & unguento ex eodem lacte parato, pinguius-

culus factus, perfectam consecutus fuerit sanitatem. Unguento totum corpus ungebat tribus post cœnam horis, quod omnibus resumptivis præstantius est, hujus unguenti descriptionem, cuius usu tabidos sæpe impinguari vidi, candidè acceptam refero *Amato non ignobili Medico, qui lib. 1. cent. curat. 92. eam sic proponit.*

℥. Gummi tragac. & arabic. an. ℥i. infunde in aq. ros. per diem & noctem, add. ol. viol. ℥ss. butyr. rec. ℥ss. camphor. ℥i. M. & in mortario cum lacte muliebri fiat unguentum. *Zacutus Lusitanus, observat. 129. lib. 1. prax. admirand.*

Mulier quædam cum ex falsa destillatione & hæmoptoisi in ulcus pulmonis incideret; cum nec ex lacte asinino, caprillo, carne testudinum, expectorantibus, resumptivis, cardiacis, & infinitis propemodum remediis, opem sentiret ullam, tandem rhodofacchari usu assiduo convaluit, ita enim eo utebatur; cum hac conserva farinam subigebat, panemque cum ea delibutum esicabat, carnes selectas cum ea coctas edebat, pullos gallinaceos assos, prius benè conserva saginatos pro cœna habebat, vitellos ovorum interdum cum conf. rosac. assumebat: jejuno etiam ventriculo pulli jure gallinacei prius rhodofaccharo saginati utebatur, demum nullum ferculum offerebatur, quod rosam non redoleret, adeo ut ni timerem dici mendax, exponerem quantitatem quam comedit hæc mulier de sacch. rosac. cujus solius usu septem mensium spatio ita recreata est & speciosior facta, ut in facie vividus ac roseus conspiceretur color.

Maxima ergo est procurandis phthificis rhodofacch. vis atque potestas: nam modicè refrigerat ob febrem ob ulceris saniem detergit & ob solutionem continui glutinat. *Zacutus Lusitanus, observat. 130. lib. 1. prax. admirand.*

Frequens sit usus ovorum rec. editorum forbium, quæ præstat subinde è nido è glalina glocitante adhuc calentia sine ullius ignis coctura forbere, sit & multus recentis butyri usus. *Reinerus Solenander, consil. 28 sect. 9.*

Mulier quædam tantam lactis copiam quo-



quotidie fundebat ē mammis, ut non solum duos pueros optimē lactaret, sed etiam butyrum ē lacte suo conficeret pro pharmacopœa, qui eo ad curam Phthifici utebatur tanquam arcano optimo ad tabem; nullum enim est remedium eo præstantius. *Petrus Borellus, observat. 82. cent. 3.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Phthisi.*

**P**RO siccando ulcere pulmonis & abstergendo, syrupus Symphyti *Fernelii* maximē convenire videtur, præparatur quoque potio ad hæc exsiccanda ulcera, quam *Lacuna* in suo *Dioscoride* dicit esse admirabilem, capite. *De Ebeno*, quia tamen ille indifferenter describit ex decocto ligni sancti in hanc formam.

℞. Ras. lign. sancti ℔i. rad. aristol. rot. pulver. ʒ. m. liquir. passul. exacinat. caric. ꝑ. ng. cortic. limon. hyssopi, ana. ʒi. infund. in aquæ ℔xv. per diem, deinde coq. ad medietatem, in colat. dissolv. mell. opt. ℔i. & coquatur mediocriter in formam apozematis clarificati, cujus dantur singulo mane ʒiv. quia tamen decoctum hoc calidum nimis esse videtur propter febrem, ego in secunda coctione, dum sit apozema, adderem succi limonis depurati ʒiij. ita enim corrigitur caliditas ipsius. Solet enim succus limonis omnium decoctorum caliditatem infringere. Certum est in ulceratis pulmonibus & fere desperatis tabidis, cum nullis aliis remediis cederet affectio, solum decoctum ligni guajaci sanitatem aliquando restituisse, id aliquibus exemplis *Schenckius* in suis observationibus testatum reliquit; & *Andreas Lacuna* in suo *Dioscoridi* cap. *De Ebeno*, hoc præ cæteris remedium proponit & laudat. *Rodericus d Fonseca, tom. 1. consult. 5.*

*Philippus Ingrassia* in consilio pro Duce *Terranova*, scribit se *Pannormi* curasse mulierem quandam, quæ ex sanguinis copioso sputo à pulmone regurgitante in Phthisin lapsa erat, pluribusque in sequentibus mensibus non contabuit modo,

sed continuò pus male olens expuebat; præsertimque per intervalla quædam, non majora quidem duab. hebdomadis maximam puris quantitatem inde collectam sepe numero quatuor librarum expuebat. Hæc cum vix per mensem ligni sancti decoctum absorbuisset, ita sanata fuit, ut salva supervixerit, nec amplius recidivaret; licet decimus quartus ageretur annus dum hæc scribebat *Ingrassia*. *Marcellus Donatus, c. 10. lib. 3. Hist. med. mirab.* Ubi adhuc plures habentur hystoriæ Phthificorum ligni guajaci decoctio curatorum.

Uxor cujusdam consiliarii phthifica interit, & post unum aut alterum mensem illius ancilla, quæ diu noctuque illi ministrabat, in similem affectum incidere videbatur: laborabat enim febre lenta, cum tussis sicca diu noctuque perseverante, macie totius corporis, inappetentia & vigiliis. Vocatus ad eam, præscribo venæsectionem & purgationem universalem ex apozemate, & balnea tepida cum victus ratione incrassante & refrigerante; quæ nihil contulerunt, tandem mecum reputans affectum procedere ex maligna qualitate impressa pulmonibus & cordi per contagium, præscribo decoctum guajaci, ad quindecim dies cum vino analeptico, sine sudore, quo remedio perfectè curata est, & febris, tussis aliaque symptomata omnino desierunt. *Lazarus Riverius, observ. 99. cent. 1.*

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Phthisi.*

**M**ULIER quædam viginti quinque annos nata gravi fluxione in pulmonem decumbente, ab aliquot mensibus detinebatur, cum tussi molesta dies notæque affligente, vigiliis perpetuis, dolore pectoris, febre lenta, alvi constrictione & macie totius corporis, ita ut phthifica omnino videretur. Vocatus ego, præmisso clystere molliente, jubeo sanguinem detrahi ad ʒ. viij. Mox duo caustica adhiberi inter scapulis iuxta spinam dorsii: ptisanam laxantem præscribo per quinque dies continuos usurpandam: cujus descriptio hæc est.



24. Tamarin. ℥ss. aq. fontis ℔iij. coq. ad ℔ii. in colat. infund. frigide per noctem sen. mund. coriandr. & liquirit. contus. an. dr. iij. ros. rubr. dr. i. capiat cyathum unum mane hora una ante pastum. Paucis hisce remediis ita restituta est, ut post quindecim dies è lecto surrexerit, & ad consueta munia sese conferre cœperit; lacte demum asinino per mensem usurpato integrè convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 78. cent. 2.*

Puella phthifica & ad extremam maciem perducta, ex consilio Medici solis passulis victitavit cum pane comestis; & pro potu utebatur decocto hordei & liquir. sicque intra octo menses restituta est optime, & probe impinguata. *Lazarus Riverius, observ. 33. cent. 4.*

Phthifim per contagium communicatam curavimus præter omnium spem sequentibus remediis: ac primo potione ex manna & syrupo ros. in decocto pectorali, sequenti die applicita sunt duo caustica posteriori parti cervicis: postmodum jussula exhibui per quindecim dies cum rad. chinæ, fol. bugl. tussilag. pulmonar. & passul. corinthiac. quæ per intervalla purgantia reddidi. Utebatur etiam continuo conserva ros. & sæpe sub noctem syrupo fluxionem cohibente ac tussim sedante, ex æquis partibus syrup. viol. de rosis siccis, & de papav. *Simeon. Jacoz. Observ. 92. cent. 4. Obs. Riverii.*

In Phthifi sacch. rosac. sum plurimum usus, cujus miram vim in Phthifi levanda esse *Avicenna* narrata rabida mulieris historia plenissimè docet: quod & ego pluries felici successu in multis expertus sum: habet enim siccandi, & modicè etiam detergendi vim, atque etiam glutinandi, unde mirifice pulmonum ulcera juvat, & ex consequenti natam inde tabem curat. *Franciscus Valeriola, observ. 5. lib. 5.*

Mulier quædam destillatione ad pectus per annos aliquot laborarat, & ita quidem vehementer, ut quamvis multis variisque remediis, tum à Medicis doctis, tum etiam ab Empiricis præscriptis usa fuisset, exiguum tamen fructum inde acceperit: tandem usque adeo auctum fuit malum, ut non solum materiam purulentam copiosè, verum etiam sanguinem ex-

pueret; & in hecticam cum totius corporis extenuatione & prostratione virium incideret. Ego tandem cum in consilium adhibitus essem, præter convenientem dietam, & exhibitionem medicamentorum, tam per os assumptorum, quam exterius applicatorum, nuchæ quoque setæcum adhibui, cujus beneficio brevi maxima cum admiratione eorum, qui ipsam antea cognoverant, ita restituta fuit ægra, ut etiam deinceps proles aliquot procreaverit; cum tamen antea per annos aliquot, & præcipuè ab eo tempore, quo destillatione prædicta laboraverat, utero non gestasset: *Guil. Fabric. Hildanus, obs. 38. centur. 3.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Phthifi.

**C**uravi Phthificos nonnullos planè desperatos, & incipientes plurimos. Summa curationis hæc est; exhibeo ipsis decoctum ligni guajacini per duos tresve menses, prius evacuato corpore, si ægroti sint cacochymi, per mannam syr. rosat. solut. per enemata, prout necessitas expostulare videtur; in decocto aliquando macerari jubeo faniculam, pedem leonis, quinque folium & veronicam; vini aliquid interdum concedo. Victus ratio est, ut caveat à falsis & acribus. Cibi sint lenti, quales sunt nervosæ carniū partes, pedes, aures, rostra animalium benè cocta; gelatinæ etiam ex his confectæ; sed sine aromatibus; carnes comedent juvenes, & cochleas bene coctas, testudines nemorales, hordeum, orizam, milium in lacte chalybeato cocta: ex fructibus profunt amygdalæ dulces, ficus, uvæ passæ, pinæ, pistachia, pyra, cydonia. Expectorantia sunt humida ex speciebus diaireos simpl. sacch. candido, & sulphure sublimato, mane sumat de electuario isto, hora una vel altera ante prandium.

24. Carnis perdicum coct. ℔ss. limac. coq. ℥v. amygd. dulc. pinear. pistac. an. ℥i. passul. enucleat. ℥v. bol. arm. orient. terr. sigill. coral. rubr. ust. an. ℥i. gummi Arabic. tragacan. an. dr. ii. sem. papav. alb.



℥vii. quatuor sem. frigid. maj. & min. an. ℥iii. conserv. consolid. maj. ℥i℥. flor. hyperic. M. j. in lapideo mortario & simili pistillo contundantur, & mistis add. hypocistid. ℥v. diachamar. diarrhod. abb. an. ℥ii. macis ℥i. pulv. fol. sanguisorbæ, C. C. usti. an. ℥ii. sacch. ros. tab. ℔ m. cum syrup. de consolid. q. s. F. Electuarium, &c. *Thomas Erastus consil. 8. libr. 13. consil. Cratonis & Aliorum Medicorum à Scholtzio editorum.*

Syrupus ex succo hederæ terrestris commendatur à *Quercetano*, ejusque descriptio talis est.

℥. Succ. heder. terrest. ℔ii. m. digeratur ut purificetur ad ignem B. M. huic succo depurato adde sacch. rosat. ℔i. penidiat. ℥. iv. coq. in syrupum quo utatur æger ex cochl. huic syrupo idem *Quercetanus* flores sulphuris admisceat ad consistentiam lohoch. de quo exhibet quater in die, coque se multos Phthificos desperatos & proclamatos restituisse gloriantur.

Syrupus sequens eximias vires habet.

℥. Succ. heder. terrestr. veronic. & card. ben. depurat. an. ℥viij. in quibus bulliant leviter fol. adianth. polytrich. scabios. & lactuc. an. M. m. in colat. dissolv. sacch. albiss. ℔i. m. F. syrupis perfectè coctus, addendo in fine extract. juniperi dr. iii. succ. liquir. & extract. card. bened. an. ℥. iv. capiat æger cochl. j. hora una ante prandium, & ante cœnam, & in ingressu lecti.

Crollius valde commendat Elixir proprietat. Chymici medicamenta ex sulphure ut flores, lac, & balsamum maximè laudant. Illorum usus commodissimus talis esse poterit.

℥. Flor. sulph. thuris pulver. an. ℥i. includantur pomo excavato: coquatur pomum & saccharo conspersum comedatur ab ægro, manè per octo aut decem dies. Vel,

℥. Conserv. ros. antiq. diamarg. frigid. diapenid. an. ℥i. flor. sulph. pulver. dr. iii. cum melle despumato, F. opiata de qua capiat magnitud. avellanæ bis, aut ter in die. Laudant etiam nonnulli Antim. diaphoreticum. Balsamum Peruvianum ad ulcera pulmonum sananda multum conducit, si ejus gutta una cum saccharo in pilulam redacta singulis diebus exhi-

*Burnet Parte I.*

beat. Pulvis pimpinellæ ad ℥i. cum jusculo singulis diebus exhibitis, maximè etiam creditur efficacæ.

Pilulæ *Ruffi* è nonnullis commendantur tanquam efficacissimæ, sumendo ℥i. singulis diebus. Verum in sequentem modum compositæ mirabiles edunt effectus.

℥. Massa pilul. *Ruffi* ℥i. antimon diaphoret. & gummi guajac. an. ℥℥. cum balsamo Peruviano, F. Massa de qua capiat ℥i. per mensem integrum.

Suffumigia etiam utiliter usurpari poterunt ad ulcus pulmonis potenter exsiccandum, & illa ore, naribus frequenter attrahenda sunt. Compositio talis esse potest.

℥. Gummi hederæ dr. i. m. thuris dr. i. myrrh. dr. m. succin. ℥i. benjoin. styrac. an. dr. m. hypocist. ℥ii. sem. coriandr. ros. rub. an. ℥i. pulverentur; & excipiantur mucilag. gummi. tragac. vel resina laricea. F. Trochisci super prunas iniciendi: vel simplicius fiant suffumigia ex thure, myrra, & mastiche, benjoi no quæ semper sint in thalamo, ut fœcus aer & odoratus attrahatur. *Lazarus Riverius, prax. Medic. lib. 7. cap. 7.*

## SUBSECTIO OCTAUA.

### Pro Phthisi.

**S**Anavi Adolescentulam quandam postquam velut Phthoe pessima laborantem, ipse ego pro deplorata reliqueram. Aderat febris vehemens, spirandi difficultas, maxima tussis, puris sputum copiosum, itaque cum cetera auxilia non valerent, jussi ut sola Pœisana pro cibo uteretur, aquaque cum saccharo confecta acciperet autem singulo mane ℥iv. decocti caudarum & chelarum Cancrorum in aqua hordei, cum ℥ii. sacchari: convaluitque perfectè & sanata est, hoc eodem auxilio multos admodum curavi, qui integrè sanitati restituti sunt. Erat autem illa filia unius qui ex Phthoe vera obierat. *Hieron. Cardanus, curat. 8. sect. 3. Method. Medic.*

Honoratissimus *D. Robertus Boyle, lib. 2. De Utilitate Philosoph. Experimentalis sect. 5. c. 6. Pro Phthisi & Tussi* plurimum extollit balsamum sulphuris crassum, quod ita fit.

M m 3      ℥. Fl.



24. El. sulphur. ℥ss. ol. olivi. vel nucum, vel, sem. pepav. alb. ℥iiss. bulliant in vase vitreato semipieno igne convenienti adhibito, continuo spatula agitando, ut ritè dissolvantur flores, & sanguineam rubedinem acquirat mistura: horulæ spatium paratur. Balsamum ab igne remotum, adhuc agitando est, donec frigescat, exhibeantur mane aliquot guttæ cum sacch. rosac. Valet etiam in Arthritide, Contusionibus & Tumoribus quibuscunque externe illitum. Idem Medicum quendam novit, qui Phthisin, sulphuris, succini, & betonicæ vel tuissilaginis fumo, feliciter curabat.

Spiritus salis dulcis, ut & simplex liquor tartari, incomparabilis sunt efficacix, guttatim in cerevisia, jusculo vel vino assumpti. *Paulus Barbette, prax. lib. 3. cap. 2.*

*Retulit Montanus*, sequendam pro desperato à Medicis *Veronensibus Venetiis* misum Phthysicum jam, qui quotidie duas scutellas puris expueret, curasse solo usu sacchari rosati; sed id dedisse in majori copia, ita ut ferè nihil aliud comederet, & Pharmacopolæ *Veneti* illi saccharum rosatum vendere nollent, sed cogeretur aliunde afferre. Vixit tribus annis post sanus. *Ioh. Baptista Montanus, consilio 152.*

Mulier quædam annos circiter 25. nata, bilioso admodum temperamento prædita, gravi fluxione in pulmonem decumbente ab aliquot mensibus detinebatur, cum tussi molesta dies noctesque affligente, vigiliis perpetuis, dolore pectoris, febre lenta, alvi constrictione, & macie totius corporis, ita ut phthysica omnino videretur, & à multis diebus lecto affixa ad interitum rueret. Vocatus ego calidissimam viscerum intemperiem advertens, & perpetuam alvi constrictionem maximè importunam, præmisso clystere molliente, jubeo sanguinem detrahi ad ℥vii. Mox duo caustica adhiberi interscapulio juxta spinam dorsi. Ptisanam laxantem præscribo per 5. dies continuos usurpandam cujus descriptio talis est.

24. Tamarind. ℥ss. aq. font. lb. iii. coq. ad lb. ij. In colatura infund. frigide per noctem sennam mund. coriand. & liquir. contus. an. ℥ii. ros. rubr. ℥i. Colaturæ ca-

piat cyathum unum mane hora una ante pastum.

Paucis hisce remediis ita restituta est, ut post quindecim dies è lecto surrexerit, & ad consueta munia sese conferre cæperit. Manebattamen alvi constrictio & somni vacuitas, quibus affectibus eliminandis præscribo primum bolum ex conserve ros. ℥i. & laudan. g. j. compositum, quo per quatuor aut quinque hor. dormivit, ac deinceps singulis noctibus fere integris, sine ullius remedii auxilio. Deinde jubeo, ut ptisanam laxantem reiteret per aliquot dies vere insequenti, lacte asinino per mens. usurpato, omnino restituta est. *Lazarus Riverius, obs. 78. cent. 2.*

Phthysicos diuturnitate mali etiam extenuatos, lateris dolore quandoque corripitur accidit: qui subinde valde molestus, & libertatem respirandi impedit; febrilem tamen non multum intendit calorem. His pulmo membranæ costas subcingenti ita firmiter agglutinatus adhæret; ut sæpenumero non absque violentia avelli queat. Concepto aliquo spiritu frigido, dolor supervenit. Tollitur ac curatur sudorificis; ut fomento ex flor. chamæmeli & cumino, quod multis benefecit. Sacculo hæc insuere oportet, qui deinde candido vino rigatus, calens dolenti loco imponitur. Venam secare qui temere audent, quantum sanguinis demunt, tantum vitæ detrahunt. *Rembertus Dodonæus, cap. 22. Medic. observ.*

Bellis major cum foliis & floribus in zythogala decocta & pota adversus phthysim, asthma & orthophæam singulare remedium censetur. *Joh. Rauius Catal. Plant. Angliæ.*

Rusticus quidam Fisenfis nomine *Johannes Hufson* difficultate respirandi eximia cum sputo purulento oppressus, à Domino Rutzeno Medico nobili & experitissimo remedium petiit, qui post vibratas aliquot quæstiones, sputisque inspectis, nullum aliud, quam moriendum esse responsum dedit, a quo rigido oraculo non parum deterritus, ab anili vetula hoc tandem accepit remedium.

24. Cerevis. communis lb. iv. picis liquid, & butyr. rec. an. lb. i. coq. simul, de hoc bibebat singulis diebus mane ℥viii. & tantundem



dem hora quinta vespertina per quadri-  
duum, à primis haustibus mite turbato  
ventriculo, enormes successarunt vomitus  
hinc rupto abscessum sanus evasit. Vir qui-  
dam fide dignissimus mihi narrabit, in diu-  
turnis & desperatis morbis, plebejos pluri-  
mos, potissimum maritimos, ad hoc tan-  
quam extremam unctionem, & ultimum  
remedium confugere. *D. Robertus Cuning-  
ghame* in M. S.

## SECTIO VIGESIMA SEXTA.

### De Phygethlo.

Φυγέθλον (in αἵματι gigno) Latine Panus,  
Phlegmone est in adenum locis emergens,  
maximè verò in cervicibus, in alis, aut in-  
guinibus; qui in inguine nascitur, peculi-  
ari nomine Bubon nuncupatur, easdem  
cum Phlegmone agnoscit causas, & iisdem  
signis innotescit: ferè autem fit hic tumor  
post febres, aut dolores ali cujus partis,  
maximeque eos qui ventrem infestant.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Phygethlo sub alis.

**D**etracto sanguine ex vena brachii  
eiusdem, Cataplasma ex atriplice,  
malva, rad. alth. cum butyro & farina  
frumenti apposui: ruptoque absces-  
su paulò post convaluit. Curatur Phy-  
gethlon ut ceteræ inflammationes. *Pe-  
trus Forestus, observ. 7. lib. 7. Observ.  
Chirurg.*

## SECTIO VIGESIMA SEPTIMA.

### De Phymate.

Φύμα (in αἵματι nasco,) tumor est glandu-  
larum rotundus, Phygethlo minor ac pla-  
nior, minusque rubens ac dolens, qui sta-  
tim augetur, & in suppurationem abit: à  
sanguine pituitoso proficiscitur. Pueros  
maxime affligit.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Phymate versus pubem.

**I**d statim factum est acuminatum, &  
augebatur, & ad suppurationem festi-  
nabat, (nam Phyma est tumor acuminat-  
us, qui statim augetur, teste *Galeno* se-  
cundo ad *Glauc. cap. 2.* & ad suppuratio-  
nem festinat; quod tuberculum, ad simi-  
litudinem eorum quæ ex terra nascuntur,  
appellant) cum plerumque in Pueris abs-  
que medicatione suppuretur, & ad sanita-  
tem perducantur, diachylon cum gummi  
applicari mandavimus; ut & alteri empla-  
str. de mucilag. quibus facillè ad suppuratio-  
nem devenerunt Phymata, & curata sunt.  
In Pueris hoc vitium sæpius nascitur, &  
facilius tollitur; in juvenibus rarius oritur,  
& difficilius curatur: ubi ætas induravit,  
ne nascitur quidem attamen in senioribus  
conspeximus; quin & *Amato* evenit. Cura-  
tur etiam tritico manso & imposito. *Fore-  
stus obs. 8. lib. 1. obs. Chirurg.*

## SECTIO VIGESIMA OCTAVA.

### De Pica.

**F**œmina quædam gravida libras ali-  
quot zinzib. maxima voluptate, sine  
ullo incommodo, una vice devoravit; nec  
quod mirum erat, ardorem in faucibus ul-  
lum se sentire mihi passa est, multò minus  
in ventriculo. *Felix Platerus, observ. lib.  
1. pag. 239.*

Novi mirabilem vim habere pro sanan-  
da malacia dare ℥ss. pulv. sem. ammeos  
quatuor diebus successivis: nam aut libe-  
rantur prorsus, aut multò melius habent.  
Verissimum etiam esse observavi, quod an-  
tiqui scribunt, nempe amyllum sanare  
malaciam. Exhiberi debet dissolutum ju-  
re pullorum. Utilissimum vinum hoc pa-  
ra modo.

℥. Limaturæ chalybis ℥ii. Macerentur  
in vini generosi lbiv. tribus diebus.  
Quarto decoque ad consumptionem quar-  
tæ partis. Cola per manicam *Hippocr.*  
reponito in loco frigido. Da in mensa  
pro primo haustum potandas ℥iv. Scio e-  
go & profiteor, non posse excogitari præ-



stantius remedium prò tollenda omni malacia, ut experientia manifestum fecit. *Felix Platerus* apud *Joh. Scroterum*, *consil.* 103.

## SECTIO VIGESIMA NONA.

### *Pro Pilarum defluvio.*

**O**leum carioph. chymicum præstans est remedium, si pars depilata leniter inungatur. *Rodericus à Fonseca*, *tom.* 2. *consult.* 60.

Post purgationem universalem, locum depilem ut lavaret mandavi sequenti lotionne, scilicet vino infusionis rorismar. & abrotani: deinde ut inungere unguento sequenti.

24. Ol. ovor. myrtin. liquoris destillantis è limacis rubris, an. ʒʒ. ciner. capill. human. talpæ, an. ʒii. ciner. apum, muscar. an. ʒi. ciner. abrot. ʒʒ. pingued. cuniculi ʒiʒ. propol. ʒʒ. ladan. puri, ʒiii. facis olei sem. lini ʒii. mell. despumat. ʒʒ. incorporentur omnia, & redigantur in unguentum, quo pili regenerati sunt. *Petrus Forestus*, *obs.* 6. *lib.* 31. *De fucis.*

## SECTIO XXX.

### *De Pleuritide.*

**P**leuritis morbus est thoracis omnium molestissimus, & acutissimus, quo nullus frequentius in hominum vitam invadit. Est autem phlegmone ejus membranæ quæ costis subtenditur, ut plurimum à tenui biliosoque sanguine ortum habens, cum febre continua, dolore lateri punctorio, tussi vehementi & spirandi difficultate, causatur à sanguine sive puro, sive humoribus calidis & biliosis admisto in membranas effluentem, causæ remotæ sunt, cacochymia, plectora, suppressæ sanguinis consuetæ evacuationes, alvi fluxus inrempestiva detentio, contubo pectoris à lapsu, aut ictu violento, vehemens exercitium, & ab exercitio largus haustus frigidus, vini meracioris ingurgitatio, æstus nimius, & frigus nimium. Pleuritidis signa pathognomonica sunt, dolor lateris acutus, respiratio difficilis, frequens & par-

va, febris continuâ, tertianæ typum plerumque observans & tussis initio sicca, postea humida, cum sputo colorato & cruento: quibus adde pulsum durum loco ferri-ni, qui merum figmentum est: alia est vera quam hactenus descripsimus, alia notha, quæ inflammatio est musculorum intercostalium externorum; hæc oritur aliquando à sanguine in externos illos musculos effuso, aliquando etiam à flatibus; interdum quoque à destillatione: dignoscitur vera à notha, quod in illa æger in partem lateri dolenti oppositam decumbere non potest, ob membranam suspensam pondere concepto gravatam; in spuria verò difficilis est decubitus in la-tus affectum.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Pleuritide.*

24. **F**Lor. chamæm. melil. rosar. an. M. j. contund. grosso modo, & in aqua coq. pro fomentatione loci affecti cum spongia. Item,

24. Ol. chamæm. ol. sem. lini an. ʒi. ol. ros. compl. aneth. an. ʒii. M. cum modico ceræ F. linimentum, post fomentationem, aperiat vena è basilica sinistri lateris, ubi erat dolor, & extrahatur sanguis ad ʒvi. donec mutaretur color, Deinde.

24. Syrup. viol. ʒii. penid. ʒi. syrup. de liquir. ʒʒ. M. pro lambitivo. Item,

24. Aqua scabios. & helenii, an. ʒii. syrup. viol. & tussilag. an. ʒi. M. F. julepus: sumatur bis in die manè & vesperi.

24. Ol. amyg. amar. adipis anser. an. ʒiʒ. M. pro unctione totius pectoris ad facilitandam tussim & resolvendam materiam; adeps anseris additur propter penetratio-nem, quia hic inter omnes adipēs maxi-mè penetrat, est enim subtilissimarum par-tium: relaxat, resolvit & habilitat pectus ad motum, *Joh. Baptista Montanus consil.* 172 & 174.

Internam ejusdem lateris, ubi dolor erat, secare jussit venam, sanguinemque ad lbii. fluere; paucis tandem ad motis ad locum dolorosum topicis medicamentis, intra se- ptem dies sanitati restitutus fuit, erant verò illa



illa vesica bovina semiplena aqua, in qua incoctæ fuerit chamæm. melil. viol. parietar. ros. malv. sem. lini & scœnugræc. an. partes æquales, cum multo viol. & rosac. oleo. *Amatus Lusitanus, cent. 1. cur. 12.*

℥. Aq. benedict. aq. hyssop. an. ℥i. syrup. de hyssopo, ℥iii. M. F. potio: qua epota, ore & alvo rectè purgatus fuit, ac statim se revalescere asseveravit; sequenti die post assumptam purgationem basilicam venam ejus lateris, ubi hærebat dolor, pertundere jubebam, ex qua multum sanguinis extractus est, & longè rectius habere cœpit; ab initio curationis latus dolore affectum perungi singulis ternis horis jubebam sequenti limmento.

℥. Unguenti de alth. ℥ii. ol. amygd. d. ℥℞. M. ad ignem, ut F. linimentum; peruncto loco calida applicentur lintea vice potus utebatur isto decocto.

℥. Hord. mund. ℥iii. card. mariæ, hyssop. an. M. j. liquir. ℥℞. ficuum, numero 6. passar. uvar. ℥iii. sacch. ℥i. coq. in aq. f. q. ad tertias. *Martinus Rulandus, curat. 25. cent. 2.*

Ad antecedentem causam tum revellendam tum derivandam phlebotomiam institui in vena hepatica affecti lateris; dolor inde se remisit: a venæsectione ad proximam causam extirpandam conversus suadeo hanc potionem.

℥. Aq. Card. ben. ℥vi. elect. de succo ros. ℥vii. M. haustu foeliciter operante, quatuor dierum spatio convaluit. *Martinus Rulandus, curat. 26. cent. 7.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Pleuritide.

**A**D pleuriticum quendam quarto die vocatus, cum eodem die alvum ex se deposuisset, illicò venam basilicam ejusdem lateris, ubi dolor erat, secare feci, sanguinisque ℥viii. extrahere; à qua sanguinis missione dolor nonnihil evanuit, qui tamen sub noctem redibat ex parte; sed fotu sequenti plurimum mitigatus est, loco affecto simul inuncto.

℥. Flor. chamæm melilot. malv. an. M. j. sem. scœnugræc. ℥℞. F. decoctio in aq. pro

ibi. pro fotu cum spongiis expressis ut artis est.

℥. Ol. amygd. d. chamæm. pingued. gallin. butyr. rec. an. ℥℞. ceræ modicum F. unguentum, unde dolor multum sedatus est; interea utebamur lambitivo in hunc modum parato.

℥. Syrup. jujub. viol. an. ℥i. syrup. liquirit. ℥℞. diatragac. frigid. ℥℞. M. F. eclegma; die sequenti cum purgavimus cum ℥i. diacathol. & feri lactis ℥iii. quo quinquies alvum deposuit, & cœpit melius habere, & facilius expuere; lambitivo ex syrup. jujub. & liquirit. adjecto sacch. penid. utens; & ita paucis diebus hic sanus evasit, pro potu ptisanam confectam ex hord. mund. passulis & liquir. capiebat. *Petrus Forestus, observ. 26. lib. 16. De Pectoris pulmonisque morbis.*

*Hippocrates Anaxioni* pleuritico octava die venam secuit; sic ego aliquando in muliere pleuritica octava die venam secari feci, quæ postea aliis adhibitis remediis sana evasit: itaque si tardius vocati fuerimus ad pleuriticos, & omissa fuerit venæsectio, etiam post quartum diem sanguinem mittere licet, modo vires adsint, ac dolor ac febris urgeat, & sputum nondum maturuerit. *Idem, observ. 33. lib. 16.*

Licet multi aliter sentiant, semper mittendus est sanguis ex latere affecto. *Idem, schol. observ. 32. lib. 16.*

Ego ut ingenuè fatear, nunquam, aut saltem rarissimè optatum successum vidi ex sectione venæ in opposita parte facta, facile enim sic ex simplici pleuritide duplex sequetur, quod & nonnullis maximo eorum damno accidisse memini: tutius itaque erit ex eodem latere venam secare; egregie enim materia peccans, & in parte affecta conjuncta hoc modo evacuat. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 30. cent. 5.*

Sal. prunellæ in aquis portulac. fragor. & acetos. satis bona quantitate exhibitum idque repetitis vicibus, pleuritidem citò ad expulsionem faciliat: hederæ terr. aqua si ad ℥iv. à pleuritico bibatur, idque in die quater repetatur à purulenta materia pectus expurgari, & ab empyemate & phthisi præmuniri tradunt. Vulgus pro singulari remedio in pleuritide aquam, cui cultrum, quo laniones animalium guttura



solvere solent, per aliquot horas imposuerunt, exhibet. *Felix Platerus, prax. tom. 2. pag. 381.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Pleuritide.

**S**utor quidam juvenis & biliosus pleuritide laborans, post multas phlebotomias, aliaque remedia ordinaria, die quinto, perseverante febre intensa & lateris dolore, sumpsit pomum coctum cum Zi. thuris, superbibendo aq. Card. bened. ℥iv. & postea tectus est, sudavit parum sine febris imminutione, sequenti die multum sudavit; & inde convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 56. cent. 1.*

Puerulus quidam quinque annorum correptus est pleuritide lateris sinistri, cum febre acutissima. Post remedia ordinaria per quinque dies usurpata, & quatuor phlebotomias, jussi ut cucurbitulae duae lateri dolenti applicarentur, cum profundis scarificationibus: contingit autem ut ex scarificationibus illius cucurbitulae quae dolentem locum proprius attingebat, sanies multas efflueret per totum diem, simulque dolor, ac febris desierit: jussi ut admoverentur folia betæ supra loca scarificata, & per duos dies saniei fluxus continuatus est, ac denique in fine verum pus è vulneribus emanavit: atque ita æger omnino curatus est: credo scarificationes ad locum pleuritidis pervenisse, & materiam morbificam per ea vulnera emanasse. *Lazarus Riverius, observ. 39. cent. 3.*

Puer quidam duodecim annorum laborabat pleuritide lateris dextri; quinquies secta fuit vena, & alia remedia ordinaria administrata usque ad septimum diem, febris erat intensa; cum inquietudine magna, dolor valde urgebat exhibita fuit die septimo, fuligin. camini pulv. ℥ss. cum aq. card. ben. intra duas horas ab assumptione, omnia symptomata valde remiserunt, ægerque multo melius habuit, & postmodum sensim convaluit. *Lazarus Riverius, observ. 79. cent. 2.*

Multos & præcipuè mulieres ex pleuritide ad extrema ferè redactos, restitutos vidimus usu pomi *Quercetani* semel aut bis

sumpti intra viginti quatuor horas, unde præter spem, vel copiosus sudor, vel anacatharsis libera sequebatur: plurimos certè nominare possem quibus ferè desperatis hoc remedii genus præscripsi, nec unquam alium quam felicem eventum ex eo animadverti: multisque qui hoc apud ægros observaverant, ita successisse multoties audiui. *Simon Iacoz, observ. 88. cent. 4. Observ. River.*

Puella quædam atrabilaria sævissimo pleuritidis dolore excarnificata, jam undam letheam bibebat; à qua eam extraximus sic.

℥i. Ol. amygd. d. ℥ii. laudan. gr. iiii. M. paulò post quievit dolor & melius habuit. *Petrus Pacheguns, observ. 20.*

Omnes pleuritici qui vomunt statim in principio morbi, evadunt, ut in infinitis observavi, levata pleura ab humorum sarcina vomitus beneficio. *Idem observat. 29.*

Ut in angina, conclamatis omnibus, in gutture foris sectio fieri potest, fortassis idem & in pleuritide factitari potest inter quintam & sextam costam: e, xigua enim puris evacuatio magna affert commoda mortalibus. *Guil. Ballonius, lib. 2. epid. ephem. pag. 249.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### Pro Pleuritide.

**H**ircum suspendo cornibus, & crura posteriora reflecto ad cornua: testes abscindo, & recepto inde cruore exanguem dimitto pro lanione; hic autem cruor siccatus est instar vitri, difficilissimeque triturationis, atque longissimè ab hircino sanguine officinarum differens; assumptus autem Zi. pondere, confestim sopit & curat pleuritidem absque venæ sectione, nec te deferet unquam. *Ioh: Helmontius tract. cui tit. Sextuplex digestio alimenti.*

Sunt mea remedia quæ neminem in pleuritide & peripneumonia derelinquunt, pulvis de virga cervi, vel tauri, vel cruor hirci, vel succus cichorii sylvestris, flores papav. sed potissimum laudo cruorem hirci, non quidem venalem, sed qualem supra descripsi; à venali cruore (qui nil nisi



ovillus est) dignoscitur, quod venalis facile teratur, eiusque pulvis; sit puniceus, hircinus autem verus difficillime teritur, estque piceo coloris illius pulvis; huiusmodi præidia *Archo* amica, atque domestica naturæ humanæ, causam immediatam in *Archeo* corrigunt, tolluntque acorem, & ad diaphoresin disponunt cruorem, dolorem pacant, quia acciditatem extinguunt. *Joh. Helmontius, tract. de vit. Pleura furens.*

Vidi Rusticum omnes pleuriticos tertio potu sanantem; utebatur enim stercore iumenti pro viro, & caballi pro muliere, quod diluebat in cerevisia, ac colaturam expressam propinabat. *Joh. Helmontius, tract. De febribus.*

Administretur cum iure, aut aliquo convenienti liquore sterco columbinum in pulverem redactum 3ß. pondere; est hoc pleuritidi remedium optimum & apud magnates aliquos inter secreta principalia celebratur. *Dominicus Panarolus, observ. 15. Pentecoste 4.*

Dux *Archorensis* æstate, dum gallinæ per gramina aluntur & pascuntur, id album quod in stercorebus earum apparebat in pulverem siccatum redigebat, & dabat ʒi.

In magnis peluriticis doloribus venæsectione etiam copiosa, formidari non debet, quam in hoc casu. *Joh. Heurnius* in viro florentis ætatis ad libras 4. felici cum successu instituit, notis ad cap. 11. lib. 5. pathalog. 10. *Fernelii.*

*Adrianus Spigelius* nostra memoria quendam cum discrimine à lateris dolore decumbentem servavit aperta lateris vena, quæ in conspectum venit. *Joh. Rhodius, observ. 17. cent. 2.*

*Joh. Prevotius* sinistri lateris pleuritidem plerumque per urinas deponi observavit; ideo hoc in casu feliciter diuretica exhibebat mitiora; è quibus diacuminum ipse erat familiare, diaphoretica nunquam voto succedere. *Joh. Rhodius, observ. 13. cent. 2.*

Inter remedia interna mirum in modum confert aqua flor. cham. stillatitia: partem enim lenit, resolvit, aperit, & sudorem movet. *Lelius a Fonte, consult. 147.*

Urina hominis vasis accurate clausis, in stercore equino per sex hebdomada fermenta-

tata, leni calore spiritum per destillationem suppeditat, qui semel aut iterum rectificatus magnum est pleuritidi & utile remedium; à decem usque ad triginta guttas sumi potest, cum liquore convenienti. *D. Robertus Boyle, lib. 2. De utilit. Phil. natural. sect. 5. cap. 5.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Pleuritide.

**M**ulier quædam pleuritide acutissima laborans, nullo alio auxilio magis levata est quam decocto flor. papav. rubei, quo utendum omni die cum syr. hyssop. iubeamus, calida accepta potione; mirabiliter enim flores huiusmodi levandis laterum doloribus valere experientia quotidiana docet, & mihi familiare & expertum id remedium esse solet. *Franciscus Valeriola, observ. 10. lib. 5.*

Pro pleuritide ad suppurationem tendente decoctum tabaci mirum est medicamentum: testor Deum, me anno elapso, à morte ad vitam revocasse quandam meam vicinam: quæ jam erat per tres menses pleuritica suppurata cum febre hectica, quæ ab istius decocti adsumptionem; per tres vices, & ab ejus sumo per fistulam accepta tribus diebus plus quam sex libra puris albi tussi evomuit, & nunc libera & sana est; decoctum ita paratur.

ʒi. Fol. tabaci ʒi. bull. at in aq. dulcis ʒi. ad medietatis consumptionem, addendo sub finem fol. malv. & branc. urinae & viol. an. M. i. colatura cum sapa misceatur, & detur calide pluries: fumum tabaci asumat quandoque ante decoctum, & quandoque post. *Epiphanius, Ferdinandus histor. 32.*

Inungatur pars affecta unguento de althæa, & postea cumini pulvis inspergatur, vel post inunctionem brassicæ oilum ad ignem calefactum, & inunctum admoveatur. *Faventinus* miscet & unguentum de althæa cum oleo amygd. post inunctionem aspergit pulv. cumini, & superimponit solum caulis, & miris laudibus effert, item gallina viva per spinam secta pulvere ireos confersa, & admota multum prodest. *Pan-nis recens e furno extractus, per medium sectus,*



fectus, & butyro recenti liquato madefactus, & admotus, materiam lateri impa-ctam potenter resolvit.

Oleum sem. lini, vel amygd. d. rec. sine, igne extractum, cum saccharo mixtum, & exhibitum, egregie tussim lenit, & dolorem pleuriticum demulcet.

Inter specifica, quæ usurpari possunt, sunt rasura dentis apri, cinis priapi tauri, vel cervi, flores papav. rub. corallus præparatus. *Quercetanus* in Pharmacopœa laudat pomum excavatum, & thuris masculi Zi. repletum, & ad ignem coctum, quod æger deglutiat, superbibendo aq. Card. ben. Zi.iii. postea vero bene contextus sudet: hoc remedium post tertium morbi diem usurpandum esse vult, eoque multos asserit fuisse restitutos.

Fuligo camini ad Zi. exhibita multum confert, sed multos magis spiritus fuliginis. *Lazarus Riverius, prax. Medic. lib. 7. cap. 2.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Pleuritide.

**E**Quitem quendam *Gallum* quatuor docti Medici curabant pleuritide affectum, quæ ob parvum dolorem, mitem tussim, lenissimam febrem, expectorantibus solis, fomentisque curanda visa est; sed cum hæc symptomatum lenitas cum interna malignitate conjuncta esset, quinto die malitia manifeste deprehendi cœpit, nam ablato omnino dolore, delirare visus est, insomnis, vigil, & cohibito sputo, lipothymia ex intervallis vexabatur; huic malo cum occurrerem, & æger viribus esset penè exhaustus, symptomataque vehementius invalescerent, loco spretæ phlebotomiæ cucurbitulas scarificatas scapulis impono, quibus aliquantisper levatus; respicere cœpit; qui deinde redintegratis viribus super partem affectam cucurbitulam cum scarificatu impono, qua detracta hirudines sex circumcirca admoveo, quæ tantam utilitatem attulerunt, ut intra decimum septimum diem, concocto sputo, & facile excreto, pristinam recuperaverit sanitatem. *Zacutus Lusitanus observ. 113. lib. 1. prax. admirand.*

Quidam pleuritide vera laborans, extracto è cubito sanguine, accepit hunc julepum pectoralem.

℥℥. Aq. scabios. tussilag. papav. rhæad. an. Zi. syr. jujub. julep. viol. an. Zi. syr. de hyssopo de liquir. an. Zi.iii. ol. fœnic. gt. iv. M. F. Julep. latus dolens inungebatur sequenti linimento.

℥℥. Unguenti resumptivi Zi. ol. fœnic. salv. an. gt. ii. M. punctivis doloribus valde urgentibus sequens fomentatio profuit.

℥℥. Fol. rutæ absinth. menth. artemis. abort. flor. chamæm. aneth. an. M. i. sem. anis. cumini, an. Zi.iii. bacc. lauri, salis communis tostior. an. Mi. conq. & incidantur ut F. ii. sacculi interbastati in vino coquendi, alternatimque applicandi: exhibeatur hic julepus contra sitim.

℥℥. Aq. fontis lbii. cinnam. el. Zi. sacch. lb. cruda trajiciantur per manicam Hippocrat. F. claretum absque coctione. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 3. cap. 3. lib. 3.*

Ad caloris incendium, sitimque restringendum, commendavi tincturam florum Rhæados cum aqua farsaræ & heder. terrestr. additis guttulis aliquot spiritus sulphuris, extractam, & syrupo ex iisdem floribus edulcoratam. *Baldassar Timaus, Cas. 5. lib. 2.*

Mitti debet sanguis singulis diebus, donec dolor & febris multo mitiores evaserint; Imò verò interdum bis in die, cum peracuta pleuritidis est. Adeò necessaria est venæsectio in hujus affectus principio, ut nunquam omitti debeat, nedum in senibus, pueris, gravidis mulieribus, puerperis & menstruas purgationes patientibus: quibus omnibus experientia docuit plebotomiam præsentem hoc affectu fuisse utilissimam. Ab ipso etiam morbi initio bis aut ter in die sunt exhibendi julepi refrigerantes, humoris ardorem & ebullitionem cohibentes, & fluxionem sistentes, ita compositi,

℥℥. Aq. pap. rhæad. Zi. iv. syr. ros. vel papav. rhæad. Zi. sal. prunell. Zi. M. F. Julep. Post primam phlebotomiam, inungatur latus dolens sequenti linimento.

℥℥. Ol. lil. chamæmel. & amygd. d. an. Zi. butyr. rec. & axung. gallin. an. Zi. i. f. linimentum. Multi addunt ceram hum-



jusmodi linimentis, quæ tamen non conveniunt, quia obstruunt poros; ut neque mucilagines, quæ emplasticæ sunt, quia refrigerant & astringunt. Post iteratam venæsectionem focus admovendus est in sequentem modum compositus.

℞. Rad. alth. & lil. an. ℥ii. fol. malv. parietar. an. M. i. sem. lini, fœnugr. an. ℥i. flor. chamæmil. melilot. sambuc. viol. an. p. i. f. omnium decoctio, quæ foveatur latus dolens cum vesica suilla. In progressu morbi addi poterunt fomento herbæ discutientes, ut origanum, calaminth. hyssop. & semina discutientia. Deinde inungatur pars affecta unguento dialthæa, &c. Post tres aut quatuor doses julepi prædicti usurpari poterunt julepi pectorales in hunc modum compositi.

℞. Hord. integr. p. i. liquir. ras. & passul. mund. an. ℥i. Jujub. par. xx. sem. 4. frigid. maj. an. ℥℔. flor. bugl. & viol. an. p. i. Coq. ad quart. v. In colat. dissolv. syrup. viol. & jujubin an. ℥ii. f. julepus pro quatuor dosibus manè & serò sumendis. Si febris sit valde acuta cum vigiliis conjuncta, emulsiones in usum vocentur. Narcotica in hoc affectu perniciofa sunt: sputum enim retinent, & pectus coarctant; unde non rarò præceps exitium consequitur. Quod tamen intelligendum est de integra narcoticorum dosi: nam in perexigua quantitate exhibita prodesse possunt in dolore vehementissimo, tussis molesta & inani à valde tenui humore oriunda, & vigiliis assiduus. In quibus casibus laudani gr. i. felici cum successu exhibui, & pluries aliquando reiteravi. Sed illius usus præcipuè in principio morbi convenit, ut humor influens in partem cohiberi possit, & morbi incrementum impediri. Quando tussis importuna est, & natura incipit per anacatharsin aliquid evacuare, teneat æger frequenter in ore sacch. ros. candidum, aut penidiatum, vel tabellas diatragacanthi. Tum utatur syr. viol. vel jujubino ex cochl. frequenter, vel utatur eclegmate sequenti.

℞. Sacchar. Cand. & penidiati an. ℥i. pulv. el. diatragac. frig. ℥ii. syrup. viol. & jujub. an. q. s. f. loch. quo utatur cum baculo liquir. sensim lambendo. Vel fiat eclegma ex butyri, mellis & sacchari æqualibus

portionibus. Si sputa crassiora sunt, quædam incidentia & attenuantia erunt permiscenda; ut syrup. de tussil. de liquir. oxymel. simplex, pulvis diatrios, & alia hujusmodi. Toto morbi decursu utatur æger pro potu ordinario decocto hord. & liquir. vel decocto papav. rhæad. cum syrup. cap. Ven. Potus non sit actus frigidus, quia pectori noceret. Vinum in hoc affectu merum est venenum, quemadmodum acida omnia, quæ tussim excitant, & constringendo anacatharsin impediunt. In declinatione instituat purgatio. *Lazarus Riverius, Prax. Med. lib. 7. cap. 2.*

Ego testari possum, aliis non neglectis remediis, sæpissime usum fuisse, urgente dolore, oleo ex semine lini puro ad ℥vi. cum evidentissimo ægrotantium commodo. Nec mihi ad remedium genus unquam fuit suspectum, etiam cum valida febre, vigente dolore, post iteratas sanguinis evacuationes. Et qui hoc medicamento utentur tempestivè, videbunt admiranda, quantitate moderata pro ægrotantium captu. Multoties exhibui, nulla præcessa alia evacuatione, tardius vocatus, ut aliquid agerem, non quia salutis spem haberem, & tamen multoties à manifesta perniciæ ægrotantes eripuit: Nam etsi imbecilles sint ægrotantes; tamen, si non juvat, neque evidenter læsisse cognovi. Itaque, quantum ego cognovi, nunquam me fefellit id remedium genus. *Petrus Franciscus Phrygius, Comment. in Histor. Hippocr. Epidem. Ægrot. 8. part. 3.*

Vinum in pleuritide lethale, quemadmodum & in Peripneumonia. *Rudius* tamen notat Malvaticum parva mensura feliciter propinatum, *Ioh. Rhodius, Analest. in Spectal. Caut. Med. lib. 6.*

Medicamento ex stercore equino, tantopere ab *Helmontio* in Pleuritide decantato, diu antequam ejus sunt edita scripta, familiariter in Pleuriticorum solatium utebatur Clarissimus D. *Ruthenus* nostrus Medicus experientissimus, in hunc fere modum.

℞. Stercoris equi non castrati, avena & pisus nutriti, q. s. Infund. in vini alb. vel cerevis. q. s. & exprimatur Bibat manè cyathum per aliquot dies.



## SUBSECTIO SEPTIMA.

*Pro Pleuritide notha.*

**I**N corporibus frigidis ac pituitosi sæpe gravissimi dolores laterum à flatibus oriuntur fortibus mitigandi; si vena per-tunderis necabis. Vidi formosissimam mulierem, quæ cum flatibus obnoxia esset, ac cum cœnasset liberalius, noctu in acerbum lateris dolorem coniecta fuit, illico à secta vena periit. *Io. Heurnius ad aphor. 33. sect. 6.*

Incredibile est dictum, quam multos tri-ta vulgataque medendi viæ, ac præsertim in pleuritide perdidit: nam audito lateris doloris nomine, si quis aliud præter venæ-sectionem remedium tenter, *ix. Sux. 150*: imò quod pertinet ad dolores lateris, nullus hodie non Medicus est: quamquam hic multorum carnificina & frustranea sanguinis (in quo vita sedet)eductio spirituumque evacuatio committitur magno artis vituperio, ut etiam hac una medendi pleuriticis via bajuli, carnifices, sutores, ac universa mulierum garrulitas Medicorum celebrium industriæ obstrepat ac sese opponat; imò si quis de latere quæritur, quocunque id modo fiat, ne articulo horulæ differre fas sit: at non novit imprudens mulier, & impudens barbitonsor, nugigerulaq; mediastina mulier multis ex causis dolores laterum oriri, in quibus ut aliquando venam non secare ne faustum est, ita eandem aperire crudele impium ac ignorantia plenum sit; nam nulla est causa tam exilis, tamq; parum efficax, quæ non dolorem in latere excitet; ac æquumne est tanquam causa eadem sit, ac idem malum, remediorum idem usurpare, & omnibus eundem cothurnum attribuere. *Guil. Ballonius, lib. 1. epid. & ephem. pag. 79.*

Cum dolores vagabundè tenent nothas costas, & continuatione membranarum attingunt aliquando mammas & partes sterni anteriores, cautè videre oportet, an propter vapores ex visceribus elatos dolores surgant, an causa a partibus superioribus pendeat, an vero in thorace ipso sit; vulgo enim secatur vena undelibet dolor sit, atque id quidem malè, quis enim nescit, si dolor iste agnoscat causam in ven-

tre inferiore, non modo non prodesse phlebotomiam, sed etiam nocere sæpe, quod attractio fiat à partibus inferis, & si nondum adsit pleuritis, ea per sectionem venæ acceleretur. *Guil. Ballonius, lib. 1. epid. & ephem. pag. 88.*

## SECTIO XXXI.

*De Podagra.*

**A**Rthritidis species est, de qua supra, *lib. 1. sect. 40.*

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Podagra.*

**P**RO doloribus citò mitigandis, compescendis ac penitus submovendis, lintea meo monitu duplicata in aqua mea Antipodagrica intincta, & parum expressa, tepidè applicabat partibus affectis & dolentibus; idque reiterabat quoties lintea siccata fuerant: que solo epithemate paucarum horarum tempore ex toto liberatus est à dolore: & hæc sanè aqua divina neminem hætenus in relevanda & tollenda Podagra, Gonagra, Chiragraque fefellit, sed omnes ad sui salutem, cum Dei laude usi sunt felicissimo & indubitato cum profectu. *Martinus Ruland. cur. 89. cent. 1.*

Aquæ nostræ Antipodagricæ compositio hæc est.

℥℥. Aq. terræ sanct. ℔i. aq. Martis ℔ii. liquoris Mercurii ℥ss. croci metall. ℥i. M. & facta ebullitione, conserventur in vase vitreo pro usu. *Martinus Rulandus, curat. 35. cent. 5.*

Cum circumferantur spuria & mendosa descriptiones aquæ antipodagricæ *Rulandi* adlubescit genuinam & *ἐπιβόηος* huc adscribere, præsertim cum ad miraculum aqua illa operata, & probata dicatur.

℥℥. Aq. terr. sanct. ℔i. aq. Martis ℔ii. liq. mercur. ℥ss. croci metall. ℥i. M. & ebullitione facta in vitro servantur.

Verùm cum ingredientium compositiones in paranda illa aqua difficultatem nobis parere queant, nisi explicari tradantur, necesse est ut ordine eorum conscribendi



modum hunc adscribamus. Aqua itaque terra sancta sequenti paratur modo.

℥. Boli Orient. ℥viii. terr. sigill. ℥iii. aq. levistic. ℔v. macerentur per dies novem in loco calido. Postea distillat.

Aqua Martis ita componitur.

℥. Aquæ per vesicam destillatæ ℔viii. in quibus infunde scoriar. ferri præp. ℔ß. stent infusa per dies sex; ac per Alembicum evocentur.

Liquoris Mercurii hæc est præparatio.

℥. Mercur. sublimat. ℥iv. quibus affunde aceti fortiss. ℥iii. & per noctem macera crocus metall. quomodo conficiatur omnibus notissimum est. *Joh. Loselius. De Podagra, sect. 2. membr. 2. artic. 2. subsect.*

Quando dolor est intolerabilis utatur hoc.

℥. Opii ℥ß. croci ℥j. terantur ista cum lacte vaccino & cum medulla panis similaginei, donec totam cum lacte incorporetur ad similitudinem emplastri, & super loco ponatur; illinatur etiam locus theiaca. *Bartholomæus Montagnana, consil. 245.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Podagra.

**A**D Præservationem.

℥. Ras. ossium, corporis humani, diagrid. hermodactyl. turbinth. an. part. æq. de quo medicamento exhibe ℥ß. pro dosi mane per aliquot dies. Vocat *Paracelsus* hoc medicamentum mirabile ad Podagram propter proprietatem ossium corporis humani. Debet autem deleteria ejus vis corrigi addendo pulverem cinnam. anif. & fœnic. Secundum medicamentum quod præ omnibus in Podagra laudatur, est helleborus niger, in quo præcipuè consistere videtur cura Podagræ cuiuscunque & ejus debet esse usus frequens. Sunt autem diversi præparandi modi; primus in pomo, in quod insigimus rad. helleb. nigri ad ℥ß. Postea charta madida pomum involvitur, & coquitur sub cineribus, deinde extractis radicibus, datur pomum mundum cum saccharo edendum: & est rarum medicamentum ad molliendum alvum non solum

in hoc morbo, sed ad sanitatem tuendam in his qui alvum siccam habent. Alius modus est, ut fiat extractum radic. ex aqua vitæ, & est optimus præparandi modus; dosis à ℥i. ad ℥ii. exhib. cum sacch. rosac. alius modus est in substantia ita.

℥. Pulv. rad. hellebor. nigr. ℥i. Zinzib. mastich. ros. rub. cinnam. anif. dauci, camphor. pulver. an. ℥i. M. F. Pulvis de quo sumat ℥i. Si per intervalla purgandus est; si frequenter ℥i. sufficit.

℥. Calcem vivam per quinque vel sex dies immerge in aq. fontis, ut sal ejus elicias, & aqua superemineat calci, ad quatuor aut quinque digitos.

℥. Hujus aq. ℔iv. & in eam laminam chalybis ferventis extingue duodecies. Postea in eandem immerge æsustum in pulverem redactum ad ℥m. cinabrii ℥m. & stent per quatuor aut quinque dies, in quibus aqua viridem acquirit colorem ex vitriolo interno ærisusti, in hac aqua lintea replicata madefiant & loco dolenti applicentur; & mirabiliter sedant dolores. Hanc aquam putat *Quercetanus* illam *Rulandi* mirabilem. *Rodericus à Fonseca, tomo 1. consult. 7.*

Vir quidam crapulæ deditus, Podagra in pede sinistro afficiebatur, exhibita cassia ad fæces communes educendas, sanguinem ex brachio sinistro ad ℥viii. extrahere jussi: purgato deinde leviter corpore, petitas linneas infundi jussi in aq. ros. & Solani cum oleo ros. omphac. & medullam panis cum lacte, cassia, & vitello ovi crudo apponi. Quale & illud est à *Leonello* commendatur.

℥. Cassiæ noviter extract. ℥ii. pulv. hermodactyl. ℥ß. vitellum ovi unius, M. cum ol. rosac. ad formam linimenti; & hæc huic ægro profuere. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 29. De Arthritide & externarum partium Affectibus.*

Valet ad Podagram cinis caulium cum axungia rec. porcina unguenti instar. Ceblebris quidam Medicus cineres stipitum caulium miscebat cum axungia & cere, & componebat unguentum. Cuidam Podagrico post universalia, viscum quercinum incerevisia communi decoxi, & colaturam panno lineo intinctam loco affecto imposui:



fui: quo solo remedio dolor sedatus est. Oleum ligni guajaci mirabile est pro Arthriticis. *Iodocus Philippi* Regis Chirurgus saponis nigri ℥i. cum vitello unius ovi mixtam applicabat Podagricis & Chiragricis miro successu cum stupra; & per tres dies non amovebat. *Petrus Forestus, observ. 15. lib. 29.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### De Podagra.

**F**Ratres duo Viri Primarii *Vesuntini*, diu Podagra hæreditaria afflicti cum summo cruciatu, ad me consilii causa venerunt: quibus præter regimen idoneum præscriptum, ut de elect. meo Antipodagrigo sumerent ad ℥i. singulis matutinis jejuni, ad quadraginta dies continuando.

Electuarium hoc ita fit.

℥i. Sarsapar. ℥vi. sem. hyperic. ℥i. fol. chamædr. chamæpit. an. ℥i. flor. beton. ℥i. Rad. aristol. rot. dr. vi. Angelic. dr. ii. Cariphyll. dr. i. Crocigr. vi. ras. C. C. ebor. an. dr. i. Succini dr. i. Corall. dr. m. ad pulver. ℥i. Sumantur sacch. cocti cum q. s. aq. ros. ℥iv. F. Electuarium instar opiatae. Deinde suasi ut pilulas sequentes singulis mensibus pondere dr. i. assumerent.

℥i. Hermodactyl. excortic. ℥ss. Aloes turbinth. mechoac. an. ℥i. rhei el. myrobal. citrin. chedul. mastich. an. ℥i. Euphorb. ℥ii. Rad. aristol. rot. ℥i. sem. hyperic. zinzib. sem. cumini, an. ℥ss. sal. gemm. ℥ss. cum succo chamæpit. F. Massa, addendo diagrid. præp. ℥ss. formentur ex ℥i. pilulae aliquot, menstruatim ut dictum sumenda. Septennio post, ad me reversus fratrum alter, statim mihi aperuit, se & fratrem suum, ab eo tempore, quo medicamentis præscriptis à me usi fuerunt, jam toto elapso sexennio, aliquotque mensibus, Podagra nunquam laborasse, nec ulla illius sensisse indicia, seque tantum pilulis fuisse usum, per anni spatium, omisso Antipodagrigo, illisque affectum hunc tribuere. *Felix Platerus, observat. lib. à pag. 906. & 904.*

Mulier quædam Podagrica, continuo hoc affectu infestata, dum in matrimonio esset, vidua postea facta consilio meo, ut

si non curari posset, saltem mitius ab ea afficeretur, usa est, Post corporis purgationem, jussi pedes Podagrae obnoxios sæpe immergere in sequenti lixivio mane & vesperi.

℥i. Ossium diversorum combustorum cum ligno quercino cineres, per quos coletur aqua fabrorum extinctionis ferri, addita mensura una vini rubri & urinæ pueri, fiat lixivium satis efficax, in quo decoq. pruna sylvestria siccata ad p. i. vel ii. sal. chamæpit. an. M. i. salis p. i. utatur frequenter purgato corpore, totum biennium ab hoc hoste libera fuit. Postea nubenseo iterum corripitur, à quo etiam, quia medicamenta neglexit, ad extremum vitæ usque afflicta fuit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 508.*

### SUBSECTIO QUARTA.

#### Pro Podagra.

**O**lim in Aula frequens fuit syrupus de spina cervina, qui domesticus appellatus fuit, quo multi Aulici in Podagra & aliis morbis, cum leniter purget, & serosa educat, quo præservacione cum fructu usi sunt, cum syrup. singulis septimanis exhiberem semel, vel certè singulis quatuordecim diebus. *Ioh. Crat. consil. 20. lib. 4.*

Docti Medici omnes ab experimentis didicerunt, ea corpora, quæ multum urinæ emittunt, & sudant frequenter, minus à Podagra tentari, in quibus verò illa duo excrementa, sudor inquam & urina detinentur, ii ad hunc affectum maximè proclives sunt. His de causis moveor, ut sassafras, quod nuper inventum est, usum ad præservacionem nequaquam improbem, si facultatem habet urinam & sudorem cieiendi, an verò quod aliqui gloriantur, id insit ei ligno experimento nullo observavi. Ego & ratione & experientia multiplici adductus rasuram cornu cervi ligatam in petia & impositam potui certum habeo & urinam provocare, & corpora, modo ad id proclivia sint, facile ad sudorem disponere si præsertim mane in lecto se contineant, & membra foveant, quod qui faciunt, à Podagra ferè liberati sunt. *Ioh. Crato consil. 21. lib. 4.*



Vomitum quantum scriptis omnium Medicorum commendatur in hoc morbo sciunt eruditi, & habet profecto magnam utilitatem, non solum ratione evacuationis crudorum humorum, verum etiam diversionis, proinde si æger in mense semel saltem possit vomere, utile hoc sanitati futurum esset.

Si haberemus oleum ex ossibus humanis, & ol. ceræ, anteferrem omnibus aliis medicamentis topicis. Tumori qui est in genu adhibeat hoc medicamentum 5. diebus.

℥℥. Vitell. ovor. n. 6. ad justam duritiem coctos, adde croci ℥i. M. & tumori superimponat mane, retinendo quatuor vel quinque horis. Utatur deinde ad œdemata, & tumores tam in manibus quam in pedibus, hoc unguento.

℥℥. Pingued. tauri ℥ii. sal. usti ℥i. ol. oliv. ℥vi. M. probè in mortario.

Ad removendos thophos in juncturis hoc unguento utatur.

℥℥. Mucilag. radic. alth. sem. lini, ol. chamæm. pingued. anser. ol. vulp. in qua vulpecula viva sit cocta, olei lumbric. an. ℥ß. salis triti dr. ii. croci ℥i. M. F. unguentum molle, quo ungantur juncturæ, semper inspergendo pulv. lumbric. terrestr. lotor. in vino, & combustorum. Unum addam à Veteribus Medicis excogitatum medicamentum, quo Arthriticus posse sanari affirmant, si per integrum annum ejus usus continetur, vel ut mense *Januario* assumatur ad ℥i. per quindecim dies, *Februario* totidem & tandem, *Martio* per duos dies, *Majo* tribus diebus, *Junio* uno solo die, *Julio* duobus, *Augusto* uno, *Septembri* duobus, *Octobri* duobus, *Decembri* duobus. Sumatur verò diluculo in aquæ ivæ arthetica vel beton. cum syrup. de ivæ arthetica vel betonica. Pulvis ita se habet.

℥℥. Aristol. ℥i. Centaur. ℥iii. Gentian. ℥vi. mel. ℥v. Hyperic. ℥vi. Petrosel. macedon. ℥ß. Agar. albiß. ℥ii. Rhapont. veri vel ejus loco rheiel. ℥i. F. omnium Pulvis. Hoc remedium, ut dixi, est veterum Medicorum, & à multis, ubi alia remedia non contulerunt, expertum; quod ego, qui veterum inventa amo & veneror, non improbo, imò ejus usum commendo. *Jo. Crato. consil. 15. lib. 1.*

*Burnet Parte 1.*

Unum addam, in quo non omnem aliquam tamen spem auxilii pono, videlicet ut in gravescente dolore, ad pedem affectum ponatur catellus. Catellum enim existimant non tantum calore suo facere ut diffletur materia, & digeratur, sed malivim ad se pertrahere, ita ut interdum quoque mori animadversum sit. *Ioh. Crato. consil. 34. lib. 5.*

Podagra mire levatur si catelli cum Podagræ recumbant, morbum enim contrahunt, adeo ut vix incedere queant, æger verò levamen suscipit. *Petrus Borellus, observ. 28. cent. 3.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### *Pro Podagra.*

**S**I fluxiones fuerint copiosæ & frequentes, & totum corpus videatur siccandum consulo ut per multas septimanas singulo mane, fumatur ℥i. pulveris mei Podagræ, qui talis est.

℥℥. Chamedr. chamæpit. cent. min. aristol. salviæ, betonic. an. ℥i. lign. guajac. opt. & nigri ℥8. singula seorsim in tenuissimum pulverem redigantur, & diligenter misc. Hoc uno remedio perfectissime curatur Podagra, nisi quis in vivendi ratione per omnia velit. *Sardanapalum* imitari. *Hieron. Donzellinus, consil. 106. lib. 6. consil. 10. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.*

Ad pedes utatur hoc linimento, remedio profecto, ut vetustissimo, sic & optimo & decantatissimo quamvis familiari & domestico.

℥℥. Salis communis (vel potius salis juniperi) in tenuiss. pollinem redacti ℥i. ol. rosac. ℥i. reducantur ad formam linimenti, quo fricet pedes mane & sero, tali enim frictione insitus calor augetur, & si quid præter naturam est, discutitur, recrementa que consumuntur, & affecta membra sunt robustiora, & adversus affectionem firmanentur. *Andr. Gallus, consil. 19. l. 7. consil. Crat. &c.*

Confert mirificè usus radicis artemis. si cibis incoquatur instar rad. petrosel. Multienim solo earum usu ab articulorum doloribus liberati sunt. Pedes ne materiam recipiant, laventur sæpius mane & vespri hoc lavacro.

N n

℥℥. Fol.



24. Fol. artemis. absinth. origan. flor. chamæm. an. M. ii. alumin. salis, an. M. i. lixivii parati ex cineribus fagi q. s. Hæc simul calefiant ad ignem, & cum opus est pedes immittantur, ut liquor supra talos emineat, resolvit, absumitque materiam nervis, articulisque adhaerentem, revocat calorem extinctum & incessum adjuvat reparatque, etiam hoc lavacro utendum cum tumor vel rubedo in pedibus apparent, & ubi incessus inhibetur. Confert hæc aq. ad sopiendum dolorem, si alia non contulerint.

24. Aq. plantag. sambuc. an. ℥ss. aq. solani, vini destillati, an. ℥iii. M. vel applicetur aqua tapfi barbati, in qua aliquid thurise bullierit. Pinguia omnibus modis evitanda, quod sua humiditate membra relaxent, & idonea ad recipiendos humores reddant. Ad corroborationem articulorum lotiones pedum singulis septimanis bis velter exhibitæ multum faciunt. Sumatur lixivium in quo chalybs extinctus sit, adiciantur flor. chamæm. herb. paralysis, absinth. artemis. ped. columb. & una atque altera ebullitione facta addatur parum salis & aluminis. *Abrahamus Sylerus. consil. 29. & 33. lib. 7. cons. Cratonis, &c.*

Pinguibus non utor libenter, sed in materia calida & vehementissimis doloribus oleum ranarum, quod hoc modo fit, plurimum prodesse observavi.

24. Ol. puri ℔i. ranar. fluviatil. num. 3. flor. verbasci M. ii. iniiciantur ranæ vivæ in oleum donec moriantur, & coquantur in olla vitreata lento igne, clauso operculo, usque ad carnis dissolutionem. Deinde contundantur, & rursus bulliant oleo percolato, addantur terebinth. opt. ℥iv. Misceantur lento igne, & servantur usui. *Io. Crato. consil. 34. lib. 5.*

Non facili remedio cedit hoc malum, quare decoctum sarsaparillæ præscribimus, si homo humidus fuerit, vel si siccus, chinæ radicem: si frigidus, guaiaci aut sassafras ad quadraginta dies. Si phlegmone sit valida, foris fovebimus aqua spermatis ranarum. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 49. sect. 6.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Podagra.

**N**Ovi ego senem quendam apud nos: is sibi ipsi in Podagra hoc modo feliciter Medicinam faciebat. Cum tumor & dolor magnus, locus rubens, accipiebat salem, cinerem, urinam pueri, & acetum in iis commistis & agitatissimum madefactum & expressum pannum laneum album applicabat aliquoties. Sedato jam magna ex parte dolore, morbo declinante, incoquebat sulphur vivum & pulverem hellebori albi, oleo sem. lini, eoque affecta loca ilinebat, quorum usum non improbo, quod ratio non refragetur, & experientia ipsa sæpenumero profuisse compererit. *Reinerus Solenander, consil. 24. sect. 4.*

Ad præservationem, post vernam purgationem, ut aliquot dies decoctum chamædryos assumat author sum. Commendarunt hoc *Genuenses* mirum in modum *Carolo quinto Casari*, quod ibidem in multorum articularibus morbis saluberrimum inventum esset. Constat quosdam hos decocto postquam dies sexaginta bibissent, penitus liberatos & restitutos, cum antea non solum pedum sed & manuum articulos isto morbo haberent diu occupatos atque impeditos. Hoc modo paratur.

24. Chamædr. dum floret, lectæ & benè asservatæ M. i. vini mediocris ℔iii. coq. in duplici vase S. A. horas quinque, excolati vini bibe mane haustum, corpore ad sudoris procurationem composito, usus sit à purgato corpore in multos ex ordine dies, ad *Maii* usque initium ab autumnali purgatione, loco chamædr. utatur ad dies octodecim decocto sassafras hoc modo.

24. Rad. Sassafras cum cortice ℥iv. rad. sarsaparill. ℥xiv. cichor. ℥ss. liquir. ras. ℥ss. passul. corinth. lotar. ℥ss. aqu. purissima ℔xii. coquantur lento igne S. A. ultra consumptionem tertiæ partis, bibantur colati decocti mane ℥vi. plus minus; adhibita cura ut sudor sine multa difficultate sollicitetur, evacuatione ritè administrata, statim ad loca veniendum quæ leviter repellant, discen-



discutiant, robovent, & plane ita constituta sint, ut leniendo dolorem sopire valeant. Hic Medici varia Præscribunt. Quidam lactis vaccini rec. & oli ros. an. lbi. Miscent, incoquunt medullam panis tritici q. s. ut F. Cataplasma, addendo vitellos ovorum tres, cum modico croci, illudque innoxie applicant quocunque morbi tempore, in omnibus topicis Narcoticorum usus, qualis opii, suspectus esse debet, nisi à valde in artis operibus perito Medico, urgente necessitate, adhibeantur. Novi Cardinalem podagricum, qui ad doloris levationem nullum efficacius invenit auxilium sequenti, accipiebat malvam cum radic. minutimque concisam incoquebat vini & acetii partibus æquis ad tertias, tum adiciebat surfures secalis crassiores, & post levem coctionem, contusa applicabat calide articulis dolentibus; quod ego item compari sæpius iuvisse. Item suffarcinatur gallina absinthio, & brassicæ foliis; licet & rapas addere, coquitur, ius per lintecola applicatur utiliter, fons ex solo iure raparum profuit multis. Curavi civem quendam *Novesiensem* doloribus podagricis diu inferrimèque confectum, solo emplastro ex foliis brassicæ & scænuigræci farina cum aceto subactis; quo non solum à doloribus liberatus est, sed planè persanatus est. Compertum scribit *Plinius Sextum Pompeium* pedibus acervo tritici immerfis persanatum esse habet hoc remedium suas rationes, sed evidentiores hoc, quod sequitur, unde & majus juvamentum percipere liceret, si illius loco hujus usus esse posset, nam discutit eleganter, celorem nativum excitat, & maximum membrorum robur addit, est autem hoc, singulis annis nimirum tempore vindemiæ, partes affectæ uvarum vinaceis post recentem pressionem & levem fermentationem adhuc calentibus, aut calido musto calefactis immergendæ mane per dies quatuordecim, isto novimus, post præscriptorum quorundam usum, restitutos, qui diu multumque cum isto morbo conflictati, ita affecti erant, ut incedere vix difficulter possent: ad omnia ista hoc unum addam quod in quodam pervetusto libro annotatum reperitur nimirum, podagricum toto anno à

morbo liberum futurum, si in *Martio*, luna decrescente, marrhubium colligat, contuderit, atque affuso vino succum expresserit, eumque succum per triduum biberit, experientia facilis est & tuta. *Reinerus Solenander*, consil. 1. & 2. sect. 5.

24. Fol. & flor. sambuc. virid. an. lbi. fol. tabac. ℥iij. contund. & optimè macerentur in aqua ardente, idque per tres dies in balneo M. deinde destillentur, hac aqua bis in die foveatur pars dolens. *Lalins à Fonte* consil. 135.

Fiat embrocatio ex oleo rosato tepido, vel lacte vaccino tepido, aut fiat tale.

24. Ol. rosat. lactis vaccin. an. lbi. quibus adde panem tritum, bulliant ad ignem donec veniant ad spissitudinem, & tunc removeab igne, & adde tria ovorum lutea benè miscendo, & actu tepida appone, in progressu adde ol. chamæ. dolores tales mirificè mitigat sterco bovis cum oleo rosato calefactum & appositum. Ad præsertionem laudo vomitum duobus diebus continuis singulis mensibus, si sit facilis ad vomitum, alias non, laudo etiam cauterium potentiale, sed magis actuale in tibia dextra. *Victor. Trincavellus*, consil. 97. lib. 3.

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Podagra.

**P**Uurgetur caryocostino præstantissimo Medicamento ab ℥ss. usq; ad ℥v. ex aqua ivæ, hoc Pharmacum pro sanandis doloribus articulorum adeo insigniter confert, ut si quis ipsis inchoantibus statim exhibeat, miro quodam modo fluxionis cursu intercepto, aut omnino evanescant Dolores, aut mitiores evadant. Datur gratia preservationis bis aut ter in anno, adeo scèlici successu, ut ego quam plures sanasse profitear solo hujus usu: sumque expertus in me ipso, & *Ludovico* patre meo, qui cum quotannis doloribus molestaretur articularibus postquam uti cœpit familiariter, nunquam redierunt Dei Optimi Maximi benignitate, pro revulsione sunt qui cauterium proponant vel in cubito vel in crure opposito, & certè utrumque rectè factum puta.



verim, posset ipsi alterutrum imponi, at quod experientia didici maximè proficuum est cauterium in eodem pede factum, sub genu loco assueto in parte potissimum exteriore, etenim fluxio quæ à capite solet irruere in subjectas partes, antequam ad articulum pollicis pertingat, ex emissario fortassis evacuabitur, circa particulam affectam hoc utitur emplastro, quod efficacissimum invenies pro robore partis, & pro discutendis excrementis quæ confluerunt.

℥. Cortic. granat. crasso modo contus. M. ii. coq. in vino tamdiu donec dissolvantur; mox adde summitat. tenerior. rubi, fol. semperviv. an. M. i. contund. omnia fortiter & colentur per setaceum; actum adde farinæ hord. cribellatæ, ℥i. farin. sem. fœnugræ. ℥i. & cum vino decoct. prædict. F. emplastrum, imponatur nocturno tempore, manè autem abluatur locus ex vino rubro decoctionis rad. ebul. & gallar. supress. contular. *Horatius Eugenius, epist. 3. lib. 10. tom. 3.*

Quando à doloribus minus vexatur, optimum erit, si oleo omphacino cum sale ad unguenti formam redacto, partes dolentes inungeret, easque interdum aceto, in quo iva bullierit lavaret: quo uno remedio magnum *Agrippam* esse curatum scriptores perhibent, hieme, si diacoralio ad ℥i. usque adeo ab *Alexandro Traliano* celebrato, uteretur, non parum esse pro futurum sperarem; quanquam sæpenumero irridere consuevi eam superstitionem & diligentiam, qua putavit tanquam necessaria utendum esse iis; qui à simili medicamento fructum optant: ille enim numerus dierum interpolatus quid utilitatis secum afferat sanè ignoro, quem admodum illud existimo rationem non parere, quod quanto frequentius utetur, eò uberior fructus ab ipso sperari jure potest. *Hier. Mercurialis, tom. 3. consil. 21.*

Sunt Magni Medici qui usum brassicæ singulariter commendant, & laborantibus podagra tunc cum adest dolor, solam brassicam edendam præscribunt, hoc certum est quo victus parcius alimentum præbet, eo salubriorem esse, parti affectæ applicanda sunt initio, quæ eam roborant,

& affluxum nimium prohibent: itaq; scobem cornu cervini sumat, in aquam verbasci ponat, & percolatam aquam pedibus applicet. Deinde sola aqua verbasci utatur, vel succo, qui in vase vitreo floribus verbasci repleto, & soli exposito, repetitur; nam iste succus est longè potentior. Postremò folia tabaci calefacta apponi possunt. *Johan. Crato, consil. 22. lib. 7.*

Ego omnibus mellis acidum usum præferrem, aut in jusculo aliquot olei vitrioli guttulas dissolverem, scio illius præstantiam, aliqui ab eo ut metallico & corrode abhorrent, sed temere. In corpore humano aliam vim & effectum habet: quod quotidie in gingivis exulceratis experimur; putridam enim consumit carnem, sanam abstergit & corroborat, mel acidum tale est.

℥. Mellis rosarum, vel quod in hoc corpore convenientius est, syrupi de betonica ℥iii. his adde olei vitrioli gt. ix. capiat primum de hoc unum cochlear manè jejuno ventriculo, deinde duo cochlearia, postea tria: & sic eo uti pergat, ab uno scilicet denuo incipiendo, usus illius est tutus & suavis, & ventriculum humidum mirificè adjuvat, & pituitam è corporibus removet. *Id. Crato consil. 38. lib. 7.*

## SUBSECTIO OCTAVA.

### Pro Podagra.

**U**tiliter intra corpus aliquot guttula spiritus salis armoniaci propinantur, ad sudorem movendum, naturam confortandam, tartarum resolvendum ac expellendum. *Paracelsus* pro indubitato anodyno commendat eundem spiritum, qui cum spiritus vini anatica portione mixtus, & plumaceolo bis vel ter loco dolenti adhibitus, confestim dolores sopit, aliqui camphoræ nonnihil addunt.

Magnæ *Britaniæ* Regis *Iacobi* emplastrum contra podagram, sequenti modo conficitur.

℥. Ol. è pedibus bubul. & ovill. è floribus sambuci, ol. lini rec. express. an. ℔b. ol. lumbric. hyperici composit. an. ℥viii. minii plumbi alb. an. ℥xii. lithargyr. aur. & argen.



argent. an. ℥viii. coq. ad empl. consistentiam, tum adde ceræ flavæ, colophon. an. ℥iv. racamach. ℥iii. opoponac. ℥i. in vino malvatico solvantur, colentur, atque ad suam consistentiam reducantur, postea emplastro addantur, hinc ab igne remotis, cum refrigerare incipiunt adde camphoræ in ol. hyperic. solut. ℥ß. M. *Ioh. Lofelius, lib. De podagra.*

Purgatio per arcanum corallinum podagram in sui semine interimit. *Ioh. Helmontius, tract. cui tit. Volupe viventium morbus antiquitus putatur.*

Apud *Moravos Olmutenses* nobilæ nuper hoc experimentum didici pro sedandis illi- cò doloribus podagricorum.

24. Herbam barbicapram ( quæ alias dicitur pulmaria ) ea cum suis radicibus floribusque destillatur, & in hac pan- ni linei madefacti imponuntur podagri- cis, vel cum penna illinitur articulus dolens.

Sutor quidam *Viennæ* natura biliosus, podagra circa magnum pedis pollicem atrociter corripitur; multis remediis frustra tentatis, tandem omni dolore libera- tur cataplasmate sæpius de die renovato ex stercore vaccino recenti in sartagine cum butyro frixo, quo postea & alios ab imma- nibus doloribus sanavit, expertus fuit fel- piscis cyprini inunctum profuisse podagri- cis. Sed communiter in omni ferè arthritide, à quacunque causa oriatur, soleo foeliciter uti cataplasmate ex vino panis & medulla factò, si sit causa calida vinum rubrum ca- pio, cui addo oleum rosaceum, si frigida vel mixta, vinum album cum pulvere flor. chamam. fursuribus bene tritis, & oleo rosac. hoc cataplasma non modo omnem fluxionem repellit, sed & influxum non mediocriter digerit. *Adrianus Spigelius, lib. De arthritide.*

Nos hætenus habuimus iu usum car- nem bubulam, cujus fructum crudum si- ne pinguedine parti dolenti superligavi- mus, idque manè & vesperi mutavimus; atque ita foeliciter dolorem sedavimus. *Ioh. Hartmannus, præct. Chimiæ. pag. 313.*

Oleo saponis foeliciter utor in doloribus podagricis celeriter mitigandis. Fieri id puto propter vim caloricam & acrem, *Burnet Parte I.*

quia materia in cavitatibus articulorum & vicinis tendinibus ac ligamentis impacta ad superficiem evocatur dissipaturque: quo modo alias materia in superficiem trans- lata & tumorem externum excitante do- lor mitescit. Aliquando accidit, ut post usum hujus olei cuticula à cute sepa- rata pustulæ excitarentur, quibus aper- tis ichor quidam flavus, falsus & acris profluxit ad septimanas aliquot, unde diu æger ab invasionibus podagricis im- munis fuit. *Gregorius Horstius, observ. 23. lib. II.*

Podagrici præsertim inveterati plerum- que malè ferunt purgationes & venæsectio- nes, quæ ipsis paroxysmos aliquando gra- vissimos concitant: quia humores commoti consuetas potius ad partes imbecilliores, quam alias derivationum & revulsionum vias affectare solent. Si itaque, ut sæpius necesse est, podagricos purgare volueris vi- deque membra potissimum & prius poda- gra afficiantur. Ea proinde oportet ante & inter purgandum deferendæ, eorumque sin- gularem habere rationem & curam. *Vol- fangus Hæferus, Hercul. Med. lib. 4. cap. 1.*

Qui podagræ ingentes dolores patitur, capram intra cubiculum suum apportare, ac ex ea lac supra membrum dolens & ma- lè affectum emulgere curabat; quo dolo- res diminui, & meliusculè se habere evi- denter sentiebat. Nec quidem injuria, nam lac sic recens emulctum dolores de- mulcet & mitigat. Est autem remedium hoc *Turcarum* principibus commune & fa- miliare satis à te qui lucrum & honores quevis in pretio habendum. *Amat. Lusita- nus, curat. 41. cent. 5.*

Caligis & manicis ac chirothecis ex pelle canis rufi paratis uti contra podagram & chiragram, remedium præservativum non contemnendum à multis habetur. *Idem, ckrat. 29. cen. 5.*

## SECTIO XXXII.

### Pro Pollicis vulnere.

Quidam in pollice à cultro vulnus passus est subitoque balsamo quo- dam sanatus fuit, paucis post diebus acer- bum dolorem in eadem parte sensit, ut non solum



solum cibo & potu; sed etiam somno privaretur: cum verò ob inflammationem & tumorem, gangrænæ imminentis, digitique amputandi instaret periculum, contra meum & Chirurgorum consilium, qui digitum aperiendum esse dicebamus, ne periostium corrumperetur, remedio sequenti usus est, quo miraculosè sanatus perfectissimè fuit.

24. Vini albi haustum unum, mellis 3. iv. ovor. vitell. nu. 3. M. & leniter super ignem linea spatula agita, donec vinum in fumum abierit, & quod residuum est unguenti consistentiam acquisiverit, hoc remedio multa vulnera & ulcera desperata curata fuerunt. *Petrus Borellus, observ. 96. cent. 1.*

### SECTIO XXXIII.

#### *Pro Pollutione nocturna.*

**P**rohibuimus spectacula, venerisque colloquia, lectiones impuras, imaginationes fœdas, & tactus impudicos, somnum supinum, ne in molli quoque pluma decumberet: suavisque ut jejunaret in pane & aqua, si posset, & ut à cibis delicatis, & iis abstineret quæ semen augent, præcepi ut sub lumbis lanimam plumbeam perforatam portaret, imperavi etiam, ut illi sanguis satis copiosè detraheretur; & vomitus concitaretur. Ruta commanducata crebrò per somnia venerem imaginantibus prodest, præterea ut pollutionem arceret, consului ut imitaretur illud exemplum, quo Nobilis quidam ex consilio mulieris, (apud *Leonellum*) cum per quatuor menses passus esset continuò pollutionem, curatus fuit; quando dormitum ibat Nobilis, ligabat filum ad collum, quæ chordula descendebat usque ad collum virgæ, & cum ea virgam ligabat non multum stringendo, & quando in somno inflabatur, & erigebatur membrum, propter ligaturam chordulæ dolorem virgæ incurrebat, & sic excitabatur, ut semen in somno non rejiceret, & ita fuit curatus. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 26. De penis vitiis.*

### SECTIO XXXIV.

#### *Pro Polypo narium.*

**P**olypus est carnosus in naribus excrecentia ex radicibus quibusdam tenuibus pendens, & nunc è naribus propendens, nunc etiam in palatum descendens, oritur ab humoribus crassis & viscidis, pituita imprimis sanguini permista è cerebro in nares defluente, signa sunt manifesta, caro enim excrescens polypi piscis carni similis est h. e. tumescens, laxa, rara, mollis, colore varia, nunc enim alba, nunc rubea, nunc cineritia, nunc livida conspicitur, molestissimum est malum, nares enim obstruit, respirationem intercipit, loquelamque obscurat & impedit.

#### SUBSECTIO UNICA.

#### *Pro Polypo narium.*

**P**ræmissis venæsectione & purgatione, jussi ut guajaci decocto uteretur cum tenui victu; nam multis guajaci usus profuit, deinde partem attingat fortiter astringentibus & parum causticis; qualis est aqua sequens utilissima in principio adhibita, Authore *Rondeletius*.

24. Uvar. immaturar. lbiii. cortic. malor. granat. balauft. sumach. an. lbii. mace-rentur omnia in aceto & destillentur; deinde adde alumin. lbj. vitriol. ʒiii. destillentur iterum omnia simul, & aqua illa tangatur pars affecta, quidam utuntur aqua separationis auri, vel si nimium vehemens sit; utere medicamento ex puniceis malis confecto, quod sic se habet, accipiantur tria mala granata, ea tribus generibus eorum, acidis scilicet, dulcibus & austeris, eaque matura, ac recentia terantur simul in mortario. Deinde succus exprimatur, & coquatur in linimenti formam, specillum ex lana vel linteo confectum eo in succo imbuatur, & frequenter in nares demittatur, hoc remedium siccatur & astringit sine morfu, & excrementum humorem absorbit. Puer quidam quinque annorum in nare altera polypum habebat. *Carpus* ille insignis Chirurgus hoc Medi-



Medicamento *Galleni* ex puniceis usus est, & puero rhei el. pulver.  $\mathfrak{z}$ i. exhibuit: deinde usus est unguento suo ad polypum valente.

24. Cera alb.  $\mathfrak{z}$ iii. ol. ros.  $\mathfrak{z}$ ii. butyr. antiq.  $\mathfrak{z}$ iv. simul liquefiant ad ignem, deinde extrahas, & pone in aqua & bene laventur duabus vicibus: cui addantur ova numero 2, cum  $\mathfrak{z}$ i. m. sublimati M. nimis forte est, fortasse  $\mathfrak{z}$ . m. imposuit: præterea tangebatur aqua vel spiritu vitrioli, & curatus est. *Petrus Forestus, observ. 8 lib. 13. De nasi affectibus.*

Unguentum sequens cum petia linteoli naribus intrudat, illic ubi inter polypum & nares adhuc patet aditus, repetatque bis in die.

24. Unguenti *Ægyptiacæ*:  $\mathfrak{z}$ ß. cortic. granat gallar. an.  $\mathfrak{z}$ ß. ol. vitriol.  $\mathfrak{z}$ i. M. deinde irroret nares sequenti liquore, capite adeo resupinato, ut nares subire posset.

24. Ol. vitriol.  $\mathfrak{z}$ i. alumin. usti  $\mathfrak{z}$ i. aq. plantag.  $\mathfrak{z}$ i. M. post dies quatuordecim, aliquousque jam absumptus erat polypus. Verum ut penitus auferretur, sequenti deinceps usus est.

24. Sublimati  $\mathfrak{z}$ i. coq. in aq. fabror.  $\mathfrak{z}$ ii. ad consumptionem madietatis, addé ol. vitrioli  $\mathfrak{z}$ ß. alumin.  $\mathfrak{z}$ i. M. & cum penicillo intincto sæpè tangat polypum, & sic penitus asilatus est polypus. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 665.*

Mihi est quædam aqua destillata maximè polypis proficua: quæ sic conficitur.

24. Succi rad. ari & fol. rorismar. an. part. æq. pulv. fol. rorismar. & rad. ari exsiccat. an. bonam quantitatem vitriol.  $\mathfrak{z}$ ii. omnia in plumbeo alambico destilentur, & aqua utere. *Epiphanius Ferdinandus, hist. 7.*

Gentianæ pulverem siccissimum cum serofulariæ succo in turundam aptatum in utramque nares quam potui altissimè adégi, in die muratis turundis, est hoc pro polypo fidum experimentum, & quod antea etiam feliciter cesserat. *Henricus ab Heers, observ. 28.*

## SECTIO XXXV.

### De Porigine.

*Ηττορία* (in *πύρρον* fursur) Latinis fursuratio, & porrigo, affectus est, in quo

scalpentibus, fursuribus similia, ex capitis cute decidunt, oritur ab humoribus serosis & ichoribus biliosis & pituitosis, ad caput cum alimento pilorum delatis.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Porrigine importuna.

**J**Uvenis quidam Melancholicus porriginem diu passus est: illi enim tenues fursuraceæ squammulæ ex capitis & universi corporis superficie continuo resolvebantur, pluribus ulceribus relictis, è quibus sanies quædam virulenta ex intervallis per totum corporis ambitum emanabat, quod malum cum non solum sit fœdum & molestum, sed periculosum, & facile in lepram commigret, idcirco illi citissimè auxiliares manus adhibere oportet. Post infinita propemodum usitata remedia, tandem solò urinæ balneo omnimodam consecutus est sanitatem, in quo prius fursures & fumaria erant in cocta, nec sine ratione, nam urina vehementer abstergit, & potenter repurgat; quo pacto scabiem, sorditiem, pruritusque nitrosa qua pollet facultate persanat. *Zacutus Lusitanus, observ. 3. lib. 1. prax.*

## SECTIO XXXVI.

### De Potus frigidi noxa.

**E**Legans quidam juvenis quum pila luderet, & sudore respersus, ac totus madidus ad puteum pro fici arcenda venisset, exhausta frigida, illico in terram cecidit & obiit: alterum novimus, qui quum non minus corporis totius ad apertis porris, madidus domum reverteretur, cyathum frigidioris aquæ ebibit, & mortuus quoque fuit: sed alterum vidimus, cum domum pervenit, vrgenti maximo æstu, cellam vinariam ingressus fuit, & calicem merationis vini frigidi exhaustit, & exanimatus cecidit, & vitam cum morte commutavit. *Amatus Lusitanus curat. 62. cent. 2.*



## SECTIO XXXVII.

## SUESECTIO UNICA.

## Pro Priapisme :

## De Pruritu uterino.

**A** Principio vena secatur, deinde ad revulsionem hoc vomitorium commendatur.

℥. Rad. asar. ℥i. bull. in aq. ℥x. ad medietatis consumptionem, colaturæ adde oxymel simplex ℥ii. F. emeticum, capiat tepidè, deinde post levem purgationem imperavi ut decoctum sequens sumeret.

℥. Rad. nymphaeæ cum flor. alb. ℥. m. portulac. lactuc. menth. an. M. i. rutæ ℥iii. sem. agn. cast. ℥i. m. flor. nymphaeæ alb. p. i. F. decoctio in aqua, in colat ibi. adde syr. nymph. ℥. m. M. valde id commendabat; & ideo sæpius reiteratum fuit, præterea imperavimus ut lumbos inungeret sequenti unguento.

℥. Unguenti refrigerant Gal. rosac. santal. an. ℥i. M. & ut totum priapum inungeret unguento rosac. at nihil æquè profuit ac radix nymphaeæ decocta & pota eo modo, ut superius dictum est, in cibo utendum est portulaca cum aceto, utile etiam est succum limonis sumere, eoque cibum condire, bibat aquam, parum comedat, prodest frigida ablucere pedes, & refrigerare renes; his enim partibus refrigeratis nunquam penis distenditur aut erigitur. *Petrus Forestus, obs. 9. & Schol. lib. 26. De penis vitiis.*

In priapismo præstantissimum est oleum rutæ destillatum inunctum, & intro sumptum gutulis aliquot *Joh. Hartmannus, pract. Chimiæ. pag. 264.*

## SECTIO XXXVIII.

## De Pruritu uterino.

**P** Pruritu uterinus ardens est scalpendi & coeundi tentigo cum maximo desiderio & dolore, oritur ab humore salso, seroso & adusto, differt à furore uterino, quod furor virginibus magis contingat, & absque dolore & pruritu se prodatur; pruritus verò annosis, & vetulis accidat, neque semper coeundi desiderium conjunctum habeat.

**P** *Aræus* hunc affectum in quadam muliere curasse scribit *Ægyptiaco* unguento aqua marina aut lixivio dissoluto, & injecto; atque eodem medicamento madefactis linteolis ex stupis canabinis in uterum immixtis sanitatem recuperasse, hoc etiam conveniens erit.

℥. Rad. lapath. acut. enul. camp. an. ℥i. contusa decoq. in aceto, per setaceum trajiciantur, additis ol. irin. ℥i. myrrh. ℥i. lithargyr. ℥ss. ceræ q. s. F. unguentum, quo madefiant linteola, & intromittantur, si ita attenuando & extergendo adhuc non sedatur pruritus, quæ vim habent narcoticam in usum vocentur.

℥. Unguenti popul. ℥i. conquassetur cum aceto scillitico; adde opii pulverisati gr. viii. M. applicetur tepide. *Rodericus à Fonseca, tomo 2. consult. 68.*

Ut vulvam lavaret præcepi cum hoc decocto.

℥. Fol. plantag. lepath. acut. cum rad. an. M. i. coq. in aq. plantag. post lotionem hoc linimento inungantur.

℥. Lithargyr. auri per diem ac noctem in acerrimo aceto macerati ℥i. ol. viol. q. s. F. linimentum molle, & ita à feda illa passione liberata fuit, fuit hoc linimentum secretum præceptoris mei *Elidæi. Petrus Forestus, obs. 50. lib. 28. de morbis mulier.*

## SECTIO XXXIX.

## Pro Pruritu totius corporis.

**P** Ost repurgatum corpus ab humore salso & acri, ut hoc unguento uteretur mandavi.

℥. Rad. lapath. acut. enul. camp. an. ℥i. decoq. in aceto, & contusa per cribrum tenue transmittantur, quibus adde ol. irin. ℥. iv. salis ℥i. myrrh. ℥ii. litharg. ℥ss. ceræ parum F. unguentum, si hoc non sedatur pruritus, addatur parum argenti vivi, quod pruritus sedat. Post exsiccationem & discessionem materiæ, remanet sensus ille pruritus, quem auferes oleum hyoscyami unguento immiscendo, vel fiat sic.



℥. Unguenti pompholig. ℥ii. ol. hyoscyam. ℥i℥. F. unguentum, quo ungatur pruriens, hoc refrigerando pruritus aufert mirum in modum. Post horum usum, utile est corpus balneo detergente frequenter ablueri. *Petrus Forestus, observ. 9. lib. 5. Observ. Chirurg.*

## S E C T I O XL.

*Pro Psyrachiiis.*

Ψυδράχαι & Ψυδράχαι sunt parvæ quædam in capite pustulæ vesicis similes super cutem eminentibus: oriuntur ab humore, ex sanguine, bile & salso nitrosoque humore mixto.

## SUBSECTIO UNICA.

*Pro Psyrachiiis.*

**P**Syrachia, nempe pustulas parvas in cute capiti puer habebat, similiter in fronte, similes vesicis eminentibus in superficie rubicundas & asperas; quas inungere iussi cum humidæ essent, & virus effunderent cum magno pruritu, unguento sequenti.

℥. Lithargyr. ceruss. an. ℥i℥. cretæ alb. sulph. an. ℥ii. cum oleo myrtino. F. unguentum. *Petrus Forestus, observ. 26. lib. 8. De exterior. capitis vitiiis.*

## S E C T I O XLI.

*De Pterygio.*

**U**nguis oculi (Græca πτερυγίον, i. e. parva ala (est nervosa & duriuscula membranula, plerumque ex angulo sese obtendens, & sæpe pupillam obtegens; membranula hæc plerumque est albicans, non tamen semper, sed aliquando rubicunda, citrina, & subnigra: oritur frequentissime ab angulo majore juxta nasum rarius à minore, rarissime ab alterutra palpebra; pars affecta est tunica adnata, interdum tamen ita invalescit, ut corneam & pupillam integat. Causa unguis est humor lentus è capite destillans, qui supra adnatam consistens ob

viscositatem facile concrevit in tunicam.

## SUBSECTIO UNICA.

*De Pterygio.*

**P**ost universales celebratas evacuationes; ad medicamentorum admotionem in oculo ipso condescendimus: præcipue ad hoc sequens, quo universa cura clausa est.

℥. Ovum cujus album per foramen extrahatur, vitello manente; vice albi ejecti ovum per prædictum foramen sale nitro fino pulverisato impleatur, postea verò totum ovum maza coopertum sub cineribus calidis dimittito: quousque totum durum satis evadat: depositis deinde crustis, ex vitello & sale nitro mixtam materiam in subtilem pollinem redige, cujus pulvisculum melle exceptum oculi ungui admove, & bis in die innova, brevi enim opus complebis: memini etiam me, huic similes oculorum unguis aqua forti argenteorum rosacea temperata curasse. *Amatus Lusitanus, cent. 3. curat. 82.*

Detracto sanguine, & corpore ritè pilulis purgato, fomentis usi sumus primum emollientibus & inflammationem tollentibus, ex decocto malv. fol. viol. sem. malv. scænuigræ. cydon. & papav. postea admisimus detergentia; & ea quæ ad pterygion confirmatum valent: tandem cum ad fortiora detergentia coacti fuimus accedere, hoc sequenti collyrio utebatur.

℥. Succ. scænic. ℥iv. succi chelidon. ℥iii. succi rutæ, ℥ii. succ. malv. ℥i℥. Aloes ℥vi. vitrioli ℥iv. ærugin. æris ℥i. zinzib. cinnam. an. ℥℥. fellis anguil. ℥℥. fellis tauri, bubul. aut porci ℥ii. sacch. Cand. ℥iii. mell. opt. ℥℥. bulliant succi addendo reliqua & depurentur, & F. collyrium s. a. quod cum sæpius bis in die in oculum stillaretur, licet cæcus per integrum ferè annum, paulatim visum recepit; & tandem integrè pterygio liberatus est magno cum nostro honore; at Dei benignitate. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 11. De morbis oculorum, &c.*

Præmissis universalibus remediis, imprimis aqua calida oculum fovebamus; deinde



die abstergentia medicamenta admovebamus, & hoc collyrium, quod ab initio saepe juvisse accepimus.

24. Lactis muliebris, croci, fellis caprae, an. part. aq. aliquantulum ad ignem bulliant in ovi testa, guttas in oculum instillato; & multis in quatuor diebus unguem erosit, & pannum abstulit. Empiricus quidam ad pannos & pterygia consumenda hoc collyrio utebatur.

24. Salis gemm. ℥i. aq. ros. & foenic. an. ℥i. M. Praecepti quoque ut hac aqua destillata oculum ablueret linteolo molliori, vel guttulas aliquas instillaret.

24. Extra lupi piscis, ac una cum felle, jecore & reliquis visceribus imminutas partes concidito, adjecto Mi. fol. foenic. vel sem. ejusdem contusi, & in alembicum distilla, ac usui reservato: ac visum acuit, & unguem ab oculo remover. Hac aqua Dominade *Hochstratem* in pauperibus frequenter usa est. *Petrus Forestus, observ. lib. 11.*

Quod sequitur tutissimum experientia & ratione confirmatum est.

24. Chalcanth. roman. ℥ii. virid. æris ℥i. in tenuissimum pulverem redigantur: deinde fume unum ovum, aut duo coquantur dum indurescant; emundata à cortice seindito per medium, extrahitoque vitellum, in cujus loco imposito pulveres supradictos. Deinde ligato divisum ovum, ac triduo macerato in ℥v. aq. mellis stillatitiae, & ℥iib. vini albi, ovum postea in liquore exprimito; liquorem expressum instillato quater singulo quoque die ad gutt. v. aut. vi. in omnibus partibus perygii: nam oportet singulas tangere. Validius erit si adauxeris vini copiam, & aquam mellis diminues; hujus Pharmaci usum D. O. M. benignitate à sinistro oculi pterygio fui ego ipse sanatus. Si adeo contumax fuerit morbus atque rebellis, ut medicamenti non cedat, ad manualet operam accedendum est; atque uncinis, acubus & filis prorsus extirpandus. *Horatius Augeminus, edist. 12. lib. 11. tom. 3.*

Inter remedia minus vehementia, sequens cum fructu usurpari poterit.

24. Ossis sepiae ℥i. sacch. Cand. ℥i. vitr. ℥ss. tutiae præp. ℥ss. M. F. pulvis subtilissimus ungula inspergendus. *Lazarus Riverius,*

prax. Medic. lib. 2. capit. 18.

## SECTIO XXXII.

### De pulmone praefixo.

**C** Vidam infligebatur propè Urbem *Prielam*, ingens vulnus sub papilla sinistra: sed eo ob temulentiam flocci facto, neque implorata alicuius ope erupit postridie ex hiantie vulnere non exigua pulmonis pars, adæquans magnitudine sua tres transversos digitos; quod grave infortunium non promovit tamen hominem temerarium, plagam hanc cum cura habere; sed contulit se nihilominus satis inconsideratè. *Amstelredamum*; bidui itinere inde stans; nec coercens pendulam pulmonis partem fascijs, nec implens vulnus lineamentis usque dum reficeretur in nostro valetudinario, in quo illicò imperatum, emortuam pulmonis partem, filoprius constrictam, forcipe excidere coalescente residuo lobo, in ipso vulnere: cuius oræ coaluerant tam firmiter intra diem decimam quartam, ut vix quicquam impedimenti manserit, præter levem tussiculam, interpolatis vicibus duntaxat molestantam. Partem autem hanc lanci impostam vidimus pendere circiter ℥iii. grande mehercules pondus in viscere tam raro ac levi. Creditum hætenus ut non servetur, cui pulmo medius vulneratur: ita utique vix restitui, qualemcunque ipsius plagam; sed usus, qui omnium Magistrorum superat præcepta, docet evidenter nihil hic trepidandum, sed cautè decurrendam semitam, quam nobis præiucere veteres. Præcide (inquit *Celsus, lib. 5. cap. 26.*) quicquid ex iecinora, liene, aut pulmone extremo dependet. *Nicolaus Tulpius cap. 17. lib. 2. Observationes Med.*

## SECTIO XXXIII.

### De Pulsuum observatione.

**P**ulsuum differentias quæ verè possunt cognosci & præcipi à Medico, non scio plures quam istas sex. Si *Galenus* potuit alias observare & cognoscere, bene est;



est; hoc scio, quod omnes nos non alias cognoscamus, quam illas communes. Quod de aliis dicunt alii forsitan est impostura. Sex pulsus sunt, 1. Magnus & parvus 2. Velox & tardus. 3. Frequens & rarus. 4. Aequalis & inæqualis 5. Vehemens & debilis. 6. Plenus & vacuus. Nugas puto esse reliquas quatuor differentias à *Galeno* traditas, quas certè impossibile est cognoscere. Quidam dicunt se posse pulsum ferrinum percipere, quod splendidum est mendacium. Sicut Medicus quidam dixit ægrum habere ferrinum pulsum, & alter doctior eum, se deprehendere posse negaret, tandem & ipse professus est, nec se deprehendisse, hoc tamen ideo dixisse, ut si fortè alter cognovisset, ne ipse minus scire videretur; sed quando tu non cognoscis, (inquit) neque ego cognosco: haud æquo animo patior me interpellari inter tangendum & explorandum pulsum, quod nihil tantam requirat diligentiam & attentionem, quam pulsus: ut mirum sit alios confabulari interim, & tamen omnes pulsum differentias, assequi. Ego nescio an possint esse tam ingeniosi, & tanta celeritate discurrere. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 256. & 257.*

Multum abest ut de pulsu intermittenti in pueris pertimescendum esse existimem: quoniam siquid est, quod in adeò tenella ætate facile in quasvis formas mutetur, planè pulsus est; ut meritò Medici elegantiores, vix in pueris pulsum tangere, aut saltem æstimare videantur; neque unquam apud Veteres observare mihi licuit inæqualitatem pulsus interceptionem vè inter certa gravis alicujus puerorum mali indicia esse relatus, quemadmodum in viris observatum quidem est. *Hieronymus Mercurialis, tom. 1. consult. 13.*

Vir quidam quadraginta quinque annorum febre continua laborans pulsus intermissionem habebat; singulis quatuor aut quinque pulsationibus arteria deficiebat, & tempore duorum ictuum sive duarum pulsationem immobilis manebat; signum malum, præsertim in febribus continuis. Cæterum cum intermissio pulsus huic venerit ob arteriam à crassis, & malis succis compressam, non verò ob vitalis facultatis imbecillitatem, non difficile fuit eum libe-

rare, ad causam, unde mala affectio originem trahebat, attendendo. Cor corrobora-  
vimus, & humores ab eo retraximus quos postea attenuavimus, incidimus, & tandem purgavimus: unde pulsus ex heterorhythmo pararythmus, & postea eurhythmus, i. e. consonus est factus, & ægrotus ipse ex toto sanus. *Amatus Lusitanus, curat. 72 cent. 6.*

Pulsum toto vitæ decursu adeò esse obsecrum, ut tactu percipi non possit, novum & admiratione dignum est: quod tamen annis abhinc viginti *Furnis* civitate *Flandrie* in plusquam sexagenario sene mihi observasse contigit, non semel. Is enim quum à retroactis annis aliquot frequenter variis, atque iis non infimi nominis Medicis, carpum obtulisset ut experirentur, si qua tandem ratione motum aliquem arteriarum percipere possent, singulisque negantibus subsultationem aliquam sentiri: tandem ætate provectus jam, & sexagenario, ut dixi, major inter epulas manum mihi porrigit, ac rogat, ut ex arteriarum moto aliquid, quod ad præsentem corporis constitutionem pertineret, in medium asferem. Detraçtanti primùm mihi, quod non esset ejus temporis atque loci, persuasit tamen ille, quum urgeret vehementiùs: indecens enim censebam, si ejus canitiei tantulum non concessissem. Quum igitur diligentius pertento, nihil minùs quàm micationem aliquam percepi: imaginabar tamen levem aliquam diastolen, non secus ac si perrepantis arteriam vermis species repræsentaretur, cujusmodi pulsum vermicularem appellare consueverunt. Cum interim ille intentis in me oculis responsum expectaret, meque meditabundum conspiceret, subridens; Nihil, inquit, ò *Baldvine*, est quod hæsites. Motum nullum percipis, atque id mihi à teneris usque familiare, & quasi annatum fuisse scias velim, quod & ante te multæ tuæ professionis viri tecum experti sunt. Admiratus casum excutiendum censui, atque ea probabilior causa esse videbatur, quæ dictabat arterias altè delitescentes adeò occultari, ut motum earundem quantumvis exacto digitorum examine percipere non liceret. *Baldvinus Ronsseus, Epist. Medicin. cap. 11.*



## SECTIO XXXIV.

## SECTIO XXXVI.

## De Pulsu tangendo.

## Pro purgando corpore.

**C** Apitaneo ob facinus commissum *Venetis* manus ambæ abscissæ fuerunt; ita ut cum postea ægrotaret, pulsus articularum in ipsis brachialibus deprehendi non poterat; quæsitum tandem fuit inter Medicos præsentēs, ubi nam arteria tangi deberet; variè responsum fuit: altero prope cor asseverante, altero verò in temporibus: demum conclusum cum *Galeno* fuit, quod ubi carpi pulsus occultatur tarsi arteria tangenda est, i. e. arteria in pede ad secundum digitum post maximum sita. Unde rectè eos Medicos facere mihi visum est, qui cum de obitu aut virium prostratione suspicantur, ad illam tangendam arteriam accedunt; quum cæteris pulsatilibus prima deficiat, quia longinquior à fornacis calore sit. Sic enim *Galenus lib. 3. De Anatom. administ. Amatus Lusitanus . cen. 1. curat. 96.*

## SECTIO XXXV.

## Pro Pupilla ruptione.

**I**N divulsione & ruptione pupillæ, item corneæ omnium optima est aqua ex albumin. ovorum quæ sic fit. Coquantur ova ad duritiem, deinde iis medium dissectis, eximantur vitelli, postea cum quibusdam albuminibus ad duritiem coctis, & tenuiter quasi in pulvem cum cultello sectis cavernas liquorum ovorum comple, partibusq; debitè conjunctis & filo coligatis in cucurbitula præcisè in medium ex filo suspende: clauso orificio cucurbita in B. M. collocetur, & coquantur: videbis albumina secta paulatim in liquorem destillare quem probe ex fundo cucurbitæ collectum (est nimirum satis exiguum) ad vulnera oculorum recentia cum pluma sæpius applica. Quali acunque etiam vulnera citra aliquam cicatricem consolidat, estque magnarum virium, pterygiis oculorum item feliciter adhibetur. *Ioh. Hartmanus , practic. Chimiatr. pag. 98. & 102.*

**N** On ego transcederem in purgatione usum Cassiæ & rhab. augendo & minuendo dosim, prout purgatio bene succederet, & virtus toleraret. Nulla enim purgatio est tam exquisita quæ perfici non possit his benedictis medicamentis; Si modo dosim pro viribus metiamur. Nullus præterea humor est in humano corpore redundans, qui his duobus medicamentis educi non possit: sive ille sit crassus & viscidus, sive terreus & adustus, sive subtilis & biliosus ut quotidiana experientia deprehendimus, & ut testatur upud *Græcos, Aëtianus*; apud *Arabes* verò *Mesue*.

Sit exemplum tale.

℥℥. Flor. Cassiæ ℥x. rhab. pulv. ℥ii M. cum sacchar. F. bolus. *Ioh. Baptista Montanus.*

Petis ut purgans aliquod nomen, quod aut nullius saporis, aut certè non ingrati sit, & abdominabilis; inter simplicia nullum novi, quod hac in parte radici mechoacan præferre possem. Jam sæpè illud exhibui delicatis personis; quæ à mentione etiam rhei, agarici, aut aliorum abhorrent: dosis illius est ℥ss. ad. ℥i. aut Div. in pulverem redigo, & admixto paulo gingib. stimuli gratia cum uno atque altero cochleari vini dulcis seu malvatici propino; blandà expurgat, & fere agarici vires æmulatur; nisi quod ventriculo minus infestum est. Si degustaveris, ferme nullum odorem aut saporem percipies: & tamen in evacuando non segne est. Jussi etiam aliquando, ut eadem radix pani, quem vocant *Martio*, incoqueretur, & sic ægro ignoranti, non sine fructu, exhibui, quo plus candoris habet, eo melior est, e compositis blande & sine molestia corpus expurgantibus plurimum tribuo passulis laxativis vulgo dictis; quibus hic in aula nihil est frequentius; Constant autem ex infusione fol. sen. in qua passulæ inf. q. macerantur, & deinceps syrup. rosat. solutivus affunditur: interdum etiam rhei aliquid adjicitur; sed in communi, ne nauseam pariat, omittitur. Electuarii cujusdam lenientis descriptionem subjungo, quæ per



per me Authore in Officina suæ Majestatis parata est.

℥. Fol. sen. mund. ℥i vß. rhei el. ℥iß. infunde in vini malvat. lb. iv. succi cydonior. depurat. lb. ii. mane bulliant S. A. exprimantur fortiter; expressioni adde pulpæ pomor. redolent. arte coctor. lb. v. brodii, zinzib. lb. i. brodii cydonior. aut mivæ lb. m. sacch. lb. iii. coquantur ad formam diacydoniati. Sub finem decoctionis adde mannæ el. in vino malvatico dissolutæ ℥vi. distribuatur in capsulas: non tantum sine molestia, sed etiam cum voluptate assumitur. Totam massam hanc in duas partes distribui; & alteri pro singulis unciiis grana aliquot diagridii adjeci, ut in validioribus plus operaretur, à ℥. m. ad ℥i. tuto exhiberi potest. *Petrus Monavius, epist. 28. lib. 2. epistol. & consil. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.*

Pulvis ex radice mechoacan. confectus prodest in morbis chronicis & inveteratis: in Podagra, Asthmate, Hydrope, & ali-

is morbis à materia frigida originem ducentibus, dosisejus à ℥i. ad ℥ii. propinatur cum cerevisia, vel immiscetur confervis & electuariis solutivis. Formantur inde etiam Catapotia: infusum parum aut nihil viri-um exerit, *Abraham Seyler, epist. 8. lib. 6. epist. & consil. Cratonis, &c.*

## SECTIO XXXXVII.

*De Purgatione solo odore Medicamentorum.*

**M**edicus quidem *Lipsensis* suo tempore præclarus, quoties purgare corpus vellet. Pharmacopolia ingressus, quando nimirum Electuaria purgantia recens parabantur, & illa olfecit tantum, deinde domum reversus intra eam se continuit; non aliter autem atque alius qui Pharmacopus usus, sexies quoque vel septies excrevit. *Philippus Salmuthus, observ. 8. cent. 3.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER DECIMUS QUINTUS

*De Affectibus à litera R incipientibus.*

## SECTIO PRIMÆ.

*Pro Rachitide.*



**R**achitis (morbus Veteribus incognitus, quo tamen hodiè in tota *Britannia* nullus frequentior) est intemperies frigida totius spinalis medullæ calvariam egressæ omnium nervorum interortorum, & partium omnium membranosarum ac fibrosarum universi corporis, cum defectu & torpore spirituum, & partium tono vitiato: causa & partes primario affectæ ex ipsa definitione patent: ejus signa & symptomata sunt: laxitas & mollietates partium primo affectarum; debilitas & languor seu enervatio par-

rium motui inservientium; ignavia & torpor artuum, caput iusto majus, facies plenior & floridior, partes musculosæ macie confectæ, protuberantiæ quedam & nodi circa nonnullos articulos maximè in carpis, ut etiam in talis, & extremitatibus costarum, ossium nonnullorum incurvatio, quæ frequentius accidit ossibus cubiti, tibiæ, femoris & humeri; pectoris acuminatio & angustia; gibbositas, subtumida quædam abdominis repletio & hyhochondriorum tensio, tussis frequens, respiratio difficilis, & multa alia pulmonum vitia, ut & eorum infarctus, tumores duri,



duri, adscensus, inflammationes, coalescentia cum pleura, pulsus exilis & debilis: quorum omnium communis causa videtur esse inæqualis & improporcionata nutritio. Causæ antecedentes sunt, præter labem à Parentum semine consimili diathesi imbuto, fœtui impressam, humores vitiosi in corpore redundantes, pituitosi, biliosi, at præsertim melancholici: procatactica verò errores in usu rerum non naturalium commissi. Hoc morbo corripuntur Infantes à nono mense usque ad secundum annum cum dimidio.

Clarissimus *Franciscus Glissonius* de Rachitide doctissimum omnibusque absolutum numeris conscripsit Tractatum ad quem Lectorem remittimus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Rachitide.*

**C**Hirurgica præsidia in hoc affectu communiter recepta ac probata, & præ cæteris famosa, duo præsertim sese offerunt; scarificatio aurium, & fonticulus; quod ad scarificationem aurium attinet. Empirici nostrates, qui hunc affectum tractant, eam pluris faciunt quam quis facile putaret: solemniter quippe in sua praxi eam celebrant, absque ea vix felicem curationem sperant. Nos verò, licet hoc remedium genus non improbemus, vidimus tamen absque ejus usu nonnullos pueros feliciter sanatos: plerumque bis vel ter, interpositis septem circiter dierum intervallis, hanc operationem repetunt; rarius lanceola aut acutiori scalpello; frequentius ordinario obtusiorique cultello id perficiunt, nihil dolorem ejulatumque infantis morantes, in concha auris ut plurimum hanc scarificationem instituunt; aliqui verò eam ad interiorem & exteriorem alæ sive pinnæ aurium circumferentiam, imo ad Herlicen usque extendunt. Hæc operatio non nisi præmissis universalibus fieri debet. Fonticulus in hoc affectu multum probatur, atque hoc solo ferè præsidio nonnullos pueros liberatos fuisse novimus; excitandus est inter secundam & tertiam colli vertebra; potiusque per

simplicem incisionem acuto scalpello factam, quam cauterio actuali vel potenciali.

Præparatis & evacuatis morbi causis, vel saltem ita edomitis, ut ad tempus ulteriorem curationem non impendant, statim ad hæc alterantia specifica procedendum est; quæ quidem jugulum quasi ipsius morbi petunt. Sunt autem ea vel simplicia vel composita; simplicia quæ nobis hæcenus innotuerunt, sunt sequentia. Radix seu potius spicæ radicis osmundæ regalis; radix filicis maris, item turiones vel potius gemmæ ejusdem vix dum è terra prorumpentes; radices graminis, cichor. asparag. rub. tinct. eryng. herbæ capillares, ceterach. lingua cervina, hepatica, agrimonia, cuscuta, betonica, veronica, mas, folia & cortex tamarisci, cortex rad. cappar. flores & folia lamii, borrag. salv. rorismar. abrotan. absinth. chelidon. maj. crocus, radic. curcum. farsaparill. sassafras, china, triafantala, lignum guajacum, ejusque cortex: flores sulph. chalybs, præp. crocus Martis, sal. chalybis, vinum chalab. vinum album Gallicum & Rhenanum, spermaceti, moschus, ambra grysea, castoreum, vermesterrestres, jecora ranarum & pullorum corvi, millepedes vino albo lotæ & in clibano siccatae ac pulverizatae, & similia.

Ex his medicamenta composita conficiemus in hunc modum.

Apozemata & cerevisiæ medicata.

℞. Rad. osmund. regal. spicas num. 6. herb. veronic. maxis, ling. cervin. ceterach. cap. ven. hepatic. an. M. i. salv. anthos. an. M. β. passul. min. ℥iii. liquir. ℥β. macis ℥ii. coq. in. ℔vii. aq. fontis S. A. in colat. ℔iii. dissolv. syrup. capill. ven. ℥iii. M. F. Apozem. capiat puellus haustulum hujus quotidie manè, hora quarta pomeridiana, tum etiam noctu, si potum petierit; imò si voluerit, utatur eo pro potu ordinario, tussi & obstructione pulmonum simul cum hoc affectu graviter afflictis maxime convenit.

℞. Fol. osmund. regal. ling. cervin. hepatic. ceterach. flor. trmarisc. rad. filic. maris, an. M. i. passul. min. ℥ii. santal. alb. & rubr. lign. sassaf. an. ℥ii. sem. coria-



coriandr. ʒi. macis ʒi. fol. salv. M. ʒ. coq. in f. q. aq. font. S. A. ʒi. ad ʒii. colatura edulcoretur sacchar. vel melle, pro potu ordinario. Hepaticis hoc affectu laborantibus succurrit.

ʒ. Sarsapar. incis. & optimè contus. ʒiii. rad. chinæ in taleol. concis. ʒi. infund. & coq. S. A. in ʒvii. aq. font. ad ʒvi. ʒ. tum adde radic. assafr. ʒii. osmund. reg. ling. cervin. ceterach. cap. ven. lamii, an. M. ʒ. liquir. ʒii. macis ʒi. coq. ad ʒiiii. colaturæ adde mell. vel sacch. ʒiii. M. pro potu ordinario. Conducit præcipuè iis qui Lue Venerea laborare suspecti sunt, ut & strumosis:

ʒ. Rad. sarsapar. ʒviii. rad. chin. ʒii. lign. assafr. ʒʒ. ras. ebor. ʒi. osmund. reg. veronic. maris, ling. cervin. ceterach. capill. ven. hepatic. summitat. lamii, an. M. ʒi. concisa & contus. S. A. coq. in congiis iv. cerevisiæ rec. ad unius consumptionem, sublatis ab igne adde cong. i. ejusmodi cerevisiæ: agitentur simul baculo, & deinde colentur. Ingredientia eadem sacco ex tela rara includantur cum frusto ferri in ejus fundo reposito, & suspendantur in cerevisiatum addito fermento, fiat fermentatio cerevisiæ ad perfectam usque depurationem. Liquor limpidus post aliquot dies depromatur pro potu ordinario.

ʒ. Vini chalyb. ʒʒ. syrup. de cichor. cum rheo ʒii. bibat æger quotidie mane per quinque aut septem dies, aut plures, nisi fluor alvi, aut ventriculi debilitas prohibuerint: in quo casu, loco syrup. de cichor. cum rheo, addatur syrup. de rosis siccis.

Juscula & panatellæ.

ʒ. Scolop. ceterach. hepatic. capill. ven. salv. an. M. ʒ. cortic. tamarisc. santal. rubr. an. ʒii. indantur ventri pulli majusculi, aut gallinæ, vel galli veteris, & contuso ventre, coq. cum ʒii. passul. min. in f. q. aq. fontis additaque suff. quant. farinæ avenacæ purioris. F. jusculum perfectè coctum.

ʒ. Rad. chinæ in taleol. concis. ʒii. sarsaparil. alb. & medullos. incis. & contus. ʒiii. infunde per noctem in ʒix. aq. font. manè post levem ebullitionem, inde colaturæ ling. cervin. veronic. an. M. i. macis ʒʒ.

passul. corinthiac. ʒi. & cum carne vervecina, vitulina, vel capon. addita farina avenacea. F. S. A. jusculum Quod si tenuiora juscula desiderentur, loco farinæ, crusta panis incoqui; sin verò crassiora, mica panis cum vitellis ovorum admisceri poterit; porro ob debilem puelli coctionem nonnunquam cochlearia aliquot vini addantur. Panatellæ ex ejusmodi jusculis colatis, iterumque cum mica panis coctis, additis tandem, ut ab igne sublata fuerint, butyro & sacch. q. s. conficiantur.

Pulveres & Electuaria.

ʒ. Rad. Filic. mar. vel potius gemmarum ejusdem vixdum è terra prorumpentium, & in umbra siccant. spic. osmund. reg. an. ʒii. macis, sem. anis. an. ʒʒ. croci gr. ʒ. F. pulvis; dosis à ʒʒ. ad ʒi. in lacte, sero lactis cerevisiato, apoze-mate aliquo, jusculo, panatellis, &c.

ʒ. Medullos. part. rad. sarsapar. ʒii. rad. chinæ ʒi. rad. assafr. ʒi. sem. carvi & coriandr. an. ʒʒ. rad. filic. maris, osmund. reg. an. ʒii. M. F. pulvis usurpandus ut prior.

ʒ. Milleped aq. prius, deinde vino albo lot. in clibano post extractum panem siccant. q. v. F. pulvis; dosis à ʒʒ. ad ʒi. in jusculis, &c. ut supra; eodem modo præparata jecinora ranarum, & pullorum corvi pulveris præscribuntur.

ʒ. Flor. sulp. ʒii. spec. diarrhod. abbat. diatrion. santal. an. ʒʒ. croci gr. ʒ. sacch. crystallini ʒiii. pulverata subtilis. simè cum aq. f. ros. rub. q. s. F. pasta lento calore siccanda, quæ denuò, ubi usus fert, in pulverem redacta exhibetur ad ʒi.

ʒ. Conf. ros. rubr. ʒi. ʒ. conf. flor. borrag. lamii, sal. anth. an. ʒʒ. chalyb. præp. ʒi. cinnam. liquir. an. ʒʒ. croci ʒʒ. santal. rubr. ʒi. pulverat pulverandis, F. S. A. electuarium cum syrup. de cich. cum rheo, vel de absinth. q. s. capiat æger ʒʒ ʒii. vel ʒi. quotidie manè vel per se, vel in cochl. feri lactis cerevisiati vel decocti alicujus appropriati, vel etiam vini.

Remedia extrinsecus applicanda sunt, liquores, olea linimenta, unguenta, & emplastra; liquores in hoc affectu longo usu probati, sunt omnia propè vini genera;



ra ; imprimis verò vinum Monscatellinum Alii potius commendant vinisque præferunt Cerevisiam *Geldunensem*, seu *Prussiacam*, quæ quidem ad consolidandas & firmandas partes plurimum, ad sanguinis autem æquationem, ejusdemque æqualem distributionem parum aut nihil potest ; idem esto judicium de vino *Alicantico*, ut & de vino rubro. Aliqui loco vini utuntur aq. vitæ vulgari, quæ nihilo inferior vino creditur. Decocta quoque in ejusdem usum ita parari queunt.

℞. Rad. osmund. reg. fol. salv. flor. calendul. fol. lari, scolopendr. veron. maris, an. M. ℥. roris mar. ros. rubr. sicc. an. p. i. coqu. in aqu. font. & aq. vitæ vulgar. an. ℔i. ad tertiæ partis casum : colatura servetur ad usum ; verum liquores hi rarò aut nunquam soli adhibentur, sed oleis linimentis, vel unguentis, æquis ferè partibus admixti, & quidem coram luculento igne tepidi usurpandi, calida nutricis manu donec exsiccentur affricti. Olea quæ maximè probantur, sunt, oleum vermium terrestr. chamæm. flor. calend. veronic. maris, è pedibus bovinis, vulpinum, catellorum, hirundinum. Unguenta ita componantur.

℞. Fol. salv. rubr. veronic. mar. anagall. flor. calendul. an. M. ii. rad. osmund. regal. ℥vi. butyr. Majal. ℔i. vini alb. ℔℥. concisæ herbæ & contusæ radices, coq. S. A. ad vini absorptionem : dein F. expressio dum adhuc calent, cui adde ol. nuc. myristic. per express. ℥i℥. Misc. diligenter ; & post subfidentiam abjectis facibus, F. unguentum purum, reponatur in olla vitreata ad usum. Vel,

℞. Fol. chamæm. becabung. nastur. aquat. cochlear. hortens. veronic. maris, cardiac. cap. ven. ling. cervin. ceterach. lauri summit. menth. rubr. salv. ros. mar. baccar. hederæ, an. M. ℥. rad. osmund. reg. ℥iv. vini moscatellin. ℔℥. butyr. Majal. ℔i. incidenda incisa, & contundenda contusa, coq. omnia ad vini absumpt. exprimito dum calet, & separato impuro sedimento. F. S. A. unguentum. *Franciscus Glissonius. Tractatu De Rachitide.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Rachitide.

**P**ro rachitide optimum est medicamentum & potens specificum ens veneris, quod sic fit.

℞. Vitrioli *Gedanensis* optimi (si *Hungaricum* vel *Goslariense* haberi nequit) q. v. calcinetur ad obscuram rubedinem, tum frequenti affusione aquæ calidæ, ablatis ita salinis particulis, exacte dulcescat, sicceatur quam optimè, & in tenuissimum pulverem reductum cum equa portione purioris salis armoniaci subtiliter pulverisati exquisitè misceatur : mistura ponatur in vitream retortam ad tertiā partem, ea plenam, sublimetur in B. arenæ, dando ignem per gradus ut artis est, per decem vel duodecim horas, sub finem ita augendo, ut fundus retortæ (si fieri possit) planè excautescat ; sublimatum exemptum, nisi fuerit satis flavum sed aliquo modo pallidum capiti mortuo commissum & cum eo probe commixtum, denuo sublimetur, luteo demum debitoque calore imbutum, rursus semel sed per se exaltetur : dosis est à duobus vel tribus granis ad decem vel duodecim (aliquando in robustioribus ad viginti vel triginta) in aqua destillata vel tenui cerevisia, quovis tempore, dummodo vacuus sit ventriculus exhiberi poterit ; ego tamen ut plurimum hora decubitus propino ; operatur (quando sensibilis est operatio) per sudorem, & aliquomodo per urinam, plusquam centum pueruli rachitide laborantes, de quorum maxima parte conclamatum fuit, hoc solo exaltato colcothare curati sunt. In febribus etiam aliisque morbis ad conciliandum somnum utiliter exhibetur : in dolore etiam capitis, suppressionem mensium, lumbricis, & ad appetitum excitandum miras exerit vires. *D. Robertus Boyle. Tractatu De utilitate Philosophiæ experimentalis, part. secunda sect. 5. capit. 6.*



## SECTIO SECUNDA:

## De Ranula.

**R**anula, Græcè *βροτοπος*, tumor est ranæ formam referens, qui sub lingua ex molli carne, cui lingua incumbit, cuique quasi vinculo alligata est, nonnunquam exoritur; causa est sanguis viscidus & pituitosus ad mollem illam oris partem confluens, ibidemque mollem & laxum tumorem excitans; qui si aperiatur profluit ex eo mucus ovi candido persimilis; aliquando & lapilli ex apertis ejusmodi tumoribus excernuntur; pueros hoc malum maximè infestat.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Ranula sub lingua.

**R**anulam sub lingua patiebatur juvenis quidam, quem sic curavi, corpore repurgato pulvere sequenti tumorem fricari jussimus.

℥. Cort. gran. hyssop. sic. sal. communis an. ℥ii. F. pulvis; al. quo modo detumescere capit: hoc modo *Joh. Teyngius* Medicus *Amstel.* curavit juvenulam duodecim annorum ranulam quantitatis nucis majusculæ sub lingua inflatam, tensam, & mollem habentem intra duo dies: puella pulverem sub lingua tenebat: id medicamentum *Nicolao Florentino* tribuitur, qui tamen in adultis loco salis communis utitur sale armoniaco: nos etiam cum sale tosto & gemmæ fricari jussimus; hoc etiam decocto usi sumus, sub lingua sæpè contento.

℥. Balauſtior. alumin. gallar. an. ℥ß. F. decoctio in aq. & sic absque Chirurgi opera fuit curatus hic juvenis. Mulier quædam curata est à ranula hoc lavamento.

℥. Aq. plantag. ℥ß. balauſt. ℥iß. alum. ℥ß. mell. rosac. ℥ß. bulliant pro lotionem. Mulier quædam rustica longo tempore batrachon sub lingua habuerat, ut non alia spes curandi superesset, nisi ut scalpello utrinque tumor aperiatur, quod cum Chirurgus dextrè administrasset, humore effluente quantum potuerat, & postea exiguo sale addito, ore paucis diebus colluto, curata tandem fuerat. *Petrus Forestus*, ob-

*Barnet Parte I.*

*serv. 28. lib. 14. De affectibus labior. gingiv. dentium, oris, & lingua.*

Si affectus sit inveteratus, & ulcus prædictis remediis exsiccari nequeat, tangatur oleo sulph. bis in die, temperata tamen cum aq. rosac. ita ut ad una guttam olei quinque vel sex guttæ aq. rosac. misceantur: ita enim intemperies corrigetur, & exsiccabitur pars quæ ad roborationem, vino nigro admixto alumine sæpè abluenda est; si post hæc remedia morbus redeat, ad cauterium actuale veniendum, cujus administrationem docet *Petrus. Lazarus Riverius*, *prax. Medic. lib. 5. cap. 2.*

## SECTIO TERTIA.

## De Raucedine.

**B**raucēdo, Latine raucedo, est vocis insolita & non naturalis gravitas & asperitas; accidit à nimia humiditate membranarum asperam arteriam constituentium, à catarrho è cerebro delabente; generatur quoque per accidens ob nimium calorem, ventorum borealium, fumorum & pulverum inspirationem.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Raucedine.

℥. Syrup. viol. de liquir. an. ℥i. oxymel. scillit. ℥ß. aceti scillit. ℥iii. M. F. lohoch. quod lambebat manè ante & post cibum, & ante introitum lecti; atque hoc solo remota est raucedo intra viginti quatuor horas *Martinus Rulandus*, curat. 35. cent. 4.

℥. Ol. amygd. d. rec. penidiar. an. ℥iii. M. F. lambitivum: de quo lambebat singulis diebus sæpè & parum, vacuo tamen stomacho ne impediatur coctio. *Joh. Baptista Montanus consil. 121.*

Raucedine puella diutissimè laboravit, ut vix cum loquebatur, intelligeretur; varia cum frustra tentasset, tandem hoc remedio sanata fuit.

℥. Succ. liquir. ℥ii. myrrh. ℥i. gummi tragacanth. ℥i. sacch. cand. & penid. an. ℥i. cum affusa aqua ros. F. morselli; teneat



unum in ore; cubitum itura; sinatque sponte dissolvi & cubet in dorso *Felix Platerus*, obs. lib. 1. pag. 216.

24. Syrup. capill. ven. ℥ii. syr. de liquir. ℥i. sperm. ceti ℥i. aqua fœnicul. ℥vi. (forte ℥vi.) M. F. potio pro ii. dosibus matutinis, quæ raucedinem apprimè mitigabit. Postea assumat pilul. de agar. coch. & aur. an. ℥i. cum gr. ii. diatrid. eclegma deinde sequens lambitione per arteriam in thoracem instilletur.


24. Loh. sani & expert. ℥ii. loch. de pino ℥i. sperm. ceti ℥b. cum syr. de liquir. q. s. F. eclegma: substituantur denique trochisci sublinguales.

24. Spec. diatragac. frig. ℥ii. diapapav. dr. i. cum syr. viol. F. massa; ex qua formetur pilulæ ad formam bechicarum: hæc cum Deo raucedinem penitus abigent. *Joh. Nevius*, consil. 81. l. 7. consil. Cratonis, &c.

Vir quidam Nobilis raucedine & erosione amygdalarum propter catarrhum salsum & acrem laborans, *D. Kueffer* & alii cuidam Medico seniori, Medicis celeberrimis, se curandum commisit: ex his *D. Kueffer* suavit, ut ad humores acres revellendos & evacuandos, setaceum fieret: hæc cum alter Medicus, cujus opinionem semper magni fecerat æger, acriter repugnet, & altercatio inter ipsos orta esset, & per menses aliquot perseverasset, mirum in modum adauctus fuit morbus: tandem mortuo seniore Medico *D. Kueffer* iterum ægro applicationem setacei proponit, cumque id sine meo consilio admittere nollet æger, *D. Kueffer*, sic petente ægro, ad me venit, *Lausannam*, ubi cum omnia exposuisset, petiit ut secum *Argentina* me conferrem, ubi prædictum ægrum, ex deplorata raucedine, fœliciter restituiamus: præcipuum autem præsidium, quo post Deum, restitutus fuit, setaceum censendum est cervici adhibitum. *Guilielm. Fabritius Hildanus*, observat. 24. centur. 6.

## SECTIO QUARTA.

### Pro Renis dolore.

24.  L. nardin. ℥v. fol. parietar. rec. ultimatè contrita ibi coq. ambo si-


mul in sartagine; in fine add. croci ℥i. & fiat cataplasma, extend. super pannum, & applica calidè, sedabit dolorem ferè in instanti.

24. Ther. dr. i. dissolv. cum ℥i. aq. milii solis & bibat patiens ter in septimana, est nobile & infallibile remedium. Scribit quoque *Avicenna* theriacam conferre doloribus renum pluribus de causis. *Bartholomæus Montagnana*, consil. 14.

Epoto uno cyhatho ex nostro consilio revisiæ in qua flor. chamæ incocti essent, & expressi, statim miraculi instar ructibus emissis, omnis dolor evanuit. *Petrus Forestus*, observ. 1. lib. 24. De renum morbis.


## SECTIO QUINTA.

### De Renum ulcere.

 *ἄλκος τοῦ νεφρός*, ulcus renum est continui solutio in carnosa substantia contingens, aliquando consequitur abscessus non rectè curatos, ictum vel casum renum vasa disrumpentem. Idem præstat profluentis materiæ acrimonia renes exedens; sed frequentius ac ferè semper a calculo intus coercito producitur, qui vel pondere renem contundit, vel attritu comminuit exeditque, ulceris signa sunt, dolor lumborum gravativus, pus urinæ permixtum: urina, quæ liberè profluit, redditur alba, turbida, lactis sero per similis, quæ tandem quiete sedimentum purulentum mucosumve deponit: si calculus originem dederit, tum urina eruenta sæpè conspicitur, priusquam purulenta evadat.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Renum ulcere cum ardore urinæ.

 Mnium primò medicamentum seq. propinavi.

24. Cass. rec. extract. ℥i. terebinth. el. decies lotæ in aq. viol. ℥i. (terebinthina torreatur, ut pulverisari possit, cum sacch. asperso, & pulv. liquir. F. bolus: quo ter alvum deposuit cum magno juvamine; sanguinem quoque detraxi ex



ito; victus rationem & vite institutum hunc modum ordinavi. Aerem eligat siccum inclinantem, in activis temperam, aut paululum calidum, valde enim idus ardorem urinæ auget, & frigidus e Hippoc. ulceribus mordax; somnum deratum concessimus, & consueti lonorem, cum immodicæ vigiliæ hinc valde obsint, quietem injunximus, & ut omnem delationem, ac efferventem gestationem, maximè quæ sit equo, vitaret, præcepimus; hic enim perpetuum otium (ex *Ætio* decreto) confert, vice autem exercitii, ægrum decumbentem mollior fricare singulis diebus mane convenit; repletiones omnes declinet, alvum molliorem semper habeat clysteribus lenientibus; nihil enim hic præstantius quam ut natura faeces quotidie excernat; & sicuti animi immodici affectus hic locum non habent, ita omnibus renum & vesicæ affectionibus coitus quoque insensibilis; iussimus etiam ne super mollem culcitram plumeam cubaret: nihil edat quod salum, acre, amarum, acetosum, vel nimis dulce aut præpingue sit; oleosa enim hic maximè damnantur; pro cibo imprimis commendavi ptisanæ cremorem, hordeatum avenatum, amygdalatum, & subinde orizam. Est etiam idoneus cibus amyllum ipsum aut similago lota cum lacte cocta: lac quoque ovis permixtum; imò ova gallinarum tepida & mollissima, si edantur, valde proficiunt. Concessi quoque ut oleribus uteretur, sed coctis, malva, intybo, portulaca, lactuca. Summopere commendavi aviculas montanas teneram carnem habentes, & carnem gallinarum, phasianorum, & perdices asinas præcipuè, vel juscula eorundem. Pro potu utendum vino albo adstringenti diluto, aut aqua in qua hordeum torrefactum, & radix liquir. fuerint decocta, vel lac caprillum, ovillum, aut amygdalinum, lactis usus in hoc vitio maximè laudatur, asininum præsertim, quod repurgare & sanare dicitur: quo nos in Domina quadam commodè usi sumus. Secundi meriti equinum est. Postrema laus bubulo & ovillo debetur nam bene alunt, quia pinguiora sunt. Exhibeantur ad 3iv. addita salis mica & mellis exi-

quo. Jejunis datur, nec nisi concocto priore aliud assumi debet; hæc pro victu præscripsimus: has etiam potiones præscripsimus ad dolorem &, humores acutos, sallos, mitigandos & contemperandos.

4. Hord. mund. p. i. lactuc. malv. viol. portulac. intib. an. M. i. sem. 4. frigid. mal. an. 3i. flor. viol. nymphæ an. p. i. sem. papav. alb. dr. ii. jujub. sebest. an. num. 6. F. decoctio in colat. ibi. dissolv. syrup. viol. nymphæ, an. 3i. syrup. cap. ven. papav. an. 3ß. M. F. Apozema. Postea continuo habebat ex decocto malv. cum toto & sem. quatuor. frigid. maj. in sero lactis, adjecto melle rosac. ad deterfionem; ac satis ex mingeat; manebat tamen urina valde feculenta, mucosa & purulenta, & dolor non sedabatur; quare ad majorem deterfionem dedi subinde pilulas ex terebinthina lota cum aqua fœniculi, deinde rursus exsiccata, & super laminam ignitam parum tosta, ut pulverizari posset; ex eo pulvere cum succo liquir. pilulas componebam ad magnitudinem cicæ; tres pro vice sumebat; superbibendo decoctum malvæ antedictum; & iterum dedi cassiam in bolo; pilulas dictas per duas septimanas continuavit, sed cum nondum dolor mitigaretur, æger, desperans de sua salute, radio remediorum affectus, omnia deinceps præsidia relinquere voluit; quare adhortando ut curationem prosequeretur, consului, ut singulis septimanis, semel sumeret 3iii. vel 3ß. cass. rec. extract. cum 3i. troch. alkixengi, & ut omni die sumeret ex sequenti electuario ad magnitudinem castanæ, & immediate superbiberet cyathum unum feri lactis.

4. Sacch. viol. 3iv. Conserv. ros. unius anni 3m. sem. malv. 3ii. sem. papav. alb. 3i. sem. quatuor frig. maj. an. 3i. sem. hyoscyam. alb. 3ii. pulv. liquir. 3ii. gran. alkixengi cum suis vesicis exsiccatis, & subtiliter carpellatorum (ut Pharmacopœorum more loquar.) 3iv. succ. liquir. 3ß. bol. arm. veri, troch. de terra sigill. an. dr. m. cum syrup. capill. ven. & viol. F. electuar. liquidum moderate. Cum his usus esses per septimanam unam, cœpit dolor mitigari, & urina minus mucosa exibat, minusque



ardorem inferens, indies in melius mutabatur. Cum ergo quotidie melius haberet, sero lactis relicto, lacte bubulo utebatur, & unguento rosac. lumbi inungebantur. Postea cum ulcera satis videbantur repurgata (ex eo quod pus cum urina in minori quantitate excernebatur, neque feculentem erat, sed subalbidum, laeve & æquale) ad resiccandum & glutinandum, cum lacte ovillo aut vaccino aliquid boli armeni veri injecimus, & dedimus conservam ros. quibus ad tempus utens, & subinde solo lacte vaccino, rectè deinde habuit. *Petrus Forestus, observ. 37. lib. 24. De Renum Morbis.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Renum ulcere.

**Q**uidam aquæ tepidæ potu & olei communis ante pastum vomitum incitant; quo solo remedio sæpe repetito, referunt hunc affectum curatum fuisse: cum vomitus humores ad renes defluentes revellat & avertat, verum cum à cibo melius vomant *Rondeletius* iubet id à cibo fieri, & ut aquam tepidam bibant cum paucis oleo, simul inungendo os ventriculi oleo lilior. ad ejusdem relaxationem, unde minori molestia vomunt, quod & nos fecimus in rustico quodam Renum ulceratione laborante ex vomitu videbatur levior factus, at iis tantum hæc iubenda sunt, qui facile vomunt, alias enim ea quæ vomitum excitant, ulcus irritant. In fine curationis pro cicatrice inducenda & consolidatione, sumpsit noster Rusticus manè singulis diebus ad quinque pluresve dies ʒss. boli armeni veri cum cyato uno lactis vaccini rec. mulcti. Hoc autem erat unum ex arcanis Præceptoris mei *Elidai*, quo in pauperibus pro renum ulceratione curanda utebatur; quod & ulcus repurgat, & simul consolidat, quo cum quinquies vel circiter sumpisset, ulcus tandem probè consolidatum est. *Petrus Forestus, observ. 38. lib. 24.*

In inveterato renum ulcere quidam consulunt usum decocti sudoriferi: ita *Rondeletius*, post evacuationem utile erit pro-

move re sudores, vel ingressu laconici vel guaiacino cremore, qui movet sudores, ulcera tergit, copiam urinæ minuit: sic in omni ulcere renum & vesicæ iuvat, & hæc quæstio est de apicibus artis. *Guil. Ballonius, conf. 66. lib. 3.*

*Indi* in exulcerationibus renum & vesicæ alcem plantam probe tufam & cum lacte mixtam propinant non sine magno successu, & ægrorum commodo (aliquot dies continue) & ilicò curari *Garcias* affirmat.

Practici solent aliquoties pilulas aloeticas in hoc casu exhibere non sine patientis commodo (ex aloe cum pulvere lumbr. terrestr. & calyb. præparato) per aliquot septimanas. Nonnulli terebinthinam *Venetam* dr. i. pondere cum vitello ovi dissolutam, postea in brodio gallinarum diffusam exhibent sæpius, in aliquot exemplis observatione deprehendi, mercurium dulcem hic multum posse, si primum exhibeatur (iusta dosi aliquoties in septimana, ut bis vel ter pro viribus ægrotantis) ut non tantum impuritates totius corporis, sed imprimis renum eluantur, hinc si succedit spiritus mercurii dulcis, nulla ulceratio refragatur. Spiritus mercurii dulcis est talis.

ʒi. Mercur. sublimati crystallini (non mercurii d.) q. v. tere in pulverem impalpabilem, superfunde in cucurbita non nimis alta opt. spirit. vini abstrahere per alembicum ex cineribus reasfunde destillatum liquorem, ac denuò destilla, perge per cohobiam tamdiu, donec tandem, destillatum spir. vini oleum quodammodo albicans videatur per alembicum transire, quod alio excipulo collige. Super caput mortuum residuum in cucurbita funde alium spiritum vini recentem, procede simili ratione ut antea, donec nempe omnia in oleum seu spiritum albicantem prodierint. Hic spiritus mercurii exulcerationibus renum & vesicæ mirabiliter operatur si ejus guttæ ii. vel iii. quotidie semel atque iterum in aquæ radicib. nymphaeæ equiseti, plantag. exhibeantur. consolidationem tempestivè absolvit quod sequitur.

ʒi. Conserv. ros. part. ii. sem. hyper part. i. M. exhib. quantitate avellana vesper  
in



in fine curæ per aliquot dies. Hoc modo etiam inveteratissimæ exulcerationes tolluntur feliciter. *Ioh. Hartmannus*, pract. Chimiatr. pag. 253.

Succo chalybis quosdam renum & vesicæ ulcere laborantes Summi Dei beneficio curavi. Lotus vino chalybs tenuatus lima, vino dulci potentique immaceratus liquefit. Cochlearium sumunt manè remixta aqua cap. ven. lac asinum etiam confert. *Ioh. Heurnius ad Aphor. 6. sect. 6.*

## SECTIO SEXTA.

*Pro Resolutione crurum à feso dorso.*

**A** Principio parti percussæ tale apponendum est medicamentum.

24. Absinth. virid. M. i. contund. in mortario; adde integrum ovum, i. e. lutum cum albumine sine cortice & agita, atque oleo rosac. M. omnia in mortario, & facto emplastro apponatur loco affecto. Hoc est optimum medicamentum in omnibus contusionibus, quia habet facultatem leviter repellendi, sedandi dolorem, & leviter resolvendi, in eundem usum potest applicari diapalma oleo rosato dissolutum. *Rodericus à Fonseca t. 2. consult. 28.*

## SECTIO SEPTIMA.

*Pro respirationis difficultate cum suffocationis periculo.*

**E**xhibui pulveris croci ʒi. cum vini cretici (vulgò malvatici) duobus cochlearibus, quo assumpto subito restitutus, liberè respiravit ab omni suffocatione liber. *Rembertus Dodoneus, cap. 19. Medicinal. Observ.*

## SECTIO OCTAVA.

*De Rhabarbari elogio & usu.*

**N**on est aliud medicamentum humano corporis ita familiare, sicut Rha quod Barbarum vocant, cujus frequens etiam usus, nihil incommodat prorsus; id si mane masticeatur pondere unius scrupuli.

*Burnet Parte I.*

puli, deinde deglutiat; non tantum alvum ipsam molliorem atque obedientem reddit, sed etiam masticatione caput expurgat, sensus omnes vegetissimos reddit, ventriculum & reliqua membra si quid aliud mirandum in modum corroborat, citra insignem excalefactionem. Materias tam pituitosas, quam biliosas & adustas à corpore ejicit, neque propterea aliquam noxam ex longo ejus usu corpori affert, sicut reliquæ faciunt medicinæ. Est enim omni ex parte medicina tutissima, & nullius prorsus nocuenti. Dentes etiam, præter alias utilitates, ab omni putredine & nigredine conservat, gingivas solidas reddit, anhelitum commendat, adeoque divinum omnino remedium est. Habeo ex *Montano* Hydropicum quendam facie, ventre, pedibus, atque adeo toto corpore intumuisse, atque in summo fuisse periculo, ita ut plerique de ipsius salute desperarent, is fato nescio quo monitus, cœpit uti Rhabarbaro modicè primum, ex quo subducebatur alvus, & serofitas sine molestia, & optimè habere cœpit; is augebat pondus quotidie, ita ut à drachmis ad uncias deveniret, atque eas devoraret, & tandem integras libras; contigit ut evacuarentur humores noxii, corroborarentur membra, & non tantum hydrope liberatus, atque adeo omnibus pro miraculo habitus est sed membra quoque robustiora exinde facta calor totius corporis optimus, & functiones corporis omnes rediere, vixit sanus & incolumis citra ullam infirmitatem ad primum usque senium: quo tempore à servo sicario vulnus lethale accepit, supervixit tamen, & ex integro coaluit vulnus magna omnium admiratione, & præter expectationem vixit ad ultimum usque senium, tandem interrogatus, quonam pacto tantum corporis robur sibi conciliasset, ut à lethalibus ægitudinibus evaserit, respondit frequenti usu Rhabarbari. *Adolphus Occo. epist. 10. lib. 2. epist. & consil. Cratonis. &c.*

De frequenti usu Rhabarbari, ut liberè tecum agam, vehementer hæreo: non enim te latet *Galenum* plerisque in locis aloem puram senibus damnassee, quod solos biliosos seu tenues succos, qui in senibus minimè abundant, educat, idem quoque



dicere possum de rheo, quod & experientia, & scriptorum auctoritate constat vix solam bilem expurgare. *Hier. Mercurialis, consult. 73.*

## SECTIO NONA.

### De Rheumatismo.

**R**heumatismus affectus est Arthritidi affinitate junctus, in quo non solum articuli (ut in Arthritide) sed etiam totum corpus, media scilicet inter articulos spatia, muscoli nimirum, eorumque membranae, totusque corporis habitus, atrocissimo torquentur dolore. Oritur ab humore seroso summa acrimonia praedito, cum flatibus quandoque conjuncto. Corporis etiam partes internae, ut ventriculus, intestina, uterus, pulmo, rheumaticum hunc affectum aliquando experiuntur.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Rheumatismo.

**J**uvenis quidam laboravit Rheumatismo universali, omnes propemodum corporis articulos infestante, cum febre assidua. Praecipua remedia fuere venesectione decies usurpata, & julepi refrigerantes & incrassantes, quibus bis aut ter accesserunt leves purgationes, tandem malo perseverante exhibitus est bolus ex conserva rosae cum calomel. gr. xx. extract. jalap. gr. vi. tertio quoque die: multa serosa & porracea deiciebat; quo remedio quater usurpato dolores omnino sublati sunt. Tumores oedematosi articulorum praesertim pedum remanentes, emplastris resolventibus & roborantibus discussi sunt. *Lazarus Riverius, cent. 3. observ. 41.*

In alio hic affectus sublatus fuit intra quindecim dies septem venesectionibus in principio celebratis, & aqua papav. rhoad. mane & sero exhibita, remittente vero dolore, purgatus fuit ter pulvere arthritico alternis diebus, *Idem observ. 43. cent. 4.*

## SECTIO DECIMA.

### Pro Rhyade.

**R**hyas est carunculae anguli majoris absumptio vel imminutio, à qua & angulus latior evadit. Fit ab humorib. acribus & erodentib. vel à medicam. catharteticis, pro fistulae lachrymalis curatione adhibitis, cui ut plurimum hic affectus succedit. Curatur sarcoticis & consolidantibus medicamentis, qualia sunt sequentia.

℞. Ros. rubr. p. i. nuc. cupress. myrtill. an. ℥ii. aloes ℥ss. vini austeri ℔i. coq. ad quartam partis consumptionem, hoc decocto abluatur pars frequenter. Vel.

℞. Aloes thuris, an. ℥i. sang. drac. ℥ss. ros. rubr. gran. sumach. an. ℥i. aquae ros. ℔i. bulliant ad quartam partis consumptionem. F. instar collyrii.

Rhyadi opponitur Encanthis, quae est ipsius carunculae immodicum incrementum: oritur à sanguine redundante ad partem translato, & ulcere istius partis non satis maturè exsiccatò. Curatur excedentibus medicamentis, à mitioribus ad potentiora progrediendo, igitur alumen ustum prius admovendum est, quod si non sufficiat, ad unguentum Apostol. vel Aegyptiacum, vel vitriolum ustum progrediendum. Quod si nec haec sufficiant, ferro abscindenda est caruncula, vel cauterio actuali absumendo. *Lazarus Riverius, prax. med. lib. 2. cap. 16.*

## SECTIO UNDECIMA.

### De Rosmari penis viribus.

**R**osmari penis osseus spithamas meas tres aequat, crassus pollices duos, utroque extremo tuberosus & spongiosus. Os pudendi calculosis singulare esse remedium experientia comprobavit. Pulvis quoque ex eodem partum promovet, & secundinam promptè expellit, quod si ex extrema penis spongiosae parte tuberosa & spongiosa sugatur cerevisia stranguriam statim sedare in urbe nostra compertum est. *Thomas Bartholinus, histor. 43. cent. 2.*



## SECTIO DUODECIMA.

## Pro Ructu.

**P**ilularum Iliacarum *Rhasis* singularem facultatem saepius in ructu molestissimo compertam habuimus. *Hispano* cuidam Militi adeo molestus ac difficilis erat assiduus ructus, ut in extremis versari videretur, cum ad eum vocaret. Usus fuerat admodum multis remediis, sed frustra omnibus, huius initio exhibuimus pilulam unam pondere gr. x. per quam vitiosis ac foetidis humoribus nonnullis, expurgatis, melius habere videbatur. Postea paucis diebus interpositis data grana quindecim, tertio verò die quo assumpto & expurgatione pravorum humorum succedente, qui antea lecto affixus veluti moriturus jacuerat, surrexit, & quocunque libuit, ambulavit, & cibum potumque cum appetentia assumpsit. *Rembertus Dodoneus, cap. 36. Medicin. observ.*

In ructibus vulgò commendatur vinum absinthites, sal & spiritus absinthii potiora sunt. Si ructus fuerint foetidi & nidorosi, primum subsidium petitur à vomitu per aquam benedictam cum aqua mentæ & anisi. *Joh. Hartmanus, pract. Chymiatr. pag 174.*

Mercator quidam *Lusitanus* in ructum incidit adeo molestum ac importunum, ut nec momento temporis, vel solus, vel in corona hominum esse posset; quin adstantes ructus violenti sono audito, intèrturbaret. Plurimis frustra usurpatis auxiliis, tandem Ambari usu in merito dissoluti omnino convaluit, hoc potu jejuno ventriculo usus fuit toto anno, assumptis quatuor granis Ambari cum Faler. ni unciis duabus permixti. *Zacutus Lusitanus, prax. Med. admirand. lib. 2. observ. 8.*

## SECTIO DECIMATERTIA.

## De Ruminatione humana.

**C**ondiscipulus quidam meus semper post horæ quadrantem, quando nimirum à mensa surrexeram, regerebat eibum indigestum & exactius comminuebat, voracissimus erat: hinc avidè cibum

serè integrum, vixque præmansum deglutiebat; & post ad rumen more pecudum revocabat, atque ruminatum ventriculo commodius concoquendum reddebat. *Philippus Salmuthus, observ. 100. cent. 1.*

In Crenobio *D. Iustina Patavii*, Monachus quidam cum voluptate cibos ruminavit. *Io. Minadous*, cæterique primi nominis Medici brutorum more gemino ventriculo præditum putabant, ipso morte sua defuncto, *Franciscus Plazzonus* Antistite ac *Minadoo* præsentibus æsophagum reperit undiquaque carnosum instar muscoli, reliquis universi corporis partibus se rectè habentibus. *Jo. Rhodius, observat. 59. centur. 2.*

Nobilis quidam *Patavinus* nullo non tempore ab assumpto cibo circiter horam plus minus cibum in os attrahere & rursus mandere ruminareque cogeatur, ita quidem ut hæc actio minime de suo arbitrio nutuque dependerit, sed vel invitum ad ruminandum impulsus fuerit, ab insigni quadam oblectatione, qua, ut ipse fatebatur ruminandi cibum tenebatur. Dicebat præterea, omnem cibum, sive solidum, sive mollem, se semper ruminare, & dum assumebat, deglutire absque ullo fere dentium officio, quamvis dentes soritus esset in utraque maxilla, ut alii homines: & os aliquanto latius ac gulam, propter quam causam Literam S. agrè proferre potuerat, sibi insuper videbatur quasi bolum quendam intra os continere, quod expeditam illi locutionem impediret; cujusmodi serè boli, sed deglutionem remorantis, exemplum habet incomparabilis ille Philosophus & Medicus Felicissimus *D. laterus lib. 1. observat. Titulo De Doloze Cordis*. Huic tamen Nobili ruminatio, motusque maxillæ ad latera longè mitior obtigerat ac cæteris. Cum agrotabat, nequaquam ruminabat; sed ab omni ruminatione tunc temporis cessabat, ut boves quoque faciunt, cum agrotant, quod tanquam signum morbi illorum infallibile tenent Rustici. Post ipsius obitum aperto cadavere, inventus est ventriculus ingentis magnitudinis, & interna superficie valde asper, hæc historia ab *Aquapendente* proponitur, qui etiam subdit patrem hujus Nobilis paulò supra frontem in



capite corniculum durissimum crassitie digiti manus minimi, longitudine verò olivæ *Hispanice* habuisse insculptum & extuberans, substantiæ ungui per simile, ex qua ille conjecturam facit, parentis semen ali-

quam habuisse affinitatem cum cornigeris animalibus, neque mirum fuisse, genitum filium simile quid à Parente contraxisse. *Ioh. Burgavuer, epist. ad Horst. pro observat. 9. lib. 4. observat. Gregorii Horstii.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER DECIMUS SEXTUS.

*De Affectibus à littera S incipientibus.*

### S E C T I O P R I M A.

*Pro Salacitate.*



**A**D imminuendam sanguinis copiam, evacuato corpore, phlebotomiam in cubito dextri brachii institui: mox pro calore totius, & imprimis vasorum seminalium, restringendo refrigerantia, quædam præscripsi. ℞. Aq. nymphæ, lactuc. portulac. endiv. ℥i. aceti ros. ℥i. sacch. albi. ℥ii. M. bibat singulis matutinis cyathum unum vel duos. Vesperis emulsiões 4. sem. frigidæ cum aquis modo descriptis extractas exhibui. Extra etiam topica quædam refrigerantia renum & lumborum regioni applicui.

℞. Unguent. refriger. *Gal. 3v. mucilag. sem. psyll. cum aq. lactuc. extract. 3℔. ok. viol. nymphæ an. ℥ii. sacch. saturni ℥ii. ceræ alb. q. s. M. fiat unguentum.* Dietam commendavi tenuem & sobriam, præscriptis aromatibus, cibisque calidis & acribus, raphano imprimis, porro, cepis, alio, sinapi, rapis, pastinaca, ovis, lactuciniis, ejusmodi venerem stimulantibus edulis. Cerevisiam bibat secundariam, vel quod melius aquam: *Sine Cerere hamque & Baccho friget Venus.* Hisce aliisque id genus non proficientibus, in mentem venit, quod olim *Patavii* ab Excellentissimo *Prætorio* audieram, Nephriticum quendam à diuturno nitri præparati usu à renum calculo perfectè liberatum, sed postea ad rem

veneream prorsus inhabilem redditum. Feci periculum, & singulis matutinis & vespertinis nitrum in aqua nymphææ solutum exhibui, cujus usu diebus circiter 30. continuato adeò deferbuit, ut uxori vix sufficeret. Dignus sanè qui *Messalina* temporibus vixisset. *Baldassar Timæus. Cas. 52. lib. 3.*

### SECTIO SECUNDA.

*Pro sanguine compescendo è venis sub lingua sectis.*

**V**ir, cui sub lingua venæ sectæ sunt, valde angustiabatur, quòd ex iis multus fluebat sanguis, nec pro eo compescendo remedium habebatur. Cæterum post multa hinc inde petita, sed frustra, jussum fuit, ut agrotus acerrimum acetum ore teneret, & aliquoties id repeteret: quod ita contulit, ut illicò sanguis constrictus fuerit, & venæ ipsæ aggrutinatæ. *Amatus Lusitanus, curat. 5. cent. 7.*

### SECTIO TERTIA.

*De Sanguinis fluxu ex poro.*

**N**Ovi hominem robustum admodum, qui sæpe mecum conquestus est de certo sanguinis fluxu, quo singulo quo-



quoque mense graviter affligeretur, interroganti mihi qua parte corporis fluere, id se nescire respondit, admiratus hominis verbum; detege, inquam, locum unde fluat, deposito pallio illea dextra ostendit, ubi subiacet jecoris pars ima, diligenter locum oculis lustro, si foramen aut cicatrix in parte sit: omnia æquabiliter posita, levem & mollem carnem, nullam asperitudinem cicatricisve notam inspicio, ab homine decipi suspicor, quod ille advertens, paucis, inquit, diebus hunc tibi scrupulum demam; instat enim tempus quo sanguinis fluere consuevit, reversus perendie uno superposito digito locum fluxus contegebat; quo amoto, non secus emanavit sanguis, ac si ex incisa vena proflueret, nec prius fluor ille cessabat, quam sanguinis libra emitteretur, quo evacuato, nullus discernere poterat, unde evacuatio facta esset; existimabam venulam foraminibus cutis sua cervice inhærescere, indeque statim tempore sanguinem evacuari. Curavi itaque hominem sola sanguinis missione ex vena jecoris singulo quoque mense, curiosoque victu iniuncto, protracta cura est ad sextum usque mensem, & tandem convaleuit. *Antonius Benevenius, cap. 4. De abditis morborum & sanationum causis.*

Simile exemplum & inter rara *Iacobi Helzerii* habetur. Novimus, inquit, quendam cui è regione hepatis, vena per intervalla dehiscerebat, quæ sanguinem funderet, restante sanguine vestigium non aparebat. *Rembertus Dadonius* annotat. ad cap. 4. *Libri Benevenii.*

## SECTIO QUARTA.

### De Sanguinis sputo.

**V**idesupra lib. 8. sect. 1. De Hemoptoe.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Sanguinis sputo.

**N**os ad constrictionem dedimus lapidis hamatitidis curiosè lævigati & in pulverem tenuissimum redacti ℥ii. cum

aqua sola tepida, & egregie contulit. Hoc enim modo *Trallianus* dabat iis in quibus sanguis copiosè non evacuabatur; alioqui in his qui largius sanguinem reiciebant, cum succo mali punici, vel succo polygoni dabat. Exhibuit etiam hunc lapidem iis qui pus expuere inceperant; ac mirum est, quomodo ulcus exsiccarit sanaveritque, & ideo in catarrho acri corrodente utebatur. Alterum etiam asperam arteriam expuentem hic lapis curavit, ipso *Tralliano* non admodum sperante. Nos verò hunc lapidem contritum in tenuissimum pollinem cum aqua plantag. vel bursæ pastor. sæpè transfusum, & deinde colatum, ut aqua rubedinem acquireret, accepimus, immixto syrupo portulacæ vel myrtillac. ita ad sanguinis sputum commodè exhibuimus. *Petrus Forestus, observ. 17. lib. 16. De pectoris & pulmonis morbis.*

Cuidam valde tussienti, cum sputum sanguinis redderet, post venam sectam ad ℥iv. imperavimus, ut paulatim lambendo hunc linctum deglutiret: quod egregie profuit.

℥. Conserv. ros. antiq. elect. diatragac. frig. an. ℥i℥. bol. armen. ver. cum aq. ros. lot. ℥iii. amyli. ℥ii. excipiantur cum syrup. iuiubino & myrteo, & fiat eclegma. Multis etiam profuit ℥i. philonii perfici cum aqua plantag. & portulac. ante cibum propinata, uti & ius frigidum decoctorum iuiuborum in quo candens ferrum extinctum fuerit, omnia actu frigida sumenda. *Petrus Forestus, obs. 11. lib. 16.*

Cuidam ex casu sanguinis sputo laboranti, post venam sectam, statim sequentem potum propinavi.

℥. Mummiæ ℥i. rhab. torrefact. bol. armen. spod. terr. sigill. an. ℥℥. syrup. cydonior. ℥℥. aqu. plantag. ℥ii. M. Hanc potionem commendabat unicè *Guainerius* in sputo sanguinis ex casu. *Idem observ. 13. lib. 16.*

Ad quendam accitus sanguinis sputo ex casu è scala laborantem illicò quod sequitur exhibui.

℥. Mummiæ spermat. ceti, an. ℥℥. decocti pectoral. ℥iv. mell. rosac. oxymel. S. an. ℥℥. pauco adiecto butyro, F. Portio. Vena statim secta fuit in brachio, pectu.



pectusque inunctum oleo rosac. & myrteo, & sic sanitati restitutus fuit. *Petrus Forestus, observ. 15. lib. 16.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Sanguinis sputo.

**F**iat sibi appropriatus hic Pulvis.

℞. Troch. de carabe & de terra sigillat. an. ℥ss. mummiæ, boli armen. sang. drac. an. ℥m. gummi arab. tragacanth. torrefact. an. ℥i. F. pulvis Sumatur ℥i. cum aq. plantag. & portulac.

℞. Aqu. plantag. ℥iii. aqu. ros. ℥i. mivæ cydon. ℥i. M. F. iulepus. Capiat pluribus diebus.

℞. Margarit. perforat. corall. rub. hæmatitid. sem. portulac. glutin. piscium. an. ℥i. troch. de carabe ℥ss. cum melle viol. F. pilulæ ex ℥i. ix. de quibus capiat tres duabus horis post assumptionem potus prædicti. *Barthol. Montagnana, cons. 104. & 112.*

Medicamenta quæ hoc tempore mihi videntur opportuna ad sanguinis grumos dissipandos, ejusque vitiosum motum emendandum, dirigantur oportet, idcirco continua oris collutio ex posca, ejusdemq; potus veluti pitifando factus, itemq; coagulatum leporinum ex eadem posca cum saccharo ad lambendum exhibitum pro grumis dissolvendis probantur. Simulque eodem tempore rhabarbarum cum aqua viol. irroratum, & postea dilutum cum decocto myrobolan. citrin. sem. plantag. acetos. tamarind. ac passul. Propinatum mihi maximè placet. Deinde pro opprimendo sanguine, præter philonium persicum cum conserv. viol. mihi sunt in usu, primo pulvis testæ ovi è quo pullus exierit, ex aqua plantag. datus. Secundo, succus plantag. vel per se, vel cum sero chalybeato bibitus. Tertiò, Medicamentum quod fit ex ℥ii. sacch. viol. & ℥ss. sem. hyoscyami alb. datum ad ℥i. vel ℥ii. Plurimum etiam ad suppressendum sanguinem conducet immergere scrotum in gelidam. Maximus est enim consensus inter spiritualia, & genitalia membra. *Jul. Cesar Claudinus, cons. 114.*

Prælarè hic præbetur decoctum rad.

consolid. maj. ex lacte & pulv. hæmatitid. corall. boli, sem. hyoscyami, sem. papav. cum conserva ros. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 13. sect. 5.*

℞. Conserv. ros. ℥iii. conserv. beton. ℥i. boli armen. dr. ii. sem. hyoscyam. alb. ℥i. syrup. de ros. rub. sicc. q. s. F. electuar. cujus ℥ss. exhibeatur vesperi hora somni. Diacodion. in rotulis cum bolo arm. in ore assidue detineatur. *Ioh. Zecchini, consult. 34.*

Primo die venam cubiti dextram secare jussi, deinde subsequentem syrupum quater exhibui.

℞. Fol. plantag. centinod. burs. pastor. an. M. i. m. sem. plantag. papav. alb. lactuc. an. ℥iii. decoq. in f. q. aqu. ad tertias, incolat. ibi. dissolv. syrup. papav. alb. & myrtin. an. ℥ii. M. pro quatuor vicibus. Dum uteretur syrupis, de sequenti quoque electuario ad castaneæ quantitatem vesperi se cubitum conferens, assumpsit, & post usum syrup. tempore matutino tantundem etiam sumpsit, & spatio septem dierum convaleuit.

℞. Sacch. ros. ℥ii. sem. papav. alb. & hyoscyam. an. ℥ss. pulv. boli arm. corall. rubr. an. ℥iii. opii ℥ss. cum syrup. myrtin. q. s. F. electuar. *Abrahamus Seyllerus cons. 15. l. 6. cons. Cratonis & aliorum Medicor. à Schoetizio editorum.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Sanguinis sputo.

**A**ntiqui omnes ad sistendum sanguinem proponunt portorum succum tanquam experimentum probatum. Ego scio aquam stillaticiam eorum & hyperic. & pimpinellæ certò sanguinis profluvium cohibuisse; & hoc pro arcano teneri à summo quodam Italia Principe. Medicus etiam summus experimenti conterraneus noster, in sua Empirica, tradit pro certò aquam cyclaminis id virium habere, si ad ℥iii. vel iv. aquæ exhibeantur. *Christophorus Guarinnus, consult. 482.*

Ad sputum & vomitum sanguinis plurimum valet hic syrupus.

℞. Fol. virid. plantag. M. xii. rad. consolid. maj. ℥vi. utriusque seorsim exprima-

tur



tur succus, tum misceantur, & cum sacch. q. s. F. syrupus, S. A. D. *Robertus Boyle*, tractat. De utilitate Philos. Experim. part. 2. sect. 5. cap. 6.

Ut præservetur à Iputo sanguinis, primum omnium abrafo diligenter capite futuræ coronali vesicatorium adhibendum est, & octavo quoque die innovandum per mensem unum cum dimidio; serosos & acres humoris è cerebro defluentes in pulmonum substantiam hac ratione citra incommodum revellemus: interim bilis vacuando levibus cholagogis. Saccharum præterea rosac. post cœnam sumptum opitulabitur, si ipso ad multos menses obstinate utatur; ad acres humores in toto corpore contemperandos lac asininum valde accommodatum est præsidium. Summat 3v. recenter munctum hora matutina addito saccharo; ne aut in grumos vertatur, aut in qualitatem nidorofam aut acidiam. Caterum pro humoribus, si quid remanserunt, è thorace detergendis, atque pro pulmonibus præservandis, ne rursus in eundem incidant affectum, hæc judicantur præstantissima. Syrupus ex symphyto & pulmonaria hoc modo præpar.

℞. Rad. & cimarum consolid. maj. & min. an. M. iv. fol. pulmonar. M. iii. ros. rubr. plantag. pimpinell. polygon. scabios. tussilag. an. M. ii. è tufis omnibus recentibus exprimatur succus; coq. ad lbiii. & addendo sacch. fini lbiiß. F. Syrupus Hic enim blandè malos omnes humores detergit in pulmonibus existentes citra metum erupturi sanguinis sæpe lambendo sumendus est. Efficax præterea ea conditum ex conservæ rosac. & symphyt. an. 3ß. troch. de carabe, de terra sigill. an. ʒi. corall. & margar. elect. an. ʒß. cum syrup. supraddito, aut myrtino F. conditum, sumendum cochl. i. pro vice hora una ante cibum. *Horatius Augenius*, to. 2. l. 3. epi. 1.

Vim adstringendi & sanguinem sistendi salviæ inesse; cum aliis experimentis demonstrabat *Veslingius* in Horto Patavino, Plantarum vires spectantibus exponens, tum maxime hoc suosputum sanguinis eadem herba cum melle exhibita sanatum testabatur, remedio ex *Ætio* desumpto: apud quem, *Tetrab. 1. Sermon. 1. Orpheus*, dato, inquit, sanguinem expuentibus suc-

ci salviæ cyathos ii. jejunis cum melle bibendos & sanguis ilicò cohibebitur. Est autem hic *Orpheus* teste *Plinio*, primis qui inter *Grecos* de Herbis scripserat. Cui addamus experimentum *Andrea Schilingii* Professoris olim *Argentinenfis* Celeberrimi, qui Phthysicos sæpius lacte caprillo salviato cum visco querno aliisque pneumonicis mixto insigniter levatos adnotavit. *Georgius Hieron. Velschius*, observ. 37.

Succus Salicis bibitus stringit fluxum sanguinis jejuno stomacho. Similiter facit gummi ejus; bombax ejus qui crescit quando florescit, sistit etiam fluxum sanguinis. *Marcellus Cumanus* obs. 37.

## SECTIO QUINTA.

### De Scabie.

*Scabies*, est aspreo quædam cutis, seu ejusdem levis exulcerario pruriens, ac interdum rodens ex humidior quavis pustula, sive pallida, sive nigra, cum calore & dolore orta; quæ rupta ulcusculum in cute ostendit humidum, aut etiam sanie purgata interdum aridum. Hujus causa necessario debet esse humor crassus, falsus, acris & mordax. Nullus enim alius ad cutem protrusus, symptomata qualia in scabie videntur, producere potest. Talis autem est tum atrabilis, tum pituita falsa, quibus sanguis corruptus ut plurimum commiscetur. Ejus generationi favent tibi pravi, succi acres, falsi, & facile corruptibiles, intemperies etiam viscerum calida & sicca; ut & victus incontinentia, corporis immundities: aliquando generatur criticè post quosunque morbos; alia est recens, alia inveterata; alia totum corpus occupans. alia saltem manus & crura: alia est ab humore atrabilario, quæ sicca, alia à pituita falsa, quæ humida appellatur. Notissimus est affectus, nec ullis signis ut dignoscatur indiget; magis ob turpitudinem molestat, quam ob aliquod imminens periculum; e contra, à plurimis sæpe perservat morbis: periculo non semper vacat; in senibus contumax est, & curatur difficilis diuturnus. in lepram migrare potest. Sicca quam humida ægrius curatur.



## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Scabie.

**P**ost lenitionem ex cassia, sanguinis missionem, per aliquot dies modo semel, modo bis in die sumebat haustum ex sequenti decocto.

℥. Fumiterr. virid. M. iii. scabios viol. summitat. lupul. absinth. endiv. cichor. cum toto, borrh. bugl. acetos. agrim. dent. leon. scolop. cap. ven. an. M. i. cort. rad. fœnic. apii, liquir. an. ℥ss. sem. quatuor frigid. maj. & min. an. ℥ss. sem. anis. ℥i. fol. fen. ℥i. epithymi & polipod. q. an. ℥iii. Helleb. nigr. ℥ss. Uvar. passar. exacinat. hord. mund. an. p. i. prunor. num. i. cicer rubr. ℥i. F. omnium decoctio in sero lactis pro libii. colatura sacch. dulcoretur. Sed & hæc puppa pendebat in decoctione, exprimentum dum potio sumeretur.

℥. Rhei, myrobal. omnium, an. ℥i. spic. schœnanth. an. gr. v. F. pulpa membræ scabiosa omnia linimento sequenti inungebat.

℥. Succ. fumiterr. lapath. acut. succ. plant. acet. an. ℥ss. terebinth. lotæ in aqua aquiseti ℥i. lithargyr. argent. ℥i. ceruss. ℥ss. pingued. porc. but. rec. an. ℥ss. ol. ros. q. s. F. linimentum S. A. & his hic vir curatus fuit; ceterum hujus uxor cum simul quoque eadem scabie inficeretur, & supradictis præfidiis illam curare non poteramus; tandem hoc unguentum contra scabiem transmissum est, quo innumeri curati dicebantur, cujus hæc est descriptio.

℥. Rad. lapath. acut. in mortar. pisti, M. i. pulv. zinz. ℥i. bacc. lauri, arist. rot. an. ℥ss. cum pinta dimidia cremoris lactis, coquantur per horam dimidiam in olla nova, & redigantur in unguentum. Vesperi eo se inungebat apud ignem: cum isto unguento omnia loca scabiosa inunxisset, integrè ab omni scabie liberata est, cum antea curari nullis unguentis potuisset: & hoc solo unguento sanata est, quo & infinitos alios subinde curavi; quare & hoc ipsum inter arcana remedia mea pono. *Petrus Forestus, observ. 10. lib. 5. Observ. Chirurg.*

Juvenula quædam sexdecim annorum cum novem annis scabie infecta fuisset, nec ullis remediis curari posset, ad me

tandem consilii causa venit; huic sæpius decocta sanguinem purificantia præscripsimus, quæ conficiebantur ex borrh. bugl. acetos. & similibus in sero lactis decoctis. Deinde corpore rite expurgato, eam nudam per horam in balneo sequenti posuimus, idque quinque diebus continuando.

℥. Lapat. acut. cum rad. fumar. malv. scabios. viol. hædere arbor. surfur. opt. sal. communis, an. M. ii. coq. in aq. communi pro lavacro facta abstersione totius corporis, lectum calidum intrabat & sudabat; sic materia sufficienter ad cutem propulsa, tunc tandem eam inunximus unguento ad scabiem in præcedenti observ. descripto; eo cum aliquandiu inuncta fuisset à fœda scabie curata est. *Petrus Forestus, observ. 11. lib. 5. Observ. Chirurg.*

Quendam scabie & pruritu totum corpus fœdante laborantem ita sanitati restitui.

℥. Decocti senæ ℥iv. Confect. hamec. ℥. vi. M. F. potio; quæ rectè & copiosè expurgatus est. Postea venam brachii aperuit, multumque sanguinis emisit.

A sanguinis missione septimo die tale ipsi ordinabam balneum.

℥. Alumin. ℥v. salpetræ ℥iii. sulphur. vivi ℥ii. redigantur in pulverem; qui coquebatur in aqua fluviali liquantia sufficit; tertio quoque die renovatur, balneabat mane & vesperi, & intra viginti dies ab ista fœda lue & symptomatibus liber sanusque evasit. Potus erat decoctum mellissæ saccharatum. *Martinus Rulandus, curat. 80. cent. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Scabie.

**P**ost purgationem.

℥. Rad. lapath. cum fol. num. 3. hord. cum cortice suo, p. ii. radic. alth. ℥. ii. fol. malv. M. ii. radic. helleb. nigr. ℥i. bulliant omnia simul aq. s. q. ad dimidiæ partis consumptionem. Deinde fiat fortis expressio, colaturæ adde ol. ros. ℥iii. terebinth. ℥ii. sal. nitr. ℥. m. bulliant omnia ad aq. consumpt. deinde addantur succi limon. ℥vi. removeanturque ab igne; dumque incipit refrigerari, adde vitell. ov. or. num.



num. 4. conservetur postea in vase mundo & bene cooperto, & illinet loca scabiosa omnia, scalpando prius apud ignem, & sic fiat alternis diebus vesperi ante introitum lecti, septem vicibus; ultimo ingrediarur baln. & mundificetur totum corpus, postea mutet vestes & Chirothecas. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 372*

℞. Resinæ terebinth. lota ℥ii. butyr. rec. ℥i. sal. ℥iii. ol. rosac. costin. sulphur. vivi, an. ℥v. ovor. lintea ii. M. F. linimentum. Hoc linimentum multum profuit. Postea sequens pro absterfione institutum.

℞. Sulphur. vivi ℥ii. bacc. lauri ℥i. baccar. juniper. ℥v. sal. ℥iii. contund. omnia & ligentur in petia & imponentur in olla recondita, & sic aliquantulum bulliant. Postea accipiat illa petia, & cum ea fricetur corpus, quando vadit dormitum, seu singulis noctibus, seu alternis. *Ioh. Baptista Montanus, consil. 376.*

Inter topica remedia scabiei convenientia, hoc primatum obtinere tanquam expertus confirmo, quod habet.

℞. Rad. enul. campan. virid. lb. m. pingued. porc. ℥v. in mortar. marmoreo pistentur, & ad lentum ignem parum bulliant, & F. unguentum, quo ager pustulas inungat; est enim admirandæ virtutis unguentum hoc, ut incantamento ejus opus simile videatur; cujus vires si expertus fueris, nobis consenties. *Amatus Lusitanus, cent. 2. curat. 98.*

Quam primum sanguis copiosè per seclatam venam in cubito, non quidem unica vice, sed repetitis vicibus educatur: cuti tum hirudines, tum cucurbitulæ parvæ seu corniculi dicti (quod magis probo) numerosi tamen appliciti mihi quam maximè arrident; sicuti & fonticuli in brachiis & femoribus inusti non improbantur. Purgetur deinde cum infuso hellebori nigri, agar. troch. & sen. cum syr. de polipod. Demum in partes vocetur medicamentum quod & autoritate gravissimorum virorum, & experientia ipsa est præstantissimum, & me nunquam in similibus casibus fefellit. Est autem piloselle decoctum ad quadraginta dies ebibitum; sal quoque theriacale in conserva borag. assumptum mihi non displicet; quod scio

etiam cum fructu alias ab egregio patiente assumptum fuisse. Quod ad externa, unguentum quod mihi in scabie serina atque contumaci est in usu proficuo non subicebo; quod ita se habet.

℞. Alumin. troch. usti, chalcant. usti, an. ℥v. Aristol. rot. virid. aris, an. ℥ii. picis naval. ℥ii. ping. anatis ℥v. Succ. enule ℥i ol. ros. compl. butyr. antiq. an. ℥ii. M. & F. unguentum. S. A. Probo item medicamentum quod conficitur ex sulphur. succo tabaci, unguento rosac. oleo tartari & camphora; & cum *Avicenna* ad inunctionem ex hydrargiro ascendere non abhorrerem. *Iul. Casar. Claudinus, consult. 47.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### Pro Scabie.

**Q**uidam scabie vulgari in manibus & pedibus infestatis, sic curatus fuit. Sumpsit primum purgans sequens.

℞. Cathol. ℥ß. Contect. hamec. ℥ii. Syr. de fumar. ℥i. cum aq. fumar. & endiv. an. ℥iii. M. F. Potio sequenti die secta fuit vena brachii. Deinde apozemate hoc usus est.

℞. Rad. liquir. ℥ii. rad. lapath (quod Rhab. monach. vocant) ℥iß. rad. polipod. ℥ii. cort. tamarisc. ℥ß. fol. endiv. mercurial. fumar. summitat. lupul. an. M. i. flor. borag. scabios. an. p. i. passul. paria x. prunor. num. 10. epithymi ℥ß. sen. ℥iii. sem. cartham. contus. ℥i. sem. anis. scenic. an. ℥ii. F. omnium decoctio in colat. q. s. pro iv. vel v. vicibus adde sacch. q. s. aromatiz. ℥ii. cinnam. absoluto apozemate adhuc semel purgetur sequenti potione.

℞. Rad. liquir. polipod. an. ℥vi. sen. ℥ß. sem. anis. ℥i. flor. cordial. p. i. F. decoctio in colat. ℥v. infund. rhei ℥iv. Agar. ℥i. Spic. zinzib. an. ℥i. F. expressio dissolv. syr. ros. solut. ℥iß. F. Potio. Absoluta purgatione, capiat cubitum iturus mithrid. ℥i. Vel,

℞. Conserv. cichor. bugl. ros. an. ℥i. spec. triosantal. ℥i. cum syrup. de endiv. F. elect. superbibat semper aquam fumar. & acetos. sumat electuar. alternis diebus quod intemperiem sanguinis contemperabit. Balneo dein hoc utatur.

℞. Rad.



## SUBSECTIO QUARTA.

## Pro Scabie.

24. Rad. bryon. lapath. acut. sol. scabios. malv. mercurial. parietar. viol. hederæ, fallicum, an. M. ii. decoq. in aq. pluvial. adde aquæ extinctionis ferri, & lixivii, an. mensur. aliquot tartar. ℥ii. sulph. ℥i. sal. M. i. ut. F. balneum in quo sedeat per horas duas in die; dein in lecto se siccet à balneo ungatur ita.

24. Ol. ros. viol. an. ℥ii. succ. lapath. acut. & plantag. an. ℥i. aceti ℥ß. but. rec. ℥ß. coq. ad succ. consumptionem; adde litharg. ℥iii. rad. serpentar. ℥i. sulphur. ℥ii. ceræ q. f. F. unguentum; restitutus, mox fuit. *Felix Platerus observ. lib. 2. pag. 534.*

Adolescens quidam sæda scabie torquebatur à qua liberari nequiverat venæ sectionibus & purgationibus multis intra sex menses per intervalla usurpatis: tandem ei exhibetur merc. d. ℥i. cum diagrid. ℥ß. quibus optimè purgatus est, & à scæda illa scabie intra paucos dies liberatus, *Lazarus Riverius, observ. 26. cent. 1.*

Quidam Empiricus decocto stibii calcinat. cum sarsaparilla additis etiam aliis, perniciosas sanabat scabies. *Platerus, pract. tom. 2. cap. 17. pag. 767.*

Certissima experientia comprobatum est ad omnia genera scabiei in capitibus infantium, plurimum opitulari camphoram si super ferrum candens aduratur, & in pulverem redigatur, & scabiei inspergatur, aut cum pinguedine veteri suilla commisceatur, & caput inungatur. *Franciscus Joel, pract. lib. 9. sect. 2.*

Nihil vilius detritis calceis. Novi tamen puerum *Melitemsem* toto corpore crustis fedis oblitum, qui asperso cinere combusti corii calceorum cum oleo rosæ, convaluit. *Thomas Bartholinus, Histor. 73. cent. 6.*

Ad magnam illam scabiem quæ in tibiis excutitur, post morbos longos, & præcipuè febrem quartanam, doloribus favissimis inunctam nihil inventi in tota medicina efficacius quàm sequens unguentum.

24. Unguenti basilici ℥iv. terebinth. ℥ii. olei ros. ℥iv. vitell. ovorum numero 3. ceræ tantillum, F. unguentum, quo inungantur partes scabie laborantes. *Petrus Pacheguns, observat. 35.*

**Q**uidam Scabie perpetua sicca illa quæ perpetuo pruritu vexat, mirum in modum vexabatur dies ac noctes, somnum capere non poterat, cibum respuebat, vertigine tentabatur identidem. *Cracovienses* quidam Medici aliquot annis hominem variis medicamentis (alioqui macrum, siccum & melancholicum) excarnificaverunt. Fuit qui sarsamparillam, deinde chinæ radicem aliàs guajacum præberet: denique hydrargyro unctus fuit: sed hæc frustra omnia, non potuit morbus his armis propulsari; tandem consilio *Italia* cujusdam *Iob. Pedemontani*, qui tum in *Dacio* ei, qui nunc *Polorum* Rex est, ministrabat, ad Antimonii grana iv. deventum est. Quid multa Morbus tam diuturnus, tam pertinax paucis mensibus depulsus est; jam sex anni abierunt, etiam nunc benè valet. Addam hoc quoque quod mihi magis mirum videtur; is quem dixi *Pedemontanus*, jam à quindecim annis singulis ferè mensibus decem, duodecim, quatuordecim, cum lubet & necesse esse putat, grana ebibit; morbosum se fuisse antea ait, post usum stibii rectè semper valuisse; itaque magis ut imminetibus morbis obviam eat, quàm ut præsentem aliquem curet, stibio se tam frequenter uti affirmat. *Andreas Dudithius, epist. 17. lib. 6. consil. & epist. Cratonis & aliorum à Scholtzio editorum.*

24. Olei glandis unguentar. ℥iii. spiritus salis ℥ß. mosch. vel zibeth. gr. ii. ceræ q. f. F. unguentum, quo faciliè & jucundè (cum bonum spiret odorem) scabies curabitur. Pauperes & milites illam mirè fugabunt sola saponis nigri lotionem, at non diu cuti inhaerere debet, sed citò abluendus ne cutem excoriet. Decoctio malvarum cum alumine ad libitum est etiam optima ad scabies curandas, si ter ea corpus abluatur tepidè. *Petrus Borellus, obs. 7. cent. 2.*

Præmissis universalibus, partes exulceratas manè & serò inungendas curavi unguento meo contra scabiem, & certissimo, infallibili hujus morbi remedio,

24. Pulv. cortic. lauri, sulph. citrin. an.



℥iv. epulæ ℥ii. vitriol. alb. ℥i℥. styrac. liquid. q. s. M. F. unguentum. *Baldassar Timæus, Cas. 16. lib. 6.*

Ut scabies facile decidat, præsertim à corporibus delicatis, ʒ. Herb. fumar. senæ, lapath. an. p. i. helleb. nigr. ℥i. in aq. q. s. infundantur & bulliant parum. Hoc decocto scabies lavetur. Postea absterfo corpore, hoc linimento inunge, & brevi decideret.

ʒ. Ol. communis ℥ii. aceti ℥℥. sulph. in pulv. redact. & lineo panno excepti ℥i. bulliant omnia ad aceti consumptionem. Hoc linteo continente sulphur scabie inunge, & facile decideret, etiam non præcedente herbarum lavacro, opus brevi consequeris, si ter quaterve in die scabiem illines *Amatus Lusitan. cur. 89. cent. 5.*

Præmissis universalibus, sedeat in decoctione ex gypso, quod certè est præstantissimum ad omnem scabiem. Mollit enim, quod apparet ex eorum manibus qui gypsum tractant, non enim exasperat, ut calx, sed propter sulphur lenit. Utatur item sequenti unguento.

ʒ. Express. succ. plantag. lapath. an. semipoculum; lithargyr. coch. ii. sulph. gypsi an. cochl. i. butyri parùm loti cum aqu. cochl. iii. terebinth. agitata cum butyro mediam portionem ad omnia. F. unguentum s. a. *Felix Platerus apud Ioh. Scroterum, consil. 115.*

## SECTIO SEXTA.

### Pro Scrapularum dolore.

**E**Go autem scio a posteriori experientia doctus, quod oleum de pyrethro & de Euphorbio omnes antiquos Scapularum dolores potenter curant. *Montagnana, consil. 20.*

Emplastrum ex tacamahaca utiliter hic adhibetur. Gummi enim hoc præterquam quod blandè emollit atque per halitum digerit, adstringenti etiam qua pollet facultate mirum in modum partem corroboret. *Ioh. Zechius, consult. 100.*

## SECTIO SEPTIMA.

### De Scyrrho.

**S**cyrrus (Grece Σκίρρο) tumor est præter naturam durus ac renitens, concolor & indolens. Duplex est, unus velut incipiens, in quo digitis presso, inest doloris sensus, alter verò confirmatus & exquisitus, qui omnis doloris omnisque sensus est expertus; ejus causa est crassus viscosusque humor particulæ ita impactus & insertus, ut non nisi ægrè solvi dissiparique possit.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Scyrrho.

**V**iro cuidam Scyrrho legitimo in eretice laboranti victum tenuem & boni succi præscripsimus, sanguinem quoque detraximus. Exhibitis deinde syr. de fumaria de epithymo cum decoctis appropriatis, cum sena humorem melancholicum sæpius purgavimus. Deinde hoc ceratum ut applicaretur mandavimus.

ʒ. Axung. anat. anser. gallin. an. ℥iii. ammoniac. in aceto solut. ℥i. bdell. galban. an. ℥i. dialth. emplastr. de melil. an. ℥℥. bulliant in mucilag. sem. lini, fenugrac. & alth. an. ℥i℥. quoad formam cerati induant. Valent in omnibus scyrrhis & duris tumoribus ex melancholia non naturali grossa, & congelata; quale hoc quoque est ceratum à nobis expertum.

ʒ. Diachyl. alb. gummati dialth. unguenti *Agripp. an. ℥ii. ol. lil. alb. ℥i. pingued. anet. ℥ii. dissolv. & M. ad ignem: addito ammoniac. bdell. & ladani, an. ℥i. dissolut. in aceto. F. ceratum. Fertur & hoc emplastrum expertissimum esse ad resolvendum omnem duritiem in una septimana.*

ʒ. Sem. sinap. sem. urtic. sulph. spuma maris, aristol. bdell. ammoniac. ol. aneth. an. part. æq. cum cera & modico aceti F. emplastrum; at sequens expertum habetur ad scirrhum cancerosum.

ʒ. Tutia ℥ii. antimon. plumbi usti, lithargyr. argenti, an. ℥i. succ. plantag. centinod. solatri, an. ℥℥. bulliant simul omnia ad



ad succor. consumptionem. Deinde conterantur in mortario plumbeo diligenter, quoad colorem fuscum induant. *Petrus Forestus, observatio 3. lib. 4. Observat. Chirurgic.*

Post universalia remedia lapidem molarem candentem accepi, & asperfo aceto, locum, ut sudaret, suffumigavi; postea emplastrum de mucilagin. deinde de ammoniaco commode apposui. *Idem observ. 2. lib. 4. observ. Chirurg.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Scorbuto.

**S**corbutus est prava quædam totius corporis *ααββζζ* à sanguine crudo & ichoroso specifica quadam corruptione infecto ortum ducens, conjunctam habens crurum debilitatem, maculas, gingivas tumidas ac sanguinolentas & dentium laxitatem, ejus causa est crudus & ichorofus sanguis in toto corpore, potissimum tamen in hypochondriis, specifica quadam corruptione peccans. Hoc malum accersunt diætæ vitium & rerum non naturalium vitiosus usus. Incipientis signa sunt, lassitudo spontanea, in inferioribus partibus gravitatis sensus, crurum debilitas, angustia pectoris, & respiratio difficilis: vires fumenti adest in gingivis rubedo & pruritus, facies pallida, pulsus parvus & inæqualis, dentes vacillant: ipsum ingravescentem indicant præter enumerata, gingivarum corruptio, & oris graveolentia, in cruribus maculæ purpureæ & rubræ. Fallit sæpe Scorbuto sub imagine falsa plurium morborum, quos furtim producit quales sunt dolores colici, capitis, paralyces, convulsiones, arthritides, alvi fluxus, & constipationes lipothymix, pleuritides, apoplexiæ, epilepsiæ, hydropes, soporosi affectus, & febres omnis generis.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Scorbuto.

**P**ramissis venæsectione & purgatione hoc decocto utatur.

℥. Cortic. rad. cichor. petrosel. an. ℥ss. scolopendr. cichor. ceterach. beccabung. coclear. fumar. agrimon. absinth. rom. an. M. ss. flor. cordial. an. p. i. sem. anif. ℥i. sen. endiv. agni casti an. ℥ss. uvar. passar. enucleat. p. i. cortic. rad. cappar. ℥iii. F. decoctio in aqua pro ℔i ss. colaturæ adde syrup. sceletyrbici nostri, syrup. de fumar. de endiv. de cichor. cum rheo an. ℥ss. M. F. apozema pro quatuor dosibus: syrup. sceletyrbicus noster conficitur ex succo beccabungæ & cocleariæ cum saccharo. Nul- lum eo præstantius Empiricum in scorbuticis inveni. Gingivæ sanguifluæ abluantur cum decocto plantag. consolid. min. ros. cimarum rubi, beccabung. & coclear. incolat. add. mell. rosat. & rob. diamor. Possunt etiam gingivæ solo succo cochlear. confricari; vel cochlear. & beccabunga coq. cum lacte, & ejus decocto gingivæ sæpe abluantur. Noster verò patiens sola aqua destillata beccabunge & cochlear. sæpe abluens gingivas fuit curatus. *Petrus Forestus, observ. 11. lib. 20. De Lienis Morbis.*

Cum Scorbuto vir quidam ad desperationem diu laborasset, nos eum restitui- mus hoc julepo sæpius exhibito.

℥. Syrup. de sceletyrb. nostri ℥iii. aq. cochl. ℥iv. aq. beccabung. ℥i. M. pro duabus dosibus; fuit sæpe reiteratum, cum continuò fumeret.

Syrupus sceletyrbicus quem nos primùm in usu deduximus, hoc modo parabatur.

℥. Succ. cochlear. beccabung. an. ℔i. sacch. opt. ℔ii. cum ovi albumine depu- retur. Coq. simul & F. syrup. S. A. Cum tanta utilitate hoc nostro syrup. usi sumus, ut etiam nunc à *Brabantinis Medicis & Flandricis* expectatur, ut maximam copiam hujus syrupi pro amicis annuatim confici jubeamus. *Idem observat. 12. & schol. lib. 20. De Morbis Lienis.*

℥. Diasen. dr. vi. mell. rosat. solut. ℥iv. cum decocto sen. fiat Potio, quæ vacuavit humorem melancolicum & pituitosum.

℥. Chalib. præp. & pulv. dr. vi. rhei, agar. troch. sal. tartar. an. dr. ii. spec. diar- rhod. abb. ℥i. pulv. rab. capp. citri, tamarisc. an. dr. i. cum melle ros. F. electuar. ex quo sumat. mane quatuor horis ante ci- bum ℥ii. superbibendo ℥i. vini albi gene- rosi.



rosi. Rodericus à Fónseca, tomo i. consultatio 2.

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Scorbuto.

**F**ol. sen. ℥ii. rheiel. ℥i℥. cortic. hellebor. nigr. ℥℥. ceterach. p. ℥. sem. anis. zedoar. galang. an. ℥i. F. infusio per noctem in f. q. feri lacti. in loco calido, mane ebulliant, in colat. ℥iii. dissolv. syrup. ros. solut. cum rheo ℥i. crem. tartar. ℥i℥. aq. cinnam. ℥i. F. haustus. Præmissio ejusmodi cathartico sapius repetito, properandum erit ad illa media quæ scorbuticam corruptionem alterant, & radicem morbi respiciunt; quam ob causam fiat potu sequens.

℥℥. Herb. cochlear. M. ii. anagall. aq. nasturt. aq. an. M. i. acetos. min. M. m. absinth. sedi min. rutæ, an. p. i. feri lactis caprilli destillati q. s. in mortario marmoreo herbæ recentes contundantur, & exprimatur succus, qui lento igne depuretur, & in vitris benè clausis conservetur.

℥℥. Istius succi ℥iv. syrup. de fumar. ℥i. aq. cinnam. cochlear. i. M. F. haustus. Hic Potus per quatuordecim dies continuetur quotidie bis, non neglectis intermediis evacuationibus, quo non tantum materia peccans attenuetur, sed simul etiam per alvum educatur.

Ulceribus rebellibus prospiciendum erit hoc unguento de apio.

℥℥. Succ. apii, meliss. coclear. an. ℥. m. succ. chelid. maj. ℥v. mellis q. s. coq. & adde pauxillum thuris, myrrhæ & aloes, ut F. unguentum pro mundificandis ulceribus *Gregor. Horstius, ad observat. 35. lib. 7. De Morbis contagiosis & malignis.*

Primo primas vias bolo eluerem ex cassia & hiera S. *Gal.* Deinde hoc syr. sceletyrbico præpararem materias ad aliquot septimanas.

℥℥. Succ. cochlear. beccabung. an. ℥iiii. sacch. opt. ℥ii. cum ovi albumine depuretur, coq. ad consistentiam syrupi.

℥℥. Hujus syrup. rec. ℥i. m. aq. cochl. ℥ii. aquæ nasturt. vn. i. aq. borrag. vn. ℥. M. F. haustus, mane sumendus, vespere imperarem conservam cochlear. superbibendo aquam

*Burnet Parte 1.*

ex succo cochl. destillatam. Si opus purgatione, expeditur illa clysteribus frequentibus, ex appropriatis & refrigerantibus, qui hic mirè conducunt; quod si clysteres nocturni sumerentur, & noctu retinerentur, plurimum lucri nobis inde sperandum, & quam feliciter id evenerit mihi testari possum; attemperatis succis, & exhausto à saburra corpore, de Lapide Bezoardico Orient. cogitandum; in quo certam, Dei gratia; spem salutis proponere possemus; tantum enim sudorem moveret quam vix ligni decoctum; & sanctè affirmo, me hujus ope quam plurimos Scorbuticos per Dei gratiam restituisse in integrum. *Guil. Romanus, Epist. ad Petrum Crusium, post observ. 35. lib. 7. observ. Horstii.*

## SUBSECTIO TERTIA:

## Pro Scorbuto.

**C**uratio à sanguinis missione inchoanda erit in initio, si ejus fuerit plenitudo; vires, ætas, & reliquam consenserint copiosam autem detractionem hic dissuaserim; per hæmorrhoides si legitime vacuentur, commodum erit. Quum verò ratio advocetur Medicus, nisi altas malum egerit radices, invalueritque, & lituris in tibiis se morbus prodiderit, à sectione venæ abstinendum consulverim. Hinc leniter corpus evacuetur cum foliis senæ expurgatis ad vn. m. vel ℥iii. vel minus si epithymi tantundem ad adjunxeris, cum paucis passulis corinth. sem. fœnic. & zinzib. an. ℥. m. quæ simul sub vespere in feri lactis q. s. leniter efferveant, & macerentur noctu. Deinde mane post fervorem unicum forti expressione coletur serum, quod propinetur; potest & vn. m. sequentis pulveris eodem modo infundi, colaturaque expressa exhiberi.

℥℥. Fol. sen. mundat. vn. i. epithym. tartar. alb. an. vn. m. cinnam. carioph. galang. sem. anis. an. ℥i. diagrid. ℥ii. m. M. F. Pulvis. Purgato suaviter corpore, singulis diebus bis, hora nimirum matutina, & quarta pomeridiana assumentur ℥iv. succi expressi ex herbis sequentibus, admiscebiturque sacchari puri quantum voles, & canellæ parum.



24. Cochlear. sisymb. cardamines, nasturt. hiemal. an. part. æq. beccabung. partem mediam. Hæ virides in mortario lapideo cum pistillo ligneo contundantur, exprimanturque: ex potissimum in hoc morbo extirpando singularem sunt fortitæ ex ratione prærogativam, quum primæ tres incidant, extenuent, & per urinas expurgent; quarta aliarum vires contemperet. Contusæ item illæ in lacte caprino rec. vel in ejus penuria, vaccino decoquuntur, à forti expressione propinatur. Felicem quoque successum expertus sum, si quando in lactis sero illæ herbæ decoquerentur; succorum tamen exhibitio præstat. Absinthium vulgare admixtum confert plurimum; utiliterque adjunxi sepenuerò fumariam & chamædryn. Nummularia quandoque ob laxa viscera, & dissolutas compages miscetur. Hoc remedio infinitos esse curatos intelligo.

24. Comar. absinth. vulg. sic. gran. juniper. contus. an. M. i. lact. caprin. lb. iv. coq. ad tertiæ partis consumptionem exprimendo, colentur, deinde admisce croci in pulver. redacti ʒi. Deinde ebulliant fervore uno aut altero, secundo, colentur. Decocti hujus datur haustus tepidus ter indie, hora matutina, tertia pomeridiana, & quando cubitum itur: Mulierem novi in Scorbuti curatione celebrem, quæ corpore vacuato, hanc propinabat portionem.

24. Beccabung. sisymb. Cardamin. an. M. iii. vel iv. contusis herbis admisce sem. erucæ, rad. ireos vulgaris recentis, an. ʒß. Zinzib. ʒii. Piper. long. ʒi. simul per colum trajiciantur cum vini rubri lbii. ex hoc potu commoto singulis diebus hora matutina calidè offerebat, deinde ægro diligenter contecto eliciebat sudorem novem in ea curationis ratione impendens dies. *Ioh. Vierus, observ. I. lib. I. Observ. Medic.*

## SUBSECTIO QVARTA.

### Pro Scorbuto.

**N**on incommodè exhibetur pulvis senæ nostræ descriptionis.

24. Fol. sen. el. ʒiß. crem. tartar. ʒvi. cin-

nam. ʒiii. cariophyll. galang. an. ʒß. diagrid. ʒi. M. Hujus pulveris ʒii. vel iii. pro ratione virium, in s. q. feri lactis per noctem infundi possunt, & colatura mane exhiberi. Referunt quidam in *Norvegia* ad hunc morbum profligandum felicissimè usurpâri fructum chamærubî ejusdam, qui sub nomine chamæmori *Norvegicæ* à *Carolo Clusio*, in *Historia Plantarum rarior. lib. I. cap. 5.* describitur.

*Eugalenus* multos Scorbuticos se curasse testatur solo decocto cochlear. & beccabung. & in lacte vel sero lactis, ut & decocto absinthii.

Aquæ nostræ Scorbuticæ hæc est descriptio.

24. Cortic. tamarisc. fraxin. radic. cappar. radic. polipod. q. aperient. an. ʒi. gentian. ʒvi. helenii, ari, cortic. citri, an. ʒß. chamædr. chamæpit. Card. bened. an. M. i. trochisc. de absinth. de cappar. an. ʒi. sem. eruc. ʒß. contundantur, contusis adde rad. raphan. sylvestr. acerrim. lb. ß. nasturt. aq. cochlear. beccabung. fumar. an. lb. iii. & cum prioribus contundendo misceantur, & S. A. digerantur, & affusa vini rhenani, aq. cuscut. Card. bened. an. s. q. destillentur, *Daniel Sennertus, pract. lib. 3. part. 6. sect. 2. cap. 6.*

Cum quidam Scorbuto tam miserè laboraret, ut maculis toto pectore & cruribus diffusis, membrisque rigentibus vix incedere posset, jussus est ab *Otthone Heurnio* potu quotidiano uti ex vini lb. iii. quibus brasicæ rubræ concisæ M. iv. cum gingib. ʒß. & cinnam. ʒii. immacerati fuerint. Jucundissimum hoc remedium, & vinum Hippocraticum ferè æmulans, imprimis si saccharum adjiciatur, intra quindecim dies circiter perfectam sanitatem restituit. *Georg. Hieron. Velschius, observ. 55.*

Remedium sequens cum bono successu, ego sapius expertus sum.

24. Summitat. genist. M. iii. minutim incis. coq. in cerevis. fortior lb. iii. ad medietatem, exhibeantur ʒii. aut iii. bis in die Aquæ destillatæ hic plurimum possunt; harum dispensationes quædam in nostra Pharmacopœa, perquam utiles & concinnæ habentur, ut sunt aq. raphan. composita, lumbric. & limacum magistralis.

Vinum



Vinum antiscorbuticum simplex egregii usus ad hunc modum parare solco, verno aut æstivo tempore.

24. Fol. cochlear. sereno cœlo collector. q. v. succo è contusis expresso, doliolum. iv. aut v. congior. capax impleatur, flor. cerevisiæ cochlear. i. vel iii. impositis per duos dies fermentare sinatur. Dein vas occlusum in cella vinaria per sex menses collocetur: deinde liquor clarus ac instar vini Hispanici flavesceat, in utres exhauriatur, ac usui servetur, per plures annos incorruptus perdurat. Dosis. vn. iii. vel iv. bis in die.

Vina medicata, quorum cyathus unus aut alter horis Medicis, aut etiam inter prandendum quotidie assumantur, ad hunc modum parentur.

24. Fol. cochlear. M. iv. rasur. raphan. sylv. vn. iv. cortic. vvinteran. contus. vn. ß. cortices exteriores quatuor aurantiorum totidem limon. ponantur in vase idoneo cum vini albi, rhenani, aut tenuioris Hispanici lbxii. Vas obturatum servetur in loco frigido; vinum effundatur clarum quoties opus est.

Usitatus est cerevisiam medicatam Scorbüticis pro potu ordinario constanter bibendam præscribere. Paretur cerevisia pro doliolo iv. congior. capaci, vice flor. lupuli incoquantur summitat. pini vel abietis M. iii. Post fermentationem in doliolo peractam, imponantur fol. cochlear. M. iii. rad. lapath. acut. præp. vn. iv. cortices iv. aurant. Postquam per septimanam subsidentia inclaruit, potui exponatur. *Thomas Villis tract. De Scorbuto, cap. 7.*

Spiritus salis dulcis, armoniaci, cochleariæ, omnibus reliquis præstant medicamenti. *Paulus Barbette, prax. lib. 4. c. 3.*

Sanguis partius est detrahendus, cum longa observatione constet, largam sanguinis missionem agrè hunc morbum perferre. Non una, nec in una parte vena aperienda, sed per intervalla modò basilica vel mediana, modò salvatella, modò saphena, si nihil prohibeat, secunda, ut in varia corporis loca diffusus sanguis vitiosus per varias etiam venas evacuetur. Sed hæmorrhoidum a portio omni phlebotomiæ præferenda est, cum per hanc viam melancholicus humor commodissimè eva-

cuetur. Immolienda catharsi observandum.

1. Validiora purgantia minùs tutò exhiberi, cum in hoc morbo cor facile afficiatur, & animi deliquium subsequatur. 2. Purgationem rectissimè institui per *τρευματική*, si quidem vitiosorum humorum colluvies una vice exhauriri non potest. 3. Purgantibus semper admiscenda esse antiscorbutica. 4. Nunquam purgandum nisi præmissis præparantibus. 5. Præparantia non solum ex aperiensibus & attenuantibus, sed & appropriatis & scorbuto peculiari quadam & specifica vi adversantibus conficienda. Præmissis venæsectione & purgatione, obstructions lienis & vicinarum partium aperiendæ veniunt, humorum crassities corrigenda, & sanguis a tartaro scorbutico depuranda. Ubi notandum primò, vulgaribus medicamentis aperiendi, attenuandi & incidendi vi prædictis scopum hunc nunquam obtineri posse, nisi admisceantur appropriata, quæ sale volatili abundant, & humores crassos & fixos subtiles & quasi volatiles reddere, & vitium illud in coctione & *τρευματική* corrigere valent. Secundò antiscorbuticis calidis & acribus cautè utendum, præsertim in corporibus rarioris texturæ, & quæ siccioris & calidi sunt temperamenti, aut humoribus biliosis abundant. Tertiò dulcia scorbuticis non exhibenda, imprimis saccharum, habet enim qualitatem glutinantem & obstruentem, adeoque collectionibus crudorum humorum, ansam præbet. Quartò simplicia antiscorbutica recentia & eorum succos & conservas præferenda compositis arte paratis, præsertim decoctis, extractis, &c. Cum enim tota eorum vis & potestas in sale volatili consistat, facile fieri potest, ut decoctione, extractione, exsiccatione, &c. dissipetur & evanescat. Mihi longo usu probata sunt, quæ sequuntur.

24. Succor. rec. express. cochlear. lbj. nasturt. beccabung. an. lbß. sum. cichor. acet. an. vn. v. M. præcipitentur cum succo citri.

Secundo Mixturæ. 24. Herbar. rec. cochlear. nasturt. aq. an. Mii. beccabung. acetos. an. M. i. Contund. in Mortario lapideo, affund. vini *Rhenani*, in quo rad. armoraciæ rec. tessulat. incis. per triduum macerata. smt. lb. i v. Stent infusa per

P p 2. diem.



diem & noctem. Postea exprimantur fortissime & colentur. Addi succi citri rec. ℥iv. sacchar. parum. Dosis ad ℥iii. ad ℥iv. Vel,

℥. Mixtur. simpl. spirit. cochlear. nasturt. aqu. baccar. juniperi an. ℥β. M. Dosis à ℥i. ad ℥ii.

Tertio Electuaria. ℥. Pomor. citri rec. una cum corticibus incis. n. 3. fol. cochlear. rec. M. iii. nasturt. ag. M. ii. acetosell. M. i. Contund. in mortar. lapid. cum paucis saccharo. F. Electuar. Vel.

℥. Electuar. nostri chalybeat. ℥iii. Conser. cochlear. nasturt. an. ℥ii. cortic. citr. condit. seorzon. & cichor. condit an. ℥vi. M. & cum syr. cochlear. q. s. F. Electuar. Hoc etiam vino medicato aliquando utitur.

℥. Herb. rec. cochlear. nasturt. an. M. ii. fumar. absinth. pimpinell. an. M. iβ. cortic. fraxin. vn. i. bacc. juniperi vn. iβ. rad. enul. vn. i. cichor. ℥vi. grosso modo incisa & conquassata includantur doliolo. Affunde musti vel cerevis. rec. mensuras 24. Post fermentationem colatura defaecata & clara sumatur bis ter in die ad vn. vi ad. vn. x. vel plures ad placitum. *Baldassar Timaeus. Cas. 34 lib. 3.*

Juvenis quidam triginta plus annorum, nec per cubiculum meare, nec pedibus incedere valens, simplici hoc utitur medicamento.

℥. Rad. armoraciz vn. iii. coq. ex fero lactis. Colaturæ lb. ii. dentur usui. Septimo post die pro suavi cura in ædibus meis gratias mihi egit. *Paulus Barbettes, practic. lib. 4 cap. 3.*

Cum bis oras *Gronlandicas* *Hermanus Nicolai* illustrasset, dicit inquilinum remedium scorbuti, quo *Groenlandi* tanta vehementia infestantur, ut omnis membrorum motus ipsis denegetur. Nimirum cochleariam & acetosam ita copiose in *Infulæ Ursorum* monte provenire vidit, ut gressus viatorum impediunt; sed semper junctas has plantas esse & vicinas, quia seorsim fumi non debeant, ne singulae per se sumptæ detrimentum afferant: quippe alteram sale volatili, alteram acido turgescere, ex quarum mixtura intermedia qualitas exultet. Modum autem eas assumendi in *Gronlandia* hunc esse usitatum, ut *Rhan-*

giferorum vel avium carnem recentem cum avenacea vel hordeacea ptisana excoquant, ejusque brodium his herbis scorbuticis condiant, unde insigne alimentum medicamentorum emergat, cujus esu ita laxari alvum, evacuatis humoribus corruptis, ac si medicamentum catharticum haussissent mox que quasi renatos convalescere. *Thomas Bartholinus, Act. Medic. anni 1671. & 1672. Observat. 9*

## SECTIONONA.

### Pro Scorpionis ictus.

**F**Amulum habui qui à Scorpione ictus, tanto subito ac tam frigido sudore toto corpore profusus est, ut argentissima nivè atque glacie sese opprimi quereretur. Verum cum argenti illi solam theriacam ex vino potentiore exhibuissem, illicò curatus est. *Antonius Benevenius, cap. 56. Libri De abditis Morborum & Sanationum causis.*

## SECTION DECIMA.

### De Scrophulis.

**S**Crophula seu Struma, Græcè *Ροίπος*, est scirrhusus glandularum tumor membrana peculiari conclusus. Universas sapè glandulas occupat, maximè eas que sunt in cervice, collo, axillis, inguinibus & mammis: in mesenterio quoque non rarò stabulatur. Si in gutture sit, bronchocele vocatur. In hoc differunt scrophule à reliquis glandulosis tumoribus quod plures sunt, & radices profundiores agunt. Earum causa est pituitosus, cœnosus & gypseus humor. Dividuntur in benignas & malignas. Benignæ sunt absque inflammatione & dolore, contra verò malignæ.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Scrophulis.

**P**Oterit æger ex infra scribendis pilulis per quadraginta dies singulo mane ex monitu *Job. de Vigo* unam deglutire.

℥. Eu-



℥. Euphorb. zinzib. turbith. succ. radic. ireos, agar. an. ℥i. confusa M. & fermentur pil numero xi. quod ad externa strumas discutit lupin amar. farina ex oxymel. cocta & illita. Ad idem etiam præclare facit bubulum stercus aceto incoctum, & delinitum; id enim tumores scirrhusos omnes instar cataplasmatismis appositum mirifice dissipat. *Petrus Forestus, observ. 10. in schol. lib 3 Observ. Chirurg.*

Cum quidam Scrophulam in collo haberet, consulvi illi, ut ab omnibus frigidis abstineret, & ut omni septimana semel sumeret ex sequenti pulvere ad pondus unius Florenti Rhenani.

℥. Turbith. el. dr. iii. zinzib. mastich. an. dr. i. sacchar. alb. dr. vi. F pulvis. Manè bibat sæpius ex decoct. rad. scrophular. filipend. & pimpinellæ; bis in die inungat se cum isto unguento.

℥. Empl. oxycroc. ℥β. ol. chamæm. lil. alb. an. ℥i. M. Quidam lolium cum fursure, sem. lini & stercore columbino cum modico vino decocta pultis instar apposuerunt, quod duritiem mirabiliter resolvit; & à proprietate valere volunt agrimoniam collo suspensam; radicemque asphodeli confusam & impositam: sed egregiè confert pinguedo destillans ex anseris, inuncta; at hoc unguentum mirabile habetur ad scrophulas.

℥. Arsenic. rubr. dr. ii. argenti sublim. dr. β. rad. serpentar. rad. beton. panis porcin. an. dr. β. Aloes hepat. dr. i. F. omnium pulvis, & cum axungia F. unguentum: dissolvit enim Scrophulas. Ego tamen cum cautione, si in collo sint; vel sub axillis eo utendum suaderem; sed potius hoc sequenti uti vellem, quod ad Scrophulas, Glandulas & Nodos duros facit.

℥. Medull. crur. vituli ℥ii. butyr. rec. di. alth. an. ℥. m. M. F. unguentum. Ad glandulas in collo valet egregiè farina filigin. cum melle apum, emplatri modo. Cum juvenula quædam pateretur Scrophulas in collo, *Laurentius Bruminck* Chirurgiæ Doctor ad eam accitus, istud emplastrum apposuit.

℥. Ciner. caul. rubr. combust. sal tosti, an. part. xq. cum melle fiat emplastrum super ignem, diu admotum fuit, sed parum aut nihil profuit, quare præ-

*Burnet Parte I.*

scripsit totum partim maturativum, partim resolutivum: mox eodem emplastro appposito, citò suppuratae sunt, natura faciente duo vel tria foramina quæ tandem per concavitates intercutaneas in unum congregatae sunt; hoc viso, forcipe aperuit in modum crucis, ac labia deinde abscissa cepit primò mundificare cum unguento ægyptiaco, deinde cum dulcibus, & benè valuit cum populeo, unde facta est incarnatio, & per alumen ustum superflua caro corrosa. Hæc sequentia pro Scrophulis egregiè juvant.

℥. Scrophul. filipend. pimpinell. flor. genist. pilosell. caulium rubr. agrimon. rubr. mai. an. M. i. aristol. rot. rad. spatul. scetid. raphan. an. ℥i. enulæ ℥β. sem. coriandr. ℥β. F. decoctio ad sibi. in duabus partibus vini albi, & una parte aquæ: dulcoretur cum sacch. & F. Potus.

℥. Ammoniac. galban. in aceto dissolut. an. ℥i. bdell. ℥β. medullæ cervi, axungie anatis, an. ℥β. mucilag. alth. fenugrac. sem. lini, an. ℥ii. lithargyr. ℥β. pulv. ireos ℥i. olei aneth. ceræ an. q. s. F. emplastr.

Sed & hoc remedium mirabile habetur, valens à forma specifica in qualibet specie Scrophularum.

℥. Succ. rad. irid. euphorb. an. q. s. confice triginta pilulas ad quantitatem cicerum, & ad unam omnem diem triginta diebus; nam mirabiliter valet ad eas removendas. Sed adde de spica & mastice q. v. est enim correctorium euphorbii. Ego tamen cum magna cautione ob euphorbium iis utendum suadeo. Pulvis rad. pentaphylli exhibitus per aliquot dies, præservat à Scrophulis sumatur cum optimo vino; idem præstat radix filipendulæ & agrimoniae.

Confidenter affirmat *Tagautius* Christianissimo *Francorum* Regi divinitus peculiari dono esse indultum, ut quam plurimos strumosos solo manuum tactu integræ sanitati restituat.

Rex etiam *Eduardus* (ut referunt Historiæ) solebat solo tactu sanare strumosos; quod immortale munus jure velut hæreditario ad Reges posteriores manavit; nam Reges *Angliæ* nunc etiam tactu, ac quibusdam hymnis non sine ceremoniis prius recitatis strumosos sanant, *Petrus*



*trus Forestus, observ. 11. & schol. lib. 3. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECVNDA.

### *Pro Scrophulis.*

**A**ccipe quam promisi descriptionem emplastri ad Scrophulas & scirrhosos tumores molliendos, resolvendos & discutendos efficacissimi, & olim à Clarissimo Viro *D. Lamberto VVolfio* Medico Celeberrimo & *Cosma Slotano* Chirurgo præstantiss. pro Aulico quodam præscripti, maximoq; cum fructu, me præsentē usurpati.

℞. Rad. bryon. cyclamin. helen. cucum. agresti an. ℥i. coq. in vini albi & aceti, an. q. s. deinde pistentur, & per setaceum percolentur, colaturæ admisce pulv. rad. irid. myrrh. oliban. mastich. croci, aristol. rot. an. ℥i℥. flor. chamæm. melil. sam. buc. an. p. i. opopon. sagapen. ammoniac. bdell. galban. in aq. vitæ dissolutor. an. ℥℥. gummi hederæ, styrac. calamit. an. ℥iii. euphorb. ℥v. sem. staphysagr. ℥i℥. argenti vivi, saliva hominis extincti ℥ii. ol. lil. de vitell. ovor. æsypi, an. ℥v. adip. anser. anatin. suill. medull. cruris vituli, an. ℥i. mucilag. semin. lini, scænugræc. rad. alth. an. ℥i. M. & cum s. q. ceræ flavæ & terebinth. F. emplastr. *Guil. Fabritius Hildan. observ. 38. cent. 3.*

Mulierem quandam Scrophulis laborantem ita tractavi.

℞. Pilul. coch. ℥ii. cum aq. cinnam F. pilulæ ix.

℞. Empl. de melilot. ℥℥. malaxetur oleo cheirino; tumori imponatur.

Ad discussionem Scrophularum.

℞. Aq. vitæ ℥i℥. flor. chamæm. ℥℥. sem. scænugræc. ℥i. lavendul. ℥℥. M. bulliant parum, colentur, hoc decocto, noctu fomentetur tumor spongia calidè. Cum tumor adhuc non cederet, ita egi.

℞. Sem. sinapi. ℥i. sem. urtic. ℥℥. sulphur. vivi ℥i℥. gummi ammoniac. in aq. vitæ solut. ℥ii. empl. diachyl. ireat. ℥ii. malaxentur oleo lil. F. emplastrum. Post fotum admovendum; hoc emplastro Scrophulæ imminui cœperunt. Cum postea de novo Scrophulæ increverent, denuo illam purgavi.

℞. Lign. guajaci ℥iv. sarsapar. ℥℥. fol. beton. M. i. rad. enul. ℥ii. fol. sen. ℥i℥. sem. cartham. ℥i. sem. anis. ℥ii. scænic. ℥i. F. decoctio incolat. ℥℥. dissolv. agar. ℥iii. zinzib. ℥i. cinnam. ℥i℥. F. expressio, adde syrup. ros. solut. ℥i. F. potio pro tribus dosibus. Finita purgatione.

℞. Conserv. majoran. ℥℥. theriac. ℥i. M. F. bolus; capiat jejuno stomacho. Cataplasma sequens tumori adhiberi jussi.

℞. Rad. ireos, ℥iv. incid. minutim decoq. in vino albo: pistentur. Adde farin. fabar. & hord. an. ℥i℥. mell. ℥iv. M.

℞. Ol. lil. & cheirin. an. ℥i. succ. rad. irid. ℥i. aqu. vitæ ℥ii. coq. cum oleis succus, adde gummi ammoniac. in aceto forti solut. F. linimentum. Inungat eo Scrophulas ante cataplasmatiss applicationem. Ad sudores movendos.

℞. Lign. guajac. ℥i℥. sassafr. ℥i. rad. liquir. ℥℥. stent in infusione in mensur. iii. aquæ, coq. lento igne ad consumptionem tertiæ partis; adde sacch. ℥i. cinnam. ℥i. Capiat noctu cubitum infra ℥iv. Jussi laminam plumbeam tenuissimam supra Scrophulas ligare: & fortius adhuc emplastrum præscripti.

℞. Sem. sinapi, urticæ, spumæ maris, rad. aristol. rot. & pyreth. an. ℥℥. scillæ præp. pulp. colocynth. an. ℥i. sulph. vivi ℥i. pulverizat. diligenter. adde gummi ammoniac. bdell. in aceto fortiss. dissolut. an. ℥℥. cum pauca cera & oleo lilior. F. emplastrum, supra corium extensum Scrophulis applicetur.

℞. Lapid. spong. spongiæ combust. corall. utriusque, an. ℥℥. ossis sepiæ & rad. pimpinell. an. ℥i. cinnam. ℥i. zinzib. cariophyll. an. ℥i. sacch. rosat. tabul. ℥iii. F. pulvis. Capiat ℥ii. pro vice, absument enim Scrophulas. Fomententur duræ glandulæ sub mento ante emplastri applicationem sic.

℞. Fol. caulium rec. rubr. fol. hyoscyami, chelidon. urtic. mortuæ pimpinell. an. M. i. rad. raphan. ℥i. rad. aristoloch. rot. ℥℥. incid. omnia, & decoq. cum aceto rosac. & foveatur pars affecta. Presistebat in usu empl. ultimo descripti quod continuò gestabat: tandem ut quæ remanserat Scrophula tolleretur, jussi reiterare Cataplasma prius præscriptum addendo sulph. vivi ℥℥. aq. vitæ ℥ii. euphorb. ℥℥. ol. lil.



lil. ℥i. Fiat Cataplasma; nōdum penitus ablata Scrophula applicui emplastr. de Vigo. *Felix Platerus, obser. lib. 3 pag. 686.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Scrophulis.

24. **S** Pongia in furno adeo exsiccatur ut comminui possit, pulverizatur ℥i. Datur jejunis aliquot septimanarum spatium; potest admisto saccharo & aromatis gratus, ut libentius sumatur, reddi. Probatum vinum in quo talpa decocta fuerit. Inter externa, pinguedinem quę destillat ab anserē dum assatur, prius infarcto multis muribus, valde quidam approbabat. Butyrum in quo scrophul. rad. contusa macerata fuerit aliquandiu, vel cocta commendatur. Hoc *Matthiolus* ita parare docet, radicem autumnī tempore effossam, repurgatam, tufam, cum butyro recenti operculato fictili, in uliginoso loco, per quindecim dies reponit & dimittit, postea lento igne butyrum illud liquefacit, & percolatum asservat. Eadem scrophularia radix, uti & mures aliquot vel conjunctim, vel separatim in oleo sic macerari vel coqui ad eundem usum potuerunt. *Felix Platerus, Practic. 3, cap. 3 pag. 323. & sequentibus.*

Tres Bufones in oleo olivarum in vase terreo eoque lutato cocti, oleum faciunt præstantissimum ad Scrophulas: sed cujus vapores dum sit noxii sunt, quare ab iis cave, & probè vasa tua ludentur. Scrophule primò arsenico admoto vesicante excotientur, pars deinde sublimati admotione corrodetur; & tandem oleo dicto utere, quod adhuc præstantius erit, si in eo salem bufonum infuderis. Hinc forsā orta sunt antiqua Gallia insignia, quę erant tres bufones, juxta multos Auctores, cum Reges Gallia hujus morbi curam suscipiant. *Petrus Borellus, observ. 38. cent. 4.*

Quantam Scrophulis laborantibus opem ferat Paronychia folio rutaceo (quę *Bauhino* est sedum tridactylites, seu alfine petræa) luculenter ostendit. Nobilis *D. Robertus Boyle* Tractatu suo aureo De utilita-

te *Philosophia Experimentalis, par. 1. sect. 2.* Vbi refert se juvenem quendam vidisse, hoc morbo graviter afflictum, sine dolore, paucisque diebus vilissimæ hujus Plantæ in cerevisia infusæ beneficio quàm optimè curatum, sine ulla sensibili evacuatione humorem peccantem consumit, dolores sedat, discutit tumores, & ulcera sanat; ita ut ad hunc affectum oppugnandum mirabiles prorsus virtutes possideat.

Juvenis quidam viginti annorum longo tempore scrophulis in collo laborabat, eius curationem institui à lunæ oppositione usque ad conjunctionem, à coniunctione verò ad oppositionem intermissi, quia in rectè curandis strumis hæc tempora crescentis videlicet Lunæ & decrescētis, sunt observanda Medico. Curatus autem à me sic fuit, per singulos dies bis, mane nempe & vesperi perungi curabam totam strumam calente oleo sulphuris, postea calida lintea circumplectebam. Præter hæc singulis quatuor diebus exhibui mane spiritus vitæ aurei ℥i. quo multum expurgatus fuit à phlegmaticis humoribus, atque his paucis subsidii tumor indies decrescebat; & in quadraginta diebus totus evanuit, nec amplius recruduit, id quod etiam in multis aliis feliciter & veraciter sumus experti. *Martinus Rulandus, curat. 87. cent. 8.*

24. Cineris spong. marin. ossis sepia, piper. long. cinnam. sal. gemm. pyrethr. nuc. cupress. gallar. cortic. quercus, flor. ros. rub. an. ℥ss. M. F. Pulvis, dosis ℥ii. vel ℥i. *Paulus Barbet, prax. lib. 2. cap. 2.*

Inter alia plurimum valet spiritus salis armoniaci toties meritò laudatus internè, ut & externè iusto vehiculo mixtus. *Fredericus Dechers, not. ad cap. 2. lib. 2. prax. Barbetiana.*

Sequens medicamentum mirificè valet ad sanandum Scrophulas apertas.

24. Ol. laurini ℥i. ceruss. pulver. & aqu. vitæ lavigat. ℥i. alumin. rochæ ℥ss. salis communis ℥ii. M. F. unguentum *Hier. Fabrit. ab Aquapend. opera Chirurg. part. 2. lib. 1. cap. 29.*

Accipiatur talpa & elixetur bene, deinde ad solem exsiccetur & pulverisetur, & cum melle albo conficiatur. Et fiant pilulæ in modum cicerum, & omnidie



die serò dentur 4. vel 5. quousque materia scrophularum per secessum educatur, Iuravit mihi *Henricus Anglicus*, quod pluries experimentum hoc probavit. Item pulvis florum genistæ in cibis & potibus sumptus scrophulas curat. Aliud ad idem. Accipe cavitas, & in qualibet illarum immitte iii. vel iv. guttas lactis titymali, & mitte eas in sereno aere sic per noctem jace-re: manè vero dabis; quia mirabiliter valent; ducent enim ad 15. fellas vel plures. Et ego sum expertus hoc in pluribus rusticis robustis, quia materiam grossam & viscosam mirabiliter educunt. *Arnoldus de Villanova practic. lib. 2. cap. 5.*

Pulvis Magistri mei expertus ad gulæ botium, per cuius assumptionem infal-lenter curantur omnes bozuti.

24. Ciner. spongiæ mar. & palæ mari-næ ossis sepia, piper. long. & nigri, zinzib. cinnam. sal. gemmæ, pyrethr. gallar. spi-næ rosar. an. ʒii. M. F. pulvis, de quo æger sæpius de die & nocte in ore aliquid teneat, & paulatim deglutiat. Idem & cibis in-spergi poterit. Item.

24. Unam spongiam marinam optimè ad Solem exsiccata, & pone eam cum centum granis piperis nigri in olla nova & comburantur in igne, donec fiat pulvis, qui misceatur cum mellis despumati q. s. ut F. electuar. molle. Iterum omnia re-mittantur ad ollam prædictam & combu-rantur ut prius, & iterum omnia pulveri-sentur, & cum melle conficiantur, & ite-rato adhuc similiter comburantur. Hoc facto tribus vicibus, iterum adhuc cum melle despumato conficiantur prædicta, & fac ex iis xxx. pilulas grossas ad quan-titatem fabæ grossæ, & quolibet manè jeju-no stomacho teneat unam ex iis, sub lin-gua, quousque per se cum saliva paula-tim transglutiat, & pro certo liberabi-tur. Has pilulas & pulverem superscri-ptum extraxi à quodam libro secretissimo Magistri mei, quem clariorem omnibus aliis libris reputabat. Cor talpæ comestum per novem dies, vel ipsa talpa assata & co-mesta liberat à botiis & scrophulis. *Idem ibidem lib. 2. cap. 4.*

Quidam ad nos adduxit filiam suam tre-decim annos natam temperamento sangui-neo præditam, quæ ab undecimo ætatis

anno menstruas purgationes patiebatur. Cum ab octo mensibus fluxio quædam in partem faciei dextram decubuisset, paucis postea diebus decidit in cervicem, ita ut glandula illius loci paululū tumefacta appa-ruerit. Ab eo tempore tumor sensim in-crevit, ita ut jam ovi anserini magnitudi-nem superaret. A præsentibus Medico & Chirurgo per duos menses multa præstita fuerent remedia, purgationes decocta su-dorifica, causticum; tum parti admota remedia, primum resolventia & emollien-tia, postea suppurantia & attrahentia va-lidissima: quibus nihil profectum est, imò contra tumor antea exiguus incrementum suscepit. Nos verò consilio inito cum *D. Delort* Universitatis Decano, & Chirur-go seniori, primum eam misimus ad Ther-mas *Balerucanas*, ut iis uteretur in potu, balneo, & capitis embrocatione. Postea verò sequentia præscripta sunt. Pulvis ar-thriticus, addito zinzibere, sumendus singulis hebdomadis, venæ sectio post primam dosim pulveris; fons ex spon-gia in aqua calcis expressa & arctè alli-gata per decem dies; suffumigium ex lapide pyritæ extincto in aceto fortissimo bis in die exceptum per infundibulum, cujus tubu-lus totum tumorem contineat. Post suffu-migium, emplastrum de Vigo, quadru-plicato mercurio, cujus singulis uncis ad-datur vitrioli *Romani* ʒi. bochetum sar-se si-ne vino per longum tempus, infusio ad bronchocele in Pharmacopœa *Querceta-ni* descripta, tempore plenilunii usurpanda; aque *Meynenses* per mensem pro potu, & fons partis bis in die; postea emplastrum prædictum; ex eadem aqua fiat bochetum. Post reditum ab aquis, si tumor non fue-rit discussus, aperiendus erit caustico. Omnibus remediis usa est, exceptis aquis *Meynensibus*: quia; cum reliqua nihil pro-fecissent; imò tumor incrementum sus-cepisset, non fuit speranda salus ab hu-jusmodi aquis. Ideo ad apertionem sta-tim veniendum censuimus, admoto cau-stico, supra escharam facta fuit incisio; & illicò erupit aqua tenuis & limpidissi-ma instar aquæ fontanæ, ac tumor sta-tim subsedit, ad planitiem parti oppo-sitæ propemodum æqualem, quod no-bis admirationem peperit, & observatio-ne dignum.



dignum censuimus. Similes enim tumores ab aqua productos, præter hydroceles & hydrocephalos, à nemine authorum descriptos existimo. Decem aut 12. horis ab apertione correpta est febre acuta, & magna fluxio facta est in partem cum inflammatione. Tertio die cessavit febris, post venæ sectionem bis factam & purgationem; cataplasma de mica panis tumori admotum, qui paululum subsedit, & pus quoddam pituitosum effluebat, 13. dies ab apertione, exivit per ulcus cystis integra instar succi verè membranosa, & paucis postea diebus curata est. *Lazarus Rivezius, observ. 76. cent. 1.*

Quidam celebri ob scropularum curationem exhibebat decoctionem chamædryos in vini albi lb. ad lbii. consumptionem. Dosis cochl. vi. manè & vesperi per mensis spatium. Quo non proficiente, exhibebat infusionem roris marini & linguæ cervinæ, an. M. i. in vini albi lb. iv. per horas 24. & sumebat æger cochl. viii. bis in die, quo decocto fovebat etiam partes tumentes. *D. Hulse, referente. Ioh. Raio in Catalogo Plantarum Angliæ.*

## SECTIO UNDECIMA.

### • Pro Scroti Gangræna.

**V**ir quidam honestus annorum circiter quadraginta, vino obrutus, cum repentè in Scroti tumorem, cum febre acuta & virium subita dejectione, incidisset, à Chirurgo vocato remedium petiit; qui cum livorem istius partis cum ulceratione totius penis, imò periculum, quod manifestam gangrænam deprehenderet, notaret, de cura sollicitus petiit consilium Medici. Ego vocatus, injecto prius clystere, quoniam alvus à biduo non responderat, præscripsi cataplasma ex scordio, ruta, farina lupin. orobi cum oxymel. vino & similibus. Per os exhibui diasenam *Fracastori*; & subinde aquam theriacalem, quòd malignitatem cordi communicatam observarem, sine hac enim vix respirare potuit. Die sequenti, deposito cataplasmate, cuticulam quam Epidermidem vocant, se paratam vidimus: tertio die scrotum sponte apertum;

& circa vesper. aq. fbx. effluerunt, quarto die testes ex toto nudatos conspeximus; deciderat enim scrotum a pectine usque ad perinaum. Hic quod factum opus deliberavimus, resiccantibus & incarnantibus remediis, quatuordecim dierum spatio tantum profecimus, ut non tantum testes scroto muniverimus, sed & natura scrotum novis pilis vestiverit, glans peni redierit integra, omnia ulcera penis consolidata fuerint, & officium viri deinceps patiens præstare potuerit. Ego nec quisquam Medicorum nostrorum, similem nec vidit nec audivit: Luis Venereæ nulla suspicio, nunc inculcata fruitur valetudine. Ego Naturam potius in conservatione speciei quam individui sollicitam esse dixi: Studet enim perpetuitati, ut cum individuum servare non possit, speciem conservet, quod præstat partibus quibus subolescimus. *Petrus Holtzemius, observ. 76. cent. 5. Observat. Chirurg. Guil. Fabritius Hildan. in sequenti observatione consimilis habetur Historia.*

## SECTIO DUODECIMA.

### De Secundina derelicta.

**P**ost Partum non rarò subsistunt Secundinæ, quæ nisi quam primum expellantur, puerperæ certissimam minantur ruinam. Retinentur verò ob nimiam tunicarum densitatem & crassitiem, propter quam uteri parietibus firmiter adherent, ob earundem rursus intumescuntiam, virium ex partu laborioso exolutionem, & oris uteri occlusionem. Causæ externæ sunt aeris frigiditas, odora menta, terror aut timor subito adveniens, & imperitæ obstetricis error, umbilicalem chordam præcidentis antequam secundina ex utero egressa fuerit.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Secundinæ retentis.

**M**ulieri cuidam post partum, diutius in utero non sine periculo vitæ secundina relinquebatur. Meo monitu olea



oleo ligni juniperi gutt. xxx. sumpsit. Post quarum sumptionem mox secundinæ prodire salubriter. *Martinus Rulandus curat. 73. cent. 8.*

Aliam quandam mulierem morti ferè ægrotantem ob secundinam à partu diu retentam, ilicò liberavi, secundinam solvi, & expuli, imponendo super umbilicum de oleo heraclio ℥iii. *Martinus Rulandus, curat. 20. cent. 8.*

Alteri mulieri in simili casu constitutæ ex oleo nostro purgatorio tredecim guttas umbilico impono, mox olei succini gutt. octodecim, cum vini cochleari propino, quibus peractis statim secundina est projecta, & mulier sanata. *Idem, curat. 65. centuria 3.*

℥. Boracis ℥i. capiat cum ℥iii. vini albi, aut detur tantundem troch. de myrrha. *Petrus Forestus, Schol. 80. lib. 28. De Morbis Mulierum.*

Hoc pro mirabili secreto & experimento ac accepimus ad secundinam extrahendam, ad menses etiam suppressos; ad uteri suffocationem, ad molam quoque & fœtum mortuum educendum, atque expertum dicitur in iis quæ per quatuordecim dies vel plures secundinam è partu retentam habuere, quæ nullis modis ab ea exonerari poterant, donec hoc secreto ab obstetricæ, quæ id à Judeo Medico acceperat, curarentur. Sumebat folia levistici viridia, contundebat & succum exprimebat cum vino optimo Rhenensi, ejusque cyathum unum propinabat. Hyeme verò contundebat semina ejusdem, & modicè in vino ebulliebat, demum colabat cum expressione, & exhibebat quam fœlicissimè. *Petrus Forestus, schol. observ. 32. lib. 28.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Secundina retenta.

**P**Orri succus cum vino epotus mirificè ad secundinam educendam valet. Sed quod omnium efficacissimum hoc in casu semper felici cum successu comprobavimus est hujusmodi.

℥. Borac. mineral. ℥ii. troch. de myrrha ℥i. succi sabinæ q. s. F. bolus de vorandus su-

perbibendo decocti artemis. ℥iv. *Ioh. Zechius, consult. 68.*

Ex obstetricum imperitia sæpius accidit secundinam post partum relinqui in utero, sed semper cum matris maximo periculo. Usu pulveris quem *Forestus* commendat (è trochisc. de myrrha sem. viol. rad. dictamn. & rasura dactyli) quasdam Dei gratia liberas scio. *Gregorius Horstius, obs. 58. lib. 5. De Morbis Mulierum.*

Pulvis *Heurnii* supra descriptus, *Subsect. 3. sect. 10. lib. 14.* utiliter exhibetur.

Cuidam, quæ in secundinarum retentione inciderat, præscripsit Chirurgus quidam, ut ex capillis ipsius nonnihil adscinderetur, combureretur, & vino dissolutum propinaretur: quod cum præstitisset ægra, secundinas feliciter expulit. *Ioh. Marsenus, observ. 5.*

Remedium illud ad Secundas pellendas *εξ ὀφθαλμῶν ἰατρῶν*, jam aliquoties nobis mirè successit. *Conradus Gesnerus*. Epist. annexa tractat. *Ioh. Baubini De Plantis à Sanctis denominatis.*

Singularis profectò equi testiculorum ad secundinas depellendas est proprietas adeo quod testatur *Gesnerus* in Epist. Rusticum quendam in quinquaginta puerperis feliciter hoc usum fuisse remedio. Usus est & *Horatius Augenus* in pluribus mirabili eventu. Præstantissimum idcirco à gravibus authoribus judicatur remedium, nam & plurimis jam deploratis profuit. Capiuntur testiculi equi castrati, & frustulatim concisi in furno exsiccantur, quorum pulvis quantum capitur tribus digitis in jure bibendus datur: idque si opus est, bis aut ter repetitur. *Iul. Caesar. Baricellus, in Hortu Genial. pag. 297.*

*Dom. Hieronymus Animæus* Antecessor meus, vir in praxi Medica, & imprimis quidem in affectibus Mulierum valde acceptus, vel ideo quoque, quia, quod maxime desiderant Mulieres, temedia facile parabilia & domestica ipsis familiariter præscripsit, & quidem multa *Germanico*. Is, inquam, pro secreto post se, relinquit ad pellendas secundinas, emplastrum ventri apponendum ex albumine ovi & rubrica, quod quia valde astringit, meritò in dubium vocari posset, utrum non potius fœtus



tunicas intra uterum cohiberet, quam expelleret, sed quia musculos ventris constringit, qui antea ob parturiendi conatum & extensum uterum relaxati & in opere suo debilitati sunt, ideo credibile est tale emplastrum juvare. Musculi enim abdominis contracti & in se redeuntes, uterum quoque superius deprimendo, ad expellendas secundinas aptiores reddunt. *Vvolfgangus Hæferus, lib. 7. Herc. Medic. cap. 6.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### Pro Semine extinguendo.

24. **S**Em. ruta (quæ licet in fœminis genituram suscitet, in viris tamen extinguere experientia compertum est) sem. viticis, rad. irid. an. ℥i. sem. lactuc. ℥i℥. menth. sic. ℥iii. sacch. ℥i. M. F. pulvis cujus ℥i. ex vino albo tenui detur duabus horis ante prandium per aliquot dies, hoc medicamentum est mihi valde familiare, & huic intentioni maximè accomodatum. *Joh. Zecchius, consult. 42.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

### Pro Serpentis ictu.

**R**usticus quidam à Serpente in stomacho vulneratus, verba sci folli contritis & admotis brevi tempore curatus fuit. Notando ergo est illius plantæ vis, & credibile est quod de Mustela ferrur, quæ à Serpente vulnerata ad hanc herbam accurens, curatur. *Petrus Borellus, cent. 1. observ. 27.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### De Serpigine.

**S**erpigo species est herpetis qui ἐν Σιουέρ-<sup>705</sup> τος dicitur, de quo vide supra, lib. 8. sect. 9. De Herpete.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Serpigine.

**P**ro Serpigine Puerorum maximè faciem occupante, hoc arcanum propo-

nam. Creta pulverizata, & misceatur cum succo semper vivi ad crassitiem linimenti, quo locus inungatur: statim exsiccat serpiginem & phlyctenas, eo remedio diu ante nos Chirurgus quidam *Delpensis* commodè in pueris utebatur. *Petrus Forestus, schol. observat. 5. lib. 5. Obs Chirurg.*

Ad Serpiginem caput occupantem tria hic præscribam diversa medicamenta, inter se paululum differentia quorum alteram altero efficacius erit, istis te uti ita velim, ut uno post alterum ex ordine illito, diligens observatio fiat quodnam utilius sit magisque conveniat; nam isto comperto, cum eo ad sanationem usque procedendum. Primum hoc sit.

24. Sulph. vivi ℥β. ceruss. ℥iβ. alum. crudi ℥. m. camphor. ℥. m. mercur. sublimat. gr. iv. aq. plantag. ros. an. ℥iii. vini sublim. ℥i M. S. A. Utere pro litu ad locum affectum cum penna. Alterum hoc esto.

24. Rad. lapath. acut. concis. & macerati in aceto ℥vi. rad. chelidon. ℥ii. alumin. usti, salis, an. un. i. m. camphor. ℥. m. dia. pomphol. axung. suill. an. vn. m. cum succo plantag. F. linimentum ducendum in mortario plumbeo diu; quod leviter illinendum. Tertium sit hoc.

24. Butyr. rec. infusli ℥i. m. succi rad. lapath. acut. concis. & macerat. in aceto ℥i. m. succ. rad. seroph. ℥β. coq. ad succor. fere consumptionem, tum adde ceruss. dr. i. alumin. ℥. m. camphor. ℥i. sulph. & thur. an. ℥. m. album. ovi numero i. subigantur in mortar. plumbeo ad formam linimenti. Addam & quartum, aquam nimium albam quam in serpigine comperi utilem, licet su. bacris videatur.

24. Alumin. crudi ℥i. ceruss. ℥iβ. camphor. ℥iβ. mercur. sublim. ℥. m. aq. vitæ & plantag. an. ℥ii. M. illinatur penna. Applicentur etiam folia pinguia crassulæ maj. est enim vere medica & salubris ad id genus affectus herba. *Reinerus Solenander, consil. 2. sect. 2.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### De Singultu.

**S**ingultus (Græce λυγμός, in λείψι singul-  
tio) est motus convulsivus ventriculi studen-



fludentis excutere quod sibi molestum est. Ejus causa est materia acris ventriculi orificium irritans & vellicans. Quidam volunt esse diaphragmatis & nequaquam ventriculi affectum, ex eo quod voluntarius esse potest, & omni tempore pro Inbitu excitari; ut plurimum tamen produci ab affecto prius ventriculo ab acris halitibus, vel flatibus, vel humoribus undecumque accedentibus, & quaunque demum via ad membraneum diaphragmatis centrum penetrantibus.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Singultu.*

**V** Ir quidam post febrem continuam & fluxum ventris ac vomitum incidit in singultum, huic cum ab omnibus pro deplorato haberetur, decoxi semina anethi, carvi, portulac. & papav. alb. in cerevisia tenuiore, ex quo decocto tantum unum cyathum bibens, miraculi instar, præter omnium opinionem à singultu liberatus est. Alius laborabat singultu per triduum, pro quo *Ioh. Tiengius* decoxit. M. i. sem. aneth. in nodulo ligati in pintis duabus cerevisiæ, quam æger bibebat calidè; prius tamen illum purgaverat. Post sumptum anethi decoctum, stomacho applicabat sequentes sacculos in aqua calefacta positos.

℥. Flor. cahamæ. melilot. aneth. an. M. i. organ. calamenth. rutæ, an. M. β. incid. & F. duos sacculi, quibus remediis cessavit singultus. Oportet in singultu curando causam prius animadvertere. Sic ille, qui in gultu habebat ex ventositate, sequenti remedio evasit.

℥. Philon. ℥i. diagalan. ℥ii. detur cum vino. Alteri & hoc sequens profuit.

℥. Theriac. opt. ℥i. pulv. dictamn. ℥β. exhibitum fuit cum vino.

Novi vetulam octuagenarium, quæ per semiannum subinde singultiebat; remediis nihil juvantibus, nisi devorato loco sano, quo se tantum juvari assererat. *Petrus Forestus*, obser. 12. lib. 18. *De Stomachi Affectibus*.

℥. Sem. aneth. ℥iβ. sem. papav. alb. sem. portulac. an. ℥iβ. M. fiat puppa quæ pen-

deat in cerevisia ordinaria, & fiebat hujus puppæ expressio, cum cerevisiam biberet, & singultus expressus fuit. *Idem*, obser. 29. lib. 6. *De Febris Epidemicis*.

A Febre acuta quidam singultu laborans capiebat sæpissimè ex julepo sequenti.

℥. Hord. mund. M. i. sem. quatuor frigid. mai. sem. papav. alb. an. ℥i. sem. portulac. lactuc. an. ℥β. sem. anif. aneth. fœnic. an. ℥i. flor. cordial. p. i. liquir. ras. ℥iii. coq. in aqua pro sibi. colatura aromatizetur cum spec. diagrid. frig. diarrhod. abbat. triasantal. an. ℥i. addendo syrup. viol. ℥iβ. syrup. acetos. citri, ex infus. ros. an. ℥i. M. F. Iulepus, quo singultus cessavit. *Idem*, obser. 31. lib. 7. *De Symptom. Februm*.

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Singultu.*

**S**ingultum hunc ob corrupti humoris acrimoniam & malignitatem in ventriculi tunicis residuam fieri statim collegi, quam ob causam pro ejusmodi materiæ evacuatione, tartar. vitriol. ℥iv. cum vino absinth. præscripti, quo laudabiliter operante, sed nec dum expultrice stimulatâ quiescente, julapium *Foresti* in hoc casu commendatum (cuius descriptionem vide Subsektionem superiore) ordinavi. De quo sæpius haustum concessimus, donec ad usum laudani opiatî accederemus, huius gr. iii. cum dr. m. theriac. & ℥i. Conserv. ros. permista dedimus, quo ipso ad miraculum usque periculosum symptoma cessavit. *Gregorius Horstius*, obser. 25. lib. 1.

Remedio est si puppa ex anethi semine ac papaveris potui immittatur. *Io. Heurnius*, ad aphor. 13. sect. 6.

Causa tollitur vomitu & purgatione. Inter purgantia hieram *Galenî*, qua non sufficiente, hieram *Pachis* summis laudibus extollo. Ubi vero symptoma maximè viget, ego summo cum successu diaphænico cum philonio romano uti soleo. Ab usu horum ad evacuantia insensibiliter est deveniendum, quæ cum motu, id præstant sunt sternutatoria, quorum materia satis nota est, quæ sine motu, sunt diatrion pipercon, diagalanga, sed præcipua sunt sal. theria-



theriacale, & sal absinth. quæ hic sunt magnæ efficacæ, quibus non conferentibus, ab usu olei ex calcantho in vino generoso dati non abhorrerem. Quando symptomata urget, ad medicamenta quæ ipsum respiciunt descendendum erat: ideo mivam cydon. simplicem atque aromatizatam laudo, sicuti theriacam, (vel quod magis probo) diagalangam, aut mithridatium cum philonio roman. castoreum etiam ex mulsa datum est præstantissimum, quod alligatum etiam ex *Tralliano*, veluti amuletum convenit. Medicamenta etiam externa in eundem usum sunt usurpanda; ideo profusio ipsius ventriculi facta cum oleo, in quo castoreum, styrax & mastiche, una cum vino cretico in duplici vase ad consumptionem vini coquantur, est maximi usus. Lini-mentum quoque ex mithridatio liquato in aqua ardenti mihi est ex usu, quibus non conferentibus una cum *Avicenna* sinapismos probo. *Jul. Cesar Claudinus, consult. 18.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Singultu.*

**P**uer annorum circiter decem de ventriculi dolore conquestus, sine ferè intermissione, idque per octiduum dies noctesque singultiebat, ad me adductus, aquam nucum viridium cum raphano in aceto prius maceratarum extillatam propinavi, qualem vomitionis excitandæ gratia exhibere soleo. Verum, etsi minimè vomuerit, tamen statim singultus desit, & cum noctem denuò haustum bibisset, ab hoc symptomate perverso penitus fuit liberatus. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 217.*

Chirurgus quidam æger factus, mox singultire cœpit, adeo continuatis vicibus dies noctesque, ut nec dormire, nec rectè loqui aut cibum capere posset ad extremum hoc pacto debilitatus, cum nil juvisset, & jam quasi in agone esset, dedimus illi non sine metu, ipso tamen summo opere rogante, vomitorium satis validum chymisticum, quod ad manus erat, unde immensam bilis æruginosa &

nigræ copiam evomuit aliquoties, cessavitque singultus, ipseque sensim convaluit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag. 218.*

Adolescens quidam febre hemitritæa correptus, singultu etiam perpetuo afficiebatur. Dedi vomitorium sequens.

℞. Radic. raphan. ℥ii. sem. atriplic. aneth. an. ℥i. F. decoctio in colat. ℥iv. dissolv. syrup. acis. simpl. ol. oliv. an. vñ. i. bibat & fauces irriter digito vel penna ut vomat. Jussu ventriculi regionem fomentare decoctione absinth. in vino, addito pulvere cariophyll. item ventriculo apponatur crusta panis in vino madefacta, & pulvere cariophyll. aspersa, cum longioribus jam intervallis singultiebat, dedi iterum tale vomitorium.

℞. Ol. amygd. d. vñ. iß. ol. aneth. ℥ii. aq. nuc. virid. vñ. iii. M. bibit, & denuo vomitio secuta est. Postea ventriculum inunxit ol. nucis mosch. & sumpsit Conserv. rosar. Deinde aliquoties purgatus tandem convaluit. *Idem, observ. lib. 2. pag. 314.*

Extra maximè convenit fotus ex aceto valde acri cum castor. piper. sinapi bene calido per spongiam ventriculo applicatus. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 27.*

Puellæ cuidam tredecim annorum singultu laboranti exhiberi jubeo calomelan. gr. xvi. diagrid. gr. viii quo solo remedio affectus in totum sublatus est eodem die. *Lazarus Riverius, cent. 3. observatio 42.*

Vir quidam febre maligna laborans gravissimo singultu & ferè assiduo torquebatur. Vocatus in consilium, laudani gr. ii. præscribo cum emulsione quatuor sem. frigid. maj. in qua salis prunellæ ℥i. dissoluta fuit; intra horam cessavit singultus, nec amplius rediit. *Lazarus Riverius, observ. 78. cent. 4.*

Etemporaneum pro singultu remedium est thoracis compressio. *Joh. Hartmannus, pract. Chymiatri. pag. 176.*

## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

*Pro Siti intensa.*

**E**piscopus Lodovensis cum per aliquot dies Arthriticis doloribus conflictatus esset,



esset, subito dolores valdè imminuti sunt, eodemque tempore febris cum corripuit, cum siti inextinguibili, ita ut postquam duos cyathos aquæ bibisset, sitis nullo modo imminuta appareret. Existimavi hos affectus provenire ex retentione humorum, qui ad articulos antea ferebantur. Ad horum affectuum curationem præscripsi clysterem laxantem & refrigerantem bis in die iterandum, tum etiam Phlebotomiam bis in die per biduum, & in singulis haustibus potus ordinarii, qui erat ex decocto hordei & graminis, dissolvebam salis prunellæ dr. i. spirit. vitrioli gr. xii. hisce remediis intra biduum sitis illa ingens extincta est, & febris admodum remissa, ac paucis postea diebus, blandis purgationibus, cum jusculis refrigerantibus, per intervalla usurpatis integrè restitutus est. *Lazarus Riverius, observ. 37. centur. 3.*

Vir quidam febre continua laborans, tam intensa siti vexabatur, ut crederet se esse unum ex bajulis illis *Parisiensibus*, qui aquam per urbem circumferunt, clamabatque diu, ac noctu sic (*de l'eau*) sed cum sitis ejus nullis potuisset extingui remediis, cessavit sumpta ʒiſs. salis prunellæ cum aq. communi. Alteri etiam eodem affectu laboranti idem profuit remedium, *Petrus Facheguns, observ. 24.*

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

### Pro Spasmodicis.

**M**ulier quædam in difficili partu convulsionibus corripiebatur, sanum tamen & salvum foetum enixa est. Postea spasmi manuum pedumque recurrunt eodem ferè horæ momento vespertino, quo primùm in partu invaserant, servantque statum istud tempus per plures hebdomadas. Consultus ego dedi Pulverem *Marchionis*, in aqua hirundinis & cerasor. paroxyfmo imminente circa vesperam in lecto sumendum, quo iteratis vicibus sumpto, à spasmodis liberata fuit. *Thomas Bartholinus, histor. 39. cent. 3.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### Pro Sphacelo.

**F**ermentum quod cerevisiæ calenti post quinque vel sex horas demitur, sphacelum sistit, experimento mulierculæ *Batavica*, quæ Pistori, cui sequenti die crus amputandum erat, fermento super linteam illito, non sine Chirurgorum admiratione summa, naturalem cruri calorem concillavit, continuatoque ejus per aliquot dies usu, ab omni labe miserum vindicavit: imminemtem ex frigore gangrenam facie cerevisiæ melioris extinctam in ancilla nostra vidi. *Thomas Bartholinus, histor. 41. cent. 5.*

## SECTIO VIGESIMA.

### De Sterilitate.

**S**terilitas (Græcè *ἄγονία* & *ἀτεχνία*) concipiendi est impotentia, partium genitalium, seminis, uteri, & sanguinis: menstrui vitio proveniens. Ejus causæ aliæ sunt internæ, aliæ externæ: internæ sunt, vel ex parte uteri, vel ex parte seminis & menstruorum vel ex parte habitus corporis. Causæ ex parte uteri, sunt ejus cervicis nimia angustia vel amplitudo, ipsius etiam uteri immodica intemperies, sive calida nimium; semen exurens, seu sicca supra modum, illud arefaciens, sive demum humida, ob fluorem album præcipuè, omnium frequentissimam sterilitatis causam; in uliginoso enim & madido utero semen germinare nequit. Præterea sterilitatem inducunt uteri tumores omnes, præsertim hydrops, ulcera item obliquitas, perversitas & oris ejusdem clausura ob malam conformationem, coarctatio etiam ab omento pinguiusculo. Seminis vitio impeditur conceptus, quando vel nullum est, vel paucum, vel intemperatum, aut aliena & inimica conceptui qualitate præditum vel quia semini virili inproportionatum existit. Sanguis item menstruus hanc calamitatem infert, ob ejus longam retentionem, vel immoderatum profluvium. Nimia denique corporis obæritas vel gracilitas hic etiam partes agunt.



agunt. His addunt Authores occultam quandam dispositionem, qua nonnullę Mulieres steriles redduntur, sine ulla manifesta causa. Causę externę sunt nimius motus, nimia item quies, passiones animi, coitus invitus, amor enim conciliat genituram, intempestivus & nimius concubitus, Pharmaca etiam conceptum impedientia, fascina per Diabolorum mancipia inducta.

## SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Sterilitate.*

**C**omitissa quędam primo Matrimonii anno Filiam peperit, postea annis penę duodecim sterilis permanfit. Subinde uterinis morbis divexabatur, nec menses decenter & ordine fluebant, ut curam illius susceperem rogatus, eam sic aggressus sum. Postquam itaque a mensibus repurgata fuerat, primũ facies hac ratione expurgata sunt.

℥. Catholic. ℥i. dissolv. in aq. meliss. & cichor. q. s. ut F. Potio, capiat. Altero die vena brachii aperta fuit, tertio, quarto, quinto, & sexto diebus continuis præparante hoc syrupo usa fuit.

℥. Rad. aper. in vino albo macerat. an. ℥i. rad. rub. ℥ss. artem. matricar. nepet. pulg. utriusque fumar. summitat. lupul. an. M. j. cicer. rubr. p. j. flor. bug. anth. leuconii an. p. j. sem. fesel. siler. month. fœnic. an. ℥ss. passul. ℥ii. F. decoctio, in colat. adde sacchar. q. s. aromatiz. ℥i. cinnam. & ℥i. santal. citrin. F. apozema pro quatuor dosibus.

Septimo denuo purgata fuit sic.

℥. Pilul. aggregat. ℥ii. aurear. ℥ss. cum vino malvat F. pilulę ix. Octavo, ut vires recolligeret, sumpsit hunc bolum.

℥. Conserv. rosm. ℥i. ras. ebor. ℥i. mosch. gr. ii. M. F. Bolus. Hisce peractis deinceps alternis diebus hoc electuario usa est bolum illius sumendo.

℥. Conserv. Satyrion. conserv. rad. eryng. an. ℥i. pistac. pinear. mundat. conf. flor. anth. an. ℥i. cortic. citr. condit. zinzib. condit. an. ℥ss. sem. cruc. bulbi, an. dr. iss. ras. ebor. dr. ii. coagul. lepor. ratur. cornu caprę, priapi tauri pulv. an.

℥i. pulv. diamb. diamosch. an. ℥ss. cinn. cariophyll. macis, nuc. mosch. an. ℥ii. cum syrup. conserv. zinzib. F. Elect. interim topica matricularia adhibui remedia, pessaria duo primũ, quę duabus noctibus in sinu uteri retineret.

℥. Spec. tripher. magn. sine opio, spec. benedict. agar. crasso modo triti, an. ℥i. sem. nigell. roman. ℥ii. cum succo mercuriali, F. Pasta, impleantur duo sacculi & utatur.

Cum instaret septimana, qua menses fluere debebant, saphenam aperiri iussi, & ut menses sic expectaret. Absoluta mensium purgatione curam denuo aggressus sum. Infectionem talem illi præscripsi.

℥. Rad. alth. M. ij. rad. valerian. enulę rubię maj. an. M. i. fol. majoran. artemis. nepet. chamędr. chamępit. fol. lauri, vinc. pervinc. puleg. origan. an. M. j. flor. chamęm. meliss. sambuc. an. p. ii. sem. lini fœnugręc. an. ℥i. sem. carvi ℥ss. bulliant in aqua adde lixivii mensur. ij. sedeat in hoc balneo noctu cubitum itura per horam unam, ventremque inferiorem ad umbilicum usque immergat calidę, dein egressa & absterfa calidis pannis, in sellam perforatam sedeat, in eaque fumum sequentem per quartam horę partem imo ventre excipiat.

℥. Troch. gall. & alipt. mosch. an. ℥ss. styrac. calam. ladan. benjoin. an. ℥iii. lign. Aloes santal. citrin. an. ℥iv. rad. pœon. ℥ss. mosch. ambr. an. ℥ss. cum laricea, F. trochisci pro fumo ponder. ℥ii. imponatur unus carbonibus, surgens ē sella & in lectum decumbens inungat regionem sub umbilico sequenti unguento.

℥. Ol. nardin. moschxl. an. ℥iii. pingu. ed. gallin. anser. an. ℥i. fol. lign. Aloes, zinzib. zedoar. an. dr. ii. macer. nuc. mosch. cariophyll. an. dr. iii. ros. stęchad. schęnanth. an. dr. m. castor. dr. i mosch. zibeth. an. gr. vi. F. unguentum, inungatur, & postea dormiat. Hunc processum balnei suffitus & inunctionis eo modo per dies septem continuet, verum duobus postremis diebus, postquam hisce usa fuerit, & in lectum se composuerit, pessarium hoc in sinum uteri immittat, totaque nocte retineat.



24. Mastich. dr. i. m. styrac. liquid. Div. cicer. rubr. dr. m. vitell. ovor. crud. q. f. F. duo Pessaria. Post usum postremi Pessarii, ea nocte corpus membraneum crassum, latum, & fibrosum rejecit, quod, quia inde mirè se levatam sentiebat, multis annis gestasse, & pondus & gravamen inde sensisse prædicabat. Jussi ab usu omnium medicamentorum absteret, donec mensium tempus præteriret, quod cum advenisset, nec menses fluere, statim se gravidam suspicabatur, jussi emplastrum sequens in pectinis regione noctu gestare.

24. Mass empl. pro matric. ʒi. de mastich. ʒ. m. hypocyst. acaciæ an. dr. i. ros. rub. dr. m. santal. omnium an. ʒi. styr. calam. benjoin. troch. gall. & alipt. mosch. an. dr. i. malaxentur oleo moschæleo, F. emplastr.

Ex nausea, vomitu & mensium retentione grvida esse quoque opinatus sum, nec me opinio fefellit; nam mox ventris & mamillarum intumescencia ejus rei fuerunt indicium siquæ post nata id confirmavit. Hæc cura laudem non exiguam mihi apud magnates peperit. *Felix Platerus, observ. lib. 1. pag 270.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Sterilitate ob uteri humiditatem.

24. **C**Innam. cardamom maj. croci, cariophyll. macis, cyperi, nuc. mosch. cumini, lign. aloes, piper. long. cass. lignæ, an. ʒii. cubeb. doricæ an. ʒiv. ambr. mosch. balsami an. dr. i. sacch. albiss. ʒbi. m. vini malvatic. aqu. bugl. & meliss. an. q. f. F. electuar. de quo capiat omni sero quando vadit dormitum cochli j. Est hoc expertissimum, quod cum hoc quod calefacit, exsiccat matricis humiditates, ad imprægnationem solemner disponit, & non solet me decipere.

24. Gallix mosch. castor. bdell. ladani coagul. lepor. nuc. mosch. an. ʒ. m. coquidiu in aqua, in qua lavetur aut suffumigetur cum ea.

24. Testiculum verri exsiccatum unum, testiculor. vulpis paria iv. testicul. lepor. par. v. galli para vj. matric. leporis x. cere-

bra passerum, 60. rad. pastinac. sylv. carfluorum, satyrionum, omnium cum sacch. conditor. ras. ebor. an. ʒii. m. cinnam. electiss. ʒiii. veretri tauri non nigri, pinear. dactyl. nucisindæ, an. vn. ii. piper. long. zinzib. flor. rorismar. an. ʒ. m. sem. fescel. dr. i. sem. urtic. cariophyll. croci, macis, galang. cyperi, nuc. mosch. cass. lign. cubeb. doricæ. nepit. sem. mercurial. masculi, fol. indi, mosch. ambr. an. dr. i. sacch. alb. dissolut. cum aq. nepit. ʒvi. F. electuar. quod prolificativum est mirabile à me expertum: utatur mane jejuno stomacho, & etiam quando intendit copulari viro. *Bartholomæus Montagnana, consil. 207.*

Purgato ut decet corpore, ego maxime comprobo hanc confectionem; si eius ʒ. m. cum vino generoso tribus vel quatuor diebus continuis jejuno ventriculo, ante mulieris cum viro concubitum propinetur.

24. Mosch. ambr. an. gr. iii. castor. dr. m. lign. aloes, cinnam. cariophyll. ras. ebor. an. ʒ. ii. spic. piper. long. an. dr. m. doricæ. zedoar. galange an. dr. i. sacch. vel mell. q. f. F. mixtura S. A. utilem etiam imò omnium efficacissimam hunc in usum confectionem nunc describendam inveni.

24. Satyrii ʒii. spec. diamosch. d. ras. ebor. an. ʒii. uteri lepor. sicc. & pulv. ʒss. succi salviæ depurat. succ. herb. tabac. an. ʒss. sacch. albiss. in aq. artemis. q. f. fiat confectio in rotulis: cujus ʒii. mulieri exhibeantur desinentibus mensibus, tribus diebus continuis hora una ante cœnam, superbibendo ʒii. vini generosi.

24. Zinzib. cinnam. spic. nard. an. ʒi. nuc. mosch. macis, benjoin. styrac. an. dr. i. cariophyll. ladani an. dr. m. castor. ʒi. cum terebinth. F. trochisci quibus uterus suffumigetur.

Si adhuc non concipiat, repurgatio iterum leniter corpore, guajaci decoctum triginta diebus aut pluribus accipiet in hunc modum paratum.

24. Lign. guajac. ʒv. falseparill ʒi. aquæ communis ʒix. infund. horis viginti quatuor. Deinde bulliant ad consumptionem medietatis; in fine add. artemis. matricar. salv. beton. an. p. i. coletur & usui servetur. *Job. Zecchius, consult. 67.*

Capiat sæpius in die de morsulis his conceptionem facilitantibus.

24. Rad.



24. Rad. fatyr. rec. eryng. an. dr. ii. pine. ar. mundat pistaceor. an. dr. ii. m. cortic. citri, zinzib. an. dr. i. sem. eruc. filer. mont. pastinac. syl. cineræ, an. ℥ii. coagul. lepor. priapi tauri, an. dr. m. cinnam. cariophyll. an. ℥i. cum sacch. ros. tab. solut. in aqu. meliss. ros. & bugl. q. s. F. confectio in rotulis. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 14. cap. 1. lib. 5.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## De Sterilitate.

**I**Nter alia si vino myrrhato, quod veteres in deliciis habuerunt, hoc tempore non careremus, infessos ex eo factos cunctis aliis anteferrem; sed si loco ipsius vinum generosum capiatur, eiq; myrrha, & aristolochia, artemisia, rosa, & cupressus incoquantur, atque ex ipso percolato infessus utero de more pareatur, magnam utilitatem esse sequuturam credo: sic enim simul & nimia humiditati, recentricis infirmitati, uteri oris obliquitati, & consequenter sterilitati succurri posse sperandum est. *Hieronymus Mercurialis, consult. 93. tom. 1.*

Peracta corporis purgatione, & muliere à menstruis mundata, statim mane & sero per duos dies sumat. hanc evaporationem, quæ mirabilis est, & nunquam vana est inventa nam mundificat matricem, & eam ad conceptionem disponit, & continet quam plurima simplicia juvantia manifestis & occultis qualitatibus.

24. Sabin. lauri, rorismar. fol. citri, matricar. menth. symbr. bistort. rad. petrosel. liquirit. fœnicul. aspar. meliss. absinth. origan. quatuor anodyn. salv. sambuc. matrisylv. an. part. æq. semin. anis. cumin. cubeb. galang. an. ℥i. bull. in aq. in vase benè obturato, & post accomoda embolum per cannam perforatam, & sumat fumum in utero. His pluries factis duobus diebus, coeat cum viro suo manè. Si adhuc non concipiat mulieri suffumigetur hoc mirabili suffitu manè & sero per duos dies à menstruis.

24. Mosch. ambr. an. gr. x. lign. aloë ℥ss. gummi olivar. dr. ii. cinnam. el. ℥i. myrrh. dr. m. gall. mosch. gr. xv. pulv. assafr. ℥ii. *Barnet Parte 1.*

terebin. & gummi pini, q. s. F. suffitus; Hoc facto, utatur nocte mulier hoc Pessario.

24. Pulv. liquir. & matric. lepor. exsiccat. an. ℥i. stercor. lepor. & cumini, an. ℥ii. spicæ, myrrhæ, & amomii an. ℥i. coagul. lepor. ℥ss. ladam q. s. contundenda cor. und. & in petia ligentur, & imponantur. Ad omnem sterilitatis causam valet ex *Democrito*, ut tam vir quàm mulier per aliquot dies bibant ad ℔ss. juris galli veteris cum dr. i. pulv. testiculi verris seu apri siccati in umbra; & est secretum rarissimum & valde expertum. Uterus leporis siccetur, & cum vino detur in potu, vel decocto assafras per decem dies, maxime cum à menstruis mulier est purgata; vel ex *Rhasis & Avic.* urina Elephantis mirabilis est, maxime de sero bibita cum mulier est vicina conceptui. Ad idem valet radix bistortæ vel imperatoricæ cum vino bibita plures dies: ad idem ex *Savonarolle* dens Pueri septem annorum in auro vel argento gestatus in brachio, vel lapis aquilæ. Ad eandem intentionem valent infra scripta simplicia, quovis modo sumpta, vel in pulvere, vel in elect. nimirum satyrion herba, radix lapathii, matris leporis, porci, rasura eboris, coagulum leporis & stercus ipsius, & vulpis, sem. fesc. pastinaca, urtica. Sic *Galenus 3. De remediis paratu facil. cap. 190.* Leporis uterum frige, tritamque assidue propina; cum stercore vulpis & sevo bubulo inunge mulieris virique genitalia. Mihi maximè familiaris est hæc conferva.

24. Pulv. ras. ebor. ℥i. pulv. fesel. dauci, an. ℥ii. coagul. lepor. ℥ii. conserv. borrag. & anthos, an. ℥ii. M. Post menstrua sumat mulier. Fœcundissimas quoque reddit mulieres, ut ex *Historiis Egyptiorum* habetur, haustus succi salviæ domesticæ ad ℥iv. cum modico sale, maximè post menses. *Epiphanius Ferdinandus, histor. 95.*

## SUBSECTIO QUARTA.

## Pro Sterilitate.

**S**ummæ efficaciz creditur secundina mulieris exsiccata & in pulverem redacta,



daſta, ac Zi. exhibita, alii pro ſecreto habent pulverem ex hepate & teſticulis porcelli, quem ſolum ſcropha edidit; eumque ſterilitatem arcere aſſerunt, tam in viris quàm mulieribus.

*Matthiolus in Dioſcorid.* Ammi ſemen prædicat his verbis; ammi legitimi ſemen, quod ex *Alexandria* aſſertur, mirificè præſtat ad mulierum ſterilitatem, nam compertum eſt hujus tantum ſeminis auxilio plures prolificas affectas: ſiquidem ſi propinetur mane Zi. pondere ex vino meracio, aut carniū jure intenuem pulverem contritum, alternis diebus, tribus horis ante cibum, futuram pollicetur prolem. Sed oportet maritum cum uxore rem habere iis tantum diebus, in quibus illa ſemen non ebiberit.

In quibus mulieribus viſcerum calefactio timetur, raſura ebor. erit utiliſſima ad Zi. cum vino albo ſumpta, per quatuor aut quinque dies poſt purgationem menſtruam. Eſſentia ſatyriionis hic maximè excellit, ſi ea ad Zi. vel ii. uſque ad Zi. in vino malvatico exhibeatur ejusdem etiam ſal valde efficax eſt ad Zi. cum vino malvatico poſt purgationes menſtruas exhibitum.

Aqua ſtillaticia ſequens eſt valde efficax.

℥. Cinnam. cariophyll. nuc. moſc. mac. an. Zi. cubeb. piper. long. galang. zedoar. ſem. ammeos, ſeſel. an. ℥. gran. juniper. dr. i. vini albi generoſi, aq. roriſmar. majoran. meliſſ. an. q. ſ. ſtent in digeſtione per ſex dies, poſtea deſtillantur, ac mane & veſperi cochlear. i. vel ii. exhibeantur. *Lazarus Riverius, prax. medic. lib. 15. cap. 15.*

Sterilitatem experimento abolet, teſte *Mermannuo*, hoc vinum medicatum.

℥. Lign. indic. lb. ſar. parill. Zi. ſaſſa. fr. rad. chinæ, liquirit. an. ℥. cortic. lign. dr. v. turbith. dr. iii. rheiel. dr. ii. fol. ſen. Zi. zinſib. cal. arom. an. dr. i. rad. ſireos dr. ii. flor. veronic. beton. an. M. i. affund. vini rhenani lbx. & bibat quotidie lb..

Vel præmiſſis, purgationibus, & balneis, & ſuffitu, &c.

℥. Ol. nardin. moſchæl. an. Zi. ol. cheirin. dr. x. ſpec. diamb. diamoſch. d. ſtyrac. liq. an. dr. ii. Ambr. moſch. zibeth. an. gr. iv. cum pauca cera. F. linimentum, quo uteri

regio illiniatur. *Vvolfgangus Hæſernus, Herc. Med. lib. 7. cap. 2.*

*Lemnius* refert obaſas mulieres ſale vegetabili deſtituta ſteriles, moderato ſalis condimento ſæcundas fieri. *Idem, lib. 2. cap. 1.*

Imprimis hic utiles ſunt thermæ naturales ſulphuræ, bituminosæ, aluminosæ, nitroſæ, ad quas plerumque ſeminæ ſteriles tanquam ad Aſylum confugiunt, & quidem ſæpe non ſine fructu. *Daniel Sennert. præſt. lib. 5. part. 2. ſect. 4. cap. 2.*

Pilularum ex terebinthina uſus vere & autumno, frequenter ſatis ex uſu, ſterilitati medetur. Nobilis mulier Medicorum conſilium ſecuta, hac arte & ingenio ſterilitatem vitaffe ſe affirmavit: frequenter devorabat pilul. unam ex tereb. optima præſertim incunte vere, per tres menſes, & exacta æſtate, initio autumni, per tres alios menſes: quod creditu non eſt difficile; maximas enim dotes & opportunitates terebinthina eſt conſecuta: ut facile in pilul. formam reformetur, in decocto conveniente elixanda eſt, ut facilius ducatur, & conſiſtentiam acquirat formandis pilulis utilem. *Guil. Ballonius. conſil. 30. lib. 3.*

Mulierem, quæ nunquam conceperat, quamvis innumeris medicamentis uſa eſſet. *Joh. Veſlingius*, à morte ſectam, vidit tumore uteri laboraſſe, membrana propria materiam ſebo ſimilem continente, quem ideo inter ſterilitatis cauſas merito referendum cenſebat; ejusmodi ſteatoma uteri fundo adnatum viſum quoque notavit. *Joh. Rodius, cent. 3. obſerv. 46. Georg. Hieron. Veſſchius, obſervat. 72.*

Mulieres quædam, quæ per multos annos ſine conceptione ſteterant, frequenti uſu balnei & electuarii ſequentis tandem imprægnatæ ſunt.

℥. Fœnugræ. lb. ſ. artemiſ. ſicc. Zi. beton. nepitæ, majoran. an. ℥. avellan. roſtar. lb. i. zinſib. cinnamom. cariophyll. piper. long. gran. paradys. an. Zi. nuc. moſch. nuc. cupreſſ. an. dr. ii. moſch. fini Zi. mell. deſpumati lb. ii. F. Electuar. quo utatur mane & ſero. *Arnoldus de Villanova Tractat. 2. de Sterilit. cap. 8.*



## SECTIO VIGESIMAPRIMA.

## De Sternutatione.

**S**ternutatio (Græcè Πτερνυσι in πτερνυσθαι sternuo) est flatuosorum spirituum, acriumque vaporum cerebrum offendentium violenta & involuntaria per nares expulsio. Causæ internæ sunt humores, & vapores à cerebro ad nares delabentes. Externæ verò radii lucentis Solis, vapores è cepis, allio, sinapi, raphano, &c. & medicamenta ptarmica naribus admota.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Sternutationem molesta.

**J**ussi ut per nares sæpe attraheret lac tepidum, quod cum ter quaterve fecisset, miraculi instar, statim cessavit sternutatio. Credebam enim ex acris Catarrhi descensu ad nares sternutationem irritari, neque mea opinio me fefellit, nam ex lacte tepido per nares attracto, falsedo & acrimonia quæ nares pungebat, mitigata fuit, & sternutatio molesta ablata. *Petrus Forestus, observ. 127. lib. 10. De Cerebri morbis.*

## SECTIO VIGESIMASECUNDA.

## Pro Stomachi ardore.

**C**uratio hujus mali duobus perficitur: Primum est, ut ardor ille sedetur; alterum, ut causa tollatur, ne idem malum revertatur. Prius perficitur iis quæ fervorem humorum temperant, & ebullitionem tollunt; unde datur conserva rosar. fructus acidi, & eorum succus, ut malum citrium, granatum, berberis, vinum absinthites, panis medulla, aceto, & alius succis acidis imbuta. Vel, ʒi. Conserv. ros. vitriol. ʒss. cydon. condit. ʒii. rob. ribes ʒss. spec. diatrion. santal. diarrhod. abbat. an. ʒ. m. syrup. cydon. q. s. F. Electuar.

Imprimis verò utilia sunt quæ istam ebullitionem tollunt, humorem quasi imbibendo & præcipitando, vel ut facilius

deserveat, faciendo, aut ejus qualitatem tollendo; in quem finem præcipuè commendatur creta alba, quam vulgus etiam inter ὑπόριχα numerat, nux mosch. bolus arm. oculi cancri, C. cervi, lapides carpio-num, grana thuris. Hinc sequentia commendantur.

ʒi. Nuc. mosch. ʒi. cretæ ʒii. sacch. ʒiii. F. pulvis, dosis ʒss vel ʒi.

ʒi. Nuc. mosch. macis, rosar. an. ʒss. sacch. alb. ʒi. cretæ ʒii. F. Pulvis. Vel,

ʒi. Nuc. mosch. ʒss. croci gr. ii. C. cervi usti ʒii. cret. ʒss. sacch. in aq. portulac. dissolut. q. s. F. rotulæ. Vel,

ʒi. Cretæ ʒi. bol. arm. ʒii. ros. rub. margar. præp. an. ʒss. macis ʒi. sacch. alb. in aq. dissolut. q. s. F. Morsuli. Vel,

ʒi. Conserv. ros. vet. ʒi. ocul. cancri præp. bol. armen. an. ʒx. cum syrup. conf. nuc. mosch. F. Electuar. *Daniel Sennertus, prætic. lib. 3. part. 1. sect. c. 16.*

## SECTIO VIGESIMA TERTIA.

## Pro Stomachi dolore.

**A**Dvium quendam accitus stomachi dolore vehementi laborantem, cum decoctum flor. chamæm. in cerevis. communis præbuissem, emissis ructibus, & in sudorem solutus, incantamenti instar omnis dolor evanuit; ut nullis aliis præsidiiis opus fuerit uti. *Petrus Forestus, observ. 20. lib. 18. De Stomachi Affectibus.*

Præceptor meus *Elidaus* hoc sequenti medicamento utebatur.

ʒi. Electuar. de dactyl. seu diaphænic. ʒss. philon. rom. ʒii. cum aqua chamæm. fiat Potio. Hoc etiam in simili casu adhibuit.

ʒi. Elect. diaphænic ʒvi. philon. rom. ʒi. aq. flor. chamæm. ʒiii. F. Potio.

Nos mulierem quandam simili dolore correptam, cum elect. diaphænic. & alia non iuvarent, hoc solo foru curavimus.

ʒi. Rad. alth. ʒss. flor. ros. rub. chamæm. summit. absinth. an. M. i. coq. in aq. chamæm. & aq. communis, q. s. pro ʒiss. in fine addendo vini Rhenens. opt. aq. ros. & acet. an. parum. F. Fucus; quo omnis dolor cessavit; adeo illud medicamentum



approbavit; ac divinum appellabat ut memoriae inscriberem, ut alios simili malo laborantes à dolore curarem. Alia etiam mulier dolore stomachi intolerabili cruciata, post remedia universalia, hoc sequenti fotu ab omni dolore incantamenti instar fuit liberata.

℥. Absinth. commun. & roman. flor. chamam. ros. rub. menth. exsicc. an. M. i. sem. sumach. myrtillor. an. ℥. m. flor. melil. p. i. coq. in aq. pro lbi. m. colat. adde spec. diarroh. abb. ℥ii. m. aromat. ros. ℥i. aq. ros. ℥ii. aceti ros. ℥im. iterum semel bulliant, & F. fots pro ventriculo *Petrus Forestus, observ. 23. lib. 13.*

De expertis ad stomachi dolorem est hoc.

℥. Pulv. Cariophyll. ℥ii. aq. decoct. organ. ℥iii. sacch. alb. ℥i. detur calidum in potu in aurora. Solet sedare stomachi dolores, & singultum à frigido provenientes. *Barth. Montagnana; cons. 10.*

Pro stomachi dolore causato à jecoris fervore, & ventriculi algore, nullum mihi tutius medicamentum videtur rheo; quod & crudam pituitam & bilem clementer expurget, obstructionsque mirifice summoveat, quare sibi saltem in mense bolum ex rheo ℥i. & tantundem spec. hier. gal. melle rosato solvente paratum devoraverit, nulla purgatio tutior efficaciorque deprehendetur ad doloris præcautionem. *Joh. Zecchi, cons. 55.*

Qui de oris ventriculi dolore conquerebatur, vires effœminatus evomere non potuit. Caterum ab injecto clystere, quo alvus rectè respondit, ℥iii. aquæ florum chamamelicalidæ bibit, à cujus potione dormivit, & optime valere dixit. Et sanè destillati chamamelis aqua pro leniendis ventriculi & intestinorum doloribus præcipua medicina. *Amatus Lusitanus, curat. 39. cent. 5.*

Pro stomachi inflatione. Ego aqua zedoariæ, observatis observandis, frequentissimæ utor, & sic mulieribus & virginibus hystericeis pariter succurro. Addo, suavitatis gratia, man. chr. per *Vvolfgangus Hæferus, Herc. Medicin. libr. 3. cap. 1.*

Aqua zedoariæ ita fit.

℥. Zedoar. lb. i. excorticetur; & incid. adde anisi lb. m. vini mensur. ii. Stent per

14. dies. F. destillatio in B. M. Reiterata vice superaffundo primam destillationem. De hac aqua, urgenti admodum ventriculi inflatione, capiat cochl. i. ut etiam lipothy-miis & cordis palpitatione supervenientibus. *Gregorius Horstius, libr. 5. observat. 1.*

## SECTIO VIGESIMA QUARTA.

### Pro Stomachi Exulceratione.

**C**um aliquando vir quidam ab imperito Medico purgantem medicinam hausisset, cui ad accelerandam evacuationem acria quædam & erodentia fuerant admixta; tantus dolor ventriculi ortus est, ut trium hebdomadum spatio per os nihil fere sine immani loci exulcerati dolore assumere potuerit, & fame pene enecaretur; Medicis incassum laborantibus, tandem quod propria ratio & experientia suggerit, usus est tragacantum aq. flor. rorismar. misso, cujus fragranti tenacitate ulcus consolidatum, & multos postea annos vixit incolumis. *Thomas Bartholinus, histor. 21. cent. 6.*

## SECTIO VIGESIMA QUINTA.

### Pro Stomachi imbecillitate.

℥. **C**assia ℥β. spec. hier. ℥iii. cum sacch. F. bolus, sumat in aurora, nullum est medicamentum præstantius adducendos vitiosos humores in ventriculo hiera ipsa. Sequenti die pro præparatione humorum sumat in aurora ℥i. oxymel. simpl. postea reiteretur bolus hieræ, præterea pro roborando ventriculo externis utatur hoc linimento.

R. Ol. nard. mastich. an. ℥i. m. vini gener. ℥ii. bulliant ad consumptionem vini; deinde adde pulv. mastich. cinnam. pulv. absinth. an. ℥i. cum cera. F. linimentum; quo illinatur stomachus ante cibum. *Roder. à Fonseca, tom. 1. consult 67.*



## SECTIO VIGESIMA SEXTA.

## De Stranguria.

*Σπινθηρία* (in *σπινθηρία* gutta & *σπινθηρία* urina) est urina guttatim facta cum vel sine dolore & continuo ad mingendum stimulo, excretio: Causæ sunt humores acres, calculus, intestini recti, uterique inflammatio, pus à renibus ad vesicam transmissum, quæ omnia expultricem vesicæ facultatem, propter affectum: sphincterem, stimulo, hunc introducunt affectum: causæ externæ vini, cerevisiæque sæculentæ potatio, crudorum alimentorum leguminumque esitatio, &c. mixtus est affectus ex ischuria & dysuria.

## SUBSECTIO UNICA.

## Pro Stranguria.

**M**ihi adhæsit Stranguria cum insigni dolore, ultra tres septimanas & nihilque juit, ac decoctum malvæ cum syr. viol. quo alios multos postea simili malo laborantes curavi. Verum cum postea urina facile efflueret ob debilitatem vesicæ nimis fortasse relaxatæ, à decocto illo abstinui; & vesicam roboravi inunctione olei myrtæ & mastich. *Petrus Forestus, obs. 4. lib. 25. De vesicæ morbis.*

Quidam stranguria laborans, consulente *Antonio Harvero Medico Hagbano*, brassicam rubram decoxit cum jure vervecis, coque jure utens, insperso paucis pulvere nuc. mosc. curatus fuit; fortè ex frigidityte hoc malum contraxerat. Chirurgus *Harlochiensis Delphensis* hoc modo stranguriam tollebat.

℥. Fol. chamæ. thymi an. q. s. fol. fenæ ℥ii. coq. in aq. chamem. hujus expressionis cyathum propinabat: ad causam frigidam rectè valere arbitror: verum Pharmacopæus meus, cum aliquando stranguriam pateretur, ex largiore potu vini; capiebat aquam rosac. cum album ovi concussam, ad medium scutellæ ebibebat, quo seipsum, tum alios curabat: alius cum modo stranguria afficeretur, ex mulierculæ consilio decoxit flor. chamæ. cum lacte bubulo; & ita seipsum curavit, lac ar-

*Burnet Parte I.*

dorem mitigabat, & flores chamæ. lotium provocabant. *Petrus Forestus, observ. 23. lib. 25.*

Mihi semper profuit vinum rhenanum ad stranguriam propter recentem cerevisiam illatam: quod si in pagis degens, ubi vinum non esset, apud ægros, cogebar cerevisiam bibere recentem, sumpta nuce myristica, ab hoc malo levabar: cum ex cerevis. rec. stranguriam quidam incurrisset, solo sevo candelæ umbilico inuncto, se ipsos curabant: alii solo cochleari oxymel. epoto, id malum a se depellebant: sed & foliorum ribes nigræ odor, multoque magis eorundem decoctum id vitium emendare expertum habemus. *Idem, observ. 2. lib. 25.*

Stranguriam lapides cancerorum sanare docet. *Joh. Helmontius, tractat. à sede anima ad morbos.*

Datur decoctum malv. & emulsio 4. sem. frigid. & papav. alb. *Joh. Heurnius apher. 22. sect. 3.*

Manè & principio mensæ utatur hoc potu ordinario.

℥. Sem. alth. malv. ad ℥iii. cicet. rubr. rec. ℥iii. sem. 4. frigid. maj. an. ℥iii. hord. mund. p. ii. caric. ping. numero 9. sebest. rec. numero 7. liqu. ras. ℥vi. F. decoctio in aqu. lib. v. ad medietatis consumptionem, quotidie manè & vesperi ℥ss. saquentis pulv. admittat.

℥. Trochisc. alkengi cum opio ℥iii. oculi cancri ℥i. sacch. penid. ℥ss. M. F. pulvis superbibat de hoc liquore.

℥. Syr. viol. iujub. an. ℥ss. spirit. terebinth. gt. v. aq. parietar. viol. alth. an. ℥ss. M. pro mitigatione doloris penem affligentis, hoc fomento utatur.

℥. Flor. malv. verbasc. viol. alth. an. M. i. sem. lini fenugræ. an. ℥ss. farin. fabar. ℥ii. coq. in s. q. lactis vaccin. pro fotu. Hoc verò inungatur.

℥. Mucilag. sem. lini fenugræ. extract. cum aq. portulac. an. ℥ss. pomac. opt. ℥ss. vitell. ovor. numero 2. camphor. ℥ss. opii gr. v. butyr. rec. & insulsi q. s. F. linimentum. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 9. cap. 5. lib. 4.*

Vir senex 81. annorum, cum juvenis esset, nec non, post vini potatione delectabatur, sed haud alterius quam *Rhenani*, cujus



subinde multas amphoras bibere poterat citra ebrietatem. Hic post sexagesimum ætatis annum temperantius vixit; præteritis verò octoginta vitæ annis, etiam quam antea parcius multò, & rarò admodum vino *Rheneno* usus. Tandem verò nec bibere citra offensam potuit: Si quando enim *Rhenanum* eum bibere contigebat etiam in exigua quantitate, ne copiosè, mox illi urinæ stillicidium valde molestum fuit. Ab aliis vinis, ut *Gallico*, *Hispanico*, aut rubro, non offendebarur. Repertum fuit remedium, sed quod non nisi præsentī malo succurreret. Quotiescunque enim ad *Rhenani* vini potum revertebatur, mox iterum urinæ stillicidium accedebat. Profuit tandem ex ovorum testis in cinerem reductis & vino *Rhenano* permixtis lixivium, quo vel semel assumpto, deinceps vino *Rhenano* ad extremum usque diem innoxie uti potuit. Supervixit, postquam liberatus à stillicidio urinæ esset, annos duos aut tres. *Rembertus Dodonaus*, observ. 48.

## SECTIO XXVII.

### De Strumis.

**V** Ide supra Sectione Octava. De Scrophulis.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Strumis in collo.

**P** Ræmissis debita purgatione & venæsectione hoc topicum adhibeatur.

℞. Lentium cum aceto excoctar. ℥iv. succ. apii, depur. ℥ii. sem. coriandr. ℥ii. cum adipe porci masculi F. cataplasma extend. super lintea, & bis in die affectis locis applicetur. Item.

℞. Pulv. fol. & rad. tussilag. vn. ii. farin. sem. lini ℥i. cum adipe suillo F. cataplasma. Interim ut electuarius nostrum in hunc usum maximè probatum sumat etiam atque etiam hortamur: est tale.

℞. Ossium gallin. elixat. ossium vertebr. human. an. ℥. m. troch. de viper. ℥ii. scord. margarit. an. ℥. m. mell. despumat. q. s. F. electuar. sumat bis in die ad ℥ss. manè &

vesperi dum it dormitum. *Job. Zecchini*, consult. 70.

Lenita alvo melle rosato solut. & manna, vel hiera *Gal.* cum cassia, humores sunt præparandi decocto rosmar. betonic. borrag. scrophular. adiecto syrup. de beton decichor. & oxymel. simpl. postremo humores sunt deturbandi infuso agar. & rhei, vel catapotis cochiis, demum exhibeatur decoctum ligni sancti cum roremar. scrophular. cichoraceis & santalis albis per plures dies. Pro tumore resolvendo laudo maxime emplastrum, diachyl. magni ireati: si in suppurationem abit, applicetur dachylon gummatum: facta suppuratione, apertoque loco, ad mundificationem, à melle cum pulvere myrrhæ & irecos, vel ab unguento basilico & apostol. non est recedendum quo in casu nec pulvis asphodeli aut floris æris improbatur, mox pro implenda carne uti licebit unguento diapompholig. vel de beton. vel isidis; tandem ad cicatricem obturandam utatur unguento infra scripto, quod est sepius in frequenti usu clarissimis viris.

℞. Ol. laurin. aq. vitæ ceruss. pulver. an. ℥i alumin. ℥i. salis commun. ℥ii. M. F. unguentum. *Jul. Cesar Claudinus*, consult. 112.

### SUBSECTIO SECUNDA.

#### Pro Struma coxa innata ingentis magnitudinis.

**M** Uliorem quandam struma coxæ innata multos annos miserabiliter vexabat. Adeam jam magnitudinem excreverat, ut occupante ea coxam ipsam acrus, ambulare non posset; quo factum ut jam quinquennio misera in lecto jaceret: nec ex Medicis ullus inveniebatur, qui aut ferro aut alio quovis medicamento tollere tam ingens malum auderet: quare omni spe destituta, me cum juniore adhuc essem ad se vocans, operam nostram deposcit; lachrymis urget, & precibus, ut quamlibet miserabile, aliquod tamen ei præsidium afferam mori se malle quam in tanta miseria & calamitate vitam ducere: moverunt me, fateor, infelicis mulieris



lieris lachrymæ: ac propterea rem sanè arduam, & quam nullus qui saperet attentasset, aggressus, strumam ipsam ea potissimum parte, qua coxæ pendeat, vinculo deligo: & quoniam refecanda crassitudo palmo plenior erat, singulis diebusque diebus vinculum ipsum arctiusnecto, donec pars media refecaretur: tum cadenti ferro, quod superest scindo, sanguinem supprimo, & mulierem ferrè mortuam resumens mollicubiculo recreo; ac curiosa dein observatione, idoneisque medicamentis ritè procedens, divino tandem auxilio eam in pristinam sanitatem reduco. Tanta aurem fuit præcisæ carnis moles, ut pondus 60. Librarum excederet. *Antonius Benvenius, cap. 14. lib. De mirandis morborum & sanationum causis.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Strumis.

**P**ost venæsectionem & purgationem moveatur pars affecta spongia in aqua calcis expressa & arte alligata per decem dies, excipiatursuffumigium ex lapide pirite extincto in aceto fortissimo, bis in die per intundibulum cujus tubulus totum tumorem contineat; postea applicetur emplastrum de *Vigo* quadruplicato mercurio, cujus singulis uncis addatur vitrioli romani ℥i. & ammon. in aceto soluti. *Lazarus Riverius, obs. 76. cent. 1.*

Virgo quædam decem annos nata tumores duos & strumosos patiebatur in tribus digitis, qui curati fuerunt suffitu aceti supra filices candentes coniecti mane & sero per mensem integrum continuato, hoc remedium à *Galeno* miris laudibus effertur ad tumores scyrrhosos discutiendos. *Samuel Formius, observat. 49.*

Puella quædam quatuor annos nata laborabat scrophulosis tumoribus circa collum & aures valde eminentibus: consuluit aliquis parentibus ipsius, ut eam pediculis corripere sinerent, qui tandem ulcera toti capiti inferre possent, per quæ materia morbifica, humor scilicet pituitosus in magna copia ritè evacuatus est per aliquot menses; & ægra tandem liberata

fuit absque alio remedio. *Simeon. Iacoz. observ. 20.*

Armoricos quidam à pluribus annis strumis circa collum & sub utraque axilla laborans tandem ab Illustriss. *D. Gab. Harduino* de *Sain Jacques* nosocomii charitatis *Lutetiani* Medico ordinario in hunc modum curatus est. Præmissis universalibus cataplasma ex foliis cucumeris asinini seu juscule contusis, partibus tumentibus admovit; præscriptaque dieta tenui, nec non modico exsiccante, altera die opiata sequens præscripta est.

℥℥. Turbith. hermodact. an. ℥ii. rad. utriusq; scrophular. ℥i. rad. angelic. ℥ii. fol. senæ ℥℥. scammon. crudi ℥iv. f. omnium pulvis, & excipiatur cum syr. ros. pallid. dosis ℥ii. addendo cuilibet, mercur. sublimat. dulci gr. xx. qua alternis diebus per xv. dies repetita, nec non renovato cataplasmate disparuerunt tumores omnes scrophulosi, absque sectione, aut eradicatione ulla: & sic sanus & incolumis evasit *Lazarus Riverius, observ. 10.* Inter observationes hinc inde decerptas.

Novi plures qui in strumosis tumoribus digitalis floribus valde confidunt: quos quidam in butyro maiali quot possunt immittens curant insolandos per æstatem; alii cum adipe porcino miscent; & sub terra defodiunt per quadraginta dies. Utrique flores cum unguento reservant, una lintheis inducunt & tumoribus applicant: hosce tumoribus discutiendis vel maturandis ulceribus detergendis vel explendis sufficere, ferunt expertos; quinto & sexto quoque die diacarthamo purgant, interim continuo decoctum herbe robertianæ præbent: pars ulceris rubens parte unguenti tenuiore inungatur; pars autem unguenti crassior lintheamini imponatur, quod nunquam mutetur: sunt qui novella & primò erumpentia plantæ digitalis germina accipiunt, eorumque succum expressum in butyro coquunt ad succi consumptionem; atque hoc novo succo addito bis terve repetunt *D. Bates* referente *Joh. Rajæ, Catalogo Plantar. Angliæ.*

℥℥. Fol. lamii albi M. i. calefiant. inter duos lateres calidus, & tumori applicetur: eum unius noctis spatio ut plurimum aperit. Electuarium flor. genistæ pulv. &



melle rosato exceptum ad scrophulas expertum, si eo quis utatur continuo. *Ioh. Rayus, Catal. plantar. Anglia.*

Homines fide digni observarunt strumas aliosque tumores aboleri, si pars affecta affricetur ad manum cadaveris humani, ita enim sensim evanescere tumores, prout sensum putrescit cadaver; quo tardius hieme; citius aestate contingit. *Thomas Bartholinus, Histor. 66. cent. 3.*

Nos pluries vidimus, praemissis universalibus, brevi tempore & faciliter strumas curatas, non alio medicamento, quam aloë, si nempe ipsius tolia (praesertim, aestate, tunc enim abundant copioso humore) sub cineribus calidis aliquantisper posita, per longum & per medium dissecta super strumas quotidie apponantur. mundant etenim & abstergunt ulcus, humorum putredini summo opere resistunt & vulneraria facultate praedita citissime ad sanationem perducunt. *Dominicus Panaxolus, obs. 22. Pentecoste 4.*

Sequenti remedio plures unico mense strumae evanuisse praegrandes vidi: ac subito praefocationem à venenoso fungo illam curari.

℞. Spongiae marinae in carbonem combustae ℥iij. ossis sepiae usti, piper. long. zinzib. pyrethr. gallar. salis gemmae, calcis testarum ovor. an. ℥i. M. cum aqua stillata ex praefatis spongiis. & exsicceetur paulatim. Accipe hujus pulveris ℥ss. decresciente Luna ut paulatim liquatus deglutiat, vel fac illinctum & boccium disparebit: alii defectu spongiae sumebant pilosam excrecentiam sylvestribus rosetis innascentem, exteriori cortici castaneae persimilem hirtam hispidamque, cujus solius pulvere utebantur feliciter. Item usus sum hoc unguento in strumis & schyrrhis.

℞. Ol. laurin. ℥viii. oliban. mastich. gummi Arabic. resin. abiegn. an. ℥ii. destillatum iterum destilla cum cineribus clavellatis. *Ioh. Helmontius, tract. cui tit. Tartarus non in potu.*

## SECTIO VIGESIMA OCTAVA.

### De Studendi modo.

**P**ost prandium quiescas à studiis donec tres horae elapsae fuerint, neque post

eam studiis incumbas; siquidem in multam noctem studia protrahere, & matutino tempore in lecto stertere, non solum fluxiones parit, verum etiam ingenio officit. *Jo. Crato, consil. 13. lib. 4.*

## SECTIO VIGESIMA NONA.

### Pro Sublimati veneno.

**V**ir quidam famulam percussis, quæ ira percita, hinc inde vindictam querens in mentem revocat suam dominam sublimatum cum argento vivo profucandis genis coxisse, ac in mortario sub lecto reposuisse, ad quod accedens, ejus portunculam ℥ss. pondere accepit, quam duobus pullis prandio destinatis, altero verò elixo, clam indidit: ex quibus cum herus ac uxor uterum gerens, filii & servi, simul & catu quidam comederent, omnes in vomitum & symptomata gravissima inviderunt; quibus pertotum illum diem ac sequentem noctem miserè laborarunt: vocatus ego, videntque omnes angi, ac in vomitum pronos, causam unicam ac communem omnibus esse dixi, eamque venenum fuisse certuseram: proinde nulla data mora ad evomentia medicamenta confugimus; inter quæ numerare licet lapidem bezoar, sed præcipuum vomitorium, & quod inter cætera palmam obtinuit, ut experientia tunc deprehendi, fuit aqua namphæ, cujus, singulas libras tepidas bibendas propinavimus, à cujus potu omnes multa evomuerunt, & melius habere visunt: At postquam satis evomuerunt, ad theriacam devenimus, & hoc conditum.

℞. Conserv. acetos. citri ℥iv. smaragd. ℥ii. scordii. ℥ss. terr. lemn. ℥iii. M. & cum syrup. de acetos. citri F. conditum & jusculis pinguibus, nonnullis etiam adhibitis clysteribus, veluti cordi ad motis epithematibus, sanitati intra triduum fuerit restituti. *Amatus Lusitanus, cent. 1. curat. 64.*



## S E C T I O XXX.

## De Suffocatione uterina.

**V** Ide supra lib. 8. sect. 15. De hysterico affectu.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Suffocatione uteri.

**G** Albanum dissolvimus cum modico aceto, & in corio rotundo extendimus, & umbilico mulieris apponimus: hoc remedio infinitas præfocatas curavimus, & à paroxysmo excitavimus: pessus etiam in hunc modum paretur.

℞. Gall. mosch. ℥iij. cinnam. foli. macis, earyophyll. an. ℥i. ambr. mosch. an. gr. iij. ladan. styrac. an. q. s. cum aq. ros. mosch. F. veluti suppositorium utero indendum. *Petrus Forestus, observat. 1. & schol. lib. 27, De morbis mulierum.*

Cum viderem virginem suffocatione uteri ex femine retento miserè torqueri, imperavi ut emplastrum contra matricem quo nos uti solemus, pudendo muliebri apponerem, quod cum fecissent, illico ad miraculum cessavit uteri suffocatio: Emplastri nostri hæc est descriptio.

℞. Gall. mosch. alipt. mosch. styrac. calam. ladan. puriss. mastich. an. ℥i. xyloaloes, xylobalsam. carpobalsam. galang. cyper. an. ℥iij. ros. rub. ℥iij. ceræ novæ lbj. pulver. pulverizentur & cum terebinth. q. s. F. emplastrum ut artis est; huius accipio vn. i. & obduco in circuitu galbano in forma rotunda, & umbilico appono; & inveni sæpe magnam utilitatem quotidiana experientia. Alia muliere suffocatione uteri laborante, cum neque emplastr. contra matricem, neque male olentibus naribus admotis excitari potuerit, tandem nos vocati plumas perdicis ustas naribus admovimus & mox ad se rediit: postea etiam eodem malo subinde recurrente, semper eodem remedio fuit restituta; tales igitur plumæ pro quadam proprietate juvant; quare cum aliæ plumæ combustæ idem tam effica-

citer non præstant, has semper deinceps paratas habere volumus. Quædam puellæ nobiles pello ex tymo cum panno lineo subdito, à paroxysmis illico restituta sunt. Ad idem valet pessus ex floribus rorismar. Novimus alias sola masticatione sem. levistici, semel paulatim deglutiendo à paroxysmo fuisse liberatas. *Idem observ. 32. & schol.*

Cum globum ex assa fætida & castor. pro odoratu naribus admovissemus, & hunc pulverem sequentem sumpsisset, eum exigua cerevisia, accessio licet gravior cessavit.

℞. Rad. gentian. sem. dauci ostrut. (r. imperator.) an. ℥ß. F. pulvis subtiliss. post tres dies redeunte uteri suffocatione adeo violenta, ut pro mortua haberetur, dedi ex cerevisia ℥i. pulv. matricalis, qui ita describitur à *Leonello*.

℞. Rad. dictam. sem. dauci an. ℥i. cinnam. el. cass. lign. meliss. an. ℥iij. croci orient. ℥ß. castor. rec. ℥i. M. F. Pulvis sed accessio adeo erat violenta, ut neque pulvis juvaret, nec odor assæ fætida, castorei, nec plumæ perdicum ustæ, quæ omnia tamen sæpe juvare solebant. *Idem, observ. 33. lib. 18.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Suffocatione uteri.

**P**er os exhiberem decoctum tale.

℞. Galang. zedoar. el. bacc. lauri, rad. ligustici an. dr. ii. gran. & rad. pæon. an. dr. i. sem. cumini dr. iß. sem. dauci, pastinac. sylv. an. dr. i. coq. in aq. flor. tilia, betonic. & matricar. an. lbj. ad easum tertiæ partis de colatura dabis manè & serò cochlearia v. vel vii. calide: decocto exhausto, darem de sequenti pulvere, quem sæpe in sedando dolore ac strangulatione matricis non sine fructu sum expertus.

℞. Semin. dauci ℥ß. sem. pastinac. sylv. dr. ii. rad. pæon. & gran. ejusdem excoct. an. dr. iß. rad. ligustic sem. cumin. an. dr. iß. anterior. ossis cranii humani ex sutura coronaliusti, cinam. el. an. dr. iß. bacc. lauri, zedoar. el. an. ℥iij. fol. betonic. rad.



rad. bistort. an. ℥i. succini albi ammeos, se-  
lecos an. ℥ss. redigantur singula in tenuis-  
simum pulverem & M. dosis manè & serò  
℥ss. cum aqua matricar. beton. & modico  
vini albi clari.

*Nicolaus Florentinus* etiam laudat in ta-  
li casu pulverem gentian. in vino calido ob-  
latum, & scribit hunc pulverem dolorem  
ventosum ex flatu crasso inflativo, tum pro-  
prietate, tum qualitate sanare; & addit,  
dicunt quidam quod curat dolorem presen-  
tem & præservat à futuro. Ad extra appli-  
carem emplastrum de Galbano factum, &  
de baccis lauri, an. q. s. & applicarem cu-  
mini, vel solum emplastrum de baccis lau-  
ri precedentibus tamen fomentis carminan-  
tibus, & anodynis sive humidis sive siccis.  
*Ioh. Nevius, consil. 35. lib. 3. consil. Crato-*  
*nis, &c.*

Cum uteri suffocationes in enixis eve-  
niant matrice etiam optimè purgata; ni-  
hil utilius semine dauci saccharo incru-  
stato deprehendi, & usu confirmavi.  
*Abraham Seylerus, epist. 31. lib. 6. consil.*  
*& epist. Cratonis, &c.*

Friktionibus & ligaturis pedum, &  
præscriptis subsequenteribus, paroxysmum  
inhibuimus.

℥. Castor. Div. ass. foetid. ℥i. galban. Dis-  
cum cera q. s. F. pomum, teratur manibus  
& odor naribus percipiatur. Item,

℥. Pulv. fol. artemis. puleg. absinth.  
meliss. an. ℥iii. sem. cumini, angelic. an.  
℥i. galban. ℥i. cum cera, & terebinth.  
q. s. F. Emplastrum extensum corio ven-  
tri imò applicetur in forma accomoda-  
ta. *Gregorius Horstius, observ. 11. lib. 5.*  
*De morbis mulierum.*

Quidam accipiebat septem circiter do-  
muncalas cochlearum, easque in pulve-  
rem subtilem redactas prunis insperge-  
bat, jubebatque scæminas hystericas parte  
inferna fumum excipere: sincerè affir-  
mabant omnes, sentire se, ac si quis si-  
lo matricem ad locum suum detraheret  
quod postea sapissimè à pluribus proba-  
tum, semper efficax compertum fuit.  
*Jeremias Martinus, observat. 36.*

Ancilla quædam fluxum mensium ita  
copiosum patiebatur, ut intra duas horas  
sanguinis lbiv. aut v. exereverit; unde sequen-  
ta est affectio hysterica ita gravis, ut illa

aphona, & quasi mortua jaceret, cum ta-  
men apertos haberet oculos, & manu se-  
strangulari judicaret. Vocatus ad eam se-  
quentem potionem præscribo, tum cohi-  
bendo fluxui, tum hysterica affectioni co-  
ercendæ idoneam.

℥. Aq. raph. ros. & plantag. an. ℥i. san-  
guin. dracon. gr. xii. sal. prunell. ℥i. M. F.  
potio, quæ post tres horas interjecto juscu-  
lo reiterabatur. Post primam exhibitionem  
omnia symptomata remissa sunt, in secun-  
da verò omnino cessarunt. *Lazarus Rivel-*  
*rius, observ. 84. cent. 1.*

## SECTIO XXXI.

### De Suffusione.

**V** Ide supra lib. 3. section. 31. De  
Cataracta.

### SUBSECTIO PRIMA.

*Pro Suffusione & dolore oculorum acerbò.*

**M**edicamenta ocularia externa pri-  
mum gratia solius doloris sunt adhi-  
benda, quo circa præter fotum ex decocto  
scænogræci, objecta prima & secunda ebul-  
litione, cum spongia factum, præter ca-  
taplasma ex carne pomorum dulcium sub-  
cineribus concoctorum, vitello ovi asso,  
pulvere sacchari, tantillo croci, lacte mu-  
lieb. & aq. fœnic. exceptis; ego mirum in  
modum laudo fotum factum cum frusto  
carnis vituli in aqua chamæm. calefacto, ac  
pulvere sacchari superasperso, vel cum ve-  
sicula hœdi, vel agni oleo amygdalino dul-  
ci recens parato repleta. Sedato dolore, si  
cataracta non videatur perfecta, ita ut me-  
dicamentis discutientibus auferri posse  
commode videatur, laudo aquam viridis  
æris; laudo & medicamentum *Galenii* 4 lo-  
cal. quod ex felle cum melle, & succo mar-  
rhubii conficitur. Linctus & sufflatio et-  
iam non sunt improbanda, potissimum  
si fiant masticato semine fœnic. dulcis li-  
quor etiam stillatitius recens euphrasiz,  
ac tandem ex troch. viperini prius in  
succo chelidon. maceratis mihi probatur:  
ictus vero ad discutiendam materiam o-  
culis impactam, nil præstantius reperiri



unquam poterit decocto viperarum in aquis ocularibus parato. Pulvis etiam carnis accipitris assæ, cum pulvere verbenæ & fœnic. ex aqua euphras. datus est miri usus. Præ cæteris ego usitatum habeo florem nucis moschatæ cum conserv. euphras. *Jul. Casar Claudinus, consult. 56.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Suffocatione.*

**E**X iis quæ longa experientia cognovimus, laudamus inter cætera, ut juvenis aliquis puellus aut juvencula suavem habentes anhelitum, insufflent leniter in oculum laborantis manè jejuni; ubi prius os abluerint aqua pura, in qua hora una aut altera macerata fuerint semen fœniculi, nux moschat. & cinnamomum. Postea verò lingua lambent oculum, mandet autem prius semen fœniculi & euphrasiam. *Iac. Sylvius, consil. Cratonis, &c.*

Mulier quædam *Lutetia* aqua è *Phænicea* anagallide destillata multos suffusione laborantes liberavit. Potest destillari cum melle. *Iac. Hollerius, lib. 1. De Morbis internis, cap. 21.*

Duo præ cæteris in hunc usum collyria maximè probamus. Unum est, paratur pani, ex toto farina, cum rutæ, chelidonix, euphras. & beton. & fœniculi pulveribus, melle addito, qui excoctus, & recenter ex furno extractus, in partesque dissectus intra vasa duo stannea vel argentea concluditur, inde aqua quædam colligitur, quæ guttatim in affectos oculos instillata mirificè conducit. Hoc sæpe fœlici cum successu citra noxam ullam expertum præsidium. Alterum est.

24. Fol. viol. alb. M. j. sem. raphan. hortens. ʒi. Ammoniac. ʒß. & M. & pulverizata, macerentur horis vigintiquatuor in aqua fœnic. lbi. dein bulliant unica levi ebullitione, colentur, & percolato adde succ. fœnic. depurati ʒi. Balsami opt. ʒiii. Hic liquor mane & vespere instillatus corpore (ut decet) prius exactè purgato, non solum præfatum vitium tollit, verùm etiam antiquas oculorum ægritu-

dines ita deterget & dissipat, ut cataractam etiam citra ferrum mirabiliter auferat. Interim verò ut capitis & oculorum excrementa prorsus dissipentur, atque hæ partes roborentur, ligni Indici decoctum per triginta aut quadraginta dies epotum cum simplicibus oculoribus paratum maximè opportunum ferè non dubitamus, in hunc modum parabitur.

24. Lign. sanct. ʒi. ʒß. farsæparill. ʒß. rad. fassastras, ʒii. infund. per diem & noctem in aq. lbi. dein bulliant ad consumptionem medietatis, in fine adde ad ebulliendum euphras. chelidon. verben. fœnic. beton. an. p. i. colentur; & ʒvi. vel vii. in aurora propinentur; & sic provocetur sudor, capite tamen & oculis ab incalescentia defensis. *Joh. Zecchius, consult. 27.*

Inter localia, aqua quæ ex pane, cui pulvis fœnic. & rutæ, cum modico melle admixtus sit recenter ex furno extracto, ac inter duo vasa stannea concluso colligitur, oculo guttatim instillata mihi placet. *Hier. Mercurialis, tom. 1. consult. 87.*

Præclare suffusioni opitulatur sequens aqua stillatitia frequenter oculis illita.

24. Fol. recent. exsiccant. tamen fœnic. rutæ, euphras. beton. verben. tormentill. galitrici, anagallid. chelidon. an. M. i. flor. ros. sylvestr. cichor. agrimon. periclymeni, an. M. ʒ. contusa omnia misceantur, & cucurbitulæ vitreæ imponantur, quibus admisceantur mell. virg. lbi. urinx infantis, vini generosi, roris cœlestis mensibus *Majo*, & *Junio* per fœniculi virescentis herbam mundissimo linteolo collecti & expressi, an. lbi. qui liquores adfundantur herbis & per quatuordecim dies digerantur vitro bene clauso, in ventre equino, & tandem in balneo cineris artificiosè destilletur aqua, quæ ter ad faeces sicari incipientes reafundatur, ac subinde iterum destilletur. *Franciscus Joel. pract. libr. 2. sect. 1.*

Vidit *Joh. Crato*. Monachum quendam novem dierum spatio à præceptore suo ex suffusione facillimo remedio curatum, radicibus nempe fœniculi in vino coctis, & decocto oculis applicit. *Hier. Reusnerus, observ. 35.*

Puer vel Puella octo annorum jejuno



Stomachò mastichet rosam unam recentem, & post masticationem statim oculos lambat. *Ioh. Baptista Montanus consil. 84.*

Fiat collyrium istud.

24. Aloes ʒi. pompholyg. lotæ ʒß. aq. euphras. ros. æenic. an. ʒi. M. F. collyrium, & ex eo fiat destillatio in oculis. Cum hoc sæpe etiam lippitudinem sanavi. Testis est *Johannes Frata* Juvenis nobilis Veronensis, qui, postquam *Gymnasio Ticinensi* lippitudinem correptus fuisset, hoc solo collyrio, post debitam totius corporis purgationem, à me curatus feliciter convaluit. *Omnibonus Ferrarius de Arte Medica Infantium lib. 3. cap. 19.*

Quidam qui antequam morbo Gallico afficeretur, altero oculo cæcus erat, suffusione densissima oculum occupante, hydrargyri inunctione à morbo Gallico & à suffusione, quod maximè mirum est evasit: *Alexander Traianus Petronius, lib. 5. De Morbo Gallico, cap. 1.*

## SECTIO TRIGESIMA SECUNDA.

*Pro Sugillatione seu oculi macula.*

**P**ost venæsectionem & purgationem, & cucurbitulas scapulis appositas, ne plus sanguinis efflueret leviter repellentia, ut album-ovi cum aq. rosæ concussum & lacte muliebri apposui. Postea sanguinem calidum columbarum ab alis destillantem instillavimus: ad majorem discussionem, nonnulli lac muliebri cum pauco thure infundat; at nobis satis fuit sanguis columbæ vel turturis, alioqui ad magis discutientia venissemus, quæ ad inveteratas & denigratas sugillationes præscribuntur, ut est aqua raphani, succus absinth. cum melle mixtus liviorem oculi tollit, quo nos in pauperibus utimur. Quidam initio caleo recenti utuntur *Petrus Forestus, observ. 8. & schol. lib. 11. De morbis oculorum.*

## SECTIO XXXIII.

*De Sulphuris Balsamo.*

**I**n aliquot curationibus hætenus recensui certa experientia, cum ratione

conjuncta quibus ostenditur quid oleum seu balsamum sulphuris præstet in externis morbis, quæque ipsius vires sunt. Nunc studiosus medicinæ omnes ejus facultates plenius cognoscat, breviter & summatim eas exponam: habent attrahendi peculiarem vim hoc oleum, leni contactu vel illitu sanat ani fissuras, fistulas apostemata, pruritus, proidentiam, mariscas, & alia anivia, anthracem etiam & apostemata omnia, aurium dolorem, tinnitu, exulcerationem, vermens & alia aurium vitia: arthriticos item morbos. Calefaciendi vim habet non excellentem ratione mixtionis & compositionis: conglutinat & consolidat omnia ulcera & vulnera; carnem mirificè accitissimè generat; cancerum etiam, canitiem, casum ab alto, capitis ulcera, colicam, cutis sceditates omnes, contusa membra, & cranium fractum sanat contactu vel illitu: emollit dura, dolores, dislocationes membrorum, fissuras laboriorum, & aliarum partium frigidos, morbos, faciei ruborem, pustulas, gallicam scabiem hæmmorrhoides cæcas, earumque dolorem, humiditas morbos omnes sanat illitu, mamillarum etiam duritiem, tumorem. exulcerationem & cancerum, & morsus animalium venenatorum; maturat etiam & mundificat: curat etiam paralyin, paronychiam, polypum podagram, pruritus, pediculos necat; pus generat, rumpit apostemata ad maturationem perducta, mundificat eadem; curat scabiem omnis generis illitu; ut spasmus, sanat illicu tumores, tubercula, tibiæ ulcera, vulnera quæcunque vomicas, varices varos, ulcera recentia, antiqua & putrida, & ustionem ex quacunque causa. *Martinus Rulandus, curat. 92. cent. 1.*

*Schroderus* in Pharmacopœa sua medico chymica ita descripsit balsamum sulphuris *Rulandi.*

Fl. Sulphur. vel sulphur. puri ʒi. ol. rapar. express. vel nucum ʒß. vini generosi ʒi. macerentur per dies octo lento igne, aliquoties agitando. Postea coquantur lentè ad vini consumptionem, tandem cola, & serva usui.



## SECTIO XXXIV.

## De Surditate.

**K**Ω<sup>ωωω</sup>, Latine Surditas, auditus est abolitio. Ejus causæ sunt vapores biliosi, aut humores crassi; nervos auditorios obstruentes, & facultatem auditricem intercipientes, cerebri, item intemperies ac læsio in parte illa ubi nervi auditorii originem habent; ratione cujus, vel non generantur, vel non transmittuntur spiritus. Externæ, & procacitæ causæ sunt, violenti circa aures ictus, tumorem, abscessus, corpora exterius intra aures delabentia.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Surditate.

**C**Um satis purgata esset mulier quædam surditate laborans, vetula quædam illi consuluit, ut granum unum vel alterum moschi opt. in bombace misceret, & auri perpetuo imponeret. Hoc remedio præter omnium spem ab omni surditate liberata est. Ego multos quidem, quibus auris sanie longo tempore maderet, curavi sola imposita bombace vel cottone, in quo moschus reservatur, quod & aurem exsiccat, & simul surditatem tollit. Mulier quædam oleo murino (mures enim recens sine pilis macerabat oleo) utebatur cum miraculo ad aurium surditatem. *Gisbertus Horstius* aquam ex illis destillabat, & eam in aures immittebat. *Arculanus* Medicus suo tempore insignis, in nono ad *Almanforem*, scribit moscum cotto involutum, & in aurem positum egregiam prærogativam habere in curando surditatem; sed in mulieribus juveniculis suffocationi uteri obnoxiiis nequaquam convenit. *Petrus Forestus obs. 15. & schol. lib. 12 De Aurium Morbis.*

Succus hederæ depuratus cum vino albo potenti instillatus mirifice prodest, ut & absynthium cum aqua marina decoctum, ac per arundinem pro fomento adhibitum. Ova quoque formicarum contrita, & cum succo capræ in aurem infusa, quam vetustissimam etiam surditatem persanant; item & caprillum fel, vel le-

poris fel recens cum pari mellis portione mixtum, & in capræ corio tepesfactum, & in aurem immisum auditum mirifice restituit: quæ omnia topica crassos, & vitiosos humores in auditus organo surditatem causantes incidunt, secant, & attenuant. Convenit etiam ligni guajaci decoctum per triginta dies: quo tempore theriacæ, vel mithridatii interdum Zi. nonnunquam conserv. beton. aut flor. salviæ ʒß. alternis saltem diebus dormituro exhibeatur. *Joh. Zecchius consult. 56.*

ʒ. Menth. salv. puleg. rorismar. chamæm. millefol. cent min. abrotan. an. M. i. bulliant in vino albo generoso ad tertiæ partis consumptionem, & cum it dormitum calefiat, inde per infundibulum suscipiatur fumus intra aurem per spatium dimidiæ horæ, & prædictæ herbæ benè calidæ ad aures internas admoveantur. *Rodericus à Fonseca, tomo 2. consult. 58.*

Pro surditate in febribus dare solemus elect. de succo ros. cum syr. ros. laxativo & manna, cum elect. lenitivo. *Joh. Heurnius, ad aphor. 60. sect. 4.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Surditate.

**J**Udæus quidam Empiricus illi medicamenta quædam suppeditavit, quæ cum ego satis probem, volui studiosis ea communicare. Ea hæc sunt; Conficiatur lixivium ut fieri solet ex cinere juniperi, & fluviali aqua; lixivii capiat lbix. cui infundantur per viginti quatuor horas serpill. flor. chamæm. absinth. matricar. an. M ʒ. baccar. lauri, rad. ireos, an. vnc. i. rad. asari vn. iß. contusa infundantur. Deinde eo lixivio abluat caput aliquoties.

ʒ. Succum porrorum, succi absint. oleo amygd. amar. petrosel, an. vn. ʒ M. Deinde ea mistura impleantur capræ duæ excavatæ, ac earundem cortice tectæ, atque ita sub cineribus calidis coquantur. Coctis iis succus exprimatur, qui sæpe in aure instilletur.

ʒ. Aceti accerrimi lbix. stercor. columb. rec. q. s. mixta hæc indantur in ollam novam coq. ad medietat. consumptionem. Deinde coopertam ollam crusta panis largi



larga in medio perforata, & imposito aptè emboto, auri, subiiciat; atque inde exhalantem vaporem in aures excipiat, vesperi iturus dormitum, continuet ad duodecim dies, quaternis quibusque medicamentum reiteretur. Hęc medicamenta post ritè purgatum corpus administrentur. *Reinerus Solenander, consil. 4. sect. 1.*

Non subiticebo quod experimento multorum probatum reperio, nimirum surdos non parum beneficii suscepisse ex hoc præsidio, quod recepit aquæ stillaticię ex renibus arietis nuper ab ariete extractis & minutim incis, cum pari portione aq. vitę; si guttulas aliquot noctu ante cęnam in aurem instillaveris, & gossipio foramen auditorium obturaveris, quod si simul cum renibus aliquid florum capitalium instillaveris, non erabis, item magni solet esse momenti in aurem injicere intillationem ex ligno guajaco, flor stachados majoranę, anisi ac rutę. *Ludovicus Mercatus, consil. 16.*

Plurima gravis auditus sunt remedia, neque semper obtemperat uni, sed ex deterio ritè tympano, & infuso liquore flatus discutiente, maximum plerumque percipitur emolumentum. Nihil utilius urina leporina, sive seorsim, seu cum spiritu vini auribus calidè instillata: cujus frequentior usus multis opitulatus fuit, & quidem præcipuè Proxenetę cuidam *Amstelredamensi*, quieo surditatis jam devenerat; ut necesse foret; palimpsesto, sive chartę deletili inscribere, si quis illi verbis communicatum velles. *Nicolaus Tulpinus, observ. 15. lib. 4.*

24. Carduum benedict. asperge aquam cardui, & fac ut denuo destillet. Hoc liquore linteolum imbutum *Crato* surdastris immittit in aurem, si doleant, vel non audiant. Nihil ex omnibus medicamentis, quę expertus est, se conducibilis comperrisse fatetur *Carolus Oslevius, epist. 51. lib. 3. consil. & epist. Cratonis, &c.*

Præmissis univerialibus, ad topica materiam auri impactam discutientia veniendum est, quę in hunc modum administrari potuerunt.

24. Fol. organ. absinth. puleg. serpyll. salvię, menth. cent. min. malv. alth. an. M. i. flor. camomill. melilot. stęchad. & anthos. an. p. i. cinnam. caryophyll. an. 3ß.

decoq. in aquis partibus aq. fontis, & vini alb. sub finem additi. Colatura foveatur auris affecta cum spongia calidè manè & serò. Ex eodem decocto poterit fieri suffitus in aurem per infundibulum. Fomenti loco adhiberi potest panis cum semine carvi subactus & calens è furno per medium sectus, vel panis ordinarius ex clibano sumptus & inferiori crusta ablata in spiritu vini immergatur, & calidè, quantum æger ferre poterit, ad aurem applicetur, ut vapor intromittatur. Si pro fomento & suffitu decoctum præscriptum fortius desideres, pulpa colocynthidis & radicis hellebori albi ad dr. i. vel ii. addi poterunt. Idem decoctum in vino albo solo, vel in vino & aceto parari poterit, ut magis penetret & potentius discutiat. Post fotum & suffumigium liquor aliquis in aurem injiciendus est, eaque postmodum cotone moschato obturanda.

24. Ol. amygd. amar. & rutac. an. 3i. M. infunde calidè in aurem. Vel.

24. Ol. de castor. & lil. alb. an. 3i. ol. aneth. 3ß. hellebor. alb. 3ß. aq. vitę 3i. Bulliant in B. M. ad aquę vitę consumptionem. Colentur ad usum Vel.

24. Rad. cyperi, bacc. lauri, sem. anis. & cumin. pulver. an. 3i. Castor. pulver. 3. m. ol. rutę q. s. M. iisque impleatur cappa magnum excavatum quod postea coque super prunas; & exprimatur succus in aurem instillandus. Olea chymica efficacissimè operantur, qualia sunt oleum rorismar. majoran. salvię, fęniculi, de spica caryophyll. quę tamen, propter nimiam vehementiam, sola non sunt usurpanda; sed cum prædictis in parva quantitate admisceri possunt in hunc modum.

24. Ol. præd. 3ii. ol. de spica, fęnic. aut caryophyll. aut alterius cujusvis dr. i. m. vel dr. i. M. Aquę etiam nonnullę in aurem instillantur; quę ad surditatem maximè conferre existimantur. Sic plurimum laudatur ab authoribus aqua fraxini, quę elicitur, ramos virides fraxini una extremitate igni admovendo, & ex altera extremitate aqua stillans usui asservanda. Præcipuè confert, quando surditas à causa calida oriunda est, & remedia valde calefacientia suspecta sunt. Si caliditas non timeatur, pari aq. vitę portione admista efficacior evadet, *Mat.*



„ *Matthiolus* hanc aquam valdè prædi-  
 „ cat his verbis. Fraxini spumam, quæ  
 „ à viridi ligno igni exposito manat, ad-  
 „ ditis succis cyclaminis, scyllæ, rutæ æ-  
 „ qualibus partibus, omnibus simul pa-  
 „ rumper fervefactis, plurimum valere ad  
 „ surditatem scimus, si in aurem sanam  
 „ hic liquor calidus infundatur, cum se cu-  
 „ bitum receperit æger, atque cum super  
 „ affecta aure jacere oportet. Ubi verò u-  
 „ tramq; aurem surditas occupaverit, in  
 „ eam fundatur quæ minus affecta fuerit,  
 „ & super alteram jaceat: Spiritus vini,  
 „ in quo helleborus albus infusus fuerit,  
 „ in aurem affectam instillatus magnæ est ef-  
 „ ficaciæ. Alii commendant succum hæderæ  
 „ depuratum cum vino albo potenti permi-  
 „ stum. Peculiariter demum conducunt ad  
 „ hujus affectus curationem thermæ sulphu-  
 „ reæ & bituminosæ cum balneo tum lotione  
 „ capitis. Balneo siquidem sudores copiosi  
 „ provocantur, & materia fluxionis antec-  
 „ dens educitur. Lotione vero capitis cere-  
 „ brum roboratur & exsiccat, & humores  
 „ in ipsa aurem impacti discutiuntur. Uten-  
 „ di modus peculiaris à *Penoto* describitur,  
 „ & valde commendatur his verbis, „ Nihil  
 „ æque conducit in surditate, etiam post  
 „ centum remediorum usum quam ut pa-  
 „ tiens, optimè prius mundato corpore, &  
 „ deinde capite purgato, sulphureis bal-  
 „ neis caput madefaciat hoc modo. Ex  
 „ spongiis maginis confutis veluti cucu-  
 „ pham ferat in capite ad supercilia & in-  
 „ fra aures descendentem. Sedeat sub ca-  
 „ nali balneorum & verso epistomio a-  
 „ quam accipiat quæ abscerpta spongiis  
 „ caput continuo calore suo fovebit, atq;  
 „ omnes capitis futuras auriumque com-  
 „ missuras diducens. Atque aperiens va-  
 „ pores tollet, vel materiam impactam  
 „ nervis viisque auditoriis resolver per ha-  
 „ litum, aut adeo mutabit, ut brevi sit  
 „ abitura. Bis in die ita sedere eum conve-  
 „ nit ad horas duas, ac deinceps statim su-  
 „ dare in lecto, diætamque adhibere te-  
 „ nuem ex succis & jure carniū, vinoq;  
 „ nisi obligophoro planè abstinendum est.  
*Lazarus Riverius, prax. lib. 3. c. 1.*

## S E C T I O XXXV.

*De Stupore mortali ab exhalatione  
 musti recentis.*

**V** Initor quidam tempore vindemia-  
 rum, cum in cella vinaria musto  
 implevisset, illudque effervesceret, vapo-  
 reque uti solet; acri & vehementi cavam  
 implevisset, volens inspicere sua dolia cum  
 in cellam veniret, vaporem hunc hauriens  
 attonitus concidit, & statim expiravit.  
 Alias hoc sæpe evenisse intellexi, existimo-  
 que id fieri non à repletionem vaporum &  
 exhalationum istarum, sed potius à nar-  
 cotica illarum vi, quæ uti in vino quod-  
 jam deferbuit, ebrios reddit, sic maximè  
 dum adhuc fervet, potenterque exhalat,  
 attractus vapor sensus internos externosq;  
 subito stupefaciens, respiratione, ut in  
 apoplecticis sublata, hominem enecat.  
*Felix Platerus, observat. lib. 1. pag. 18.*

## S E C T I O XXXVI.

*Pro Syncope.*

**D** A aquam theriacalem cum aq. cin-  
 nam. & aq. borraginis. *Io. Heurnius,*  
*ad aphor. 41. sect. 2.*

Leipothymiam solvit oleum succini alb.  
 & ejus balsamus naribus inditus, vel ad  
 odorandum exhibitus, item balsamus,  
 oleum & aqua cinnamom. balsamus rutæ,  
 cariophyll. idem & quidem celerius præ-  
 stant. Sic ambra & moschus feliciter lip-  
 thymias tollunt, præsertim in viris. In  
 Lypothymia stomachica profunt vomito-  
 ria, deinde confortantia, ut oleum ze-  
 doariæ, vinum, & extractum ejusdem,  
 essentia, melissæ cum spir. vini, & aliquot  
 guttis ol. juniperi. In Syncope folia, &  
 flores melissæ insuantur sacco, qui po-  
 stea cum spiritu vini aspersus applicetur  
 mamillæ dextræ calidè, item aqua perla-  
 rum sic.

℞. Aquar. 4. cordial. an. vn. ii. manus  
 Ch. cum vel sine perlis vn. i. magister per-  
 lar. dr. β. succin. alb. pulv. ℥ii. aq. *Longii*  
 vn. i. M. detur cochlear. β. *Ioh. Hartman-*  
*nus, pract. Chymiatr. pag. 153.*

Hic



Hic liquor singulariter ab *Horstio* laudatur.

℞. Aceti destill. ℥vi. Margarit. & corall. præp. an. ℥ß. Solve in loco calido,

accipe filtrati liquoris ℥ii. syrup. acetos. citri, julepii de cinnam. an. q. s. *Vvolfgangus Hesperus, Herc. Med. lib. 2. cap. 1.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ

## LIBER DECIMUS SEPTIMUS.

*De Affectibus à littera T incipientibus.*

### S E C T I O P R I M A.

*Pro Tabē.*



Uoniam ulcus exsiccationem postulat, decoctum rad. chinæ cum santalis ut remedium mite proponimus in hunc modum.

℞. Rad. chinæ præp. ℥i. santal. citrin. ℥ii. aq. capill. ven. & borrag. an. ℔i. post infusionem F. decoctio ad consumptionem tertiæ partis, hujus decocti colati assumat manè ℥iv. bibat etiam in prandio & cœna. In eandem etiam intentionem pro exsiccando ulcere proponimus remedium singulare sic.

℞. Pulver. fol. millefol. ℥i. juris pulli ℥iii. sumat in aurora per aliquot dies, vel ex eodem pulvere cum saccharo. F. Tabellæ. *Rodericus à Fonseca, to. 2. cons. 46.*

Hoc præstantissimum judicatur ad fluxiones sistendas, & exsicandos pulmones.

℞. Sacch. ros. veter. diapienid. an. ℥i. flor. sulph. ℥i. cum syrup. capil. ven. F. tabellæ, quas in ore gestet.

Hoc quod sequitur eclegma maximæ censetur efficacix ad hunc morbum, & empyematicos de quo si detur ter quaterve in die, mira præstabit, ita conficitur.

℞. Syr. de succo hederæ terrestr. ℥ii. flor. sulph. q. s. ad reducendum omnia in loch. Syrupus hederæ in hunc modum fit.

℞. Succ. hederæ terrestr. bene depurati ℔ii. sacch. rosat. ℔i penidior. vn. iv. coq. in syrupum.

Pro siccando ulcere pulm. & abstergendo, syrup. de symphyto *Fernelii* maxime convenire videtur. *Rodericus à Fonseca.*

Nunc cœpit proferri lignum illud Sassafras nuncupatum, gustu suave, & cibis conveniens, cujusvis tum commendatur in expediendis visceribus omnibus & pulmonibus: quare illud ego incoquerem in juribus cum ptisana, & in aurora exhiberem. Cochleæ hic commendantur, quoniam etsi lentorem habeant experimento tamen deprehensæ sunt vim etiam habere viscera expurgandi, unde *Ætius* vel in obstructo liene præbet: unde etiam retinere fluxum humorum in pulmones, & aperire etiam vias posse videntur, & alimentum calori febrili resistens præbere. *Christophorus Garinonius, consil. 444.*

Ex tabe simplici innumeros sanavi: erat autem præter victus moderatam rationem, unicum hoc præsidium, sanguinem suillum, & cochleas purgatas, & ranas cum germinibus rubi in balneo M. destillabam, & aquæ hujus pro ætate quantitatem dabam, donec pingues efficerentur. *Hier. Cardanus, sect. 3. method. med. curat. 4.*

Anni quindecim præteriere, ex quo Mercatoris *Basiliens.* puer octennis, ab alio quodam puero baculo circa lumbos percussus, aliquot diebus post malè habere



## SUBSECTIO SECUNDA.

re cepit, & septimanis aliquot præteritis, licet ad vitæ tempus ultimum cibo sufficienti nutriretur, tabe absumptus obiit, huic licet nec tussis molesta esset, nec febris laboraret, nihilominus à quodam tanquam Phthisicus fuit tractatus, quare parentibus mortis causam intelligere cupientibus, & me ut cadaver aperirem rogantibus, ipsorum voluntati satisfactorius, cadavere denudato ventrem infimum turgidum reperi, & utrinque circa umbilici regionem ad tactum renitentem, & quia nec tussim, nec febrem ipsi molestant fuisse intellexeram, illicò nec dum cadavere aperto astantibus significavi, mali causam in mesenterio latitare, mox ventre aperto, glandulas Mesenterij non solum tumentes, sed etiam scyrrhos reperi & ita conglobatas, ut duorum pugnorum magnitudinem superarent: in thorace verò & pulmonibus vitii nihil penitus occurrit, causam ergo tabis, harum glandularum scyrrhum censui, chylis distributionem inhibentem. *Gregorius Horstius, cap. 5. lib. 7. Histor. Medic. mirab. Marcelli Donati.*

Tabem à glandulis mesenterii nimium turgescantibus advenire, mortemque causare, sequens etiam historia ostendet. Infantula quædam hujus urbis duorum circiter annorum plurium mensium spatio indies contabuit, licet stomacho satis valeret, & consueto more alimenta sumeret, cum interim alvi fluxu quasi colico continuo laboraret. Fatiscantibus tandem viribus, ob debitam corpori denegatam alimoniam, occubuit. Parentes, ut mortis dilectæ filiolæ causa melius innotesceret, obnixè rogarunt, ut me præsentem exhiberem, dum aperiretur cadaver. Quorum votis annuens, detractis tegumentis ventris communibus cum peritonæo, invenimus in mesenterio innumeras glandulas mirum in modum turgidas & duriusculas, ita ut multæ nucis avellanæ, sed plures juglandis magnitudinem exæquarent. A quibus obstructo chyli in suum receptaculū transitu, corporeque sic succo nutritio defraudato, non mirum si tales primum omni artis præsidio irreparabilis, fluxu comitata cæliaco, tandemque dura mors & inexorabilis successerit.

*Pro Tarantatis, seu de morbis à Tarantula.*

**P**RO præservatione, homines quantum fieri possit, fugiant campestres locos & agros, domusque politas &undas habeant, nam hæc animalia solent in fissuris domum, in foraminibus degere, & hac cautela maximè uti oportet per mensem *Juni, Julii & Augusti*; cum his temporibus sævire soleant ac mordere. Verùm quoniam qui hac Peste tentantur, sunt ut plurimum rustici, supradicta servare non valentes, ideo alia provisione indiget; propterea illis consulerem, ut anchusam herbam comedant, vel ejus decoctum bibant, vel collo ligatam habeant. Habet enim hæc vim magnam ex *Dioscor.* adversus vim venenosorum animalium, quorum vim arceat & frangit. Ad idem faciunt calamentum, serpillum odoratum, bolus armena, artemisia, scordium, succus raphani, allium, mitridatium, nasturtium: sed maximè omnium, nostrum antiphalangium commendamus, quod non solum præservat, sed curat felicissimè. Quod ad curationem attinet, ea quàm citissimè fieri debet, nam periculum est in mora, cum sævissima soleant in ictu tarantulæ excitari symptomata, & veneno est quàm citissimè occurrendum. Sub Chirurgia comprehendendo suctionem, frictionem, incisionem, seu scarificationem, vesicatoria, cauteria, cucurbitulas, hirundines & venæ sectionem. Quantum ad primum, suctio cum ore est remedium præstantissimum, sed periculosum & lubricum, & si quandoque molendum est. à Regibus, Imperatoribus, & summis Principibus fieri debet, qui multa habent principia, infidelia, qui adhuc ne ipsa moriantur, debent prius comedere ad satietatem vinumque meracem bibere, & aliquo ex dicendis antidotis se munire debent, Sed hoc remedium, ut dixi, lubricum est, & in *Apulia* recessit ab usu: loco cujus poni possunt gallinæ, vel columbi recentes occisi super morsuram, vel eorundem animalium viventium pars postica, scilicet anus. Quantum ad frictionem multum juvat, nam foras evocat venenum,



juvat etiam partis scarificatio ; maximè etiam vesicatoria commendantur , præcipuè quæ cum Cantharidibus fiunt , vehementissimè enim attrahunt foras venenum & Cantharides à proprietate videntur esse alexipharmacum tarantulæ . Profunt etiam cauteria , tam actualia , quam potentialia , ut & hirundines . Quantum ad venæsectionem , non multum convenit primis diebus , sed temporis progressu , cum jam venenum omnes corporis partes est aggressum , tunc existente aliqua plethora , secari potest vena hepatica maximè in ætate adolescentiæ . Quantum ad Pharmaciam , sub hæc comprehendimus antidota seu bezoardica , seu alexipharmaca agentia à proprietate occulta . Maximè facit ex *Dioscorid.* ad Tarantulæ morsum semen pastinacæ sylvestr. ad ℥i. cum vino bibitum , & decoctum melissæ , & folia origani emplastrata , ipsumq; origanum in pulv. cum vino bibitum ad ℥i. vel balneum aque maris , vel succus folior. mori ad vn. ii. vel supra partem commorsam capæ triæ . *Galenus* commendat decoctum cent. min. Laudat etiam phalangia redacta in pulverem & vino pota , nam Tarantatos à morte liberat . *Orthasius* ad Tarantulæ ictum multum facere dicit ℥i. aristol. rot. cum vino . *Serapio* , pro eadem intentione laudat semen nigellæ ad ℥i. cum vino bibitum . Alii ad cælum extollunt supra partem ictam stercus capræ . *Rhasis* multa atque proficua conscripsit , ut balneum in aqua calida , theriacam , succum fol. mori , vinum fortem allium , cominum , agnum castum ingressum aquæ maris calidæ ; laudat etiam sudorem promovendum . *Ruffus* apprimè omnium commendavit theriacam , balneum & vinum vetus . *Rabbi Moyses* in loco morsuræ ponit panem masticatum , nam mirabilem habet antipathiam cum veneno tarantulæ . *Plinius* succum plantaginis post multa præcipuè commendavit , & ideo lacertæ & alii vermes morsus araneæ formidantes , succo plantagin. seu esu herbæ se tuentur , laudavit etiam gallinæ cerebrum cum pipere comestum , merum , agni casti semen & caneros fluviatiales . *Petrus de Hebano* multa laudat , & inter cætera præcipit tarantatos esse sepeliendos in arena calida , vel cinere calido .

Nos autem post longas experientias , & post multorum annorum decursum , variasque & assiduas observationes quas in tarantatis fecimus maximè omnium quinque remediorum genera commendamus , quorum primum est aqua vita , hæc enim expellit venenum , corroborat calorem naturalem , aufert melancholiam , quare omnes explet indicationes in ictu tarantulæ , & quia diuretica est à centro ad circumferentiam expellit venenosos & corruptos humores , & verè res est mirabilis ; & nos felicissimè illam in tarantatis experti sumus pluries , exhiberi potest ad ℥i. ℥. ii. ℥. iii. juxta ætatem , complexionem , & magnitudinem symptomatum . Secundum est quinta essentia roris marini : cujus admirandas vires ad ictum tarantulæ & in expellendo venenum omnium animalium venenosorum pluries experti sumus . Tertium est aqua nostra vitalis destillata quæ sic fit .

℥ Flor. citrangul. bonam quantitatem fol. tenerior. quercus , card. bened. scabios. acetosell. sonchi , salv. majoran. flor. lavend. absinth. roris mar. tussilag. ros. rubr. sicc. scorzonæ. meliss. pimpinell. borrag. rutæ an. M. iii. cyperi nostrat. rad. angelic. bacc. lauri , juniper. cortic. citri , tormentill. zedoar an. ℥i. cinnam. cariophyll. an. ℥ss destill. omnia in balneo M. & aqua servetur , hoc aqua etiam uti solet à licicis cum successu in febribus pestilent. & malignis . Quartum est antiphalangium nostrum electuarium , quod quidem mirabile est adversus morsus , omnium tarantularum , componitur hoc modo .

℥ Fruct. myrti & tamaricis , an. ℥i. sem. pastinac. nigell. agn. cast. dauci , anisi , cumini & origani , an. ℥i. terr. sigillat. bol. armen. or. præp. an. ℥ii. cent. min. aristoloc. rotund. an. ℥ss. fol. meliss. trifolii bituminosi , chamæpit. & abrotan. an. p. ss. theriac. opt. & mithridat. an. ℥i ss. succ. capar alii , plantag. atriplici hederæ depurat. an. q. s. cum melle fiat syrupus , cum quo fiat electuar. addendo aqu. vitæ q. s. dosis , à ℥i ss. ad ℥iii. datur cum vino præservationis gratia ad ℥i. semel vel bis , datur præsepte veneno ad ℥iii. bis vel ter aut sæpius cum vino . Quintum est musca , in hac enim nostra regione per totam Apu-



Apuliam nullum aliud genus remedii promptius excercetur quam musica intarantatis; & certè res est mira de musica, & nisi propriis oculis videatur, non creditur; cum ille qui à tarantula fuit commorsus, qui fere dira veneni tabe moribundus, & querulus, ansius, & agonizans erat, quinque extrinsecos ferè sensus & intrinsecos penè amiserat, motumque habebat ablatum, mox ubi tympana parvalyram, cytharam, fides, cymbalum, variosque tibicines, vel quodvis aliud instrumentum musicum audit, statim reviviscit, oculos & aures arrigit, & in pedes se attollit, incipiens leviter in principio movere digitos pedum & manuum, & servata harmonia lege sibi convenienti, sibi que arridenti, statim fortiter tripudiare & gestire manibus, pedibus, capite, & singulis corporis partibus incipit, variaque corporis agitatione conflictatur; ergo magis præsentaneum & promptius remedium in hac regione non invenitur ipsa musica; nam ea incitantur ad tripudium & ingentes saltus, variasque corporis agitationes & sic mitescit effera vis veneni, corpore universo maximis sudoribus profuso; ob id publicè in æstate vagantur tibicines per totam Apuliam, multumque lucrifaciunt, cum promptissimè excitent tarantatos. *Epiphanius Ferdinandus Historia* 81.

### SECTIO TERTIA.

#### De Temperantia.

**S**elymus Turcarum Imperator Solimani Pater, de uno tantum ferculo edere est solitus, & antecibum corpus exercebat; ea moderatione hoc obtinuit, ut nunquam ægrotarit, donec divinitus eo loco periret, quo patrem antea veneno sustulerat. *Gaspar Hoffmannus consil. 14. lib. 5. Consil. Cratonis, &c.*

### SECTIO QUARTA.

#### De Tenesmo.

**T**enesmus est assidua, crudelis & peracerba desidendi cupiditas, eaque fru-

stranea; qua scilicet nihil egerunt; & nihilominus tanquam egerere aliquid debent, novo subinde egerendi desiderio stimulantur, licet eo conatu nihil proficiant. Pars in hoc malo affecta est extremitas recti intestini; causa est quicquid facultatem expultricem intestini recti stimulare potest, ut est à dysenteria, ejus intestini exulceratio, vel humor acris, mordax & salsus illi adhærens, calculus item in collo vesicæ hærens, & tumor partium vicinarum; intemperies quoque frigida contracta ex sessione super lapidem frigidum, aut mora in aqua.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Tenesmo.

**H**unc morbum curaturi, primo decoctum hoc parari fecimus, ut ejus infessu dolores & tensiones placaremus, simulque ut per anum necessaria inde remur.

℞. Rad. alch. malv. chamæm. sem. lini, scænuagræc. ros. rub. an. M. ii. in lbxx. aqua. F. decoctio sufficiens, cui adde ol. rosac. chamæm. an. ℥iii. in hoc decoct. tepente fiat infessus, ut non solùm anus, sed inguina quoque madescant: ejus vice quandoque utebatur filtro aut spongia prædicto decocto imbuta, & parum expressa; tunc vero clysteres abstergendi vi præditos ita injecimus.

℞. Decoct. hord. integr. ℥xv. sacchar. rubr. ℥iβ. ol. ros. ℥iij. vitell. ovor. num. 2. fiat clyster in quo & mell. rosac. colatum imponere optimum sane est, quum ex iis quæ maximè ulcera abstergant sit. Abstersione facta ad clysteres ulcus exsiccantes & constringentes, devenimus ita.

℞. Sumach. plantag. balauft. an. p. j. F. decoctio in aq. lbii. in colat. lbi. dissolv. sævi hircin. ℥iβ. butyr. rec. insulsi ℥i. thur. ℥ii. ovum unum integrum, ol. myrtilli ℥ii. M. F. clyster. quem pro posse retineat: sed cum æger graviter morbum ferret, & indices pejus haberet, & dolor in eum sæviret; ad glandes ex sævo hircino paratas cum massa pilul. de cynoglossa, adjecto uno vel altero opii grano, devenimus, vel ad



elysteres ex lacte vaccino confecti, & oleo rosar. omphac. cum pilul. de cynoglossa ℥℥. adjectis quoque gr. ij. vel iij. opii, à quibus gummi Tragacanth. & Arabic. uti & sævum hircinum & butyr. rec. minimè eliminabantur, quibus, & unguento ex plumbo foris ad anum applicito intra octo dies sanus factus est, optimo semper assuescens victui, & acria fugiendo. *Amatus Lusitanus, curat. 94. cent. 3.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Tenesmo.

**H**oc suffu migio miraculi instar tenesmus curatus fuit.

℥℥. Mastich. ℥i. thur. ℥i. sem. myrtill. ℥i℥. flor. ros. rub. exsicce ℥iij. F. pulvis pro suffumigio, fumum post secessum sub sella, carbombus ignitis injecto pulvere, in anum recipiebat, & à tenesmo molestissimo liberatus est. *Petrus Forestus, observat. 39. lib. 2. De profluviis alvi*

Fortum paravimus in hunc modum.

℥℥. Summitat. aneth. rapsi barbat. flor. chamæm. melilot. an. M. j. baccar. myrti, flor. rosar. an. p. j. sem. lini, fœnugræc. an. ℥iij. F. fofus. Sacculus etiam ex turfare in vino astringenti decocto admoveatur ano & fiat suffumigium ex thure, myrrha, gallia mosch. & rosis, prius in ano suscepto fumo per cathedram perforatam ex decocto flor. rapsis barbati. *Petrus Forestus, observat. 41. lib. 22.*

Mollibus enematis eluatur malum, ut ex aqua hordei cum saccharo & vitello ovi. *Ioh. Heurnius, ad adhor. 27. sect. 7.*

Si vigilæ unâ cum dolore perseverante consequantur, neque remediis cedat affectus, aliqui componunt suppositoria stupetactiva ex thure, mastichæ, croco, styrace liquida, adjecto paucio opio, ut videre licet apud *Guainerium*. Sed is admonet ut cum filo semper coxæ alligetur; quia opium ad intra attractum æternum soporem inducere posset. Idem narrat mirabilem casum præceptoris sui, qui suppositorium ex opio confectum cuidam tenesmo laboranti imponi iusserat, ex quo per 4. horas continuas quievit, ita ut eodem tempore idem suppositoriam filo

appenso evanuerit. Unde ad duos dies ager tam horribilem saporem in ore percipiebat, ut assumere cibum non posset, unde ejus præceptor vomitum ejdem provocavit, & tunc ager suppositorium illud filo appenso evomuit. Certè (inquit) nisi mihi vir tantus narrasset, huic ipsi vix fidem dedissem, ideo monet, ut in talibus suppositoriis nequaquam audaces simus, sed circumspecti, eadem coxæ alligando cum filo, ne sursum repant. *Petrus Forestus, schol. obs. 42. lib. 21.*

Tenesmo afflictabatur vir nobilis, præscriptum est hoc fomentum.

℥℥. Fol. rapsi barb. absinth. an. M. vi. coq. in lacte recenti, & conficiantur sacculi alternatim toti ventri & ano calidè sæpius applicandi. His dolor remisit cum stercoreum facili ejectione. *Martinus Rulandus, curat. 75. cent. 6.*

Ad tollendum dolorem in tenesmo impleantur duo sacculi trito sulphure, & in aceto bulliant. Et modo sedeat super uno, modò super alio calido, quantum potest, pati, quia statim tollit dolorem, & est expertum. *Arnoldus de Villanova, practic. lib. 2. cap. 35.*

## SECTIO QUINTA.

### De Termintho.

**T**erminth<sup>Terminth</sup> ejusdem generis pustula cum epinyctide est, ex fervido præassatoque sanguine prorumpens; est nigri coloris & rotunda. quæ ardore in squammam abit.

## SUBSECTIO VNICA.

### Pro Termintho in nate.

**B**assificam cum mellem tritam apponi jussimus. Uva etiam passa cum ruta egregiè ei medetur, curatur ut hyma. *Petrus Forestus, observat. 10. & schol. lib. 1. observat. Chirurg.*



## SECTIO SEXTA.

## Pro Testium inflammatione.

**V** Ir quidam ex equitatione violenta incidit in testiculi dextri inflammationem cum tumore insigni. Secta fuit vena brachii bis, semel in malleolo, purgans medicamentum exhibitum: pars fovebatur aqua rosar. & imponebatur cataplasma ex farina fabarum cocta in oxycrato ita ut quarta pars aceti cum tribus aquæ partibus misceretur; quod cataplasma nunquam me fefellit in hoc affectu: in hoc tamen agro, adeo tenera erat cutis scroti, ut ex coriata fuerit ab aceto acriori, & cataplasma ferre amplius nequiverit. Ego iterandum curavi cataplasma, sed ad tollendam acrimoniam aceti, illud decoquendum curavi cum lithargyro; & sic cataplasma optimè operatum est, agerque intra triduum à tumore liberatus. *Lazarus Riverius observ. 39 cent. 2.*

Ad dolorem sedandum, & inflationem simul tollendam, folia hyoscyami commendatur. *Io. Tiengius Medicus Amstelodamensis* pro arcano agrimoniam decoctam in aceto vel vino, & contusam apponebat. Expertus est à tota proprietate valere contra inflationem testiculorum. Remover etiam omnem dolorem aqua illius decocti cum panno lineo admota. *Petrus Forestus, lib. 27. observ. 1.*

## SECTIO SEPTIMA.

## Pro Testis Scirrho.

**N** Obilis quidam ex inflammatione & suppuratione facta in scroto durum eo loci scirrhum contraxit qui anserini ovimagnitudine adauctus est, indolens, qui tamen impedimentum, præsertim inter equitandum, illi adferebat; multis usus est remediis, verum nullam sentiebat diminutionem, donec *Basileam* veniens, sequentibus usus, cœpit admodum diminui atque emolliri, ita ut discedens, de impedimento amplius minimè conquereretur, tumore ferè penitus ablato, sensuque in illo recuperato; fomentari iussi primum hoc fotu, singulis noctibus.

*Burnet Parte 1.*

24. Rad. bryon. irœes rec. an. ℥iii. rad. cyclam. vn. i m. sem. nasturt. dr. iii. sem. sinap. dr. ii. rad. aristol. rot. ℥ß. sulphur. dr. iii. coq. in lixivio & aqua ferrata pro fotu. Emplastrum dein applicet sequens dies noctesque gestando, sæpiusque renovando.

24. Gummi ammoniac. bdell. an. ℥iß. infund. in aceto fortiss. per biduum, & dissolvantur, addendo sulph. vivi, spumæ maris, an. ℥ii rad. aristol. rot. sem. urtic. an. ℥i. sem. sinap. ℥iß. cum paucio oleo antiquissimo & cera rubra & melle F. Emplastrum. Usus est postmodum, sine fotu, quam diutissimè, & cum emolliri tumor inciperet, ut melius procederet cataplasmate hoc noctu uti iussi, & mane & interdum emplastro. Cataplasma tale erat.

24. Rad. Bryon. ireos, lilior. alb. rec. an. ℥bi. coq. in lixivio & aqua ferrata fabrorum: add. gummi ammoniac. dissolut. in aceto fortiss. ℥iß. sulph. ℥i. sem. sinapi, butyr. rec ℥iii. M. mirè profuit. Purgatus ab initio fuit, venaque secta. *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 693.*

## SECTIO OCTAVA.

## De Thea.

**I**ndie Orientali nihil familiarius est positione decocta ex Herba quam *Chinenses Thee*, ac *Iaponii Tichia* vocant. Sunt huic herbae ut folia oblonga, acuminata, & in ambitu crenata; sic radices fibrosæ ac in minimas particulas dispersæ *Iaponensium Tichia* longè plures æstimatur, quam *Chinensium Thee*, venitque non raro una ipsius libera centum argenti libris. Creditur hic passim, nihil hac herba salubrius, cum ad vitam in extremam senectutem porogandum, tum ad impedienda quæcunque sanitatis incommoda; neque ipsam solum corpora reddere vegeta, atq; arcere calculi dolores quibus hic neminem dicunt obnoxium; verum etiam tollere dolorem capitis, gravedinem, lippitudinem, destillationem, spiritus difficultatem, ventriculi imbecillitatem, intestinorum tormina, lassitudinem ac somnum, quem tam evidenter compescit, ut sorbitionem huius decocti assumentes, videas interdum

R r 3

inte-



Integras noctes lucubrando consumere, ac sine ulla molestia evincere inexpugnabilem ceteroquin dormiendi necessitatem; calefacit enim modicè, & adstringendo ventriculi osculum refrænât, coercetque usque eo vaporum ad somnum conciliandum necessariorum adscensum, ut nihil impedimenti afferatur illis, qui scribendo aut meditando satagunt noctes transigere; differunt haud parum inter se discrepantes hæ Nationes circa utendi rationem, permiscensibus Iapponiis pulverem hujus plantæ in lapide Ophitide contritum, aquæ calidæ, *Chinensibus* vero plantam cum paucis salis saccharive granis ex liquore aliquo decoquentibus, quod decoctum deinde calefactum officiosissimè propinant, cum convivis invitatis, tum quibuscunque honoris causa ipsos salutatum venientibus, idque ea animorū inclinatione ut Principes etiam viri non detrectent, quim potius honori ducant, suis manibus hanc herbam vel amicis decoquere, vel alioquin ei miscendæ temperandæve operam suam impendere; extructis propterea in Palatiorum suorum interioribus, conclavibus ac focolis ex pretiosissimis lapidibus, lignisve, isti operi speciatim dicatis: in quibus etiam curiosè asservantur ollæ, tripodes, infundibula, calices, cochlearia, aliaque perpolita hujus culinæ instrumenta, quæ aliquot aureorum millibus redempta ac sericis integumentis involuta intimis solummodo amicis ostendunt, neque minori habent loco, quam apud nos adamantes, gemmas, ac bacata summi pretii monilia, ut videre est apud *Jo. Maseum Rerum Indicarum lib. 7. & 12. & Lud. Almeydam. select. epist. lib. 4. & Petrum Iarricum tom. 2. lib. 2. cap. 17. Matth. Riccium De Christian. Expedit. apud Sinas lib. 1. cap. 7. Aloisium Fras. in Relat. Japonic. & Iac. Bontium dialog. 7. Med. Ind. & Joh. Linscotum, cap. 29. Nicolaus Tulpinus, cap. 25. lib. 5. observ. Med.*

In duabus tantum Provinciis *China* arbor *Thea* dicta reperitur ex *Alex. de Rhodes Peregrinationum historia*. Bellidis folia habet, & una alia major est, magnis curis colliguntur hæc foliola semel in anno (ut nos hic uvas colligimus) ex arbore myrti folio prædita: bullitur in aqua (&

tunc extendi potest & ejus forma percipi) ad dr. i. pondus, & calidæ aquæ illius vitrum deglutitur; vapores enim somniferos adeo cohibet, ut impediât quo minus vigiliis fatigeris, aut somnum cupias, roboret præterea stomachum, renes purgat, & calculo utilis est. *D. Vignavetus Pharmacopœus præstantissimus ea felicissimè sæpe usus est eaque multi utuntur magnates & Viri Literati à longo tempore, idque cum successu felicissimo. Petrus Borellus, observ. 39. cent. 3.*

## SECTIONONA.

### De Theriacha.

**Q**Uod attinet ætates theriachæ, rideo ego infantiam, pubertatem, adolescentiam & senectutem; quando suam formam absolutam theriacha est adeptæ, & jam finis est motus fermentationis, tota est homogœnea figmentum est de opio frigido Primis 5. annis; si ita est, nondum est perfecta fermentatio; quod post annos quindecim aut triginta demum valeat contra omnia venena somnium est. Si perfecta est primo anno, cur non vires integras habeat? Quis est nostrum quin etiam ex temporaneas compositiones contra venena faciat? num diascordium, elect de ovo; &c. sunt servanda 20 an. ante usum? a page cum istis nœniis. Quid quod scribunt quidem ista, sed in praxi observat nemo? Judicetur theriaca omnibus viribus efficax, cum finis est motus, & mistio omnia ad unitatem homogœneam redegit, sive annus sit impendendus, sive tempus aliud prolixius, prout se habent circumstantiæ. *Andreas Libavius in ep. annexa, observ. 1. lib. 10. observ. 1. Gregor. Hostii:*

## SECTIO DECIMA.

### Pro Thoracis abscessu & Fistula.

**P**uerulus Thoracis abscessu laborabat, & cum matura jam esset suppuratio, timeretque ille ulcus mucrone discindi, theriacam superpono, qua non secus unius tantum noctis spatio abscessus apertus est, ac si scalpello fuisset incisus; ex quo



quo facil coniectari potest quanta sit huius compositi vis, quod & nos sæpe aliàs experti sumus. *Antonius Benevenius. De mirandis morborum & sanationum causis.*

Devenimus ad mirabilem illum syrupum magistralem ab Excellentissimo *Fallopio* descriptum, lib. *De Vulneribus*; qui ad thoracis quasvis fistulas inveteratos plurimum conducit: à quo absumpto melius habuit æger, & tandem, licet non nisi post annum, omninò convaluit. Est autem syrupi descriptio hæc, cui chinam nos addidimus.

℞. Rad. alth. fol. millefol. marrhub. artemis. lapat. caulium valde virentium, pimpinell. cimarum rubi, rad. rubiæ tict. cum foliis, aristol. rot. fragar. matricar. cent. min. matr. sylv. beton. savl. rad. cariophyll. an. M. β. thur. mascul. ʒβ. sarcocoll. ʒi. sem. plantag. anis. fœnic. canabis, an. ʒβ. croci, rhab. rhapontici, cent. maj. an. ʒi. vini odor. ℥xv. chinæ ʒvi. Hæc omnia conterantur, deinde infund. in vino per viginti quatuor horas: bulliantque sine aqua. Colaturæ addantur mellis opt. ℥iv. & iterum bulliat decoctum cum mele unica ebullitione, spumetur & servetur ad usum, dosis ʒv. manè. *Epiphanius Ferdinandus, histor. 32.*

## SECTIO VNDECIMA.

### De Tinea.

**V** Ide supra lib. 1. sect. 7. *De Achoribus.*

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Tinea.

℞. **N** Asturtium contusum frixum cum axungia porcina, apponatur capiti abrafo; spatio viginti quatuor horarum crustam excidere facit; quinimo si eo quis diutius utatur, morbum sanat, quod experimento confirmatum est. Quidam purgato corpore, & abrasis pilis, ita curant tineam.

℞. Stercor. columbin. pecudum, anserum exsiccat. an. part. æq. ponatur in olla vitreata cum pinguedine suilla veteri ad

ignem quoad liqueat axungia, postea coletur pinguedo in aliud vas, & cum hac pinguedine inungatur caput primo die, sequenti die lavetur cum axungia dulci, & ita prosequantur alternis diebus quoad sanetur, altero die lavando, altero inungendo. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 54.*

Tineam siccam cum fursuribus, in capite præcedentibus universalibus remediis hac lotionem curavi.

℞. Malv. betæ, lapath. acut. cum rad. heder. arbor. cent. min. an. M. i. caul. rubr. M. β. colocynth. ʒiii. agar. ʒi. fol. sen. ʒβ. helleb. nigr. ʒiβ. coq. in aq. ad ℥iβ. colat. adde salis p. j. qua caput lotum fuit. *Petrus Forestus, Obs. 13. lib. 8. De exterioribus Capitis vitiis.*

Præter universalia medicamenta hæc infra scripta remedia tandem contulerunt puero novem annorum inveterata tinea laboranti.

℞. Lapath. acut. cum rad. betæ viridis, enul. campan. rad. chelidon. an. M. ii. fursur. macri. M. j. cent. min. p. j. fol. sen. ʒβ. colocynth. ʒiii. agar. ʒii. F. omnium decoctio in aq. marina in balneo M. in fine post decoctionem add. parum vitrioli crudi, decoctione adhuc calida existente, & manè stomacho jejuno F. lotio capitis. Deinde caput inungatur infra scripto linimento.

℞. Butyr saliti, axung. porc. an. ʒi. sulph. ʒβ. argenti vivi cum saliv. extincti ʒi. vitrioli crudi ʒi. hoc modo conficiebatur; axungia igne per se resolvebatur, deinde sulphur per se eliquescebat supra ignem in patella terrea, mox sulphur ita liquatum, & bene calidum in mortarium æneum conijciebatur, pistillo semper quam diutissime ducendo insuper butyrum liquatum, & coctum ad nigredinem calidumque admiscebatur, postea verò axungia liquata adiecta, semper pistillo probe agitato, atque hinc inde ducendo, postremo argentum vivum adiectum est, & omnium ultimò vitriolum; atque hæc omnia in dicto mortario concutiebantur, & pistillo continuo movebantur, donec totum frigidum evaderet, ac in linimentum coiret: est autem hoc præstantissimum remedium in tinea quantumvis



inveterata, & ab omnibus incurabili iudicata, modò universalia præcesserint. Hoc enim feliciter usus sum, capite prius loto, jejuno stomacho, in illis qui nullis aliis remediis curari poterant. *Petrus Forestus, observ. 20. lib. 8.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Tinea infantium.*

**S**olent infantes hoc malo) quod illi frequens est ex lactis corruptione, vel ex ejusdem abundantia vel ex utero materno) juxta *Rhasen* à variis morbis præservari, ut epilepsia, convulsione; & experientia sæpè vidimus tales infantes hilares & jucundos esse: hinc doctissimorum Medicorum autoritate, nisi parentibus urgentibus, à curatione multi abstinere. Quod si verò insistent parentes, medicamenta duntaxat levia adhibebimus; & præcipuam curationem in nutricem rejiciemus; si ergo materia videtur falsa & acris sumat nutritrix. ℞i. syrup. ros. pallid. ut lac corrigatur, & fascia lata manus infantis ligentur, ne malum scalpant; præterea lavetur caput decocto hordei ex cortic. malv. fumar. & borrag. lotoque capite, applicentur caules leviter supra cineres torrefacti, & butyro loto inuncti. Quod si videantur ulcera madentia restringi, admoveantur folii hederæ eodem modo torrefacta & inuncta: tandem folia atriplicis apponantur, hoc enim juxta *Rhasen* attrahit ad se acuitatem humoris, & venenositatem, quod & nos experti sumus: id etiam mirabiliter confert, si radices altheæ decoctæ cum urina pueri applicentur. Potest etiam obliniri caput vitello ovi crudo, capite prius abluto cum urina pueri. *Petrus Forestus, observ. 19. lib. 8.*

Hoc etiam topicum valet ad tineam in omni ætate, etiam puerili sine periculo.

℞. Succ. fumar. scabios. lapath. acut. ennlæ an. ℞ss. lithargyr. ℞ii. M. cum axungia antiqua porcina & ol. nucum q. s. cera adjuncta. *Idem, schol. obs. 22. lib. 8.*

Nos huic morbo optimum observavimus remedium, plures etenim quico usi sunt, præsertim pueri pristinae sanitati fuerunt

restituti. Vide licet fiat unguentum ex sulphure, axungia & succo limonum; & cum eo, abrasis prius capillis, fiat inunctio, ubi tinea infestat, vesperi per tres vices, alternis diebus, dummodò prius corpus pugatum fuerit: facta inunctione per dies quinque sequentes nihil agi debet; quibus transactis, fiat ablutio capitis cum decoctione malvarum. Videbis, Lector, mirandam rem, nempe brevi tempore morbum superari, nec amplius regredi. *Dominicus Panarolus, obs. 31. Pentecoste 5.*

## SECTIO DUODECIMA.

### *De Tonsillarum inflammatione.*

**M**ulier quædam afflicta est tonsillarum inflammatione gravissima, quam brevi secuta est, exulceratio cum dolore intenso: celebrata venæ sectione, & gargarismis ex oxycrato per biduum frustra usurpatis, sequenti curata est intra unum diem.

℞. Sem. sinapi ℞i. aceti rosac. & sacch. alb. an ℞i. aq. ℞iij. F. gargarisma. *Lazarus Riverius, observ. 76. cent. 4.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

### *Pro Torminibus infantium.*

**A**d tormina infantium dare solebam, anisi ℞i. crassè pulverizati, cum primo pultis cochleari; hoc purgat infantes, non aliter ac si senior rhabarbarum sumpsisset. *Joh. Heurnius, ad. aphor. 24. sect. 3.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

### *De Tremore.*

**H**odie imprimis pro singulari in hoc casu remedio laudatur electuarium *Orvietanum*. *Felix Platerus.*

Ad tremorem egregiè confert, si urina propria membra tremula sæpius laventur; alli verò urinam pueri magis commendant: habetur hoc quidem pro experimen-



mento indubitato, quacunque causa tremor oboriatur, five ex Venere vel vino potatione, vel post alios morbos, at ex fumo argenti vivi. *Petrus Forestus, schol. obs. 5. lib. 8. De exterior. Capitis vitiis.*

In tremore manuum post universalia, exhibeo ea, quæ caput & nervosas partes roborare creduntur, quale est præcipuè diacorum, & extractum calami: extra autem tremulas manus foveo vino calido, in quo betonic. salvia, majorana, rosmarinus & similia incocta sunt, & penetrationis causa spiritus vini aliquid affundo. Ita multum tremor paulatim remisit donec prorsus aboleretur. *Petrus Monavius, Epist. 28. lib. 2. Consil. & Epist. Cratonis, &c.*

Relatum est mihi aliquando à fido pharmacopœo aurificem *Bruxellensem* solo & continuo esu cerebri leporis astanti à tremore evasisse: esus quoque columbarum sylvestrium à vi quadam occulta valere dicitur. *Petrus Forestus, observ. 99. lib. 10. De cerebri morbis.*

Ad tremorem capitis senilem. ʒi. Pavonis finum, & cum aq. vitæ q. s. distempera, coque utatur in potu tribus matutinis. Fimus verò ad ʒi. qualibet vice sufficiet, & sic curabit senum capitis importunos tremores. *Petrus Borellus, observat. 98. cent. 3.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### Pro Trichiasi seu pilorum militione.

**V**Idua quædam *Bernensis* ante octennium doloribus torminibusque ventris & lumborum correpta fuit, eisque ultra annum continuò serè laboravit. Interim urina (quam non nisi maximo cum conatu excernebat) nunc sanguinolenta, nunc purulenta, & turbida erat; verùm quod admiratione non vacat, non solum purulentis & viscidis humoribus referta erat urina, sed & pili quamplurimi rufi & oblongi quotidie cum ipsa excernebantur, idque non sine dolore maximo, non nihil eorum duri ac rigidi & velut setæ porcinae erant, & proinde partes quæ transibant, mirum in modum pungebant: multis usque fuerat remediis, sed sine successu. Ego

cum ann. 1616. ad ipsam vocatus essem, & quæ recensui, præcipuè excretionem pilorum ex ipsa intellexissem; pilos quin etiam ipsemet in urina vidissem, admiratione captus fuit casus enim mihi novus & veluti in auditus fuit. Rogatus tamen sequentibus remediis curationem aggressus sum: vires cum propter doloris vehementiam & diuturnitatem, vigiliarumque frequentiam summopere labefactatae essent; imprimis ea quæ insigniter nutriunt, præscripsi: deinde suasi ut clysteres sibi familiares faceret; sequenti itaque enemate usa est, ab initio cum fructum ejus percepisset semel aut bis in die, deinde per intervalla veluti de tertio intertertium, aut quartum quemque diem.

ʒi. Rad. alth. malv. an. ʒii. fol. meliss. artemiss. origan. malv. alth. an. M. ij. flor. sambuc. melil. chamæm. an. M. i. sem. anis. carvi, seseleos, an. ʒii. sem. fœnugræc. & lini an. ʒii. incid. & contund. omnia in minutissimas partes, & misc. diligentissimè, ac reserventur in sacculo aut pixide benè clausa.

ʒi. Harum herbarum M. ii. coq. in aq. ʒbi. ad medietatis consumptionem in colac ʒbi. dissolve bened. lax. ʒvi. ol. aneth. chamæm. an. ʒß. butyr. rec. ʒi. vitell. ovorum. 2. M. F. Enema, corpus per intervalla purgavi sequenti potiuncula.

ʒi. Rad. fœnic. cichor. an. ʒii. fol. scabios. cuscut. meliss. an. p. i. flor. cordial. & genist. Hispanic. an. p. ʒ. sem. sesel. fol. sen. an. ʒi. coq. ut colatura redeat ad ʒii. in quibus dissolv. bened. laxat. ʒi. diacartham. ʒi. syr. ros. solut. compos. cum rheo, agar. & senna ʒß. aqua cinnam. ʒiii. M. F. potio.

Renes sequenti linimento bis in die inungere jussi.

ʒi. Unguenti ros. ʒii. ol. amygd. d. & lil. alb. an. ʒi. M. F. Linimentum, ex præscriptis rad. herbis, flor. & seminibus pro enemate paratis, etiam sacculos præparavi, quos aqua coctos, ventri & perinæo applicandos curavi, hisce ad tempus adhibitis remediis, ita restituta fuit matrona hæc, ut in hunc usque diem anno 1620. quo hæc scripsi, satis commodè & feliciter inter nos vivat. Utinam aliquis Linexis oculis prædatus nobis locum, in quo pili hujusmodi



nascuntur, investigare vellet, hæc eadem mulier postea cum urina non solum pilos, sed & semen anisi (quo post pastum quotidie utebatur) & carbonem reiecit, absque tamen insigni dolore, *Guil. Fabritius Hil-danus, observ. 50. & 51. cent. 5.*

Mictum capillorum sive trichiasin conspexere Medicorum aliqui, sed admodum pauci. At quis reciprocantem ipsius periodum? quam nobis evidentissime obtulit filius Consulis *Hornani* afflictus 4. amplius annos ab hoc inusitato capillorum mictu, qui ipsi identidem revertebatur quolibet decimo quarto die, cum insigni urinæ difficultate, & tanta perturbatio corporis inquietudine, ut vix se contineret in cubili: æquantibus singulis pilis, modò medium, modo vero digitum integrum; sed mucositate involutis, ut raro separatim, sed plerumque conglobatim prodierint. Durante qualibet accessione dies ferme quatuor: in quibus hæc continenter & molestè redderet urinam, transiegit tamen reliquos dies sine ullo cruciatu, ullove capillorum mictu usque dum postliminio repeteret consueta reciprocandi ratio. *Nicolaus Tulpius, capit. 52. lib. 2.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### *Pro Tuberculis malignis.*

**M**ulier quædam sexaginta nata annos, articulari morbo obnoxia, in manus pollice digito tuberculum articulum prehensum passa est, ex eorum genere quæ dolores & gravia symptomata afferre solent. Pro quo domando illicò emplastrum parare jubeo, quo nullum præstantius aut divinè excogitari potest, & supra tuberculum admoveere. Habet aut remedium sic.

℞. Fol. scabios. p. i. fulig. cumini ℥i. album. ovi num. 1. vel 2. salis ℥iii. M. F. Emplastrum s. a. & applicetur. Si tuberculum tibi incidendum videbitur, incide & aperi, cui quoque ad aperto emplastrum admoveatur. Eo enim dolores symptomata pessima evenire solita ex iis tuberculis leniuntur, & sæpe omnino remittuntur, imò & tuberculum ipsum hoc remedio minuitur & delitescit. Cæterum

si tibi videbitur corrodam esse carnem, prout sæpe evenit, utere alumine rochæ exusto, vel unguento apostolico, supra tuberculum prædictum semper ponendo emplastrum, quousque omnino compos voti sis. Sic enim mulier hæc sanata fuit, nec in digito vitium ullum relictum. *Amatus Lusitanus, curat. 50. cent. 5.*

## SECTIO DECIMA SEPTIMA.

### *De tumore in genu ex quo aperto puris loco flatus egreditur.*

**M**ulier triginta annos nata, ab octo mensibus tumorem patiebatur partem femoris inferiorem occupantem & ipsum genu; nullus rubor aderat, sed dolor eam infestabat, ut claudicare cogeretur; multis remediis res solventibus adhibitis, tumor in eodem statu permanebat. Tandem in duobus locis, parte scilicet interna & externa, elevatio satis insignis apparuit, eaque circumscriptam cum mollitie & fluctuatione, ita ut purulentam materiam adesse omnes existimarent, admotum est causticum potentiale parti magis tumentis, quæ erat exterior, postmodum scalpello incisa eschara & aperto tumore, flatus quidam emanavit, & nihil aliud. Simile exemplum habetur apud *Zacut. Lusitanum lib. 2. prax. admir. observ. 163.* ubi docet ex *Galeno* & *Avic.* hujusmodi tumores in genu sæpe à Medicis aperiri, pus intus latere existimantibus, & nihil aliud tamen quàm flatuosum spiritum egredi. *Lazarus Riverius, observ. 13. cent. 3.*

## SECTIO DECIMA OCTAVA.

### *Pro Tumore pedum.*

℞. Tercor. vaccin. q. s. aceti q. s. coq. simul ad pultis consistentiam. Hæc cum aliquoties tumentibus pedibus applicata fuit, tumor brevi admodum omnis absumptus est. *Martinus Rulandus, curat. 12. cent. 9.*

Tumida membra hoc sequenti oleo manibus perunctis benè erunt confricanda.

℞. Ol.



24. Ol. nucum vel amygd. amar. ℥iv. sem. aneth. cumini an. ℥iii. vel iv. bacc. juniper. ℥β. sal. & alumin. an. ℥ii. vini albi opt. ℥iii. coque trita & mista ad vini consumptionem; deinde exprimendo cola, & servetur oleum in usus prædictos. *Reinerus Solenand. consil. 7. sect. 3.*

Præmissio cathartico & sudorifero.

24. Fol. fumar. eupator. organ. serpill. abrotan. an. M. i. rad. hirundinar. cortic. sambuc. an. ℥iβ. sem. aneth. cumini, fœnic. an. ℥β. bacc. juniper. lauri, an. M. i. contund. & incid. & coq. in aqu. f. q. pro fomento sicco supra quod decoctum effervesceat ponantur pedes linteis obvoluti, quoad sudor è vapore erumpat; idque repetitis vicibus. *Joh. Petrus Lotichius, observ. 15. cap. 3. lib. 6.*

Matrona quædam Nobilis quinquagenaria tumorem œdematosum cum dolore insigni in dextro pede patiebatur, cujus origo talis fuerat. Cum aliquando iter faceret, equus cui insidebat in terram cecidit & super dextrum Matronæ pedem, quo ictu gravissimo calcaneum depressum est, & à parte pedis interiori ad exteriorem detrusum: unde dolores acerbissimi cum movendi impotentia exorti sunt. A multis tum Chirurgis tum Empiricis pluries vexata est; nec os luxatum in pristinam sedem protinus reponi potuit, unde dolores est ambulandi impotentia, cum pedis tumore œdematoso, eam continuo affligebant. Jam à 4. mensibus in his angustiis erat, cum eam invisi. Explorans autem diligenter partem affectam, video luxationem satis levem remanere, eamque callum contraxisse, atque adeo esse immedicabilem; dolorem autem præcipuum esse in vola pedis, non in parte luxata, quod nervi partem illam occupantes humore multo imbuti essent: ideo oportere, ad curationem, humoris ad partem debilem affluxum impedire, & eum qui parti impactus erat discutere, partemque ipsam roborare. Quæ omnia octo dierum spatio sequentibus remediis præstita sunt.

24. Rad. sarsæ ℥iv. aq. font. ℔iv. infund. per 24. horas, deinde bulliant ad mediæ partis consumptionem, addendo sub finem senn. mund. ℥i. turbinth. hermodactyl. an. ℥ii. Colatura capiat ℔β. manè per 8. dies.

24. Ol. ceræ ℥i. Illinatur pars affecta manè & serò. Deinde sequens emplastrum admoveatur.

24. Mass. emplastr. diapalm. vino rubro austero soluti & ad vini consumptionem cocti ℔β. ros. rubr. myrtill. mastich. & tartar. vini rubr. pulverat. an. ℥i chamæpit & chamæm. pulverat. an. ℥ii. F. massa, de qua formentur emplastra, quibus per unversum post inunctionem contegatur. His tumor & dolor ablatus est, manente tamen claudicatione propter ossis luxationem. *Lazarus Riverius, observat. 75. cent. 3.*

## SECIO DECIMA NONA.

*Pro Tumore suppurato resolutione curato.*

**F**ilia mea octo annos nata tumorem phlegmonosum & œdematosum satis exiguum passa est in parte externa mandibulæ inferioris dextræ, quæ ad suppurationem venit. Ego metuens à cicatrice facies scædaretur, antequam ob abscessus apertionem venirem, resolutionem prius tentare decrevi, *Guidonis* authoritati innixus, qui dicit aliquando apostemata suppurata resolutione finire: quod etiam soleni *Paræi* experimento confirmatur, qui se apostema suppuratum mercurio crudo cum emplastro diapalma subacto, per viam resolutionis curasse testatur. Ad cujus imitationem dicti mercurii ℥i. cum emplastr. diapalm. ℥i. admiscui, & tumori suppurato admovi; qui intra quatuor dies omnino resolutus est. Ad materiam suppuratam resolutione discutiendam, sequentes conditiones necessariæ sunt. Primo ut materia sit quantitate exigua. Secundo ut sit tenuis & serosa. Tertio ut cutem, & corporis superficiem occupet, non autem partes profundas. Quarto ut sit in corpore robusto, juvenili, & molles carnes habente. Quinto ut sit tempus æstivum. *Dionysius Pomet. observ. 1.*

Eadem filia mea passa est tumorem œdematosum crudum & minimè suppuratum supra regionem lumborum magnitudinis volæ manus, qui eodem remedio intra paucos dies discussus est. *Idem observ. 2.*



## SECTIO VIGESIMA.

## Pro Tumore ventoso in genu.

**P**ost universalia remedia, consului, ut hoc cataplasma resolutivum (etiam valens in materia phlegmatica) aponeretur.

℥. Sem. anis. subtiliter pulveriz. sem. fœnic. cumin. carvi an. quart. m. farin. fabar. ℥i. succiebuli & sambuc. & vini aromatic. an. q. s. decoquendo F. cataplasma, quo apostema illud ventosum resolutum est. *Petrus Forestus, observ. 3. lib. 3. Observ. Chirurg.*

## SECTIO VIGESIMA PRIMA.

## De Tussi.

**B**hæ, Tussis, est Thoracis concussio ab insita facultate, cum vehementi exsufflatione, studentis excutere quod sibi molestum est; alia est humida, alia sicca; humida vocatur, quoties ipsius ope, humores in aspersa arteria contenti, pituita putra, sanguis, pus &c. per os foras expelluntur. Sicca rursus dicitur, quoties magno licet ac multo labore, nihil excernitur, sed irritato fatigatur universum corpus tussiendo conatu, unde tum capitis, tum hypochondriorum, aliarumque partium dolor vehemens nonnunquam excitatur, quin aliquando Hernia producit, aliquando Urina, vel alvi Fæces involuntariè extruduntur. Tussis causa est quicquid asperam arteriam vellicare, aut quovis modo irritare potest ac molestare. Humidæ verò tussis causæ sunt humores à capite delabentes, ut plurimum pituitosi, nunc aeres, salique vel acidi; nunc blandi & insipidi; nunc tenues fluidique, nunc crassi, & visceridi; humores itidem varii (sanguis pus, sanies, pituita & serum) (ex pulmonum substantia vel vasis in asperam arteriam translati: forinsecus etiam quædam adventitia vel ore assumpta, perperamque in arteriam delata. Tussis autem sicca pro causis externis agnoscitur tum aërem, tum potum frigidum affatim admissum: pro internis verò aliquando catarrhum valde viscidum, vel valde tenuem aëremque expirato vehementius aëri haud

cedentem, aliquando etiam halitus, flatusve à tenui intestino, ventriculo vel per gulam elevatos, vel per lacteas venas in cor, & pulmonis substantiam, usque ad tracheam arteriam sese insinuant.

## SUBSECTIO PRIMA.

## Pro Tussi.

**P**ræsbiter quidam dicebat se omnem tussim curare pomo excavato & melle rosato impleto, supra prunas vivas affato, & sub noctem devorato, quod seipsum semper, tum alios plurimos, à tussi curasse jactabat.

Vxor mea cum sub noctem ex acri fluxione tussiret, deglutiendum exhibui vitell. ovi crudum cum sacch. cando, quod cum in introitu lecti ter quaterve deglutiisset, illicò in principio tussis cessavit, neque aliis remediis opus fuit. *Petrus Forestus, obser. 3. lib. 16. De Pettoris & Pulmonis Morbis.*

Ego ad tussim siccam & veterem ad tabidos, pleuriticos, asthmaticos, & eos qui valida tussi laborant, utor hoc eclegmate.

℥. Succ. tussilag. ℥ss. mucilag. sem. alth. cum aq. hord. extract. ℥ii. sacch. pend. q. s. F. Loch. *Petrus Forestus, schol. observ. 5. lib. 6.*

Sedandæ tussi cui sputum sanguinis est admixtum, Medici egregiè commendant syrup. myrtillor. quo & nos frequenter utimus. Valet etiam in sanguinis sputo syr. de portul. ut & loch. de portulaca, quo frequenter utebatur Præceptor meus. *Elidius Bononia,*

*Gisbertus Horstius* dabat ℥i. vel. ℥ss. lapid. hæmatitid. subtiliter pulver. cum succo granat. vel virgæ pastoris. *Faventinus* dabat stercor. murium pulv. ℥ii. cum aqua plantag. Hæc mirabilem effectum habent consolidandi venam ruptam. *Petrus Forestus, schol. obs. 20. lib. 16.*

Plumeam pellem cygni pellicea industria elaboratam & adaptatam in thoracis affectibus præsentaneum esse remedium, & specifica quadam facultate pectori prodesse, in uxore mea observavi hoc modo. Fuerat illa à multis annis tussi obno-



xiam, præsertim hiemali tempore cuius causa & medicamenta multa adhibita, fonticuli quoque facti fuerunt absque insigni tamen fructu; quum vero amicus quidam plumea pelle cygni ipsam munerasset, illamque ab eo tempore præsertim hiemali pro tegumento pectorali gestasset, paulatim, laus sit Deo, à tussi liberata fuit; hinc pellem hancce specifica quadam facultate pectori prodesse conicio; quemadmodum vulturis pellem foras admotam, ventriculū roborare, & concoctionem cibi promovere videmus. *Guil. Fabricius Hildanus, observ. 21 cent. 6.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

*Pro Tussi.*

**Q**uidam Siculus molesta quadam tussicula laborabat, & cum diu nihil conferentibus auxiliis, hoc malum tolerasset, ad nos tandem venit, rem exponit, consilium querit. Nos verò & quod morbus diutius inveterasset, & quod multos expertos Medicos nihil omnino profecisset, putabamus hoc vitium ægri elidi posse. Verum ne quid intentarum relinqueretur, marrubii succum ex melle ægrum devorare iussimus singulis diebus, tum & interjectis temporibus scyllam lambere, donec vermis ex ejus pectore unacum tussi propulsus, hominem sanitati restituit. *Antonius Benevenius, cap. 77. De abditis Morborum & Sanationum causis.*

Vermes in intestinis reperiri frequenter contingit, qui & quandoque vomitu rejiciuntur; sæpius verò per inferiora descendunt; in pectore autem & pulmone gigni atque cum tussi expelli inter rarissima & admiranda numerandum, atque ideo quidem magis, quod pulmo assidue moveatur, locum, quo hære ac quiescere posset, nullum vermi relinquens: nec minus admirandum est & in vesica nasci vermem, quod tamen cuidam viro accidit, cui in vesica existens multis modis molestus fuit, quandoque etiam sanguinis mictu provocato, donec tandem per penis meatum sponte egressus, finem doloribus imponeret. *Rembertus Dodonæus, annot. ad cap. 77. lib. De abditis Morborum & Sanationum causis Antonii Benevenii.*

Trochiscis his, cum necessitas urget, tuto & secure poteris uti.

24. Thur. mascul. succ. liquir. an. ʒi. opii, croci, myrrh. an. ʒi. cum syr. papav. formentur trochisci lupinis magnitudine æquales. *Reinerus Solenander, consil. 10. sect. 4.*

Ad tussim mirifice decoctum raparum cum saccharo candido butyro, vel oleo amygdal. d. recenti, prodesse animadverto. Sed detrahendus est illis cortex, & primæ cocturæ aqua abjicienda. Nephriticis etiam prodest. *Jo. Crata. epist. 15. libr. 5. epist.*

Jurisconsultus delectatus impendio nimis acri limonum succo eo processit dementia, ut quotidie biberet sex plus minus uncias: excitata inde molestiore tussi, quam ut ullis curationem reciperet remediis, præterquam solo raparum decocto, quod uti omnibus tussientibus ex usu est, ita quoque huic ægro plurimum opus attulit, enavigato, intra mensis curriculum, periculoso hoc Syrtium æquore, in quo facillime submersus fuisset. *Nicolaus Tulpinus, observ. 20. lib. 4.*

Imprimis valet cortex medius amaræ dulcis coctus in hydromelite. Nam talis potus gratissimus est toti regioni pulmonum thoracis, mirifice expurgat omnem saniem, mucaginem & impurum sordidumque phlegma, ac præterea confirmat illas partes, & corroborat omnes: quare commendatum tibi sit hoc decoctum. Est quoque valde bonum remedium, pro mitiganda tussi, decoctum aquæ fontanæ ebullitæ cum sem. sceniculi. Erit hoc ex facile parabilibus. *Georgius Oethens apud Johannem Vuitichium, consil. 12.*

## SUBSECTIO TERTIA.

*Pro Tussi.*

**P**ro singulari in tussi remedio à quibusdam celebratur oleum essentielle sacchari ab ipsis vocatum; quod sic parare solent: in phialam aliquoties intus vino albo generoso lotam & exsiccatam toties quartarium unum sacchari puriss. indunt, eamque hermetice clausam, in arena aut cineribus candentibus, igne paulo



vehementiore substrato, collocant, atque saccharum ad sublimationem, quæ cum stridore fiet, urgent; hocque post exemplum albuminibus ovorum ad duritiem coctis inclusum in cava vinaria in limpidissimum oleagineum liquorem solvunt; hujus cochl. i. aut alterum sensim deglutitum, multum in tussi præstare posse asserunt. *Felix Platerus, pract. tom. 1. lib. 2. cap. 5. pag. 419.*

Dum dormiturus est, pilulam factam ex styrace calamita, succo liquor. & sem. papav. alb. modico, sub lingua detentum interdum profuisse scio. Medicamentum quoque illud de seminib. à *Galeno* usque adeo celebratum 7. *De com. Med. s. loc. e. 5. & quinto method. fluxiones* hæc pertinet exsiccare consuevisse certum est. *Hier. Mercurial. cons. 90. tom. 1.*

Mulier quædam ab octo mensibus laborabat humerorum & brachiorum doloribus, cum pectoris angustia tussi & difficultate spirandi; multam extussiendo materiæ pituitosæ & aquosæ copiam excernebat: pluribus potionibus & apozematis aliisque remediis usa fuerat ab alio Medico præscriptis, malo in eodem statu perseverante; tandem meam opem implorat, ei exhibeo bolum ex calomelan. gr. xx. & diagr. gr. x. cum conf. ros. horis duabus ab assumptione remedii, copiosè sudavit, postea per tres vices alvum copiosissimè deposuit: & postero die dixit se perfectè curatam esse: tandem triduo post jubeo ut idem remedium repeteret, à quo quater purgata est, & ab eo tempore à prædictis affectibus omnino liberata est. *Lazarus Riverius, observ. 31. cent. 3.*

24. Calomelan. gr. xx. resin. jalap. gr. x. M. hoc remedio septies purgata est mulier quædam hoc affectu cum raucedine & difficultate spirandi laborans, & à fluxione & tussi omnino liberata; ita ut aliis remediis opus non fuerit. Est enim remedium ad contumaces fluxiones eradicantes efficacissimum. *Idem, observ. 47. cent. 3.*

Testatur *D. Robertus Boyle*, Tractatu *De utilitate Philosophiæ Experim.* se vidisse hominem, qui molestissimæ tussi non aliud utilius potuit invenire præsidium, quam succi fumum aut sulphuris balsamum;

idem pro tussi feliciter exhibere solet spiritum cornu cervi ad gr. viii. vel x. in cerevisia, vel quovis liquore minime acido, excepto lacte. Eundem spiritum commendat in convulsionibus puerorum, pleurisi, obstructionibus splenis, hepatis, & uteri, affectibus etiam cerebri, delirio febrium, & phrenitide.

24. Oxy. scillit. ʒss. ol. amygd. d. rec. & syr. viol. an. ʒvi. aq. veron. hyssop. & anis. an. vn. i. m. spec. diatr. solom. ʒss. ol. anis. destil. ʒ. ʒ. sacch. cand. or. iii. M. F. potiuncula, sumat cochl. ii. vesperi & quoties tussis urget.

24. Aqu. vitæ vel spirit. vini ter destillati patellam argenteam fere plenam; accendatur, sinaturque conflagrare, usque eo ut quarta vel quinta ejus pars supersit, atque flamma per se extinguatur. Hoc peracto, immitte in residuum adhuc dum ferventem, sacch. cand. finiss. q. s. M. diligenter redeat ad consistentiam julep. eo utatur mane & vesperi calidè.

24. Syrup. liquir. hyssop. tussilag. an ʒ. vi. loch. sani & expert. syrup. de papav. oxymel. scillit. an. ʒii. spec. diatr. solom. pulm. vulp. præp. an. ʒi. julep. viol. julep. è sacchar. cando, an. dr. i. ʒ. lactis sulph. ʒ. m. ol. anis. gt. v. balsam. sulphur. terebinth. chxir. propriet. an. ʒss. M. F. Lambile Deglutiantur ejus cochl. ii. vel ʒi. calidè ter in die: Profuit.

Loco potus ordinarii, bibat de hoc claretto pectorali.

24. Sem. anis. fœnic. an. dr. i. ʒ. rad. ireos, liquir. an. dr. i. ʒ. spec. diatr. Solom. diapenid. an. dr. i. m. manus. Ch. perlat. & cinnamom. el. an. vn. m. vini Rhenens. opt. ʒbi. m. sacch. vn. iii. croci ʒ. m. trajiciantur per manicam *Hippocr.* & F. claretum. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 2. 6. cap. 1. lib. 3.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Tussi Puerorum Kinchoest appellata.*

Cum Infans quædam unius anni valida tussi afficeretur, quæ nullis prædiis mitigari potuit; tandem nescio cuius mulierculæ consilio, mures coctos

natrix



nutrix masticabat, & pro cibo Infanti dabat; quo remedio à tussi liberata est.

Altera puella quinque annos nata, cum validissima tussi longo tempore detineretur, nuc ullis medicamentis curari posset, alterius mulierculæ consilio utens, guttam unam atque alteram sumpfit aquæ destillantis à limace exiguo sale consperso (hoc enim modo limaces in liquorem resolvuntur) quam cum cyatho cerevisiæ communis ebibit, & ex incontinenti fuit curata. *Insulanus* Medicus quidam hoc eclegmate ad tussim puerorum commodè utebatur magno experimento.

℞. Rad. alth. bene mundat. ℥iii. coq. in lbi. lactis vaccin. vel melius in flore lactis, ad optimam dissolutionem; tundantur & cribro cremor excipiat, addendo sacchar. cand. sacchar. penid. an. ℥iii. M. tempore tussis vehementis detur cochl. i. deinde bis in die. Hoc magna cum utilitate u-

sus sum, & raro me fefellit; quanquam subinde (cum facile situm contrahat ob lactis pinguedinem, neque diu eclegma durare possit) jubeo rad. alth. in aq. farfaræ decoqui; deinde per setaceum ut prius extractis reliqua addo: utor quoque commodè & utiliter ad tussim rad. althæ saccharo incrustata. *Petrus Forestus, observ. 6. lib. 16. De Pectoris & Pulmonis Morbis.*

Succus pulegii cochlearis unius mensura, admixto sacchari candi tantillo, pueris exhibitus efficacissimum est remedium adversus tussim illam clamorosa *Chincough* dictam. Hujus notitiam *D. Boyle* acceptam refero; qui ad profligandum hoc symptoma inter alia medicamenta primas ei tribuit, nec immerito, ut experientia nobis compertum est. *D. Hulse, referente Io. Raio Catal. Plantar. Anglia.*

# MEDICINÆ PRACTICÆ LIBER DECIMUS OCTAVUS.

*De Affectibus à littera V incipientibus.*

## S E C T I O P R I M A.

*De Variolis.*



**V**ariolæ sunt Pustulæ in summa cute, partibusque cuti proportionè respondentibus, cum febre continua, propter peculiarem sanguinis effervescentiam & ebullitionem, à facultate expultrice excitatæ. Causa earum *Spontanea* videtur esse labes quædam, seu impuritas sanguinis, inter prima fœtus rudimenta in utero concepta, quam Authores ferè omnes reliquijs sanguinis menstrui rectè adscribunt. Causæ evidentes sunt contagium aliunde susceptum, peculiaris aeris dispositio, & immodica sanguinis & humorum perturbatio, à crapula, aut nimio

exercitio. Imminentes Variolas indicant, febris incerta & vaga, modo intensa, modò remissior, dolor in capite & lumbis, facies quasi inflammata rubescens, magna anxietas, & inquietudo, cum syncope quandoque & vomitu immani, somnolentia gravis, terrores in somno, deliria, convulsiones, sternutatio, lachrymæ involuntariæ, oculorum splendor, & narium pruritus, calor, rubor, & punctationis sensus in toto corpore, oris ariditas cum tussi & siti. Res in vado esse videtur, quando accidit hic affectus in bona constitutione aeris, in ætate puerili, si in toto morbi decursu, symptomata eveniant laudabilia, si Variolæ



riolæ sint molles, distinctæ, paucae, rotundæ, fastigiatae, & boni caloris, i. e. in principio rubræ, postea albescences. Si contraria his appareant signa in summo versabitur ægrotans periculo.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Variolis & Morbis.*

**S**I video naturam pigram esse in expellendis & emittendis Variolis aut Morbillis, exhibeo decoctum descriptum ab *Avic.* quod habet caricæ, lentes excortic. & tragacanthum; & sentio inde magnum commodum, si quater aut quinquies mane & serò sumatur. Puerilis vero qui decocto uti nequeunt, propino mane & vespere haustum aque sceniculi; hæc enim non parum facit ad expulsionem Variolarum & Morbillorum. *Iohan. Nevius, consil. 25. lib. 3. consil. Cratonis. &c.*

Decoctum *Avicen.* ita se habet.

*℞.* Ficum ping. ℥vii. lentium excort. ℥ii. lacca ℥iiss. gummi tragacanth. & sem. scenic. an. ℥ii. Coq. in ℔iiss. Aq. fontis donec redeat ad tertiam partem. An commode præscribi possunt medicamenta antequam Variolæ aut morbilli sese prodeant? an illa impediunt motum Naturæ: imò inopinatò venam secuimus, & medicamentum purgans dedimus, quibus die sequenti aut postridie apparerent Variolæ, & melius multò habuerunt, quam quibus non ausi fuimus idem exhibere: sic parum probabile quod dicitur minus affatim erumpere papulas, si corpus ante purgaveris.

Dominus ab Insula de summa difficultate deglutiendi (quæ erat tantum Morbillorum latentium soboles, nos autem nil tale suspicabamur) conquerebatur; insignis febris: eluimus alvum clysmate, venam metu synanches secuimus; sequenti die exanthemata apparent, & brevi tamen convaluit.

Si puellis detrahatur sanguis initio in suspicionem Morbillorum & Variolarum, impediatur augmentum febris, cujus calor maleficus est tabificus; & sic fusus liquidisque carnibus non ita tumescet cor-

pus, nec scæda scabie maculabitur & inquinabitur, imò dum eruperunt, potest etiam detrahi sanguis, quod nos beato quodam successu fecimus. *Guil. Bollonius, lib. 1. Ephem. & Epidem. pag. 37. & 50.*

In primo *Epidem.* nostrorum libro annotavimus in sævitia symptomatum, quæ erant prænuncia exanthematum (sed hoc ignorabamus, quia fortè cautiores fuissimus) nos medicamenta & phlebotomiam tentavisse, cum ea eruptio præsto adesset, & tamen innocuum utrumque remedium, ut jam anile sit credere, nil in exanthematis tentandum, imò ex tribus pueris exanthemata passis, qui purgatus est levius habuit. *D. Denisot.* narat Abbati cuidam, cum nil de exanthematon eruptione constaret, phlebotomia largè celebrata, à prandio erupisse illa calumniabatur Medicos, tamen nil inde evenit deterius, imò cum servæ cuidam exanthemata, eaque densissima paruisent, nec non lingua intumuisent, flagrante etiam malo secta est vena copiosus detractus sanguis, & hoc innocuum fuit, notandum hoc *Idem, Epid. l. 2 p. 141.*

In variolis, ante eruptionem, sanguinem esse mittendum affirmant uno ore Medici ferè omnes, si scilicet ingens fuerit febris incendium nimiaque sanguinis effervescencia: levata enim, vena secta, natura quoque tanquam sarcina opprimitur onere facilius & felicius materiæ morbificæ aggreditur ad partes extimas protrusionem. Hanc præxim tum recta ratio, tum multiplex experientia confirmat: in omnibus curæ meæ commissis salutiferam semper comprobavi. Imò huic præcipuè generoso præsidio acceptam sanitatem sub *Deo* referendam judicavi. Nequaquam ut falsò creditur, necessariam sanguinis impedit, imò verius nimiam ejus conspescit ebullitionem; ita ut, phlebotomia præmissa, potius quam præterita, felicius procedat variolarum eruptio. Miravit nondum desino, unde nam tantum in venæ sectionem vulgi animis præjudicium subortum: quo fit ut famæ suæ nimium consulentes vix ausi sint Medici in variolis pertundere venam cum tamen omnes ferè omnium nationum Medicinæ proceres qui scriptis orbi inclaruerunt, magnum hoc *Idem* in hoc



affectum summis laudibus relinquerint commendatum.

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Variolis serpentibus.*

**P**uer quidam Variolis corripit; ex quibus nonnullæ percurrerant, ut miserum corpusculum intra duos dies ferè totum excoriatum reliquerint: Serpebant quippe, ac cutem tantum exanthemata hæc excoriabant. Contra quæ sic orsus sum. Primo, cum materia hæc plus justo subtilis esset, eam obrundere conati sumus; nec tantum eam, verum etiam hepatis & membrorum interiorum malam qualitatem infrigendo, ne de novo altera gigneretur, sed id refrigerantibus complebamur medicamentis, ut syrupo rosato de cich. simpl. de endiv. de violis, adjectis similibus aquis exterius ver jecur ex santalino unguento illinebatur, sed victus ad id multum faciebat, qui ad frigidum cum humiditate declinabat: quibus omnibus materia crassior est reddita, & Variolæ crassæ & amplæ apparere cœperunt. Prædictæ excoriationes quas nonnulli practici rubeas infectiones appellarunt, sic à nobis tractatæ sunt. Primo à propinato syrup. viol. solutivo lactucæ aquæ permixto, quo optime egressit, sequenti lavacro eas lavari fecimus, ac postea panno lineo abstergi, & pulvere infradicendo aspergi. Habet autem lavacrum sic.

℞. Ros. rub. sic. myrtill. fol. lentisc. sumitat. querc. tamarisc. an. M. i. fiat omnium decoctio quo decocto excoriatæ partes laventur, & ut dixi, lineo panno abstergæ sequenti pulvere inspergantur.

℞. Thur. mastich. ros. rub. sarcocoll. an. part. æq. F. pulv. subtiliss. Ubi unguento uti necessum fuit albo camphorato, aliquando verò plumbeo usi sumus. *Amatus Lusitanus, curat. 18. cent. 3.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Variolis.*

**P**uer quidam quinque annos natus, Variolis laborabat cum alvi fluxu per  
*Burnet Parte I.*

totum morbi decursum perseverante, septimo die multo gravior fuit alvi fluxus, febris intensa, sitis ingens. Variolæ depressæ, quarum elevatio ab alvi fluxus impediatur reliquis remediis usque ad id tempus parum conferentibus, sequentem præscribo julepum alvi fluxum & malignitatem respicientem.

℞. Rad. pentaphyll. & tormentill. an. ℥i. fol. scabios. pimpinell. an. M. i. scord. p. santal. citrin. dr. ii. coq. ad quart. tria, pro tribus dosibus bis in die sumendis addendo unicuiq; dosi confect. de hyacinth. ℥ss. troch. viper. ℥ss. lapid. bezoard. gr. iii. Post primam exhibitionem alvi fluxus imminutus fuit, Variolæ tumefactæ, & sitis imminuta. In aliis Pueris quam plurimis eadem potio mire profuit ad sedandum alvi fluxum, & variolas depressas tumefaciendas. Cui addebam aq. ros. & naph. an. ℥ss. etiam citra alvi fluxum, in depressis Variolis mirum in modum contulit, & plerumque sic componebam.

℞. Rad. tormentill. & pentaphyll. an. ℥i. fol. pimpinell. & scord. ana M. i. santal. citrin. & ras ebor. an. ℥ii. coq. ad quart. iii. in colat. ℥iii. dissolv. aq. naph. & ros. an. ℥ss. troch. viper. ℥i. lapid. bezoard. gr. iii. F. potio, quæ grandioribus detur uno haustu bis in die, lac verò sugentibus, ex cochleari frequenter. *Lazarus Riverius, observ. 2. cent. 2.*

℞. Aq. card. ben. ℥iii. aq. theriac. dr. iii. troch. viper. ℥i. lapid. bezoard. gr. vi. capiat horis vespertinis. Cordi applicabantur pulli columbini, ac deinde linimentum ex theriaca, confect. alkerm. & ol. scorpion. *Matthiol.* In omnibus jusculi dissolvebatur bezoard. mineral. ℥ss. hisce Variolarum eruptio ita promota est, ut tandem à favo illo morbo æger penitus liberatus fuerit. *Lazarus Riverius.*

Vidi puerum quendam Variolis laborantem, cum signis laudabilibus, febris enim post exortum pustularum remiserat, respiratio libera erat, nullus alvi fluxus, tubercula eminentia satis, somnus mediocris, bene se habebat ad ea quæ offerebantur, subito tamen, & sine manifesta causa pustulæ sese oculcaverunt, morsque secuta est illarum occasum, id ipsum vidi in pluribus aliis eodem morbo afflictis,



quibus omnibus mortem certissimam portendi. *Petrus Pacheguns, observ. 25.*

Quotquot Variolis aut Morbillis laborantes vidi, qui tensione & meteorismo ventris, cum anxietate huc atque illuc agitabantur, tot intra paucos dies obire vidi, præcipue si dolor junctus fuerit. *Idem observ. 62.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Variolis.

**P**ost eruptionem statim maxima cura habenda est oculorum, narium, gutturis, & pulmonis: oculos itaque statim in initio, & deinde quotidie auro puro leniter confricare prodest; id enim arcet ne in oculis erumpant exanthemata. Utile quoque est oculos sæpe illinire sequenti collyrio.

℥. Aq. plantag. ros. & euphras. an. ℥ss. in quibus dissolv. camphor. gr. ii. croci gr. i. F. collyrium. Nare si à pustulis exanthematum occupentur, subinde acetum rosaceum odorandum naribus admoveatur. *Franciscus Joel, sect. 5. lib. 9. practic.*

Pro tuendis gulæ & gutturis partibus, exterius scutum croco intersutum & lacte muliebri intinctum apponimus, hoc enim poros aperiendo, venenum ab intimo gutturis exterius allicit. *Thomas Willis, tractat. De Febris, cap. 15.*

Linguae humanæ & salivæ in solitum usum non ita pridem muliercula propalavit. Occupaverant Variolæ Epidemicæ universam faciem tenelli filii Clarissimi in Urbe nostra Viri, & oculis minitabantur exitium, frustra aliis tentatis, nutrix dolore infantis commota & commiseratione, lingua propria oculus pueri lingebat, sicque reſeratis oculis absterſaque sanie convaluit infans morti antea relictus, & publicis ex suggestu precibus expiatus. *Thomas Bartholinus, histor. 29. cent. 1.*

Observavi hoc anno 1629. quo Variolæ hic populariter grassantur, & multos infantes è mediis tollunt, nonnullis quidam infantibus ante Variolarum eruptionem, aliis verò postquam eruperunt,

& jam suppuratæ fuerunt, vermes spithamæ longitudine, & longiores ex intestinis spontè prorupisse, qui infantes omnes mortui sunt. *Daniel Sennertus, practic. lib. 3. part. 6. sect. 1. cap. 6.*

*D. Turquetus* apud *Petrum Asselinaum* referebat, *Elisabetham Angliæ* Reginam, contractas Variolarum suppuratione maculas in seipsa delevisse, emulsione lactea ex sem. canabino separatis corticibus, cum aq. ros. parata & cum gossipio admota. *Georgius Hieron. Velschius, observat. 88.*

## SECTIO SECUNDA.

### De Varis.

**I**O 80°. Latine Vari, tumores sunt duri & parvi in faciei cute à crasso succo progeneriti. Oriuntur ut plurimum ab humore alimentari poris cutis sese insinuante, cui aliquando humor excrementitius & atrabilius admiscetur.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Varis in facie.

**P**eractis convenientibus evacuationibus tam cum Pharmacis, quam cum Phlebotomiis, abluens faciem ter vel quater in die hac aqua experta Præceptoris mei *Faventini*.

℥. Camphor. ℥ii. ceruss. ablut. ℥i. cicer. rubr. ℔ss. interior. melon. ℔i. ovor. hircundin. numero 10. margarit. ℥ii. sem. bombac. ℥iii. salis commun. ℥ii. succi limon. ℥ss. tartar. vini alb. ℥ss. pulverizentur pulverizanda, & contundantur contundenda & infund. omnia simul in ℔x. aquæ distillationis lapathi acuti per duos dies, tum destillentur in alembico, qua aqua destillata si utaris modo dicto, procul dubio sanaberis ab hoc affectu, quod si tibi nimis molesta sit hæc compositio, aliud unguentum ad te mitto, quo multi qui per quinque annos & plures faciem pustulosam habebant, nec ullis remediis curari poterant, curati sunt.

℥. Argenti vivi saliva extincti vel aceto vini fortiss. ℥ii. vitriol alb. ℥ii. ol. laurin. ℥ss. agi-



agitantur diu simul ut unguentum coeant, vespere inungito, mane aqua fursur abluito, hoc unguento nuper Nobilem mulierem curavi, quæ per duos annos faciem pustulosam habebat, quæ nullis aliis remediis quam hoc curari potuit. *Petrus Forestus, observ. 7. lib. 5. observat. Chirurg.*

### SECTIO TERTIA.

#### *De Vena integra à pulmone rejecta.*

**N**Avarchus *Amstelredamensis* qui diu in mari vixerat, contraxit ætate jam maturus ex perenni destillatione, tussim magis terra quàm mari molestam, qua per biennium flaccidos pulmones exagitante, defecit tandem viscus hoc plus nimio laceratum: & effundit ex inopinato, non tantum sanguinem, sed præterea duos insignes venarum ramos: adæquantes singulos expansæ manus magnitudinem. Prodebant autem separati ab omni parenchymate, ostendentes non minus distinctè extrema sua lineamenta, ac si otiosus Anatomicus removisset circumpositi visceris impedimentum, argumento certè evidenti totum pulmonem fuisse vitiatum; ac proinde haud mirum, excretis hisce surculis effundisse ipsum ipsam cum sanguine vitam: at verò mirabantur Medici, tantam parenchymatis dissolutionem sine prævio pure: quod ipsum quoque non minus forte mirabuntur posterì: licet nec visuri, nec lecturi simile exemplum in ullis Medicorum monumentis, sed ut altissima flumina minimo labuntur sono, sic eveniunt homini subinde maxima infortunia sine turbulentis præsagiis. *Nicolaus Tulpius, cap. 11. lib. 2.*

### SECTIO QUARTA.

#### *De Venæsectione Neroniana.*

**I**N consuetudinem venit præsertim inter *Germanos*, & hic quotidie à Nostratibus usurpatur, ut multi in utraque manu simul, aut in utroque brachio, venas sibi incidi curent; idque ut plurimum non sine dispendio valetudinis, ex duplicata

enim venæsectione diversis in membris inter se oppositis, uno eodemque tempore facta, maxima in corpore, præsertim in hepate fit sanguinis & humorum agitatio; quod sine periculo fieri non potest. Hanc Venæsectionem Neronianam appellare placuit. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 92. cent. 6.*

### SECTIO QUINTA.

#### *De Venæsectione.*

**V**ulgò dicitur quoties duorum solennium remediorum usus incidit necessarius, à venæ sectione potius, quam purgatione est auspicandum: an hoc verum? Mihi valde difficile videtur statuere, quibus in morbis, quando & quomodo hoc sit usurpandum. Fortè hujus rei cognitio petenda erit ex *Galen cap. 4. lib. De Renum Affectibus*. Si (ait) Phlebotomia corpus evacuaveris, Catharticum venas, arterias, & inanes regiones inveniet non oppletas, ita facile in totum corpus pervadet ad attrahendos succos, & facile educuntur ob eorum tenuitatem & infusionem. Si contra vasa repleantur, ob plenitudinem in corpore medicamentum non deferetur, unde aut subsistent aut nil bene faciet. *Guil. Ballonius, Epid. & Ephem. lib. 1. pag. 76.*

Quæritur an somnus concedendus à phlebotomia? Observatum aliquando indulto somno post Phlebotomiam cuidam Illustri Domino non multò post mortem obrepisse: in somnum repentinæ tantæ calamitatis causa relata est; an non ea experientia eodem exemplo terrere nos debet; quoniam videmus passim Medicos gratificandi ægris gratia, Theorematum artis, suæ desertores, nil perinde esse putare, an quis à secta vena dormiat, an non? At si vires sint imbecillæ, verendum est, ne si somnus interdicator, vigiliis frangantur magis. Verendum quoque est ne eodem somno intro revocati spiritus & sanguis refrigeratis partibus extimis, grave aliquod periculum creent. Si in iis rebus morte infaustoque aliorum eventu moniti, ne quid tale eveniat videamus. *Guil. Ballonius, Epid. & Ephem. lib. 1. pag. 70.*



## SECTIO SEXTA.

*Pro Veneficio & Veneno.*

24. **A** Dipis canis benè liquati & mundati ℥iv. adipis ursi ℥viii. caponis ℥xxxiv. tres truncos visci columni adhuc virentis, frustratim sectos & tusos dum humescant, contunde autem simul lignum, folia, baccas, misce omnia in phiala, quam soli novem septimanis cum exposueris, virentem balsamum extrahes, eoque veneficatorum corpora, loca maximè dolentia & juncturas inungendo, certo experimento curabis. Hæc est descriptio medicamenti *Charriæri*. Notandum, in corryo non nasci viscum, nisi post annum centesimum: eumque Epilepticis, aliisque capitis Affectibus obnoxiiis, quærno longè utiliore esse. *Henricus ab Heers, observ. 8.*

Celeberrima *Orvietani* antidotus, sumpto & in convulsiones usque ferociente veneno, ita omnes anxietates, & instantes Syncopes statim conculcat ac si nullum intro admissum virus foret. *Ioh. Helmontius tract. cui tit. Butler.*

## SECTIO SEPTIMA.

*Pro Ventrículi attritione.*

**G**alenus ponit hunc casum libr. *De Præcognitione*, qui contigit filio Regis, dicentibus aliis Medicis esse principium febris (Incurrebat enim statim à cibo assumpto in lentissimum frigus, cum maxima contractione pulsus, & coarctatione anhelitus.) *Galenus* non esse febris principium asseruit. Rogante autem Patientem, quid esset, respondit, consuevit stomachus tuus conteri à cibo assumpto converso in phlegma ante excretionem. Petiit Patientis quid agendum esset? Respondit; Si esset alius, exhiberem vinum cum pipere, sed in vobis Principibus securissimis auxiliis consueverunt uti Medici. Sufficit ergo nardino unguento lanam intingere, & ori ventris applicare, pedibus calefactis recedentibus Medicis. *Pitholæus* vinum Sabinum attulit, piper immisit, pedibus

calefactis, apposita lana in oleo nardino infusa calida super os ventris, bibit æger, & statim sanatus est. Mihi licet sim nunc senio confectus, solum bis in vita mea casus iste innotuit. Primò, fui vocatus ad Nobilem quendam, qui statim cum accessi, dixit mihi; Ego non vos vocavi, ut sperem sanitatem recuperare, sed ne videar omnino vitam negligere. Unus enim Avunculus meus ex tali ægritudine dies clausit extremos: Ego dansei bonam spem salutis, volui suæ cœnæ interesse, ut omnia accidentia possem perpendere: statim cum cœnasset, totus frigidus ut glacies factus est, pulsus omnino contractus, ita ut vix sentiretur, cum tanta angustia, frequentia & compressione anhelitus, ut statim præfocari videretur: perseveravit in iisdem symptomatibus spatio trium vel quatuor horarum, deinde paulatim remissa sunt omnia, Ego verò memor loci allegati à *Galeno*, dixi, estote bono animo, spero enim, Deo favente, vos liberare ab hoc morbo. Mane sequenti feci pedes cum pannis calidis fricare, & fricationibus fortibus calefacere. Deinde lanam succidam carminatam decenter in oleo nardino calido infundere, & super stomach. applicare, superponendo pannos calidos; deinde dedi ei ℥i. pip. pulveriz. involuti in hostia madefacta in vino: postea dedi circa ℥iij. boni vini calidi, & illinc ad horam feci eum cibare, testis sit mihi Deus, quod nunquam postea minimam partem sensit illius passionis, licet antea plus quam per mensem ea ordinariè post omnem cibationem infestaretur. Mulierem etiam quandam simili morbo laborantem iisdem remediis statim sanavi. *Petrus Bayrus, practica. lib. 11. cap. 9.*

Fœmina quædam honestis Parentibus nata, cum frigidis cibis admodum assuevisset, iisque unice delectaretur per multos dies, semper assumpto cibo, toto corpore horrere statim cœpit, imò instar glaciæ reddi; idque maxima cum compressione thoracis, & difficili anhelitu per horas aliquot persistente: donec tandem membra calere rursus inciperent, recordatus casus, cujus *Galenus De Præcognitione ad Posthumum*, cap. 11. Itemque *Bayrus in Enchiridio*, lib. 11. cap. 9. meminit, locum marito,



viro Literatissimo ostendi qui non describi modò, sed omninò depingi conjugis morbum exclamavit; remedia ab illis relata singula, nimirum vinum cum pipere, & frictiones statim usurpat, sed absque successu, sequentibus diebus nihilominus eadem repetit, verùm frustraneo planè conatu: quod nimirum ventriculus habitualiter quasi alteratus esset, succedente post modum colica, atque hunc excipiente tremore primùm, mox paresi, tandem tumore quoque nigenti faucium ex terno; & ita dejectis viribus moritur. *Philippus Salmuthus, observ. 9. cent. 2.*

## SECTIO OCTAVA.

### De Ventriculi Calculis.

**C**Um *Horna infer. Austria*, Satuum Illustr. Medicus essem, vocabar ab Illustri, quadam Matrona ad mulierem mortuam, ut præssem apertioni Anatomicæ, ad explorandam incognitam diuturni morbi & mortis causam Conquereretur illa de continuo ventriculi dolore, tumore, nausea, & inappetentia. Fuit à nonnullis pro tympanitica, curata, alii existimantes ipsam gravidam, à medicamentis omninò abstinerunt, aperto itaque abdomine & ventriculo, in fundo ejusdem lapilli sunt inventi, nullo, cohærentes vinculo, sed pomi granati granorum instar sese mutuo amplectentes, tam copiosi, ut binas volas manus implerent. *Wolfgangus Heferus, Herc. Med. lib. 3. cap. 1.*

## SECTIO NONA.

### Pro Ventriculi dolore insigni in febre acuta.

**C**Um nauseabundus esset, vomitorium tale propinavi.

℞. Decocti hord. ʒi v. sacch. & syrup acetos. simpl. an. ʒi. M. quod cum tepide ebibisset primo crudos humores postea pituitam una cum bile evomit, & dolor fuit aliquo modo sublevatus quanquam idem circa precordia hereret, & ad imum ventrem verge-

*Burnet Parte I.*

ret; ideo clyster mollis injectus est: verum quanquam melius inde habere videretur, dolor tamen ex toto non fuit mitigatus, & sic ad fœtum emollientem anodynum & aliquo modo ventriculum roborantem confugimus.

℞. Fol. malv. viol. chamæ. summitat. aneth. an. M. i. flor. ros. rub. Miß. coq. in aqua pro fotu, quod dolor plurimum mitigabatur: interea sumpto decocto flor. chamæ. in cerevisia, ructus multos cum emisisset dolor sedatus est. *Petrus Forestus, ob. 1. lib. 7. De febr. Symptomatis.*

Ad ventriculum dolentem ac frigidum.

℞. Zedoar. el galang. opt. an. ʒii. bacc. lauri ʒi. incid. & parum contund. & coq. in vini rhenani lbi. ad consumptionem tertiæ partis, de colatura exhibeo pro vice cochlearia ij. vel iii. singulis tribus horis, & sæpenuero in hoc casu profuit, ad sedandum dolorem alvo existente clausa, talem exhibeo bolum.

℞. Elect. diaphœnic. ʒiiß. philon. roman. ʒii. M. pro una dosi, sedat dolorem somnum provocando, & succos malos in ventriculo contentos, dolorem moventes, secum educit: ut sæpius sum expertus, etiam cum commodo ægrorum, & fuit olim secretum *Ludovici de Leonibus*, præceptoris mei *Bonomie*. Si verò una cum dolore intolerabili alvus respondet ægroto sequenti potione non sine fructu usus sum.

℞. Decocti superioris ex zedoar. & galang. ʒiiß. vel ʒiii. Philon roman. ʒß. M. detur calide. *Io. Nesius, cent. 10. lib. 2. Consil. Cratonis &c.*

Mulier quædam annos nata sex supra 40. conquereretur dematissimo dolore os ventriculi lancinante, ad quem levandum & abigendum paravi tale vomitorium.

℞. Aq. benedict. vini alb. an. ʒi. quibus dilutis & epotis, mox in vomitum multum solvitur, evomitque viscidam pituitam permultam, atque post vomitiones istas intra diei spatium ab ingenti hoc liberatur dolore. *Martinus Ralandus, cur. 65. cent. 2.*

Uxor mea puerpera conquereretur mihi de gravi dolore quem sensit circa os ventriculi, à quo liberata statim est hoc modo.

S f 3

℞.



24. Vini boni ℥viii. vitell. ovor. num. 2. coq. ut a. e. Coctum jus sine pane exhaustit, ac postea in lecto affluenter sudavi per duas horas, & à tam crudeli passione liberata fuit. Interea lanam oleo chamam. calente imbutam orificio admovebam utiliter & salubriter. *Idem cent. 1. curat. 10.*

Injecto clystere primum emolliente tum carminante & discutiente, postea admoveatur focus sequens regioni stomachi.

24. Rad. cyper. galang. cal. arom. an. ℥i. fol. menth. origan. puleg. majoran. hyssop. salv. an. M. j sem anis. fœnic. carvi, dauci & bacc. lauri an. ℥℥. flor. camom. melil. anth. & lavend. an. p. i. Contund. & incid. includanturque duobus sacculis, qui bulliant in vino generoso, deinde expressi ventriculo & toti ventri alternatim admoveantur. Post fotum fiat illitus ex oleo rutaceo & anethino mixtis cum aqua vitæ, quibus addatur illi, quid ol. salv. aut cariophyll. chymicè extracti. Post inunctionem admoveatur emplastrum de baccis lauri, velejus loco cataplasma ex melle & semine cumini. Interim dum hæc fiunt, si nausea adsit, excitabitur vomitus blandiori vomitorio, aut catharticum exhibeatur pituitam evacuens. Julepus sequens ad dolorem sedandum, flatu discutiendos, pituitam detergendam & ventriculum roborandum efficacissimus est.

24. Fol. absinth. vulg. cent. min. & agrimon. an. M. ℥. coq. ad ℥v. In colat. dissol. sacch. alb. ℥i. M. capiat manè per biduum, *Lazarus Riverius, Prax. lib. 9. cap 11.*

## SECTIO DECIMA.

### Pro Ventriculi imbecillitate.

**P**iperis grana septem vel novem confra. cta non pulverizata ut sic minus fauces urant, cum vino exhibita, subito refrigeratum ventriculum juvant: quod & zinziber facit. Nux moschata comesta concoctionem juvat, cujus pulver. cum aq. chamam. destillata bibitus dolorem ventriculi mox sedat, cariophylli comesti idem faciunt. *Felix Platerus, practic tom. 2. cap. 5. pag. 444.*

Affinis quidam meus vir doctissimus ex

febre quartana, qua per triennium laboravit, imbecillitate ventriculi contracta, iussus à *D. Erasmo* mane gingiber crudum comedere, cum id majore etiam copia assumpisset, quam fortassè edoctus erat, ab eo tempore ultra triginta annos singulis matutinis duas radices magnas gingib. paululum saltem masticatas deglutivit; facitque adhuc, nequicquam subinde malin ventriculo sentiens, imò ad omnia munia graviter obeunda alacrior inde reddi solitus, quo tam multorum annorum hujus aromatis usu, hoc sibi adeo familiare fecit medicamentum, ut nec die uno, sine noxa, ille carere amplius possit. *Idem, observat. lib. 2. pag. 335.*

Magna insurgit difficultas de ventriculo, frigido & hepate calido; quomodo nimirum frigidus possit calefieri, ne simul hepar inflammetur, si quidem quæ ventriculum calefaciunt eadem plerumque & hepar inflammant, huic autem malo *Galenus* prævenire studens excogitavit compositionem quam nomine diatrion piperon donavit. Hoc equidem medicamentum singulari vi præditum est calefacere ventriculum, ne ejus calor communetur hepati. Nam cum constet ex tribus generibus piperis, quarum facultas calefaciendi in substantia tenui consistit, exolvitur antequam ad hepar deveniat. Est itaque conveniens & calefaciendi & tollendi intemperiem ventriculi medicamentum. *Abrahamus Seylerus, consil. 6. lib. 4. Consil. Cratonis &c.*

## SECTIO UNDECIMA.

### Pro Ventriculi imbecillitate.

24. **T**erebinthin. claræ ℥ii. mastich. pulv. ℥℥. spec. arom. ros. ℥℥. M. F. bolus detur horis duabus ante cibum, ad stomachum enim moderate calefaciendum & non exsiccandum, nullum ex internis valentius præsidium hoc usurpari potest, pro eo roborando fiat hoc ceratum.

24. Mastich. ℥℥. cariophyll. cinnam. nuc. mosch. zedoar. an. ℥i. spec. diamosch. d. ℥℥. ol. mastich. q. s. ad densandos pulveres; ceræ & terebinth. q. s. F. ceratum



tum extend. super alutam ad formam scuti, & ventriculi regioni admoveatur diuque gestetur. *Ioh. Zecchius, consult. 21.*

Duo vel tria grana mastiches parum contusa, & ex ovo sorbili, vel ex vino, aut ex jure data, tribus saltem horis ante cibum mirifice conferunt in firmando ventriculo. Sed longe præstantiores sunt rotula quædam ex inventione nostra, quæ & ventriculum roborandi & hepatis hypochondriorum vasa obstructa reserandi, atque nutritionis viscera omnia roborandi insigni facultate pollent, sunt autem hujusmodi.

℥. Spec. aromat. rosat. diarrhod. abbat. Spec. troch. de rhab. an. ℥i. limat. chalyb. præp. & in pulv. tenuiss. redactæ ℥ii. sacch. albiss. in aq. scolopend. dissolut. ℥iii. F. confectio in tabellis, quarum ℥i. detur mane quinque horis ante prandium. *Ioh. Zecchius, consult. 22.*

Maximè valet medicamentum mihi valde familiare quod sequitur.

℥. Conserv. ros. antiq. ℥iii. nuc. mosch. ℥i. Spec. diatrion. piper. arom. rosat. an. ℥ii. santal. omnium dr. m. lign. Aloes. ℥i. mivæ, cydon. aromaticæ q. s. F. electuar. cujus vn. m. detur duabus horis ante prandium septem diebus continuis. Quo tempore ceratum corio exceptum hic describendum supra ventriculi regionem gestabit.

℥. Mastich. ℥ss. cariophyll. nuc. mosch. zedoar. lign. Aloes an. ℥ss. Spec. diamb. ℥i. ol. mastich. vn. β. terebinth. q. s. F. ceratum pro stomacho. *Ioh. Zecchius, consult. 35.*

## SECTIO DUODECIMA.

*Pro Ventris doloribus & flatibus in gravida.*

**Q**Uando prægnanti accidit dolor imi ventris & renum, ita ut de abortu hæsitet, scinde panem magnum secundum latus, & calefac unam medietat. ad ignem, & eam partem quæ est ex latere medullæ, infunde, in malvat. vel optimo vino calido; deinde asperge pulverem carioph. & calidum liga supra umbilicum,

statimque dolor ventris cessabit. *Petrus Bayrus, pract. lib. 15. cap. 7.*

Umbilico sacculum ordinavimus ex milio, cumino, anetho, fœnic. pauxillo aque vitæ asperso, nec non permutationis gratia emplastrum. *Roderici à Castro lib. 3. De morb. mulier. cap. 12. quod,*

℥. Vitell. ovor. num. 6. fortiter agitentur & adde pulv. anis. cumin. fœnic. an. ℥i. cum ol. laurino F. ad ignem placenta mollis quæ umbilico applicetur. *Gregorius Horstius, observ. 27. lib. 5.*

## SECTIO DECIMA TERTIA.

*Pro Ventris torminibus.*

**V**Ir quidam gravibus ventris torminibus vexabatur, quæ solo hoc topico remedio sopivi.

℥. Farin. avenac. ℔bi. decoxi in aceto forti q. s. ad formam pultis, quam ventri imponebam ex qua statim doloris mitigationem perseculi, & liber ab hoc malo evasit. Potest etiam farina cum lacte recenti coqui. *Martinus Rulandus, curat. 16. cent. 1.*

℥. Rutæ M. iii. decoq. in aceto quæ sacculo indita ventri adhibebatur, qua soporatus est dolor. *Martinus Rulandus, cent. 2. curat. 59.*

## SECTIO DECIMA QUARTA.

*Pro Venere languida.*

**M**ulier prolis cupidissima, sed appetentia Veneris nullo modo lacescita, à me petit, ut stimulos Venereos in se emortuos (ut dicebat), accenderem: quod feci sequenti optiata.

℥. Conserv. rad. eryng. & satyrionis marisan. ℥i. cortic. aurant. melle conditor. ℥vi. nucem juglandem conditam num. 1. Confect. Alkerm. ℥ss. Ambr. gris. formic. volant. an. ℥i. Mosch. gr. vi. cum syrup. conservationis corticis citri. F. opiata, de qua capiat ante levem cœnam ad molem parvæ castanæ, superbibendo parum vini Hippocratici. Illa confessa est se miram percepisse voluptatem post usum opiatæ nostræ. Nihil autem efficacius in-



venitur quàm litus regionis uteri ex oleo de formicis volantibus, quod sic fit.

24. Formicar. volantium ℥ii. infundantur diebus canicularibus in oleo ad solem fervidum per 40. dies. *Petrus Pachecus, observ. 19.*

## SECTIO DECIMA QUINTA.

### De Vermibus.

**V** Ide supra lib. 10. sect. 22. De lumbricis.

### SUBSECTIO PRIMA.

#### Pro Vermibus.

**P**uer quidam trium annorum vermibus laborabat, febricbat, caput dolebat, tremebat, nares scalpebat, in os digitos immittebat; hunc Deo auxiliante, ita sanitati restitui.

24. Farin. lupin. amaror. Aloes an. ℥iii. succi absinth. ℥ii. commista omnia bene extendebantur supra petiam, & applicabantur umbilico, post applicationem emplastri, exhibui sequentem haustum.

24. Diaturbith. cum rheo ℥ss. feri laetis ℥i. F. potus quem cum calide exhausisset manè jejuno stomacho, vermes omnes per secessum emisit, & laus Deo convaluit, pro siti sedanda per tres dies durante, bibit aquam fontanam in cujus libii infunde batur per noctem ℥i. caparum incisarum, quæ in abigendis vermibus maxime proficiebant. *Martinus Rulandus, curat. 21. cent. 2.*

Exhibuimus hier. pic. *Galen.* ℥ii. quo remedio plus quam viginti vermes excrevit. Iterum hoc dedimus. Medicamentum.

24. Spec. hier. ℥i. sem. fantonic. pulver. scor. cent. min. corallin. an. ℥i. cum sacch. F. boli, sumpsit quotidie ℥i. & plusquam quingentos vermes excrevit. *Rodericus d. Fonseca.*

Puerum vidimus qui septimum agens annum triduo ex nimia lumbricorum vi fere mortuus jacuit, solo potu ex gramine

aceto & saccharo vivens. Quarto autem die cum Medicamentum ex Aloe, Myrrha & crocei propinaretur, duo de quinquaginta, supra centum, vermibus alvo depositis, statim convaluit. *Antonius Benevenius, cap. 85. lib. De mirandis morborum & sanationum causis.*

Nota & mihi mulier fuit supra quadraginta annos nata, quæ gravissimis ventriculi doloribus & nausea subinde correpta (plus minus.) vermes excrevit. *Rembertus Dodonaus, annotat. ad cap. 85. Libri Benevenii. De mirandis morborum causis, &c.*

### SUBSECTIO SECUNDA.

#### Pro Vermibus.

**P**ro Adultis saepe hoc pulvere fumus.

24. Sem. fantonic. ℥i. fol. sen. ℥ss. cent. min. ℥iii. rhei opt. ℥i. C. cervi usti, rad. dictamn. sem. lupin. an. ℥i. sem. cinæ ℥iv. fol. Athanasia, (i. e. tanacet.) dr. i. F. pulvis: dosis in adultis dr. m. cum aq. gram. vel acetos. mane & hora tertia, pomediana.

Pulvis pro pueris.

24. Sem. cinæ, corallin. an. dr. ss. rhei el. dr. ss. F. pulvis dosis ℥ m. vel ℥i. pro ætate pueri cū iure pulli vel aq. acet. & quoniam pueri ob amarorem medicamenta fastidire solent, facio tales placentulas.

24. Sem. cinæ ℥ii. C. cervi usti dr. i. sacch. alb. in aq. absinth. solut. ℥iii. F. confectio in placentas. Sequenti unguento inunge Umbilicum.

24. Ol. petrosel. nigr. ℥. m. cera novæ dr. i. m. M. F. unguentum, Adiunge sequens emplastrum quo sapissime in pueris utor.

24. Pulv. lumbric. dr. i. colocynthid. absinth. petrol. nigr. Aloes hepatic. an. dr. i. Myrrh. ℥. m. ol. absinth. fell. taurin. an. q. s. F. Emplastrum s. a. de quo accipe pro una vice dr. vi. vel ℥i. extendantur supra corium & applicetur ventri. *Joh. Nevius, consil. 25. lib. 3. consil. Cratonis &c.*

Pro vermibus in adolescente octodecim annorum summa cum laude exhibui cochlear. i. succi granat. & cochlearis dimidium olei olivar. simul commixta, co(dicta)



mirum) quinque sedes habuit, multosque vermes simul deiecit. Nobilis quidam *Gal-lus* hoc arcano utebatur, dicebatque Regi-nam *Gallia* solitam esse hoc remedio uti in pueris suis. *Elidius* præceptor meus pue-ris dabat pulverem corallin. rhab. el. an. Di-cum aq. gram. syr. viol. exiguo adjecto. *Petrus Forestus*, observ. 27. lib. 21. De Men-senterii & intestinorum affectibus.

Confectio illa quæ diacarthamum dici-tur potentissimum est remedium datum pueris ad vermes deiciendos & ad pituitam vel chylum corruptum ex quo generantur & nutriuntur, sed in exigua quantitate, quia fortiter solvit. *Petrus Forestus*, ob-serv. 33. lib. 21.

Puerpera quædam febre maligna labo-rans & ventris torminibus, una cum fluxu vermes teretes deiecit, huic pulverem hunc sequentem cum cerevisia exhibui.

℞. Pulv. c. cervi usti ℥ss. sem. portulac & zedoar. an. ℥ss. M. statim à pulvere exhibi-to, dolor ventris, qui vehementissimus e-rat, illico mitigatus est, & quinque ver-mibus ejectis, una cum excrementis liqui-dis, sana evasit, febre & fluxu desinenti-bus. *Idem*. observ. 34. lib. 21.

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Vermibus.

**I**Nfans quidam duorum annorum ver-mibus laborabat, post alia remedia tan-dem pulverem c. cervi usti, passulis exaci-natis impositum continuo devorabat: at-que ita dulcedine passularum allekti ver-mes, hoc solo remedio, dictu mirum, con-tinuato, ultra centum vermes per alvum deiecit; & ventre inuncto oleo cotoneor. & absinth. pulv. c. cervi usti immixto, & e-xigua cera adjecta; à vermibus modo vivis, modo mortuis exeuntibus, tum à fluxu al-vi & febre liberatus est, & magno cum no-stro honore perfectè convaluit. In om-nibus vermibus sive latis, sive rotundis (præcipue etiam ubi fluxus ventris adest) pro comperto habemus, nullum præ-stantius remedium esse quàm c. cervi u-stum, vi quadam occulta, pueris tum infantibus ac adultis exhibitum, memi-ni enim quod soror mea cum adhuc ju-

vencula existens vermiculatione labora-ret, exhibito hoc solo medicamento sim-plicissimo, nescio quot vermes ultro ex ano ejecerit qui decidebant in terram vi-vi & sic curata fuit. *Petrus Forestus*, observ. trigesimoquinto & schol. libr. vi-gesimoprimum.

Sal deglutitum ascendentes vermes ad stomachum deorsum pellit. *Idem* schol. obs. 36. l. 21.

Adolescens quidam vermibus laborans purgatus primum fuit infuso rhab. de-inde jussit ut noctu applicaret empla-strum paratum ex farinæ siliginis scu-tella in pinsita cum felle bovis, adden-do cochlear. pulv. absinth. & duo co-chlearia olei absinth. cum paucis aceto; gestat noctu supra umbilicum. Si ver-mes prodeant, continuet adhuc aliquan-diu, ut & alii exeant pilulis sequenti-bus frequenter utatur.

℞. Aloes ℥ss. rad. gentian. ℥ss. diagrid. ℥ss. cum succo absinth. F. pilulæ, capiat ℥ss. pro vice. *Felix Platerus*, observ. lib. 3. pag. 884.

℞. Sem. contra Di. passul. liquir. con-serv. viol. an. ℥ii. obsinth. rom. pss. F. decoctio in colat. ℥iv. infund. rhei. ℥i. corallin. gr. v. in express. dissolv. rhei ℥ss. F. potio. *Guil. Ballonius*, consil. 30. l. 1.

In febribus ubi maxima adest pravitas qualitas occulta & venenata, aut copia vermium, sæpè aquam ex citrio malo destillatam utilissimam inveni, destilla-tur per balneum M. prius citrio malo in minutissimas partes redato: hoc facto, ponitur totum malum citrium ad destil-landum, nempe cortex, pulpa, semina & aciditas simul confusa habebimus, a-quam pretiosissimam omni hyacinth. con-fectioe nobiliorem, dosis sit hora ante cibum, ab ℥ii. ad ℥iv. v. atque etiam vi. vermes necat, putredini resistit, cor mi-rificè tuetur, & vires fovet, potest vel so-la, vel cum jure, aut aliis aquis misceri. *Dominicus Panarolus* observ. 3. Pentecostæ 5.

Pro vermibus inter omnia mihi potior est mercurius d. quo in hac civitate mirabi-lia præstiti in pluribus ægrotis, ita ut nul-lo alio nunc vocetur nomine nisi pulvis meus, eò quod primus in ea celebrave-rim & paraverim. Nunquam vim in-ferre



fert corpori pulvis iste, licet duplò major dosi illius exhibeatur; ita ut fateri sin coactus ex operibus, verum esse quod scribit *Hartmannus*, Mercurium dulcem plus purgare in parva dosi in corpore valde cacochymo, quàm magna dosi in alio minimè cacochymo. Novies enim à me, spatio 12. dierum saepe exhibitò, longè magis eodem corpore ventrem movebant 12. grana prima vice, quàm 24. ultima vice sumpta. Utendi ratio in morbis in quibus vermes dejiuntur, aut subire creduntur, sicut & in aliis, cum in parva quantitate purgandum, hæc est. Jubeo pro adultis duodecim grana, aut quatuordecim ad summum, misceri cum tribus, aut quatuor, aut sex granis scammonii vapore sulph. præparati, quæ syrupo ad rem accomodato excepta, vel in forma morsuli, vel pilulæ, vel forma liquida, aucta dosi syrup. ex cochleari fumuntur: forbendo jusculum post duas horas, non expectata ventris dejectione, ut in aliis purgantibus, propter mercurii volatilitatem, qui sumpto jusculo deprimitur inferiora potens. Minori dosi datur infantibus & pueris, ad 6. vel 8. gr. scilicet mercurii d. & 3. scammonii præparati: quamvis multoties ascenderim ad 12. gr. hujus mercurii in parvulis sine ullo incommodo. Vocatus à quibusdam mulieribus ad juvenem quindecim annorum ad extremum vitæ subitò redactum inviserem, intrans cubiculum inveni quasdam ex iis floeculum lanæ bene carptæ naribus & ori admoventes alias verò candela cerea accensa periculum facientes, an adhuc spiritum duceret. Accedens proprius ad ægotantem, etiam si pulsu careret, agnovit amen nondum esse mortuum: percontans igitur quod rei esset, & quonam morbo laborasset, responderunt, Nullo. Hoc responsò, arbitratus sum juvenem in hoc vitæ discrimen redactum esse à vermibus: nam de veneno nulla erat suspicio. Ideò jussi Pharmacopœo, ut nulla facta mora mercurii d. gr. xii. & diagrid. gr. iv. ex cuspide cochlearis, cum aqua portulacæ aut ptisana, in guttur subitò immitteret, ita ut liquor vapores pulveris. Cum autem nullum deglutiendi motum haberet ægotans, retulit mihi Pharmacopœus totum supra linguam remansisse pulverem. Imperavi itaque, ut argentum

vivum ipsi magnitudine propinaret ex cochleari cum lacte, ne à mulierculis videretur, apud quas pro veneno habebatur, asserens hydrargyrum viam ad stomachum inventurum, etiam si nullus fieret motus deglutiendi. Quo optimè peracto à Pharmacopœo, mirandum: postridie assumpto hydrargyro, vidi ægotum deambulantem juxta domum suam. Cujus rei novitate attonitus petivi ab eo quid à discessu meo accidisset. Respondit se ab hydrargyro sumpto quinque aut sex vermes per os eiecisse, & ita periculum mortis evasisse. *Nicolaus Cefneau, observ. lib. 3. cap. 8. observ. 1.*

Tyro Pharmacopæus septemdecim annorum obambulans, & arti suæ incumbens, de repente mania quadam corripitur, obmurmurans, nec seipsum nec alios agnoscens, ad interrogata nihil respondens, manumque dextram sinistro hypochondrio frequenter admoventes, tanquam aliquid ablaturus. Vocati duo Medici, quorum unus eram, maximè laborabant in dignoscenda horum symptomatum causa. Primus, propter motus inordinatos corporis, epilepsiam esse credebatur. Ego verò minimè; sed è duobus unum affirmavi; aut juvenem esse fascinatam, aut vermibus horum omnium causam esse referendam: nos quidem contra fascinationes non valere, contra autem vermes aliquid posse: ideo potenti ad hoc utendum esse remedio, quod uno haustu & inopinanter deglutiiri posset, propter ægotantis incontinentiam, ad quod nullum magis esse idoneum mercurio dulci cum scammonio, dosi satis valida, ut citò agere possit. Socio igitur egroto imperavi, ut 14. gr. mercurii d. sumeret, cum 6. gr. scammonii vapore sulph. castigati, in cuspide cochlearis argentei imposita, cum aqua portulacæ, dum ægotus jacens os ad clamandum aperiret, in fundum gutturis ejus cum imperu immitteret: quod optimè præstitit, reique postea eventum expectaturi discessimus. Horis duabus elapsi redii solus, de his quæ accidissent sollicitus, invenique ægotantem ad ignem sedentem, mentis competentem, actorumque omnium immemorem; Interrogatus à me, in medicamen-



to quod sumplerat venter subductus esset, respondit, Minimè. Expectandum, dixi, non enim otiosum erit medicamentum, ut contigit: de nocte quippe sexies aut circiter venter subductus est cum 36. vermibus, omninoque sanus ab eo tempore permansit. Mirabar ego antidoti vires, nulla facta dejectione, nullisque vermibus ejectis, omnia symptomata quiescisse, hoc autem in merc. d. laudem. *Idem, observ. 3.*

Rogatus à quodam Chirurgo ut rusticum inviserem pleuritide, ut ipse putabat, laborantem, accedens ad ægrotum statim affirmavi ex pulsu, morbum non esse pleuritidem. Inspectoque partis dolentis situ, visus est mihi potius infra, quàm supra septum transversum positus pulvisque multum credens, qui durus non erat, asservi per jocum. Tales pleuritides medicamento purgante sanari; pignoreque certare volebam, aut vermes subesse, aut saltem corruptorum humorum non parvam copiam, Tumptoque postera die purgante medicamento 40. vermes ejecit, & sanatus est. *Idem l. 2. cap. 3. obs. 2.*

## SECTIO DECIMA SEXTA.

### De Verrucis.

**V**errucæ sunt tubercula ex cute instar monticulorum pronata: absque dolore, subdura & scabra: à variis quas ob continent, formis diversas sortiuntur appellationes; aliæ enim sunt sessiles Græcè *μυρμηκία* dictæ, quæ humiles sunt infra latæ, & radices alte infixas habent; dolore etiam affligunt: aliæ rursus sunt pensiles *ἀκροχορδον* Græcis appellatæ, quæ parte quidem summa latiores sunt, ima verò versus cutem, tenuiores, qua quasi pediculo innituntur; thymia denique vocantur, quæ colorem thymi repræsentant, ad cutem etiam sunt tenues, in summo autem latæ duræ, & asperæ, pensilibus minores; oriuntur autem omnes vel à materia crassa melancholica & pituitosa, vel ex succo cuti & cuticulæ alendæ destinato.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Verrucis.

**P**ater meus cum juvenis manus verrucis repletas haberet, ei consultum fuit à *Spiringio Medico*, ut omni die sale & aceto eas fricaret; quo remedio sanatus fuit, nostra ætate quidam succo calendulæ solo inuncto sanati sunt. *Petrus Forestus, observat. 10. lib. 4. Observ. Chirurg.*

Ad verrucas, myrmecias & acrochordonas tollendas sæpe feliciter usus sum succo thymali. Præterea raphanum excavato, sale impleto, operculo occluso in cæterino per noctem servato, salem in liquorem versum invenies: eo verrucas confricato, & panno in eodem liquore tincto superligato, postea decident: est hoc secretum *Alexii Pedemontani*. Ad verrucas etiam valet radix chelidonizæ cum axungia trita & admota, eas enim absumit & tollit, agrimonia quoque cum forti aceto emplastrata verrucas tollere dicitur. *Idem, observ. 11. lib. 4. observ. Chirurg.*

24. Limac. rubr. q. v. ponantur in vase plumbeo asperso sale, & sic maneant per quatuor dies, abjectis limaciis, ter, quaterve in die cum liquore illarum liniantur verrucæ. *Idem, schol. observat. 11. libr. 4.*

Verrucas nobilis cujusdam puellæ totas manus occupantes, sola sanguinis tauri iam mactati calidi illitione sublatas vidi. Idem etiam sanguinem cervinum quidam præstare referunt. *Philippus Salmuthus, observ. 27. cent. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Verrucis.

**U**T subito verrucæ omnes manuum curentur, lotio tantum eorum instituenda est, ex aqua communi in qua sal armoniacum solutum fuerit; quod à *D. Videt Medico Delphin.* qui millicies expertus est cum felicissimo successu, acceptum teneo. Nuper famulum *Dom. legat Hollandia* curavi, qui innumeris verrucis à duodecim annis scatebat, nec ab ullo curari potuerat: curatus autem fuit



fuit sola aqua cum sale armoniaco saepe fricando ut dictum est. *Petrus Borrellus, observ. 46. cent.*

Quidam patiebatur multas verrucas in digitis manuum, quas curavit meo consilio, illitu lactis ficulnei quater aut quinque adhibiti. Idem præstitit idque multò efficacius spiritus sulph. per campan. per aliquot dies admotus in rustico quodam. *Simon Iacoz. observ. 17.*

Intra septem vel octo dies, curantur, verrucæ portulaca contusa; ea pars confricatur, deinde instar cataplasmatidis admoveatur, iterando bis in die. *Samuel Formius, observ. 34.*

Esto pomum transcissum cujus pulpa interna sit affricta verrucis, donec inteperit, & religatis medietatibus per filum, donec pomum putruerit, tum enim videbit verrucas attactas disparuisse: simul atque vita pomi ultima perit, cui verrucarum impressio fuit conglutinata, perit etiam verrucarum vita ultima. *Job. Helmontius, tractat. cui tit. Magnum oportet.*

Verrucæ atque stigmata à perturbatione prægnantis foetui inducta; attactu cadaveris sensim ac sponte mortui, donec pars intimè refrikerit: sponte evanescent. *Job. Helmont. tract. cui tit. Tumulus pestis.*

Remedia verrucarum multa à Practicis hinc inde commendantur. Ex vegetabilibus, *Chalmeteus* scrofulariam, *Fallopins* folia salicis aut succum eorum, *Dioscorides* pisa & ciceres, *Platerus* heliotropium, *Hartmannus* aquam supranatantem truncis quercuum bipenni detruncatarum. Alii cichorium verrucarium, lac tithymali, radices dracunculi, irides, ari, cyclaminis, chelidonii, folia sabinæ. rutæ, millefolii; aquam è sarmentis vitium, succum porri, caparum, verbasci, portulacæ, mali punici; semen nigellæ, squillam, & nescio quæ commendat. Ex animalibus, caput anguillæ, lacertæ; sanguinem menstruum; sterqus caprinum, ovium, canis; fel tau. ri, lucii; pinguedinem ardeæ, talpæ &c. laudant. Ex fossilibus denique & mineralibus, alumen, nitrum, calcem vivum, vitriolum, arsenicum, æruginem uris, & sexcenta alia prædicant. Verùm

pauca ex his famam sustinent. Mibi longo usu compertum est, emplastrum ex galbano & sale ammoniaco, quod sic componitur.

℥j. Galban. aceto. squillit. soluti ℥i. sal. ammoniac. ℥i. picis navalis ℥ss. empl. diachyl. magn. ℥iii. M. F. magdaleon. Hoc emplastro verrucas & clavos in multis curavi. Si remissius agit, dosin salis ammoniaci augeo. Fæminæ cuidam cujus manus utraque plurimis ultra centum verrucis mirè deformabatur, linimentum sequens, quod commodius erat, præscripsi.

℥j. Rad. dracunculi, ari, cyclamin. irid. an. ℥iii. fol. sabinæ ℥ss. sem. heliotrop. ℥ii. sal. ammoniac. ℥i. oxymel. scill. q. s. M. F. Unguentum, quo singulæ verrucæ mane & vespere inungantur. Exaruerè quidem & deciderunt nonnullæ; sed paulò post aliquæ denuò excreverunt, nonnullibi & novæ eruperunt; quare fortiori runcina extirpandas duxi.

℥j. Mell. ros. ℥ii spir. vitriol. ℥iii. M. pro linimento, quocum verrucæ aliquandiu illitæ fuissent, sensim nigrescere, corrugari, tandemque penitus excidere visæ sunt. *Baldassar Timæus. Cas. vigesimo quinto lib. 6.*

### SUBSECTIO TERTIA,

*Pro Verrucis in virga & locis secretis ex lue gallica.*

Post universales purgationes, dissolvo parum sublimati in aq. plantag. cum exiguo aluminis, & pulma verrucas illino, quibus exsiccantur, & cum crusta decidunt. Chirugi in nosocomio *Delphensis* in *Gallica* lue verrucas tollunt, inungentes unguento morbi gallici, quo si non desinunt, etiam utuntur sublimato & alumine cum aqua plantag. (quo remedio & nos uti consuevimus, antequam illi eo uterentur) donec decident & perfecte curentur. *Isbrandus* Chirurgus *Delphensis* hac aqua egregia utitur ad condylomata, verrucas thymos ani, virgæ & membrorum muliebrium consumenda & auferenda in lue gallica.

℥j. Aq. plantag. ℥ss. sublimati ℥iv. alumin. ℥ss. pulverizentur in aqua penna intin. &c.



Et vel petia lini verrucæ tangantur: hac aqua nos felicissime usi sumus. *Nicolaus Massa, cap. 5.* De cura ulcerum morbi *Neapolitani*, describit modum faciendi aquam separationis auri ab argento, qua utitur in verrucis hoc modo:

℥℥. Vitriol. roman. ℥ii. alumin. roch. ʒvi. (fortè ʒvi.) salis nitri ℥i. pone in cucurbitam curvam, vel si vis pone in retortam cum capello suo recipiente ad ignem fornacis, & habebis aquam cum qua separatur aurum ab argento, & cum qua fit pulvis angelicus quæ aqua est mirabilis ad removendas verrucas in quacunque parte, & maximè in ano & vulva; cauterizat etiam ista aqua ulcera maligna ambulatoria ubicunque etiam fuerint, ut in gutture, & prohibet progressum ulcerum virgæ & vulvæ. Sed cum est nimis acuta, oportet lymphare ipsam cum aqua rosac. at ea (inquit *Massa*) sæpe sanavi ulcera mala gutturis, tangendo bis in die cum aqua dicta, cum medietate aq. ros. admixta, & est de secretis nostris. *Petrus Forestus, observ. iii. lib. 4. Observ. Chirurg.*

#### SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Verruca Gallica in mucrone lingua enata.*

**A**Ger multis pressus angustiis, Medicos, pacta liberali mercede, rogat, ut pro sui salute veterum ac juniorum monumenta revolvant: ego stipendii compendio adductus, amicos, i. e. liberos, tota nocte consului. Multas pro tanto malo remediorum myriadas inveni. Otiduo tentavi omnia frustra. Ultimò adii *Lacunam*, lib. 2. in *Dioscor. cap. 17.* qui pro Verrucis curandis nullum aliud præsidium utilius esse inculcat, quam chelidonii maj. folia pista cataplasmatismis forma super verrucosam partem impone. Ad agrum latabundus accedo, remedium experturus, & emplastrum exertæ linguæ appono lineo panno involutum, & in medio linguæ triplicato filo ligo, non petranfierant dies duo quando, verruca omnino contabuit, ita uti illico exciderit. Hoc exemplo edo-

ctus plures in volis manuum & plantis pedum renatas, quæ miserrimè ægros excruciaverant, radicibus hoc facili & certissimo auxilio extirpavi. *Zacutus Lusitanus, observ. 79. lib. 1. prax. admirand.*

#### SECTIO XVII.

*De Vertigine.*

Σάστου & σκοτόδινος, Latine Vertigo est exagitatio & præternaturalis commotio spirituum animalium in ventriculis potissimum anterioribus cerebri, quæ omnia circumagi videntur. Hujus causa proxima est tenuis vapor aut fluctulentus spiritus in cerebri ventriculos irrepens, qui in plexu choroide spiritus animales & humores exagitans & variè impellens, turbulentos sensus motusque reddit. Excitatur autem hujusmodi vapor non assiduo sed per intervalla & periodos. Crudus verò & vitiosus humor in quo calor imbecillistalem excitat vaporem, interdum in ipso cerebro, sæpius in subjectis partibus veluti ventriculo, hepate, liene, & matrice continetur. Causæ procatacticæ sunt diuturna & celeris corporis totius circumgyratio, rerum externarum circumrotatarum, & aquarum vorticum continuus aspectus ab alto, immodica exercitatio, solis æstus, balnei calor vehemens; dignoscitur, quod omnia in girum circumagi videntur, aliquando etiam & visus obscuratur, quandoque & sibilus vel tinnitus in auribus precipitur, sæpe etiam laborans corrumpit, nisi propinquis nitatur adminiculis.

#### SUBSECTIO UNICA.

*Pro Vertigine.*

**H**oc vinum cuidam seni ita profuit, ut postea nunquam amplius de vertigine, admodum conqueretur.

℥℥. Senn. ʒii. turbinth. ʒß. agar. ʒiii. zinzib. ʒi. piper. ʒß. sem. coriandr. ʒi. absinth. ʒii. summitar. cent. min. majoran. an. dr. i. infund. in mensura j. vini, bibat diebus aliquot. Vixit diu postea incolumis. *Felix Platerus, observ. lib. 1 pag. 10.*

*Pilule*



Pilulæ nunc describendæ ex intervallis frequentibus devorentur, quippe quæ efficacissimæ sunt ad affectum hunc demendum, simulque ad caput & omnes sensus confirmandum.

℞. Agar. el. ℥iii. colocynth. ℥i℥. myrobal. cheb. ℥i. sem. major. rutæ, pœon. an. ℥i. zinziber. asar. piper. ana ℥i. nuch. moschat. cubeb. cariophyllor. xyloaloes, mastich. cardamom spic. nard. an. ℥℥. hellebor. ℥iii. sal. gemm. nitri, an. gr. v. Aloes hepat. pondus duplum. F. pilulæ cum benedicta, quarum ℥i. bis terque in mense, vel ℥i. tertio quoque die exhibeantur. *Joh. Zecchius, consult. 96.*

Inter alia placeret mihi aliquando usus sequentis Electuarii, quod quidam *Hippocratis Theriacen* vocant. Ego non semel ejus usu similes, & eo graviores morbos curavi.

℞. Succ. absinth. succ. marrhub. succi stach. mastich. rhei, chamædr. chamæpit. an. ℥iii. hyssop. ℥i. agar. boni, ad pondus omnium, pulverizentur omnia subtilissime, & excipiantur melle cocto; detur manè à dr. ii. ad dr. vi. in decocto stœchad. Hujus loci si placet.

℞. Theriac. bonæ antiq. vel mithridat. conserv. flor. beton. vel salviæ, vel anthos an. partem j. conserv. rosar. part. ii. cum melle anthosato. F. Electuarium. *Reinerus Solenander, consil. 2. sect. 1.*

Præmissis venæ sectione & purgatione, mihi placet per triginta dies sarsæ & ligni decoctum cum cichoraceis paratum sumat *Hier. Mercurialis, consult. 3. tom. 1.*

Præ ceteris oleum buxi sicut in Epilepsia ita in vertigine optimum judicatur remedium intus & extra, inungendo eo quotidie pulsus & carpum, & plantas pedum: intus verò in hunc modum.

℞. Conserv. flor. rorismar. ℥iii. ol. buxi nuc. mosch. menth. chymico modo extract. an. ℥℥. M. cum syrup. cort. citri, F. Electuar. cujus sumat mane dr. ℥. Est remedium præstantissimum corroborans ventriculum & cor. Quinimò si per os guttæ viii. aut x. olei buxi cum ℥iij. aq. pœon. exhibeantur, nullum sentiret hoc, mea sententia, præstantius auxilium, *Rodericus à Fonseca tom. 1. consult. 16.*

Conserva flor. calendulæ à nonnullis tan-

quam specificum vertiginis maximè commendatur. *Lazarus Riverius, prax. Medic. lib. 1. c. 9.*

In Vertigine, præmissis universalibus, specificus est pulvis ex cinnabrio nativo confectus, cujus descriptionem habet *Quercet. libr. De capit. Affect. stercus pavonis absque omni præparatione in forma pulveris cum sacch. mixtum & exhibitum ad ℥i. vel ℥. m. vertiginem etiam inveteratam curat. Idem epidem. Ioh. Hartmannus, pract. Chimiatri. pag. 91.*

Decoctum radicum primulæ veris in zythogalo, aliove idoneo vehiculo sumptum singulare est & præsentissimum remedium ad vertiginem. *D. Hulse, referente Ioh. Raio Catalogo Plantarum Angliæ.*

## SECTIO VIGESIMA OCTAVA.

### Pro Vesicatorii doloribus.

**Q**uidam comate laborans, & ab eo emerfus conquerebatur mirum in modum de dolore à vesicatorio excitato. Sed cum nullo anodyno potuissem illum sanare, Domina *Ranchina* uxoris meæ soror solo hydrelæo leniit. Ego mulierculam vesicatorii igne excarnificatam beavi sic, & omnes alias quæ in tale tadium inciderunt.

℞. Cortic. secundi & viridis rami sambuci cultello derasi M. j. coq. in oleo dulci cum pauca aqua ad consumptionem aquæ. Colaturæ adde ceræ parum. F. Unguentum, quo dolores omnes à vesicatorio excitatos demulcebam. Divinum mehercule est. *Petrus Pachequus, observ. 12.*

## SECTIO DECIMA NONA.

### Pro Vespe ictu.

**C**um vespa manui meæ aculeum fixisset, dolor adeò sævire exortus est, ut impar essem ad ferendum malum. Admotâ theriaca, in momento cruciatus cessavit; sed cum post tres horas theriacam illam admotam abjecissem, rediit dolor crudelissimus ut antea, qui sopitus est eodem



eodem remedio parti per integrum diem admoto. *Petrus Pachecus, obs. 6.*

## SECTIO VIGESIMA.

### De Vesicæ ulcere.

**E**<sup>ἡ δὲ τῆς κύστεως</sup> solutio continui in musculosa, ut plurimum vesicæ cervicē, aliquando etiam sed rarissimè in ejusdem membrano corpore. Oritur ab humoribus acerbis, calculo asperso, pure è locis, superioribus transmissio, ab inflammatione etiam & abscessu malè curato; ab assumptis denique cantharidibus. Signa ulceris vesicæ sunt vehemens circa pubem dolor, urinæ difficultas suberuenta & purulenta urina, furfurum aut squammularum cum urina excretio, & tenesmus *vid. 81. aphor. sect. 4* in ulcere virgæ: sanguinis & pus etiam profuit sed ante urinam aut sine urina, & inter mediendum in ejus meatu dolor percipitur. Capacitatem vesicæ ulcus si obsideat dolor continuus per totum infimum ventrem persentiscitur, si verò in cervicē consistat, circa pubem, & tempore tantum excretionis, dolor se prodit.

### SUBSECTIO UNICA.

#### Pro Vesicæ ulcere.

**M**aximè hic prodest corpore decenter purgato, lactis potus; neque scio (inquit *Ætius*) an post ullum aliud remedium secundo saltem loco id sit habendum: nam & asperitates lenit, & ulcerationes eluit. Trochiscum etiam unum *Gordonii* sine opio, modo in lacte caprino dissolutum modo in decocto hordei per syringam injecimus. Potest etiam distemperari unus ponderis ℥ii. cum lacte & ita exhiberi: Valet in ulcere renum & vesicæ. Sed magis conducunt trochisci injecti in vesicam, quam per os sumpti, quod ab ore ad vesicam longam sit via. Accipiat per os hunc bolus.

℥. Cass. rec. extract. ℥i. pulv. trochisc. alxikeng. ℥i. F. bolus, Valde hic conveniunt trochisci alxikengi; & ideo ut ℥i. aliquando caperet cum lacte ovillo, jussi, Capiebat etiam has pilulas.

℥. Terebint. venetæ claræ lotæ in equiseti ℥ii. liquir. pulv. ℥i. succi liquirit. ℥ss. F. pilulæ instar cicer. dentur iii. pro vice. *Petrus Forestus Obs. 29. lib. 25. De Vesicæ morbis.*

## SECTIO VIGESIMAPRIMA.

### Pro Vesicæ, Utericoli orificiis & hæmorrhoidum summo dolore.

**H**oc unguento partes dolentes tum Vesicæ, tum uteri orificii, ut & podicis, blandè illiniat penicillo intincto in eo.

℥. Succ. hyoscyam. ℥ii. mucilag. sem. lini, psyllii extract. cum aqu. plantag. an. ℥ss. crem. lactis ℥ii. ol. amygd. d. rec. ℥ss. coq. ad consumptionem succorum, adde opii ℥ss. bene dissoluti in lacte ceræ albæ q. s. F. linimentum. Suffitum quandoque admittat in sella perforata ex decocto sol. verbasci & hyoscyam. fuscitatum; bibat noctu cubitum itura haustum lact. caprini addito sacch. penidii parum; in quo lacte radices consolid. maj. parum ebullierint. Postquam per biduum illud biberit, tertia nocte adiciat lacte sic præparato pulv. seq. dr. i.

℥. Troch. alxiKengi cum opio vn. iß. sacch. penid. vn. ii. F. pulvis. Vino bibendo, cum eo carere non possit, saccharum permisceat, ut dulce fiat, minusque accendat: vel syrup. violaceum, aut julepum violaceum, quod non solum gratiam vino addit, sed etiam vires illius infringit. Vbi dolor remittere incipit, excipiat fumum, ex pulvere sequenti carbonibus injecto excitatum partibus inferioribus.

℥. Thuris, mastich. ladan. styrac. benjoin. carabes, an. part. æquales: à salsis & acerbis sibi temperet. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 484.*

## SECTIO VIGESIMASECUNDA.

### Pro Vicibus ad eos, qui flagris casti sunt.

**Q**uidam inungunt loca percussa flagellis cum oleo rosac. mixto cum pulv. boli arm. nam mitigat dolorem, & lo-



& locum affectum ab inflammatione arcet. transactis tribus diebus aut quatuor, inungantur oleo irino vel sambucino calido: & postea in processu sequenti.

℞. Resin. ℥iii. ceræ ℥i℥ pone ad ignem, & liquefactis adde terebinth. dr. m. (potius vn. m.) olei com. ℔i. sœnugræ. thur. an. dr. ii. bulliant aliquantulum. Deinde cola, & cum eo manè & vesperi ante cibum inung. *Petrus Forestus, schol. observ. 31. lib. 6. Observ. Chirurg.*

Pellis ovīs recens excoriatē calens adhuc circumdata, quolibet efficacius, die una & nocte persanat. *Idem, schol., observ. 4. lib. 5. Observ. Chirurg.*

### SECTIO VIGESIMA TERTIA.

#### *Pro Vigiliis & sudoribus diaphoreticis.*

**C**um alvi adstrictio concurrat, præ omnibus adnitendum, ut alvus respondeat, alias frustra vel optima auxilia adhibentur. Commodus remedium applicari non potest clystere ex jussculo caponis cum saccharo crasso confecto. Hoc non solum alvum solvit; sed etiam corporis vires restaurat, quod & passulę lotæ ante cibum sumptæ præstant. Balneum aquæ dulcis, si aliquid ros. rubr. & flor. nymphæ injectum fuerit, somnum conciliat, dolorem demulcet, sudorem inhibet, & appetitum promovet: conciliat quoque somnum medulla cervi recens, si tempora inungantur ad noctem; confert hic pulvis mirificè non solum ad somnum inducendum, verum etiam vires restaurat, somnia horribilia arcet; atque sudorem inhibet.

℞. Smaragd. hyacinth. margarit. corall. bol. armen. scob. ebor. an. q. l. in pollinem redigantur, ad noctem sub ingressum lecti quantum media testa nucis porticæ capit propinatur. Quod si sudor non cedat fiat inunctio dorsi ex lacte mulieris butyro & ol. viol. cui etiam rosac. addi potest cum mucilagine psylli ab opiatis abstinentium. *Abraham Seylerus, epist. 5. lib. 6. consil. & epist. Cratonis, &c.*

Cuidam militum duci assiduis vigiliis affecto brevi & mediocriter ita.

℞. Fol. bismalv. chamæm. an. M.iii. coq.

in s. q. aquæ, ejus decoctione vesperi cubitum iturus per hore quadrantem crura imposita abluebat, ac postea lectum ingressus confestim somno se debebat, & præternaturali depulsa. *Martinus Rulandus, curat. 4. cent. 6.*

### SECTIO VIGESIMA QUARTA.

#### *Pro Vipera morfu in pede.*

**T**ribus interpositis à punctura horis puellam demorsam (quæ tredicim erat annorum) ad me deferunt, nulla interposita mora, per Chirurgum præsentem, locum punctum vulnusculis profundioribus per ambitum scarificare jubeo, & cucurbitulas multa ignitas flamma admove: quibus sanguinis ater & virulentus latitans abundè fuit extractus sed & universam tibiam levioribus vulnusculis scarificari quoque jussi sanguinemque tamdiu ex illis fluere, quoad sua sponte cohibitus fuit (nam erat tibia tum temporis multis & variis maculis lividis & rubris variegata) tunc verò ex illis ac acribus cepis optimè pistis, theriaca adjecta confectum emplastrum loco demorso admove-ricuravi, & in potu illi theriac. ℥iii. meratioris vini ℥v. dissolutas propinavimus. Post hæc verò quatuor interpositis horis, panatellam ex aliis confectam in victu obtulimus; à somnoque abstineret, quantum possibile esset, monuimus; sequenti vero die puellam tremoribus corripere deprehendi, minoribus tamen; (cœperant enim jam fumi venenosi cor petentes minui; ad infimasque partes retrahi) tunc jejuno stomacho succi fol. fraxini ℥iv. in potu dedimus: est enim Medicamentum hoc omnia antidota in hoc casu excedens; emplastrum porò dictum è novo paratum, iterum loco per tres sequentes admotum fuit dies, in quibus quoque & aliis sequentibus prædictum fraxini succum ebibit. *Amatus Lusitanus, cent. 1. cur. 1.*

Ratio, veterum auctoritas, & quotidiana experientia me docuerunt nullum esse præstantius præsidium ad mitigandos dolores ex morfu viperæ, simulque ad extrahendum venenum, animalibus per dorsum discissis, actuque calentibus parti vulne-



vulneratæ applicatis, quæ cum refrigerant amoveantur, & alia ut Gallinæ, Galli, aut Columbe iterum atque iterum applicentur. *Joh. Zecchius, consult. 33.*

Quàm primùm quis à vipera morsus fuerit, celerrimè ad locum affectum ferrum candens tam prope admoveatur quàm suffere poterit patiens, ita enim vi ignis extrahetur venenum, quod ut oculati testes mihi retulerunt, aliquando instar ceruleæ maculæ ferro adhærebit. *D. Robertus Boyle tractat. De utilitate Philosophiæ naturalis, part. 2. sect. 2.*

## SECTIO VIGESIMA QUINTA.

### *Pro Visionis debilitate.*

24. **M**Acis ʒi. euphras. ʒiv. M. F. pulvis subtilis de quo cochlium semper ante cibum deglutitur; vidi homines & decrepitos ferè ad cæcitatem perductos, hoc pulvere integræ visioni restitutos. Item odor majoranæ frequens magnum est secretum *Bartholom. Montagnana consil. 58.*

In cibo 2. mensibus utatur isto pulvere.

24. Beronic. organ. chamedr. rutæ, saxifrag. levistic. puleg. euphras. an. M. i. anisi, fœnic. cinnam. siler. mont. an. ʒi. calam. aram. galang. an. ʒß. sacch. ʒßß. M. F. pulvis. *Joh. Crato consil. 37. lib. 6.*

Collyrium quoddam mihi probatum hic describam; cujus quidem usu frequenter, non solum oculorum partes omnes mirificè roborantur verùm etiam spiritus visori limpidi redduntur; quod collyrium *Hollerus Medicus Parisiensis* Celeberrimus à vetustis quibusdam Medicinæ auctoribus accepit, hoc enim scribunt visum cæco novem annorum restituisse est autem hujusmodi.

24. Succ. apii, fœnic. verben. chamædr. pimpinell. cariophyllar. salv. chelidon. rutæ, centinod. morsus gallin. cariophyllar. farinæ volatilis an. ʒi. piper. crassiuscule triti, nuc. mosch. lign. aloes, an. ʒiii. omnia immergantur in urina pueri incorrupti, & sexta parte vini malvatici bulliant brevi tempore, tum exprime & percola, & repone vase vitreo bene obturato: hora somni singulas guttas singulis oculis instil-

*Burnet Parte 1.*

la. Dum vindemiarum tempore mustum effervesceit flores, euphrasie injiciantur vinumque repurgatum asservetur, quod in mensa epotum singulari est remedio *Joh. Zecchius, cons. 95.*

Euphrasie pulvis sorbili ovo inspergitur, aut inde sal. oxydorsicum paratur.

24. Salis commun. ʒi. euphras. sicc. ʒii. macis, cinnam. an. i. M. *Joh. Hollerius, lib. 1. De Morb. intern. cap. 20.*

## SECTIO VIGESIMA SEXTA.

### *Pro Visionis debilitate ob maculam.*

**C**Auterium ad aliquot dies sincipite gestarum summo opere laudo cucurbitulas modo siccas, modo humidas, strictiones, ligaturasque partium extremarum proficuas admodum esse posse fateor, quantum attinet ad topica, quæ detergentia, & discussoria esse debent. Primò probò aquam fragorum instillatam. Secundo sanguinem galli antiqui eodem modo usurpatum, sed collyrium quod ab ovis induratis, ac secundum cavitatem vitelli, pulv. sacc. viridis aris, & aloes lotorum repletis, ac in loco humido appensis, stillat, tanquam efficax Medicamentum usu experientiaque mihi non semel comprobatum propono. Sicuti & aqua pannis quæ sic paratur: conficiatur panis ex farina frumentacea cum pulvere simplicium ocularium, tantillo calcanth. mulla exceptis, deinde hic panis statim ex clibano extractus, reponatur inter duo vasa stænea bene occlusa, ibique detineatur, quousque frigescat. Post colligatur aqua, ex vaporibus ab eodem pane emissis, exorta: quæ in oculos instillata mirificè valet ad usum dictum; utilis etiam est aqua salis ammoniaci. Sed inter cætera probò, ut canna fœniculi in orto de nodo ad nodum perforetur, & foramen pulvere sacchar. & croci repleatur (vel sale minerali, saccharo, & pulvere euphrasie) deinde cera occludatur, per noctem detineatur, ac manè liquor extrahatur, verum antehorum omnium usum maxime proderit, si oculi foveantur spongia molli madefacta in decocto alth. mal. fœnic. semin. lini ac hujusmodi aliorum emollientium.

T t



tium . *Jul. Caf. Claud. conf. 11. & 136.*

## SECTIO VIGESIMA SEPTIMA.

### *Pro Visus debilitate.*

**E**X jecore cujusdam pisciculi vulgari lingua à nostris dicti *Aelpuyck*, liquor quidam defluit, experimento certo obscuritati visus admodum commodus & utilis: capitur hic piscis probe *Delphensem* urbem in aquis *Veenlandia*. Ejus liquore ciliatantum inungantur, & lacrymæ ex oculo exhibunt, is qui visum obscurum habet, miraculi instar illicò lucidum & luminosum recuperabit. Hoc arcano felicissimè in multis usus sum. *Petrus Forestus, observ. 35. lib. 11. De Morbis oculorum, &c.*

Omninù existimo vitreorum conspiciolorum usum convenientem oculis plurimum commodare, tantum abest ut detrimenti aut noxa quid iisdem adferat; & quidem hoc duplici de causa, quoniam nimirum, primò similitudine quadam substantiæ oculos reficiunt; & in statu suo conservant. Et præterea, quia radios, quibus visio perficitur, dispergi non ita subito sinunt; oculus certè, quoad primum visionis organum, humorum crystallinum aqueæ naturæ est, atque ideò rebus aqueis & diaphanis, veluti aqua clara, vitro crystallo, speculis, & per consequens etiam conspiciillis naturaliter gaudet; unde non immerito in decantatissimis scholæ *Salernitana* versiculis, hic etiam legitur. *Fons, speculum, gramen, hac dant oculis relevamen, & Aristotiles* testante *Mesue* magno illi *Alexandro* consuluit ut saepe speculum tersum, directum, ac diu intueretur; hac enim ratione visum sese corroboraturum, & oculi defatigationem remoturum esse. *Petrus Monavius, Epist. 33 ad Andr. Dudithium, lib. 5. Epist. & consil. Cratonis, &c.*

Per specillis uti cœpiante aliquot menses ad candellæ lumen, quoties minutulæ literæ legendæ essent, nunc etiam magnos characteres vix sine iis lego, ac quod dolentius est, jam de die etiam saepe adhibere ea cogor, itaque de quo antedubitabam, & ex te quærebam, nunc meo

periculo edoctus, didici rectius facere eos qui non nisi necessario ad eorum usum descendunt, tanta tam parvo temporis intervallo mutatio, miraculi instar mihi visa est. *Andreas Dudithius, Epist. 22. Ad Monavium, lib. 6. Epist. & consil. Craton. &c.*

Nobilis quidam à multis annis assuetus singulis matutinis diebus ablueri faciem & oculos aqua frigidissima: hinc paulatim debilitatus & obfuscatus est visus. *Guil. Fabricius Hildanus obs. 27. cent. 1.*

Hepar mustelæ piscis recenter exemptum & vino ablutum suspendatur in vitro, ut nec fundum nec latera attingat, solisque ad radios vase clauso resolvantur; hoc tantum foris inungi debent palpebre & cilia, & miraculosè visum tenebricosum restituet. *Job. Heurnius, ad cap. 5. lib. 5. pathol. Joh. Fernelii.*

Ad oculorum observationem magno successu utebatur *Bonifacius* aqua hac carulea ipsi summè secreta.

℥. Aq. rosar. ʒi. sal. armoniac. ʒi. sacch. cand. ʒi. vitriol. a lb. ʒss. album. ovor. vn. ʒ. M. probe agitando in pelvi aurichalcea. *Jeremias Marcus, observ. 25.*

Experimentum à Magistro *Michaelo Scoto*, expertum ad caliginem, & pannum oculi. Accipiatur bona theriaca, & cum bono vino albo distemperetur, & pluries in die oculis imponatur: & hoc per plures dies fiat, quia mirabiliter valet. *Arnoldus de Villanova. Practic. Med. lib. 1. cap. 16.*

## SECTIO VIGESIMA OCTAVA.

### *De Ulcere.*

**E**Λ<sup>uo</sup> ulcus est continui solutio tum imminuta magnitudine, in parte molli à materia erodente exorta ex qua ut plurimum non sanguis, sed aut sanies, sive *ἰσὴρ*, aut pus, aut sordes profluunt, cum variis affectæ partis dispositionibus præternaturalibus: Antecedens ulceris causa, est corporis impuritas atque cacochymia, aut ex improbo victu, aut ex viscerum prava affectione contracta conjuncta est, humor quineunque acris & erodendi vi præditus in affecta parte consistens ac hæ-



hærens. Causæ externæ sunt, Medicamen-  
ta caustica, morsus & contactus venena-  
torum animalium, combustio ab igne,  
aqua, oleo, aliisque fervidis succis, &  
contagium, ut in lue venerea; Ulcerum  
differentiæ plurimæ sunt, aliud est re-  
ctum, æquale, recens, magnum & sum-  
mum; aliud obliquum, inæquale, in-  
veteratum, parvum & profundum: a-  
liud rursus simplex, aliud compositum,  
compositum verò, est intemperatum,  
rheumaticum, apostematofum, putri-  
dum, sordidum, virulentum, ver-  
minosum, cavernosum, & fistulosum,  
callosum, supercrescens, dolorificum,  
& malignum.

## SUBSECTIO PRIMÆ.

### *Pro Ulcere.*

**P**roponam hic Medicamentum poly-  
chrestum ad omnia ulcera sananda et-  
iam composita, & est unguentum mirabile  
dictum, quia mirabilia præstat, confectio  
calis est.

℥. Lithargyr. auri ℥ii. ol. ros. lbi. ponan-  
tur ad ignem in vase vitreo, & bulliant eo  
usque quo si mittatur intus calamus com-  
buratur, adde ceræ novæ ℥iii. styrac. li-  
quid. ℥i. mell. ℥i. bulliant & in corpore  
tuturæ optime; postea extrahatur ab igne ad-  
de pulv. thuris myrrh. præcipitati, ol. te-  
rebinth. ceræ, resin. pini, an. ℥i. M. opti-  
mè. Hoc unguentum exsiccans est, & ab-  
stergens, & malignitatem extinguit ob præ-  
cipitatum. *Rodericus à Fonseca, tom. 2.  
consult. 17.*

Pro ulcere calido in tibia.

Corpore decenter purgato, ulcus lava-  
ri mandavimus cum aqua plantag. ros. &  
similibus. Deinde unguentum commodè  
desiccativum & incarnativum etiam refri-  
gerans in tibiis maxime expertum præscri-  
psimus.

℥. Ceruss. ℥i. lithargyr. ℥i. mastich. co-  
rall. rub. ros. sang. drac. camphor. an. ℥i.  
unguenti popul. quar. β. ol. ros. viol. aqu.  
folani & plantag. q. s. lapid. calamin.  
& ossis sapiæ an. parum. F. Unguen-  
tum. *Petrus Forestus, observ. 5. lib. 7. Ob-  
serv. Chirurg.*

Quidam in ulceribus parvis exco-  
riantibus cutem & carnem tibiæ cujusdam, pri-  
us apposuit emplastrum excerussa lithar-  
gyro auri, myrrhæ & oleo ros. coctis ad  
duritiem convenientem; sed interim succo  
senecionis exco-riationes, tum ulcera lava-  
bat, deinde pulvere aristol. long. & bac-  
carum lauri insperso; hinc pannum li-  
neum in succo senecionis madefactum cir-  
ca tibiæ exco-riatamolvebat, superin-  
ductis fasciis à talo ad genu usque; &  
ita tibiæ exco-riata ab omnibus ulceribus sa-  
na evasit. *Idem, observat. 4. lib. 7. Observ.  
Chirurg.*

Pro ulcere verminoso.

Unguentum hoc in ulceribus ad vermes  
descriptum à *Bertapalia* adhibuimus.

℥. Olei amygdal. amar. succ. arant. aci-  
dor. vini malvatici, an. ℥ss. pulv. colocyn-  
th. cent. min. an. ℥ii. ceræ, q. s. F. unguentum.  
*Petrus Forestus, observat. 10. lib. 7. Observ.  
Chirurg.*

Pro ulcere cum ossis corruptione.

Chirurgus ut squammæ exsiccarentur,  
& exciderent ossium cortices, & ut bona ca-  
ro renasceretur, commodè hoc sequenti  
pulvere usus est.

℥. Aristol. rot. ireos, Aloes combustæ,  
rad. peucedan. scorix æris, cortic. pini. an.  
part. æq. F. pulvis adjectum est deinde mel.  
ut fieret emplastrum. *Petrus Forestus, obs.  
11. lib. 7. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Ulcere.*

**I**n ulcere simplici ut ore go hoc ung. quod  
de Tutia Magistrale appello, & om-  
nium optimum est quæ ego viderim.

℥. Ol. ros. omphac. an. ℥v. ol. myrtin.  
unguenti popul. an. ℥iii. sol. plantag. solan  
hortens. an. M. ii. incisis herbis, omnia mi-  
sceantur per octo dies, & quotidie agiten-  
tur: hoc facto, colentur, & colaturæ ad-  
de ceræ ℥iv. misce super ignem, donec li-  
quescant, postea baculo misce, & cum te-  
pidum est, adde litharg. auri vel arg. ℥vi.  
ceruss. ℥ii. tutiæ, præp. ℥ii. plumb. ust. ℥i. β.  
ducantur in mortario plumbeo per duas  
horas. *Gabriel Fallopius, cap. 13. lib. De  
ulceribus.*



Novi qui in omnibus ulceribus brassica utantur, & bonis agrorum rebus: nam vetus *Roma* (inquit *Plinius*) annis sexcentis hac Medica usa est, & *Chrysippus* volumen illi dicavit, per singula membra homini digestum, mihi certè ejus vis usu constat. *Joh. Heurnius*, lib. 1. method. ad parxim.

*Carpus* utebatur unguento ex lithargyro cocto, hoc modo.

℥. Lithargyr. auri & argenti an. ℥vi. ol. commun. ℔iv. M. pone ad ignem & fiat unguentum. Sic qui magnum ulcus habebat, quod exsiccare non poterat, hoc sequenti Medicamento exsiccatum est.

℥. Argenti sublimati auripigm. salis armoniaci, salis commun. an. ℥j. aquæ currentis ℔i bulliant simul omnia usque ad duarum partium consumptionem & usui reservetur. *Petrus Forestus*, observat. 12. lib. 7. Obs. Chirurg.

Pro ulcere virulento corrosivo & ambulativo.

Chirurgus quidam hac lotionè commodè utebatur.

℥. Myrobal. citrin. ℥ß. myrtill. rosar. an. M. ß. santal. omnium an. ℥iß. aqu. ros. ℥iv. aq. plantag. ℥viii. bulliant omnia simul ad tertiæ partis consumptionem. Idem hoc pulvere ad cicatricem inducendam utebatur.

℥. Boli armen. ℥ß. alumin. ℥ii. balauft. myrtill. myroball. citrin. an. ℥iß. M. F. pulvis, hoc etiam unguento prohibente ulceris deambulationem utebatur.

℥. Tutie præp. plumbi usti, antimon. an. ℥iii. pulveriza subtilissimè, & cum oleo myrtino F. unguentum. *Carpus* hoc utebatur pro exsiccando ulcere.

℥. Aristol. long. rot. cent. min. an. M. ß. caud. equin. M. j. cort. thur. ℥i vini nigri ℔x. mell. ℔ß. bulliant ad consumptionem duarum partium, & coletur.

Quidam cum ulceratam haberet tibiam ulcere virulento & corrosivo; pulverem cranii humani adusti inspergebat, & supra dictum pulverem linamenta sicca apponebat, & ita curatus est: unguent. hoc valde est expertum mundificans & consolidans omnia ulcera corrosiva, ambulatoria, & difficilis consolidationis.

℥. Succor. depurator. pentaphyll. pilosell. consolid. minor. buglæ, absint. an. ℥i. succ. caud. equin. virgæ pastoris, an. ℥ii. succ. plantag. ℥v. ol. ros. ℥iv. ceræ ℥iii. mell. rosar. ℥iß. terebinth. ℥ii. vel q. s. ceruss. lotæ in aqua plantag. lithargyr. auri, tutie præp. plumbi usti & loti, spodii, balauft. an. ℥ß. sang. drac. sarcocoll. nutrit. in aq. plantag. myrrh. thuris, aloes, ros. sicc. ciner. sarmentor. vitis an. ℥iii. F. Unguentum.

Hæc aq. mirabilis habetur in exsiccatione ulcerum virulentorum.

℥. Succ. portulac. plantag. succi uvarum non maturarum an. pintam. i. album ovorum num. 8. alumin. crudi ℔i. optimè pulveriz. & extrahatur aqua per alembicum, *Petrus Forestus*, observ. 13. lib. 7. Obs. Chirurg.

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Ulcere.

**M**ethodus Chirurgus ad ulcera sordida & putrida, & ad gangrænas, hoc unguento absterivo utebatur.

℥. Micam panis siliginæ, & tempera eam in aceto vini ad horas sex, postea eam contunde, & adde mell. ros. & salis, q. s. extend. super licinia, postea superpone pulmaceolum infusum in aceto & aqua, ita ut comprehendat totum ulcus, interim non omitendo defensivum circa partes vicinas. Sed & nos unguento mundificativo mirabili ad ulcera putrida sine corrosione commodè utimur.

℥. Succ. depurator. apii, absinth. beton. an. ℥i. suc. plantag. ℥iv. succ. agrimon. ℥ii. mell. rosar. colat. ℥. iv. bulliant omnia simul leviter semper movendo usque ad consumptionem quasi succorum, deponendo spumam, deinde removeatur ab igne, & incorporetur cum eo pulvis sequens ad mellis spissitudinem.

℥. Gallar. quercus ðiß. myrrh. el. ðii. thur. mastich. aloes succotr. sang. drac. sarcocoll. an. ℥i. psidia, ros. rub. balauft. ciner. sarmentor. vitis, an. ℥i. F. pulvis subtilissimus. Aliud unguentum mundificativum mirabile in ulceribus sordidis & fraudulentis.

℥. Suc.



24. Succi folior. lilii ℥iv. aceti ℥i. mell. ℥β. M. & coque in vase æneo ad perfectionem: aliqui addunt succ. absinth. apu, & plantag q s. & mirabiliter operatur. *Idem, observ. 14. lib. 7. Observ. Chirurg.*

Pro ulcere profundo & cavernoso in mulieris cujusdam coxa.

Cum eam sæpe purgassemus, ad decoctum ligni guajaci devenimus ipsi ulceribus absteris cum injectionibus & lotionibus ex lixivio, melle rosato, & alumine factis: aqua maris hic egregiè confert, ut & aqua aluminosa, quæ in hoc affectu præstantissima est.

Pro putrefactione circa labia, & ut etiam ulcera ampliarentur, aliquando precipitatum imponere mandavimus: deinde ablata eschara, ad majorem mundificationem, etiam unguento. Ægyptiaco cum decocto hordei, & mellis modico abluimus, ulceribus satis absteris, & per tres dies hac lotionem ulcera ablui iussimus.

24. Aquæ hord ℥β. mell. ros. ℥iii. M. deinde ad incarnationem Chirurgus venit hoc sequenti unguento, quod est *Io. de Vigo.*

24. Terebinth. claræ ℥ii. mell. ros. ℥i. far. cocol. ℥iii. glutin. piscium, tragacanth. an. ℥i. antimon. plumb. usti, an. ℥β. succ. centaur. ℥ii. vel ejus loco pulv. ℥iii. farin. hord. cribrati ℥β. croci ℥i. bulliat terebinthina cum melle ros. parum deinde omnia simul misce in hoc casu est mirabilis incarnationis, iterum ab initio etiam in circuitu aliquod defensivum appositum est, postea unguentum de minio super linteum admotum est, & ita cicatrizatum est hoc ulcus, sequens etiam Medicamentum quod in frequenti usu est apud Chirurgos, miram vim habet in glutinandis seu incarnandis ejusmodi ulceribus.

24. Aq. decoct. hord. sibi. mell. ros. ℥iii. sarcocoll. ℥iii. myrrh. thur. an. ℥i. vini odorifer. ℥vi. coq. omnia simul usque ad tertiæ partis consumptionem, interdum potest addi aliquid aloes post glutinantis Medicamenti impositionem, sola spongia nova mulso imbuta circumponenda est quam fieri potest mollissima, ejus autem deligatura à sinus fundo incipiat, & ejus ore finiatur; fasciarum verò spiræ sinus profun-

*Burnet Parte I.*

dum sine dolore ardeant, ac paulatim usque ad os ejus relaxentur: spongia ideo circumdatur & alligatur ut exsiccet manantemque è sinu sanem excipiat, alioqui partem eroderet; sit mulso imbuta, ut detergeat, mollis ne asperitate lædat; nova verò, ut desiccet. *Petrus Forestus, obs. 15. & schol. lib. 7. Observ. Chirurg.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Ulcere.

**P**RO ulcere fistuloso.

Mirificè prodest in antiquis fistulis & admodum callosis hæc injectio.

24. Unguenti Ægyptiac. ℥β. sublimati ℥β. lixivii ℥iv. aq. ros. ℥ii. arsenic. ℥i. aq. plantag. ℥iv. bulliant usque ad consumptionem tertiæ partis injecto Medicam. fistulæ os linamento concepto claudendum est, ne id refluat nisi enim aliquandiu maneat nullum affectum effatū dignum præstare poterit: quæ ex arsenico illinuntur penicilla, neminem unquam sefellerunt, ut præter experientiam quotidianam recentiorum fere omnium scripta testantur *Petrus Forestus, observ. 16. lib. 7. Observ. Chirurg.*

Pro ulceribus tibiæ.

Quidam hoc cerato de plumbo, quo uti solebat *Angelus de Parma*, curatus est.

24. Antimon. ceruss. lotæ, an. ℥β. plumb. usti, lithargyr. terebinth. an. ℥i. ol. rosac. completi ℥ii. ceræ alb. ℥β. ceræ in oleo liquefactæ addatur terebinth. Deinde pulveres, & F. unguentum. Hoc etiam egregiè probatum est ad ulcera tibiæ ostracosa.

24. Ceræ, resin. an. ℥i. sævi castrati ℥ii. picis naval. ol. an. ℥iii. mastich. thur. an. ℥iii. lithargyr. ℥β. ceruss. ℥β. coq. simul oleum, resina, sævum & cera, usque ad bonam glutinositatem; postea addantur reliqua. De tertio autem die in tertium ulcus, debet lavari vino calido. Hæc etiam tela quæ ad *Galenum* refertur, competit ulceribus tibiæ.

24. Ol. ros. ℥xii. ceruss. ℥iii. lithargyr. ℥iv. thur. mastich. an. ℥β. san. drac. ℥β. myrrh. sarcocoll. an. ℥ii. coq. parum, usque ad rubedinem, & extrahatur ab

T c 3

igne,



igne, & imponatur tela antiqua ex lino.  
*Idem obs. 18. lib. 7.*

Pro ulceribus *Chironius ex Galeno.*

24. Cerae libi. ceruss. vn. viii. ol. rosac. libi. sal. ammoniac. vn. iii. squamm. aris vn. ii. thur. alumin. ærugin. malicor. calcis vivæ, an. vn. i. quæ liquari debent liquata & frige facta aridis vino tritis admisceto, & placidiore igne decoquito. *Petrus Forestus schol. observat. 12. lib. 7. Obs. Chirurg.*

Pro ulcere sordido putri virulento depascente in brachio cujusdam mulieris cum ossiscarie.

Post ritè purgatum corpus, & exhibitum decoctum ligni sancti, ulcus quotidie per tonsorè abstergi post sudorem præcipio decocto primo ligni & linteolis exsicari; tum os corruptum eradi, donec aliquid cruoris vel humiditatis appareret; postea illini tribus aut quatuor guttis balsami sulphuris, tandem applicari emplastrum meum diasulphuris jubeo; quibus omnibus caro in osse latè denudato procreata, & ulcus ad consolidationem perductum fuit in quadraginta diebus.

Emplastrum diasulph. ita fit.

24. Ol. sulph. vn. iii. ceræ 3ß. colophon. 3iii. myrrh. ad pondus omnium, cera, colophonia oleoque liquefactis simul, & benè commixtis inspergatur myrrha subtilissimè trita; paulatim igneque lento coquantur, spatha semper agitando, donec benè permixta fuerint. Postea nimirum post quartam horæ partem, ab igne deponantur, & paulatim frigescant, & habebis emplastrum præstantissimum, certum & infallibile in curandis omnis generis ulceribus & vulneribus quibuscunque. *Martinus Rulandus curat. 63. cent. 1.*

Corpore purgato ulcera diebus alternis semel lavabantur manè & per se siccabantur, sequenti aqua nostra.

24. Aq. plantag. libi. aq. ros. libß. fl. malorum arantior. vn. iii. argenti vivi sublimati & pulv. vn. ß. M. coq. omnia lento igne per quartam horæ partem. Deinde removen- tur ab igne, & cum deferbuerint, in phialam vel tritum imponuntur pro usu, & sic mulierem quandam cujus totum corpus ulcerosum erat, brevi tempore curavimus *Mart. Ruland. curat. 19. cent. 5.*

Fœdissima cruris ulcera curavit Illustr.

Comitissa quædam in *Moravia*, cum decocto fol. quercus, cui addidit parum alumin. myrrh. & thuris, quo decocto eluit ulcus, folia verò decocta calidè emplastri loco applicavit ter in die renovando. Sic levissima subinde, & vulgaria videntur, plurimum juvant. *Vulfgangus Hæserus, lib. 4. Herc. Medic. cap. 2.*

## SUBSECTIO QUARTA.

*Pro Ulcere in dorso sinuoso, profundo & sordido.*

**P**ost universalia ad detergendum & mundificandum ulcus, his usus sum auxiliis.

24. Decoct. hord. integr. libii. mell. rosac. colat. 3iv. M. F. injectio intra ulcus per siphonem rectum: absque mordicatione detergit & eluit ulceris ichores. Verum quum & crassa sanies sordida multa inesset, hoc alterno fortiore mundificativo usi sumus, nempe egyptiaco unguento præfato decocto admixto, adjectis aq. vitæ 3ii. interdum & post dies aliquot ubi hoc secundo decocto usi essemus, nec satis pro voto deterfio procederet, hac injectione nobili & efficaci utendum censuimus.

24. Ligni sancti subtiliss. pulverati, cortic. ejusd. an. 3ii. aristol. long. cent. min. ab. sinth. agrimo. caud. equin. fol. oleæ, myrti, pimpinell. consolid. maj. an. M. i. cortic. thurr. myrrh. sarcocoll. an. 3ß. vini rubr. odorif. libii. mell. despumat. 3iv. fiat omnium decoctio; ex cuius colatura fiat injectio intra ulcus, addendo hora injectionis aq. vitæ el. 3i. pro qualibet vice. Vbi animadversione dignum & observatione visum est, aquam vitæ cum præfato decocto potentissimam esse & efficacissimam in detergendis sordidis ulceribus sine morfu, iisdemque exsiccandis & ad glutinationem promovendis, quia si cum præfato decocto adiciantur aq. vitæ el. libii. & in alembico vitreo in B. M. destillantur, mirabilem inde elici liquorem ad ulcera sordida & cavatum detergenda tum glutinanda quod crebro experimento nobis exploratum est mira namque profecto aquæ vitæ vis est in detergendis ulceribus & glutinandis; præsertim nervosararum partium, ut diuturna ob-



observatione nobis est comprobatum, ut qua nihil est præstantius. Cum carnem in hoc ulcere regenerare revellemus, altera injectione usi fuimus, cujus est vis, & modicè detergere, & carne cavitatem implere, unde sarcotica dici merito potest.

24. Fol. plantag. M. ii. agrimon. herbæ Roberti, pentaphyll an. M. i. summitat. absinth. numero 3. utriusque consolid. caud. equin. ceterach. hyperic. an. M. β. beton. M. i. F. decoctio in aqua in fine adde vini rubr. astring. lbii. ros. rub. fol. myrti, an. p. ii. hord. integr. p. ii. de colatura cape lbiv. quibus adde farinæ fabar. ℥i. farinæ orobi ℥β. thuris, mastich. sarcocoll. resin. pini, an. ℥i. myrrh. aristol. rot. an. ℥vi. irid. flor. ℥β. mell. rosa colat. ℥iii. M. & ex hoc liquore F. injectio intra ulcus hoc sequenti unguento, post injectionem, intra ulcus cum turundis, splenus ac licinis commodè utebamur.

24. Succ. plantag. ℥iv. succ. agrimon. ℥ii. succ. absinth. ℥i. vini rubr. ℥iv. ol. ros. omphac lb. coq. simul ad vini & succorum consumptionem, in fine addendo farin. fabar. ℥iβ. farin. orob. ℥β. thuris, mastich. sarcocoll. resin. pini, an. ℥i. myrrh. el. irid. flor. & aristol. rot. an. ℥β. terebinth. in vino albo lotæ vn. iii. mell. despumat. ℥iv. ceræ quod satis est, F. unguentum. Pulvere item sarcotico hoc post completam ulceris detersionem intra ulcus usi feliciter sumus.

24. Aloes el. ℥ii. thur. & cortic. ejusdem, myrrh. sarcocoll. an. ℥i. rad. irid. flor. ℥iv. F. omnium pulvis tenuissimus ad movendus cavo ulcere ad impletionem cavitatis. Sed sequenti unguento celerrima omnium est perfecta mundificatio; miram namque in detergendis ab ichoribus & sorde ulceribus vim habet.

24. Succ. apii lbβ. (mirabile est in detergendis ulceribus) mell. el. ℥iv. farin. hord. ℥ii. farin. orobi ℥i. m. myrrh. el. ℥ii. terebinth. ℥i. m. coq. omnia simul ut fiat unguentum quo turundæ & licinia imbuantur, & in ulceris cavitatem indantur; optime ulcera & citra morsum purgat. Ad carne implendum ulcus hoc sumus emplastro usi.

24. Lithargyr. auri ℥vi. ol. ros. omphac. lb. m. acet. rosac. lb. m. coq. simul lento i-

gne, perpetuò cum baculo agitando, donec acquirat colorem nigrum ad bituminis & cerati consistentiam ut F. magdaleon, ex quo fiat emplastrum supra ulcus apponendum, in fine verò curationis emplastro diachalciteos cum diapompholig. usi sumus; & sic tandem curatum est fistulosum hoc ulcus citra sectionem. *Franciscus valeriola, observ. 1. lib. 5.*

## SUBSECTIO SEXTA.

*Pro Ulcere.*

**U**lcus in pede scæminam quandam affligebat, & licet quandoque sanaretur, certis temporibus remeabat, erat enim illi hæreditarium malum. Hoc remedium præ cæteris laudabat, quod ei profuit.

24. Lithargyr. ℥ii. ceruss. ℥iii. pulverizata laventur aqua rosac. & siccantur, addetur præp. pompholig alb. an. ℥i. m. plum. bi usi & loti ℥ii. F. pulvis tenuiss. Excipiat infusione gummi tragacanth. facta in aq. ros. add. savi capr. ℥ii. vel paulò plus, ut F. instar emplastri, addendo camphor. ℥i. *Felix Platerus, observat. libr. 2. pagina 561.*

Ex glabritie sciemus virulentam & malignam qualitatem invasisse partem ulcere detentam, unde ferinum ulcus subolescit. Propterea Chirurgis illud studium semper adsit, ut partem firmet, & totius cacochymiam castigent. Utantur sæpè è purgatione decocto sarsæ, & chinæ & ligni Indici, & ulceribus talia topica adferant, quæ unâ partis calidum nativum recreent, ac intemperiem flectant. *Ioh. Heurnius, ad aphor. 4 sect. 6.*

In contumacibus ulceribus, mirum in modum solatio esse solent remedia revelentia succos à parte vulnerata. Hinc est quod ita juvent vulnerariæ potiones, nam urinas movent, unaque ichorosam materiam, quæ quotidie in partem ulceratam ferri solebat, excludunt. Inde etiam decoctiones rad. chinæ & sarsæ juvant: nam talem materiam sudoribus & vaporibus evacuant ac revellunt. Hoc itaque dicere velle videtur *Hippocr.* hic, quia à talibus ulceribus periculum est, ut ossa



affligentur, vos cavete ne in longum tempus trahatur eorum sanatio, & ne inveterascant. *Idem, ad aphor. 45. sect. 6. Pro ulcere sordido.*

Imponatur sequens mundificativum.

℥℥. Mell. rosac. ℥i. terebinth. non lotæ ℥℥. pulv. rad. aristol. rot. myrrh. aloes, thur. an. ℥i℥. M. in mortario, addendo croci ℥i. vitellum unius ovi, ad sedandos dolores, si supervenerint. Vel,

℥℥. Pulv. rad. gentian. irid. flor. lign. guajac. farin. lupin. an. ℥ii. summit. cent. min. hyperic. & scord. an. ℥i terebinth. non lotæ ℥℥. mell. rosac. q. s. F. S. A. unguentum. Mercurium precipitatum præstantissimum esse medicamentum in omnibus ulceribus indies experior: insperfo ipsum per se, vel hoc modo in forma unguenti filamentis impono.

℥℥. Mercur. præcipitati rectificati & aq. rosac. & plantag. loti ℥ii unguenti rosati ℥i. ceræ ℥i. M. diligenter in vase vitreo, spatula lignea. *Guil. Fabricius Hildanus, cap. 27. lib. De Meliceria.*

Ad ulcerum mundationem ac consolidationem sæpius cum admiratione consideravi balsami sulphur. terebinth. anisati, & c. effectum laudabilem, multisque incredibilem, si ejus aliquid ulcere instilletur aut illinatur, mox enim novi puris generatio ita fuit inde diminuta, ut non raro hujus unius balsami ope intra paucos dies plenè curata fuerint in mammis & alibi excitata post inflammationes apostemata notabilia. *Franciscus Sylvius, lib. 1. c. 40. paragr. 61.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Ulcere.

**U**lcera multa & maxima in multis corporis humani partibus, sequenti emplastro ad curam perfectam deducta sæpius vidi.

℥℥. Mastich. ℥i. terebinth. venet. ℥iii. ceræ flavæ ℥iv. liquecant in terrea olla, primò cera cum terebinthina, postea removeantur, & in aqua tepida diu laventur, & malaxentur, dumque malaxantur pulvis mastiches cum iis incorporetur, & in magdaleonis redigantur. Sequentia etiam emplastra miros produxerunt effectus.

℥℥. Beton. agrimon. verben. pimpinell. an. M. i. ceræ terebinth. resin. an. ℥bi. mastich. ℥i. vini alb. opt. ℥iiii. coq. ad consumptionem tertiæ partis, & cola, coques autem herbas solas, & post consumptionem tertiæ partis, adde reliqua; rursusque parum ea coques, deinde emplastrum à vino separabis. Nicotianæ decoctione etiam sola in oleo cum ceræ q. s. F. optimum emplastrum ad idem. *Petrus Borellus, observ. 16. cent. 1.*

Pro ulceribus serpentibus oris labiorum gingivarum, & faucium.

℥℥. Ærugin. aris ℥i. auri pigmenti ℥i℥. trita subtilissimè, coque in vini albi ℥iv. ad mediæ partis consumptionem. Post refrigerationem adde aq. ros. & solan. vel plantag. an. ℥i℥. ut fiat aqua viridis pro illitione ulcerum. *Felix Platerus, lib. Observ. pagin. 607.*

Pro ulceribus oris & faucium venereis.

℥℥. Aq. plantag. ℥ii. unguenti Ægyptiac. ℥iv. M. pro lavatorio: quæ ab ulceribus istis quam plurimi per me curati sunt, & est mirabile. *Petrus Forestus, observ. 21. lib. 32. De Lue Venerea.*

Pro ulcerum hæmorrhagia.

Admove farinam tenuissimam molendinarum cum bolo, sanguine drac. maxima hæc copia aspergantur. *Joh. Heurnius, ad aphor. 21. sect. 7.*

*Neapolitanus* quidam morbo Gallico leviori quàm laboraret, ulcus in palato ad columellam excedens patiebatur, ex quo periculum erat, ne columella ipsa corrofa exsive evaderet. Pro quibus abigendis morbis, non semel (ut decet) purgato corpore, decoctum rad. sarsæ paucò sene paratum, optimo & parco instituto victus ordine, bibendum tradidimus: quo rectè sudabat & melius habebat. Cæterum, pro ulcere ipso sanando aquam hanc deferendam paravimus, ex qua gosapii madefacta pilula intus indebatur, adaptabaturque, ita ut ne gutta ulla caderet. Aqua ita se habet.

℥℥. Aq. plantag. ℥ii. virid. aris ℥℥. M. ad igne parum calefiat, & ut dixi per intervalla utatur. Est aqua hæc optima, & quæ à putrilagine ulcera expurgat & mundificat. Porro aquam hanc quandoque magis mitem, quandoque verò potentiorē paramus, prout necessitas urget.



cui & tuthiam præp. ad ℥iv. addimus. Sed hic prædicti usus est, & frequentes gargarismo sequenti gargarisabat.

℥. Sumach. balauft. summitat. rubi, fol. olive, plantag. ros. an. M. i. thur. mast. farcoc. an. ℥ss. F. decoctio in aqua ℔. iii. f. a. Colaturæ adde mell. rosac. colati ℥ii. M. & ad ignem iterum parum bulliat, quo assiduo utatur. Per intervalla etiam lacte gargarizabat, quod summum remedium pro iis curandis ulceribus habetur; iis vero ita rectè valuit, ut intra viginti dies pristinam sanitatem adeptus sit. *Amatus Lusitanus, curat. 85. cent. 6.*

Pro ulceratis tibiis.

Vidi quendam, qui in tantum habebat tibiis ulceratas, quod ossa apparebant discooperta. Omnia bona in hac ægritudine consumpserat, nec poterat aliquod utile remedium reperire. Cui quidam extraneus superveniens dixit, vade & accipe carduum benedictum viridem in bona quantitate, & pista ipsum bene; postea fac decoqui in bono vino; deinde axungiam porci liquefactam adde; iterum simul bulliant. Postea admisce farina tritici q. s. ut. f. in modum unguenti liquidi, & de hoc unguento ungebis quolibet die. Hoc fecit, & brevi liberatus est. *Arnoldus de Villanova, practic. lib. 2. cap. 44.*

Pro ulceribus & vulneribus.

Multum commodi affert in his affectibus lapis medicamentosus seu salutis, qui ita paratur.

℥. Vitrioli viridis ℔i. vitriol. alb. vn. m. alumin. ℔ss. anatron, sal. communis, an. ℥iii. sal. tartar. sal. absinth. artemis. cichor. persicar. plantag. an. ℥. m. Ponantur in olla vitreata, affunde modicum aceti ros. coq. igne carbonum lento, sæpius agitando. Ubi incipit spissescere, add. ceruss. *Venet. ℔. m. bol. armen. ℥iv. M.* diligenter omnia, donec vi ignis mediocris in lapidis duritiem massa concreverit, qui postea fracta olla eximendus, & ad suos usus reservandus. Si gummata, myrrham videlicet & thus, addere voles, instituat coctio lenta, ne comburantur & vis illorum igne evanescat. Alii brevius ita conficiunt.

℥. Vitrioli ℔i. nitri ℔ss. ceruss. alumin. bol. armen. an. ℥iv. ammoniac. ℥ii. Omnia

bene pulverisant, cerussam verò & bolum in marmore prius terrantur, ac aceto communi ad supereminentiam duorum digitorum affuso coquunt leniter in olla satis capaci, donec redigantur omnia in lapidem durum. Aliter ita fit.

℥. Alum. ℥iv. vitriol. *Vngar. ℥ii* vitriol. alb. tartar. borac. mastich. thur. sal. armo. niac. an. vn. i. ceruss. vn. vi. boli armen. veri vn. iii. crasso modo contusa coq. in olla vitreata capaci cum aceto fortissimo igne lento usque ad consistentiam seu duritiem lapidis.

Hujus lapidis virtutes ferè sunt innumerales. In partibus corporis exterioribus omnia ulcera subito tollit: laventur manè & serò, & linteolum madidum superimponatur. Desiccatur vulnera & ulcera aphrodisia vetera, omnes ulcerum defluxiones tollit, mundificat & confortat partem affectam, dentes confirmat, & gingivas à putredine conservat. Oculorum lachrymas restringit, rubedinem & oculorum dolores & caliginem tollit. Contra erysipelas, scabiem, serpigines, tineam, cancerum: oris & gutturis ulcera, ambusta omnis generis, &c. optimè valet. Utendi modus est, ut una unica lapidis liquecat in ℔bi. aquæ fluvialis, vel pluvialis, vel aquæ alicujus destillatæ appropriatæ, non fontanæ, dissoluta. Post filtrationem & sæcum abjectionem aqua clara utimur. *Osuvaldus Crollius, Basilic. Chymic. pag. m. 383.*

Non possum te non admoovere, ne omnia, quæ lapide medicamentoso scribit *Crollius*, veluti oracula esse tibi persuadeas. Nonnunquam enim Theoricus *Icari* penis multa scribit, & astra extollit, quæ cum Solem, videlicet Experientiam (quæ verum à falso distinguit) attingunt, liquefcunt, & in nihilum abeunt, Si ingredientia hujus lapidis diligenter examines, non solum calidum & siccum, sed & insigni acrimonia prædictum esse reperies. Quomodo igitur vires ipsius innumerales, ut scribit *Crollius*; esse possint, & tot in affectibus sine damno ægri tutò applicari, nondum video. Cave ne periculum facias in ulceribus partium nervosarum dolore item & inflammatione obfessis, præcipuè in corporibus delicatulis, biliosis & cacochymicis: dolorem enim, inflam-



inflammationem, vigilias, inquietudines, aliaque pessima symptomata protinus supervenire videbis. Cave præterea, ne medicamentum hocce in cancro aut ulceribus cancris, sive mammillarum aut oris, sive in quacunque corporis parte is fuerit, applies: videbis enim protinus malum ingravescere, & in pejus abire. Cave denique, ne in ophthalmia usurpetur hic lapis. Fac obsecro periculum tale. Asperge aquam, in qua iste lapis dissolutus fuerit, in laminam ferream exacte politam, & relinque illam per horas aliquot, & videbis ubicunque aqua illa aspersa fuit, non solum maculas nigras, verum etiam nonnihil de substantia ferri ablatum esse. Hæc si in ferro fiunt, quid in cornea membrana politissima fiet? *Guil. Fabrit. Hildanus, cent. 5. observ. 91.*

## SECTIO TRIGESIMA PRIMA.

### De Vomitu.

**V**omitus (Græcè *emetos* in *emeto* vomo) est eorum, quæ in ventriculi capacitatem continentur, violenta per os rejectio: Oritur vel vitio ventriculi, quod inflammatus, excoriatus, aut exulceratus sit; vel ob materiam qualemcunque qualitate sua eundem irritantem, que irritando ad vomitum incitant, sunt copiosior ingestus cibus, idem corruptus putrescensque: humores serosi, pituitosi, bilioli, atrabillarii, vel aliunde in ventriculum confluentes, puta à capite, à tenui intestino, ob vitiosam in eo humorum effervescentiam; vel ibidem geniti; pus item pancreatis, aut alterius partis vicinæ inflammationem aut ulcus consequens; & sanguis ex ventriculi aut intestinorum vasis ruptis erosusque effluens, aut ex suppressis menstruis ad ventriculum translatus. In vehementi etiam tussi, ob accedentem potentem musculorum abdominis contractionem, vomitus sæpius contingit; in ileo rursus ab inverso intestinorum motu peristaltico in consensum trahitur, & ad vomitum adigitur ventriculis. Vomitus subinde præcedere solet nausea, quæ nihil aliud est quam inane vomendi desiderium, quo nihil ejicitur, sæpe tamen sponte nulloque conatu aqua pellucida profluit ab ore.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Vomitu.

**S**artor quidam longo tempore vomebat quæcumque; comedebat ac bibebat: cujus vomitum sistebam potione sequenti.

℞. Vini malvatici ℥vi. ol. vitriol. gt. vi. diluantur bene. Ex diluto hoc capiebat quotidie mane jejuno stomacho ℥i. quo vomitus consistit cibum potumque retinuit, ac recte valere coepit. *Martinus Ruland. curat. 12. cent. 1.*

℞. Absinth. M. vi. vini ℔iij. aceti ℔i. coquantur. Hoc decocto per linteum expressum fovebatur duos aut tres dies stomachus.

## SECTIO VIGESIMA NONA.

### Pro Umbilici apostemate & acutissimo dolore.

**L**ocum affectum jussi mane & vespere perungi balsamo sulphur. & post unctionem superimponi malvas in lacte capri no coctas: his abscessus maturari velociter coepit, ad suppurationem pervenit ac disruptus est. Post disruptionem autem mane ac vespere utebatur balneo decoctionis pisorum, & post egressum inungi semper jubebam umbilicum balsamo prædicto, tunc undamque eodem oleo tinctam imponi, atque his tribus prædictis solis, intra duodecim dies ex toto ulcus perfectè curatum fuit. *Martinus Rulandus, curat. 39. cent. 1.*

## SECTIO TRIGESIMA.

### Pro Umbilici prominentia à partu.

℞. Corticem viridem sambuc. & quod sub exteriori cortice est scabæ, donec colligas M. i. inice, iacculo, & in lacte coque, & impone ventri mulieris, malumque evanescet. *Joh. Cnato consil. 40. lib. 5.*



machus, multumque conferebat ventriculo restaurando, & roborando. *Idem. curat. 23. cent. 2.*

Cucurbitulam unam atque alteram fundo ventriculi sine ferro applicabis, & ipsi ventriculo sequens emplastrum.

℥. Ol. Mastich. cydon. an. ℥ss. crustæ panis assati, & in aceto forti per horas duas infusi ℥ii. spodii, mastich. menth. corall. rubr. santal. alb. & rubr. an. ℥i. farin. hord. q. s. ad subigendum, & F. emplastrum. Ligaturas dolorificas brachiis ac pedibus admovebis. Quod si nec illis remediis vomitus coerceri poterit, consulo, ut æger pedes suos in aquam frigidam subito ponat. Cum cibariis sequentem pulverem offerendum censeo.

℥. Cortic. citri, ligni Aloes, sem. coriandr. præp. portulac. santal. citrin. mastich. an. ℥ii. M.F. pulvis. Quod si ille pulvis non proderit, exhibebis sequentem pulvisculum.

℥. Pulver. lign. Aloes ℥ii. reservetur uti, &

℥. Syrup. acetos. citri ℥ss. de quo sumat ligulam unam, cui addes pulv. ligni Aloes parum, & ægroto propinabis. Ego enim pulvisculum illum intali casu non sine fructu exhibitum fuisse novi. *Joh. Nevius, consil. 11. lib. 2 consil. Cratonis. &c.*

Vomitum molestissimus in febre maligna levissimo remedio meo consilio ita sublatus est.

℥. Sal. absinth. ℥i. succi limon. rec. cochlear. unum; mixta fuerunt in ipso cochleari & exhibita. Statim vomitus sedatus est, neque deinceps vomitu quicquam rejecit. *Lazarus Riverus, cent. 1. observ. 15.*

Mulier quædam vomitu ingenti choleram morbum referente laborans curata fuit in momento hausto aquæ cyatho spiritu vitrioli satis insignem aciditatem adeptæ. Alia Mulier Lipothymiam & alia gravia symptomata ex utero patiens eodem spiritu aquæ mixto sanata est. *Lazarus Riverus, obs. 46. & 47. cent. 4.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

## Pro Vomitu.

**P**RO evacuatione materiæ quæ in ventriculo continetur, maximè laudo, hieram simplicem *Galenicum* cassia sic.

℥. Cass. ℥ss. spec. hier. simpl. ℥i. cum sacch. F. boli.

Ad roborandum ventriculum assumat mane jejuno ventriculo ℥i. aq. vitæ nostræ juniperinæ, aliquando etiam cochl. i. aquæ nostræ theriacalis. In eandem etiam intentionem convenit exhibere sal. absinth. & menth. ad gr. iii. vel v. in vino infusa: item oleum cinnam. & nuch. mosch. si cum vino aliquot eorum guttæ sumantur. Extra verò roborandus ventriculus emplastro de crusta panis. Præterea sumantur tria linteola, madesiant in succo menthæ, deinde exprimantur, & albumine ovi illinantur, & aspergantur pulvere thuris; ponantur illorum alterum calefactum, supra stomachum duo reliqua apponatur carpo, & adligentur. Solent enim vomitum sistere. *Rodericus à Fonseca, consul. 74. tom. 2.*

Nauseam citissimè solvit comesta zedaria vel ejus extractum. Eam à sumpto medicamento proveniente arcet panis tostus pulvere carioph. & aceto aspersus, ori vel naribus admotus, itemque cæpa præmorfa. Vomitus enormes sistit aqua menthæ ad ℥ii. semel atque iterum sumpta. Emplastrum theriacæ ventriculo impostum. Succus cydonior. crudus miraculosè vomitum sistit, si cochl. i. vel alterum propinetur. Sæpe vomitus vomitu curandus est. Durantibus itaque vomitibus, & quidem singulis diebus recurrentibus, aquæ benedictæ usus imprimis auxilium affert confortato deinceps ventriculo. Laudanum opiatum etiam egregiè valet, ubi reliqua omnia parum efficiunt. *Joh. Hartmannus, præct. Chymiatr. pag. 177.*

## SUBSECTIO TERTIA.

## Pro Vomitione nigerrima.

**I**Nstar attramenti Scriptorii nigram: Vir quidam materiam admodum copiosam



sam evomuit, idque repetitis vicibus, summe interim debilis, prostratisque viribus. Sequentem potionem ei exhibui.

℞. Mummiæ ℥ii. syrup. de ros. rubr. sicc. ℥i. aqu. plantag. ℥i℥. M. bibat una vice. Sequenti die similem materiam nigerrimam denuò evomuit, & de cordis dolore admodum conquerebatur. Exhibui tunc hanc potionem.

℞. Rhei pulv. ℥iv. syrup. ros. solut. simpl. ℥ii. aqu. plantag. q. s. F. potio. Dejecit ternas sedes æquè nigras. Postea cœpit melius habere Biduo post sedes naturales redierunt, nec dum amplius hæc materia apparebat. Jussi ut per vices conserva ros. bonæque victus ratione uteretur. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 800.*

Ante decennium Nobilem quendam Cardialgia quædam subito invasit, adeo ut animo deficeret, quàm secutus est vomitus sanguinis concreti copiosi, & dejectio ejusdem, sed picis instar nigri, unde valde debilitatus, sed mox ad se rediit: Post triennium idem illi accidit, iter diebus æstivis calidioribus facienti, nam subito febrili paroxysmo correptus in syncopen incidit, sanguineque supra infraque, uti prius excrevit. Altero triennio interjecto, eadem sanguinis excretio illum iterum invasit: ac postremum, hoc anno 1611. mense *Julio*, quo ad me consilii causa venit, eundem paroxysmum est passus. Pallebat admodum alioquin tunc de nullo alio affectu conquestus.

Exposui illis à venis meseraicis, ob illuviem in illis contentam, tetri sanguinis, referatis hoc accidere, occurrendumque maturè, periculosum enim esse, quod aliorum exemplis comprobavi. Ordinavi ut singulis mensibus sequenti purgatione uteretur.

℞. Rhab. ℥iv. myrobal. citrin. ℥i. pulver. irrorentur vino rubro donec molescant postea adde syr. ros. solut. simpl. ℥i℥. plantag. q. s. F. potio diligenter prius expresso rhab. & mirobal. cum aqu. plantag. Utatur per vices hac mistura.

℞. Conserv. ros. ℥ii. conserv. flor. cichor. flor. tamaricis, bugloss borrag. cort. citr. condit. an. ℥i. rad. cichor. condit. ℥vi. troch. de rheo, ℥℥ ras. ebor. ℥i. corall. rubr. ℥i. ciner. pell. ventriculi & intestinor. galli-

næ ℥i. spec. diatrionfant. ℥℥. cum syrup. de quinque rad. F. mistura capiat bolum superbibendo aq. plantag. cum paucò vino

Pulvere sequenti utatur octiduo semel, & si paroxysmus superveniat, bis vel ter.

℞. Succin. puri ℥i. corall. rubr. ℥i℥. ba-laust. ℥℥. sem. hyoscyam. alb. ℥i. sem. plantag. ℥℥. F. pulvis, adde sacch. rosar. tab. æqualem portionem capiat per se, vel cum vino rubro, aut lacte utulato. Ad hæmorrhoidum provocationem quàm ego utilissimam censerem, ad diversionem & evacuationem illuviei illius, in venis meseraicis colligi solitam, jussi ut sanguisugas podicis, per canalem, ut artis est, applicaret, sperare me si hac ratione hunc fluxum sibi familiarem redderet, posse præter naturales illas sanguinis excretiones sic impediri. Uti & factum sicut prædixeram, *Felix Platerus, observ. lib. 3. pag. 697.*

Quidam evomuit lbvii. sanguinis nigerri-mi: & per secessum dejecit multis vicibus sanguinem nigrum ut pix liquefacta, ad lbx. altera nocte per os rursus lbv. non-nihil tamen plus colore accedenti ad sanguinem; tamen vivescens erat, odorem præ se ferens subacidum, & per anum profudit lbvi. sanguinis coagulati nigri nullum habentis odorem; tertio die habebat nigras faeces malè olentes, quarto die niger-rima egressit excrementa, non tamen referentia colorem picis, illo die ordinatus clister ex jusculo pulli, vitell. ovor. & saccharo. Aliis diebus præteritis nutritus æger vitel-lis ovor. & pane loto, infuso ante in vino odorato, factum etiam epithema cordi, jussus quiesceret in lecto, & ab omnibus negotiis abstinere: qui postea advocatis aliis, id est mutatis Medicis, mortuus est. *Reinerus Solenander, consil. 15. sect. 5.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Vomitu sanguinis.

Utatur sequenti remedio tanquam præstantissimo.

℞. Camphor. ℥℥. poscæ vel aq. plantag. ℥iii. bibat ubi fluor sanguinis superveniet, fluxum enim inhibet & obstructions col-lit.



Juit. *Guil. Rondeletius*, *consil.* 68. *lib.* 6. *consil. Cratonis* &c.

℥. Aqu. urtic. vn. vi. spirit. vitriol. q. s. ad acetositatem satis largam, probè diluantur, & satis frigide potentur; post hanc ebibitam potionem simul ventriculo applicetur panis tostus cum pulvere cario-phyll. aspersus & in vino malvatico & aceto madefactus, vel fiat pulcicula ex medulla panis fecalini & vino rubello styptico & aceto fortissimo calidè inducenda toti ventriculo & orificio ejus, manè & vesperi renovanda. Hac ratione subito sistitur vomitus cruentus. *Ioh. Hartmannus*, *pract. Chimiatri*. pag. 178.

Vomitus cruentus curabitur conglutinationis denuo vasis per misturam sequentem, in aliis quoque sanguinis excretionibus utilem.

℥. Aq. plantag. vn. ii. aq. cinnam. ℥vi. aceti stillat. vn. ℥. corall. rub. præp. ℥℥. sang. drac. ℥℥. laudan. opiat. gr. ii. syrup. myrtin. vn. i. M. hæc mistura cochleatim sæpius assumpta curabit plerasque vasorum rupturas, & supra multorum expectationem sanguinis effluxum brevi tollet. *Franciscus Sylvius*, *lib.* 1. *Prax. Medic.* cap. 9 paragraph. 20.

Quidam rusticus vomitu sanguinis laborabat, qui nullis remediis per multos dies usurpatis sedari potuerat. Medicus cupiens sanguinem in ventriculo collectum educere per vomitum, qui graviter agrotantem infestabat, & oppressionem insignem in ea parte efficiebat præscripsit ol. amygd. d. vn. ii. quibus vomitus excitatus est, vomuitque sanguinem concretum, simulque hirudinem unam sese in terra commoventem. Hæc erat causa ignota & rara vomitus sanguinis, retulit postea æger se in rivulo aquam bibisse cum qua simul hirudinem hausserat. *Lazarus Riverius*, *observ.* 26. *cent.* 4.

Venæsectio statim celebranda est parca manu, & repetitis vicibus, ut major fiat revulsio; idque ex basilica cubiti dextri, si à jecore, vel sinistri, si à liene malum exoriri videatur vel ex vena malleoli, si ex mensum suppressione profluxerit. Fiant frictiones & ligaturæ partium extremarum. Clysteres detergentes injiciantur. Applicentur cucurbitulæ natibus, cruribus &

lumbis, imò & hypochondrii, ut sanguis retineatur. Oxyerati cyathus adhibeatur, si sanguinis concreti suspicio fuerit: eo enim facillè dissolvitur sanguis, & à ventriculi venis propellitur eademque constringuntur. Eodem oxyerato ventriculi regio soveatur subfrigide Absente vomitu, ut venæ constringantur sequentia, usurpanda.

℥. Album. ovinum. i. aq. ros. & aceti an. ℥i. m. Agitentur fortiter deinde adde amyli ℥ii. M. utatur æger ex cochleari. Vel,

℥. Corall. præp. terr. sigill. bol. armen. lapid. hæmatit. & troch. de carabe an. ℥i. aq. plantag. & syrup. myrt. an. vn. ii. M. utatur ut supra. Vel prædicto pulvere utatur cum jusculis.

℥. Succ. plantag. vn. iv. exhibeatur actu frigidus mane & serò. Testatur *Galenus*, hoc succo nihil æquè præstantius esse ad quodlibet sanguinis profluvium cohibendum, succus portulacæ & poligoni cum saccharo sumptus ad idem est efficax.

℥. Aq. plantag. & portulac. an. vn. i. m. syrup. myrtin. vn. m. syrup. de papav. ℥ii. vel iii. sal. prunell. dr. M. F. julep. frequenter iterandus.

℥. Conserv. ros. antiq. & rad. symphit. an. vn. i. cydoniat. vn. m. myrobal. condit. num. i. troch. de carabe & terra *Lemnia*. an. dr. ii. corall. præp. & croci martis an. dr. i. cum syrup. de ros. sicc. F. opiata, qua utatur frequenter Trochisci de carabe non solum astringunt, sed etiam sanguinem concretum dissolvunt: ideo frequenter usurpandi. Syr. corall. utiliter etiam usurpari poterit, sed multo utilius eorum tinctura cum succo limonum rec. parata, Ubi magno impetu sanguis excernitur, nec prædictis remediis illius vomitus sedatur, ut mortis periculum immineat ad narcotica veniendum est, vel assumpta, vel per clyster. injecta. Exteriùs verò inungatur regio ventriculi oleo ros. & myrtino in aceto lotis. vel unguento sequenti.

℥. Succ. plantag. & centinod. an. vn. i. m. aceti ros. vn. i. ol. omphag. vn. vj. Bulliant ad succorum consumptionem, deinde adde sang. dracon. mastich. cortic. granat. & myrtill. an. dr. ii. camphor. ℥i. cera rubr. q. s. F. unguentum. Pro potu utatur aqua ferrata cum syrup. cydon. & spir. vitrioli.



fuscula etiam cum aqua ferrata decoquantur. Foveantur hypochondria lumbi subfrigide decocto plantagin. & portulacæ facto in oxycrato. Manas demittantur in aquam frigidam: sic enim omnis vomitus sedatur. Postea unguentum refrigerans *Gali* in aceto lotum dictis partibus illinatur; celebrata sufficienter phlebotomia ad causæ sublationem & integram morbi solutionem; purgatio blanda & frequens instituenda est, quæ sanguis à serosis & biliosis humoribus hunc affectum producentibus repurgatur. Debent autem fieri ex rhab. myrobal. tamarin. & triphera *Persica*, quæ medicamenta purganda astringunt, & humores nullo modo exagitant, ut inde non metuenta sit vomitus sanguinis concitatio. *Lazarus Riverius, Practic. lib. 9. cap. 8.*

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Vomitu stercoris.

**A**D vomitum stercoris quidam capiebat omni die jusculum malvæ, & convaluit cum alia remedia non juvarent. *Reinerus Solenander, consil. 15. sect. 5.*

## SECTIO TRIGESIMA SECUNDA.

### De Unicornu Groenlandico.

**M**ercatores nostri *Islandiam* & *Groenlandiam* navigantes invenerunt quod in *India* & Oriente toto veteres tantopere de prædicarunt, Unicornu nempe marinum, seu balenam *Narval* Islandis dictam in superiore maxilla dentem unicum habet longum crassumque recta protensum, gyris intortum, & striatis flexibus ex majore radice ad summum acumen desinentibus, hic est dens quem pro unicornu vero antea omnes venditarunt; & ex animali terrestri deciduum crediderunt, affirmare non dubito, ex balenæ dente desumpta fuisse. Unicornua quotquot hætenus hoc titulo prodierunt, vidi integra Unicornua in thesauris, *Vitruvii*, in fano *S. Dionisii* alibi que, sed tam similia huic balenæ denti, ut ovum ovo, exhibitus pulvis ejus à *Di.* ad *℥ss.* in aq. Card. bened. vel sambuc. vel cere-

visia, etiam invitis insuetisque sudorem copiosius exprimit; dedi quam plurimis febricitantibus, raro sine optato successu, ut in usum pauperum hujus Unicornu frustula non pauca consumpserim. Experti sunt quoque eandem vim in agris suis Medici consummatissimi *De Kvernius* & *Mothius*, ut candidè mihi confessi sunt. Neque solum exhibitus pulvis profuit, sed collo appensa frustula amuleti vicem sustinuerunt; rogatus transmissi frustulum *Cl. Viro Alberta Kypero* Professore *Leyden* amico meo, qui 1655. Magno successu in formam pulveris redactum cum aqua convenienti exhibuit ægrotis lue pestifera, quæ totum *Belgium* depopulabatur, correptis ut aut illico convaluerint, qui principis obstiteret, aut leviora experti symptomata morbum facilius tolerarint, aut certum exitum in aliquot die distulerint. *Thomas Bartholinus, histor. 4. cent. 4.*

## SECTIO TRIGESIMA TERTIA.

### De Urinæ difficultate & suppressione.

**V**ide supra lib. 3. sect. 3. De calculo, & lib. 9. sect. 12. De Ischuria.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Urinæ suppressione ex calculo renum.

**P**ER tres quatuorve dies lotium non reddiderat mulier quædam renum calculo laborans; cum hæc remedia sequentia adhibuissém miraculi instar urinam reddidit & curata fuit.

℥℥. Parietar. virid. M. iv. cum buryro frieta pectini cataplasmatiss instar calidè imponatur.

℥℥. Cheræfol. malv. parietar. ana M. i. sem. alth. malv. ℥ss. cicer. rub. ℥i. sem. quatuor frigid. maj. ana ℥i. kord. mund. p. i. sebest. rec. num. ix. caric. num. v. liquir. ras. ℥ss. coq. in ℔i. aquæ ad consumptionem medietatis: colaturam continuè bibens, his remediis curata fuit. Mulier quædam gravida quæ in octavo mense adeo calculo fuit affecta, ut mingere non poterit; his autem remediis non tantum lotium reddidit, sed & calculos duos ad pisi



magnitudinem, neque fatui obfuerant remedia, nam nono mense absoluto feliciter peperit. *Petrus Forestus, observat.*  
24. *De renum morbis.*

Cuidam mercatori urinæ retentione laboranti ex calculo ureterem obstruente, hoc decoctum sequens exhibui, quod licet secretum sit & arcanum, ut vocant, nunc quidem reticere nolo ob communem ægrotantium utilitatem, tale igitur est.

℥. Sem. malv. alth. an. ℥iii. cicer. ru. br. ℥iii. sem. quatuor frigid. maj. an. ℥ii. hord. mund. ℥ii. caric. ping. num. ix. sebest. num. vii. liquir. ras. ℥vi. F. decoctio in lb. iv. aq. pluvial. ad medietatem consumptionem, colatura usui reserve tur, qua continuo utens calculum semper excrevit, & urina copiosissime effluxit est hoc decoctum lubricans simul & emolliens, & urinam provocans, hoc modo alii simili casu laborantes in hunc modum semper curati fuere, primo injecto clystere emolliente deinde fomentis, & linimentis emollientibus, dolorem sedantibus & renem ac ureterem relaxantibus, postea decoct. nostro cum ficibus, cicere & aliis, ultimo purgatione ex cassia adhibita. *Petrus Forestus observat.*  
29. lib. 24.

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Urinæ retentione.*

**R**usticus quidam decem diebus urinæ suppressione laborabat, pro illo consultus, hoc Medicamentum præscribo.

℥. Rad. sanic. liquir. ras. an. ℥ß. parietar. malv. viol. agrimon. summitat. ribes nigræ, an. M. i. sem. anis. ℥i. m. uvar. passar. exacin. p. j. sol. sen. ℥i. gr. alxi xengi, n. s. F. decoctio in lbiii. feri lactis ad medietatem, bis in die sumebat ex hoc decocto, regionem vesicæ tum pectinem inungebat ol. amygdal. d. postea adjecto olei scorpion. etiam imposito hoc cataplasmate.

℥. Parietar. malv. chærefol. florum chamæm. an. M. i. cum in. pulv. ℥i. Rad. alth. vn. i. m. coq. in exigua aqua ad mollitudinem, pistentur addendo butyr. rec. vn. ii. ol. scorpion. vn. i. M. ex decocto, cum sum-

psisset, alvusei soluta est, & cataplasmate continuo imposito, tandem minxit lotium copiosum. Multa sunt quæ lotium provocant; sed præcipue folia ribes nigræ, licet aliquando vehemens sit, ut sanguinem simul cum lotio educat, ut in hoc rustico evenit. *Petrus Forestus, Obs. 18. & schol. lib. 25.*

Pro urinæ difficultate cum dolore circa pubem in muliere quinto die partus. Cum frustra multa remedio essent tentata accitus fui: hoc sequens cataplasma pectini appposito, incantamenti instar, cum eandem pro deplorata haberent, lotium liberè reddidit, & ab eo dolore, qui pubem exercebat, fuit liberata.

℥. Parietar. M. ii. chærefol. Mi. m. incisa ad mollitudinem decoq. add. butyr. rec. vn. ii. ol. scorpion. vn. i. m. calidè pectini applicetur, ita profuit, ut nullis aliis remediis opus fuerit, suspicabar malum ex frigore contractum; sola sæpè parietaria cum oleo scorpion. instar emplastri pectini apposita (quod experimentum præceptoris mei *Elidei* erat) profuit, & me raro fessellit, etiam ubi obstructio esset ab humoribus crassioribus, præcedente tamen clystere emolliente. *Idem observ. 8 lib. 25.*

Pro urinæ suppressione in puero.

℥. Parietar. oleo frixam, & eam calidam ad pectinem superimponere vel inter anum & pudenda; urinam enim ciet. Vel capam excavatam accipe in quam infunde oleum apethinum vel commune, & ad cineres calidos, quoad tabescat, finito & pistam calidam supra prædicta loca imponito; aliorum ac caparum restis minutim cæsa, & oleo, frixa ac admota juvat; oleum lilinum idem præstat sed puer hic, quum multa essent tentata, ex oleo scorpion. inunctus multa minxit, & liber evasit; radix mea oleo cocta, & pectini applicita, urinam pueris unice provocat. *Amatus Lusitanus, curat. 10. cent. 4.*

## SUBSECTIO TERTIA.

### *Pro Urinæ suppressione.*

**S**ubsequens emulsio in suppressione urinæ ultra septimum diem ad miraculum usque excrevit suas vires in muliere qua-



quadam, & est secretum *Divi Maximiliani*, excrevit calculos ultra mille & quingentos, & aliquot mensuras urinæ.

24. Sem. viol. purpur. ʒss. cum aq. veronic. q. s. F. emulsio. *Carolus Oslevius Epist. antepenult. lib. 3. Epist. & consilio, Cratonis &c.*

Pro urinæ interceptione & difficultate, laudo ego hunc pulverem.

24. Nucleor. Persic. cerasor. an. ʒii sem. dauci, filer. montan. ʒvi. sem. fœnic. d. anis. liquir. an. ʒss. artemis. ʒi. sacch. albiss. ad pondus omnium F. pulvis subtiliss. capiat cochl. i. in vino albo tenui, in eo casu maximè etiam laudo amygdalas amaras, vel iis meliores nucleos persicos comestos: item pulvisculum virgæ aureæ vel artemis. vel calam. aromat. quem velim cum vino albo tenui absorberi ʒi vel ʒii. pondere, mirum quam sint ex usu hi pulveres, si in frequentem usum adhibeantur, vel simplices vel mixti. *Reinerus Solenander, consil. 18. sect. 1.*

24. Sem. raphan. genist. an. ʒiii sem. bardan. ʒii. croci ʒss. sacch. ʒss. F. pulvis: detur una pars manè jejuno ventriculo ex vino albo, altera pars vesperti ante cibum. Inter ea quæ admoventur tria maximi valoris mihi magnoperè probantur. Primum sanguis vulpis calidus renibus illitus; alterum oleum scorpion. cum minima cantharidum in pulv. redactarum portunculæ pariter illitum: tertium est hoc.

24. Succ. cepæ, petrosel. apii, fœnic. an. ʒiv. cum mica panis F. cataplasma pro renibus. *Ioh. Zecchius, consult. 30.*

24. Aq. veronic. parietar. an. ʒii syrup de alth. ʒi. M. F. Julepus add. ol. succin. gt. v. exhibe dimidiam partem circa vespertam, alteram mane; repetatur hic clyster alternis diebus.

24. Rad. malv. alth. an. ʒi. fol. malv. pariet. heder. terrestr. an. M. i. flor. chamæm. melil. an. p. i. sem. fœnic. anis. carvi an. ʒii. F. decoctio in colat. lbi. dissolv. bened. laxat. ʒss. mell. viol. ʒi. ol. amygd. d. chamæm. an. ʒi. salis ʒii. F. enema, cum iisdem, herbis aucta quantitate fiat infusus. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 11. cap. 5. lib. 4.*

24. Parietar. rec. M. iv decoq. ad cataplasmatism consistentiam, adde ol. lil. alb. ʒii. ol. scorpion. ʒi. F. cataplasma, id lin-

teo duplicato densè inductum calidè sumini applicetur, cum admiratione illico lottum provocatum quoties admotum, quasi affixa cucurbitula sensit urinæ attractionem. *Augustinus Thonerus, observ. 10. lib. 1.*

## SUBSECTIO QUARTA.

### Pro Urinae suppressione.

**H**oc decoctum præscripsi.

24. Rad. liquir. ʒi. passul. ʒss. rad. ononid. vn. ʒ. cicer. rub. p. i. fol. malv. parietar. an. M. i. flor. chamæm. p. i. F. decoctio, dulcoretur addito sacch. & bibat, infusione quoque ex decocto malv. parietar. chamæm. tepide utatur, his factis urinam denuo reddidit & dolor circa vesicæ regionem quievit. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 280.*

Ad mictionem provocandam quæ mirè angebat, bibit jusculum sequens.

24. Cicer. rubr. p. i. rad. asparag. petrosel. an. vn. i. sem. melon. vn. m. coq. addito butyro, bibat, sub vespertam copiosè minxit urinam, cessante iterum mictione dedi hanc potionem.

24. Sem. nasturt. ʒss. aq. parietar. vn. i. Julepi viol. vn. m. bibat, & repetat. decoctum cicerum, quibus factis immensam denuo urinæ copiam ut prius minxit sine recidiva. *Felix Platerus, observ. lib. 2. pag. 359.*

Vir cuidam nobili certis temporibus circiter biduum vel triduum suppressabatur urina, adeo ut nullam reddere poterat; tuncque dolorem & in renibus gravem, & distendentem in vesicâ sentiebat, donec urina impetu quodam cursum profiliret, copiosa, eaque turbida, in qua subsidente, vel colata per pannum, pus & mucus bona quantitate deprehendebantur. Existimavi renum & præsertim dextri, in quo latere magis dolebat aliquam exulcerationem esse, à qua pus in renibus coacervatum mucumque urinæ in ureteres influxum tam diu impedire, donec loco cederet, & cum urina elueretur; metuebam etiam ne calculus quoque aliquis subsit, qui in renum substantia genitus; auctus diuque retentus, illic sedem



dem fixerit: remediis meis usus rarius & mitius hoc affectu laboravit, inter quæ hæc plerumque profuerunt, quando paroxysmus ille cum invadebat, in sessione in balneo utebatur, ex decocto relaxantium & anodinorum simplicium parato.

Bibebat de hoc diluto terebinth. una vice ad ℥iſſ. quod & ſilli non ſaperet, quia tamen mictio inde mox ſequabatur obtemperabat.

℥. Resin. laricæ vel abietin. puriff. & limpida ℥ſſ. vitell. unius, ovi, mell. ℥i. a. gitentur probè in mortario marmoreo, donec albeſcat & diſſolvat lactis cremoris inſtar: poſtea adde vin. alb. opt. aq. parietar. & flor. fabar. an. ℥iſſ. ſyrup. limon. vel acetof. citri ℥i. agitentur denuò, ut amplius liqueſcat, ſervetur ad uſum, ex terebinth. vera cypria pilulas parari cura. vi hoc pacto.

℥. Terebinth. vera ℥ſſ. ſacch. cand. ℥ii. ſyrup. de limon. q. ſ. F. maſſa, de qua capiat ℥i. pro vice hebdomadatim, vel ſi malit in pulvere uti, ejus ℥i. bibat cum vino: paroxysmo interdum adveniente bibat ſequens decoctum, uti & alio tempore frequenter.

℥. Cicer. rubr. p. i. maceratorum aliquandiu antequam decoquerentur, in aq. rad. ſœnic. petroſel. & aſparag. rec. vel turionum illius recentium cum pullularent, an. parum. F. decoctio, adde ol. amygd. d. rec. expr. ℥vi. ſalis tantillum pro uno haſtu. Quando dolor immenſuſerat, ut nulla eſſet quies, egoque vocatus a deſſem, ad narcotica progreſſus, quibus prius non erat uſus, cum & ſomnus obreperet, atque levamen ſentiret, mirè laudabat; quæ tamen non niſi neceſſitate urgente ſumma, illi exhibebam, per pilulas ejuſmodi.

℥. Pulv. troch. alkikengi ſine opio ℥ii. opii ℥ſſ. contriti diligentiffimè cum ℥i. ſacch. candi, cum ſyrup. de liquirit. F. maſſa. Detur pilula ℥i. pondere, vel paulo plus prout operabitur. Hiſce potiſſimum remediis quæ abſtergendo obſtructiones ſolvebant, urinam promovebant, dolorem mulcebant, multos annos ſublevatus fuit; donec thermas Cellenſes adire volens, cum itineri accinctus eſſet, apoplexia ſubitò correptus expiravit. *Felix Plat.*, obſ. l. 3. p. 813.

Fotus ad motus reni & ureteri, mox in-

unctio ex oleo Scorpionum & amygd. d. cum etiam cataplaſma ex ſæce decocti emollientis cum cepis coctis ſub cineribus: eodemque tempore exhibitus julepus ſequens.

℥. Succ. parietar. & ſœnicul. marin. an. ℥iſſ. ſucc. limon. & ol. amygd. d. rec. an. ℥i. M. F. Julepus, pro una doſi: intra horam ab aſſumpto julepo, copioſè minxit & liberatus eſt. Ad ſigillum curationis ſumplit poſtridie mane bolum ex caſſia, rheo, & cremore tartari. *Lazarus Riverius*, obſ. 29. cent. 2.

## SUBSECTIO QUINTA.

### Pro Urinae ſuppreſſione.

**N**obilis quidam diebus æſtivis calidiſſimis *Lutetia Monſpelium* veniens, multoque potu ad ſitim extinguendam ſeſe ingurgitans, quatuor à reditu ſuo diebus incidit in omnimodam urinæ ſuppreſſionem. Uſitatis remediis per triduum uſurpatis nihil conferentibus, tandem ego vocor, & prædictorum relationem audiens, quæro num dolorem aliquem in lumbis aut pube æger perciperet, aut alias nephriticis affectibus obnoxius fuiſſet, ille ſe nullo dictarum partium dolore affici, neque unquam dolores nephriticos paſſum eſſe conſtanter affirmavit; quibus omnibus diligenter perpennis, cenſui hanc urinæ ſuppreſſionem à nullo renum aut veſicæ vitio dependere, ſed potius ab obſtructione venarum emulgentium, quam humorum multitudo pepererat. Siquidem *Gal. lib. 10. meth. c. 2.* duplicem obſtructionis cauſam ſtatuit, humorum ſcilicet multitudinem, & eorum craſſitiem: ratione multitudinis vaſa nimium repleta & diſtenta, non poſſunt ſeſe contrahere ad expulſionem, quod manifeſtè apparet in veſica, quæ à diuturniore urinæ retentione prætermodum diſtenta, difficillimè interdum urinam excernit, propter contractionis defectum. Huic ſententiæ inhærens, phlebotomiam propoſui larga manu celebrandam, abſolvendam venarum plenitudinem, cui cum acquieviſſet Medicus ordinarius, extracta fuit ſanguinis lb i.



at vix hora elapsa à venæ sectione, sensit æger profluentem urinam à renibus ad vesicam per ureteres, & se brevi eam redditurum professus est; ac paulo post matulam petiit, quæ cum unica mictione repleretur, alia vasa fuerunt afferenda, ita ut intra horæ spatium plures urinae libras excreverit. Sicque omnino liberatus est, neque sumere voluit purgans medicamentum quod in crastinum ipsi fuerat præscriptum: *Lazarus Riverius, observ. 1. cent. 1.*

*Ioh. Dominicus Sala* qui ætatem inter experimenta consumpserat, semel omni vitæ spatio se urinam quindecim diebus in viro suppressam vidisse monuit, venis ad pollicis amplitudinem intumescens, quæ fluente denuo urina inflatum naturalem rediere. Secus urinam supra quinque vel sex dies nunquam meminerat retentam. *Ioh. Rhodius, observat. 28. cent. 3.*

*Nicolaus Trevisanus* Medicinæ Theoreticæ Professor, jam ætate confectus à vesicæ calculo urinæ vexabatur suppressione. *Iacobi Zabarella* tum Professoris Medici munere atque consilio, cum lapidem nephriticum brachio aptasset; calculum excrevit: ne quicquam ex eo percepit incommodi, postquam ipsum perpetuo circumferret. Eandem ejus efficaciam *Ioh. And. Schorargus* celebris Medicus Patavii in agricola est expertus, qui urina retentum valde torqueretur, lapide isto coxæ interiori admoto; ea protinus effluxit. *Ioh. Rhodius, Observ. 30. cent. 3.*

Lapis Nephriticus maximè laudatus ex nova Hispania deferitur, prassio lapidis similis, qui ad viridem colorem lacte permixtum tendit, præfertur viridior: ejus præcipua laus est ad nephriticos dolores, tum ad calculum expellendum & arenulas. Nobilis mihi notus unum habet, cui nullum alium comparandum vidi; nam eum brachio gestans, tanta arenularum quantitate liberatur, ut metuens ne noxia sit tanta ejectio, interdum illum deponat, nullumque tum amplius calculum ejicit: sed dolore premente, denuo eum gestans, statim levatur aut minuitur dolor, multarum arenularum, atque etiam calculorum expulsionem. Ea etiam occulta

facultate præditus est, ut ab ejusmodi dolore præservat renibus gestatus, renum calorem mitigando. Ducissa *Bejar* ter brevi temporis intervallo nephriticis doloribus afflicta, armillam ex eo lapide sibi confecit, quàm perpetuo gestat; ex illo tempore (quod decennium superat) eo dolore nunquam vexata est. *Nicol. Monardes, lib. De simpl. Medicam. ex novo orbe delatis.*

## SECTIO TRIGESIMA QUARTA.

### De Urinae incontinentia.

**U**rinae incontinentia est ejusdem propter Sphincterem resolutum, vel vesicam compressam, sine acrimoniæ & doloris sensu, præter voluntatem emissio.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Urinae incontinentia.

**V**rina infantum (ut refert *Benedictus Vermensis*) muribus elixis in cibo datis cohibetur. Ego hoc expertum novi à quibusdam mulierculis *Delphensibus*, quæ pueris elixos mures commodè dederint. *Petr. For. schol. obs. 22 lib. 25. De Vesicæ morbis. Legatur Obs. 22.*

*Malmundarium* anno 1608. vocatus, hydropicam anum curaturus, immanem ex remota platea ejulatum audio, sciscitatus quid esset, ducor ad juvenem primiparam, cui inepta obstetrix vesicam lacera-verat, ut ne momento urinam contineret. Vnde iugi stillicidio excoriata primum cutis labiorum pudendi moxque tot ibi verrucæ sed molles, natæ, ut putem nullius duas manuum volas capere; illas potuisset; utraque nates ad os fere eodem lotio exesa. Iussi *Leodium* illam vehi cupidissimus curam illam tentandi reclamante Socero meo *Ryctio* Medico Doctissimo: ut primum operi me accinxi, informem illam & prægrandem verrucarum molem, magmate illo ex stibio crudo & sublimato æqualiter mixtis, vnde butyrum antimonij destillant; dense oblevi: qua sæpius derassa, die tandem tertio, labia pudoris altissime sepulta primum se aperuere, & clunium



putris caro exesa vel excisa spem boni successus fecit, ut primum diductis labiis Sphincterem vesicæ observare potui, siphonem argenteum concinnavi, cujus partem breviorē vesicæ immittebam, longiori autem, & quatuor latos digitos extanti lagenam alligabam. Hoc modo urina aliò derivata, ulceribus ad citatricem ductis, sana sibi visa, maritum, cum quo biennio non consueverat, decimo nono postquam *Leodium* venit die, ad se vocat, a quo, cum ipsam artem repōnendi siphonem necessariò auferendum in amplexibus docuissem, iterum grāvīda scēlicius peperit: cāterum urinae jugi stillicidio cum multa adhibuissem frustra, dimisi hoc uno lātā, quod omni dolore soluta molestā vitam ob lagenæ pondus commodius traheret. Tandem alia occasione *Malmundarium* revocatus, lātissimā offendi, unaque siphonem argenteum offerentem; jam inquit aliquot menses hujus adminiculo non egui, tibi fortē usui aliquando erit. Stupente me, quomodo urina illa incontinentia liberari potuisset, ostendit mihi sacculum collo appensum, in quo erat pulvis busonis vivi in nova olla usti. Hoc à cingaro se edoctam; ab ejus usu nihilo secius urinam se continere, quam ante lacerationem. *Leodium* reversus, hoc secretum nunquam mihi lectum vel auditum in alio experiendum dixi. Appendi itaque collo Mercatoris cujusdam eadem incontinentia ob malè sectum calculum, vexati, mirum dictu, etiam hic statim persanatus fuit. Aliam, periculum hujus faciendī occasionem quamvis curiosè quāsierim, reperire non potui. *Henriens ab Heers obs. 14. lib. 1.*

## SECTIO TRIGESIMAQUINTA.

### De Uteri Cancro.

**F**Requentius generatur Cancer in uteri cervice, quamvis aliquando & ipsi substantiæ accidere potest. Alius est ulceratus, alius non. Non ulceratus est tumor durus, inæqualis, colore sublivido, venenosus, calidus, perpetuo dolore affligens. Ulceratus verò, est ulcus, quod præter dolorem, tumorem, ac inæqualitatem

labra habet prætumida, dura, & aspectu horrida, ex quo etiam concreta illuvies sordida & livida, interdum etiam subrubra & cruenta sanies emanat, tenuis, nigra & graviter olens. Oritur ex menstruo sanguine adusto, humoribusque calidis & torrefactis ad hæc loca confluentibus. Ex hac causa primò fit scirrhus qui si diu persistat & exuratur humor in cancerum degenerat, primò non ulceratum, postea ob majorem corruptionem & acrimoniam, etiam ulceratum.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Uteri Cancro.

**S**Equens injectio ulcerato Cancro maxime convenit.

24. Herb. Roberti, verbasci, scabios. chelidon. min. aneth. sterc. human. an. aq. v. comburantur: de cinere accipiantur ℥ii. aq. solan. vn. vi. excepta in mortario plumbeo pistillo plumbeo agitentur; deinde in uterum injiciantur, Oleum ovorum frequenter ductum & agitatum in mortario plumbeo, donec spissius reddatur, & plumbi colorem contraxerit, efficacissimum est medicamentum. Cinis cancerorum fluviatilium lotus in aqua Solani, permixto pulvere ex plumbo vel antimonio, ulceratum Cancrum curare dicitur & creditur: quod si non curat saltem mitigat, exsiccat & depascentem cohibet. *Petrus Forestus schol. obs. 47. lib. 28. De Mulier. Morbis.*

Inter topica sequens cæteris præcellit.

24. Ol. ex vitell. ovor vn ii succ. solani & veronic. vel sempervivi an. vn. ℥. Mercur. crudi dr. ii. agitentur in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo, donec crassitiem linimenti acquirant in uterum immittatur hoc linimentum cum turundis oblongis, vel candelis cereis linteolo obvolutis. Injectiones multò facilius immitti poterunt in hunc modum compositæ.

R. Aq. hord. lb. m. aq. solan. & plantag. an. vn. ii. aq. veronic. vn. i. trochis. alb. rhas. dr. ii. sacch. Satur. dr. i. F. injectio. Si dolor atrociter urgeat, ad vn. i. v. injectionis, syrup. papav. ℥. i. Foveatur etiam pars affecta aqu. solani & plant. vel eorum decoctis: quibus



addi poterunt folia nymphææ, papav. alb. rosæ rubræ & camphora. Quod etiam decoctum iniici frequenter poterit in uterum, fietque multò efficacius, si in mortario plumbeo agitetur, vel sacch. Saturni eadem permisceatur. Inter specifica commendantur ranæ lotæ & coctæ, & cataplasmatibus loco impositæ: vel earum decoctio per injectionem abhibita: tum etiam decoctum aut succus Cancror. fluviatil. in uterum injectus; sicuti & herba Roberti sumpta vel admota.

Cogimur aliquando, propter immanissimum dolorem, ad narcotica recurrere, quæ in hoc affectu, propter intensum humorum fervorem, minus nocent: & vidimus nos mulierem Cancro in mamma laborantem, quæ singulis noctibus; per quatuor menses, laudan. gr. ii. vel iii. innoxie & cum maximo solatio sumebat. Si ex Cancro ulcerato multus sanguis prodeat, ut sepe fit, iniiciatur in uterum succus plantag. cum tantillo thuris. Sed ante omnia instituantur universales evacuationes. *Lazarus Riverius, prax. med. l. 15. c. 10.*

### SECTIO XXXVI.

*Pro Uteri dolore intenso ex frigore.*

**N**ihil quicquam huic magis profuit, quam castor. ℥ii. cum vini rhenani exiguo sumpti. Alteri etiam mulieri, cui cum dolore ventositas admixta erat, exhibui pulv. rad. gentian. ℥i. cum vino generoso. Nihil enim æquè dolori subvenit, ut rectè dixit *Benedictus Veronensis*, quam castoreum, si ex frigida causa fuerit, sive potum, sive illitum; ita & gentiana trita mirè prodest ex vino calefacto pota, si ex vento fuerit, nam & imminuentem arcet dolorem. *Petrus Forestus, observ. 40. lib. 28.*

### SECTIO XXXVII.

*Pro Uteri Ficis.*

**G** *Vainerius* mulierem hoc morbo laborantem post universalia remedia ita curavit. Capiebat picem *Hispanicam* & pulverizabat in terreo vase, supra quam la-

ridum ignitum inflammatumq; guttatim stillare fecit, ut sic pix liquefacta in formam unguenti coiret; eo oblinebat uteri hæmorrhoides & ficus, & sic dolorem sedabat. Modo etiam accipiebat butyrum rec. & in mortario plumbeo cum pistillo plumbeo ad formam unguenti cogebat, eoque mirabiliter dolorem sedabat, & ubi ardor insignis esset cum dolore, hoc unguento commodè utebatur.

24. Unguenti popul. ℥iii. croci ℥ii. opii ℥i vitellum unius ovi rec. incorporentur simul, & locus affectus inungatur: magna admiratione dolorem sedat. Consului ut nostra Matrona iisdem remediis uteretur. *Petrus Forestus, observ. 54. libro 20.*

## SECTIO XXXVIII.

*De Uteri furore.*

**F**Uror Uterinus est species quædam mania ab intenso & effrenato coeundi appetitu orta, qui mentem de sua sede dejicit, ita ut laborantes obscæna & impudica verba passim effutiant, abjecta omni verecundia Venerem furiosè expetant, & ad eum viros invitent. Causa est seminis copia caliditas, & acrimonia in vasis seminalibus immodicè turgens.

### SUBSECTIO UNICA.

*Pro Uteri furore.*

**P**hlebotomia sæpius, pro ut vires ferre poterunt, celebranda est, ut tota humorum massa, & ipse uterus refrigerentur, & sanguis fervidus ab uteri venis revellatur. Postmodum purgatio instituenda est benignioribus composita, bilem aut melancholiam educantibus, prout alteruter humor redundaverit. Purgationi succedent julepi præparantes humorem peccantem refrigerantes scilicet & leviter aperientes, per triduum usurpandi. Mox purgans validius exhibendum erit ad humores illos penitus infixos evellendas, cui usui conferre poterunt illa medicamenta purgantia, quæ in mania curatione fuere descripta, quæ per intervalla erunt repetenda.



Iterata purgatione ad uterum, & universum corpus refrigerandum, humorisque fervorem temperandum, sequens balneum erit utilissimum, idque pluries in morbi decur fuerit repetendum.

R. Fol. lactuc. salic. nymphaeae, viticis, portulac. umbilic. ven. an. fasci. flor. viol. nymphaeae & ros. an. M. ii. coq. omnia pro balneo, quod ingrediatur tepide, sine sudore, bis in die longè à pastu.

Ad ulteriorem corporis refrigerationem ferum lactis per multos dies exhibeatur. Proprietate specifica semen extinguunt sequentia.

R. Fol. nymph. salic. viticis, an. M. iv. fol. lactuc. portulac. umbil. vener. an. M. i. sem. quatuor frigid. mai. lactuc. & papav. alb. an. vn. ß. aneth. ʒii. flor. nymph. & viol. an. M. i. contund. omnia recentia, & irrorentur succo limon. & destillentur in B. M. ac singulis aquae libris adde camphorae ʒi. Capiat vn. i. frequenter. Vel ex praedictis simplicibus fiat decoctio, & saccharo dulcoretur ad plures doses addendo camphorae parum, vel fiat emulsio ex sem. frig. mai. lactuc. & papav. alb. extracta cum aqu. nymph. lactuc. & salicis, cum syrupo violaceo. Opiata in hunc modum praescribi poterit.

R. Conserv. flor. nymph. viol. & viticis, an. ʒß. Conserv. ros. vn. ß. caulium lactuc. condit. vn. i. corall. & smaragd. præp. an. ʒi. cum syrup. viol. & nymph. F. Opiata.

In summa delirii vehementia somnum conciliantia utilissima sunt tam interna quam externa. In toto morbi decursu clysteres refrigerantes & blandè purgantes uturpandi sunt, cavendo ab acrioribus & vehementer purgantibus.

Injectiones etiam fieri possunt in uterum ex decoctis herbarum pro balneo aliisque remediis praescriptarum, quibus utiliter Sal Saturni addi poterit. Clysteres frequentes ex oxycrato ad hoc quoque conferre poterunt. Exterius linimenta refrigerantia, lumbis, pubi & perinaeo admovenda sunt, ex ol. nymph. unguento rosae. vel albo refrigerante cum succis solani hyoscyami, nymphaeae dissolutis, addendo parum camphorae; tum lamina plumbea perforata supra renes continuo gestanda. Ratione causae huiusmodi virgines viro juveni ac va-

Burnet Part. I.

lido jungantur. *Lazarus Riverius, prax. medic. lib. 15. cap. 5.*

## SECTIO XXXIX.

### De Uteri Hydrope.

**H**ydros Uteri est ejusdem tumor praeter naturam ex collectione feri, pituitae, aut flatus, intra illius cavitatem, aut propriam substantiam & membranas, propter debilitatum calorem nativum & malam proprii alimenti coctionem. Una causa est uteri ipsius intemperies & debilitas ex partu laborioso, abortu frequenti, aut frigore externo, contracta: alia verò, est eadem quae & hydropem universalem producit: aqua autem ex abdominis capacitate caecam & inusitatam sibi viam parat in uterum. Plurimum etiam facit ad hydropem uteri accersendum mensium diuturna suppressio. Hujus morbi signa sunt, tumor in ventris latus & secundum uteri formam extensus, in ambulando gravitas & spirandi difficultas, & menses inordinati, pauci, pravi, aut eorum defectus, uteri osculi gracilitas & humiditas, mammarum mollicies & lactis carentia, dolor in ventris & lumborum, rigor ac saepe febris.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Uteri Hydrope.

ʒ. **F**ol. sabin. matricar. puleg. sem. daucian. p. i. rad. apii & rub. tin. & an. ʒi. bulliant in brodio pulli columb. S. A. cujus ʒvii. vel viij. propinetur jejuno ventriculo: praemissis catartics, egregie ita purgatur uterus. Hoc decoctum efficacissimum reddetur, si immediate prius una ex infra scriptis pilulis exhibeatur.

R. Castor. opt. mirrh. rubiae tinct. an. ʒß. croci ʒi. succ. limon. q. s. F. Pilulæ ix.

Ad summovendum verò uterinum tumorem, & humorem discutiendum, non ignobilem locum obtinet quod sequitur medicamentum.



24. Borac. mineral. ℥ss. croci ℥ss. cum succo fabin. in formam boli reducantur, & bis in hebdomada devoretur. *Ioh. Zecchini consult. 30.*

Ventositati Uteri mirabiliter prodest experimentum quod est à nuce moschata.

24. Nucem moschatam integram, seca in quatuor partes, & applicato rectà infundibulo ad orificium uteri, particulam nucis super carbones projice ardentes, ut fumus rectà per canalem in ipsum uteri fundum quodammodo ferri possit; id semel atque iterum, imò tertia vice experire, si non processerit ab initio, & tandem ventus interclusus cum bombo, & motu totius corporis penitus cum impetu profiliit, & mulier sanatur. Hoc modo juvenem mulierem, curavi, & aliis omnia frustra tentantibus. *Ioh. Hartmannus, pract. Chym. p. 279.*

## SECTIO XXX.

### Pro Uteri procidentia.

**S**ubtus suffumigabatur corio anguillæ salitæ exsiccatæ in furno, & pulverizata manè & serò, quod maxime à *Gentili* commendatur ad uteri præcipationem, & ego felicissimo successu uti soleo, etiam ad intestini recti foras prolapsum, Suffumigabatur quandoque ex pulv. lannæ arietis nigri, quod remedium à proprietate juvat. Inter cætera laudat *Mercatus* in hoc affectu lapidem magnetem supra umbilicum, & rationabile est remedium; sed propter defectum non est factum. Fiebat quoque suffitus ex rebus foetidis, ut ex pennis combustis, ex limatura plumbi, &c. Sed circa res foetidas, & malè olentes illud perpetuò est observandum, ut nunquam his utamur, nisi res odoratas auribus admoveamus, nam res foetidæ solent syncopen inducere, *Epiphanius Ferdinandus, histor. 39.*

Cauterium actuale ignitum manu ostentetur, ac simulet Medicus, vel Obstetrix velle partem tangere, ita enim Natura retrahitur, & cum ea uterus ipse, aut pars aliqua quæ extra propineat. Vel si mulier timidiuscula sit, vivi mures filo

ligati cruribus repentè submittantur. Retulit mihi Chirurgus quidam exereitatissimus, vulnus quendam in ventre accepisse, per quod intestina egrediebantur, quæ ut reducerentur in suam sedem, nullum aliud medicamentum profuisse quam candens fermentum magnum, quod coram Patienti manu gestans vulnere applicaturum finxit, ejus rei subito terrore è vestigio intestina in locum suum reducta fuerunt. *Rodericus à Castro lib. 2. De morb. mulier. cap. 16.*

## SECTIO XXXXI.

### De Uteri scirrho.

**S**cirrhus uteri ejusdem tumor durus ac citra dolorem retinens, à crasso terrestri & faculento humore procreatus: oritur sæpe ex male curata inflammatione, ob nimium vel refrigerantium vel discutientium usum, à sanguine item melancholico, aut pituitoso nondum exusto in uteri aliqua parte collecto: signa scirchi sunt, tumor durus, tactuique renitens sine dolore, si legitimus sit; cum dolore si spurius, menses initio suppressi aut diminuti, crescente malo, magnus quandoque sanguinis fluor, corporis gravitas & ad motum ineptitudo: si substantiam affligat, in dorso & coxa dolorem excitabit; si verò ipsius cervicem, digiti contactu explorabitur: à mola discernitur; quod, menses vel supprimuntur, vel si fluant, ordinem servant, in mola autem, si fluant, inordinariè fluunt, in mola etiam mamma lacte turgent, in scirrho verò extenuantur.

## SUBSECTIO UNICA.

### Pro Uteri scirrho.

**C**um robusta esset, sanguis ut extraheretur mandavi; exhibui etiam syrup. ros. pallid. cum foliis senæ, adiecto paxillulo elct. de hiera, deinde apposui emplastrum de mucilagin. & de melil. postea & emplastrum de amoniaco, sed prius inunxi hoc linimento.

24. Mucilagin. sem. lini scænu grec. alth. malv. an ℥v. succi ireos ℥iii. pingued. anatis gal.



gallin. anser. an. ℥vi. ol. cheirini ℥i℥. bul-  
liant. ad consumptionem succor. deinde ad-  
de croci ℥℥. cum ceræ F. unguentum: com-  
mendatur à *Nicolao*; his remediis hæc opti-  
mè habuit.

Ad partem emolliendam. fiat hic fatus  
ex *Rondeletio*.

℥. Rad. lil. alb. bismalv. cucum. agrest.  
an. ℥iii. artemis. tertiam partem manipuli  
unius, ficum paria xx. sem. lini scœnugr-  
æ. an. ℥ii. flor. chamæm. viol. melilot.  
an. p. i. F. decoctio in aq. & oleo dulci,  
qua foveatur regio uteri; ex residua pista-  
& transmissa fiat cataplasma, quod appli-  
cetur post fotum, deinde utatur sequenti  
unguento.

℥. Butyr. rec. axung. porcin. an. ℥i. pin-  
gued. gallin. anatis, anser. an. ℥i℥. ol. amy-  
gd. d. & lilior. an. ℥iii. mucilag. sem. scœnu-  
græ. extract. cum vino albo ℥i. terebinth.  
& ceræ q. s. F. unguentum quo utatur post  
usum fatus; & post usum unguenti rursus  
redeat ad fotum, & iterum ad unguentum.  
His præsidii aliquando usus sum commo-  
dè in vidua quadam, in qua durities erat to-  
tum serè uterum occupans; sequens quo-  
que valde utile est.

℥. Opoponac. bdell. ammoniac. an. vn. i.  
styrac. myrrh. an. ℥℥. propol. verè ℥i. rad.  
irid. ℥i. croci dr. ℥. dissolv. lachrymè in  
oleo lil. & amygd. d. & vino malvatico,  
& depurentur; quibus adde terebinth. &  
ceræ parum F. unguentum. *Petrus Fo-  
restus, observ. 45. & schol. lib. 28. De mor-  
bis mulierum.*

℥. Emplastr. de melilot. & de mucilag.  
an. ℥i. gummi ammoniac. in aceto solut. &  
traject. & iterum inspissat. ℥℥. cum ol. li-  
lior. F. emplastrum debitæ magnitudinis  
superalutam extendendum & regioni ute-  
ri applicandum post inunctionem & quin-  
to quoque die renovandum. *Lazarus Ri-  
verius, obs. 38. cent. 1.*

Inter præsidia præcipua, quæ ad emol-  
liendum scirrhum, priscorum & juniorum  
sagacitas adinvenit, chalybs est, cujus u-  
su lapidosas durities promptè liquari vi-  
dimus: scœmina quædam ex menstrui re-  
tentione malè habens in uteri regione tor-  
mina persensit, apparuit etiam in pubis  
regione tumor aliquoties durus, & indo-  
lens, qui ab ovi magnitudine incipiens,

ita quinquennio excrevit, ut cucurbitam  
rotundam magnam præsentaret, in cujus  
profundo, tactu murmur percipiebatur;  
expurgatum corpus sæpiissimè sudorifica-  
fotus, unguenta, cataplasmata varia ad-  
hibita. Sed omnia hæc, etsi utilia, nullam  
commoditatem attulere; tandem solo cha-  
lybis usu per duos menses exhibitum omninò  
resolutus est tumor. *Zacutus Lusitanus, obs.  
88. lib. 2. Prax. Medic. Admirand.*

## SECTIO XXXII.

### Pro Uteri suffocatione.

**I**Nter alia exhibui flores nucum juglan-  
dium: est enim florisistius mira effica-  
cia in sedando strangulato utero, & habet  
vim etiam evacuandi. Soleo autem dare ℥ii.  
cum brodio pulli, vel cum quavis aqua hi-  
sterica. *Ioh. Scroterus apud Ioh. Wittichium,  
consil. 54.*

In suffocatione uteri uti soleo sequenti  
pulvisculo hysterico, qui me nunquam se-  
sellit.

℥. Fæcul. bryoniæ ℥ii. margar. præp. ℥i.  
castor. xxi. ol. stillat. rutæ, succ. alb. an.  
gt. v. M. F. pulvis, dividatur in tres partes  
æquales. Et repetitum, si opus fuerit, ori  
infundatur cum vino calido, in quo tantil-  
lum maceris & croci ebullierit. *Baldassar  
Timæus, cas. 17. lib. 4.*

Atriplicis olidæ folia contusa cum sac-  
charo conservam faciunt hystericis utilis-  
simam. *D. Needham, referente Ioh. Rajo  
Catalogo Plantarum Anglia.*

## SECTIO XXXXIII.

### Pro Uteri ulcere.

**I**N utero sed præcipuè in ejus cervice &  
collo sæpius contingunt ulcera, quæ  
pro parentibus agnoscunt acres & eroden-  
tes humores, inflammationem, lucem ve-  
neream, malignam gonorrhæam, partum  
difficilem, lochia post partum diu reten-  
ta, & secundinas corruptas: externæ cau-  
sæ sunt acris Medicamenta, violentus con-  
cubitus, casus, percussio vulneratique,  
signa sunt, dolor in ea parte acris & pun-  
ctivus, sanies & pus per intervalla ex ute-  
ro



ro per se, aut cum urina profluens, dolor incipitis, animi quandoque deliquium & febricula.

## SUBSECTIO PRIMA.

### *Pro Uteri ulcere.*

**P**Ræmissis venæ sectione & purgatione, & julepis bilem & acrimoniam contemperantibus, ad ardorem & intemperiem tollendam imperavi, ut succum burse pastoris & plantag. aliquando injiceret cum lacte muliebri, & exterius cum iisdem succis lavaret; vel cum panno lineo applicaret. *Valescus* utebatur aqua frigida: novi (inquit) aliquas mulieres quæ sentientes se habere ejusmodi ulcera lavabant ea cum aqua frigida, mundabant, deinde & cum pannis lineis exsiccabant, & in matricem mittebant frequenter, atque iisdem præsidis sæpè mutatis hæc ipsa sæpius per se ad integram curationem sufficiebant. Ablata intemperie ad detergentia devenimus, hoc optimum mihi videbatur quod ex fero lactis constabat cum paucis saccharo: quod ut injiceretur jubebam ad ulceris deterfionem: postea etiam adjecto melle, & syrup. de rosas: aliquando etiam consulyi, ut injiceretur decoctum lentium & plantag. & agrim. decoct. absinth. nisi non convenit quando ulcus est sordidum, deterfo satis ulcere aqua hordei & melle rosato, mandavi ut unguentum conficeretur ex tutie abluta & præpar. partibus duabus cadmiæ, litharg. argent. sarcocoll. an. part. i. cum ol. ros. vel aq. plantag. inungatur; demum deventum est ad unguenta partem resiccantia, ut ad unguentum diapompholig. & de cerussa, & sic egregie curata fuit. *Joh. Tiengius Medicus Amstelrodamensis* nobilem se matronam hoc modo ab ulcere uteri restituisse dicebat dabat de quarto in quartum diem ℥v. decocti senæ epithymi, ros. rub. myrobal. ind. & clysterem subinde in partem affectam injici mandabat ex aqua tepida decoction. senæ, epithym. fumar. flor. cham. ros. cui terebinthina exigua, mel. rosac. & hordei farina injecta erant, deinde pessos in uterum seu os uteri ponebat.

℥. Mell. rosac. libb. farin. lupin. filigin. fœnugræc. sarcocoll. an. ℥ß. F. pessi si pruritus aut dolor adesset, iisdem addebat semen papav. hyoscyam. & camphoram. *Petrus Forestus, observ. 48. lib. 28. De Morb. Mulier.*

Succus urticae cum pueri urina mistus abluendo injectus ulcer. uteri mirificè sanat *Felix Platerus, practic. tom. 2. cap. 14. pag. 575.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### *Pro Uteri cervicis ulcere.*

**P**rimò unguentum sequens dolores ulcerisq. causa præscripsi, ut illud cum panno lineo discerpto uteri cervicis intruderet.

℥. Mucilag. sem. psyll. factæ cum aqu. ros. ℥iii. vitell. ovi, num. 2 troch. alb. *Rhas.* cum opio butyr. rec. an. ℥m. F. instar unguenti deinde utatur hac injectione cum syringa.

℥. Aq. solan. plantag. ros. an. ℥ii. opii, dissolut. ℥i. alb. ovor num. 1. ol. rosac. ℥i. agitentur probè, lenimen ab hisce & præsertim unguenta maximum sensit, quare illius usum postea semper continuabat: post dies aliquot, diversionis gratia, cum adeo copiosè ichor urens efflueret, dedi illi manna ℥ib. in jusculo, & quia mire eam augebat fluxus ille, idque præsertim peracto menstruo fluore dedi sequentem potionem noctu cubitum ituræ.

℥. Aq. plantag. & ros. an. vñ. i. syrup. de papav. ℥iii. trochisc. alkikengi sine opio & sacchar. ros. tabul. an. ℥ß. M. F. potio variæ sunt subinde exhibita purgantia. Cum rediret per vias ardor & cruciatus, qui tamen semper usu unguenti cessabat, dedi seq. emulsionem ut aliquoties biberet.

℥. Emulsionis rv. femin. frigid. maj. fact. cum ac. ros. & plantag. an. ℥vi. item injectionem novam ordinavi sic.

℥. Troch. alb. rhas. cum opio ℥ß. mucilag. sem. psyll. cum aq. ros. extract. ℥ii. infusion. gummi tragac. ℥i. fact. cum aq. plantag. ℥ii. misc. & injiciantur cum lacte: suffitum hunc quoque per infundibulum, injecto pulvere sequenti super carb.



carbones excipiebat singulis matutinis, quem valde probat.

℞. Thur. mastich. an. ℥i. F. pulvis pro suffitu.

Ad sanationem ulceris hanc injectionem præscripsi: nihilominus semper in usu unguenti perseverans, quod omnibus præstabat.

℞. Rad. consolid. ℥i rad. bistort. ℥ss. alth. ℥vi. fol. plantag. equiseti, consolid. Sarac. an. M. i. sem. lini, ℥i. sem. psyllii. ℥iii. hord. p. i. F. decoctio, in colat. libi. dissolv. mell. rosat. ℥ii. sacch. rubr. ℥i. M. pro injectione purgato iterum corpore, usa est per vices sequenti pulvere.

℞. Oñium dactyl. ℥iii. pulv. equiseti ℥i. corall. rubr. ℥i. sacch. ros. tab. ℥i. sang. drac. dr. m. F. pulvis tenuiss. horum usu cœpit ita sanari, ut in publicum prodire posset; verum post 3. menses, iterum fluor licet minore quantitate admodum tamen aeris rediit. Postquam per quadriduum purgata erat, hac usa est infusione,

℞. Rad. consolid. herb. consolid. alchymill. plantag. equiset. heder. mal. chamæm. an. q. s. add. sem. lini & gypsi usti scutell. i. coq. in aq. pluviali, add. aq. fabrorum extinctionis ferri: hac infusione usa est per mensem integrum semel in die ad duas horas; & quoties è balneo egrediebatur, suffitum hunc admittebat.

℞. Thur. mastich. an. dr. iiii. benjoin. styrac. calam. an. ℥m. succini, dr. ii. F. pulvis crassus, pro suffitu, injiciebat interim continuo troch. alkixengi dissolut cum lacte caprino, dolore urgente cum opio, postea sine eo, & sic tandem integrum restituta est. *Felix Platerus, observ. lib. 2. p. 2. gin. 480.*

## SECTIO XXXXIV.

### De Vulnere.

**V**Ulnus) Græcè Τρῦμα in τὴν πόρην vulnere) est unitatis in parte molli à resecante & acuta, casum vel punctum facta solutio. Causæ sunt, omnia armorum genera, & dentes animalium. Vulnerum variae sunt differentiæ, una petitur ab ipsius vulneris natura, & sic aliud est rectum, aliud obliquum, aliud

magnum, aliud parvum, aliud profundum, aliud superficiale, aliud in carne musculosa, aliud in venis aut arteriis, aliud in tendinibus & nervis, aliud in ligamentis & articulis, aliud sine, & aliud cū contusione, alia rursus differentia sumitur à modo inflictionis secundum quam, vulnus aliud est casum illatum, aliud punctum inflictum, aliud per globum bombardicum illisum, aliud dentibus aut aculeis inflictum. Tertia differentia sumitur à parte affecta, & sic aliud est partium internarum, ut cerebri, cordis, jecoris, lienis, ventriculi, intestinorum, uteri, vesicæ, &c. aliud externarum, ut capitis oculorum, nasi, brachiorum, thoracis, dorsi, ventris, &c. Quarta differentia petitur ab eventu, juxta quam aliud est securum, & facile curabile, quale est quod cuti & carni ense infligitur, aliud rursus malignum, curatuque difficile, ut quod nervis, ligamentis, & ossibus infligatur; aliud denique lethale, ob nobilitatem & præstantiam partis affectæ, vel quia ab armis intoxicatis infligitur, aut morsu animantium venenatorum.

## SUBSECTIO PRIMA.

### Pro Vulnere.

**D**Escribam hic aquam paratu facillimam, qua vulnera ferè omnia ad miraculum sanantur. Fie in hunc modum.

℞. Aq. vitæ opt. vini ter destillatæ hyssop. hyperic. hyssop. millefol. an. M. ii. thur. myrrh. pulv. an. vñ. iiii. infund. per quatuor dies. Postea destillentur per balneum vel arenam, bene obturatis capello recipiente Aquam destillatam serva in vase vitreo bene clauso. Cum aqua hac post unionem per futuram totum vulnus madefiat. Imò hæc aqua ter destillata cum infusione prædictarum herbarum & pulverum per octo dies habet facultatem sanandi omnia vulnera infundendo illam, & superimponendo linteam madidum in ea, & superinfundendo pulveres.

℞. Thur. mastich. myrr. sarcocoll. boli arm. sang. drac. an. part. æqu. pulv. M. & supra futuram illam aquam madidam insperge, & supra impone pessulam oleo terebinth. madidam, & liga; nec solvas, usque ad quar-



quantum diem; & quotidie semel vulnus ligatum fove, & madefac eadem aqua vitæ. Quarto die solve ligaturam reperies vulnus conglutinatum. Quod si non reperias, rursus eadem facito, & per tres dies non solvas, madefaciendo vulnus quotidie ut supra; post tertium diem solve, & rursus cura ut supra, usque ad duos dies; nec multum sollicitus sis de diæta, quæ tamen sit accurata. Do tibi secretum maximum facile parabile, ad curanda fere omnia vulnera; quo si recte uti sciveris, lucraberis multam pecuniam. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 9.*

Habet hoc oleum vim curandi omnia vulnera & ulcera. Ita fit.

℥. Olei commun. antiq. ℔x. resin. pini, terebinth. ceræ, an. ℥ii. hyperic. rorismar. ros. millefol. an. M. ℔. croci ℥i. pingued. porci rec. ℥vi. bulliant in balneo M. quo oleo calidissimo quantum ferre possit ager, quidam omnia vulnera curabat. Ad ulcera quoque maxime confert. Aliud.

℥. Aq. vitæ opt. & generosi vini pluries circulatæ, q. v. ponatur in boccia vitrea colli longioris: diligenter obturetur os, digeratur per viginti dies, sublimo equino calido, ita tamen, ut superior pars sit extra stercus aeri exposita; apparebit post viginti dies aqua cærulea supra faeces, quæ erunt coloris albi: separetur hæc aqua paulatim per inclinationem à facibus, & reponatur in vas vitreum bene obturatum ad usum. Hæc est illa aqua qua (ni fallor) nuper quidam utitur *Venetis*, ad curanda omnia vulnera ad admirationem usque. Vocatur hæc aqua a nobis divina. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 16.*

Pro Vulnere Sclopeti in brachio.

Fiat digestio ex terebinth. ovi luteo & oleo rosac. In eandem intentionem præ cæteris laudatur oleum catulorum, quod omnibus digestivis anteponendum est. Est enim huic oleo vis mirifica, tum sedandi doloris, tum puris in ulcere maturandi. Si verò tale oleum non adsit, digeratur vulnus hoc digestivo.

℥. Ol. sem. lini & lib. alb. an. vñ. iiii. unguenti basilici ℥i. liquefiant simul, quo oleo calenti madefiant penicilla, &

intromittantur. Suppurato vulnere, abstergendum est & mundificandum ita.

℥. Terebinth. cum aq. ros. lotæ ℥iv. ol. ros. ℥i. mell. rosac. ℥iii. myrrh. aloes, mastich. aristol. rot. an. ℥i. ss. farin. hord. ℥iii. M. quo abstergetur ulcus & caro gignetur; Si ob longitudinem sinus medicamentum non possit attingere omnes partes, per interjectiones abstergendum erit ita.

℥. Aq. hord. ℔iv. agrimon. cent. min. pimpinell. absinth. an. M. ℔. rad. aristol. rot. ℥℔. F. decoctio ad ℔bi. colat. add. aloes, hepat. ℥iv. mell. rosac. ℥ii. bulliant parum F. injectio intra sinum. *Rodericus à Fonseca, tom. 2. consult. 2.*

## SUBSECTIO SECUNDA.

### Pro Vulnere.

**P**RO vulneribus maximus erit usus linimenti vel balsami cujusdam à nobis inventi, cujus ea vis est, ut concoquat, digerat, mundificet, & carnem etiam inducat; cujus certissimi in omni periculo faciendo usus nunquam me pernituit. Ejus descriptio talis est.

℥. Terebinth. claræ, & empl. de gummi elemi, an. ℥i. ss. pingued. castrat. ℥ii. pingued. porcin. antiq. ℥i. liquefiant ad ignem, & F. linimentum, quo ad ignem liquefacto, gallinaceæ plumæ extrema vulnera leviter inungatur. Hujus balsami vis satis laudari nequit. Hoc etiam emplastrum optimum comperimus.

℥. Ol. rosat. viol. chamæm. an. ℥ii. axung. gallin. & medull. crur. vituli, an. ℥i. vermium terrest. vino nigro lotor. ℥ii. butyr. rec. ℥i. ss. mucilag. alch. ℔bi. bulliant omnia simul usque ad consumptionem mucilag. Deinde colentur. Colaturæ adde lithargy. subtiliter tritur. ℥v. minii ℥vi. cum ceræ alb. q. s. F. ceratum, addendo terebinth. ℥i. ss. mastich. ℥i. F. ceratum. Omnibus recentibus vulneribus utile imprimis est: eo optime pus concoquitur & expurgatur, & caro demum inducitur. *Franciscus Arcaus. De curand. Vulneribus lib. 1. cap. 1. & lib. 2. cap. 5.*

Pro Vulnere simplici in carne.

Statim huic candidum ovi (ut fieri solet) agi.



agitatum stupa canabina expertum admodum est: deinde suto vulnere, appositus est hic Pulvis rubr.

℥. Bol. armen. terr. sigil. an. ℥vi. thur. mastich. sarcocoll. an. ℥iiss. myrrh. aloes, an. ℥iiss. tragacanth. pisti, sang. drac. an. ℥i. farin. hord. & fabar. an. dr. m. F. pulvis qui cum ovi candido liquore agitetur, donec in corpus unum coeat, quod glutinis instar lentescat, postea stupis lenibus excipiendum erit medicamentum, & ita vulnere admovendum. Supra quod & alię stupę solo ovi albo imbutę, & intra pannum lineum eodem madefactum liquore involute apponendę sunt. Sed & supra vulnus, nulla alia intercedente materia, pannus aliquis tenuis prædicto liquore imbutus ad moveri debet, ne scilicet dum remouentur stupę, futurę jam factę fila abrumpan aut dilacerent. Loca etiam circumjacentia oleo rosac inuncta fuere. Primus hic apparatus usque in quartum diem mutari non debet: quod si post quartum diem transactum, vulnus non coaluerit, vino aliquo stiptico calente abluendum est. Deinde stupę prædicto vino imbutę & expressę super ipsum vulnus apponendę erunt, quas & quotidie mutare oportebit. Intra enim paucos dies hoc modo vulnus adglutinabimus & per sanabimus. Vinum omnis vulneris, qua vulnus est; optimum est medicamentum; siccatur enim & adstringit. *Petrus Forestus, observ. 23. & schol. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro Vulnere cavo.

Chirurgus quidam hoc medicamento ad vulnus carne implendum, & ad deperditam carnem generandam feliciter cum linamentis utebatur.

℥. Terebinth. ℥iii. ol. myrtin. ℥ii. resin. pini, colophon. an. ℥i. thur. ℥iiss. sang. drac. vn. i. cerę parum. F. unguentum. Est unguentum quoddam, sine quo esse nolo, vocatum, in generando carnem apprime Nobile, & tale est.

℥. Thur. myrrh. an. ℥ii. sang. drac. ℥i. m. picis gręc. & navalis, an. ℥i. centaur. vn. m. terebinth. resin. pini, an. vn. m. sævi vaccin. vn. m. cerę vn. iiss. ol. q. s. F. unguentum. *Idem observ. 25. & schol. lib. 6. Observ. Chir.*

Vulneribus carne repletis, cicatricem in-

ducere solebat. *Ioh. Carpus* insignis Chirurgus modo cum unguento de cerussa, modo cum tetrapharmaco. Sed & hoc sequens unguentum cicatricem inducit.

℥. Terebinth. ℥ss. ol. ros. myrtin. an. ℥i. sævi castrat. ℥ii. cerę ℥iii. litharg. plumbi usti, minii, ceruss. an. ℥iii. corall. rubr. ℥i. tutiæ præp. ℥ii. F. unguentum. *Petrus Forestus, observ. 26. lib. 6. Observ. Chirurg.*

### SUBSECTIO TERTIA.

#### Pro Vulnere.

**I**N contusione cum vulnere facta à bombardâ in crure, aut in alio loco, Chirurgus quidam loca contusa inungebat oleo rosac. quo & *Carpus* uti solebat.

Inter alia etiam utebatur hoc unguento.

℥. Ol. rosac. ℥viii. ol. vitell. ovor. ℥ii. vitri albi. subtiliss. pulveriz. ℥ii. cerę albę ℥iiss. cortic. mediani sambuci M. i. bulliant omnia S. A. & colentur. Huic non est par à principio, usque ad repletionem carnis, & est mirabile in omni combustione ignis. Sed in contusionibus prædictis. Hoc unguentum solum est utendum, quousque mala qualitas sit remota, deinde curantur ut alię contusiones. *Forestus observ. 27. lib. 6. Observ. Chirurg.*

#### Pro Ulcere cum hæmorrhagia.

Chirurgus quidam ad sanguinem à vulnere profluentem restringendum, commodè hoc restrictivo utebatur.

℥. Vitriol. roman. ℔i. aceti vini ℔ii. boli vn. i. adde, si velis, croci Martis, & minus faller vn. i. M. Quidam hoc tempore solo croco Martis contenti sunt. Hoc quod sequitur, ut à quodam accipi, nunquam fefellit.

℥. Argenti sublimat. ℥i. probe misce cum unguento populeo, & utere. Alius hoc restrictivo in vulneribus nimium sanguinem effudentibus utebatur. Usneam seu muscum arboris sambuci in vulnere ponebat, & non extrahebat priusquam vulnus pellesceret; sanguinem enim in vulnere restringit: quemadmodum vasa spermatica vituli cum didymo si comburantur, & in Pulverem redigantur, mirabiliter sanguinem stringunt, hoc pulvere utuntur *Judei* dum pueros circumcidunt.

Alius Chirurg. insignis hoc pul. utebatur.

℥. Cal.



24. Calceis vive, vitriol. alb. aloes, an. q.  
 1. Sed & hic pulvis valet ad restringendum sanguinem.

24. Alumin. combust. cortic. granat. aloes, an. ʒi. vitriol. roman. ʒʒ. sang. drac. balauft. an. ʒi. acacie ʒi. fiat pulvis. *Petrus Forestus, obser. 37. lib. 6. Observ. Chirurg.*

Pro vulnere in junctura humidum quid extillante.

Hoc unguentum contulit.

24. Terebinth. lotē in aq. salu. ʒʒ. mell. comun. vel rosac. ʒiii. farin. hord. ʒii. aloes succotrin. ʒiii. F. unguentum.

Chirurgus quidam hoc sequenti utebatur unguento in similibus accidentibus.

24. Farin. sem. lini, farin. hord. orobi, an. part. equ. mell. q. s. ad incorporandas prædict. far. supra ignem ad spissitudinem pulvis, deinde cum frigidum evaserit, adde. pulv. thuris, myrrh. an. ʒʒ. confice ad modum ung. His nervorum ac tendium vulneribus celsim acceptis expeditissimum appri-meque idoneum esse creditur quod ung. ex vermibus vulgò nuncupatur. Recipit autem cent. min. lingue canis lanceolatę (quę plantago est maj. angustifolia) pilosell. consolid. maj & min. an. M. i. verm. terrest. ʒʒ. ol. commun. ʒbi. vini ʒbi. subigantur simul, & ita septem diebus nutriantur seu fermentantur. Deinde illis adde savi arietis ʒbi. picis nigr. resin. an. quart. i. Gummi ammon. galb. opoponac. in ac. dissol. an ʒv. simul omnia moderato igne decoq. usque ad vini & acet. consumpt. & colentur. Vbi penę refrixerint; adde tereb. quart. ʒ. thur mastich. sarcocoll. an. ʒiii. croci ʒii spatula agitentur in mortario, ut F. unguentum. Si nervus sit nudatus, non applicabis acris medicamenta. Tunc præstantissimum erit, calcem æstatis tempore diebus canicularibus sub Sole aqua salubri & dulcissima sæpius elotum, & exsiccatum, plurimo optimoque rosaceo admixtam opponere. Congruit etiam in hoc casu unguentum diapompholig. ut & Emplastr. diachalcitid. *Petrus For. obs 39. & sch. l. 6 Obs. Chir.*

## SUBSECTIO QVARTA.

### Pro Vulnere.

**V**ulneri turundam balsamo sulphur. Imbutam manē ac vesperi applica-

bam, quę per agglutinationem & concretionem (quę facultates peculiare ac mirificę sunt in hoc oleo) sanabatur intra 4. dies. Sic cetera vulnera omnia etiam à tormentis bellicis & sclopetis accepta, miraculosę curavimus. *Martinus Rulandus, curat. 88 cent. 9.*

Vulnera mane & vesperi vino mundifico: postea gossipium aut linteolum in oleum hyperic. intinctum vulnere applico: atque hoc perfacili remedio vulnera citò certoque sine majore negotio sano. *Martinus Rulandus, curation. 6. cent. 3.*

In parte nervosa vulnerata utendum est lenibus ac dolorem placantibus, ne à dolore fluxio incumbat parti: quare pax sit à validę refrigerantibus & stringentibus: potius calidis siccantibus curentur. Sæpē non sine successu author fui Chirurgis, ut in his uterentur oleo extuso ex sem. hyperici, cui immacerati fuerant flores hyperici. *Joh. Heurnius, ad aphor. 66. sect. 5.*

Vidi domicellam quę in humeri & scapulę articulo vulnus acceperat. Nullus tumor apparebat, leniter insaniebat, ac claudi januas ac fenestras volebat, ne alibi mors ingrederetur: obiit. Virum vidi, qui lapsu humeri carnem læserat, nullus tumor, leniter insaniebat, edere nolebat, verebatur enim ne cochlearia ac patina irreperent in ventriculum, obiit. *Joh. Heurnius, ad aphor. 65. sect. 5.*

Succus urticę cum urina pueri mistus abluendo, vulnera citò & mirę sanat. *Felix Platerus, practic. tom. 2. c. 17. pag. 109.*

Inter vulgus nostrum celebre & decantatum est unguentum *Torchilli Rustici Cimbri*, quo feliciter utuntur in vulneribus recentibus & inveteratis, in nervorum resolutione, & quā plurimis aliis affectibus, ut huc tanquam ad sacram anchoram confugiant, quanquam ex lege artis confectum non sit, contemnenda tamen neutiquam est plebei hominis experientia quandoque olitor est opportuna locutus. Ut ad plures unguentum perveniat, non gravabor ejus compositionem hic signare.

24. Balsamitę seu salvię part. iii. mille. fol. part. iii. quę colligantur exeunt mense Majo, vel aliās pro tempestatis varietate, minutim incisa simul coquantur per horas duas in vase cum butyri Majalis ʒviii. colen.



colentur; & colatura iterum igni imponatur, admixtis sævi cervini lbii. & sævi hircini lb. cera lb. m. resin. pini, quart. j. terebinth. lb. m. coq. omnia invicem donec dissoluta sint, deinde ab igne remotis, addendum tantum ærugin. minutim contusi, & viridi colore tingatur, immiscendæ quoque ol. spicæ ℥ii. & ita omnia invicem permisceantur, & agitentur donec refrigescant. Aliud ejusdem unguentum ad membrorum dolores, fracturas ossium, luxationes, aliosque externos morbos, qui integra & illæsa cute molesti sunt, miris à vulgo encomiis laudatur, cujus hæc est conficiendi ratio.

℥. Absinth. marin. vir. quartar. vasis, conf. maj. tantundem; minutim concisa coq. per horas 2. in but. Majalis lbx. & colentur Colatura super novum ignem repolatatur dum sævi cervin. lbii. axung. taxi lb. ceræ lbss tereb. lbss. donec hæc liquefiant. Deinde ab igne remotis, addantur olei juniper. ℥iv. & invicem agitentur donec refrigescant. *Th. Barth. hist. 25. cent. 6.*

Nuper patefactum est remedium sympatheticum, quod sanat eminus. Doctor. Theologus quidam retulit mihi, quod cum non posset assequi, subesse in chalcantho vim naturalem sanandi vulnus abiens, si linteo cruento adspergeretur, ideoque reputasse opera Diaboli istam sanationem contingere: ex altera autem parte vidisse aliquot experientias à viris probis factas: itaque in re dubia & cum Conscientia se tecisse experientiam rei hoc modo. Insperfit pulverem optimi chalcanthi linteo cruento, cum protestatione expressa, se nolle quicquam experiri, aut sanatum iri, si vel minima esset pacti aut cacodæmonis operatio: se vidisse tamen vulnus solito citius sanatum, cruorem etiam statim sedatum: adeoque deinde se credidisse causas naturales, quanquam nobis ignotas, operari in præfata sympathetica curatione. *Ioh. Helmontius, tractat. cuitit. Butler.*

## SUBSECTIO QUINTA.

*Pro Vulnere maximo, in bregmate ad cranium usq; sine fractura in Muliere gravida.*

**I**lla protinus accepto vulnere in terram quasi mortua prostrata, cibum indige-

stum evomuit; sanguinem item per os, nares & aures, non solum primo die, sed etiam per dies aliquot eiecit, & loquelam amisit, ita ut postquam ipsam in lectum posuissent, cuncti nihil aliud quam mortem proximam expectarent: ut ad illam perveni abrasis crinibus maximum vulnus in bregmate dextro secundum longitudinem future recte ductum ad cranium usque: quod tamen neque impressum inveni, febris, dolores totius capitis, vigiliæ, inquietudines, & syncopes aderant. Quotiesunque item jusculum aliquod aut ptisanam sumeret, statim evomuit, aliaque signa, ex quibus cerebrum valde commotum & sanguinem extravasatum circa membranas cerebri effusum esse, conspiciebantur. Ego ut cerebrum sese evacuare posset, de perforatione cranii ad stantes amicos monui, qui licet, rationibus meis intellectis, facile consentire videbatur, suaserunt tamen: imò obnoxè rogarunt, ut omnia alia remedia tentarem, priusquam ad hoc, quod ipsis tam grave atque periculosum videbatur pervenirem. Ego ne mihi imputaretur, parvi. Ossi itaque denudato, filamenta sicca, reliquo verò vulnere sequens digestivum imposui.

℥. Thereb. lotè in aq. beton. & salv. nuc. i. ol. rosac. & ol. nostri die debet an. ℥i. ol. de vitell. ovar. ℥i. gummi elemi dissolut. cum prædict. oleis & colat. ℥ss. croci ℥i. vitell. ovar. nu. ii. M. F. un. Omnia deinde emplastro basilicone obtegantur. totum verò caput oleis sequ. inunxi.

℥. Ol. nostr. de betonic. ℥i. ol. rosac. ℥ii. M. eodem die quia alvus constricta, sub vesperam enema leniens exhibui, rejecto clystere, venam in cubito dextro pertudi, sanguinemque ad vn. iv. revulsioni-bus gratia extraxi. Cum verò ab initio morbi præ dolore non quievisset, post cænam per duas horas ipsi usque ad quatuor grana laudani exhibui. Ea nocte satis quiete dormivit: altero die iterum ossi (quod & tandiu faciendum est, donec carne tectum sit) filamenta sicca, reliquo verò vulnere digestivum præscriptum imposui, totumque caput oleis prædictis inunxi. Interim autem dum contractebam vulnus, sequenti sacculo calido totum caput cooperiebam.



24. Rad. caryophyllat. ℥ii. fol. & fl. beton. fl. chamæm. melilot. ros. primul. veris summitat. rosmar. majoran. an. M. i. sem. anis. vn. i. incid. & contund. Pro sacculo interfuto & ejus magnitudinis, ut totam ferè capitis partem capillatam cooperire possit: eo vino rubro incocto, calidè applicetur. Sacculus iste non solum vulnus ab injuria aeris defendit, verùm etiam caput roborat, sanguinemque extravatum dissolvit, incidit, atque ut partim per poros cutis, partim per vias naturales effluere possit, efficit: estque mihi in vulneribus & contusionibus capitis satis familiaris: non tamen statim ab initio, sed postquam universalia prius adhibita fuerint, eo utor. His administratis præfidiis, optimaque observata victus ratione, & alternis diebus adhibito enemate, febris, reliquaque symptomata circa quartum diem multum imminuta fuere. Vulnus quin etiam ad optimam digestionem sese parabat, ita quidem ut septimo die morbi nulla amplius adesset febris neque dolor: elapso septimo, solo oleo betonica totum caput inunxi, vulnere sequens unguentum imposui.

24. Terebinth. lotæ in aq. saliv. ℥ß. gummi elemi dissolut. in ol. betonic. ℥ii. pulv. rad. caryophyllat. rad. irid. fl. aristol. rot. myrrh. thur. an. dr. m. cum s. q. mell. ros. & vitell. ovi F. unguentum, quod filamentis est imponendum. Omnia denique emplastro de betonic. obtengantur; & sic tandem singulari Dei beneficio, feliciter curata fuit: & fructum usque ad constitutum tempus gestavit. *Guil. Fabricius Hildanus, obs. 22. cent. 3.*

## SUBSECTIO SEXTA.

### Pro Vulnere.

**N**on possum silentio involuere medicamentum quoddam præstantissimum ad partium nervosarum vulnera: cujus descriptionem ab *Hispano* quodam sacerdote fide dignissimo accepi, qui retulit in *Hispania* non licere hoc medicamentum componere, quod homines medicamenti viribus confisi, facile digladiantur, inque arenam descendant. Est autem h. c.

24. Olei vetustiss. ℥iv. terebinth. puræ ℥viii. frumenti integri ℥iß. Hyperic. ℥ii rad. Card. bened. & rad. valerian. an. ℥i. thur. pulver. vn. i. radices & herbæ crasso modo contundantur, in olla ponantur, & tantum vini albi superfundatur, ut omnia in vino mergantur: & per biduum facta infusione, oleum & frumentum adiciantur, & coq. omnia ad vini consumptionem: mox facta forti expressione addatur terebinthina. & thus: & iterum parum sinantur bullire: servanturque in vase vitreo. Sana vulnere, ut ajunt, spatio viginti quatuor horarum. Modus utendi talis est; abluto prius vulnere vino albo frigido, statim inungitur totum vulnus oleo prædicto calente, quod si hoc fieri commodè nequeat, per siphonem intra vulnus, tanquam per clysterem immittitur, & confestim labia vulneris ad mutuuum contactum adducuntur, deligatura, futura, aut glutino: Deinde partes circumstantes prædicto oleo similiter inunguntur. Supra vero vulneris labia jam reducta, linteam imponitur, prædicto oleo madens, supra hoc aliud vino nigro expressum, mox alia lintea sicca; deinde fascia superligatur. *Hieron. Fabricius ab Aquapendente Chirurg. part. 2. lib. 2. cap. 7.*

Pro vulnere sub ala ad pulmones penetrant, injectiones primùm abstergentes, postea siccantes & consolidantes successivè in vulnus per syringam infundantur tepidè, corpore ita collocato ut rursus esfluere possint. Abstergens injectio talis sit.

24. Seri lactis caprilli ℥viii. mell. ros. ℥ii. succi api, chelidon. an. ℥i. sarcocoll. infus. in lacte & solut. ℥iß. terebinth. cum vitell. ovi solut. ℥i. M. F. injecto abstergens, interlapso med. die, injecto consolidans adhibeatur ita.

24. Lactis caprin. in quo igniti silices sunt extincti ℥iß. dissolv. succ. plantag. rad. consolid. majan. ℥i. sarcocoll. infus. & solut. in lacte ℥iß. terebinth. solut. cum vitell. ovi ℥ii. M. F. injectio consolidans. Si multum puris emanet, abstergente frequentius, sin minus, consolidante utatur. Bibat singulis diebus lac caprillum, & si pus remittat, ovillum ad ℥iv. pro vice, sumendo manè in lecto cum ℥i. m. sequenti pulveris.

24. Rad. consolid. maj. ℥ii. rad. alth. ℥i. liquir.



liquir. dr. iii. sem. plantag. dr. i. sem. hyo-  
scyam. 3. m. ocul. cancri 3i. Gummi Arab.  
tragac. an. 3. m. sacchar. ros. tabul. vn. iv.  
M. F. pulvis. Injiciantur vulnere turunda  
isto unguento tinctæ.

R. Terebinth. lotæ in aq. salv. vn. β. mell.  
rosat. 3iii. farin. hord. 3iii. Aloes succotrin.  
3iii. M. F. unguentum. Paretur potus vul-  
nerarius thoracicus in hunc modum.

R. Herbar. pyrol. veronic. alchymill. ca-  
riophyllat. caul. rubr. sanicul. utriusque  
an. M. i. ungul. caballin. M. m. agrimon.  
pentaphyll. an. M. m. rad. consolid. maj. dr.  
iii. rad. bistort. dr. i. coq. in aq. font. ad 3bi.  
add. mel. ros. colat. vn. ii. syrup. jujub. vn. i.  
M. pro decocto traumatico. *Ioh. Petrus  
Lotichius, observ. 6. cap. 8. lib. 6.*

## SUBSECTIO SEPTIMA.

### Pro Vulnere.

**V**ulneratus quidam in pectore cum  
globo sclopeti, sequenti potu cura-  
tus fuit.

R. Fol. artemis. consolid. maj. buglæ,  
ungul. caballin. hyssop. caul. rubr. an. M. i.  
vel ii. coq. in vino & aqua, addendo in fine  
mell. q. f. & F. potus.

Hæc potio sequens mirabilis, ad vul-  
nera interna valere dicitur.

R. Agrimon. pimpinell. fol. oleæ, cent-  
min. stœch. Arab. salv. pilosel. consolid. u-  
triusque arnogloss. cariophyllat. rubiæ  
tinct. pedis columbin. hormin. absinth. ta-  
nacet. heder. terrestr. fragar. bugloss. gen-  
tian. betonic. verben. an. M. m. bulliant in  
tribus quartis vini ad quart. i. Postea adde  
mellis vn. viii. colentur in modum clareti.  
Alii conficiunt ex pirola, betonica, cario-  
phyllat. consolidis, diaboli morsu, sanicu-  
la bugla, per vinca, in cerevisia, vino,  
aut aqua in duplici vase cum melle. Alia  
potio mirabilis, quæ dicitur fistulam cu-  
rare, & ossa fracta de vulneribus projicere.

R. Valerian. caulium rubr. fragar. abro-  
tan. tanacet. summitat. & rad. lapath. a-  
cut. tormentill. rub. tinct. plantag. lanceola-  
tæ, cariophyllat. Card. bened. an. M. i. sem. fe-  
nic. apii, petrosell. an. vn. m. sem. canab 3ss.  
grosso modo pulverizata, coq. in 3bx. vini al-  
bi, usque ad consumptionem medietatis.

additis 3biii. mellis, F. Apozemâ, detur  
quolibet mane & sero ciathus. *Petrus Fore-  
stus, schol. observ. 17. lib. 5. Observ. Chirurg.*

Pluribus experimentis comprobatum  
audio mille folii virtutem ad vulnere co-  
hibitionem, indiesq; novis observationibus  
confirmari: referam solum quod ab *Holle-  
rio in Chirurg.* adnotatur. Cuidam decusus  
nasus erat, qua os in cartilaginem definit.  
Rusticus propendentem partem alteri di-  
gitis conjunxit, herbam tusam & è vino  
nigro tritam, quod millesol. appellant,  
impegit, rudius omnia colligavit, unde  
celerrime restitit sanguis profluens, & vul-  
nus pulcra cicatrice brevi coit. *Iul. Cesar,  
Baricellus, hortul. genial. pag. 210.*

In ulmo arbore inveniuntur vesiculæ  
quædam, in quibus gummi latent ad instar  
lenti, & glutinosi humoris, ex quo culi-  
ces generantur. Humorem hunc una cum  
culicibus colligit *Michael Sterpinus* insi-  
gnis Chemicus mense junio, in phiala vi-  
treâ, qui glutinosus est instar argenti vivi,  
sed in vitrum coniectus rufescit. Post plures  
dies colat, & infudit flores ac rad. Simphi-  
ti maj. concisas, recentes, maceratque in So-  
le per aliquot dies: tum aquositate in cine-  
ribus per destillationem abstracta ad dimi-  
dium, colat per filtrum, & conficit bal-  
samum vulnerum, quod se in plurimis ex-  
pertum, testatur consolidare vulnera recen-  
tia viginti quatuor horarum spatio, certis-  
simo eventu. *Hieron Reusnerus, observ. 136.*

## SECTIO XXXV.

### De Uvula elongatione.

**V**ide supra lib. 3. sect. 49. De Columelle  
inflammatione.

## SVBSECTIO UNICA.

### Pro Uvula elongatione.

**F**iat rasio capitis super commissura sa-  
gittali, & applicetur ibidem ventosam  
habens orificium satis amplum & oblon-  
gum, & teneatur saltem per unam horam,  
vel mediam, ter vel quater in die reiteran-  
do ipsam; violenter etiam sursum attra-  
hantur capillie ejus ita ut cutis capitis exfo-  
lietur à cranio suo per tale enim ingenium  
statim



statim vulvula mirabiliter sublevatur. Vidi ipsum fieri & instanter profuit: sed non debet fieri nisi in casu arduo magnæ suffocationis. *Barthol. Montagnana, consult. 88.*

℥. Gummi gutt. gr. viii. tartar. vitriol. gr. iv. ol. succin. gt. iii. cum syrup. ros. solut. F. pil. v. ante vesperam scarificatione cum cucurbitulis utebatur: & paulo post isto gargarismo usus est.

℥. Aq. verben. plantag. equiset. an. ℥iii. flor. ros. rub. cortic. granat. p. i. sem. cydon. ℥i. ebulliant omnia simul in colat. dissolv. diamor. dianuc. syrup. papav. mell. ros. colat. an. ℥β. vin. granat. ℥i. syrup. de granat. acid. ℥β. sal. prunell. ℥i. spirit. vitriol. q. s. ad grat aciditatem coletur denuo ut F. gargarismus pelucidus.

Tale circa colum inducatur cataplasma.

℥. Rad. alth. ℥i. fl. scabios. samb. ros. rubr. melil. chamæm. an. M. i. sem. alth. ℥i. coq. in vini albi q. s. ad mollitudinem & pistentur: adde farin. sem. lini & scenu-græc. an. vn. m. Pulv. nidi hirund. vn. i. mel. lis rosac. vn. m. theriac. el. ℥i. ol. sal. d. m. ol. chamæm. amygd. d. rec. an. q. s. M. pro cataplasmate.

Contra Uvula elongationem hoc etiam proposui.

℥. Rad. bistort. irid. tormentill. gallar. immaturar. an. dr. ii. flol. ros. rub. scabios. an. dr. i. lap. calamin. præp. dr. i. m. alumin. usti dr. ii. M. F. pulvis subtiliss. lingua speculo oris depressa, cochleari parvulo ad id facto pulvis uvulae admoveatur, imò si fieri potest undique insuffletur. *Ioh. Petrus Lotichius, observ. 1. & 2. cap. 5. lib. 2.*

Ad faucium glandulas tumentes. *Ioh. Heurnius* hoc in secretis habuit.

℥. Argentinam coq. ex cerevisia, & fiat gargarismus, notis ad cap. 9. lib. 2. *patholog. Ioh. Fernelij.*

## SECTIO XXXXVI.

### Pro Vulvæ ruptura ad anum.

**C**onjux Mercatoris cujusdam corpore tenella & juvenis in primo partu adeo vehementer in tertium usque diem laborabat, ut exeunte tandem foetu spatium quod est inter anum & rimam pudendi rumperetur, anusque & vulva unum continuumque fierent foramen. Consultus per obstetricem respondi. Rupturam hanc aliter vix consolidari posse quam per futuras adeoque Chirurgum admittendum, qui operationem hanc eo quem præscripturus essem modo perficeret. Verum reclamante puerpera, quæ mori potius, quam tale quid pati, obstinato animo proposuerat maritus & parentes aliud remedium instantanter flagitabant. Suasi ut obstetrix matricem vino calido, in quo butyrum miale ebullierit, blandè diligenterque fomentaret & reponeret, postea rupturæ labia sensim adduceret & coniungeret, linteaque glutine infra descripto obducta & ansulis suis instructa utrinque ad latera vulneris ita apponeret, ut ansulae sibi invicem rectè responderent; deinde siccatō glutine, linteisque cuti jam tenaciter inherentibus, ansulas seu fila mutuò colligaret, ut labia vulneris rectè firmiterque unirentur. Interea ut pedibus aliquantò elevatis, & supino corpore per dies octo vel novem in lecto quiesceret ægra, omniaque coctu difficilia, vel tussim aut sternutationes proritantia devitaret, monui. Quo facto, isthmus iste intra dies quatuordecim adeo perfectè coaluit, ut quinque partus, quam minùs laboriosos ex eo tempore, sine ruptura sustinuerit.

Descriptio Glutinis.

℥. Pulv. rad. consolid. mai. ℥ii. bol. arm. mastich. sanguin. dracon. sarcocoll. farin. volat. pomphol. an. ℥i. M. cum resina pini & album. ovi an. q. s. pro glutine. *Baldassar Timaus, Cas. 31. lib. 4.*

*Finis Libri decimi octavi & ultimi.*





# Nomina Auctorum Practicorum ex quorum Operibus hoc Opus conflatum est.

## A

*Amatus Lusitanus.*  
*Areæus Franciscus.*  
*ab Aquapendente Hier. Fabr.*  
*Augenius Horatius.*  
*Acatia Martinus.*  
*Aimar Ozias.*

## B

*Bottonus Albertus.*  
*Boetius Anselmus.*  
*Benivenius Antonius.*  
*Ballonius Guilelmus.*  
*Baricellus Julius Cæsar.*  
*Barbette Paulus.*  
*Bayrus Petrus.*  
*Borellus Petrus.*  
*Boyle Robertus.*  
*Bartholinus Thomas.*  
*Brendelius Job. Philippus.*

## C

*Chomel Franciscus.*  
*Cardanus Hieronymus.*  
*Captivaccius Hieronymus.*  
*Crato Johannes.*  
*Cumanus Marcellus.*  
*Cordæus Mauritius.*  
*à Castro Rodericus.*  
*Cheneau Nicolaus.*  
*Cunninghame Robertus.*

## D

*Duditius Andreas.*  
*Deckers Fridericus.*  
*Dunzellinus Hieronymus.*  
*de Diemberbroech Isbrandus.*  
*Donatus Marcellus.*  
*Dodonæus Rembertus.*

*Burnet Part. I.*

## E

*Estanove Petrus.*  
*Erastus Thomas.*

## F

*Ferdinandus Epiphanius.*  
*Fallopium Gabriel.*  
*Fabritius Guilelmus Hildanus.*  
*— Hieronimus ab Aquapendente.*  
*Fernelius Iohannes.*  
*Fienus Iohannes.*  
*Faber Iob. Petrus.*  
*à Fonte Lælius.*  
*Forestus Petrus.*  
*à Fonseca Rodericus.*  
*Formius Samuel.*  
*Fontanus Nicolaus.*  
*Ferrarius Omnibonus.*

## G

*Gasserus Achilles.*  
*Gallus Andreas.*  
*Guarionius Christophorus.*  
*Glissonius Franciscus.*  
*Glandorpius Matthias.*  
*d GuildenKlee Balthasar Thimæus.*

## H

*Hoffmannus Gasparus.*  
*Horsius Gregorius.*  
*ab Heers Henricus.*  
*Heroldi Hieronymus.*  
*Hollerius Iacobus.*  
*Horsius Iacobus.*  
*Hartmannus Iohannes.*  
*Helmontius Iohannes.*  
*Heurnius Iohannes.*  
*Hodges Nathanael.*  
*Hæferus Vvolfgangus.*  
*Hæchstetterus Philippus.*

X x

Loc!



# I

Joel Franciscus.  
Iacoz Simeon.

# L

Libarius Andreas.  
Lofelius Iohannes.  
Lotichius Ioh. Petrus.  
Lossius Fridericus.

# M

Monabonus Apollonius.  
Montagnana Bartholomæus.  
Mercurialis Hieronimus.  
Martius Jeremias.  
Montanus Ioh. Baptista.  
Marfinus Iohannes.  
Mercatus Ludovicus.  
Matthiolus Petrus Andreas.  
de Marchettis Petrus.  
Monavius Petrus.

# N

Nævius Casparus.  
— Iohannes.

# O

Occo Alphonsus.  
Oslevius Carolus.

# P

Paræus Ambrosius.  
Pomaret Dionysius.  
Panarolus Dominicus.  
Platerus Felix.  
de Paduarius Henricus.  
Petræus Henricus.

# R

Romanus Guilelmus.  
Rondeletius Guilelmus.

Reusnerus Hieronymus.  
Referus Horatius.  
Rhodius Iohannes.  
Rumlerus Ioh. Udal.  
Riverius Lazarus.  
Rulandus Martinus.  
Rompsius Constantinus.  
Roussæus Balduinus.

# S

Seyler Abrahamus.  
Spigelius Adrianus.  
Scheiderus Balthasar.  
Sylvaticus Benedictus.  
Stieberus Bernardus.  
Sennertus Daniel.  
Sylvius Franciscus.  
Saxonia Hercules.  
Sigismundus Iohannes.  
Scaliger Iulius Cæsar.  
Salmuthus Philippus.  
Solenander Reinerus.

# T

Tbonerus Augustinus.  
Tulpius Nicolaus.  
Trincavellus Victor.

# V

Valetius Antonius.  
Valeriola Fridericus.  
Velschius Georg. Hieronymus.  
Varandus Iohannes.  
de Villanova Arnoldus.

# VV

Vdierius Iohannes.  
Vvillis Thomas.  
Vvittichius Iohannes.

# Z

Zecchius Iohannes.  
Zacutus Lufitanus.



# INDEX

## SECTIONUM

### Hujus Operis.

#### INDEX LIBRI PRIMII.

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>	<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>P</b> ro Abdominis Abscessu..	1	37. De Argento vivo sine noxa deglutito..	ibid.
2. <b>P</b> ro Abdominis musculorum Inflammatione..	ibid.	38. Pro Aronis punctura..	48
3. Pro Abdominis musculorum scirrho..	2	39. Pro Arsenici veneno..	ibid.
4. Pro Abdominis musculorum tumore..	ibid.	40. Pro Arteria incisa..	ibid.
5. De Abortu..	ibid.	41. De Arthritide..	49
6. De Abscessu spirituofo..	7	42. De Asthmate..	63
7. De Aceto..	ibid.	43. Pro Atrophia..	70
8. De Achoribus..	ibid.	44. De Auditus difficultate..	72
9. De Æglope..	9	45. De Auris dolore..	73
10. De Affectione hypocondriaca..	10	46. De Auris sibilo, sonitu & tinnitu..	75
11. De Albugine..	12	47. Pro Aurium fluxu..	77
12. De Alopecia..	13		
13. De Alvi adstrictione..	15		
14. Pro Alvo constipata..	ibid.		
15. Pro Alvo duriore..	16		
16. De Alvi pertinaci obstructione..	17		
17. Pro Alvi fluxu..	ibid.		
18. Pro Alvi colerico..	18		
19. Pro Alvi nimia profusione & medicamento cathartico..	ibid.		
20. Ad Alvum sistendum..	ibid.		
21. De Amaurosi..	ibid.		
22. De Ambustione..	23		
23. De Aneurismate..	26		
24. De Angina..	27		
25. Pro Ani abscessu & ulcere..	35		
26. Pro Ani fistula..	ibid.		
27. Pro Ani condilomatibus..	36		
28. Pro Ani intertigne..	ibid.		
29. Pro Ani procidentia..	ibid.		
30. Pro Ani prolapsu..	37		
31. De Aphthis..	ibid.		
32. De Apoplexia..	39		
33. Pro Apum iclu..	45		
34. De Apoplemate circa genu, cujus purulenta materia per secessum excreta est..	46		
35. Pro Appetentia canina..	ibid.		
36. Pro Area..	47		

#### Libri Secundi..

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Bubone..	77
2. <b>D</b> Pro Butonibus in ventre genitis..	78

#### Libri Tercii..

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Cachexia..	79
2. <b>D</b> Pro Cacoehymia à morbo relicta..	81
3. De Calculo..	ibid.
4. Pro Caloris naturalis debilitate..	101
5. De Calvitie..	ibid.
6. De Cancro..	102
7. De Canis rabidi morfu..	109
8. Pro Canitie..	112
9. De Cantharidum præparatione tutissima..	ibid.
10. Pro Cantharidum veneno..	113
11. Pro Capillorum casu à relaxatione meatuum cutis..	ibid.
12. Pro Capillorum defluvio..	ibid.
13. Pro Capillorum in fronte proventu..	114
14. Pro Capitis contusione ex casu..	ibid.
15. Pro Capitem puerorum crustis..	ibid.
16. Pro	



<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
16. Pro Capitis & ventriculi debilitate.	114
17. De Capitis dolore.	115
18. Pro Capitis fluxione.	120
19. Pro Capitis gravedine & fluctuatione à pituitæ & serosi humoris copia.	ibid.
20. pro Capite tuberoso.	121
21. De Carbunculo.	ibid.
22. pro Cardialgia cum impedimento veluti bolo in faucibus.	ibid.
23. De Carie Ossium.	124
24. De Carie Gallica.	126
25. pro Carne superflua.	ibid.
26. De Carne lateris ablata & restituta.	127
27. De Carunculis in meatu urinario.	ibid.
28. De Caro.	130
29. De Castorei mira vi.	132
30. De Casu.	ibid.
31. De Catalepsi.	134
32. De Cataracta.	136
33. De Catarrho.	137
34. pro Cephalea antiqua.	146
35. pro Cephalea biliosa.	ibid.
36. pro Cerebri commotione.	247
37. De Cerebri fungo.	ibid.
38. pro Cerebri inflammatione, & sphacelo.	148
39. De Cervi lachrymâ.	ibid.
40. De Chalibis præparatione.	149
41. pro Chlorosi.	ibid.
42. De Cholera morbo.	150
43. Pro Cicatrice in facie auferenda.	151
44. pro Cicutæ veneno.	ibid.
45. De Cingulo Mercuriali.	153
46. pro Clavis pedum.	154
47. De quadam gravida clysterum usu nutrita.	ibid.
48. De Cœliaco morbo.	ibid.
49. De Colica.	156
50. De Columellæ inflammatione.	164
51. De Comate.	165
52. Pro Condiendo funere magnatum.	166
53. Pro Conditura corporis Nobilis Viri.	167
54. De Contusione.	ibid.
55. De Convulsione.	168
56. De Cordis Calculo.	172
57. Pro Cordis à verme in ventriculo proveniente.	174
58. De Cordis osse.	ibid.
59. De Cordis palpitatione.	175
60. De Corde pilis referto.	177
61. De Corio humano.	ibid.
62. Pro Corneæ malè affecta à scoria chalybis.	ibid.
63. pro Corneæ Cancro.	178
64. Pro Corneæ ruptura.	ibid.
65. Pro Corneæ & Adnatæ ulceribus.	ibid.
66. Pro Coryza.	179
67. De Coxendicis dolore & luxatione.	ibid.

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
68. De Cranii depressione & fractura.	181
69. pro Cruribus exulceratis, &c.	183
70. pro Cruris ulcere inveterato & maligno.	184.
71. Pro Crustis caput pueri occupantibus.	ibid.
72. pro Cutis externa excoriatione in Infanti.	ibid.

#### *Libri Quarti.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Dentium affectibus.	185
2. <b>D</b> Pro deglutitione depravata.	186
3. De Diabete.	195
4. De Diarrhœa.	198
5. pro digitorum in manibus contractione.	201
6. pro Dorsi dolore.	202
7. pro Dracunculis puerorum.	ibid.
8. De Dysenteria.	203
9. De Dyspnœa.	211
10. De Dysuria.	215

#### *Libri Quinti.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>A</b> D Ebrietatem præcavendam.	216
2. <b>A</b> De Edropio.	ibid.
3. De Empyemate.	217
4. De Epilepsia.	219
5. De Epinyctide.	228
6. De Epiphora.	229
7. De Erysipelate.	ibid.
8. pro Excrescentia carnea in faucibus.	244
9. pro Excrescentia carnea in ulcere.	ibid.
10. De Excretionem critica.	245
11. De Excretionem pilorum.	ibid.
12. De Exomphalo.	ibid.

#### *Libri Sexti.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Faciei vitiiis.	246
2. <b>D</b> Pro Fame ingenti ex verme cucurbitino.	249
3. De Favo.	250
4. pro Faucium ulcere.	ibid.
5. De Febre continua.	251
6. De Febre intermittente.	265
7. De Febre hæctica.	279
8. pro Febre alba in virgine.	283
9. pro Febre verminosa cum alvi fluxu.	ib.
10. pro Ficu cancrolo in oculi dextri Orbita.	285
11. pro Fistulis & rimis in volis manuum ex Lue Venereâ.	ibid.
12. De Fistula.	ibid.

13. De



<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
13. De Fistula lachrymali.	287
14. De Fluore alvi.	289
15. De Fluxu post abortum.	292
16. pro Fluxu hepatico.	ibid.
17. pro Fluxu narium vehementi in febre.	293
18. De Fœtu mortuo.	294
19. De Fractura.	296
20. pro Fuci vulnere.	298
21. pro Fungorum veneno.	ibid.
22. De Furunculo.	299

*Libri Septimi.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Ganglio.	300
2. De Gangræna.	301
3. pro Genu tumido.	304
4. pro Gibboso.	305
5. pro Gingivis excreſcentibus.	ibid.
6. De Glaucomate.	306
7. De Gonagra.	ibid.
8. De Gonorrhœa.	307
9. De Graviditate falſa.	309
10. pro Gulæ dolore ab officulo illic hærente.	ib.
11. pro Gummiſ & doloribus Gallicis.	ibid.
12. pro Gutta roſacea.	310
13. pro Gutturis morbo Epidemico.	311

*Libri Octavi.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Hæmoptoe.	311
1. De Hæmorrhagia Narium.	319
3. pro Hæmorrhagia ex dente avulſo.	326
4. pro Hæmorrhagia ex vulnere.	ibid.
5. De Hæmorrhoidum dolore & fluxu.	ibid.
6. De Hemierania.	334
7. De Hepatis morbis.	ibid.
8. De Hernia.	345
9. De Herpete.	351
10. De Hordeolo.	353
11. De Hydrocephalo.	354
12. De Hydrope.	355
13. pro Hypocatharſi.	376
14. pro Hypochondrii dextri duritie.	ibid.
15. pro Hypopia, ſeu Piere ſeu Cornea.	ibid.
16. De Hyſterico affectu.	377
17. pro Humeris tumore laxo.	383

*Libri Noni.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E iſtero.	383
2. De Ileo.	388
3. pro Imbecillitate virium à nimia ſanguinis profuſione poſt partum.	392
4. pro Imbecillitate virium dignoſcenda per oppreſſionem facta ab ea quæ per diſſolutionem	

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
fit.	ibidem
5. De Immiſſione.	ibid
6. De Impetigine.	39
7. pro Impotentia ad Venerem.	39
8. De Inappetentia.	39
9. pro intelliini recti ulcere.	40
10. De Iſchiade.	ibid
11. De Iſchuria.	404

*Libri Decimi.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>P</b> Ro labiorum paſtulis, decorticatione & fiſſuris.	406
2. pro Labro exulcerato & cancroſo.	407
3. pro Lacte deperdito.	ibid.
4. pro Lactis exſiccatione.	ibid.
5. pro Languentibus in Venere conceſſa.	408
6. De uſu Laudani opiat.	ibid.
7. De Lentigine.	409
8. De Lepra Araba & Græcorum.	410
9. De Lethargo.	413
10. pro Lichene.	415
11. De Lienis Affectibus.	ibid.
12. De Lienteria.	419
13. De Lingue Calculo.	ibid.
14. pro Lingue & Laboriorum reſolutione.	420
15. pro Lingue vulnere.	422
16. De Lochiis per alvum expurgatis.	ibid.
17. pro Lochiorum fluxu immoſſo.	ibid.
18. De Lochiis ſuppreſſis.	423
19. pro Loquela amiſſa.	ibid.
20. De Loquela abſque Lingua.	424
21. De Lue Venerea.	425
21. De Lumbricis.	437
23. pro Lupia.	442

*Libri Undecimi.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>P</b> Ro Macilentis.	442
2. pro Maculis Infantium.	443
3. De Madaroſi.	ibid.
4. pro Mammarum inflammatione.	ibid.
5. pro Mammarum duritie & tumore.	444
6. De Mania.	445
7. pro Manus icſtu & paralyſi.	447
8. pro Marcore.	448
9. De Melancholia.	ibid.
10. pro Memoria diminuta & abolita.	453
11. De Menſium fluxu immoderato.	455
12. De Menſium ſuppreſſione.	459
13. pro Mercurii ſublimate veneno.	464
14. De Meſenterii abſceſſu.	ibid.
15. De Miſſione lactea.	465
16. De Miſſione ſanguinis.	ibid.
17. pro Miſſione puris ad veſica ulcerata.	468
18. pro Miſſione purulenta ex ulcere penis.	ibid.
19. De	



<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
19. De Mola.	469
20. De Morbillis.	470
21. Pro Morbis Chronicis.	472
22. De Morbis gravissimis ex levissimis causis ortis.	ibid.
23. De Morphea.	ibid.
24. Pro Morsu humano.	476
25. De Mydriasi.	ibid.
26. Pro Myrmeciis.	474

*Libri Duodecimi.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>P</b> RO Narium Cancro.	474
2. De quodam per. nares videntes.	475
3. Pro Nattis.	ibid.
4. De Nephritide.	476
5. Pro Nervi punctura acui in digito.	478
6. Pro Nocturnis caloribus.	478
7. De Nyctalopia.	ibid.

*Libri Decimimertii.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Obesitate.	479
2. Pro Obesitate.	480
3. Pro obstructione venarum Meseraicarum.	481
4. De Oculi cicatrice in pupilla.	ibid.
5. Pro Oculi dolore.	ibid.
6. Pro Oculorum hebetudine.	ibid.
7. De Oculorum rubore & dolore.	482
8. Pro Oculi rubore & dolore.	483
9. Pro Oculi macula.	483
10. Pro Oculo perforato.	ibid.
11. Pro Oculi tumore carneo.	484
12. Pro Oculi vulnere.	ibid.
13. De Oedemate.	485
14. Pro Opii veneno.	486
15. De Ophthalmia.	487
16. De Oticulis & aliis rebus gutturi infixis exi- mendis.	491
17. Pro Ossis tutela.	492
18. De Ozæna.	ibid.

*Libri Decimiquarti.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>P</b> RO Palpebrarum scabie.	494
2. De panno.	ibid.
3. Pro pupillis absconditis & latentibus.	495
4. Pro papillarum fissuris.	ibid.
5. De paralyfi.	ibid.
6. Pro paraphimofi.	504
7. Pro paraphimofi Infantium.	505
8. De paronychia.	ibid.
9. Pro parotide è qua calculi exempti fuerint.	507
10. De partu difficili.	ibid.
11. Pro pectoris abscessu.	513

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
12. Pro pectoris conquaflatione ex nimio ponde- re elevato.	ibid.
13. Pro pectoris dolore.	ibid.
14. De pectori vulnere admirando.	ibid.
15. Pro penis ulcere.	514
16. De peripneumonia.	ibid.
17. De pernionibus.	516
18. De pede sponte deciduo.	ibid.
19. De peste.	ibid.
20. De philtris.	539
21. De phlegmone.	541
22. De phlyctænis.	543
23. De phrenitide.	ibid.
24. De phthyriasi.	544
25. De phthisi.	546
26. De phygethlo.	553
27. De phymate.	ibid.
28. De pica.	ibid.
29. Pro pilorum defluvio.	554
30. De pleuritide.	ibid.
31. De podagra.	560
32. De pollicis vulnere.	567
33. Pro pollutione nocturna.	568
34. De polypo narium.	ibid.
35. De porrigine.	569
36. De potu frigidi noxa.	ibid.
37. Pro priapismo.	570
38. De pruritu uterino.	ibid.
39. De pruritu totius corporis.	ibid.
40. De pydrachiis.	571
41. De pterygio.	ibid.
42. De pulmone præciso.	572
43. De pulsuum observatione.	ibid.
44. De pulsu tangendo.	574
45. Pro pupillæ ruptione.	ibid.
46. Pro purgando corpore.	ibid.
47. De purgatione solo odore medicamento- rum.	575

*Libri Decimiquinti.*

<i>Seçtio.</i>	<i>Pag.</i>
1. <b>D</b> E Rachitide.	575
2. De Ranula.	579
3. De Raucedine.	ibid.
4. Pro Renis dolore.	580
5. De Renum ulcere.	ibid.
6. Pro Resolutione crurum à læso dorso.	583
7. Pro Respirationis difficultate.	ibid.
8. De Rhabarbari elogio & usu.	ibid.
9. De Rheumatismo.	584
10. Pro Rhyade.	ibid.
11. De Rosmari penis viribus.	ibid.
12. Pro Ructu.	585
13. De Ruminatione humana.	ibid.



*Libri Decimifexti.*

<i>Seſtio.</i>		<i>Pag.</i>
1.	<b>D</b> E Salacitate.	586
2.	Pro Sanguine compescendo è venis sub lingua sectis.	ibid.
3.	De Sanguine fluxu ex poro.	ibid.
4.	De Sanguinis sputo.	587
5.	De Scabie.	589
6.	Pro Scapularum dolore.	592
7.	De Scyrrho.	ibid.
8.	De Scorbuto.	594
9.	Pro Scorpionis ictu.	598
10.	De Scrophulis.	ibid.
11.	Pro Scroti gangræna.	599
12.	De Secundina derelicta.	ibid.
13.	Pro Semine extinguendo.	605
14.	Pro Serpenti ictu.	ibid.
15.	De Serpigine.	ibid.
16.	De Singultu.	ibid.
17.	Pro Siti intensa.	627
18.	Pro Spasmodis periodicis.	638
19.	Pro Sphacelo.	ibid.
20.	De Sterilitate.	ibid.
21.	De Sternutatione.	613
22.	Pro Stomachi ardore.	ibid.
23.	Pro Stomachi dolore.	ibid.
24.	Pro Stomachi exulceratione.	614
25.	Pro Stomachi imbecillitate.	ibid.
26.	De Stranguria.	615
27.	De Strumis.	616
28.	De Studendi modo.	618
29.	Pro Sublimati veneno.	ibid.
30.	De Suffocatione uterina.	619
31.	De Suffusione.	620
32.	Pro Sugillatione.	622
33.	De Sulphuris Balsamo.	ibid.
34.	De Surditate.	623
35.	De Stupore mortali ab exhalatione nulli recentis.	625
36.	Pro Syncope.	ibid.

*Libri Decimiseptimi.*

<i>Seſtio.</i>		<i>Pag.</i>
1.	<b>P</b> ro Tabe.	626
2.	Pro Tarantatis.	ibid.
3.	De Temperantia.	629
4.	De Tenesmo.	ibid.
5.	De Termintho.	630
6.	Pro Testium inflammatione.	631
7.	Pro Testis scirrho.	ibid.
8.	De Thea.	ibid.
9.	De Theriaca.	632
10.	Pro Thoracis abscessu & fistula.	ibid.
11.	De Tinea.	633
12.	De Tonsillarum inflammatione.	634

<i>Seſtio.</i>		<i>Pag.</i>
13.	Pro Torminibus Infantium.	ibid.
14.	Pro Tremore.	ibid.
15.	Pro Trichiasi.	635
16.	De Tuberculis malignis.	636
17.	De Tumore in genu ex quo aperta puris loco flatus egreditur.	ibid.
18.	Pro Tumore pedum.	ibid.
19.	Pro Tumore suppurato resolutione curato.	ibid.
20.	Pro Tumore ventoso.	638
21.	De Tussi.	ibid.

*Libri Decimioctavi.*

<i>Seſtio.</i>		<i>Pag.</i>
1.	<b>D</b> E Variolis.	641
2.	De Varis.	644
3.	De Vena integra à pulmone reiecta.	645.
4.	De Venæsectione Nerionana.	ibid.
5.	De Venæsectione.	ibid.
6.	Pro Veneficio & veneno.	646
7.	Pro Ventriculi attritione.	ibid.
8.	De Ventriculi calculis.	647
9.	Pro Ventriculi dolore insigni in febre.	ibid.
10.	De Ventriculi imbecillitate.	648
11.	Pro Ventriculi imbecillitate.	ibid.
12.	Pro Ventris doloribus à flatibus in grvida.	649.
13.	Pro Ventris torminibus.	ibid.
14.	Pro Venere languida.	ibid.
15.	De Vermibus.	650
16.	De Verrucis.	653
17.	De Vertigine.	653
18.	Pro Vesicatorii doloribus.	656
19.	Pro Vesicæ ictu.	ibid.
20.	De Vesicæ ulcere.	657
21.	Pro Vesicæ Uteri & hæmorrhoidum summodolore.	ibid.
22.	Pro Vicibus ad eos qui flagris caesi sunt.	ibid.
23.	Pro Vigiliis, & sudoribus diaphoreticis.	658
24.	Pro Viperæ morſu.	ibid.
25.	Pro Visionis debilitate.	659
26.	Pro Visionis debilitate ob maculam.	ibid.
27.	Pro Visus debilitate.	660
28.	De Ulcere.	ibid.
29.	Pro Umbilici apollemate.	668
30.	Pro Umbilici prominentia à partu.	ibid.
31.	De Vomitu.	ibid.
32.	De Unicornu Groenlandico.	672
33.	De Urinæ difficultate, & suppressione.	ibid.
34.	De Urinæ incontinentia.	676
35.	De Uteri Cancro.	677
36.	Pro Uteri dolore intenso ex frigore.	678
37.	Pro	



**Seçtio.**

37. pro Uteri ficiis.  
38. De Uteri furore.  
39. De Uteri hydropo.  
40. pro Uteri procidentia.  
41. De Uteri fcirrho.

**Pag.**

ibid.  
ibid.  
679  
680  
ibid.

**Seçtio.**

42. pro Uteri fuffocatione.  
43. De Uteri ulcere.  
44. De Vulnere.  
45. De Uvulæ elongatione.  
46. pro Vulyæ ruptura ad anum.

**Pag.**

681  
ibid.  
683  
689  
690

**F I N I S.**



# HIPPOCRATES CONTRACTUS

I N Q U O

MAGNI HIPPOCRATIS MEDICORUM PRINCIPIS

OPERA OMNIA


In brevem Epitomen, summa diligentia  
redacta habentur.

*S T U D I O E T O P E R A*

THOMÆ BURNET

M. D. MEDICI REGII,

ET COLLEGII REGII MEDICORUM EDINBURGENSIUM SOCH.



VENETIIS, MDCCXXIII.

APUD HIERONYMUM SAVIONI.

SUPERIORUM PERMISSU AC PRIVILEGIO.



HYPOCRATES  
CONTRACTUS

THE HISTORY OF THE HYPOTHESIS OF THE

OF THE HYPOTHESIS

to prevent Epistemic, and to prevent  
the Hypothesis

THE HISTORY OF THE HYPOTHESIS

THOMAS BURNET

M. D. MEDICAL RESEARCH

THE HISTORY OF THE HYPOTHESIS



VENETIS, MDCCXXII

THE HISTORY OF THE HYPOTHESIS



EDINBURGH THE SEVENTH DAY  
OF AUGUST. 1685.

**F**Orasmuch as there being an adresse made to the Lords of his Majesties Privy Councill, By Mr. Thomas Burnet Doctor of Medicine, Physitian in ordinary to his most Sacred Majesty, and Fellow of the Royall Colledge of Physitians at Edinburgh, in Scotland, Desiring that in regard he hath composed and caused Print a book Intituled *Hippocrates Contractus*, vvhich is approven by the said Colledge, he might have the ordinary priviledge allowved to Authors and Composers of Books.

The saids Lords having Considered the foresaid adresse, doe hereby give and grant the sole priviledge and licence of printing of the said book to the said Doctor *Thomas Burnet*, or his order, for the space of Nineteen years after the date hereof. Discharging all persons vvhatsomever from Printing, reprinting, importing, vending or selling any of the saids books in this Kingdom, vvithout the speciall licence of the said Doctor, or his Assigneyes under the pain of Confiscation thereof to his or their behoove, besides being farther punished as the Councill shall think fit. Extracted by me.

Colin Mackenzie.

Cls. Sti. Conf.

A P P R O B A T I O.

**C**Um Dominus THOMAS BURNETUS Medicinæ Doctor, & Medicus Regius ordinarius Regiique medicorum Collegii apud Edinburgum Socius, librum à se compositum, cui titulus, HIPPOCRATES CONTRACTUS, nobis perlegendum exhibuerit; atque in eo nihil sit, quod bonis moribus repugnet, quin ipsa totius Hippocraticæ doctrinæ medulla in ipso expressa sit, multique proinde usus, cum tyronibus, tum in praxi versatissimis esse poterit, dignum esse censemus, qui typis impressus, in publicam lucem emittatur. In cujus rem fidem subscriptiones nostras manuales apposuvimus primo die Augusti anno Domini 1685.

Robertus Sibbaldus Præses R. M. C.

Robertus Trotterus Censor R. M. C.

Joannes Leirmontius Censor R. M. C.



# PRÆFATIO AD LECTOREM.



licet Macrobius (Lector Benevole) in somnium Scipionis Libro, Hippocratem nostrum tam falli quam fallere nescium aperte pronuncianti, assentiri non possim, neque etiam usquequaque placeat, cum multis, divino virum ingenio Ethnicum appellare, fatendum tamen ultro, summum fuisse Philosophum, summum item Medicum, multorum bonorum nobis Authorem, rarissimi doni virum, semper & ubique laudandum, satis pro dignitate nunquam. Quam fuerit acris ingenii, stupendæ eruditionis, ac judicii subacti, vel inde conicere licet, quod ex parvis & vulgaribus initiis, in magnam artem medicinam provexerit, omnesque Antecessores suos longè superarit, in hunc usque diem à nullo hætenus superatus, licet quam plurimi post eum æterna laude digni extiterint Medici. Gemina enim ejus scripta, quæ temporum injurias huc usque evaserunt, eruditis lectoribus summam semper pariunt admirationem, nec est quod vel ipse Zoilus carpere possit, tam terse, rotunde, eleganter, ac succincte omnia proponit. Vera etiam ut plurimum dicere, qui in artis operibus probè versatur, haud dubie affirmabit. Non mirum ergo quod illum tota dehinc posteritas Medicorum Principem summo suo merito indigitaverit. Præ aliis quibuscumque peritissimum fuisse magnum Hippocratem in prognosi stabilienda, & præsagienda vita & morte, satis indicant aurei & prorsus admirandi prognosticorum & coacarum prænotionum libri: Quam diligens etiam fuerit & curiosus observator omnium, quæ circa ægotantes sunt, rerum, libri Epidemiorum fuisse ostendunt. Liber Aphorismorum tanto ingenio conscriptus creditur, ut existimarint veteres eum omnem vim ingenii humani superare. In morborum curatione adeo fælix, ut Herculem Alexicacum quis jure vocaverit, ferocium & ferarum agritudinem depulsorem ac domitorem. Hanc suam suspiciendam artem, in Græcis servandis, summa benevolentia manifestam fecit, cum peste à Barbaris in Græciam pervadente, demissis per loca convenientia suis discipulis, medelas indicavit, quibus qui uterentur, instantem pestem securè effugere possent: Pro qua gratia Atheniensium Senatus, honores divinos Herculi (ex quo oriundus) æquales, illi decrevit, & corona aurea mille coronatorum cohonestavit. Tanti viri fama & gloria permotus Artaxerxes Longimanus Persarum Rex, illum per Hystanen Hellesponti præfectum, ad exercitum suum morbis Epidemicis laborantem curandum, maximis propositis muneribus, ac honoribus Persarum

Opti-



Optimatibus aequalibus, perhonorificè invitavit, sed ille sorte sua contentus, divitiarum, & honorum contemptor, nec regi regum (ita enim Artaxerxi seipsum vocare placuit) parere, nec Græcorum hostibus optulari voluit. Dignus certe est Hippocrates qui omnium Medicorum manibus continuo teratur, cujus scriptis evolvendis non parvam Medici impendant operam. quem etiam nocturna versent manu, versentque diurna; lectio enim hic vel decies repetita placebit.

Multis ab hinc annis quæ proficua magis, & utilia ex omnibus Hippocratis libris, gravesque omnes sententias in proprium usum excerpti, ut peregre agrorum causa, (quod quandoque fit) proficiscens. Hippocratem facile portatilem præ manibus semper haberem. Hunc parvæ molis librum quem mihi soli diu servaveram, forte conspiciens D. Robertus Sibbaldus Eques auratus, Medicus doctissimus, Collegii Regii Medicorum Edinburgensium Præses dignissimus amicus meus plurimum colendus, ac raptim perlegens, author fuit & suator ut in Thiliatorum gratiam illum publici juris facerem. Multa quidem me ab hoc consilio dissuadebant, quod nimirum socordiam foveret, & ab Hippocratis lectione utilissima retraheret, nec bene ferè ubique audiant aliorum operum abbreviatores, licet plurimi tales de republica literaria quam optime sint meriti, ut facile esset ostendere. His tamen non obstantibus, id mihi tandem passus sum persuaderi. Quod non solum perutilem futuram hanc Epitomen iis existimaverim, quibus quando lubet, ipsum fontem adire concessum (expertus loquor) sed & iis presertim qui Hippocratem domi habere, vel, nolunt, vel, ob rem domi angustam, vix possunt. Multos enim medicos reperire licet (non propterea laudandos) qui medicorum principem vix unquam viderunt, saltem nunquam legerunt; licet omnibus qui Medicinæ nomen dedere, tam familiaris, ac notus debeat hic author esse, quam cuique domus est sua. Hi forsan hoc perbrevis perlecto libello, ad Hippocratem diligenter evolvendum incitari poterunt. Hunc effectum si producat hic noster labor, nec operam nec oleum perdidit. Ubique ferè loca paralela ad marginem notavi. Græcum textum consulto omisi, ne fastidium lectoribus minus in ea lingua exercitaris, crearet, tum ut brevior essem. Speramus benignis oculis æquum lectorem, conatum hunc norum conspexiturum, ac animum publicam utilitatem adjuvandi cupidissimum amice interpretaturum. Vale.



**M**edicinam revocavit in lucem HIPPOCRATES, genitus in Insula Coo Æsculapio dicata. Is cum fuisset mos, liberatos morbis scribere in templo ejus Dei quid auxiliatum esset, ut postea similitudo proficeret, exscripsisse ea traditur, atque ( Ut Varro apud nos credit ) jam templo cremato, Medicinam instituisse. Plinius lib. 29. Naturalis Historiæ, cap. 1.

## Ex Hippocratis vita per Soranum.

Obiit apud Larisseos, ætatis anno 90. ut alii vero octogesimo quinto, alii centesimo quarto quidam etiam centesimo nono: Inter Gyrtonem & Larissam sepultus est. Et in hunc usque diem monumentum ostenditur, in quo multo tempore examen fuit, quod mel conficiebat, quo nutrices infantes superficiariis oris ulceribus (aphthas dicunt) laborantes, apud tumulum illinebant, & facile liberabant in multis imaginibus velato capite pingitur. Duos reliquit filios, Thessalum & Draconem, qui clarissimi fuisse perhibentur.

## Galenus lib. de Theriaca Pisonem, cap. 16.

Summis laudibus prosequor admirandum Hippocratem qui pestem illam ex Aethiopia, ad Græcos, venientem, non alio presidio repulit, quam aerem purum faciendo, ne ab hominibus (qualis tunc erat) infectus hauriretur. Præcepit itaque, ut per totam civitatem ignis accenderetur, qui non solum è simplici materia constaret, sed bene olentes coronas & flores haberet: Talia siquidem ignibus alimenta subministrari consuluit, & ut unguenta quam pinguiissima infunderent, & id genus alia bonum odorem fundentia, ut hoc pacto cives aerem purum inspirantes, ab imminenti lue tuti forent.





# HIPPOCRATES CONTRACTUS.

## SECTIO PRIMA.

*Hippocratis jus-jurandum, ΟΡΚΟΣ.*



Er Apollinem Medicum & Æsculapium, Hygiamque & Panaceam jure-jurando affirmo, me quantum viribus & judicio valuerō, quod nunc juro, & ex Scripto spondeo plane observaturum, Præceptorem quidem qui me hanc artem edocuit, parentum loco habiturum, eique cum ad victum, tum etiam ad usum necessaria, grato animo communicaturum. Ejusque posteros apud me eodem loco, quo germanos Fratres fore, eosque si hanc artem addiscere volent, absque mercede & Syngrapha edoctrum; Præceptionum quoque & auditionum totiusque reliquæ disciplinæ, cum meos & ejus qui me edocuit liberos, tum discipulos qui medico jure-jurando nomen fidemque dederint participes facturum, aliorum præterea neminem. Victus etiam rationem, quantum facultate & judicio consequi poterō, ægris utilem me præscripturum, eosque ab omni noxa & injuria vindicaturum; neque cujusquam præcibus adductus, alicui medicamentum lethale propinabo, neque hujus rei Author ero; neque simili ratione mulieri pessum subdi-

titium ad foetum corrumpendum exhibebo: sed castam & ab omni scelere puram, tum vitam, tum artem meam perpetuò prestabo. Neque verò calculo laborantes secabo, sed magistris ejus artis peritis id muneris concedam, in quamcumque autem domum ingressus fuero, ad ægrotantium salutem ingrediar, omnem injuriæ inferendæ & corruptelæ suspicionem procul fugiens, tum vel maximè rerum venerearum cupiditatem, erga mulieres juxta ac viros, tum ingenuos, tum servos. Quæ verò inter curandum, aut etiam medicinam minime faciens, in communi hominum vita, vel videro, vel audiero, quæ minimè in vulgus efferri oporteat, ea arcana esse ratus, silebo. Hoc igitur jus-jurandum, si religiosè observavero, ac minimè irritum fecero, mihi liceat cum summa apud omnes existimatione perpetuò vitam felicem degere, & artis uberrimum fructum percipere. Quod si illud violavero, contraria mihi contingant.

*Hippocratis Lex, νόμος.*

**O**Mnium artium Medicina nobilissima. Verum propter eorum



qui eam exercent ignorantiam, eorumque qui temerè de his judicant, omnibus artibus jam longe inferior habetur. Cujus erroris ista mihi potissimum esse causa videtur, quod soli arti medicæ nulla in Urbibus, præterquam ignominia, præfinita est pœna, quæ eos qui ex ea constant minimè attingit. Hi tragædiarum actoribus maximè similes videntur, quemadmodum enim illi figuram quidem & habitum ac personam eorum quos referunt habent, illi ipsi autem verè non sunt: Sic & Medici fama quidem & nomine multi, re autem & opere valde pauci.

Quisquis medicinæ scientiam sibi verè comparare volet, eum his duobus voti sui compotem fieri oportet, natura, doctrina, loco studiis apto, institutione à puero, industria & tempore: Imprimis igitur natura opus est, qua repugnante irrita sunt omnia. Si verò natura ad optimam viam commonstret, artis doctrina paratur; quam ex institutione à puero, in loco ad disciplinam probe à natura accommodato, cum prudentia sibi comparare oportet. Ad hæc longi temporis industriam accedere necesse est, quo disciplina veluti gravidata, feliciter & bene crescendo maturus fructus efferat.

Hæc vero cum sacra sint, sacris hominibus demonstrantur, profanis vero nefas priusquam scientiæ sacris initiati fuerint.

#### *Liber de Arte, περὶ τέχνης.*

**E**orum aliquid quæ nondum inventa sunt, invenire, quodque invenisse quàm non invenisse præstiterit, similiterque imperfecta ad finem deducere, id mihi videtur illius esse munus, qui intelligens existimari expetit. Qui verò ea quæ ab aliis sunt inventa, inhonestorum verborum artificio contaminare contendit, neque quicquam corrigit, sed à peritis inventa apud imperitos traducit, is sanè prudentiæ existimationem tueri

velle non videtur, sed potius naturam suam, aut ignorantiam malitiosè prodere.

Medicina est quæ sane in totum à morbis ægros vindicat, morborumque vehementiam obtundit, neque iis qui à morbo victi sunt, manum admovet, cum id medicinam præstare non posse probe constet.

Qui verò ex morientium calamitatibus artem funditus delere conantur, miror quamam satis iusta oratione elati, in morientium intemperantiam causam non rejiciant, sed eorum qui medicinam exercent prudentiam accusant. Quasi medicorum sit, quæ non convenient præscribere, in ægrorum autem facultate non sit aliquid contra imperata admittere. Atqui longe magis est rationi consentaneum, ægros non posse imperatis obsequi, quam medicos ea quæ minimè convenient imperare.

Ejusdem est scientiæ morborum causas nosse, & morbos ipsos omnibus medicamentis, quæ augescere morbum prohibent, curare posse. Medicus siquidem suffecerit ad cognoscendum, sufficiet etiam ad sanandum.

Si verò is, in quo morbus cognoscitur, superetur, ob id sanè quod serius medicum accessit, aut ob morbi celeritatem peribit.

In Medicina valent tum qui in bonis disciplinis liberaliter sunt educati, tum qui à natura non infeliciter sunt comparati.

Si verò res non succedit Medico pro animi sententia, meo quidem iudicio, in morbi vehementiam, non in artem ipsam culpa rejicienda est.

#### *De Prisca Medicina.*

*περὶ ἀρχαίων ἰατρικῆς.*

**S**unt autem opifices alii quidem mali, alii verò multum præstantes: quod sanè minimè contingeret, si prorsus non existeret Ars medica, nihil.



nihilque in ea vel obſervatione, vel inventione conſtaret, omneſque illius ex æquo inexperſi & ignari eſſent ægrotantiumque rebus fortuna præeſſet. At verò nunc aliter hæc ſe res habet: ut enim aliarum artium cunſtarum opifices plurimum inter ſe differunt, tum manu, tum mente, ſic etiam in Medica evenit arte.

In Medicina via inventa eſt, per quam præclara multa longo temporis ſpatio ſunt inventa, & reliqua deinceps invenientur, ſi quis probe comparatus fuerit, ut ex inventorum cognitione ad ipſorum investigationem feratur.

Neceſſitate homines coacti artem medicam invenerunt, quod ægrotis oblata bene valentium victus ratio nihil contulerit. Nemo enim, mea quidem opinione, ad Medicinam inveſtigandam animum applicaturus fuiſſet, ſi eadem victus ratio, & ægris & ſanis accommodata eſſet.

Multa mala & varia ex plenitudine oriuntur, neque verò minus gravia ex inanitione, ut proinde in his maxima inſit varietas, magnaue diligentia requiratur. Modum enim quadam conjectura colligere oportet. Modum autem ad quem iſta referas, ut exactè cognoſcas, nullum alium invenies præter corporis ſenſum. Quocirca iſtud adeo exactè cognoſcere, ut leviter in utramque partem pecces, operoſa res eſt. Quanquam equidem vehementer hunc Medicum laudari qui parum peccet. At exacta certitudo raro cernitur.

Medicorum plerique malorum navium gubernatorum mihi ſimillimi videntur; qui ſi tranquillo mari navem regunt, nemo eos peccare deprehendat, quod ſi eos vehemens ventus aut tempeſtas oppreſſerit, jam omnibus manifeſtè conſtat eorum imperitia & culpa fuiſſe perditam. Ad hunc ſanè modum improbi plerique Medici dum leviter affectos curant, in quibus vel graviffimi errores commiſſi nihil periculi admittunt, (cum multi huiusmodi morbi ac longe fre-

quentius quam graviores hominibus contingant) in iis quidem ſi delinquant, plebeios latent: ubi verò in magnum & vehementem ac periculoſum morbum, inciderint, tum ipſorum ars & errores omnibus ſunt conſpicui. Horum enim cujuſque vindices pœnæ præſto ſunt, neque in longum differuntur. Ejuſmodi naturas quæ celeriter ac vehementer ſuorum delictorum incommoda percipiunt, equidem reliquis imbecilliores eſſe cenſeo.

Rectè mihi videntur illi artem dignam judicaſſe, quæ ad Deum Authorem ex majorum inſtitutis referretur. Nam neque ſicco, neque humido, neque calido, neque frigido hominem lædi exiſtimaverunt, neque horum aliquo ei opuſeſſe. Sed quod in unoquoque potentius eſſet, & ſupra naturam humanam, adeo ut ab ea ſuperari non poſſet, id lædere cenſuerunt, & tollere conati ſunt. In Homine ineſt & amarum & ſalfum, & dulce, & acidum, & acerbum & inſipidum, aliaque ſexcenta, quæ pro copia & viribus varias habent facultates.

*De Medico, περὶ ἱγίης.*

**A**D Medici authoritatem mihi pertinere videtur, ut perſpiciat, quoad ejus natura feret, bene colorato & optime habito ſit corpore. Putant enim plerique hominum, ſi qui minus feliciter corpus diſpoſitum habeant, eos neque aliis rectè conſulere poſſe.

Præterea ejus cultus mundus eſto, veſtis ſit decora, & unguentis utatur benè olentibus citra omnem odoris ſuſpicionem; iſtud enim jucundum eſſe ægrotantibus ſolet.

Eum quoque ſpectare oportet ut animi temperantiam excolat, non taciturnitate ſolum, verum etiam reliqua totius vitæ moderatione: Quod ad illi comparandam gloriam plurimum adfert adjumenti.

Bonis etiam ac honeſtis ſit moribus,



bus, unaque gravitatem cum humanitate conjunctam habeat: promptitudo enim & facilitas medendi effuse oblata, ab ægris contemnitur, quamvis alioquin summæ benignitatis officium illud sit. At considerandum quando his uti liceat; eadem enim apud eosdem cum rara sunt æstimantur.

Quod ad gestum attinet, vultu sit ad prudentiam composito, non aspero tamen, ne superbus videatur & misanthropus. Qui verò in risum effusus est & supra modum hilaris, molestus habetur, quod vel imprimis vitandum est: æquum item in omni vitæ consuetudine se præstare debet.

Turpissimum est per manus operam non assequi quod cupias.

[ Docet insuper quomodo officina Medica instrui debeat, ubi se demittit Hippoc. ad Tyrocinia prima futuri Medici, imo plebeis Chirurghi: veteres enim externa in Medicina discipulos primum exercebant. ]

#### De Decenti Habitu.

περὶ εὐσχημοσύνης.

**A**D incesum eo semper sint habitu, qui non tam ad superfluum curiositatem, quam ad optimam existimationem, prudentiam & animi moderationem comparatur; minime diffuentes aut superflui: in hominum concursibus graves, ad respondendum appositi, adversus altercantes difficiles, in similibus familiaritatibus contrahendis prospicientes, erga omnes moderati, ad emotiones taciturni, ad respondendum arguti, & tolerantes, in occasione prudenter captanda appositi, in victu frugales, & paucis contenti, oratione efficaces, qui quicquid doctrina acceperunt, in medium proferunt, & facultate dicendi utuntur, ad gratiam comparati.

Ad hæc omnia præcipue dux est natura. Etenim si adfuerit his, qui ar-

tibus instructi sunt, ad prædicta omnia aditus erit amplissimus.

Præclara res est, quæ ex opere quod quis didicit, proficitur oratio: opinio maximè in Medicina in crimen vertitur his qui ea utuntur; in calamitatem verò, his qui ejus opera fruuntur.

Ἰντὸς φιλότοπος ἰσόθερος.

Medicum urbanitatem quandam sibi adjunctam habere convenit: Austeritas enim tum sanis tum ægris difficilem accessum præbet: observare autem eum maxime oportet ne multas corporis partes nudet, neque cum plebeiis de rebus multis, sed tantum necessariis, confabuletur.

Quæcunque autem agat, nec perfunctorie nimis (περὶ ἔργως) neccuriosè (μετὰ φαντασίας pompose) agat.

In ingressu meminisse convenit sessionis, demissi habitus, amictus compositi, authoritatis; breviloquentiæ, ut nihil perturbate agas, assessuri, diligentia, contradictionis ad ea quæ occurrunt, constantia in teipso ad tumultus supervenientes, in turbis castigandis severitatis, denique promptitudinis ad ministeria.

Crebro ægram invise.

Medicus in promptu habeat linamenta concerpta, splenia, vincula, medicamenta tum ad vulnera, tum ad oculos comparata, instrumenta etiam, machinas & ferraamenta; alter item sit apparatus simplicior, quo ad manus operam utaris, ad peregrinationes accomodatus. Promptissimus autem est, qui via quadam & ratione comparatur. Malagmatum (i.e. cataplasmatum) quoque genera ad singulos usus præparata habeas, potiones item incidendi facultate præditas, cuique generi accommodatas. Ad manum etiam sint quæ ad Medicamentorum purgationes faciunt, ex locis convenientibus desumpta, eo quo decet modo pro suo quæque genere & magnitudine præparata, tum quæ ad vetustatem diligenter sunt reposita, tum quæ recentia pro temporis occasione in usum veniunt.

Reli-



Reliquaque ad eandem rationem, ut his adornatis, cum ad ægrotum ingressus fueris, nequaquam animo hæreas, cum singula habeas, ad id quod fieri debeat, accommodata.

Priusquam ad ægrotum ingrediaris, fac cognitum habeas quid agendum sit. Pleraque enim non ratiocinatione, sed auxilio indigent; eventa igitur per experientiam cognita, prædicenda. Id enim gloriam adfert, & cognitu est facile.

*Præceptiones. πρὸς τὸν ἐλπίω.*

**T**Empus dicendum est, in quo occasio consistit, occasio autem, in qua tempus non multum. Medicatio in tempore fit, aliquando etiam occasionem requirit. Ne pigeat ex plebeiis scissitari, si quid ad curandi opportunitatem conferre videatur. Sic enim censeo artem universam demonstratam fuisse, quod singula ex fine observata, & ad eadem aggregata fuerint.

Non oportet asseverare quod unum aliquod exhibitum remedium profuturum sit.

Suadeo ut interdum gratis cures, ita ut memoris gratitudinis potiore, quam præsentis existimationis rationem habeas, quod si vel hospiti, vel egeno largiendi occasio se offerat, his vel maximè succurrendum est. Qui enim erga homines humanum se exhibuerit, is artis amore teneri censetur. Multi namque ægri cum sciant se morbo minimè saluari teneri, etiam medici diligentia sanitati restitutos esse celebrare gaudent.

Neque sane indecorum fuerit, si Medicus in rei præsentis angustia circa ægrum versatur, imperitiæ etiam tenebris circumfusus, alios quoque accersiri jubeat, quo communi consilio quæ in rem ægri sunt, disquirantur, & illi ad præsidiorum facultatem operas suas conferant. Ubi enim assidue urget affectio, morbusque increscit, plurima in animi angustia ad rem præsentem opportuna elabun-

tur. Tunc igitur confidenti animo esse oportet.

Hoc jurejurando affirmare audeam, Medicum ratione utentem, alterum nunquam invidiosè calumniaturum. Sic enim animi impotentiam probet. Verùm id promptius faciunt qui forenssem quæstum sectantur.

Ægri diurnam appetentiam erigit indulgentia, quæ interdum morbum fovet.

## SECTIO SECUNDA.

*Continens συνηθητικόν.*

Liber Prænotionum.

*πρὸς τὸν ἐλπίω.*

**M**edicus ad providentiam sibi comparandam omne studium adhibeat. Cum namque præsenferit & prædixerit apud ægrotos, tum præsentia, tum præterita, tum futura, quæque ægri omittunt, exposuerit, res utique ægrotantium magis agnoscere credetur, adeo ut majore cum fiducia sese homines Medico committere audeant. Curandi verò rationem optimè molietur, si ex præsentibus affectionibus, futura prænoverit. Neque enim fieri potest, ut omnes ægroti sanitatem assequantur, hoc namque longè præstantius foret, quam futurorum consecutionem prænoscere. Si quid etiam divini θεῶν in morbis inest, hujus quoque providentiam ediscere oportet.

Hac ratione meritò sibi admirationem & boni medici existimationem conciliaverit. Qui namque morbo superiores esse possunt, eos utique longè rectius conservaverit ex longo antea intervallo ad singula consilium dirigens, tum etiam morituros, tum evasuros, ubi prænoverit & prædixerit, extra culpam positus erit.

In morbis autem acutis imprimis quidem ægroti facies consideranda venit, sitne benevolentium, præcipueque sui ipsius similis, ita enim opti-

*Signa ex facie.*



Coac. 212.  
Facies  
Hippocra-  
tica.

optima erit. Quæ verò simili est contraria, periculi plena est. Qualis fuerit nasus acutus, oculi concavi, collapsa tempora, aures frigidae & contractæ, imisque suis fibris inversæ, cutis circa frontem dura, intenta & arida, & totius faciei color pallidus aut niger, aut lividus, aut plumbeus. Si itaque ineunte morbo talis facies fuerit, neque adhuc ex aliis signis conicere poteris, interrogare oportet, num vigilarit homo, an alvus profusè fluxerit, an inædia & fame laborarit. Quod si quid horum fateatur, minus periculi subesse putandum erit. Dijudicantur autem ista die ac nocte, si ob eas causas ejusmodi facies fuerit. At si nihil horum præcessisse dixerit, neque intra dictum tempus ad dictum statum redierit, in propinquo mortem esse sciendum est.

Ex oculis.

Alia etiam signa considerata, tum ex universo corpore, tum ex oculis. Si namque lucem refugiunt, aut præter voluntatem illachrimant, aut pervertuntur, aut alter altero minor sit, aut ejus albæ partes sint rubræ, aut palpebræ lividæ, aut venulis nigris, si oculorum alba obsita fuerint, aut lippientium oculorum sordes circa eorum aciem appareant; aut etiam assidue mobiles, aut foras projecti, aut vehementer cavi fuerint, vel etiam squalida oculorum acies si sit, & minimè lucida, aut si color totius faciei immutatus fuerit, hæc omnia mala perniciosaque existimanda. Per somnum etiam an ex oculis aliquid subappareat spectare oportet; ubi namque non commissis palpebris ex albo quid subapparet, id si neque diarrhæa, neque medicamentum purgans expresserit, neque ita dormire consueverit æger, pravum id signum est & funestum valde.

Lethale quoque, labra resoluta, pendentia, frigida & exalbida esse.

At ægrum à Medico in latus dextrum aut sinistrum recumbentem deprehendi oportet, manibusque, &

cervice ac cruribus paulum reductis, totoque corpore molliter posito. Hic enim ferè sani jacentis est habitus. Is autem habetur optimus decubitus, qui bene valentium similis est. Supinum verò jacere, manibus, collo & cruribus, valde projectis, minus bonum. Quod si pronus ad pedes de lecto delabatur, magis formidandum. Quod si etiam denudatis pedibus deprehendatur, nec admodum calidis, manibusque, collo, ac cruribus inæqualiter projectis & nudis, malum id est, inquietudinem enim significat. Lethale quoque hianti ore assidue dormire. At in ventrem jacere, ei qui per bonam valetudinem ita dormire minimè consuevit, delirium, aut partium circa ventrem dolorem indicat.

In febribus autem dentibus stridere, ex quibus à puero minimè est consuetum, infaniam & mortem significat; quod si etiam deliranti id accidat, exitiale admodum jam est.

Ulcus quoque sive ante morbum, sive in morbo, natum sit, nosse oportet. Nam si periturus est æger, lividum, pallidum, & siccum ante mortem erit.

De manuum motione ita censeo: in febribus acutis, aut pulmonum inflammationibus; aut phrenitide, aut capitis doloribus, quibus ante faciem feruntur & aliquid frustra venantur, & festucas colligunt, aut floccos è vestibis evellunt, & ex pariete paleas carpunt, ex his omnibus malum & mortem portendi.

Spiratio crebra si fuerit, dolorem significat, aut inflammationem in partibus diaphragmate superioribus; quæ verò magna est respiratio & ex magno intervallo, delirium significat. Frigidus autem spiritus, qui è naribus & ore efflatur, valde est funestus. Facile verò spirare, valde magnum ad salutem momentum existimandum, cum in omnibus morbis acutis, quibus febris conjuncta est, tum in his qui intra dies 40. judicantur.

Coac. 497.

Ex stridore dentium.

Ex ulceribus. Coac. 496.

Ex manuum gestulatione.

Ex spiratione.



Conc.  
572.

Sudores optimi quidem per omnes morbos acutos, qui diebus judicatoriis contingunt, & penitus febre liberant. Boni verò quicunque toto corpore oriuntur, faciuntque ut æger morbum facilius ferre videatur. At qui nihil tale efficiunt, minimè sunt utiles. Pessimi autem frigidi, quique circa caput tantummodo, faciem & cervicem exoriuntur: ii namque cum acuta febre mortem, cum mitiore verò, morbi longitudinem prænunciant. Sudores boni sunt, qui guttatim, & cum exhalatione fiunt.

279.

Hypochondria optima quidem quæ dolore vacant, mollia sunt & æqualia, tum dextra, tum sinistra parte: incensa verò aut dolentia, aut intenta, aut inæqualiter affecta dextra parte ad sinistram, hæc omnia animadvertenda sunt. Quod si etiam pulsus in hypochondriis insit, perturbationem, aut delirium indicat. Verum etiam eorum oculos intueri oportet, si namque oculi crebro moveantur, insania expectanda est.

289.

Tumor vero in hypochondrio durus & dolens, pessimus quidem est, si totum occupet hypochondrium, si vero alterutra tantum pars obfessa fuerit, minus formidabilis erit tumor qui in sinistra regione consistit. Significant autem hujusmodi tumores circa principia mortem brevi ad futuram: quod si neque intra 20. diem febris quiescat, neque tumor subsidat, ad suppurationem res vertitur. His autem primo circuitu etiam sanguinis è naribus fluxus contingit, valdeque juvat; verum eos interrogare oportet, num capite doleant, aut oculorum hebetudine teneantur; nam si quid horum adfuerit, eo sanguis repit. In junioribus tamen, neque dum 35. annum attingentibus, sanguinis eruptio magis expectanda est. Tumores molles doloris expertes, digitisque cedentes, tardiores crises efficiunt, sed tamen minus illis verendi sunt. Quod si intra dies 60. neque febris esset,

neque tumor subsidat, fore suppurationem hoc loco & reliquo ventre significat.

Ventris tumores minus abscedere nati sunt, quam qui in Hypochondriis oriuntur; minime verò qui infra umbilicum in pus vertuntur.

Suppurationum, quæ hinc proveniunt, ea observatio facienda est. Quæ foras vertuntur, optimæ sunt ubi parvæ sunt & quam maximè foras feruntur, & in acutum tendunt: pessimæ vero quæ magnæ sunt & latæ, minimèque in mucronem attolluntur, at quæ intro rumpuntur, optimæ, ubi nihil cum externa sede communicant, in sese contrahuntur, nullo dolore afficiunt, totaque regio externa unius coloris apparet.

Pus vero optimum est album, leve & æquale, & quam minimum graveolens. Huic autem contrarium pessimum.

Aqua inter cutem quæ ex acutis morbis oritur mala; nam neque febre liberat, vehementesque dolores excitat, & lethalis est. Oritur fere ex laterum inanitate & lumbis, partimque à jecore. Quibus igitur ex laterum inanitate & lumbis initia ducuntur, iis pedes intumescunt, & longa alvi profluvia detinent, quæ neque dolores ex laterum inanitate ac lumbis tollunt, neque ventrem molliorem efficiunt. At quibus à jecore hydrops ortum ducit, his tussis & tussendi cupiditas inest, sed nihil effatu dignum expuunt, pedesque intumescunt, ac venter non nisi dura ægreque egerit, & circa alvum tumores fiunt, qui partim dextra, partim sinistra parte oriuntur & desinunt.

Caput, manus & pedes frigere, ventre & lateribus calentibus, malum denunciat; at corpus totum æqualiter calidum esse ac molle optimum.

Ægrum quoque facile converti oportet, & cum sese attollit levem esse. Quod si gravis esse videatur, tum reliquo corpore, tum manibus & pedibus, in angusto spes est.

Præ-

Conc.  
452.

492.

493.



Coar.  
493.

Præter gravitatem verò si ungues & digiti liveſcant, mors confeſſim expectanda eſt. At omninò nigritum digiti, tum pedes minus quam liveſcentes pernicioſi ſunt. Sed alia ſigna conſideranda; ſi enim facilè malum ferre videatur & aliud quoddam ex ſalubribus ſignis adfuerit, morbus ad abſceſſum vergit, ita ut æger morbo quidem ſuperſeſſe, & partes corporis denigratæ decidere debeant.

494.

Teſtes autem & pudenda ubi ſuſum contrahuntur, vehementes dolores, & mortis periculum denunciant.

497.

Peſſimum eſt, ſi neque noctu, neque interdium dormiat, nam aut ob dolorem vigilia adeſt, aut delirii aſſuturi hæc nota eſt.

601.

Alvi dejectio optima eſt, ſi mollis eſt & conſiſtat, eoque tempore quo per ſanitatē deſcendi ſoleat, copia verò ciborum ingeſtorum rationi reſponderit. Quod ſi liquida fuerit dejectio, conſentaneum eſt, ipſam neque ſtridere, neque paucum, & crebrò excerni, frequens enim deſidendi labor ægrum fatigat, eique inſomniam adfert. Si ſæpe & multum alvus feratur, deliquii animi periculum erit. Craſſiorem fieri dejectionem oportet, morbo ad criſin eunte. Sit etiam ſubrufa, neque admodum graveolens. Expedit etiam lumbricos teretes una cum excrementis alvi deſcendere, morbo ad criſin properante. Valde aquoſum aut album, aut pallidum, aut prærubrum, aut ſpumans deſcendi, hæc omnia calamitoſa ſunt. Præter hæc, malum eſt, quod exiguum, glutinoſum, candidum, ſubflavum & æquale exiſtit. His verò magis funeſta ſunt nigra aut pingua, aut livida, aut æruginola, aut graveolentia. Dejectiones variæ majorem quam illæ diuturnitatis ſpem adferunt. Sed tamen non minus ſunt funeſtæ. Hujus modi ſunt, ſtrigmentoſæ, biliolæ, cruentæ, porraceæ & nigrae, ſive ſecedant ſimul, ſive aliæ ab aliis ſegregatæ.

116.

Coar.  
495.

Flatum ſine ſonitu ac crepitu exire optimum. Præſtat tamen cum ſtrepitu prodire, quam iſtic revolvi. Et cum ita erumpit, aut dolere quid hominem ſignificat, aut delirare, niſi fortè ſponte ſua flatum ſic emittendum duxerit.

282.

Hypochondriorum dolores & tumores recentes quidem & ſine inflammatione, murmur ſolvit in ipſo Hypochondrio exortum, idque poſſimum ſi cum ſtercore, urina & flatu prodierit; ſi minus ubi ipſum per ſe tranſmiſſum fuerit, juvat: idque magis ſi ad inferiores ſedes deſcenderit.

575.

Urina optima eſt cum & alba fuerit Hypoſtaſis & levis & æqualis per omne tempus quoad morbus judicatus fuerit: talis enim ad ſecuritatem & brevitatē morbi præclare apparet. Sin talis urinæ intermiſſio quædam ſit ut modo pura reddatur, modo Hypoſtaſis alba & levis ſubſidat, diuturnior quidem eſt morbus, & minus res ægri in tuto ſunt. Sin ſubruba reddatur urina cum Hypoſtaſi æquali & lævi, diuturnioris quidem morbi ea erit, quam illa jam memorata, ſed admodum ſalutaris: Quæ in urinis *καυρώδεις* farinæ craſſioris ſpeciem Hypoſtaſes referunt, pravæ ſunt; his multo pejores ſunt laminæ *πιτυρώδεις* albæ verò & tenues admodum ſunt pernicioſæ; ſed his omnibus magis funeſtæ ſunt furfuraceæ. *πιτυρώδεις* nabeculæ quæ per urinas feruntur, albæ quidem bonæ ſunt, nigrae verò malæ. Quandiu autem fuerit urina rubra & tenuis, morbum adhuc pepaſmi expertem ſignificat. Quod ſi diu talis reddatur, periculum eſt ne vires ægri valere non poſſint, donec urina mitificata fuerit. Inter urinas funeſtiſſimæ ſunt graveolentes, aqueæ, nigrae, & craſſæ. Sed tum viris, tum mulieribus urinæ nigrae peſſimæ, pueris vero aqueæ. Quicunque tenues urinas ac crudas diu excernunt, ſiquidem alia ut convalituris ſigna appareant, his quidem in partibus diaphragmate inferioribus abſceſ-



scellum expectare oportet. Sed & pinguedines supra innatantes araneorum telas referentes, damnare oportet, colliquationem namque significant. In urinis autem quæ nubeculas habent considerandum venit, an superstant, vel subsidant, & quosnam habeant colores: quæ deorsum feruntur cum dictis coloribus bonæ censendæ & commendandæ, at quæ sursum feruntur, malæ & vituperandæ. Neque tibi imponat vesica quoquo modo affecta, si huiusmodi urinas reddiderit, non enim totius corporis, sed ipsius per se indicium est.

556. Vomitus perquam utilis est, qui pituita & bile permixtus est, nec admodum crassus nec multus. Nam meraciores peiores sunt. Sin autem id quod vomitione excluditur porraceum sit, aut lividum, aut nigrum, quamcunque horum colorum speciem referat, in pravis habere oportet. Quod si omnes illos colores idem homo vomitione exhibeat, valde quidem id lethale est. Sed mortem in propinquo esse significat lividus ille vomitus qui tetrum odorem spirat. Nam omnes subputridi & graveolentes odores in iis omnibus, quæ vomitu rejiciuntur, mali sunt.

90. Expecttoratum verò in omnibus morbis qui in pulmones & latera incidunt, citò & expeditè expectorari debet, sputoque flavum valde permixtum apparere; etenim si multo post morbi principium expectoretur aut flavum quid, aut rufum, aut quod multam tussim adferat, neque exquisitè permixtum sit, deterius est. Flavum si sincerum fuerit, periculi plenum est. Quod album est, lentum & rotundum, inutile. Pravum etiam est pallidum admodum & spumans (& viride & æruginosum) at si adeo sincerum fuerit, ut etiam nigrum appareat, id illis deterius est. Malum etiam si nihil expectoretur, nec quicquam pulmo excludat, sed plenus ferveat in gutture.

99. In omnibus pulmonis morbis gravedines & sternutationes tum præire,

tum subsequi, malum. Verum in aliis morbis alioquin funestissimis, sternutationes juvant.

Expecttoratum flavum non multo perfusum sanguine, quod peripneumoniciis ineunte morbo, expectoratur, ad salutem apparet mirificeque prodest. Septimo verò die ac tardius, non adeo securum. Sputa omnia mala sunt quæ dolorem non sedant, pessima etiam nigra ut prius proditum est. At omnium quæ excreantur optima quæ dolorem sedant. Horum verò locorum dolores, qui neque per sputorum purgationes, neque alvi dejectionem, neque venæ sectionem, aut medicamenta purgantia & victus rationem sedantur, eosad suppurationem tendere sciendum est.

Suppuratorum quæcunque bilioso adhuc expectorato suppurant, periculi plena sunt, si illud biliosum per se, si puri permixtum expectoretur: Et potissimum si illud suppuratum ceperit expectorari ab ejusmodi sputo, morbo ad septimum diem progresso; atque eum qui talia expectorat, metus est interitum 14. morbi die, nisi aliquod bonum signum intervenerit. In bonis signis hæc numerantur. Facile morbum perferre, benè spirare, dolorem sedatum esse, sputum sine difficultate rejicere, corpus æqualiter calidum aut molle videri, sine siti esse, urinas, dejectiones, somnos & sudores (laudabiliter fieri) ut ante definitum est, singula supervenire, bona existimanda sunt. His enim omnibus sic contingentibus, fieri non potest ut homo moriatur. Quod si ex his quædam quidem contingant, quædam minus, non ultra 14. diem æger vitam producet. Contra autem ægrè morbum sustinere, respirationem magnam & frequentem esse, dolorem minimè sedari, expectoratum vix tussiendo educi, ardere siti, ipsumque corpus à calore inæqualiter affici, ventrem & latera vehementer calere, fronte, manibus & pedibus frigidis, urinas, alvi



alvi excrementa, somnos & sudores, unaquæque qualia descripta sunt, mala esse nosse convenit. Si quid enim ex his sputo supervenerit, morietur æger, priusquam ad diem 14. pervenerit, aut 9. aut 11. die.

Coac. 402.

Reliquæ suppurationes magna ex parte rumpuntur, aliæ quidem 20. aliæ 30. aliæ etiam 40. aliquæ etiam ad 60. diem deveniunt. Suppurationis initium colliges ab eo die, quo primum æger febricitavit, aut etiam primum rigorprehendit, & si loco doloris pondus quoddam grave sentiat. Hæc enim sunt ineuntis suppurati certissima signa. Quod si in altero tantum latere suppuratio fuerit; tum vertere, tum ediscere ad hæc convenit, num dolor aliquis alterum latus detineat, & num altero calidius fuerit, atque ubi in latus sanum decubuerit, interrogare, si quod ei pondus desuper impendere videatur, sic enim altero latere in quo pondus extiterit suppuratio est. Suppuratos his signis cognoscere oportet, primum quidem si febris non demiserit, sed quæ interdum quidem levior fuit, de nocte gravior evadat; tum verò sudores incidunt multi (circa collum & jugulum) & etiam tussis, tussindique cupiditas iis oboritur, sed tamen nihil tussiendo memorabile expectorant: quin etiam oculi fiunt concavi, ac genæ rubore perfusæ apparent, & manuum ungues fiunt adunci, digiti verò maximeque summi ardore conflagent, & in pedibus tumores fiunt, cibos minimè appetunt, & pustulæ toto corpore oriuntur. Diuturnæ igitur (pectoris & pulmonis) suppurationes his indicantur signis, quibus multa fides habenda est.

402.

Ex suppuratis illi maximè supersunt quos eo ipso die, quo rupta est vomica, febris dimisit, & illico cibos appetunt, ac sitis sunt planè expertes, tum alvus pauca & figurata reddit, tum pus ipsum album est & læve & uniusmodi, & pituitæ expers, tum & si absque dolore & vehementi

tiori tussi expectoretur: qui ita affecti sunt optimè & celerrimè liberantur. Sed (à suppurato) intereunt, quos (à rupta vomica) febris non dimisit, aut si febricitandi finem fecisse videantur, iterato incendio conflagent, & siti ardent, nec ullo edendi amore tenentur, tum alvo sunt profusiore, pus autem viride & lividum expectoratur, aut pituitosum & spumans. Si hæc inciderint, brevi intereunt. Sed quibus horum alia quidem apparent, alia verò non, ex iis quidam intereunt, alii verò in multo tempore supersunt.

Coac. 402.

Quibus verò in peripneumoniacis morbis abscessus incidunt pone aures, & suppurant, aut ad infernas partes decumbit, & fistula excitatur, hi sane supersunt. Huiusmodi abscessus fore intelliges hoc modo: si febris detineat, nec ulla doloris remissio adferatur, nec expectoratum convenienter feratur, nec biliosa alvo secedant, nec facile alvus meracis feratur, nec verò urina profusè reddatur, cum multa hypostasi, atque certa salutis spes ab aliis signis salutaribus affulgeat, tum commemoratos abscessus fore spes est.

395.

Qui in crura decumbunt abscessus a peripneumonia vehementi & calamitosa, præclarè quidem omnes ad salutem faciunt, sed illi optimi qui in expectorati mutationem incidunt. Si verò tumor & dolor suboritur, sputo è flavo in pus versò, & foras prodeunte, hoc modo tum securissimè æger superstes futurus est; tum citissimè citra dolorem abscessus quiescet. Quod si neque sputum rectè excernatur, neque urina bona hypostasi prædita sit, periculum est ne articulo claudicet æger, aut ei multum negotii exhibeatur: Si verò dispareant abscessus & intro recurrant, sputo non prodeunte, & detinente febre, gravis morbi periculum, & delirii, & mortis ægro imminet.

396.

Eorum verò qui à peripneumonia sunt purulenti, se viore magis in-



intereunt, at ex cæteris suppuratio-  
nibus, juniores potius moriuntur.

Lumborum, & inferiorum partium  
dolores qui cum febre affligunt, si il-  
lis relictis septum transversum inva-  
dant, exitiales admodum sunt.

Cum suppurati utuntur, si pu-  
rum pus fuerit & album, nec te-  
tri odoris, convalescunt; at quibus  
subcruentum & cænosum, moriun-  
tur.

*Coac. 471.*

Vesicæ tum duræ, tum dolentes  
grave prorsus, & exitiale periculum  
minantur; maximè autem exitiales  
sunt, quæ cum febre assidua fiunt.  
Nam & ipsarum vesicarum dolores  
ad mortem inferendam satis sunt,  
neque alvi hoc tempore excernunt,  
nisi durum quiddam & coactum. Sol-  
vit autem purulenta mixta urina al-  
bum & leve habens sedimentum.  
Quod si neque cum urina quicquam  
dolor remiserit, neque mollior vesi-  
ca reddatur, febrisque assidua fuerit,  
laborantem intra primos morbi cir-  
cuitus morituum sperandum est. Hoc  
autem morbo potissimum tentantur  
pueri à 7. anno ad 15.

Febres judicantur iisdem numero  
diebus quibus & evadunt & moriun-  
tur homines. Etenim febres mitissi-  
mæ & rutissimis signis conjunctæ,  
quarto die cessant, aut etiam cele-  
rius. Maximè verò malignæ & quæ  
cum signis calamitosi existunt, quar-  
to die interficiunt, aut etiam prius.  
Primum ergo naturæ & morbi certa-  
men sic definitur, secundum ad septi-  
mum diem producit, tertium verò  
undecimo definitur die, quartum ad  
14. producit, quintum ad 17. sex-  
tum ad 20. neque verò ad horum quic-  
quam integris diebus exactè numera-  
ri potest.

Qui ex morbo evasuri sunt facile  
spirant, dolore vacant, noctu dor-  
miunt, aliaque securissima signa ha-  
bent. At perituri difficultate spiran-  
di vexantur, delirant, vigilant, cæ-  
teraque pessima signa habent.

Puerperis à partu crises contin-  
gunt.

*Burnet Parte II.*

Capitis dolores vehementes & per-  
tinaces cum febre conjuncti, si (fu-  
nestum) aliquod signum accesserit,  
valde perniciosi existunt. Si verò  
absque ejusmodi signis, 20. diem do-  
lor excefferit, & febris detineat, na-  
rium profluvium, aut imis in parti-  
bus abscessum fore suspicionem ad-  
fert. Verum dolore adhuc recenti,  
æque profluvium sanguinis aut sup-  
puratum sperari potest, tum alias,  
tum si dolor circa tempora & frontem  
affuerit. At sanguinis eruptio magis  
expectanda venit in his qui nondum  
35. annum attigerunt in senioribus  
suppuratio.

Auris dolor acutus cum febre con-  
tinua & vehementi, formidabilis,  
periculum enim delirii & mortis æ-  
gro adfert: moriuntur autem ex hoc  
morbo juniores quidem homines 7.  
die aut etiam citius, seniores verò  
multo tardius. Nam & febres & de-  
liria minus iis suboriuntur, auresque  
eam ob causam suppuratio præoccu-  
pat. Sed in his ætatibus succedentes  
morbi reversiones plurimos interfi-  
ciunt. Juniores verò priusquam auris  
suppuret, intereunt. Si verò pus al-  
bum ex aure manarit, tum juveni sa-  
lutis spes affulget, si aliud quoddam  
ei bonum signum supervenerit.

*Coac. 189.*

Fauces exulceratæ cum febre gra-  
ve aliquid portendunt, at si aliud  
aliquod signum adfuerit ex his quæ  
antea prava esse censuimus, ægrum  
in periculo versari denunciandum  
est.

Angina gravissima quidem est &  
celerrimè interimit, quæ neque in  
faucibus, neque in cervice quic-  
quam conspicuum facit, plurimum  
verò dolorem exhibet & difficulta-  
tem spirandi, quæ erecta cervice  
obitur, inducit, hæc enim eodem  
etiam die, & 2, & 3, & 4 stran-  
gulat. Quæ verò certæ (anginæ)  
parem doloris vim adferunt, sed ta-  
men intumescunt, & fauces rubore  
suffundunt, perniciosæ quidem  
valde sunt, sed diuturniores iis quas  
jam descripsimus, si ingens rubor  
fue-

363.

364.

365.

B



fuerit. At quibuscunque una fauces, & cervix insigniter rubent, hujusmodi sunt diuturniores. Maximèque nonnulli ex iis evadunt, si cervicem & pectus rubor detineat, neque ad interna erysipelas revertatur. Quod si neque diebus criticis dispereat erysipelas, neque tuberculum ad externas partes prorumpat, nec pus expectorarit, facileque ac sine dolore habere videatur, mortem indicat, aut ruboris reversionem; at securius est tumorem, & ruborem ad externa converti. Quod si ad pulmonem se vertat, dementiam excitat, & ex his nonnulli suppurati plerumque evadunt.

De Fe-  
bribus.

Quibus febres cessant, neque apparentibus solutionis signis, neque diebus judicatoriis, iis recidiva expectanda est. In longa febre, salutariter tamen affecto ægro, si neque ob inflammationem aliquam, nec ob ullam aliam evidentem occasionem dolor detinet, in hoc abscessus cum tumore aut dolore ad articulum aliquem expectandus, maximèque in inferioribus locis. Hujusmodi abscessus magis contingere solent iis qui 30. annum non attigerunt, minimè senioribus.

Si quis in febre non lethali dixerit sibi caput dolere, aut oculorum aciem caligine quadam perstringi, & stomachi dolor accesserit, tum vomitio biliosa adierit; ex iis autem quibus ineunte morbo caput dolere cepit, quarto morbi die magis premuntur, quam quinto; septimo autem remissionem consequuntur. At quibus 3. die dolet caput, hi maximè vexantur die quinto. 9. vero aut 11. liberantur. Quicumque vero quintum diem morbi agentes laborare ceperint, 14. die morbus judicabitur.

At verò quibus in febre caput dolet, & suffusionis caliginosæ loco hebescent oculi, aut etiam ignes micant ex oculis: & cardialgiæ loco, dextra aut sinistra hypochondriorum parte, distentio quædam percipitur doloris & inflammationis expertis, his narium

profluvium vomitionis loco, jam jam adfuturum spes est. Sed juvenibus potius illud expectandum est. Iis verò qui 30. annorum attingunt, & senioribus minus, sed in his vomitiones expectandæ.

Puerulis convulsiones incidunt, si febris acuta fuerit, nec alvus feratur & somni sunt expertes, & terreantur, & eiularint, tum etiam si colorem mutant, ac pallido vel livido, vel etiam rubro suffundantur. Hæ (convulsiones) facile incidunt puerulis nuper natis ad 7. ætatis annum; at grandiores pueri & viri non adeo per febres convulsionibusprehenduntur, nisi vehementissimum & pessimum quoddam signum ex his quæ in phrenitide fieri solent, affuerit. In Lybia, Delo, & Scythia præscripta signa vera comperiuntur.

#### De Humoribus.

περὶ Χυμῶν.

**P**Epasmi tempore fiunt, & vel foras vel intro, aut alio fluunt quo decet.

Quæ socia sunt atque vicina primum & maximè vitiantur.

Quæ ducenda sunt, quo maximè <sup>Aphor. 21. 23.</sup> vergunt, eo per loca convenientia <sup>Sect. 1.</sup> ducere oportet. Quæ prodeunt copia minimè sunt æstimanda, sed quamdiu prodeant, qualia oportet, & æger facile ferat.

Si quæ pars ante morbum laborarit, ibi morbi sedes erit, velut iis contigit qui in Perintho tussi & angina laborarunt.

Humores quibus anni temporibus efflorescunt, nosse oportet, & quales in singulis morbos efficiant, & quasnam in unoquoque morbo affectiones pariant.

Mutationes ex quibus ad quænam fiant considerandæ.

Ut se habet Terra arboribus, ita animantibus venter, alit, calefacit & refrigerat: Refrigerat quidem dum vacuatur, calefacit verò cum im-



impletur. Non secus ac stercoreata Terra, hieme, calida est, ita etiam ventriculus.

Pro anni temporis varietate, similes aut dissimiles erunt morbi, qui hoc tempore oriuntur.

*Aph. 5. Sect. 3.* Ubi æstas veri similis extiterit, sudores in febribus eæque faciles, neque peracutæ erunt, neque linguas vehementer aridas habebunt.

Cum verò ver hibernum fuerit, & extremæ hiemis frigora senserit, hibernietiam morbi fient, & tusses & pulmonum inflammationes & angina. Anni etiam tempora morborum reversiones plerumque afferre solent, sicut & ejusmodi morbos facere.

*Aphor. 5. Sect. 3.* Austri auditus gravitatem afferunt, oculis caliginem offundunt, capitis gravitatem inducunt, membrorum torporem ac languorem faciunt. Cum hic invaluerit, ejusmodi in morbis contingunt, ulcera madentia, os præsertim, pudendum, aliasque partes occupant.

*Aphor. 5. Sect. 3.* Quod si Aquilonia fuerit tempestas tusses fiunt, faucium asperitates, alvi duriores, urinæ difficultates, horrores, laterum & pectoris dolores. Hac prævalente, ejusmodi morbi maximè expectandi sunt.

Æstas bilem gignit, ver sanguinem & alia tempora, ut singulorum fert natura.

*Aphor. 1. Sect. 3.* Mutationes potissimum morbos pariunt, & in anni temporibus magnæ mutationes.

*Aphor. 2. Sect. 3.* Naturarum aliæ ad æstatem, aliæ ad hiemem, bene aut malè se habent, morbi alii ad alia anni tempora bene vel malè se habent; ætates quoque ad tempora & regiones, & victus genera & morborum constitutiones.

*Aphor. 4. Sect. 3.* Regiones ad anni tempora malè affectæ cuius temporis similitudinem habent, ejusmodi morbos pariunt. V.g. inæqualis calor & frigus, si eodem die contigerint, autumnales morbos in regione creabunt; & in reliquis anni temporibus eadem ratio servabitur.

Qui Sanguinem per ora venarum, quæ in Ano sunt, profundere solent, *Lib. 6. Epid. sect. 3. Aph. 27.* si neque pleuritide, neque pulmonis inflammatione, neque Phagædæna, neque furunculis, neque terminthis corripuntur, ac fortè ne lepra quidem, fortassis verò neque vitiliginibus. Intempestivè autem curati multi, non ita multo post hujusmodi morbis correpti sunt, & perniciosè idcirco habuerunt. Quod in reliquis abscessibus contingit, veluti fistulis, quæ aliorum medela sunt.

Impedimento est (Sanguinis missioni) iis qui cruenta expuunt, anni tempus, pleuritis, & bilis. *Lib. 6. Epid. sect. 3. Aph. 31.*

Quibus sub judicationis tempus, juxta aures exorta tubercula minimè suppararint, iis subsidentibus, morbi reversionem fieri contingit.

Quæ sedare solent, cum postea *Aph. 27.* apparent, ea si priùs fiant, liberant.

## De Crisibus.

*wee' nego' ur.*

**S**I suborto sudore, morbus cesserit, & urina fulva, cum sedimento albo conspiciatur, iis eodem die febris revertitur, quæ quinto die sine periculo judicatur.

Quibus in febre minime lethali, capitis dolor est, aliaque signa circumstant, in his bilis superat. Qui primis diebus dolore vexati, 4. & 5. die magis urgentur, 7. die febre liberantur.

Febribus ardentibus si post septimum diem morbus regius succedat, sudoris indicium est.

Judicationem faciunt copiosa mictio, sudor, vomitus, alvi deiectiones, & Sanguinis ex naribus fluxio, mensium item fluxus.

Febre ardente finiente, si morbus regius succedat, non solet ampliùs sudare, neque alibi usquam abscessum facere, sed sanus evadit.

Tertiana ut plurimum 7. circuitibus judicatur. *Aph. 59. Sect. 4.*



*Aph. 54.  
Sect. 4.*

Quibus in molestis febribus, 7. 9. aut 14. die icterus oritur, bonum est, nisi dextra præcordia obduruerint, sin minus, res in dubium venit.

Acuti morbi intra dies 14. ferè judicantur.

*Aph. 36.  
Sect. 4.*

Sudores febricitanti si contingant, 3, 5, 7, 9, 11, 14, 21, & 30. die, hujusmodi sudores morbos judicant, qui verò non sic contingunt, labores portendunt.

Urinarum concoctiones paulatim maturescentes, si diebus judicatoriis concoctæ fuerint, morbum solvunt.

Urinas cum ulceribus conferre oportet. Ulcera namque si repurgando pus album rejiciant, celerem curationem denunciant, sed si ad saniosos humores convertantur, maligna evadunt.

In febribus si urina mutationes habeat, temporis longitudinem indicat, ægrumque tum ad deteriora, tum in alteram partem necessario commutari.

Si urinæ primis minimè similes, sed ex crassis tenues evadant, & omnino tenues, æ difficilem & minimè certam judicationem faciunt.

*Aph. 39.  
Sect. 4.  
Apho. 40.  
Sect. 4.*

Quacunque corporis parte calor aut frigus inest, ibi morbus est; eique celeres in toto corpore mutationes contingunt. Quod si corpus perfrigescat, aut rursus incalescat, colorque subinde mutetur, ista morbi longitudinem portendunt.

Si febricitanti sudor succedat, neque febris desinat, malo est, producit enim morbus, & humiditatem significat. Sano sudor copiosus immodicè contingens morbum portendit, æstate quidem minorem, frigore verò maiorem.

Quibus in alvi deiectione bilis atræ quid subest, si copiosius, maior est morbus, si parcius, minor.

In febribus ardentibus, si morbus regius & singultus quinto die contingat, lethalis est. Morborum reversionibus tentantur, quibus in febricitatis vehementes vigilæ, aut tur-

bulenti somni adveniunt, aut corporis robur solvitur, aut singulorum membrorum doloris adsunt, & quibus febres non accedentibus solutionis signis, neque diebus judicatoriis quiescunt.

Si judicatione facta, urina rubra subsidentiam rubram continens reddita fuerit, his febris reversio eodem die contingit, ex eaque pauci servantur.

Quibus judicationis tempore exorta ad aures tubercula non suppurantur, his solutis morbi reversio pro recidivarum ratione, simili circuitu contingit.

Atrabile vexatis & phrenitide detentis, Sanguinis per venas ani profluvium bonum est.

Qui inter loquendum hæsitant ac balbutiunt, ut nec labris moderari queant, si hæc cessent, purulenti evadunt.

Vehementem in locis inferioribus dolorem surditas solvit, aut copiosus ex naribus Sanguis profluens.

Insania magnum morbum consuetudinem jam familiarem solvit.

Quibus in febribus ardentibus coxendicum dolor est, oculorum perversio, aut cæcitas, aut testium tumores, aut mammarum elevatio, hæc febrem solvunt, aut etiam Sanguinis ex naribus profluvium.

Tremores in febribus delirium solvit.

Febri rigor succedens febrem solvit, & sudorem evocare solet.

Quibus in febribus aures obstruuerint his nisi febris solvatur, furorem contingere necesse est. Solvit autem Sanguis ex naribus effluens, aut alvus biliosa effundens, aut dysenteria, aut coxendicum, aut genuum dolor succedens.

Quibus dolores derepente oriuntur, præcordia sursum attolluntur, si dolores vehementes ad notham costam contingant, his venæ sectio & deorsum purgatio solutionem adfert.

In aqua intercute detentis, si aquosus.

*Apho. 60.  
Sect. 4.*



sus humor per venas in alvum aut vesicam effluat, solutio contingit.

Si leucophlegmatia detento vehemens alvi profluvium succedat, solutio contingit.

Qui alvi profluvio diutius cum tussi detinentur, non liberantur, nisi dolores vehementes ad pedes contigerint.

Capite dolore vehementer affecto, si pus per aures aut nares effluxerit, morbum solvit.

Quibus per sanitatem derepente capitis dolores obveniunt, confestimque vox deficit ac stertunt, intra dies 7. pereunt, nisi febris prehenderit.

Lippitudine laboranti, alvi profluvio detineri bonum.

Convulsione aut corporis distentione vexato, si febris superveniat, morbum solvit. Si febre detentum convulsio prehendat, febris eodem die, aut postero, aut 3. desinit.

### De Diebus Criticis.

περί κριτικῶν.

**A**rtis magnam partem esse duco, posse quæ rectè scripta sunt speculari. Qui enim hæc noverit, iisque utitur, is mihi in arte non multum falli videtur. Unamquamque sanè tempestatem anni & morborum conditionem exacte addiscere oportet, & quisnam morbus bonus, quis periculo conjunctus, aut in temporis conditione, aut in morbo, quinam morbus longus sit & lethalis, longus quinam salutaris, acutus quinam lethalis, vel salutaris. Ex quibus tum criticorum dierum series contemplanda est, tum etiam prædicendi facultas suppetit: Præterea ex his, quibus, & quando, & quamnam victus rationem præscribere oporteat, cognoscere licet.

Burnet Parte II.

### Prædictorum Liber primus.

Προφητικὸν α.

6. **E**X creatio frequens & irrita, si quidem aliud quoddam signum affuerit, phrenitidem portendit.

Coac.  
244.

8. Desipientiæ quæ jam admodum fractis & debilitatis viribus, succedunt, pessimæ sunt, non secus ac Thrasynonti.

13. Albicans dejectio in phreniticis mala est. His si rigor contingat pessimum.

91

14. In furiosa & vehementi mentis emotione, succedentes tremores malignitatem denunciant.

93

16. Phrenitici parum bibunt, ex levibus strepitibus facillè irritantur ac percelluntur, tremuli sunt.

96

18. In febre ardente, si tinnitus aurium, cum visus hebitudine fiant, & ad nares accedat gravitatis sensus, furiosa mentis emotio indicatur.

23. Vocis defectiones cum singultu & virium.

24

24. Exolutione, pessimæ.

44. Ab homine moderato ferox & audax responsum, malum portendit.

38. Ubi alvus humescit, æger lassitudine, capitis dolore, siti, vigiliis torquetur, obscure loquitur, & admodum est impotens, in his casibus vehementem mentis emotionem expectare oportet.

52. Quæ perniciem minantur, ea si absque ulla significatione allevant, mortis periculum denunciant.

56. Ex Hypochondriorum doloribus, abortivæ Febres malignæ sunt.

58. Sudor in febribus acutis multus & copiosus damno est.

65. Ex rigore perfrictiones quæ ad calorem non revocantur, malæ sunt.

70. Dolor in pectore fixus cum torpore, malum denunciat, hi si suborta febre exæstuent, celeriter moriuntur.

97. Lateris dolor cum biliosis sputis præter rationem evanescens, æ-

418.

B 3 gros



gios in vehementem & furiosam mentis emotionem agit.

106. Lumborum & capitis ac oris ventriculi dolor, cum forti excretionem convulsionem suspectam facit.

107. Non nihil metuendus est cum crisi rigor.

Coac. 29.

110. In iis quibus rigores imminet, urina resistat, & in convulsoriis affectionibus.

## Prædictorum Liber 2.

Πρόρρητιχόν β.

**A**Ntequam morbus consistat secura non est prædictio.

De Hy.  
drop.

Qui aqua intercutem detentus est, & servari volet, eum robustis visceribus & contentis viribus esse convenit, simulque suapte natura facile concoquere, ac bene spirare, sine dolore esse, totumque corpus æqualiter calere, neque extremis partibus esse colliquefactum, præstat namque potius extrema tumefacta esse, etsi optimum est nihil horum adesse. Verum tum mollia, tum gracilia extrema esse oportet, ventrem contactu mollem. At neque tussim neque sitim adesse convenit, neque linguam, cum alias, tum ne à somno quidem, inarescere. Cibos autem suaviter assumere, ac ubi abunde comederit, nihil affligi. Ventrem quoque medicamentis celeriter moveri, alias vero mollia & figurata excernere. Urinam in transitu pro instituta victus ratione & vinorum mutatione, mutationem sentire. Defatigationem facile sustinere, nec lassitudinem sentire. Si horum omnia vel plurima habeat, spes est ut evadat. In quo verò nihil horum inest, sed contraria adsint, parum relictum est spei.

De Tab.

Quem tabes malè habet, si probe levare volet, convenit sputum facile tussi rejicere, esseque album & æquale, unius coloris, & sine pituita. Quod à capite defluit ad nares vertatur, neque febris prehendat, ut nec cibos impediat, neque sitim faciat.

Alvus autem quotidie dejiciat, & quod secedit durum esto, & iis quæ assumuntur conveniens. Hominem quam minimè tenuem esse convenit. Pectus verò laudandum quadratum, & hispidum, cujusque cartilago exigua & admodum carnosa est. In quo namque hæc omnia inerunt, is maximè superstes futurus est. At qui nihil horum habuerit, exitio maximè est affinis.

Minimè evadunt tum virgines, tum mulieres, quibus ex menstruorum suppressione tabes contingit. Quod si ex his aliqua superesse volet, cum multa laudabilia signa accedere, tum verò menses luculenter & manifestè comparere oportet. Alioqui nihil spei relictum est.

Ex Sanguinis eruptione maximè supersunt, quibus in dorso & pectore dolores adsunt melancholici, & ex Sanguinis eruptione dolore quodammodo levantur.

Inter Podagricos qui in senectute tophos aut callos in articulis induratos habent, aut laboriosè vitam tolerant, cum alvo sicca, humana arte hi sanari nequeunt. His succedentes dysenteriae optimè medentur, quin & quæcunque aliæ colliquationes infernæ eos valdè juvant: Juvenis verò, cui nec dum circa articulos calli induruerunt, cuique victus ratio curæ est, ad laborem est impiger, alvumque habet vitæ instituto probè respondentem, is sanè prudentem natus medicum sanus evadet.

Prægnantes ipsæ plerumque ad partum supersunt, foetumque conservant, etiamsi per multos menses Sanguis & strigmenta per alvum secedant.

Mulieres parvæ grandioribus ad conceptum præstant, tenues crassæ, candidæ rubris, nigræ liventibus: Præstant item quibus venæ extant, iis quibus minimè apparent.

Locus conceptui idoneus, quem uterum nominamus, sanus esse, & siccus & mollis debet, ac neque contractus, neque proclivis, neque ore di-



distorto , aut compresso , aut diducto . Etenim quicquid horum contingerit , conceptum fieri impedit .

Ubi ulcus in utero sanatum est , locus iste lævior ac durior necessario efficitur , & minus conceptui idoneus .

Qui diu pallidi faciem habent tumidam , eos certum est , aut capitis , aut viscerum dolore laborare , aut sedem internam quodammodo male affectam esse .

Quibus lienes magni , iis gingivæ vitiantur , & os graveolet : Quibus autem lienes magni sunt , neque Sanguinis eruptiones contingunt , neque os graveolet , in tibiis ii mala ulcera habent , & nigras cicatrices .

Humerorum dolores qui ad manus tendunt , torporesque , & dolores exhibent , bilis atræ vomitione sanantur .

### Coacæ Prænotiones .

Κακὰ προσηύδα .

### Titulus Primus .

#### De Febris .

**Q**ui ex rigore perfrigent & una dolore tum capitis , tum cervicis impliciti , mox voce capti , parvo sudore madent , ut se collegerint , moriuntur .

4. Ex frigore cum adest metus & mæror præter occasionem , convulsione finis fit . ( Nisi hæmorrhoidibus , varicibus , aut etiam menstruali profluvio , convulsione causa tollatur . )

5. Ex frigore pestifera est urinæ suppressio . ( ante rigorem præclaret apparet ischuria , & in bonis habetur , sed non è converso ; non enim signa critica & causæ criticæ retro commeant ad significandum . )

6. In rigore familiares non agnoscere , malum ; oblivio item mala .

7. Posteriorum partium frigus est convulsificum .

10. Qui crebrò & tenuiter exudant *ἐκσπνέτες* , ac subinde rigent , ii perniciosè habent , ac tandem sub mortem supputati , & alvum turbatam habereprehenduntur .

8. Crebri ex lumbis vel dorso horrores , cum cita caloris vicissitudine , calamitosi , nam acerbissima urinæ suppressio denunciatur : Atque his exudare pestiferum . ( Ex eo quod deductum alimentum elabatur ; signum enim est Empyematis cum summa virium infirmitate conjuncti . )

14. Rigores multi cum torpore malignum denunciant . ( Ob summam humorum inæqualitatem , quæ valde exitiales morbos parit . )

15. Rigores qui in sextum diem incidunt , difficile judicium adferunt .

[ Permagni interest quo die , quæve periodo , quid fiat in ægris , atque appareat . Utenim quæ sunt omnia , quæque apparent diebus criticis , firmiora sunt , quam quæ in alia incidunt morbi tempora : Sic ea quæ speciem boni præ se ferunt , debent haberi suspecta si loco non fiant . Quemadmodum & ea quæ mala esse putantur , mirificos adferunt sanitatis fructus , si ante significata criseos lege veniant , aut illis diebus quibus certamen naturæ & morbi est in prociuctu . ]

17. Dolores horriferi cum suspicioso anhelitu , signa sunt tabis .

20. Qui subindè rigoreprehenduntur , & sub noctem aliquando gravius habent , pervigiles , in somnis nugantes ac delirantes , interdum sese lotio perfundentes , in convulsionem ii tendunt .

21. Qui crebrò cientur in acutis rigores pestiferi . ( Quod sint *πρίσταν* *μη πρίσταν* . Indicant aut interni visceris suppurationem , aut frustra tentatam crisin , aut denique nativum calorem extinguere . )

23. Rigor cum posteriorum partium distentione mortem adfert .

24. Si cui cum perhorruerit , atque

B. 4. su.



sudarit critice, rursus postmodum hor-  
ror sine causa ingruerit, ac tum à pe-  
pasmò somni sit expers, huic eventu-  
ram arbitror hæmorrhagiam.

Duretus.

[ Huc spectat hæc difficillima  
prognosis, ut intelligamus, non raro  
varias esse morborum crises, quæ ad  
salutem varie suscipiuntur, pro variò  
humoris motu, naturæ impulsu, &  
partium obsessarum conditione: Quæ  
omnes sæpe numero denunciantur  
una eademque concussione, cujus-  
modi in rigore cernitur. Est consen-  
taneum, ut sua cujusque foci sit pro-  
pria evacuatio, capitis per hæmor-  
rhagiam, venarum per liberalem su-  
dorem, uteri per menstruale proflu-  
vium, omnis spes Medici, & cœptæ  
curationis fiducia, in sola evacuatio-  
ne semper stetit. ]

Proverb.  
155.

25. Quæ cum rigore sistuntur uri-  
næ, sunt praviæ & convulsivæ, id-  
que cum alias, tum si cui jam sopor-  
ato sistantur, ac tum præterea paro-  
tidas fore sperabile.

27. Quæ ex rigore incidunt apho-  
niæ, tremore solvuntur; sed & su-  
pervenientes crebrò rigores, succe-  
dentes tremores judicant.

28. Qui ex rigore virium exolu-  
tiones & capitis dolores sentiunt,  
pleni sunt periculi: Cruenta his uri-  
na prava.

Pro-  
110.

29. Quibus rigor, urina subsistit.

36.

31. Ex hypochondriorum dolore  
abortivæ febres, malignæ sunt: In his  
sopor profundus ac altus pessimus.

32. Qui in febre non intermittente  
tenuiter & crebrò exudant, cum hy-  
pochondrii tensione, ii ut plurimum  
malignè habent. Atque in his dolo-  
res ad acromium ac jugulum affixi  
pravi sunt.

Duretus.

[ Ex sudatiuncula, nulla crisis  
bona sperabilis; quia nihil paucum  
criticum. Est autem sudatiuncula ca-  
pitis & cervicis, aut sudor exiguus  
quo fit subroscidum totum corpus:  
Unde vel oppressio partium, vel sum-  
ma infirmitas significatur, per quam  
exudat succus alibilis, qui assimila-  
tione privatur. ]

34. In febre *αυαυδία*, defectiones  
sermonis malum.

36. Si quis cum febre laboriosa  
perhorruerit, nonnihil criticè exu-  
darit, indeque ardentè febricitarit,  
malum, idque cum alias, tum si in  
hoc negotio Sanguis stillarit.

40. Qui ex rigoribus, parvis sudo-  
ribus refrigescunt, malum.

42. Qui exiguo sudore madent  
cum febre, in metu sunt mortis.

43. Quibus cum biliosa dejectio-  
ne, premitur morsu pectus (i. e.  
orificium ventriculi) amarescitque os,  
malum.

45. Si quis in laboriosa febre, sin-  
gulat, vel catoche detineatur, mor-  
bo laborat pessimo.

47. Si quis ea faciat, quorum sit  
insolens, ut si appellat animum ad  
insueta, aut contra, gravissimum  
habet malum, ac tum delirium ad-  
est.

48. Quæ cum pravis signis mite-  
scunt, & quæ cum bonis non remit-  
tunt, molesta sunt & difficilia.

Proverb.  
52.

[ Quemadmodum non minùs sua  
debet habere bona suspecta, qui re-  
pentè factus est coloratior & specio-  
sior; quam mala vereri, qui contra  
consuetudinem multum emacruit, &  
colorem decoremque amisit: Ita ne-  
mo est omnium qui de seipso possit  
videri securus, si antè vigil, nunc  
soporetur, si antè sitibundus, nunc  
*παραλόγως*, superstitè causa sitife-  
ra, sitis sit expers. Pluris esse de-  
bet unum pravum signum morbi a-  
licujus, aut partis obsessæ pro-  
prium, quam decem bona commu-  
nia.

Duretus.

51. In homine moderato, ferox &  
audax responsio, & vox acuta, ma-  
lum: Hypochondria iis intro sur-  
sum trahuntur.

Proverb.  
44.  
45.

52. Qui ex sudoribus perfrigeran-  
tur, ac celeriter recalescunt, male  
habere judicantur.

E 66.

54. Qui abs re nec ulla exhausti-  
ratione, languent infirmi, mortiferè  
laborant.

40.

55. Diuturna in febre nausebunda  
pro-



proratio, ſcreatu ſiniens, malum portendit.

57. Perpuſillæ Sanguinis è naribus ſtillæ, damno ſunt.

DIRECTUS.

[ Niſi hæmorrhagiæ liberalioris opinionem faciant, ut ſæpè faciunt, quando cum urinæ pepaſmo in quartum diem incidunt, apparentque ad hæmorrhagiam ſeptimo die futuram: Secus enim malignos vel multos humores naturæ dominatu regi non poſſe, aut infirmitatem ſummam ipſius naturæ denunciant. Sunt verò ſiniſtri iudicii in qualitate bona Sanguinis, at mortiferæ in mala, qualis in Philiſco ſtillatim manavit. ]

PROTIB.

57.

58. Omnino malum denunciat, quæ in febre acuta inæmeritò *παρελογως*, præter rationem ſitis extincta eſt.

59. Qui ad manus contactum reſiliunt, malo ſunt loco.

EFUS.

[ In ægris iſtud diligenter eſt obſervandum: Aliquando enim ubi manus in carpum mittitur, quodammodo reſiliunt, & cum intremiſcentia revelli videntur, aut interdum ad pulſum aſſilire & leviter aſſurgere. *Αἰματωρτες προς χερς*, dicuntur quibus pulſus velut reſilit, aut quaſi tremibundus ſubſultat, & ad manum apparet exiguus tremor. Fit hoc nervis & fibris febris incendio exſiccatis, motrice facultate infirma, viriumque languore concurrente. Convulſionem ergo, delirium, aut phrenitidem prædicit, nec leviter ſuſpectum eſſe debet. ]

PROTIB.

54.

65. In febribus vehementes mentis emotiones *εὐσάτης* cum ſilentio, in eo qui voce non eſt captus, perniciem minantur.

h. 22.

l. 4.

68. Febrium initio, ſi atra bilis ſuſum aut deorſum prodeat, lethale eſt.

DIRECTUS.

[ Excretionum quæ in vitio ſunt, quæque dominatu morbi ſuſcipiuntur & ſunt, nulla eſt omnino tam mortifera, quam bilis atræ. Eſt enim atra bilis peſſimum excrementum, quod feritate indomabili cæteris omnibus antecellit, triaque illa ſecum habet conjuncta, quæ vim naturæ

adferunt, quæque illius præſidia maximè labeſactant. *Γδ δεινὸν, το δεινὸν τικόν, ἢ τὸ οἷονδες*. 1. acre, erodens, acidum. ]

72. Quibus jam morbo fractis, videndi vis audiendique perit, aut etiam labiorum, palpebrarum, vebnarium perversio cernitur, mors inſtat.

74. In febribus acrifæ, diuturnitatis quidem ſunt cauſæ, non tamen funeſtæ.

78. Quibus poſtridie quam invaſit, exacerbatio febris eſt, malè res eunt. At ſi perendiè mitius, quarto iniquius exerceantur, graviffimum habent malum.

80. Febres ſi alio die quam judicatorio deſierint, recidivam metuere oportet.

83. Qui cum feroci perturbatione ſomno excuſſi, è poteſtate ſui exeunt, graviffimum habent malum, & convulſificum: Idque cum alias, tum ſi prorumpant ſudores.

[ Ut rerum omnium quæ naturæ ad perſuendum tributæ ſunt, nihil eſt melius, nihil amicius, nihil denique magis conſociale, quam illa quies, quæ dono Divum gratiffima ſerpit: Ita nihil, æquè peſtiferum quam moleſta vigilia: Quemadmodum enim ſomnus ægrotum reficit, & recreat ſpiritum inſtauratione, ciborum coctione, & morbiſicorum humorum pepaſmo, unde phrenitis manueſcit: Sic admirabile eſt quantum principiis trium facultatum labem adferat, quantum naturæ præſidia labeſactet, quantisque damnis ipſos ægrotos oneret, ſi quid vel in cauſis ſomniferis vel in ſomni ipſius neceſſitate peccetur. ]

DIRECTUS.

90. Quæ in phrenitide memorantur inſomnia, bonum denunciant. (Non turbulenta & tumultuoſa, ſed placida & tranquilla.)

PROTIB. 5.

97. In intenſa phrenitide, tremores lethales.

98. Quæ circa res neceſſarias verſantur Deliria, peſſima, indeque ſi ingraveſcant, mortifera.



114. Quibus per febres assiduas pustulæ toto corpore suboriuntur, mortiferum illud est; nisi purulento abscessu, qui hic potissimum ad aures erumpit, periculo defungantur.

115. In febre acuta, exteriora perfrigerari, interiora verò sic urî, ut etiam sitim faciant, exitium portendit.

116. Febres continuæ tertio quoque die ingravescentes, supra modum periculosæ.

117. Qui diuturno defuncti morbo, ex animi Sententia cibum capiunt, neque proficiunt, gravissimè relabuntur.

118. Si venæ temporum in febribus pulsant, & facies benè habita fuerit, absque hypochondrii mollitie, diuturnus erit morbus, qui non sine liberali Sanguinis è naribus profusione, aut singultu, aut convulsione, aut coxendicum dolore desinet.

119. Alvus in febre ardente affatim prorumpens, mortis periculum adfert.

120. Sanguinis ex naribus fluxus in febre ardente quarto die obveniens malò est, nisi aliud quidpiam benè ceciderit. Quod si die quinto contingat, minus adfert periculi.

121. De febre ardente laborantibus dies 14. aut allevando, aut perimendo decernunt.

122. Si cui febricitanti rubor in facie luceat, unaque capitis dolor prægrandis, & venarum emicet pulsus, ferè profluvium Sanguinis è naribus inde venit. Quibus autem fastidia stomachi, cordis morsus, & crebræ salivæ, in procinctu vomitio est: Quibus autem ructus adsunt, flatus ventris, sonitus cum inflatione, iis alvus exturbatur.

( Magna expectatio est hæmorrhagiæ criticæ in morbis acutis, quam si neque Medicus prævidere, neque prævisam, cum in propinquo est, velut digito indicare potest, vix videtur summam vituperationem posse vitare. )

123. Quibus autem sæpius recidi-

væ contingunt, si sextum mensem superaverint, in tabem coxariam ferè incidunt.

124. Febricitate incipientibus Sanguinis è naribus stillicidia cum sternutatione accedentia, siquidem urina quarto die hypostasim habeat albam, vacationem morbi septimo fore ostendunt.

125. Quæ in febrem cadit convulsio, si eodem die, quiescat, benè est.

## Titulus secundus.

### De Cephalalgia.

126. Qui capitis doloribus & aurium tinnitibus, citra febrem, aut tenebricosa vertigine, & vocis tarditate, manuumque stupore tentantur, in iis aut apoplexiam aut epilepsiam, vel etiam lethargum sperare convenit.

127. In cephalalgia æruginosi vomitus cum surditate & somni vacuitate, insaniam brevi denunciant.

Proph.  
10.

128. Quibus capitis & cervicis dolor, ac totius corporis infirmitas quædam cum tremore adest, ab his hæmorrhagia liberat.

152.

129. Cephalalgiam tollit pus è naribus effluens, aut sputa crassa & inodora: Liberat quoque & ulcerum eruptio, nonnunquam & somnus, & alvi fluxus.

130. Cephalalgia veteriosa cum gravitate ferè convulsifica est.

131. Cephalalgici surdastri, qui manibus contremiscunt, cervice dolent, nigra & aspera meiunt, ac nigra quoque vomunt, planè sunt desperati.

95.

132. Quibus cum sudatiuncula caput dolet, alvo suppressa, convulsione tentantur.

## Titulus tertius.

### De Caro & Comate.

133. Comate, lassitudine, ac surditate tentatos, alvus erum-



erumpens, & ad crifim rubra demittens juvat.

183. Comatofi, faftidiosi, unaque dolenter hypochondriaci, faepe & parum vomentes, aurium abfcefus habent.

187. Cerebro fiderato, alii quidem tertio die, alii autem feptimo vitam finiunt, quibus elapsis periculo defunguntur; fin autem incifione facta, os difsociatum cernitur, fine dubio moriuntur.

188. Cephalalgicis ex calvariae pofticae fractura, fi craffior e nare Sanguis rivulose prorumpat, grave malum denunciat.

*Duretus* ( Ictus illatus non minus offi craffiffimo calamitofus eft, quam mitior ictus temporibus atque fronti. Accedit, quod Sanguis niger proruptus & fpaceliffimi metum adfert, & cerebro crudorem & vivacitatis extinctionem inducit. )

#### Titulus quartus.

##### De Aurium affeclibus.

189. **A**urium dolor intenfus cum febre acuta, cumque finiftro quopiam figno, juvenes quidem feptimo die, aut etiam celerius, cum delirio interimit: Nifi liberale fit expuratum ex aure, aut ex naribus haemorrhagia, aut aliud quoddam laudabile fignum extiterit. Seniores autem & ferius & rarius tollit; nam in his aures ante fuppurant, & delirium minus infeftat, fed tamen ple- rifque horum morbus revertit, & fic moriuntur.

*Prorrh.* 33. 190. In acutis & turbulentis ( i. e. cum delirio ) morbis obveniens furditas, malo eft. Quin & in longis morbis malum portendit: Ac in his ad coxendicis labores convehit.

*Duretus* 191. In febre furditas alvum fiftit. ( Hujus furditatis caufa in meatus auditorii oppilatione confiftit, fuperioris vero in exolutione partis illius cerebri, unde vis audiendi manat. Proptereaque ut illa per fe infanabi-

lis eft, ita morbi acuti turbulentique confeclaria desperationem falutis oftendit. )

193. In acutis morbis murmur edentes ac tinnientes aures, mortem praenunciant.

( Quod nec judicatorii fint nec judicantes, & nobiliffimae partis exolutio oftenditur ab exolventis caulae perennitate. )

194. In calidis febribus fonori aurium flatus cum vifus hebetudine & narium gravitate, Sanguine non prorumpente, e potestate mentis abducunt.

195. Quibus aures obfurduerint, cum capitis gravitate, hypochondrii tenfione, & fplendoris offenfione, Sanguis e naribus prorumpit.

197. Egregie furdi, dum aliquid apprehendunt tremuli, lingua etiam capti & exoluti *καθαρ* graviffimum habent malum.

#### Titulus quintus.

##### De Parotidibus.

199. **Q**uae cum dolore affurgunt ad aures ( parotides ) perniciem minantur.

200. In febribus ex praegreffo dolore ( fecundum Duretum exacto jam morbo ) rubores ad aures fubnafcentes ( parotides Dureto ) figna funt eryfipelatis in facie nafcitur, quin & convulfiones cum aphonía & exolutione, ad haec confequi par eft.

[ Morborum naturam & caulas tenere, eft hoc fane aliquid, vel potius multum; at fuccelliones morborum quo fe illi vertant, veluti e fpeculo praevidere, profecto eft artificis fulgore fuo urentis, artesque infra fe pofitas praegravantis. ]

202. Parotides pravae funt Paraplecticis.

203. Parotides ( in acutis ) fuppurati expertes, funeftae, fed forfan his alvi feruntur.

204. Parotides emolliunt tufficulae cum ptyelismo orfae.

205.



205. In parotidibus urinæ citò & paulisper mitigatæ, (i. e. modo pe-  
pasmii particeps modo expertes) pe-  
stiferæ; & quæ hujusmodi est refri-  
geratio, pessima.

Duret.

[ Quia vicissitudo est magisterii  
inter naturam & morbum, qui ut vi-  
res acquirit eundo, sic naturæ fati-  
scentis præsidia labefaciat. ]

206. In Diuturnis ( Dureto acu-  
tis ) morbis suppurati ad aures tumo-  
res, nisi pus admodum album, ac  
sine odore reddant, interimunt, po-  
tissimum verò mulieres.

Duret.

[ Erit profecto catholicum hoc  
theoremata quod unde salus vitæ spera-  
bilis, inde salutis desperatio esse de-  
bet, si id meritò naturæ non fiat. ]

207. Inter acutos parotides potissi-  
mum in causis assurgunt, ac tum si  
febrem lege critica non expellant, nec  
ipsæ coquantur, nec Sanguis funda-  
tur è naribus, nec verò urinæ cras-  
sam excipiant hypostasim, moriun-  
tur: Sed abscessus ejusmodi non rarò  
ante residunt. *Ατρυμὸς* scilicet, &  
*ἀνεπίτως*.

Proverb.  
141.

208. Si ad surditatem atque torpo-  
rem substillum accesserit narium,  
aliquid sinistri præ se fert.

159.

209. Ex surditate tubercula ad au-  
res exoriri consentaneum est.

210. Surditatem ex febribus na-  
tam solvit profluvium Sanguinis è  
naribus, alvique commotio.

### Titulus Sextus.

#### De Facie.

Lib. de  
diebus  
criticis.

211. **F**acies è tumescente residens,  
vox item blandior & mol-  
lior, tum Spiritus rarior atque faci-  
lior, remissionem postridianam fore  
denunciant.

Progn.

212. Facies cadaverosa mortifera.  
Sed ea minùs tamen quæ ob vigilias,  
inædiam, aut ventris solutionem e-  
jusmodi est. Atque talis corruptio  
his de causis orta, uno die finitur.

Proverb.  
49.

213. Egregie colorata facies & te-  
trica ( vultuosa ) in morbo acuto,

pestifera, insuper frons contracta  
phrenitidem denunciat.

214. Benè colorata facies cum su-  
doribus diffluentibus, absque febre,  
fæces vetustas subsistere, aut irregu-  
larem diætam testantur.

### Titulus septimus.

#### De Oculorum Affectionibus.

219. **I**N febre ortus oculorum ru-  
bor, diuturnam ventris af-  
flictionem denunciat.

220. Erumpentes circa Oculos e-  
minentia, dum refectioni opera da-  
tur ( seu ex morbo ægri recreantur )  
alvum prorupturam ostendunt.

222. Lippitudine affecto suborta  
febris solutionem affert, sin minus  
cæcitatatis, aut mortis, aut utriusque  
periculum est.

223. Quibus cum lippitudine ca-  
pitis dolor accedit, & longo tempore  
perseverat, cæcitatatis metus impen-  
det.

224. Lippitudine laborantem spon-  
te alvus profluens juvat. Proverb.  
113.

226. Oculorum hebetudo *ἀνεπίσπαστος*  
cum animi defectione etiam convul-  
sionem denunciat. Spiritu animali  
dissipato & nervorum principio læso.

### Titulus octavus.

#### De lingua, & reliquis oris partibus.

229. **L**ingua circa initia quidem ri-  
gidiuscula, in eodem verò  
colore perseverans, procedente verò  
tempore, ubi exasperatur, livescit,  
& fit hiulca, seu finditur, mortifera.  
At verò quæ multum nigrescit, intra  
14. diem crisin ( sinistri judicii ) fore  
ostendit. Calamitosissima est nigra  
& ex virore pallescens.

230. Lingua ad medianam lineam  
velut alba saliva obducta, febris re-  
missionem indicat, idque eodem die,  
si quod superinducitur crassum est:  
Sin autem tenuius, postridie, quod  
si adhuc tenuius, perendie: Eadem pla-

Lib.  
diebus  
criticis.



plane ostendunt quæ sunt eiusmodi in extrema lingua, sed non ita certo.

231. Lingua tremula cum narium rubore, & liquida alvo, si nulla de pulmonibus significatio sit, grave malum denunciat, citasque purgationes perniciosas indicat.

Dureto.

[ Ut lingua omnis contra naturam tremula est multum terrificæ, sic eadem facit, ut Medicus toto corpore perhorrescat, quando ipsa contremiscit cum conditionibus in hac prognosi contentis. ]

234.

235. Linguae asperæ multumque siccae, phreniticæ. Pestiferum est dentes exarescere.

236. Dentis sphacelismus abscessum ad gingivas enatum solvit.

### Titulus Nonus.

#### De Voce.

246. **D**eliria paulisper ferocia, mox erunt immania.

247. Quibus cum febre vox hæret, post acrisiam, tremuli moriuntur. (Et comatosi.)

249. Qui ex dolore (i. e. acerbissima convulsione intercostalium musculorum) voce sunt capti, crudeliter moriuntur.

254. Si quis voce captus est potestate mentis exeat, morti est proximus.

255. Quæ à rigore incidunt aphorizæ, funestæ. Sunt hi nonnihil Cephalalgici.

### Titulus Decimus.

#### De Respiratione.

260. **R**espiratio frequens & parva, inflammationem & laborem denunciat partium spirabilium, at verò magna, & rara, dementiam aut convulsionem. Et frigidus quidem Spiritus lethalis est. Lethalis est etiam æstuosus & fuliginosus, minus tamen quam frigidus. Tum magnus foras efflatus, intro

parvus, & contra, foras parvus, intro magnus, pessimus est, & mortis proximus. Quin etiam tarda, velox, obscura duplex intro revocatio, qualis cernitur in iis qui super inspirant.

### Titulus Undecimus.

#### De Cervice.

268. **F**aucium dolor prægrandis parotidas & convulsiones facit, item cervicis & dorsi acerbos dolores.

270. Cervicis & cubiti dolor est convulsificus. Id autem à facie (à capite) nasci solet.

273. Cervicis dolor cum in febre *Proph.* omni terrificus, tum verò pestiferus iis qui sunt in metu insaniz.

276. Fauces exulceratæ in febre, cum alio signo difficili, periculosum.

277. In febribus strangulari repente, nec deglutire posse, sine tumore, malum.

### Titulus Duodecimus.

#### De Hypochondriis.

281. **T**umores hypochondriorum recens obortos inflammationis expertes, & inde dolores natos, solvit borborygmus sub hypochondrio fremens, maximè si aut ipse per se secedat, aut cum urinis & deiectionibus; quin juvat is ipse, si modo descendit.

283. Stomachi dolor, & pulsus hypochondriorum febre extincta, malum denunciant, idque cum alias, tum in sudatiuncula.

284. Quæ cadunt in hypochondria cum dolorifica mala, cum alias prava sunt, tum verò si faciunt profusiores alvos; peiora autem quæ brevi nascuntur; tum quæ assurgunt ex his parotides multum terrificæ, ut cætera expurata.

285. A cardialgia com torminibus ventris feræ (lumbrici) prorumpunt.



286. Dolorificum cordis malum (i.e. cardialgia cum syncope cordis) ætate jam grandi, crebro revertens, repentinam mortem ostendit.

291. In dolore hypochondriorum cum borborygmo, lumborum superveniens dolor in febribus, alvos profusiores facit, nisi flatus erumpat, aut copia urinæ feratur.

Protrh.  
158.

292. In diuturno hypochondrii meteorismo, & alvo graveolente, abscessus qui ad aurem assurgit, necat.

295. Hypochondriorum, cordis, hepatis, partiumque circumpositarum dolores excluso Sanguine, (secundum Foesium cruenta alvi deiectione) periculo defunguntur, non excluso pereunt.

297. Hypochondriorum dolores in febre, ægro fari nequeunte, si absque sudore solvantur, malum indicant. His dolores ad *Ischia* decumbunt.

287.

301. A suppressione alvi meteorismus hypochondriorum, gravis, maximè verò iis, qui ab inveteratione tabescunt, & quibus alvi profusè feruntur.

Aph. II.  
Sect. 4.

304. Supra umbilicum labor ac lumborum dolor, qui remediis non cedit, in hydropem siccum desinit.

### Titulus 13.

#### De Dorsi & Lumborum affectibus.

306. **L**umborum dolores Sanguinis profluvium excitant.

307. Quæ ex lumborum dolore cientur hæmorrhagiæ, largæ.

308. Quibus ex dolore lumborum anadrome fit ad caput, torpidæ manus, cardialgiæ, aurium flatus sonori, hæmorrhagiæ largæ, tum alvi profusè feruntur, ac mentes perturbatæ ut plurimum.

Duret.

[Sanè lumborum excursus caput replet, ex eaque repletionem, symptomatum capitis omnium paraphoricorum, cataphoricorum, cephalalgorum, & catarrhoicorum

principia causæque ducuntur.]

309. Quæ ex dorsi dolore, principia morborum ducuntur, difficilia sunt.

310. In dolore lumborum prægrandi, & larga deiectione, ab hel-leboro vomere spumantia multa, prodest.

311. Spinæ distortionem cum spirandi difficultate, Sanguinis fluxus liberat.

314. Ex dolorifici lumborum mali ascensu, oculorum perversio ma-  
lum.

Protrh.  
69.

[Omnis afflictio cerebri alterati, quæ propagationem habet *ἐκ τῆς πύλης*, i.e. propagines, metum adferre solet, interitus, si febris adest acuta.]

315. Dolor in pectore fixus cum torpore suborta febre, malum indicat, iique celeriter mortem oppetunt.

Protrh.  
70.

[Inter Medicinæ leges quæ sanciantur de acutorum morborum natura, deque illorum causis, atque symptomatis, nullæ sunt magis Medico necessariæ ad benè medendum, quam illæ quæ ex insolentium rerum observatione nascuntur. Quid enim minus est febris acutæ quam torpor, oblivio, coma? Sunt quidem hæc omnia, crudi humoris flatulentique spiritus *ἐκ γούρου*, non autem Sanguinis multa bile perfusi, qui regnare dicitur in febre acuta, proptereaque non sine causa videntur mortifera, quatenus longissimè absunt à febre acuta. Omnia enim quæ fiunt, quæque apparent contrà naturam morbi, & ægri, terrifica esse debent, ac sæpè mortem subesse testantur.]

Duret.

325. Quibus lumborum & lateris dolor caret evidenti causa, icterici fiunt.



Titulus 14.

De Hæmorrhagia.

326. **Q**Uæ diebus criticis ex hæ-  
morrhagia incidit perfri-  
geratia eximia, peſſima.

327. Sanguinem è diverſo fluere,  
malum eſt, ut in liene magno, è  
dextris, & ſimiliter in hypochondriis.

328. Qui ex vulnere ſubinde rigen-  
tes (vel leviter ſudantes) Sanguinem  
profundunt, graviffimum habent ma-  
lum, ac inter loquendum derepentè  
moriuntur.

329. Quibus 3. die larga eſt hæ-  
morrhagia, 6. rigor, 7. perfrigerati-  
o, ruſuſque prægrandis ardor, iis  
in vicio ſunt alvi.

330. Ab hæmorrhagia nigrorum  
dejectio, malum: Peſtiferum eſt e-  
tiam prærubris & æruginofis ferri al-  
vum. Quibus huiuſmodi hæmorrha-  
giæ die quarto contingunt, tandem  
comate, & convulſione conflictati  
moriuntur, nigris prodeuntibus, &  
alvo inflata.

331. Quæ poſt (exiguam) hæmor-  
rhagiam & nigrorum deiectionem, in  
acutis ſurditas venit, malum: Ibi de-  
jectio Sanguinis mortifera eſt, ſurdi-  
tas autem ſolvit.

335. Quæ circa initia profuſæ ſunt  
hæmorrhagiæ, dum vires recolli-  
gunt, (ſeu in reſectione) alvos pro-  
fuſè cient.

336. Profuſa narium hæmorrha-  
gia vi ſuppreſſa, interdum adducit  
convulſionem, ſanat autem phlebo-  
tomia.

337. Undecimum diem agentibus,  
ſubſtilla Sanguinis mala ſunt, idque  
cum alias, tum ſi bis fiat & redeat.

[ Res malè geſtæ acceſſionem ca-  
lamitatis adferunt, faciuntque ut æ-  
gri pejore ſint loco, ſi rerum ipſarum  
malè geſtarum cauſa ſit & occaſio,  
naturæ irrita, & inanis contentio,  
quando certamen ipſius & morbi eſt  
in procinctu. Præſtatenim naturam  
quieſcere, quam aliquid fruſtra moli-

ri: Ob eam ſanè cauſam, quod omnis  
irrita proritatio, morbum alioqui ſa-  
nabilem, ex eventu reddit inſanabi-  
lem, aut ſiniſtri judicii. ]

338. Si largo Sanguinis profluvio  
ſupervenerit convulſio, aut ſingultus,  
mortiferum.

339. In his qui ad 7. annum pro-  
greſſi ſunt cum coloris ſædatione,  
inter ambulandum ſpiratio coacer-  
vata, & terræ appetentia, Sanguini-  
is corruptionem & excolutionem ſi-  
gnificat.

[ Hæc prognofis apperit ex μαντιν  
vacuandi purgando, & Sanguinem  
detrahendo. ]

340. Quæ in diuturnis exigua ap-  
parent Sanguinis è naribus eſfluvia,  
mortifera. (Subſtillum Sanguinis ed  
peius reſ ire denunciat, quo ſæpiùs  
redit. ]

341. Quæ ab initio cientur verti-  
gines, hæmorrhagia exolvuntur.

[ Inter commoda hæmorrhagiæ  
non in poſtremis, illud eſt, quod  
τα χείνια μὴ κείνοντα prohibet eſſe  
mortifera, aut certè ſiniſtri judicii.  
Hæmorrhagiæ multæ difficilia multa  
diſſolvunt. ]

345. Qui ſtatis temporibus Sangui-  
nem profundunt, ſi loco non proſu-  
derint, epileptici moriuntur.

Titulus 15.

De Palpitatione, Tremore, &  
Convulſione.

347. **Q**UI toto palpitant corpore,  
etiamne vitam finiunt vo-  
ce capti?

348. Omnes qui tremuli convel-  
luntur, ſudatiunculam habent obno-  
xam recidivæ; atque iis rigore ſu-  
perveniente fit criſis: Supervenit  
autem ventris ardore laceſſitis. Hic  
ſomni arctiores, ſunt convulſifici,  
gravitaſque frontis, & miſtio ipſa  
difficilis.

349. Quæ cadunt in hyſtericas ſine  
febri (potiùs quam non conſuetæ)  
convulſiones, faciles.



Protrh.  
162.

353. Quæ tremulis & anxiis parvæ assurgunt parotides, convulsionem denunciant, cum in vitio est alvus.

306.  
Apho. 2.  
sect. 5.

355. Convulsio vulnere superveniens funesta.

356. Convulsio feбри succedens periculum denunciat, minimum verò pueris.

257. Qui septem annis provectiores sunt, convulsione non tentantur in febre, sin autem desperati.

358. Convulsionem sanat exorta febris acuta quæ prius non fuit, quod si prius fuerit, exacerbata: Quin etiam prodest, urinam fluere albumineam, seu vitream (καλιδένειαν) alvum ferri & somnos inire.

Protrh.  
167.

359. In convulsione diu obmutescere, malum, at verò parumper, aut linguæ apoplexiam, aut brachii partiumque dextra sitarum denunciat. Exolvitur autem urinis repente multis & cumulatè proruptis.

362. Quæ speciem febris & opisthotoni præ se ferunt, urinæ geniturales exolvunt.

### Titulus 16.

#### De Angina.

366. **E**Rysipelas (cynanchica) intus foras converti, utile, at foris intrò, mortiferum. Intrò autem convertitur cum rubore evanescente, pectus gravatur, ac difficilius spirat æger.

Aph. 10.  
sect. 5.

367. Quibus cynanche ad pulmonem inflectitur, alii quidam intereunt 7. diebus, alii cum evaserint, purulenti fiunt, nulla expurgatione pituitosa sursum facta.

368. Quibus à forti strangulatu repente (i.e. sponte sua) stercus excernitur, desperatio est.

371. Inter anguinosos, qui cocta citò non expuunt, desperati.

Duretus

[Est πυρετός, πέψις τῶν παρὰ φύσιν. Rerum è natura egressarum coctio. Ut enim vera πέψις, i.e. coctio verè dicta est τὸ ἐκείσθαι, i.e. rerum ingredientum, sic ὁ πυρετός

seu mitificatio, est τὸ ἐκείσθαι, i.e. exeuntium. Utriusque causa effatrix est partium solidarum vitale principium, & vivifica vis quæ manat à corde.]

372. In Angina qui abs re prorepunt ad caput dolores cum febre, sunt desperatæ salutis.

375. In angina laborantibus absque ratione (κατὰ φύσιν) gracilescantibus faucibus, dolor prægrandis ad pectus aut alvum progressus, purulentas dejectiones facit, si quidem aliter non exolvatur (alioqui tale quid solutionem præ se fert.)

377. Ex angina sputa glutinosa, crassa, multum alba, vi expressa, malum. Atque omnis pepasmus huiusmodi malus. Purgatio multa deorsum, tales paraplectico modo necat.

378. Sputa ex angina subarida, crebra, cum tussi & lateris dolore educta, mortifera. Quin etiam quæ inter potandum per tussim rejiciuntur, quæque difficulter diglutiuntur, malum portendunt.

### Titulus 17.

#### De Pleuritide & Peripneumonia.

379. **I**nter pleuriticos quibus initio variæ (πυρετώδης Dureto) sunt expuitiones (Foesio πυκνότητες, i.e. purulentæ) ii tertio moriuntur, aut 5. quos si evaserint, nec dum multo illis sit melius, 7. aut 9. aut 11. incipiunt suppurari.

381. Siccæ pleuritides, & sputi expertes, gravissimæ. Terrificæ autem in quibus dolorifica sursum sunt mala.

[In magna pleuritide salutis desperatio esse solet, si nihil fiat, nihil appareat, quod systrophicæ inflammationis laxitatem adferat, unde remissio sit gravissimorum symptomatum, quæ ab ea inflammatione dum viget, nascuntur. Systrophicæ inflammationis laxitatem adferunt, fomentum, detractio Sanguinis, & libe.

Duretus.



liberalis ac libera sputi expurgatio , per quam ipsa pleuritis non raro *αὐτόματως* quiescit. ]

382. Pleuritides graviores quæ sine divulsionibus , quam quæ cum divulsionibus contingunt.

*Duretus.* [ Σπυγνυκτα indicant vehementem thoracis motum , validamque facultatis animalis in expectorando sputo contentionem. ]

383. Quibus pleuriticis circa initia lingua bile suffusa est , septimo judicantur : Quibus autem tertio aut 4. ad circiter 9.

386. Pleuriticis , dolores & alvum emolliri utile est , sputa colorari , nullos in pectore strepitus fieri , urinam rectè procedere : Eorum contraria difficilia sunt , & sputum dulcescere .

387. Pleuritides biliosæ simul & Sanguineæ , ut plurimum 9. aut 11. judicantur , ac ferè saluti concedunt . Quibus autem pleuriticis , initio quidem dolores sunt mites , quinto aut sex die ingravescent , ferè ad 12. perueniunt , raroque servantur . Perititantur autem potissimum 7. aut 11. quod si bis 7. evaserint , periculo defunguntur .

*Duretus.* [ Sputum rubrum simul & flavum promoveri debet , iis quæ expurgationem juvant , molliendo , leniendo & sputum ciendo , non autem Sanguinis detractione , retrahi & impediri , quod usu venire videmus non sine mærore & nemesi , ab istis pragmaticis vulgo dictis , qui omnem pleuritidis curationem exigunt in Sanguinis detractione sæpiùs iterata , quamdiu pleuriticus hujusmodi sputa expurgat cum spe salutis prædivite . O homines reipublicæ calamitosos , atque funestos ! Ipsam pleuritidem , quæ sua sponte nullius operis indigens , cum tali sputo quiesceret , ex eventu reddunt mortiferam. ]

388. Quibuscunque pleuriticis multum in pectore sputum perstrepat , unaque facies plena mæroris , & oculus icteritius & caliginosus , moriuntur .

Burnet Parte II.

[ Firmiora sunt argumenta discessionis vitæ aut morbi , quæ ducuntur è signis , quam è symptomatibus. ] *Duretus.*

389. Qui è pleuriticis facti sunt purulenti , 40. diebus à rupta vomica expurgantur .

[ Sanè in pleuritide , & peripneumonia sputum flavo exactè permixtum , quodque citam & facilem habet anacatharsin , recreat medicum , & consolatur spe certa salutis : Ac tum juvat Medicum spei plenum videre , celerem multum atque fidelem , alacriter , & vultu sereno , Medicinam pleuritico facientem. ] *Duretus ad 390.*

[ Hippocrates Author est auspicandam curationem à Sanguinis detractione , quotiescunque duorum remedium sollemnium , purgationis dico & phlebotomiæ , necessarius usus incidit. ] *Duretus ad 394.*

397. Peripneumonia pleuritidi succedens , tutior est primigenia ( potiùs gravior. )

389. Exteriora & densa corpora celerius à pleuritide & peripneumonia intereunt , quam quæ in otio conflantur .

399. In morbis pulmonis coryzas , ( id est catarrhos ferinos ) & sternutamenta præcessisse , aut consequi , calamitosum . In reliquis verò morbis ( maxime exitialibus ) adjumentum adferunt sternutamenta .

400. In pulmonis inflammationibus , si lingua tota alba fiat , ac aspera , ambæ pulmonis partes inflammatione vexantur , quibus vero dimidiata lingua , qua parte id apparet , inflammatio affligit . Et quibus ad unam claviculam dolor fit , his superna pulmonis ala una ægrotat : Quibus verò ad ambas claviculas dolor extenditur , ambæ supernæ pulmonis alæ ægrotant . Quibus ad mediam costam , media . Quibus ad discriminationem ( i. e. Ad septum transversum ) inferna .

[ Magna sæpè incidit signorum controversia , cum alia Medicum spe con- ] *Duretus ad 402.*



consolantur salutis, alia verò metu exterrēt interitus. Ac tum difficilima est tecmarseos ineundæ ratio, ad prædicendum certò quid eventurum sit. Sed ea sic ineunda ex Doctrina Hippocratis, ac primum τεκμηρίαι, i. e. signa syllogistica plus conferre ad tecmarsin, quam τα ἐκότα i. e. verisimilia. Deinde τὰ ἱμειδῆ i. e. quæ sunt ejusdem speciei, & inter se consocialia, majorem habere vim, quam ἑτερογενῆ, i. e. dissentanea, quæ sunt alterius speciei. Postremò certa comparatur τεκμαρσις, ad vitæ quidem prælagium, si cum remissione τῶν πεθογνωμονικῶν, appareant comoda epiphænomena, ut in pleuritide mitescente, sputum flavo permixtum citò & copiosè editum: Interitus autem, si pathognomonica signa prægrandia, nimis opprimendo accessionem adjungant eorum, quæ à propagatione morbi epigenomena nominantur; indeque faciant epiphænomena prava, quæ principatum obtinent in prædicendo de morbis acutis. ]

403. Qui futuri sunt purulenti, primum quidem expuunt falsa, mox dulciora.

404. Quibus in pulmone tubercula φυματὰ fiunt, (empyema Dureto) ii 40. diebus à ruptione pus expurgant, quos si superent, ut plurimum eabidi fiunt.

405. In lateris dolore, substillum Sanguinis è naribus grave malum.

406. Quibus purulentis mitiora sunt omnia, si postea pus edunt fædi odoris, iis recidiva mortifera.

408. Quicumque spumantem expuunt Sanguinem, dextroque laborant hypochondrio, à jecore spuunt. Multique intereunt.

409. Quibus concutiendo, pus editur cænosum & fædi odoris, ut plurimum moriuntur.

410. Quibus à pure coloratur specillum μύλην tanquam ab igne, maximam illi partem intereunt.

414. Raucitas cum tussi & alvo liquida, pus educit.

415. Quibus in peripneumonia, urinæ circa initia crassæ, mox ante 4. diem tenues fiunt, mortiferum.

417. Pectora rubris maculis superparsa, talibus mortem subesse testantur.

419. Quæ ob puris intrò collectionem, febres intermittunt, in his magna ex parte ægri tenuibus sudoribus diffluunt.

422. Qui perhorrescunt crebrò, ad suppurationem deveniunt, quin etiam febris talium, ipsos ad suppurationem ducit.

427. Sanguinem expuentes juvat esse febris expertes, ac tussire leviter atque dolere; ipsum verò sputum ad dies bis 7. crassescere (malè tenuari) sed febricitare multum, itemque tussire, atque dolere, tum Sanguinem subinde novum expuere, calamitosum.

428. Quibus intumuit latus, atque incaluit, si cum in oppositam partem decumbunt, grave quippiam suspensum esse videatur, pus ab una parte collectum est.

429. Empyicis à pulmone pus duci per alvum, lethale.

430. Vulnere in thoracem accepto, si quidem externa vulneris pars sanitatem receperit, interna verò nequaquam, suppurationis periculum impendet, & quibus tenera est intus cicatrix, disrumpitur facilè.

## Titulus 18.

### De Phthisi.

433. **Q**ui Sanguinem vomunt (i. e. pleno ore profundunt) spumantem, omnique dolore carent sub diaphragmate, à pulmone vomunt. Et quibus in ipso rupta est magna vena, & multum illi vomunt, & periculosè admodum: Quibus verò minor, minus rejiciunt, & securiores sunt.

434. Ephthificis quibus ad ignem sputum olet graviter, ac tum capilli fluunt è capite, moriuntur.



435. Tabidis in aquam marinam expuentibus, si pus fundum petit, celerem perniciem denunciat. Sit autem marina aqua in æneo vase.

Aphor. 12.  
Sect. 5.

436. E phthificis quibus defluunt capilli è capite, pereunt à diarrhæa, & quibus phthificis diarrhæa incidit, moriuntur.

437. Quæ phthificis accidit sputorum suppressio, dementiam infert nugacem. His hæmorrhoidem spes est apparituram.

438. In metu sunt maximo phthises, quæ ex ruptione venarum crassarum, & à catarrho è capite contingunt.

Aphor. 9.  
Sect. 5.

439. Inter ætates illæ demum ostentant periculum phthisis, quæ sunt ab anno 18. ad 35.

442. Hypochondriorum meteorismus, cum cæteros malè habet, tum verò eos pessimè, quos phthisis exercet.

433. Qui ex longa phthisi consumpti sunt, & desperati, nonnullis antè finem vitæ rigor cietur.

### Titulus 19.

#### De Hepaticis.

447. **I**N Hepatico mala est colliquatio cum raucitate, idque cum alias, tum si tussicula sit.

448. Circa hepar dolentes, cardialgici, veterinosi, perhorrescentes, alvo turbata, macri, ciborum fastidiosi, sudatiunculis crebri, purulenta per alvum profundunt (& ita moriuntur.)

Aph. 40.  
Sect. 6.  
Sect. 7.

449. Quibus jecur derepentè vehementer dolet, iis febris succedens remedio est.

451. Quibus inusto hepate, velut amurca prodit, funestum.

### Titulus 20.

#### De Hydrope.

453. **I**N sicco Hydrope stranguria prava est, ac prava quoque urina quæ hypostasim habet exiguam.

455. In biliosis alvus turbata, quæ pauca exhibet similia genituræ, atque mucosa, doloremque ad imum ventrem inferentia, nec urinæ faciles in meiando, ex talibus desinunt in Hydropem.

456. Si cui aquoso, cum febre urina pauca sit, atque turbida, perniciosum.

457. Ineunte Hydrope, si aquosa incidat diarrhæa cruditatis expers, morbum solvit.

458. Denunciato jam sicco Hydrope, si tormina sint, circa tenue intestinum, ingens malum.

459. Quæ ex Hydropicis veniunt epilepsiæ, mortiferæ.

460. Hydrops qui Medicinæ concedit, ac revenit, desperatus.

461. Qui secundum venas Hydropici sunt (i. e. leucophlegmatici) prorupta in alvum aqua (indeque diarrhæa suborta) sanantur.

### Titulus 21.

#### De Dysenteria.

462. **D**Ysenteria quæ intempestivè sistitur, abscessum facit, vel in lateribus, vel visceribus, aut in articulis: Ac forte quidem biliosa in articulis, Sanguinea verò in lateribus & visceribus abscessum facit.

463. Dysenteria laborantibus vomitio biliosa initio, grave malum.

464. Quibus è Dysenteria sævatur ad puriformia, qui superstat humor multum albus erit, & multus.

465. Dejectiones Dysentericæ, quæ rubris, limosis, cumulatè ducuntur, si cum facie rutila & saturo rubore suffusa quiescant, insania est in metu.

466. Dysenteria lienosis non longa quidem, utilis: Longa verò pestifera. Nam quiescente illa, si vel Hydrops veniant, vel etiam lien-teria, mortiferum.



## Titulus 22.

## De Lienteria.

467. **I**N Lientericis, cum feris alvinis, dolores ex intestinorum cruciatu soluti, articulorum partes attollunt, ac ex huiusmodi tenues squammæ cum rubore & pustulis sunt: Ii post multos ac tenues sudores, velut acceptis ex flagris vibicibus, rubescunt.

468. Quos longa exercet Lienteria cum feris (*i. e.* ascaridibus, alii sævis-  
simis ulceribus) torminibus & doloribus, cum hæc quieverint, intumes-  
cunt. His superrigere malo est.

469. Lienterica, quæ cum spiratione difficili, & lateris vellicatione conjuncta sunt, transeunt in Phthisin.

470. Ileosis vomere & obsurdescere malo est.

## Titulus 23.

## De morbis Vesicæ.

472. **C**alculosi ea figura siti, ut ne calculus procidat in urinæ ductum, facilius illi meiunt.

[ Temeraria est omnis Medicina, pestifera & sæpè mortifera, quæ frangendo vesicæ calculo adhibetur. Cui profuerit, vidi adhuc neminem: permultos autem, quibus exitio illa fuit. Sed unicum illud remedium calculosi, quod in sectione positum est, tam præceps est, ut sæpè in incerto sit Medico, quid agendum; ægro flagitante & implorante auxilium. ]

473. At quibus tuberculum est circa vesicam, quod exhibet Dysuriam, quovis illi modo sint collocati, torquentur: Sanatio huius fit pure pro-  
rupto.

474. Quibus urina clam illabatur ad pudendum, exolvuntur desperati.

475. Stranguriæ ileus superveniens septimo die perimit, nisi oborta febre, urina fluxerit cumulatè.

## Titulus 24.

## De Apoplexia, paralyfi &amp; paraplegia.

476. **T**orpores & stupores præter consuetudinem evenientes futura denunciant apoplectica.

477. Qui à vulnere (præsertim capitis) sunt impotentes corporis (*i. e.* in movendo pigres, & hebetes in senti-  
endo) exorta febre rigoris experte, servantur: Non exorta verò sunt apoplectici, partim dextra, partim sinistra.

478. Quæ apoplecticis veniunt hæmorrhoides, salutare, refrigerationes verò & torpores malum denunciant.

479. In apoplecticis ex magna spirandi molestia subortus sudor, mortem adfert. In his rursus, si febris accedat solutio contingit.

[ Ultima pars huius prognoseos non est Hippocraticæ veritatis. ] *Duretus.*

480. Apoplexia repente oborta, solubilis, adveniente febre lenta, mortifera est.

[ Frustra ciendo humorem morbi-  
ficum, quicquid enim humorem ciet, neque dissipat, neque exhaurit, oppressionem infert majorem, & gravioribus malis auget ægrotum. ] *Duretus.*

## Titulus 25.

## De Melancholia &amp; Mania.

483. **Q**uibus (Melancholicis) à metu febris vacuo (vel cum refrigeratione) ad furorem egressio est, id febres cum sudoribus & somni arctiores nec turbulenti exolvunt.

486. Quæ cum silentio sunt mentis emotiones (*ἐκστάσις*) inquietæ, oculos circum agentes, ac spiritum sublimè intrò vel foras ducentes, mortifera; sed tamen diuturnas inferunt paraplegias, quin etiam furiosi evadunt hoc modo affecti. Quibus autem alvo turbata exacerbatio est, iis ferè sub crisin nigra ducuntur.



## Titulus 27.

## De Phymate &amp; Phlebotomia.

491. **D**Olores qui latus invadunt in febribus (melius sine febribus) æqualiterque ibi sine signis subsistunt, phlebotomia offendit. Ac si quem teneat cibi fastidium, & si quis habeat tumidum hypochondrium; tum quibus perfrigeratio est cum torpore, non sine febre, Sanguinem detraxisse nocet. Nam cum sibi mitius esse putant, intereunt.

## Titulus 28.

## De Prognostico omnibus totius corporis morbis communi.

**H**unc titulum supræpete in libro prognosticorum, ex quo totus desumitur.

## Titulus 29.

## De Pertusionibus Capitis.

498. **Q**uibuscunque tempora præciduntur, convulsio incidit è diverso partis præcisæ.

499. Quibus concussus est cerebrum, doluitque percussis aut lapsis, continuo voce capti, nec vident, nec audiunt, ac ferè moriuntur.

500. Quibus cerebrum vulneratur, his ut plurimum febris & bilis vomitio incidit, & corporis apoplexia. Tales autem sunt desperati.

501. Ossium capitis fracturæ cognitu difficillimæ quæ circa futuras fiunt. Fiunt autem potissimum gravibus ac rotundistelis, tum ex adverso illatis, non ex plano. At ossa de quibus fissa sunt nec ne ambigitur, sic discernas, si utraque bucca mandendum exhibueris caulem asphodeli, vel ferulam, atque animum advertere jufferis, num ipsi os aliquod strepere videatur; confracta namque strepere videntur. Sed procedente tempore fissa quidem (ῥῥῶγας; Dureto rima

Burnet Parte II.

occulta) septimo die, tum 14, tum alias quoque sui significationem edunt. Nam & caro (i.e. pericranium) ab osse abscedit, aut os livescit; dolores item ichorum diffluentium excitantur, eaque jam remediis ægrè cedunt.

## Titulus 30.

## De Vulneribus &amp; Fistulis.

502. **Q**uibus omentum procidit, ut putrescat necesse est. *Aph. 58. sect. 6.*

503. Si quod præcisum fuerit tenuium intestinorum, non coalescit. *Aph. 24. sect. 6.*

504. Præcisus nervus, aut quod in gena est tenue, aut præputium, non coalescit. *Aph. 19. sect. 5.*

505. Si quando in corpore vel os excisum fuerit, vel cartilago, nunquam augetur.

507. Bilis vomitus vulnere succedens, malum denunciat, præcipue in capitis vulneribus.

508. Nervi quicunque crassi (i.e. insignes) vulnus accipiunt, ut plurimum claudos reddunt. Maxime si obliquum vulnus fuerit, ac in musculorum capitibus, præsertim femorum.

509. Interit autem potissimum è vulneribus, si cui vulneratum sit cerebrum, aut spinalis medulla, aut jecur, aut diaphragma, aut cor, aut vesica, aut quædam grandis vena. Moriuntur etiam si in arteriam (asperam scil.) & pulmonem insignes valde plagæ inflicte sunt, adeo ut pulmone saucio minor sit expiratio per os, quam illac excidit, ubi est ipsa pertusio. Intereunt verò quibus nervi interiores, sive tenuis aliquis sive crassus vulnus acceperint, si plaga transversa fuerit & magna: Quod si parva & recta, nonnulli periculo eximuntur. Sed illi perraro intereunt, qui sauciantur, ubi nulla est corporis partium prædictarum, vel absint ab his longissime. *Aph. 17. sect. 6.*

511. Ex fistulis molestissimæ sunt, quæ in partibus cartilagineis & car-



ne vacuis enascuntur, ibique sunt cavæ & cuniculosæ (longè excurrentes) ac sanie diffluunt continenter, tum verò caruncula ipsarum adnascitur orificio. Sed illæ facilius sanescunt, quæ in partibus mollibus & carneis, nervoque carentibus oriuntur.

### Titulus 31.

#### De morbis Mulierum.

513. **I**N Muliebribus, quæ antè 536. **I** partum aquosa prodeunt, malum denunciant.

514. Ora aphthosa in gravidis, bono non sunt: Ac forte etiam alvi humectantur.

515. Ex ilibus ad tenue intestinum migrantes dolores in morbis longis, ex abortu, neque admodum purgata muliere, perniciem denunciant.

516. Quæ ex partu & abortu copiosa celeriter cum impetu feruntur, si subsistant, molestiam exhibent. His rigor inimicus est, & alvi perturbatio, præcipue verò si laborent ex hypochondrio.

519. Quæ cum suspirio foras effertur spiratio, & colliquatio præter rationem, gravidis abortum denunciant.

522. Salutare est muliebria non cohiberi: Nam inde veniunt epilepsie: Quibusdam autem ventris longa profluvia; nonnullis etiam hæmorrhoides.

523. Quæ pariunt facile, rigore subinde prius correptæ, iis à partu reliqua difficillima.

528. Uterinæ duritates in alvo admodum dolorificæ, crudeliter atque citò perniciosæ.

531. Convulsionem solvunt muliebria (i.e. menstrua) quæ primum aut statim apparent, atque id sine febre.

534. Quæ cum sopore & gravitate incidunt cephalalgie gravidis, pessime ipsas habent. His autem for-

tasse profuerint quippiam convulsio- nis adesse.

538. Antè partus subinde rigere, & citra dolorem parere, periculum indicat.

541. Horrore subinde tentatis, lassitudine & capitis gravitate confictatis, muliebres purgationes erumpunt.

551. Sterilibus vomitio Sanguinis ad concipiendum prodest.

552. Oculorum caligines crebris apparentibus mensibus solvuntur.

554. Quæ sunt hysterice febre vacuis convulsiones, faciles: Sicuti Dorcadi.

555. Quibus à rigore febris est laboriosa, promoventur muliebria. His dolens cervix hæmorrhagiam ciet.

### Titulus 32.

#### De Vomitibus.

556. **M**Ortem adfert ruber vomitus, maximèque si 78. *Prorrh.* ægrè vomatur.

558. Vomitiones exiguæ biliosæ, malum denunciant; tum verò præcipue, si pervigilio conflictentur ægri.

565. Ex sinceris vomitibus singultus malus est; mala quoque convulsio. Quinetiam idem existimandum est in immodicis purgationibus, quas inferunt pharmacie.

566. Qui vomituri sunt, prius illi salivant.

568. In omni superflua purgatione, frigus cum sudore exitiale. Tum qui subinde vomunt & siticulosi sunt, male habent. Qui verò anxietate laborant cum lumborum dolore, iis alvus humectatur.

### Titulus 33.

#### De Sudoribus.

574. **Q**ui una cum febre incidit sudor, si est acuta, malus.

[ Re-



[ Reliqua huc pertinentia ex libro prognostico, petenda. ]

Titulus 34.

De Urinis.

575. **C**Itam dimissionem febris ostendit urina, quæ ex confusa quippiam pingue ostentans aqueſcit. Quæ autem subrubra est, habetque subrubram hypostasim & lævem, siquidem antè septimum diem (i.e. quarto) fuit huiusmodi, septimo die solutionem fore designat. Sin autem post 7, tardiores aut plane diuturnas. Et quæ quarto die subrubram nubeculam capit, septimo die liberat, si cætera convenienter sint constituta. Tenuis autem & biliosa, ac ne vix quidem exiguum habens hypostasim, tum quæ in melius, modo in pejus mutatur, temporis diuturnitatem postulat. Quod si ista diutius perseverat, aut ad crisin diuturnitas temporis requiratur, periculo non vacat.

576. Aquosa verò & alba in diuturnis morbis perseverans, difficilem & non securam judicationem facit. [ Quia in ea cruditis summa sunt omnia, ita ut vix sperabilis sit pepasmus. ]

577. At verò nebulæ in urinis albæ quidem & versus fundum, utiles; rubræ autem & nigræ, lividæ item, difficiles.

578. In acutis morbis periculum denunciat urina biliosa non subrubra, & quæ crassius commolitam farinam refert, albas habens hypostases, & quæ colore ac hypostasi variat, & maximè in rheumatismis è capite. Perniciem etiam præ se fert, quæ ex nigra, in biliosam tenuem transit, & quæ sedimentum habet divulsum.

579. Urinæ derepente præter rationem parum concoctæ, vitiosæ sunt. Atque omnino quicquid præter rationem coctum est in acuto, malum est. Prava autem & illa, quæ ab his prærubra, virulenti quippiam efflore-

ſcentis continet. Quæ autem alba funditur & pellucida, mali est omnis, præcipue in phreniticis appars. Prava est item quæ mox à potu effluit, maximeque pleuriticis & peripneumonitis. Mala est etiam quæ antè rigorem oleosa redditur. Malum est etiam in acutis cum virescentes urinæ sunt, nec in superficie tenus. [ Vel nec in colore persistunt. ]

580. Pestifera autem est inter urinas, quæ & hypostasim habet nigram, & ipsa quoque est nigra. Sed pueris pestifera est magis aquosa. Perniciosa est omnis urina quæ clam emittitur. Peripneumonitis pernicioſa est, quæ initio coctionem habet, verum post quartum diem, tenuis evadit.

581. Pleuriticis urina cruenta, obscura cum varia hypostasi, & indifcreta, ut plurimum intra dies 14. mortem adfert. Sed illud confestim mortiferum est in pleuriticis urinam reddi porraceam cum nigra hypostasi aut furfuracea.

582. Quæ emittitur urina habens pinguem hypostasim, febrem denunciat. ( Abire secundum Duretum ) cruenta verò circa initia reddita, morbi est longi, at perturbata cum sudore, recidivæ; sicut & alba qualis est jumentorum, cephalalgia, pelliculosa autem, convulsionis: Quæ verò sputiformes habent hypostases, aut limosas, rigorem denunciant. Quæ araneorum telis similia quædam habet, colliquationem; quæ in erraticis febribus sunt nigræ nubeculæ, quartanas denunciant. Decolores autem quæ nigra ostentant enæoremata, idque cum vigiliis & perturbata mente, phreniticæ: Cinereæ ( vel potius lixivio similes ) cum dyspnæa sunt hydropicæ.

583. Urina aquosa vel conturbata friabili asperitate, liquidam fore alvum denunciat. Quæ verò admodum tenuis spissa evadit, fortasse erupturum sudorem indicat; jam autem erupisse, quæ spumam in se ipsam insidentem habet.



585. Urina quæ utilem habet hypostasim, & mox non habet, laborem & mutationem ostendit: Quæ autem perturbata, hypostasim habet, residens, rigorem circa crisin denunciat, fortasse etiam transitum in tertianam aut quartanam.

586. In pleuriticis, urina subrubra, quæ hypostasim habet levem, securam crisin denunciat. Subviridis autem (vel aliquantulum pallida) & florida cui est alba hypostasis, citam quoque crisin ostendit. Sed admodum rubra & florida, quæ viridem (pallidam) habet hypostasim, lævem, exactam, longi & valde turbulenti est morbi, in alium transeuntis, non tamen funesti. Aquosa verò & alba quæ similem crassioris farinæ hypostasim rubram habet, dolorem & periculum denunciat: At quæ viridis (pallida rubram & instar crassioris farinæ hypostasim habet, longi, & periculosi est morbi.

Proph.  
120.

588. Vesica intercepta quippiam habet convulsivum, idque cum alias, tum si accesserit cephalalgia; quæ in his torpide exolvuntur, difficilia sunt, non tamen mortifera. Ac forte etiam aliquantulum decipiunt.

589. Renum repente dolor obortus, cum urina suppressa, lapillos, aut crassam urinam meiando reddendam ostendit.

592. In biliosis (Duretus in Pleosis) urina intercepta citam mortem adfert.

593. Urina in febre densitatem habens divulsam, morbi reversionem, aut sudorem portendit.

594. In longis febribus, exiguis & erraticis, urinæ tenues meiando emissæ, lienosæ.

595. In febre interdum varias reddi urinas, longi est morbi.

597. Quibus urinæ paucæ & grumosæ, febre non carentibus, tenuium copia ex his emissæ prodest. Tales autem emittantur ab initio, vel citò habent hypostasim.

598. Quibus urina citò hypostasim habet, celeriter illi judicantur.

599. Epilepticis, urinæ præter morem tenues & crudæ, si repletio nulla adsit, de instanti casu admonent. Idque cum alias, tum si ad acromium, cervicem aut dorsum, dolor & tensio urget. Vel corporis obrepit stupor, vel perturbata insomnia obversantur.

600. Quæ parva copia apparent, veluti stillæ Sanguinis, urinæ, vomitiones, & dejectiones, malum denunciant: Pessimum verò si exiguis intervallis sese consequantur.

### Titulus 35.

#### De Dejectionibus.

603. **U**bi alvus modicè intercepta, nigra stercoribus caprarum similia, nec nisi coacta demittit, hoc casu nasus erumpens, malo est.

604. Glutinosa, sincera & alba dejectio, prava est: Prava item quæ multum est fermentata, & aliquantulum pituitosa: Prava etiam cum ex his quæ concreta feruntur, quod subsidet, aliquantulum livescit, purulentum ac biliosum est.

605. Sanguis splendidus alvo per secessum rejectus, malo est, præsertim si dolor aliquis adsit.

606. Spumans dejectio eximiè biliosa (aut circumfusa bile) prava: Tum inde fiunt ictერი.

608. Prava est purulenta & Sanguinis atrii dejectio, cum febre & alias. Prava quoque varia & abundè colorata dejectio, & tanto peior, quo colore formidanda magis, secus in pharmacia; tum namque periculo vacat, copia non exuperans.

[ Nulla quæ sua sponte movetur Sanguinis atrii dejectio, in bonis ducenda; semper omnino pestifera est ac cita morte non rarò funesta. Nam qui à morbo emacruerunt, cum nigra dejecerint, postridie moriuntur. Sed mirum illud, ac pene dixerim miraculo apponendum, quod hæmorrhoeicus ater Sanguis tot commodis beat

Aph. 22.  
sect. 4.

Duretus  
Aph. 23.  
sect. 4.



beat ægrotum, & idem dejectus augeat multis damnis, tantumque periculo vitæ adjiciat, ut cita inde mors veniat. Tum illud etiam subito mirari, quod nigra dejectio sponte ducta, periculo & maleficio est apponenda; sperabili autem salutis ac beneficio, quam movet pharmacia convenienter præscripta.]

611. Liquida dejectio in sopore & torpore detentis, pessima esse solet. Lethale etiam est, multum Sanguinem grumosum ex alvo effluere, itemque candidum & liquidum excrementum cum alvi tumore.

615. Exactè candicans dejectio in febre, non est judicii fausti.

616. Alvus perturbata, ut pauca sæpius subducatur, distendit buccas, rubores etiam faciei delet.

617. Stercoracea cum tensione dejectio, laborem alvi denunciat, at pituitosa facta protinus cum oris ventriculi dolore, dysenteriam fortè & lumborum dolorem. His distenta alvus, quæ coacta & ægrè liquida reddit, ocyusque intumescit, habet aliquid convulsorium, iidem novus subinde rigor, periculum creat.

618. Qui nigra egerunt, ii tenuibus & frigidis sudoribus diffuunt. (Qui sunt mortis rudimenta.)

619. Alvus initio perturbata cum paucis urinis, labentibus inde diebus facta siccior, cum urinis tenuibus (crudis) & copiosis, abscessum in articulos prævidendum exhibet. (Si frigida causa est, calida aures petit.)

620. Frequentes desidendi labores, rigores adferunt: Et quibus alvi excrementum vitiosum est, id maximam molestiam exhibet, si quarto die initium fecerit.

621. Frequentes & ex parvis intervallis desidendi labores, aliquantulum viscida excernentes, cum paucis stercoraceis, hypochondrii & lateris dolore, icterum prænunciant. Animadvertendum autem, num ex istorum suppressione, ii cum virore palleant. Eos verò etiam existimo

Sanguinem profundere: Hos quoque lumborum dolores affligunt, & his Sanguinem profundentibus, Sanguis splendidus prodit. Cum sopore & capitis dolore subinde incallescere, perniciem denunciat.

625. Squalida cutis malè affectæ alvi index est. In his prærubræ carunculæ purulentæ ferè ex alvo prodeunt.

627. Biliosas alvi dejectiones surditas, & surditatem biliosa alvi dejectio sedat.

*Aph. 23.  
60.  
Sect 4.*

629. Virium exolutio dolorem solvens, alvum maximè humectam reddit.

630. Quæ circa sedem cum dolore suppurant, alvum conturbant.

631. Exitialis est dejectio pinguis & nigra, ac livida cum odoris gravitate, item biliosa simile quiddam lentum aut cicerum lomento continens, aut veluti florulentos Sanguinis grumos, & infantium egestionem odore referens, ac varia, eademque diu perseverans; talis etiam fuerit cruenta, strigmentosa, biliosa, nigra, viridis, & simul & per vices excreta. Exitiosa quoque quæcunque prodeundo sensum ægri fallit.

638. Si cui, post diuturnum alvi profluvium, biliosa vomenti & cibos aversanti, sudor effluit multus, repente interimit.

639. Ab assumpto medicamento, si tum in ipso purgationis fluxu, tum postea, Sanguis liquidus confestim exit, malum.

645. Lingua tremula, nonnullis signum est alvi prorupturæ.

647. In humecta alvo, perfrigeratio cum sudore, mala.

648. Qui è gingivis, alvo liquida, Sanguis effluit, lethalis.

649. Dejectio pura cum sudore, febrem exolvit.



Τῆ φύσεως καὶ Αἰτιολογίας.

## De Natura Hominis.

Περὶ φύσεως Ἀνθρώπου.

**S**i unum esset homo, nunquam doleret, non enim quicquam esset ex quo doleret, si unum existeret. Quin etiam si doleret, necessarium foret, etiam huic unicum tantum remedium esse. At nunc plura sunt, siquidem multa insunt in corpore, quæ cum mutuo inter se præter naturam calescunt & refrigerantur, siccanturque & humectantur, morbos pariunt. Ita ut plurimæ morborum idæ sunt, unde & varia eorum medela.

Corpus hominis continet in se Sanguinem, pituitam, & geminam bilem, nimirum flavam & nigram, ex quibus corporis ipsius natura constat; & per quæ ægrotat ac sanum est. Sanitate tum maximè fruitur, quando hæc inter se moderatè affecta fuerint temperie, facultate, & copia, & maximè si optimè mixta fuerint. Ægrotat verò vehementer, quoties horum aliquod, aut parcius, aut copiosius fuerit, aut etiam à cæteris divortium fecerit in corpore, neque cum reliquis cunctis commixtum fuerit.

In immodicis purgationibus, sola vacuata bile, nullus unquam mortuus est. Verum epoto medicamento quod bilem ducat, primum sanè quis bilem vomitione refundet, mox etiam pituitam, deinde quoque atram bilem, idque per vim, sub mortem verò etiam Sanguinem purum evomet.

Per hiemem augetur in homine pituita, at vere Sanguis increfcit, æstate bilis, autumnò verò atra bilis.

Cum hæc ita se habeant, par est, morbos qui augentur hieme, æstate finiri: Et qui æstate augentur, hieme desinere; nisi intra certum dierum circuitum solvantur; quicumque au-

tem morbi vere fiunt, horum discessum, autumnò expectare oportet. Quicumque verò autumnales morbi sunt, horum discessum, necesse est vere fieri. Quod si quis morbus hæc tempora transgressus fuerit, eum annum fore scito.

Hæc quoque nosse oportet, quod morbos quos repletio parit, sanat evacuatio, & qui ex evacuatione oriuntur, repletionem curantur, & qui ex immoderato labore fiunt, eos quies sanat, quique ex otio gignuntur, immoderato labore tolluntur.

Omnino Medicum sua prudentia obviam ire convenit morbis instantibus, & naturis, & anni temporibus, & ætatibus, contentaque solvere, & soluta intendere.

Ubi complures uno morbo, eadem tempestate, vexantur, in id, quod maximè commune est, quoque omnes utimur, potissimum rejicienda causa est: Id autem est quod inspirando trahimus.

In Dorsi & coxendicum doloribus, ex malleolis externis venæ sectiones fieri debent, in lumborum verò & testium doloribus, ex malleolis internis.

Probe nosse convenit hominem prima ætate in omni vita esse calidissimum, postrema verò frigidissimum.

## De Genitura.

περὶ γένεως.

**G**enituram ex toto corpore, & ex solidis, & mollibus partibus, & ex universo totius corporis humido, fecerni assevero. Cujus rei istud est argumentum, quod ubi rem veream exercemus, tantillo emissio imbecilles evadimus. Semen verò è corpore etiam emittit mulier.

In venere exercenda longe minorem, quam vir, voluptatem mulier percipit, vir verò etiam diuturniorem.

Qui juxta aures sectionem experti sunt,

Aph. 22.  
sect. 2.  
De Flatibus.

Lib. de  
Ossium  
natura.



sunt, si venerem quidem exercent, verum semen paucum, imbecillum, & infæcundum emittunt. Maxima siquidem seminis pars, è capite secundum aures in spinalem medullam fertur.

Humidi 4. sunt species, Sanguis, bilis, aqua & pituita.

Sic autem se res habent mulierum, si quidem cum viris rem habeant, magis sanæ sunt: Sin contra, minus benè habent. Nam & coitu uteri humidiores evadunt, qui si plus æquo siccescant, vehementer contrahuntur, sicque contracti, corpori dolorem afferunt, coitus etiam Sanguinem excalesciens, & humectans causa est, ut menses facilius profluant, quibus minimè prodeuntibus, morbis obnoxia mulieres redduntur.

### De Natura Pueri.

περὶ φύσεως παιδίου.

**S**i genitura ab utroque parente profecta, in mulieris utero permanferit, primum quidem simul permiscetur, condensatur, & calore increscit, deinde spiritum concipit, tum quia loco calido existit, tum quia mater spirat. Ubi spiritu repleta fuerit, viam ipse sibi foras facit, qua per mediam genituram exeat; ubi verò via facta, spiritus ille calidus foras erupit, alium rursus frigidum à matre ad se attrahit, idque toto tempore perseverat.

Ubi genitura tota incaluit, & flatu intumuit, ei exteriori parte membrana circumducitur, per quam ad mediam genituram intrò & foras spiritui transitus fit. Equidem genituram 6. diebus in utero retentam & foras prolapsam ipse vidi, & qualis tunc meo iudicio visa est, ex eò reliquorum conjecturam facio. Quanam autem ratione istud viderim, enarrabo. Mulieri nobis familiari, perelegans erat fidicina, quæ cum viris conversabatur, & quam minimè decebat gravidam esse, ne viliori loco habe-

retur. Hæc audierat quæ mulieres inter se narrant, si quando mulier conceptura sit, genituram intus manere, neque foras egredi. Quibus auditis & intellectis, ea semper in animo habuit: Cumque aliquando genituram non exire percepisset, rem ad Dominam detulit, quæ ad me etiam pervenit: Quo audito, ipsa ut in terram defiliret, iussi. Quod cum jam septies fecisset, genitura in terram cum sonitu defluxit. Quam illa videns non sine admiratione spectavit, ego verò qualis erat referam: Ut si quis ovo crudo externam testam undique auferat, in quo, interiore membrana contentus humor pelluceat; ad hunc fere modum se habebat ille liquor, prætereaque ruber erat & rotundus.

Conspiciebantur autem fibræ albæ & tenues, in membrana, cum sanie crassa, & rubra contentæ, & ipsa membrana exteriori parte cruore, adinstar sugillatorum suffusa erat: In cujus medio tenue quiddam extabat, quod mihi umbilicus esse videbatur, & per illum primum respirasse, ex eoque protendebatur membrana tota genituram completens.

Cum genitura in membrana continetur, spirationem intrò & foras habet, & Sanguine, à Matre in uterum delapso, incrementum accipit.

Caro dum increfcit à spiritu discernitur, in eaque simile quodque, ad id quod sibi simile, fertur, densum ad densum, rarum ad rarum, humidum ad humidum; ferturque unumquodque in proprium locum, ad id cum quo cognationem habet, & ex quo etiam ortum est.

Membrorum distinctio in fæmina fit 42. diebus in masculo verò 30. quod longissimum. Ut plurimum enim intrà hoc tempus, vel paulo minus, vel majus ista distingui contingit. Nam & purgatio à partu fit iis, quæ fœminam susceperunt, 42. diebus, quæ verò masculum, 30. Purgationes autem à partu ea de causa mulieribus con-



contingunt, quod primo tempore ad 42. dies in foemina, in masculo vero ad dies 30. paucissimus Sanguis in Pueri alimentum cedit, ex eo vero ad partum usque tempore, copiosior; ac sanè purgationem in partus purgamentis reddit, & foras exire pro die-rum ratione oportet.

Postquam singulis diebus, toto quo diximus tempore, purgatio foras procedit, primò quidem quantum he-mina attica una & dimidia, vel paulo plus aut minus pro ejus ratione, dum cesset. Prodit autem velut à vi-ctima Sanguis, si benè habeat & be-nè habitura sit mulier, citòque con-crescit.

Nisi à partus purgamentis mulier repurgetur, magno morbo tentabi-tur, vitæque periculum incurret, nisi quis celeri adhibita curatione, con-venientem purgationem promoveat.

Partus purgamenta primis diebus plurima prodeunt, deinde sensim im-minuuntur, donec desinant.

Ad masculi motum trium mensium tempus conceditur, foeminae vero, quatuor. Sic enim ut plurimum con-tingit. Et si etiam quidam Pueri antè hoc tempus moventur. Primum au-tem mas movetur, quod fœmella sit robustior. Cum autem fœtus move-tur, tunc sanè lac de se significatio-nem Matri exhibet.

Pecora cum uterum gerunt, nisi morbo aliquo laborent, potu ciboque pinguiora evadunt; itidemque mu-lier, ex eo quod uterus fœtu intume-scens, fœtæ ventrem comprimat, qua compressione, quod in cibo & potu pinguius est, foras in omentum & carnem profilit.

Arbores quæ ex aliorum inocula-tione proveniunt, ex non illarum si-milem, in quas insitæ sunt, fructum ferunt. Quod hoc modo contingit. Primo quidem oculus germinare inci-pit, cum alimentum habeat primum quidem ab arbore à qua avulsus est; tum vero ab ea in quam insitus est. Ubi pullularit, tenues ex se radices in arborem demittit, primumque ar-

boris humore, in quam insitus est, fruitur, deinde temporis spatio radi-ces in terram demittit, per eam in quam insitus est, & attracto à terra humore fruitur, indeque alimentum sumit. Ut proinde mirum minimè videri debeat, si insitæ arbores alios fructus proferant, cum à terra vi-vant.

Puer ubi in utero existit, manibus ad genas adhæret, caputque pedibus proximum habet, neque certò digno-scere queas etiam si Puerum in utero videas; utrum caput sursum an deor-sum vergat.

Quando mulieri partus instat, tum se movente Puer, & manibus ac pe-dibus se jactante, membranam quan-dam abrumpi contingit. Qua rupta, cæteræ imbecilliores fiunt, primum-que rumpuntur quæ illam contingunt, deinde postrema. Ruptis autem mem-branis, fœtus vinculo exolvitur, & agitated foras prodit. Cum vero Puer prodit, utero dilatato, qui mol-lis est, vi sibi viam aperit, & in ca-put fertur, si secundum naturam e-xierit.

Quamdiu autem in uteris manet (fœtus) validior semper evadit, dum membranas decimo mense perrum-pat, quando Matri partus instat. Quod si vis quædam Pueri contingat, etiam antè præfinitum tempus foras prodit: Quin etiam si alimento à Matre prius destituatur, sic quoque antè tempus partio ingruit. At vero si quæ ultra decem menses utero ge-llare sibi visæ sunt (quod jam sæpe audiui) sibi ipsis imponunt. Cur au-tem non longiore quam 10. mensium spatio, fœtum utero gellari contin-gat, referam. Post exactos 10. men-ses, ubi fœtus grandior est, alimen-tum & incrementum, quod à matre demittitur, non ampliùs puero suffi-cere potest: Quod in Sanguine enim dulcissimum est, ad se attrahit, si-mulque aliquantula lactis portione fruitur.

Quæ cum ipsi pauciora sint, puer-que jam plenior factus, plus alimenti quam



quam adſit , requirat , ipſe ſe jaſtans , membranas diſrumpit .

Procreatur avis ex ovi luteo , alimentum verò & incrementum , quod in ovo eſt candidum . Quod omnibus qui animum adverterint conſpicuum eſſe poteſt . Cum autem alimentum ex ovo pullo deficit , neque ſatis ei ſuppetit unde vivat , copioſius alimentum poſtulans , vehementer movetur in ovo , & membranæ circumcirca diſrumpuntur . Et ubi avis pul- lum vehementer moveri ſenſerit , putamen tundendo excavans , ipſum excludit . Atque hæc intrâ dies 20. contingere ſolent , idque ita ſe habere manifeſtum eſt . Nam ubi volucris ovi teſtam contundendo excavavit , nihil penitus humoris quod alicujus ſit momenti in ea ineſt , quod totus in pullum abſumptus ſit .

Si quis ova 20. aut plura gallinis duabus aut pluribus , ut excludantur , ſupponat , & ſingulis diebus à ſecundo exorſus , ad ultimum uſque quo ovi putamen detrahatur , ſubtrahat , frangat , & diligenter inſpiciat , is eo , quo dixi , modo , omnia ſe habere deprehendet ; ſi modo avis naturam cum humana conferre licet . Ex umbilico enim membranas portendi , aliaque omnia quæ de Puero dicta ſunt , eodem prorſus ſe habere modo , in ovo gallinaceo comperies .

### De Carnibus ſeu de Principiis .

Περὶ κρεμνῶν vel κρεμνῶν .

**Q**uod calidum vocamus , id mihi immortale eſſe videtur , cunctaque intelligere , videre , & audire , ſentireque omnia , tum præſentia tum futura : Duæ ſunt à corde venæ cavæ & hæc quidem arteria , illa vero vena cava nominatur . Arteria calidi plus continet quam vena cava , & ſpiritus penus eſt .

Puer dum in utero eſt , compreſſis labris ex Matris utero , tum alimentum ſugit , tum etiam ſpiritum , qui in Puero calidiſſimus eſt , Matre re-

ſpirante , in cor attrahit . Quod ſi quis roget , unde quis hoc ſciat , quod , ver in utero trahat & ſugat : Huic ita reſpondendum , pueri naſcuntur ſtercus in inteſtinis habentes , & quam primum nati fuerint , tum homines , tum pecora , ilico alvum deponunt ; atqui nullum haberent ſtercus , niſi in utero ſuſiſſent , imo neque mammam ilico ut natum eſt animal ſugere noſſet , ſi non in utero ſuſiſſet .

Hominibus plerique quarto ſeptenario annorum duo dentes enaſcuntur , qui moderatores nominantur ( πωλιῶντες . )

Genitura intra 7. dies habet quæcunque ex corpore ei accedere neceſſe eſt ; ut multoties vidi . Ea enim in aquam conjeſta , ſi acuratiuſ inſpexeris , membra omnia habere deprehendes , & oculorum regiones , & aures & brachia ; quin & manuum digiti , & crura , & pedes , & pedum digiti , & pudendum , & reliquum totum corpus in conſpicio eſt .

Mulier ubi concepit , ſtatim inhorreſcit , & incaleſcit , ac dentibus ſtridet , & articulum reliquumque corpus convulſio prehendit , & uterum torpor .

Puer 7. menſe natus , certa ratione in lucem prodiit & vitalis eſt . Octavo autem menſe natus nullus unquam vixit . Novem autem menſium & decem dierum fætus editus , & vitalis eſt , numerumque ad hebdomadas exactè reſpondentem habet . Quatuor nempe decades hebdomadarum dies ſunt 280. hebdomadarum autem decuriam dies 70. conſtituunt . At 7. menſe editus partus , tres hebdomadarum decurias obtinet , quæ faciunt dies 210. forte quis mirabitur fætum 7. menſe naſci , atque id quidem certè & ſæpius vidi . Quod ſi quis volet , id facile deprehendet , obſtetrices quæ parturientibus præſunt adeundo , & percontando .



## De Septimestri Partu.

Περὶ ἑπτομήνης.

**S**eptimestres nascuntur diebus centum & octoginta duobus, & insuper addita quadam diei particula.

Ex his qui septimo mense nati sunt, supersunt quidam, licet ex multis pauci.

Mulieribus de partu fides habenda est; quæ semper proferunt & affirmant, 7. mense, & 8, & 9, & 10, & 11, partus in lucem prodire, & ex his octavo mense natos minimè superesse.

Pueris ubi 7. menses attigerunt, tum alia eximia in corporibus fiunt, tum eò tempore dentes apparere incipiunt.

## De Octimestri Partu.

Περὶ ὀκταμήνης.

**Q**uod ad partum qui octavo mense editur, attinet, fieri non posse assevero, ut duas continenter consequentes afflictiones Pueri perferant. Ideoque eos qui octavo mense nascuntur, minimè superesse. Hic etenim accidit, ut ea quæ in utero est, & ea quæ in partu fit afflictione, consequenter laborent. Propterea eorum qui octavo mense eduntur, nullus est superstes. Decimestres nuncupatos 7. dierum quadragenariis potissimum, in lucem edi sentio. Perfectissimus fœtus est primis quadraginta diebus.

## De Superfætatione.

Περὶ ἐπιπύσης.

**C**um fœtus mortuus fuerit, tum aliis signis conijcere licet, tum etiam jubere oportet, ut modo quidem dextrum in latus jaceat, modo etiam in sinistrum convertatur; dilabitur enim fœtus in utero, quocunque se vertat mulier, velut saxum,

aut aliud quidpiam, si mortuus fuerit, & pectinem frigidum mulier habet.

Si parturienti, antè fœtum multus sanguinolentus citra dolorem fluxus contingat, periculum est, ne fœtus mortuus exeat, aut minimè vitalis edatur.

Mulier prægnans si venerem non exerceat, partu facilius liberabitur.

Prægnantem mulierem vel oculi retracti & caviore redditi tibi indicabunt, & oculorum candidum albedinem nativam non habens, sed lividius.

Prægnantibus si terra aut carbones in cibum expetuntur, eaque edant, in fœtus capite, ubi in lucem editus fuerit, horum signum appareret.

Mulier quæ præter naturam crassa & pinguis evasit, & pituita repleta, eò tempore non concipit, quæ verò sua natura talis est, horum gratia concipiet, nisi aliud quid impediatur.

Quæ citò concipiebat, si concipere desinat, bis in anno manuum & crurum venam sibi fecari jubeat.

Si cui dolores in coxendice, aut in capite, aut in manibus, aut aliqua alia corporis parte fuerint, cum verò prægnans est, desinunt, conceptu autem ab utero exoluto, rursus insunt, odorata & bibere, & ad uteri os apponere conducit.

Lib. περὶ ἀφορῶν.

Si noscat mulier se genituram suscepisse, tunc ne virum adeat, sed quiescat: Id autem cognoscet, si quidem vir se semen emisisse dicat, mulier verò præ siccitate ignoret. Sin uterus genituram ad pudenda remiserit, & mulier humecta evadat, rursus cum viro concumbat, quoad concipiat.

Lib. περὶ ἀφορῶν.

Mulier quæ concipit quidem, fœtus autem bimestres perdit, eo exacto tempore, neque priùs neque postea.



sterius, idque bis aut ter illi contigit, quinetiam si trimestres, aut quadrimestres, aut etiam majores fætus ad eundem istum modum perdat, his uteri in majorem amplitudinem non ampliùs increſcunt.

*Lib. περὶ ἀφορῶν.*

Vernum tempus ad conceptum maximè accomodatum.

Virgini, si menses suo tempore non appareant, multum & febricitat, & dolet, sitit, esurit, vomit, infania vexatur, & rursus ad mentem venit.

De Dentitione.

*Περὶ ὀδοντοφυίας.*

**E**X lactentibus qui urinam multam reddunt, minimè per annum durant.

Quibus alvus multum fertur, si benè concoquant, ii melius habent.

Quibus cum dentes erumpunt, alvus crebrius demittit, minus convulsionem tentantur, quam quibus sic raro alvus subducitur.

Quibus in dentitione febris acuta accedit, ii raro convulsionibus tentantur: Qui cum dentitione benè habito corpore permanent, gravi somno premuntur, periculum est ne eos convulsioprehendat.

Quibus hieme dentes erumpunt, si cætera similiter se habeant, ii melius degunt.

Non omnes dentibus erumpentibus convulsionem tentati, moriuntur, plerique etiam servantur.

Qui cum tussi dentiunt, iis tardius dentes erumpunt, in ipsa autem punçtione, magis extenuantur.

De Corde.

*Περὶ καρδίας.*

**H**umiditatem cor tantam habet quanta maximè ad æstuantis medelam satis fit.

Cor musculus est validus admodum, duos discretos habens in uno amictu ventriculos, utrinque quidem unum, qui nullo modo inter se sunt similes.

Mens humana in sinistro ventriculo à natura insita est. Et reliquæ animæ imperat.

De Glandulis.

*Περὶ ἀδένων.*

**C**erebrum ipsum quasi Glandula est. De capite fluxiones velut secretionem contingunt, per aures secundum naturam, per oculos, per nares, tres numero. Aliæ per palatum in fauces, ingulam, aliæ per venas in spinalem medullam, in Sanguinem, omnes numero septem; eæ si discedunt, cerebri purgamenta sunt, & nisi discedant; ipsi morbum creant, non secus ac reliquo corpori, si intrò & minimè foras disceſſerint.

De Ossium Natura.

*Περὶ ὀστέων φύσεως.*

**D**anda est opera, ut quam maximè procul à locis in quibus dolores fieri, & Sanguis colligi solet, venæ sectiones faciamus. Ad hunc enim modum continget minimè magna repenti mutatio, & translata consuetudine efficiet, ut ne ampliùs ad eundem locum coeat. Ossa corpori firmitatem, rectitudinem, ac formam præbent, nervi verò flexionem, contractionem & distentionem; carnes autem, & cutis omnium colligationem ac connexionem. Venæ per corpus diffusæ, spiritum, fluxionem & motum exhibent, ab una multas propagines emittentes. Atque hæc una unde exordium sumat, & ubi desinat, non satis mihi compertum est; circulo enim factò principium non invenias.

De



## De Aere locis &amp; Aquis.

Περὶ αἰθέρος, ὑδατῶν, τοῦ αἵματος.

**Q**ui artem Medicam recta investigatione consequi volet, is primum quidem anni tempora in considerationem adhibere debet, quid horum quodque possit. Deinde verò ventos tum calidos, tum frigidos, præcipuè quidem eos, qui omnibus sunt communes, ac deinceps eos qui cuique regioni sunt familiares. Quin etiam aquarum facultates animo reputare oportet. Quemadmodum enim gustu & pondere, ita & facultate, singulæ plurimum differunt. Terra etiam ipsa inspicienda, nuda ne sit, & aquis careat, an densa & irrigua, & an cavo loco sita sit & æstuoso, an verò sublimi & frigido. Hominum quoque victus ratio, quam maxime delectentur, inspicienda, an potui, & cibis & otio dediti, an exercitationibus & laboribus gaudeant, & an edaces sint, & à potu sibi temperent, & ex his singula reputare oportet. Hæc enim, præcipue quidem omnia, aut certè plurima probè qui agnoverit, cum ad urbem sibi ignotam pervenerit, cum neque morbi regioni familiares, neque communium quæ sit natura, latere poterit, ut neque in eorum curatione hæsitare aut aberrare possit.

Qui verò ista rectè cognoverit, is cuiusque temporis impendentis, & anni statum prædicere poterit, & quinam morbi tam æstate, quam hieme in Urbe communiter sint grassaturi, tum etiam quinam cuique privatim ex victus mutatione impendere debeant.

Ad artem Medicam Astronomia plurimum confert.

Hieme frigida Homines capita humida & pituita redundantia habere æquum est, & pituita ex capite defluente, eorum alvos crebrò exturbari, eosque ut plurimum habitu corporis esse debiliore, ac neque probè edere nec bibere posse.

Quibus autem capita debilia fuerint, si nunquam egregii potores erunt, quod eos crapula magis vexet.

Calidæ sunt aquæ, ubi aut ferrum nascitur, aut æs, aut argentum, aut aurum, aut sulphur, aut alumen, aut bitumen, aut nitrum: Hæc enim omnia caloris vi proveniunt.

Optimæ sunt aquæ quæ ex profundissimis fontibus proveniunt, maxime verò commendantur, quarum fontes ad solis exortus præsertimque æstivos decurrunt; limpidiores enim, & boni odoris, & leves esse necesse est.

Qui sanus est ac valet, is nullo habito discrimine, semper aquam quæ adest, bibat.

At verò de aquis salis, propter imperitiam falluntur quidam, quod alvum solvere existimentur, cum maxime alvi dejectionibus repugnent.

Aquæ ex imbribus collectæ levissimæ & dulcissimæ sunt, tenuissimæ, & limpidissimæ. Sol enim quod imprimis in aqua est tenuissimum & levissimum, sursum educit & rapit. Quin etiam ex ipsis hominibus tenuissimum ac levissimum humorem educit; cujus rei maximum est indicium, cum homo vestibus indutus in sole ambulaverit, aut sederit, quasunque enim corporis partes sol aspicit, hæc nullum sudorem emittunt. Sol enim quicquid sudoris comparet, ad se rapit, quæ verò veste conteguntur, hæc exudant, cum verò ad umbram pervenerit, tum corpus æqualiter sudore diffluit.

Pravæ omnes aquæ quæ ex nive & glacie fiunt. Ubi enim semel concreverint, non amplius ad pristinam naturam redeunt. Sed quod in his est splendidum & leve & dulce excernitur & evanescit; remanet verò quod turbidissimum & ponderosissimum. Quod hac ratione deprehendas, si enim hiemis tempore vasculum, certa aquæ mensura affusa, sub dio exponere voles, uti maxime congeletur, deinde postridiè in locum calidum dela-



delatum, ubi glacies maximè liqueſcat, cum ſoluta fuerit, iterum aquam metiaris, aquam multo pauciorẽ reperias.

De annis hoc modo conſideratione adhibita quis ſtatuat, qualiſnam annus futurus ſit, numne ſalubris, an morboſus. Siquidem ſecundum rationem, in ſiderum ortu & occaſu ſigna appareant, ſi per autumnum pluatur, & hiems ſit moderata, neque admodum blanda, neque prætermo- dum frigida, & vere ac æſtate aquæ tempeſtivæ eveniant, ſic annum ſaluberrimum eſſe, conſentaneum eſt.

*Apho. 11. Seſſ. 3.* Quod ſi hiems ſicca fuerit & aquilonia, verò verò pluvium & auſtrinum, æſtatem febribus abundare, & lippitudines inducere neceſſe eſt. Ubi enim ab imbribus vernis, & ab auſtro terra humectata fuerit, & plenior æſtus derepente ſupervenerit, tum à terra madida & calida exiſtente, tum à ſole adurente, ardorem conduplicari neceſſe eſt, hominum ventribus minimè conſiſtentibus, neque reſiccato cerebro. Neque enim ubi ver tale extiterit, fieri poteſt, quin corpus & caro nimio humore diſfluant, ita ut omnibus, ac maximè pituitofis, acutiſſimæ febres imminant. Mulieribus verò & naturis maximè humidis, dyſenterias contingere par eſt. Ac ſiquidem ſub-caniculæ exortum aqua & Hyberna tempeſtas ſupervenerit, eteſiæque ſpiraverint, quietis ſpes eſt, autumnumque ſalubrem fore. Alioqui periculum eſt ne Pueri & mulieres moriantur, minimè verò ſenes, aut ne qui evaſerint in quartanas tandem incidant, & ex quartanis in aquam intercutem.

*Apho. 12. Seſſ. 3.* Ac ſi hiems quidem auſtrina, pluvioſa & placida fuerit; verò verò aquilonium, ſiccum & tempeſtuoſum, primum quidem mulieris prægnantes, quibus partus in ver imminet, abortionem facturæ eſt veriſimile, quæ verò pepererint, adeo imbecillos ac morboſos fætus parituras, ut

Burnet Parte II.

aut ſtatim pereant, aut tenues, debiles & valetudinarii vivant. Atque hæc quidem mulieribus; reliquis verò, dyſenterias & lippitudines ſiccas, nonnullisquẽ deſluxiones à capite in pulmonem.

Si verò æſtas pluvioſa fuerit & auſtrina, & autumnus ſimiliter, morboſam eſſe hiemem neceſſe eſt, iſque qui pituita abundant, & 40. annum exceſſerunt, febres ardentes contingere æquum eſt; bilioſis verò, pleuritides & pulmonum inflammationes.

At ſicca & aquilonia fuerit, au- *Apho. ſeſſ. 3.* tumnus verò pluvius & auſtrinus, ſub hiemem, capitis dolores, & cerebri ſiderationes fieri par eſt, ac præterea raucedines, gravedines, & tuſſes, & nonnullis quoque tabes.

Quod ſi aquilonius & ſiccus fuerit autumnus, ac neque ſub arcturum pluvioſus, pituitofis, quidem, naturaque humidis, & mulieribus confert, bilioſis verò hoc maximè adverſum. Admodum enim reſiccantur, iſque lippitudines aridæ contingunt, & febres acutæ ac diuturnæ, quibuſdam etiam melancholiæ. In bile namque quicquid eſt humidiffimum & aquoſiſſimum conſumitur, quod verò craſſiſſimum & accerrimum remanet, quod in Sanguine eadem quoque ratione accidit, unde ii morbi illis contingunt. Pituitofis verò, hæc omnia auxilio ſunt.

Præcipuè maximæ anni temporum mutationes obſervandæ ſunt, ut neque Medicamentum purgans lubenter exhibeamus, neque partes circa ventrem uramus, aut ſecemus, ante dies 10. aut etiam plures, ſufficiunt tamen 10. at maximi periculi plena ſunt ambo ſolſtitia, præcipuè æſtivum, periculoſiſſima etiam ambo æquinoctia exiſtimantur, maximè verò autumnale. Siderum quoque ortus obſervandi, præcipuè caniculæ, deinde Arcturi, & Vergiliarum occaſus. His enim potiffimum

D die-



diebus, morbi iudicationem subeunt, & alii quidem perimunt, alii verò desinunt, aliique omnes in alium statum transeunt.

(Oriuntur Vergiliæ seu Pleiades circa finem Aprilis, & occidunt sub initium Novembris, Arcturus oritur mense Septembri. Hiems durat à Plejadum occasu usque ad æquinoctium vernum, ver à verno æquinoctio ad Plejadum usque exortum. Æstas verò à Plejadum ortu, ad ortum Arcturi. Autumnus deniq; ab ortu Arcturi ad Plejadum occasum.)

De macrocephalis circa Mæotidem paludem degentibus, quemadmodum se habeant, mihi dicendum est. Initio quidem hominum institutum longitudinis capitis causa fuisse videtur. Nunc verò natura etiam ad institutum accedit. Longissima enim habentes capita generosissimos existimant. Hujusmodi est institutum. Cum primum editus est infans, caput ejus adhuc tenellum & molle manibus effingunt, & in longitudinem adolescere cogunt, vinculis & idoneis artibus adhibitis, quibus capitis rotunditas vitietur, & longitudo augeatur. Hoc institutum primum hujusmodi naturæ dedit initium. Successu verò temporis in naturam abiit; ut proinde instituto nil ampliùs opis esset. Semen enim genitale ex omnibus corporis partibus provenit, ex sanis quidem sanum, & ex morbosis morbosum. Si igitur ex calvis calvi gignuntur, & ex distortis ut plurimum distorti, quid prohibet, cur non etiam ex macrocephalo, macrocephalus gignatur.

Cur Asiatici Europæis minus bellicosi existant, & moribus sint lenioribus, anni tempestates in causa sunt, quæ non magnas, tum ad calorem, tum ad frigus, permutationes faciunt, verum similes permanent: Unde neque mens stupore permanet: Unde neque corpus vehementer à suo statu dimovetur. Ex quibus ira exasperari, ac prudentiæ & caloris compotes fieri magis æ-

quum est, quam si eodem semper statu permaneant: Mutationes enim inter omnia, Hominis mentem semper excitant, neque sinunt quiescere. Quas ob causas mihi Asiaticorum genus omni ope destitutum videtur; quibus præterea eorum instituta accedere debent. Multo enim maxima Asiæ pars regum Imperio regitur. Qui verò sui potestatem non habent, neque sui juris sunt, sed Dominis subditi, ii rerum bellicarum nullam curam habent, sed ut ne bellicosi videantur.

Scythæ Carnibus coctis vescuntur, & lacte equino in potu utuntur. Et hippaco (ἵππικον) i.e. caseo equino viſſitant. Plerique Scythæ eunuchi sunt, & evirati, & effæminati evadunt, ex eò quod ex defluxione ob diuturnas equitationes laborantes, & circa coxendicem claudicantes, sibi ipsis medentur, utramque venam post aures incidendo. Hac enim curatione seipsos perdunt; juxta aures quippe venæ sunt, quæ incisæ sterilitatem inducunt.

## De Flatibus.

Περὶ φουδῶν.

**M**edicus non nisi quæ periculo sunt proxima intuetur, & quæ sunt ingrata contrectat, atq; ex aliorum calamitatibus sibi dolorem conciliat.

Ægrotantes verò artis opera, maximis malis, morbis, laboribus, dolore, & morte, vindicantur. His enim omnibus Medicina manifestam medelam adhibere deprehenditur.

Hujus artis vilia nosse difficile, seria verò facile, ac vilia quidem ipsis Medicis, vulgo autem minimè sunt cognita, cum mentis non corporis opera existant. Obscurissimos & maximè difficiles morbos opinio magis quam ars iudicat. Etsi in his plurimum imperitiæ peritia præstat.

Qui morbi causam cognoverit, is uti-

Indigna  
prorsus  
Hippocr.  
Sententia.



utique ex his quæ in corpore insunt ,  
adepta per contraria morborum co-  
gnitione , facile poterit quæ conse-  
runt offerre . Ipsa enim ars Medica  
maximè à natura inest .

De natu-  
ra Homi-  
nis .

Plenitudinem evacuatio sanat , e-  
vacuationem plenitudo , laborem o-  
tium , & otium labor . Atque ut uno  
verbo dicam , contrariorum contraria  
sunt remedia .

Medicina additio est & subtractio ,  
eorum quidem quæ exuperant , Sub-  
tractio , eorum verò quæ deficiunt ,  
additio . Qui verò istud optimè facit ,  
is optimus Medicus existimandus est ,  
quique plurimum abest ab eo præstan-  
do , is plurimum in arte Medica de-  
ficere censetur .

Hominum & reliquorum animan-  
tium corpora triplici alimento nu-  
triantur , cibo , potu & spiritu .

Tanta corporibus omnibus spiritus  
inest necessitas , ut si quis aliis omni-  
bus , & cibis & potionibus abstineat ,  
duos tamen , & tres , vel plures dies  
possit vitam ducere . At si quis spiri-  
tus in corpus vias intercipiat , vel exi-  
gua diei parte , homini pereundum  
est ; adeò necessarius est usus spiritus  
in corpore .

#### De Morbo Sacro .

Περὶ ἱερῆς νόσου .

**M**Orbus hic nihil habet aliis  
morbis divinius aut sacratius ,  
sed eandem , ex qua reliqui morbi o-  
riuntur , naturam sortitus est . Ho-  
mines verò ex imperitia , & admira-  
tione ei naturam quandam & causam  
divinam inesse censuerunt , quod nul-  
la in re reliquorum morborum similis  
esset .

Hic morbus pituitosis contingit ,  
biliosis verò minimè . Ac originis  
initium sumit , cum adhuc fœtus in  
utero existit .

Quibus in puerili ætate ulcera in  
caput , in aures , & reliquum corpus  
erumpunt , si salivosi mucosique ex-  
titerint , ii procedente quidem æta-

te facillimè degent . Tunc enim  
pituita , quam in utero repurgari  
oportuerat , emittitur & purgatur ;  
quique sic purgati fuerint , ferè hoc  
morbo comitiali minimè corripiun-  
tur . Qui verò puri fuerint , ut ne-  
que ulcus ullum habuerint , neque  
mucus , aut saliva ulla prodierit ,  
periculum est , ne ii hoc morbo cor-  
ripiantur .

Oves , & præsertim capræ frequen-  
tissimè hoc morboprehenduntur .

Cum inveteraverit morbus , am-  
plius curari non potest .

Quibus morbus jam in consuetudi-  
nem venit , ii se correptum iri præ-  
sentiunt , & hominum conspectum  
fugiunt , domumque , si propè sit , se  
conferunt , sin minus , in solitudinem ,  
quo quam paucissimi eos cadentes vi-  
deant , statimque se contegunt , pro-  
pter affectionis verecundiam , & non  
( ut plerique existimant ) propter nu-  
minis metum .

Oportet Medicum non augere  
morbum , sed properanter profligare ,  
id quod cuique morbo est maximè ad-  
versum , non amicum aut familiare  
exhibendo .

#### SECTIO QUARTA .

Continens τὰ διαθητικά .

#### De Salubri Victus ratione .

Περὶ διατης ὑγιεινῆς .

**C**Rassi qui tenues fieri cupiunt , ii  
jejuni omnes exercitationes su-  
bire , & adhuc ex labore anhelantes ,  
nec dum refrigerati , cibos aggredi  
debent , priusque vinum bibere dilu-  
tum non admodum frigidum . Quin-  
& semel cibus capiendus , & duriter  
cubandum .

Sex Hibernis mensibus vomitus  
ciendus , quod tempus hoc æstivo  
plus pituitæ gignat , & morbi circa  
caput & regionem eam , quæ est supra  
septum transversum , excitantur . At  
ubi æstas viguerit , infusis utendum .

D 2. Hæc



Hæc enim anni tempestas æstuosa est, & corpus bile magis abundat, gravitates etiam lumbos & genua infestant, calores oboriuntur, & venter torminibus torquetur. Corpus igitur refrigerandum, & quæ sursum attolluntur, deorsum ex istis locis deducenda.

Obæsi ac minimè tenues jejuni vomant. Graciliores autem, & imbecilliores, à cibis vomitum cieant.

Qui singulis mensibus bis vomere consuevit, hunc præstat duobus ex ordine diebus vomitum ciere, quamvis die.

Qui postridie cibos eructant, & quibus præcordia, nimirum cibis non concoctis, attolluntur, iis longior somnus confert.

## LIBER PRIMUS.

### De Victus Ratione.

Περὶ διαίτης τὸ πρῶτον.

**N**ullus eorum qui antè nos scripserunt, reprehendendus, quod omnia invenire non potuerint, quin potius laudandi omnes, quod quædam investigatione aggressi sunt.

Si inventus fuerit cujusque naturæ conveniens cibi modus, & laborum numerus, qui neque supra, neque infra, modum excedat, sanitas sanè hominibus exactè inventa fuerit.

Non enim morbi derepente hominibus contingunt, sed paulatim collecti, acervatim se produnt.

Omnia tum animantia, tum homo ipse, ex duobus facultate quidem diversis, usu verò consentientibus, constant, igne inquam, & aqua.

Quæ duo simul juncta, tum aliis omnibus, tum sibi invicem satis sunt: Utrumque verò seorsim, neque sibi ipsi, neque cuiquam alteri satis esse potest. Horum utrumque hanc obtinet facultatem. Ignis si quidem omnia semper movere,

aqua verò omnia semper nutrire potest.

Irreptit in hominem animus (Lux) ignis & aquæ temperationem sortitus, corporis humani portionem.

Ars Medica ab eo quod molestum est, liberat, & id, ex quo quis ægrotat, auferendo, sanitatem reddit: Idem & natura per se facere novit.

## LIBER SECUNDUS.

### De Victus Ratione.

Περὶ διαίτης τὸ δεύτερον.

**I**nsulæ continenti vicinæ, rigidiores habent hiemes, marinæ verò tepidiores, propterea quod nives, & glacies in continenti perdurant, & ventos frigidos ad vicinas insulas mittunt: In his verò, quæ in alto sitæ sunt, per hiemem non perdurant.

Venti omnes natura qui frigerant & humectant, variorum regionum & locorum situ, per quæ ad regiones quasque obveniunt, inter se differunt, & frigidiores, calidiores, & humidiores, sicciores, morbosiores, & salubriores existunt.

Hordeum natura quidem frigidum & siccum. Inest & quiddam quod purget, ex pælearum succo.

Lac ovillum alvum sistit, caprinum verò magis alvum subducit, bubulum minus, equinum & asinum per alvum magis demittitur.

Triticum hordeo valentius est, & magis nutrit, minus autem alvum subducit, tum ipsum, tum succus.

Panis ex farina integra nec excussa, siccatur & alvum subducit, purus verò, plus quidem nutrit, minus autem alvum dejicit.

Ex panibus autem, fermentatus quidem levis est, & per alvum secedit. At non fermentatus, minus quidem alvum dejicit, plus verò nutrit.

Fabæ



*Fabæ* alimentum quoddam alvum ſiſtens & flatuoſum exhibent, piſa minus quidem inflant, magis alvum deſciant. *Cicer album* alvum & urinam movet, & nutrit. *Lentes æſtuoſæ* ſunt, & turbant, & neque alvum deſciant, neque ſiſtunt. *Lini ſemen* in cibo ſumptum alvum ſiſtit, & aliquantulum refrigerat.

*Carnes bubulæ validæ* ſunt, & alvum ſiſtunt, nec facile in ventriculis concoquuntur, quoniam craſſi & multi Sanguinis eſt hoc animal. *Caprinæ* carnes his leviores ſunt, & magis alvum deſciant. *Suillæ* his quidem magis corpus roborant, & abunde alvum deſciant. *Agninæ ovillis* ſunt leviores, & hædinæ caprinis, quia exangues magis & humidæ. *Vitulinæ* carnes ad bubulas eodem ſe habent modo: At porcellorum carnes ſuillis ſunt gravioreſ. Hoc enim animal natura carnoſum & exangue, quamdiu tenellum eſt, ſuperabundantem habet humiditatem. *Sylveſtris* ſuis caro ſiccatur, robur affert, & alvum deſcit; *Cervi* verò, ſiccatur & minus alvum deſcit, magis autem urinam provocat. *Leporina* ſicca eſt, & alvum moratur, urinam tamen quodammodo ciet.

Omnia ferè volucrum genera quadrupedibus ſicciora exiſtunt; nam quæ veſicam non habent, neque urinam reddunt, neque ſalivam fundunt, prorsus ſicca ſunt. *Palumbis* caro ſicciffima, deinde *columbæ*, 3. loco *perdicis* & *galli*, ac *turturis*, *anſeris* verò maximè humida. *Anatis* carnes, & reliquarum avium quæ in paludibus, aut aquis degunt, omnes humidæ exiſtunt.

Ex piſcibus leves ſunt ſaxatiles ferè omnes, velut *turdus*, *gobio*.

*Vinum calidum & ſiccum*, habet & purgans quiddam à materia. *Vina nigra & auſtera* ſicciora ſunt, neque per alvum ſecedunt, neque urinam movent, ſed corporis humiditatem abſumendo, ſiccant & caliditatem inferunt. *Dulcia nigra* humidiora ſunt, calefaciunt autem & inflant,

*Burnet Parte II.*

cum humiditatem inducunt. *Alba* verò & auſtera calefaciunt, magis autem urinam movent, quam alvum deſciant. *Vina recentia* alvum magis movent, quod muſto ſint propiora, & nutriunt, item odora magis quam inodora ejuſdem ætatis, quia facilius concoquuntur, & craſſa quam tenuia. At tenuia dulcia, urinam magis & alvum movent, corpusque humectant, & Sanguinem inbecillum reddunt, cum adverſarium corpori Sanguinem augeant. Muſtum flatum movet, & ſubducit,urbationemque in ventre, ſuo fervore excitat, alvumque deſcit. *Vina acida* refrigerant, extenuant & humectant. *Sapa* calefacit, humectat & ſubducit.

*Allium calidum*, urinam & alvum movet, oculis minimè bonum. *Nafurtium* calidum eſt, & carnem liquefacit, pituitam albam ſiſtit, proindeque ſtranguriam infert. *Sinapi* calidum eſt, & alvum deſcit, ſed & hoc urinæ difficultatem parit. *Apium* urinam magis quam alvum movet, radices etiam magis quam ipſum, alvum movent.

*Ruta* urinam magis quam alvum movet, & præpota adverſus venena valet.

*Asparagus ſiccus* eſt & alvum ſiſtit. *Salvia ſicca* eſt & alvum ſiſtit.

*Solanum* refrigerat, & in ſomnis, veneris ludibria prohibet.

*Mentha* calefacit & urinam ciet, vomitionemque ſiſtit, ac ſi quis eam sæpè comedat, ejus genitale ſemen ita colliquefacit, ut effluat, & arrigere prohibet, corpusque imbecillum reddit.

*Brasſica* calefacit, per alvum ſecedit, & bilioſa educit.

*Betæ ſuccus* quidem alvum deſcit, olus autem ipſum cibo ſumptum, ſiſtit. Radices verò alvum magis movent.

*Raptum æſtuoſum* eſt, humectat autem, & corpus conturbat, non tamen per alvum ſecedit, verum urinæ difficultatem adfert.



Mora calefaciunt & humectant, per alvumque secedunt. Pyra matura alvum dejiciunt, cruda vero sistunt.

Veneris usus extenuat, humectat & calefacit.

Alvum coactam vomitio solvit, & plus æquo fluidam sistit, illam quidem humectando, hanc vero siccando.

Otium humectat & corpus imbecillum reddit. Quiescens enim animus, corporis humidum minimè absumit: labor siccatur, corpusque validum efficit.

Semel die sumptus cibus extenuat & siccatur, alvumque sistit, quoniam animi calore, ventris & carnis humidum absumitur.

## LIBER TERTIUS.

### De Victus Ratione.

Περὶ διαίτης τοῦ τρίτου.

**A**Nnum plerique in quatuor partes omnibus notas dividunt, hiemem, ver, æstatem, & autumnum: Ac hiemem quidem à vergiliarum occasu ad æquinoctium vernum; ver autem ab æquinoctio ad vergiliarum exortum; æstatem à vergiliarum ortu ad arcturi exortum: Autumnum verò ab arcturo ad vergiliarum occasum.

Vomitionibus post cibos cujusvis generis, humidiores ter in mense utantur, sicciores verò bis.

A cœna minimè deambulandum, sed tantum standum. Mane verò deambulationibus utendum. Soles vitandi, & frigora, tum matutina, tum vespertina, quæcunque à fluminibus, aut stagnis, aut nivibus spirant.

Cum intestinum humiditatem non habeat, stercus ambiens intumescit, viasque obstruit, & dolorem parit, calorprehendit, & quicquid biberit aut comederit, evomit, tandem etiam stercus vomitione rejicit: Quo

cum pervenerit, minimè hic vivere potest.

### De Insomniis.

Περὶ ἐνυπνίου.

**Q**ui de his, quæ per somnos contingunt, rectè conjectaverit, is ea per omnia magnam habere vim comperiet. Quisquis igitur rectè ista dijudicat, is non minimam Sapientiæ partem assequitur.

Oportet manus admoventem, Deorum opem advocare.

Quæ insomnia, de diurnis actionibus mens humana vesperi sub noctem in somnis affert, & eodem modo reddit, quo per diem in re justa, gesta, aut consultata sunt, ea bona, & sanitatem portendere existimanda sunt; propterea quod animus neque plenitudine ulla, neque evacuatione, neque alia re quavis extrinsecus irruente, superatus, in diurnis consiliis perseverat. At insomnia quæ diurnis consiliis adversantur, perturbationem in corpore denunciant. Sol, Luna, Cælum, Stellæ, pura quæque & suo motu agitata, in somnis visa, bona sunt. Sanitatem enim corporis, omniumque ejus partium significant. Quod si quid contra contingat, aliquem corporis morbum portendit. Astris quidem exterior corporis ambitus respondet, Soli Medius, Lunæ verò, qui ad cavitates spectat. Si quod igitur istorum siderum extingui, aut lædi, aut evanescere, aut cursum sustinere (alii à cursu deflectere) videatur, in illa parte morbum eventurum indicat.

Quod si in stagno, aut mari, aut fluminibus quis natare videatur, bonum non est, cum humiditatis exuperantiam indicet. Huic autem victus ratio sicca, & labores conferunt. At febricitanti bonum est, quoniam calor ab humoribus extinguitur.

Mortuos nitidos & candidatos videre bonum est, bonum quoque quid purum ab ipsis sumere. Quod si con-



tra quis nudos, aut atratos, aut sordidos, aut aliquid accipientes, vel ædibus exportantes videat, minimè est accommodatum; morbum enim indicat.

Per somnum, si quis solitos cibos, aut potus sibi edere videatur, alimentum inopiam, animique abjectionem indicat.

Fluviorum transitus, hostes armati, monstra difformia, morbum, aut furorem prælagiunt.

### De Alimento.

πρὸς τὸν σπλάγχνιον.

**I**N alimentorum genere, id quod alit, alimentum est, quod alimento est proximum, & quod alimentum est futurum.

Alimentum in pilos, in ungues, & in extimam superficiem ab internis partibus pervenit, rursusque ab externis partibus extremaque superficie ad interna redit.

Confluxio una, conspiratio una, consentientia omnia.

Venarum origo tanquam radix, hepar est, & arteriarum cor. Ex his per omnia Sanguis, & Spiritus pervagatur, calorque per hæc permeat.

Medulla ossis alimentum, ideo calor firmatur.

Facultas omnia auget, & alit, ac propagat.

### De Ratione Viçtus in Morbis acutis.

πρὸς τὸν δεινὸν ἐξέλι.

**M**aximè cum Medicum probaverim, qui in morbis acutis longè melius cæteris se gerat. Sunt autem hi, pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, febris ardens, & quicunque alii morbi ad hos consequuntur, quorum febres omninò continuè interficiunt.

Eadem omnia videntur plebeis di-

cere Medici tum meliores, tum deteriores.

Ptisana rectè videtur omnibus frumentaceis eduliis præferri in morbis acutis, eosque qui eam prætulerunt laudo. Nam & lentorem habet lævem, continuum, & suavem, ac lubricum, mediocriter humescentem, sitim minimè inferentem, & si quid elui indiget, probè abludentem, neque adstringit, neque malamurbationem adfert, neque in ventre intumescit, nempe inter coquendum quoad maximè fieri potuit, intumuit.

Si lateris dolore continuo, neque ad calida fomenta remittente, sputoque minimè prodeunte, verum citra concoctionem, extremè glutinoso reddito, nisi quis dolorem, vel ventre emollito, vel secta vena solverit, aut utrum horum conducere videbitur, exhibuerit, ptisanam autem ita affectis dederit, præcipientes eos in mortem adducit. Has igitur ob causas, aliasque hujusmodi, quæ tota utuntur ptisana 7. die, aut citius, moriuntur, alii quidem mente percussi, alii verò ab orthopnæia stertore suffocati.

Lateris dolorem si per exordia, si postea incidat, fomentis calidis tentare dissolvere, absurdum non est. Quorum quidem optimum est, aqua calida, in utre vel vesica, vase æneo, aut testaceo adhibita. Verum molle quippiam lateri, quo lenior fottus fiat, supponere oportet; utiliter admovetur spongia mollis & magna ex aqua calida expressa, fomentumque linteum involvendum, ut longiore tempore sufficiat & perduret. Hordeum item & eruum, in aceto ita temperato, ut paulo acidius sit, quam quis bibere queat, macerata & fervefacta, sacculis confuta apponere oportet; surfuresque eodem modo. Ad siccum autem fomentum, sales milium torrefactum in sacculis laneis, maximè accommodantur. Quod si ad calida fomenta dolor non remittat, non multo tempore



calefacere convenit, quod in pulmone exsiccat, & pus intra thoracem colligat.

Venæ sectio non æque dolorem solvit, nisi dolor ad jugulum pertingat; tunc ex interna cubiti vena, quam citissimè copiosum Sanguinem detrudere convenit, eo usque dum multo rubicundior, aut pro puro & rubro, lividus effluat. Utrumque enim usu venit. Si verò eas, quæ sunt sub septo transverso, partes dolor affligat, nullamque ad jugulum de se significationem præbeat, alvum veratro nigro, aut peplio emollire oportet.

Ptisanam quidem, ubi potum est medicamentum, insuper sorbendam statim dare oportet, neque admodum minore quam consuetum est quantitate.

Sed rationi consentaneum est, media in purgatione, sorbitionem non exhibere.

Multo gravius ferunt insuetam cibi abstinentiam, qui parte superiore ventris sunt biliosi. ( *πικρόχολοι τῷ ἔνδω.* )

Maximæ mutationes morbos potissimum pariunt.

Non ita peritos Medicos video, ut virium infirmitates in morbis dignoscant, quæ vel ex vasorum inanitione perficiuntur, vel ob aliud quoddam irritamentum, quæque ob dolorem, & morbi vehementiam, quamvis hæc cognita aut ignorata salutem aut mortem afferunt. Majus siquidem malum est, si ob dolorem, aut morbi vehementiam debilitato, quis potum, aut sorbitionem copiosiore, aut cibum exhibeat, ob vasorum inanitionem debilem esse ratus.

Indecorum autem est, probroque vertitur, si quis ex vasorum inanitione ægrè habentem non agnoscat & victus ratione opprimat.

Aceti aciditas biliosis naturis magis confert, quam Melancholicis: Amara enim dissolvuntur, & in pituitam transeunt, dum ab ipso in sublime attolluntur. Nigra verò fer-

mentantur, in sublime attolluntur, & multis partibus augentur: Acetum namque nigra sursum educit. Mulieribus quam viris acetum longe magis est adversum, nempe cum uterum dolore afficiat.

In morbis acutis Sanguinem detrahes, si vehemens fuerit morbus, & qui ægrotant ætate florenti fuerint, & virium robore valuerunt.

Si angina, aut aliquis aliud lateris morbus ægrum divexarit, Medicamentis quæ delinguntur repurgato; sin verò detracto copioso Sanguine æger debiliior videatur, infusum alvi per clysterem tertio quoque die exhibebis, donec in tuto æger fuerit, & fame opus habeat.

Pulmonum & laterum inflammationibus hæc instituenda curatio. Si quidem dolor sursum ad jugulum tendat, vel ad mammam & brachium, internam brachii venam secare oportet, ea parte qua dolor affligit, & Sanguinem detrudere pro corporis habitu, anni tempore, ætate & colore, plusque & cum majori fiducia, si dolor acutus fuerit, ad animi usque deliquium ducere, postea clyisma injicere.

Allium optimè editur ei, qui se ad computationem comparare volet, aut jam ebrius est.

Suillæ carniū optimæ sunt, præstantissimæ verò, quæ neque vehementer pingues, neque contra vehementer graciles, neque veteris victimæ ætatem affecutæ, edendæque sine pelle & subfrigidæ.

Si cui Sanguinem detrudere confert, alvum firmam reddere oportet.

Potionem hydropo laboranti ita concinnabis, si cantharidum trium, ablato cujusque capite, pedibus & alis, corpora, in tribus aquæ cyathis contrita, exhibueris.

Ubi verò ex epoto Medicamento laborarit, calida perfundatur, ex oleo tamen prius inunctus, jejunus bibat, edatque panes calidos ex oleo.



SECTIO QUINTA.

Continens Θεραπευτικῆς.

De Morbis . Lib. I.

Περὶ νόσων . α.

Ora venarum in ano Sanguinem fundere ſolita , ( hæmorrhoidas vocant ) intruſo in acum aquam craſſiſſimo & maximo lanæ ſuccidæ filo , deligabis .

Securior enim evadit hæc curatio .

Deinde compreſſas Medicamento putrefacies , neque perfundes donec deciderint , unamque perpetuò relinques .

De Locis in Homine .

Περὶ τῶν ἐν τῷ κατὰ ἄνθρωπον .

**Q**Uicumque à ventris morbus oritur , is levior eſt , quam qui à nervis , diffluit enim una cum humore in venis contento , neque quieſcit .

Ars Medica ut citò addiſcatur fieri nequit , propterea quod in ea firma aliqua doctrina tradi non po- teſt .

Qui artis Medicæ cognitionem habet , is minimum ex Fortuna pendet , ſed & citra fortunam , & cum fortuna , rectè eam adminiſtrabit . Firma enim eſt ars tota Medica , ejuſque præceptiones ex quibus conſtat , pulcherrimæ , fortuna minimum indigere videntur .

Si in medullam fluxio contingat , tabes occulta , ac inconſpicua oboritur .

Cum ambo latera dolent , peripneumonia eſt , cum alterum tantum pleuritis .

Qui ex pulmonis inflammatione , aut morbo laterali pus intro colligunt , minime moriuntur , ſed convaleſcunt .

**Q**UI de morborum curatione , tum ſcitè interrogare , tum ad quæſita reſpondere volet , & commodè objecta reſutare , hæc ſecum reputare convenit . Primum quidem ex quibus morbi omnibus hominibus oriuntur : Deinde verò , qui morbi , cum neceſſarias cauſas habent , aut longi ſunt , aut breves , aut lethales , aut minimè lethales , num pars aliqua corporis mutila reddatur , nec ne . Et qui ubi exorti ſunt , eventa habent dubia , aut mala , aut bona , & ex quibus in quosnam transitiones fiant , quæque Medicis , in ægrorum curatione proſpere ſuccedunt , & quæ ægrotantibus in morbis mala aut bona contingunt , quæque intempeſtivè dicuntur , aut ſunt à Medico erga ægrum , aut ab ægro erga Medicum , quæ etiam in arte exactè ſunt , aut dicuntur , & quæ in ea recta vel non recta , &c.

Moritur , ſi quis vulneratum habet cerebrum , aut ſpinalem medullam , aut jecur , aut ſeptum tranſverſum , aut veſicam , aut venam aliquam multum Sanguinem effundentem , aut cor : Ex vulnere autem minimè mori contingit , ſi his partibus vulnus acceptum non fuerit , ſed ab his quam longiſſime abſit .

Hi morbi ex neceſſitate , cum adſunt , mortem adferunt , tabes , hydrops , mulierem utero gerentem , ſi pulmonis inflammatio , febris ardens , pleuritis , aut phrenitis prehendat , aut ſi eryſipelas in utero oriatur .

Hi verò morbi dubium habent vitæ exitum , peripneumonia , febris ardens , phrenitis , pleuritis , angina , uva , hepaticus & ſplenicus affectus , nephritis , dysenteria , in muliere Sanguinis fluor .

Caen.  
509.



Isti verò minimè lethales, nisi quid ipsis accedat, diurnæ in articulos fluxiones ( *κεδυναι* dictæ ); melancholia, podagra, coxendicum affectus, tenesmus, quartana, tertiana, stranguria, ophthalmia, lepra, impetigo, arthritis.

Ferè in morbis & vulneribus, ubi mala malis ex causis necessariis succedunt, cum ista contingunt, in Medicum causam conferunt, neque talia ex necessitate fieri agnoscunt. Et si ad febricitantem aut vulneratum ingressus, & oblatum quam primùm remedium non juvet, sed postridiè æger pejus habeat, in Medicum culpam rejiciunt; quod si prosit, id tamen non perindè laudant, cum id ei contingere oportere existimant.

Suppuratus sit, si pituita ex capite ad pulmonem destillet, ac primum quidem ut plurimum latenter defluit, tussimque tenuem exhibet, sputumque paulo amarius solito existit, calorque tenuis adest. Temporis autem progressu, exasperatur pulmo, & intus exulceratur à pituita inhærente ac putrescente, pondusque in pectore, & dolorem acutum ante & retrò exhibet, corpus vehementer incallescit, & pulmo à calore trahit ad se pituitam ex toto corpore, & maximè à capite: Caput verò calefactum ex corpore, & hanc putrescentem subcrassam expuit. Quanto enim longius tempus processerit, tanto sincerum magis pus expuit, & febres acutiores fiunt, tussisque crebra, & vehemens, inædia vexat, & tandem alvus infernè turbatur. Cum eò pervenit, perit.

Cerebri sphacelismus, seu corruptio. Si cerebrum corruptum fuerit, dolor ex capite spinam occupat, & ad cor animi deliquium procedit, & sudor est, & somni expers est, & ex naribus Sanguis fluit; sæpe etiam Sanguinem vomit; non audit, & de repente privatur voce.

## De Morbis. Liber 2.

Περὶ νόσων. β.

**Q**Uod si in cerebro venæ superevomuerint ( supervomunt autem ubi bilis & pituita venas subierit ) caput dolor, tenebricosa vertigo, & gravitas occupat: Dolor quidem, ex Sanguinis nimia caliditate, vertigo verò tenebricosa cum Sanguis conferta copia ad faciem processerit; gravitas autem cum Sanguis turbidior & morbosior, in capite majore sit copia, quam intrinsecus. Aures etiam sonitum percipiunt, & nihil audiunt. Et si manus, caput, aut alia corporis pars ita affecta secetur, Sanguis ater & turbidus, ac morbosus effluit.

Si venulæ copiam Sanguinis circa cerebrum superevomuerint, & cerebrum calefecerint, febris ac dolor vehemens ad tempora, sinciput, & posteriorem capitis partem detinet, aures tinnunt, flatibus implentur, nihil audit, æstuat, & præ dolore se ipse incontinenter jactat, hic quinto aut sexto die moritur. Cum sic habuerit, caput calefacito. Si per aures aut nares aqua proruperit, periculum effugit.

Alius morbus. Si venæ in caput superevomuerint, dolor levis ( alii gravis ) totum caput detinet, & ad cervicem pertingit, interdumque ad alias capitis partes transmittit, deinde ubi surrexerit, eum tenebricosa vertigo occupat, febris non prehendit.

Cum sic habuerit, derafo capite, nisi calefactoriis cessarit, à capite frontem qua capillus desinit, scindito, sectam autem deducito, ubi Sanguis defluerit, tenuissimo sale conspergito. Postea verò quam Sanguis defluerit, totam sectionem duplicifilo involutam composito, deinde splenium cera & pice illitum, ulceri, inferiore parte imposito, lana succida apposita, deligato, & finito ad dies septem, nisi dolor detineat, qui



qui ſi detineat, ſolvito. Aquam autem, in qua farina hordei craſſior macerata fuerit, quoad convaluerit, ei bibendam exhibeto, priſanæ verò ſuccum ſorbendum, aquam etiam ſuperbidendam dato.

*Lib. πει πειδω.*

Si tertiana febris detineat, ſi quidem poſt tres acceſſiones, quarta prehendaſſet, medicamentum deorſum purgans propinato. Quod ſi medicamento tibi minimè indigere videatur, pentaphylli radices, acetabuli quantitate, in aqua tritas bibendas dato.

Tabes dorfalis ex ſpinali medulla oritur, præcipue verò recentes ſponſos & libidinoſos corripit, febris ſunt expertes, bene comedunt, & colliguntur. Quod ſi ita affectum perconteris, aſſeret ſibi videri, ex ſuperioribus partibus à capite velut formicas in ſpinam demitti, cumque urinam aut ſtercus reddit, ſemen genitale copioſum & liquidum ei prodit, neque generatio fit, & inter dormiendum, cum uxore dormiat nec ne, veneris ludibria patitur. Cumque alias, tum præcipue per locum arduum iter fecerit, aut cucurrerit, anhelofus & imbecillis evadit. Caput gravatur, & aures ſonant. Hic temporis progreſſu vehementibus febribus correptus, perit ex lipyria febre. Purgato ſuſum & deorſum corpore, lac bubulum per quadraginta dies bibendum exhibeto.

Hydrops pulmonis. Si hydrops in pulmone fiat, febris & tuſſis tenet, & acervatim reſpirat, & pedes tumunt, & ungues contrahuntur, & patitur talia, qualia iſ qui ſuppuratus eſt, ſed debilius ac diuturnius. Et ſi quid infundas, aut fomentum, aut ſuffitum exhibeas, pus non ſequitur, atque ex hoc ſanè cognoveris, non pus, ſed aquam intus eſſe. Et ſi multo tempore, aure ad latera adhibita, audire tentaveris, ebullit intrinſecus velut acetum: Et hæc quidem aliquamdiu patitur, poſteà erum-

pit ad alvum, & ſtatim ſanus eſſe ſibi videtur, ac à morbo liberatus. Verum progreſſu temporis alvus incenditur, eademque illa patitur, & adhuc amplius. Aliqui etiam intumeſcunt ventre, ſcroto, ac facie.

De Morbis. Lib. 3.

*Πει πειδω, γ.*

**O**Riuntur volvuli ex incaleſcente ventre ſuperiore, inferiore verò refrigerato. Reſiccatur enim inteſtinum & conſtipatur ex inflammatione, ita ut neque flatum, neque alimenta traſmittat, ſed venter durus ſit, & vomat interdum, imprimis quidem pituitoſa, deinde verò bilioſa, tandem etiam ſtercus, ſitis & dolor maximè circa præcordia detinet, totus etiam venter dolet & inflatur, ſeſe jaſtat, febres invadunt. His ea curatio inſtituenda eſt. Venter ſuperior quam citiſſimè purgandus, Sanguis ex capite, & cubitis detrahendus, ut alvus ſuperior caleſcere deſinat.

Partes ſuprà ſeptum tranſverſum, excepto corde, refrigerandæ. Inferiores autem partes, homine in aquæ calidæ folio collocato, & oleo ſemper illito, calefaciendæ, & calefacientia humida admovenda. Collyrium ex ſolo melle decem digitorum longitudinis, ſummæ ejus parte felle taurino illitum, bis aut ter ſubjiciendum, ut exuſta omnia circa reſtatum inteſtinum ſtercora educas. Quod ſi ſic ſucceſſerit, poſteà infuſum per clyſterem injiciendum. Sin minus, folle fabrili indito, ut ventrem flatus immittendus, ut tum ventrem, tum inteſtinum contractum diſtendas. Deinde extracto folle, infuſum per clyſterem injiciendum.

Peripneumonia talia facit. Febris acuta tenet, ſpiritum frequentem, ac calidum reſpirat, anxietas adeſt, & impotentia, & jaſtatio, dolor ſub ſcapulis, & ad claviculam & mam-



mammam, & in pectore gravitas, quandoque etiam delirium. Quidam dolorem non sentiunt, donec tussire incœperint. Verum hic morbus diuturnior ac difficilior illo est. Salivam tenuem ac spumofam primum spuit. Lingua flava est, verum progressu temporis nigrescit. Si in principio nigrescat, citius morbus finitur: Sin posterius, tardius. Tandem verò etiam rumpitur lingua, & si digitum apponas, inhæret: Hæc patitur homo minimum diebus 14. ad summum uno & viginti: Et per hoc tempus tussit vehementer, simulque cum tussi, primum quidem copiosum & spumofum sputum expuit, 7. verò, & 8. die, cum febris in vigore fuerit, humidaque peripneumonia sit, crassius procedit, sin minus, non. nono & decimo aliquantum cum virore pallescens, & subcruentum. Duodecimo ad 14. usque copiosum, & purulentum. Atque hæc fiunt, quibus naturæ & corporis affectiones humidæ sunt, & morbus vehementior est.

At quibus natura, & morbi conditio sicca est, hi minus conflictantur. Si quidem igitur decimo quarto die resiccatus fuerit, neque purulentum amplius tussi rejecerit, sanus est. Sin minus, ad decimum octavum, aut vigesimum primum diem animadvertite, & si tunc sputum illud quieverit, evadit. Sin minus, an dulcius sputum fuerit interroga, quod si affirmaverit, pulmonem purulentum esse scito, morbumque annum fore, si non quadraginta diebus pus sursum eduxerit. At si ingratum sputum esse dixerit, hic morbi status lethalis est. Verum primis potissimum diebus istud in his est conspicuum. Si igitur de his affectibus, aliquid abfuerit, nosse oportet, quænam ægro sint necessaria, & quænam Medico aggredienda sint. Quod si pauca ex his signis habeat, non est quod deripiatur, cum hæc pulmonis inflammatio levis sit, & minimè lethalis.

Cum pleuritis corripit, hæc con-

tingunt, dolor latus occupat, febris & horror detinet, crebrà est spiratio, spiritus non nisi erecta cervice trahitur, subbiliola, colore mali punici putamen referentia, per tussim rejicit, nisi quid intus ruptum fuerit. Quod si sic, etiam Sanguinem post ruptiones. Cruenta pleuritis est, in qua subcruenta expuit. Biliola quidem mitior est, nisi ægro ruptum quid intus fuerit, alioqui gravior quidem, sed non adeo lethalis. Cruenta autem vehemens, & gravis, & lethalis.

Si pleuritis in empyema transeat, & ad latera sui significationem exhibeat, secato aut inurito. At si neque pus expuatur, neque de se in costis significationem præbeat, jejunum, post copiosæ calidæ balneum, & minimè potum, in sella firma collocato, cumque alter eum ex humeris apprehenderit, tum ipse eum concutito, aurem costis admovens, ut noscas quam ex parte, sui significationem præbeat. Votum autem est, ut id ad sinistra magis contingat, quod inustio aut sectio in dextris mortem magis afferat. Quo enim dextra valentiora sunt, eo in ipsis vehementiores morbi apparere solent. Quod si propter crassitudinem, humor non fluctuet, neque strepitus edatur in pectore, crebrum autem spiritum trahat, pedes intumescant, & tussicula quædam vexet, ne decipiaris videto, sed scito thoracem pure plenum esse. Lintheo itaque tenui, in rubrica liquida admodum trita & tepida, intincto, thoracem in orbem obtegito, quaque parte primum resiccatum fuerit, ea sectionem aut ustionem facere oportet, ut quam proximè ad septum transversum accedas, ea tamen adhibita cautione ne ipsum attingas. Multi autem simul illinunt, ne partes quæ primum illinuntur, resiccentur. Post sectionem aut ustionem, penicillo ex lino crudo utere, & paulatim pus emittito.



De Morbis. Lib. 4.

De Affectionibus.

Περὶ τῶν τῶν τοῦ τέταρτου.

Περὶ παθῶν.

**H**Abet tum mulier, tum vir in corpore quatuor humidi formas, ex quibus morbi oriuntur. Hæ verò sunt, pituita, Sanguis, bilis & aqua.

Sanguinis fons est cor, pituitæ caput, aquæ lien, bilis locus in jecore.

Caput velut cucurbitula corpori incumbens, ex ventriculo pituitam attrahit.

Caput & lien morbis maximè sunt obnoxia.

Lumbricos latos, in puero dum adhuc in utero est, gigni assero; neque enim ubi semel uterum egressus est, tanto tempore stercus in alvo manet, ut ex eo putrefacto & diutius permanente, tantæ magnitudinis animal in ea concrecere possit. Qui enim sanus futurus est, histernum stercus semper quotidie per alvum demittit.

Qui latum lumbricum habet, is quale quid cucumeris semen, subinde cum stercore per alvum egerit, idque lumbrici partum esse quidam affirmant; sed malè, non enim ab uno animali tot pulli nasci possunt. Lumbricus hic non parit, sed circumcirca abrumpitur.

Calculus in vesica quinque habet signa, cum urinam reddere vult, dolore affligitur, & urina paulatim, velut urinæ stillicidio laborantibus, effluit, interdumque subcruenta est, utpote vesica à calculo exulcerata, & vesica inflammatione vexatur. Verum id non apparet, indicio tamen est summa præputii pars, interdum arenosa per urinam reddit, interdum verò duos, aut plures calculos.

**M**Orbi omnes hominibus ex bile & pituita oriuntur.

In dentium doloribus, si quidem dens erosus fuerit & mobilis, eximendus. Quod si neque erosus fuerit, neque moveatur, sed dolorem inferat, ustione resiccandus. Profunt etiam quæ commanducantur.

Si polypus in naso innascatur, eximitur laqueo ad os pertractus.

Morbus lateralis, pulmonum inflammatio, febris ardens & phrenitis, hi quidem acuti vocantur, & sunt maximè quidem & vehementissimi hieme. Oriuntur etiam æstate, sed minus & leviores.

Pleuritis est, cum febris detinet, lateris dolor, spiratio difficilis, & tussis. Sputum per initia quidem aliquantum biliosum expuit, ubi verò 5. & 6. diem attigerit, etiam aliquantum purulentum.

In phrenitide, confert caput multa calida lavare.

Ex omnibus fere morbis, acuti præcipue, & interficiunt, & maximos labores excitant; iique plurima observatione, & accuratissima curatione indigent; neque ab eo qui curat, malum aliquod inferri debet, satis enim sunt quæ à morbis adsunt; verum ut boni aliquid præstet, pro viribus curandum est. Quod si cum probè quidem curet Medicus, morbi magnitudine superetur æger, hæc Medici culpa non est.

In doloribus qui infra umbilicum contingunt, alvus molli infuso est abluenda, quod si non sedentur, medicamentum deorsum purgans exhibendum.

Si quartana prehenderit, si quidem impurgatus fuerit, primum quidem caput purgandum, & tribus aut 4. interjectis diebus, sub ipsam accessionem medicamentum sursum purgans exhibendum, rursus aliquo intervallo



lo interjectio, aliud medicamentum deorsum purgans in ipsa accessione dandum.

Qui magnum habent lienem, & biliosi sunt, malè colorati evadunt, prava ulcera contrahunt, os graviter olet, graciles sunt, lien durus est, semperque æqualis magnitudinis, neque ciborum reliquæ per alvum demittuntur.

In morbis ubi alter alteri succedit, is plerumque interficit; corpus enim ex præsentī morbo imbecillum redditum, si alter morbus accesserit, ex imbecillitate prius perit, quam alter qui posterior accessit morbus desinat.

Coxendicum morbus quum fit, dolor corripit coxæ juncturam, & summam nates: Tandem etiam per totum crus dolor vagatur. Huic confert mollire, in quacunque tandem cruris parte dolor hæserit, per balnea & tepesfactoria, ac fomenta; & alvum subducere. Ubi verò quieverit dolor, & pharmacum dandum est infra purgans, & postea bibat lac asininum coctum. Si verò in unum aliquem locum incubuerit dolor, & constiterit, & medicamentis non fuerit exactus, urito quocunque loco fuerit dolor; urito autem lino crudo.

Pedum dolor, his omnibus qui circa articulos contingunt, violentior quidem existit, & maximè diuturnus, quique ægerrimè solvitur.

Cum verò ad ægrotum perveneris, quænam patiat, & quanam ex causa interrogandum, & ex quot jam diebus, an etiam venter demittat, ac quanam victus ratione utatur.

Eos qui vulnera acceperunt fame conficito, & quæ insunt, ex alvō per infusum subducito.

Pinguia inflammatis minimè conferunt, neque fordidis, neque putrescentibus. Verum ad inflammata frigida conferunt, ad fordida verò, & putrescentia, acria & quæ morsum quendam excitando purgant. Cum verò carnem generare voles, pingua & calida magis conferunt.

Ab his enim caro succrescit. Cum cibos aut potiones addere vel detrāhere cœperis, paulatim, & additiones & detractiones faciendæ.

Singula edulia quæ juvent, & noceant habent.

Cibi, qui aut flatum, aut odorem, aut morsum, aut repletionem excitant, aut tormina, ab hujusmodi liberat vinum merum superbibitum.

## De Internis Affectionibus.

Περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν.

**Q**ui phthisi laborat hæc patitur. Febris lenta initio invadit, & rigor & pectoris ac dorsi dolor, interdum verò vehemens tussis urget, & sputum copiosum, liquidum, & falsum expuit.

Et hæc quidem per morbi exordia contingunt: In progressu verò totum corpus extenuatur, exceptis cruribus, hæc autem intumescunt, & pedes unguisque contrahuntur, ab humeris extenuatur & debilitatur, fauces sono implentur, & velut per arundinem sibilum reddunt, sitis vehemens per totum morbum vexat, & movendi impotentia multa corpus occupat. Hic ubi ad hunc habuerit modum, intrā annum in alacritate perit.

Hydrops pectoris gignitur, ubi tubercula in pulmone exorta fuerint. Et aqua repleta in pectus eruperint: Hydropem quandoque oriri ita mihi argumento sunt Boves, Oves & Sues; in his enim fere quadrupedibus, pulmonis tubercula oriuntur, quæ aquam continent, sectione namque facta, citissimè cognoveris, effluet enim aqua.

Talia autem, multo magis etiam in homine, quam pecoribus fieri videntur, quanto morbosior magis victus ratione utimur. Plerique verò exortis tuberculis purulenti etiam extiterunt. Hæc igitur per morbi initia (iis) contingunt. Tussis sicca & fau-



fauces ſtridulam quandam aſperitatem habere videntur, rigor & febris, erectæque cervicis reſpiratio ( ὀρθόπνοια ) contingit, corpus, & pedes intumeſcunt, ungues contrahuntur, interdum ad latus intumeſcit, & qua parte ſecandum ſit, indicat. Quod ſi non indicet, multa calida lotum, humeris comprehenſum concutito, deinde quonam latere magis fluctuet, auſcultato.

Quod cum intellexeris, tertiam ab ultima coſtam, ad os uſque ſecato, deinde terebra ( τρυπήτρον ) acuta ulterius perforato, cumque perforata fuerit, paucam aquam educito, qua educ̃ta, penicillum ex lino crudo in vulnus immittito, & mollem ſpongiam ſuperappoſito, deinde ne penicillus decidat, deligato. Per 12. autem dies, ſemel in die aqua educenda: Poſt 12. verò diem, 13. die, tota aqua educenda. Et de cætero, ſi ſuſcitetur aqua emittenda, venterque cibis ſiccis reſiccandus.

Lienis morbus quidam. Venter inflatur, poſtea verò lien intumeſcit, durus eſt, eique dolores acuti contingunt; color autem immutatur & niger cernitur, pallidus, & qui malicorium forma referat, ex aure & gingivis, gravis odor exhalat, eæque à dentibus diſceſſionem faciunt, & in tibiis ulcera, qualia puſtulæ nocturnæ erumpunt, membra extenuantur, neque ſtercus per alvum demittitur.

Convolutus Sanguineus ( ἐλεός αιμακτικός. ) Ex ore malus odor exspirat, à dentibus gingivæ abſcedunt, & ex naribus Sanguis effluit, interdum verò ex cruribus ulcera erumpunt, & hæc quidem ſaneſcunt, alia verò exoriuntur, color niger eſt, cutis tenuis, ad deambulationem & exercitationem ( non ) alacriter ſe habet.

**S**I ex partu minimè purgata fuerit, venter & crura intumeſcunt, rigor & dolor imum ventrem & lumbos occupat. Quandoque etiam ad viſcera progreditur, & animo deficit. His per morbi exordia afficitur, procedente verò tempore, cavæ faciei partes multum rubeſcunt. Cum ita habuerit, poſt fomentum uteris admotum, cyclaminum in ſubditio apponitur.

Cum fluor albus ſubortus fuerit, urina qualis aſini apparet, & dolor imum ventrem, lumbos ac laterum inanitates ( κενώσεις ) detinet, crura ac manus intumeſcunt, oculorum tava elewantur; & oculi humeſcunt, color auriginofus & albus redditur, cumque deambulat, anhelatione corripitur.

In uteri ſtrangulatu, graveolentia omnia in ſuffitu naribus adhibenda, bitumen ſcilicet, ſulphur, cornu, lucernæ funiculus, vituli marini adeps, caſtoreum, pudendis verò odorata.

Cum mulieri uteri duri evadunt, & ad pudenda prominent, inguinaque indurantur, & ardor in pudendis ineſt, cancri initia ſuſpecta ſunt.

Olivas albas priuſquam oleum inſit in tenues partes diſſectas ſiccato, deinde tuſas & cribratas in vinum injectas, bibendas exhibeto. Hoc & menſes detrahit, & ſecundas ejicit. Dictamnnum creticum oboli pondere, ex aqua potui exhibeto. Quo epoto, ſi ſecundas ejicere non potes, ſambuci ſuccum coctum pro ſotu injicito, & cantharidem ſubter appoſito. Hoc etiam fætum expellit.

Si uteri ad cor irruentes ſtrangularent, viticis & pæoniæ ſemen ex vino bibendum dato.

Si cum jam movetur fætus, corrumpatur & ſuffocetur, venter imus intumeſcit, & ad contactum velut ex ulcere dolet, febris, & dentium fre-



fremitus eamprehendit, dolorque gravis & vehemens, ipsa pudenda, imum ventrem, coxendices, laterum inanitates & lumbos detinet.

### De Morbis Mulierum. Lib. I.

Περὶ τῶν ἀσθενειῶν τῶν γυναικῶν.

**M**ulier quæ nunquam peperit, majore cum molestia, & celerius afficitur, ex mensibus profluentibus, quam quæ partum expectata est.

Ubi enim peperit, venulæ ei ad mensum descensum insunt ampliores.

Mulierem rariore & molliore carne esse quam virum censeo.

Si intra trimestre spatium mulieri menses non prodeant, in suffocationem subinde incidet, febrisque, ac horror, & lumborum dolor sæpè invadet.

Intrâ verò quadrimestre spatium, nisi progressi menses prioribus viam fecerint, etiam tunc trimestres omnes afflictiones eam magis affligent, maximèque pro tempore menses decurrere consueverunt, postea minus.

Plerumque verò doloris expers videtur.

Erunt autem in quartis mensibus etiam hæc signa, urinam copiosam, & crassam subinde reddet, ei venter indurefcet, majorque erit quam antea, dentium stridor aderit, ciborum fastidium, & insomnia. Si verò curetur, etiam in his sana evadit.

Intra quintum mensem, nisi ei copiosi menses descenderint, dolor adhuc fortior accidit.

Sexto verò mense, jam incurabilis erit, & juxta quidem priora signa magis affligetur.

Deinde ad ea etiam hæc aderunt, anxia erit, & subinde seipsam jactabit, & animo deficiet, & pituitam vomet, & vehemens sitis eam corripit, incenso nimirum ventre, ab

uteris Sanguine redundantibus, & ad contactum, maximèque circa pubem, dolebit, subindeque acute febricitabit, uteri frequenter murmur edent, neque pro more venter deiciet, neque vesica urinam percolabit, spinæ & totius dorsi dolore vexabitur: Nonnullis etiam lingua frænatur, vox deficit, animi deliquium adest, stomachus mordetur, urina mingitur rubra, dolet universum corpus, potissimum cervix, spina, lumbi, & inguina. Cumque eo devenerit, tum venter attollitur, tum crura, & tibiæ, ac pedes, plus æquo intumescunt, & mors instat.

Mulieribus nonnullis, cum copiosi menses duorum mensium spatio in uteris extiterint, ubi intercepti fuerint, ad pulmonem feruntur, eademque omnia his contingunt, quæ in tabe dicta sunt, neque inde superesse possunt.

Infæcunda erit mulier etiam si meliuscule habeat, si magna in uteris orta ulcera fuerint, quamvis curentur, propter cicatrices.

Prodeunt menses crassiores & copiosiores in intermediis diebus, pauciores verò, & tenuiores cum incipiunt vel desinunt.

In omni autem muliere si sana sit, euntes menses moderata quantitate prodeunt ad duarum Atticarum heminarum mensuram, aut paulo plures aut pauciores, idque ad biduum vel triduum. Longius, autem tempus, aut brevius, morbum aut sterilitatem portendit.

[ Hemina attica continet uncias IX. ]

Quod si quæ à viro emittuntur non sint ei manifesta, cruribus distentis & alternatim positis quiescat.

Concipiendi facultatem habet ea, quæ neque humiditate redundat, neque etiam exarescit, nisi horum aliquid ex prisca natura insit.

Ad virum autem eam accedere oportet, curatione recepta, desinentibus aut incipientibus mensibus, præstiterit tamen ubi desierint.

Sunt



Sunt quæ si acce quiddam, aut a-  
marum præter consuetudinem ede-  
rint, aut biberint, fætus perdunt,  
cum adhuc tenellus puellus intus exi-  
stat.

Ubi uterum gestat mulier tota pal-  
lida redditur, quoniam qui in ea pu-  
rus est Sanguis, semper quotidie è  
corpore aliquantulum stillat, & ad  
fætum fertur, eique in alimentum  
cedit.

In omnibus morbis, in quibus fo-  
tus conducit, præstiterit post forum,  
pingui aliquo perungi.

Si lac deficiat, porra trita & aqua  
macerata, potui exhibeto, calida  
lavet, & in cibo, porra & brassicam  
comedat, quin & fæniculi, necnon  
radicis illius decoctum propinato, &  
hordeum decorticatum, unà cum bu-  
tyro coctum, & refrigeratum potui  
exhibeto.

Molæ conceptus hæc est causa, ubi  
copiosi menses extiterint & paucum,  
ac morbosum semen conceperint, &  
minimè genuinus conceptus gignitur,  
& venter tanquam utero gerentis im-  
pletur: Nihil autem in ventre mo-  
vetur, neque lac in mammis innasci-  
tur, pectus verò turgescit. Hæc igitur  
biennium sæpe etiam triennium  
sic affecta est. Et si quidem una caro  
nascatur mulier perit, neque enim  
superesse potest. Sin verò multæ,  
copiosus ei Sanguis, & carnosus per  
pudendum erumpit, quod si id mode-  
ratè fiat, servatur, alioqui profluvio  
correpta perit.

Quod si prægnans diutiùs immore-  
tur, & parere non possit, sed pluri-  
bus diebus partus doloribus discru-  
cietur, sit autem juvenis & ætate  
florens, multoque Sanguine redun-  
det, venas in malleolis secare opor-  
tet, & virium habita ratione San-  
guinem detrahare.

Ad fætum excludendum, mulie-  
rem ex axillis comprehensam vehe-  
menter concurito.

De iis quæ uterum non gerunt.

Π: 31' α: 209 α: 1.

**S**I uterorum os à pudendo aversum  
fuerit, non concipiunt.

Si uteri lubrici fuerint ( id quibus-  
dam natura contingit, & si innata  
ulcera magnas cicatrices intus reli-  
querint ) mulier utero non concipit,  
semen enim foras elabi sinunt.

Si nosse velis an mulier conceptui  
sit idonea, butyrum, & lac mulieris  
puerum lactantis, potui exhibeto,  
& si eructaverit concipiet, sin minus,  
minimè.

Allium caput unicum habens, ca-  
pite depurgato & derafo, in uterum  
subdito, & postridie spectato, num  
odor ad os perveniat, quod si sic, con-  
cipiet, sin minus minimè.

Si mulier nosse velit, an conceptu-  
ra sit, anisum ex aqua quam tenuissi-  
mè tritum bibat, & dormiat, quod  
si quidem pruritus circa umbilicum  
eam corripit, concipiet, sin minus,  
minimè.

Quæ utero gerentes maculam in fa-  
cie velut ex solis adustione ( ε: 27 α: 1  
vocat ) habent, eæ femellam ge-  
stant. Quæ verò benè coloratæ per-  
manent, marem plerumque.

Si papillæ sursum conversæ fue-  
rint, marem gestant, si deorsum fæ-  
minam.

Latæ fæminas, parvæ verò, &  
conclusæ mares procreare videntur.

Ad conceptum summè faciens.  
Melanthium ( nigellara ) mulieri ex  
vino rubro acerbo exhibeto.

Mulierem juvenulam fluor mulie-  
bris ruber infestabat, & medicamen-  
to sumpto, capite purgato, vena se-  
cta, nihil proficiebat. Hæc autem  
ei causa esse videbatur ne conciperet:  
Ei autem radicem aspalathi deco-  
ctum, ex vino albo mane & ante  
cœnam exhibebam, fluorque cessa-  
vit, & non longè postea concepit &  
marem peperit.



## SECTIO SEXTA.

Continens τὸ χειρουργικόν.

## De Officina Medici.

Κατ' ἀνθρώπον.

**P**Rincipio quænam similiter, aut dissimiliter se habeant videndum idque ex his, quæ maximi sunt momenti, aut facillimè cognoscuntur, aut quavis via, & ratione comprehenduntur: Quæ & visione, & tactu, & auditione percipiuntur; quæque in visionis, auditionis, tactus, narium, linguæ & intelligentiæ sensum cadunt, ex quibus omnis nostra cognitio constat.

[ In sequentibus omnia percurrit Hippocrates à quibus, per quæ, quibuscum, & circa quæ, Chirurgia exerceatur. Communia etiam tradit præcepta de recta deligandi ratione. ]

Fricitio vim habet solvendi, vinciendi, carnem augendi, minuendi. Dura quidem vinciendi, mollis solvendi, multa minuendi, mediocris implendi.

## De Fracturis.

Περὶ ὀστέων.

**T**Riginta ad summum diebus, cubiti ossa in totum coalescunt. Nihil tamen est perpetuum. Nam natura à natura, & ætas ab ætate plurimum distat.

Pauciore victu ad decimum usque diem utendum, præsertim cum ex toto quiescant, ac obsonia liquida exhibenda, quæ ventrem modicè deducant. Vino verò & carnibus abstinendum. Post hæc paulatim reficiendi.

Firmatur autem brachii os, diebus ferè quadraginta. Quos ubi excesserit, resolvendum, minusque adstrictis fasciis, ac paucioribus vinciendum.

Machinas admovere ubi res non exigit absurdum est.

Septimo, aut nono, aut undecimo die, in fracturis ferulæ sunt admoventæ.

Canales, qui cruribus fractis supponuntur, subjici debeant, nec ne, ambigendum mihi videtur. Prosumt etenim, non tamen quantum existimant, qui eos supponunt. Nam neque in quiete, ut putant, crus continent, neque dum reliquum corpus in hanc vel illam partem convertitur, canales prohibent quominus crus sequatur, nisi homo ipse diligenter advertat. Quin etiam durum videtur, & asperum lignum subjici, nisi simul molle aliquid in ipsum imponatur. Maximè tamen est usui, cum stratum substernitur, ac dum ad desidendum æger progreditur. Potest igitur cum canali (vel glossocomo) & sine eo, benè vel malè res confici.

Tibiæ ossa quadraginta diebus, si rectè curentur, firmantur.

Femur verò quinquaginta diebus firmatur.

Imprimis confert nosse, qua ratione fasciæ initium injiciendum sit, & qua parte maximè comprimendum, quantum item conferat, si quis fasciæ initium rectè circumdet, & qua parte maximè convenit, comprimat; tum quantum detrimenti sequatur, si neque quis probè fasciæ initium circumjiciat, neque qua maximè parte convenit, sed hinc & inde comprimat.

Turpe est, & ab arte abhorrens, aliquid molientem in ipso artificio deficere.

Ex omnibus machinamentis, quæ convenienter ad usum homines comminiscuntur, violentissima hæc tria existunt, aselli circumactio, per vectem molitio, & cunei adactio. Negligenda non est per vectes molitio. Hac siquidem ratione aut nulla alia, ossa in suas sedes reconduntur.

Reposito osse, multo magis excitabitur nervorum distentio, quam non repo-



reposito, quod probè nosse convenit. Etenim si reposito osse, nervorum distentio supervenit, in angusto spes est. Præstatque, si id sine molestia fieri possit, os retro compellere. Neque enim his, quæ plus justo laxiora sunt, nervorum distentiones accedunt, sed his quæ magis intenduntur.

Nullus articulus, ac minimè omnium cubitus, dum febris adest, in suam sedem compellendus est.

### De Articulis.

Περὶ Ἀρθρῶν.

**H**umeri articulum, uno modo, in aliam videlicet, excidere vidi, nunquam autem in superiorem, aut exteriorem partem. Non tamen excidat, nec ne contenderim; licet de eo aliquid dicere possim. Verum neque in priorem partem unquam vidi, nec excidere posse existimo.

Humerus calce reponitur, in alæ cavum prius immittendo rotundum aliquid, velut parva pila & dura. Nisi enim tale quid indatur, ad brachii caput calx pervenire nequit. Est & alius restituendi modus, cum in erecti & stantis humerum, ager manu apprehensus sustollitur. Alius repositionis modus per transversum in scapula lignum rectè obitur. Pistillo quinetiam, quidam humerum in suam sedem compellunt. Sed omnium optimus reponendi modus, est per machinam *ἢ dictam*.

Multarum rerum experientiam Medicum habere oportet, ac certè etiam frictionis. Ex eodem enim nomine, non idem evenire consuevit: Nam & iusto laxiorem articulum frictio vincit, & iusto duriores soli vere potest.

Non satis est artem tantum ratione nosse, sed, & in usum exercitatione traducenda est.

Manus articuli si intro luxentur, digitum inflecti, si extra, intendi nequeunt. Ut restituantur, collocentur.

digitum super scamnum, & in diversas partes distendantur: Quod extat ex osse, vel prominentiori palmæ parte, aut calce, simul repellatur, & in anteriorem & inferiorem partem urgeatur: Ab inferiore verò parte, iuxta os alterum, molle aliquid in tumorem sublatum, si superiore quidem parte extat, manui conversæ, si inferiore, supinæ est supponendum. Curatio linteis perficitur.

Digitum articulus ubi exciderit, facile quidem videtur. Restituitur verò in directum contendendo, & quod eminet propellendo, contrarium autem in alteram partem impellendo. Curatio fasciis fit & linteis.

Optima medicina interdum est, medicinam non facere.

Turpe est cum in omni arte, tum verò in arte medendi, vel maximè post multum exhibitum negotium, multum apparatus, multam de se excitare opinionem, tandemque nihil opis adferre.

Femoris articulus ubi coxendice excidit, quatuor in partes promoveatur, in interiorem quidem sæpissimè, deinde in exteriorem, interdum verò in posteriorem, & anteriorem, sed rarò.

Quibus interiorem in partem excessit, iis crus alteri collatum, longius duabus de causis merito apparet. Osi enim quod à coxendice procedit, & ad superiorem pectinis partem fertur, femoris caput insidet, & articuli cervix in acetabulo fertur; rursus exteriore parte nates excavatur. Summa item femoris pars ad genu, & tibia similiter, ac pes in exteriorem partem ferri coguntur.

Qui ad perfectum incrementum nondum devenere, iis si prolapsus articulus non reconditur, femur, tibia, & pes breviora evadunt. Neque enim iis ossa æque in longum augentur, verum breviora sunt, ac præcipuè femur.

Ferunt nonnulli, Amazonas masculam suam prolem statim ab infantia, partim ad genua, partim ad



coxendices, luxare consuevisse, quo videlicet claudi fierent, ne mares feminis insidias tenderent, & ut iis ad manuiarias operas uterentur.

At quibus in exterioriorem partem femoris caput excessit, iis crus juxta alterum extensum, meritò quidem brevius apparet. Exteriori autem parte, nates in gibbum magis extumescit. Extrema verò femoris pars ad genu, & tibia, & pes introrsum spectare conspiciuntur. Quibus jam adultis luxatus articulus reconditus non fuerit, iis crus totum brevius conspicitur, neque ingressu terram calce contingere possunt.

Prædictiones laude dignæ ex eo existunt, quod dignoscimus quonam, & quam ratione, aut quando, res quæque exitum habitura sit, sive eo tendat ut curationem recipiat, sive curationis spem adimat.

Quibus tibiæ ossa luxata, accedente vulnere, commissa, quæ est ad pedem penitus eminent, ea sive intra, sive extra vergant, minimè reponenda sunt, sed sinenda. Id enim manifestò nosse oportet, eos, quibus ista reposita permanferint, interituros, paucisque diebus duraturos. Convulsione namque sublatis pauci diem septimum superant. Sed & pes & tibia ad gangrænam deveniunt, eaque sic affore certo nosse convenit. Quod si neque reposita, neque ab initio tentata fuerint, eorum plerique super sunt.

Eadem quoque ratio est, ubi cubiti ossa ad manus articulum, facto vulnere, vel interiori in partem vel exteriori emineant. Certo enim tenendum est, eum cui recondita ossa permanferint, supraposito mortis genere, intra paucos dies interituros. Eadem ratio est in reliquis articulis si cum vulnere luxentur. Ea omnia si reconduntur, mortem, non reposita spe salutis afferunt. At iis qui evadunt claudicatio adest.

## De Capitis Vulneribus.

Περὶ τῶν ἐν κεφαλῇ τραυμάτων.

**T**otius capitis os id tenuissimum, & maximè imbecillum quod ad sinciput est, idque quam minimam, & tenuissimam carnem hac capitis parte in se habet, cerebrumque plurimum eo loco subest. Cumque hæc ita se habeant, ab ictu, os hac capitis parte magis colliditur, frangitur & medium desidit, sub eoque casu, magis moriuntur ægri, ægriusque curantur, & mortem evitant, quam si qualibet alia capitis parte istud accidat.

Ex vulnere capitis, quacumque parte acceptum sit, ubi alioqui ex vulnere quis fuerit periturus, hieme quam æstate diutius vivit.

Fracturarum ossium capitis quinque sunt genera. ρωγυή & ρήξις, rima seu fissura, λυσις & θλάσις, contusio seu collisio, ἐσθλασις seu ἐνθλασις depressio, ἔδρη, sedes, & συμφορ., infortunium.

Capitis ulcus nulla re madefaciendum, ac ne vino quidem, aut quam minimum.

In capitis sectione, cæteræ quidem capitis partes tuto secari possunt, tempus verò secari non debet; nervorum enim distentione prehenditur qui sectus est. At si sinistra tempora secta fuerint, dextra convulsio prehendit. Sin ad dextra sectio fuerit, sinistra convelluntur:

Postquam os scalpro eraseris, si quidem ossis vulnus ad sectionem tendere videatur, intra triduum ad sectionem veniendum, neque id spatium citra sectionem superandum, idque præcipuè si calida anni tempestas fuerit.

Ubi quis ex capitis vulneribus periturus est, neque ulla ratione servari potest; his signis hoc dignoscere potest. Convulsio plerisque invadit in alia corporis parte, si in dextra parte fuerit vulnus, sinistra convellitur, & e contra, ante decimum



mum quartum diem hieme plerumque febris invadet, æſtate verò poſt ſeptimum. Quod ubi contigerit, ulcus coloris expers evadit, ex eoque ſanies parva effluit, & quod in eo inflammatum eſt, emoritur, glutinumque fit, ac ſaſamentum refert, colore ſulvum, & aliquantulum lividum, tuncque os corruptione vitari incipit, & nigreſcit, læve exiſtens, ad extremum autem ſubpallidum, & albicans evadit.

Cum verò jam purulentum extiterit, poſtulæ in lingua exoriuntur, & cum delirio mors contingit.

Inter ſecandum capitis os, ubi parum abeſt ut totum os ſectum ſit, jamque os labat, ab ipſa ſectione deſiſtendum, permittendumque ut os ſponte ſua diſcedat; ſecto enim oſſi & inter ſecandum relictò, mali nihil contingere poteſt. Inter ſecandum etiam terebra ſæpius, ne os incaleſcat, auferenda, & in aquam frigidam demergenda.

## SECTIO SEPTIMA.

[Continens. Τῆς ἐπίπληξης.

## LIBER PRIMUS.

### De Morbis Epidemicis.

Ἐπιδημιῶν τῶν πρώτων.

### Seſſio Secunda.

**C**oncoſtiones celeritatem judicationis, & ſecuritatem ſalubrem (certam ſalubritatem) ſignificant.

Præterita diſcito, præſentia cognosceito, prædicito futura; hæc mediator.

Duo circa morbos elaboranda ſunt, ut proſis, aut non noceas.

Ars ex tribus conſtat, morbo, ægroto, Medico artis miniſtro; adverſari morbo ægrotum cum Medico oportet.

## [Seſſio Tertia.

**Q**uibusdam iſterus ſexto die accidit, ſed hos aut per urinam purgatio, aut alvus turbata juvabat, aut larga Sanguinis ex naribus profuſio.

Cum febres ardentes inciperent, ſignificabant quibus lethalia impendere: Statim enim incipientibus, febris acuta, parum rigeant, inſomnes, anxii, ſitibundi, faſtidioſi, paulum exudantes circa frontem, & claviculas, ſed nullus per totum: Multum delirabant, timores, triftitiæ, extrema ſubfrigida, pedes extremi, præcipue autem manus: Accessiones diebus paribus; plurimis quarto die dolores maximi, & ſudores plurimum ſubfrigidi, & extrema jam non recaleſcentia, ſed livida, ſubfrigida, permanebant, neque amplius ſitiebant. Adhuc his urinæ nigrae, tenues, paucae, & alvi ſiſtebantur, neque fluebat Sanguis ex naribus ulli eorum quibus hæc accidebant, ſed paucus ſtillavit: Nulli horum res venit ad recidivam, ſed ſexto die mortui ſunt cum ſudoribus.

In hac conſtitutione (quæ magna ex parte fuit frigida & ſicca) ex quatuor præcipue ſignis ſervabantur: Quibusdam enim ex naribus Sanguis fluebat, aut per veſicam multa urina, multum ſedimentum & bonum habens, procedebat; aut perturbata alvo, bilioſa tempeſtively excernebant, aut dyſenterici fiebant, Multis autem contigit non ex uno ſupraſcriptorum ſignorum judicari, ſed plurimis per omnia excurrere, & videri habere gravius. Servabantur autem omnes quibus hæc contigerunt. Feminis autem & virginibus contigebant omnia antea ſcripta ſigna: Quibus autem horum aliquid bene fiebat, aut muliebria largiter apparebant, per hæc ſervabantur, & judicabantur: Et nullam novi mortuam earum quibus horum aliquid bene fiebat. Philonis namque filia, cum liberaliter



ex naribus Sanguis effluxisset, quod septimo die intempestivè cenasset, mortem obiit.

Moriebantur plurimi ex his morbis sexto die, velut Epaminondas, Silenus, & Philiscus Antagoræ filius.

Scit. 3.

Videndæ sunt quæ fiunt morborum vicissitudines, & ex quibus, in quos, succedant.

Quæ diebus paribus exacerbantur, paribus judicantur, quorum autem paroxysmi in imparibus fiunt, judicantur in imparibus.

Febrium omnium tutissima est quartana, placidissima & longissima. Non enim solum per se ipsa talis est, verum etiam ab aliis magnis morbis vindicat. Septimana longa est, non tamen lethalis. Nonana hæc adhuc longior, sed non lethalis. Tertianæ exacta celerem habet judicationem, neque lethalis est. Quintana omnium est pessima: Hæc enim ante tabem, aut jam contabescantibus ubi supervenerit, perimit. Semitertiana etiam præcipuè lethalis.

#### Ægroti Quatuordecim.

##### Primus Ægrotus.

**P**hiliscum qui propè murum decumberebat, primo die febris acuta invasit, sudavit per noctem laboriose. Secundo, omnia exacerbata sunt: Vespero verò post clysterem bene habuit, noctem quiete transegit. Tertio, mane & usque ad meridiem videbatur esse sine febre: Ad vesperam verò febris acuta invasit cum sudore & siti; exaruit lingua. Minxit nigrum. Nox laboriosa. Non dormivit. Omnino deliravit. Quarto, omnia exacerbata sunt, urinam nigram reddidit, noctem habuit minus molestam & urinas melioris coloris. Quinto, circa meridiem, parum de naribus stillavit sincerum. Urinæ variæ, habentes pendentia quædam rotunda, genitali semini similia, sparsa, non sudavit. Supposita glan-

de, flatuosa pauca exierunt. Noctem laboriose transegit. Somni exigui, verba cum delirio. Omnia extrema frigida non amplius recalescentia; minxit nigra. Dormivit parum. Sub diem obmutuit. Sudavit frigidum. Extrema livida. Ad meridiem obiit sexto die. Huic spiritus ad finem usque velut recordanti, (Fœsio intro revocanti & ingeminanti) rarus & magnus fuit. Splenintumuit tumore rotundo. Sudores frigidi usque ad finem. Paroxysmi paribus diebus.

##### Ægrotus Secundus.

**S**ilenum qui in Platamone habitabat juxta Evalcidis ædes, ex laboribus, computationibus & exercitationibus intempestivis, ignis (πῦρ) i. e. febris vehementissima præhendit. Cepit autem lumborum dolore, & capitis gravitate laborare cum cervicis distentione. Ex alvo primo die, biliosa, sincera, spumosa, abundè colorata, & multa fluebant. Urinæ nigræ, nigram hypostasim habentes. Siticulosus. Lingua arida. Nocte nihil dormivit. Secundo, febris acuta, dejectiones plures, tenuiores, spumosæ, urinæ nigræ. Noctem difficulter tulit, parum deliravit. Tertio, omnia exacerbata sunt: Hypochondrii contentio utrinque ad umbilicum promissa, submollis. Dejectiones tenues, subnigræ, urinæ turbatæ, nigræ. Nocte nihil dormivit. Verba multa, risus, cantus, non poterat se continere. Quarto cum iisdem. Quinto, dejectiones sinceræ, biliosæ, læves, valde pingues, urinæ tenues, pellucidæ, paucæ. Mente constitit. Sexto circa caput parum sudavit. Extrema frigida, livida. Magna jactatio. Nihil demisit alvus. Urinæ suppressæ sunt. Febris acuta. Septimo die sine voce. Extrema non amplius recaluerunt. Minxit nihil. Octavo, sudor frigidus emanavit è toto corpore. Exanthemata cum sudore, rubra, rotunda, parva, velut vari



vari permanebant, nec faciebant abscessum. Ex alvo irritatione parva, stercora tenuia, velut cruda, multa reddebantur cum dolore. Mingebat cum dolore, mordacia, syncera, pauca. Recalescebat, somni leves, comatosi, obmutuit. Urinæ tenues, perspicuæ. Nono cum iisdem. Decimo potum non capiebat. Comatosus somni autem tenues erant, & à ventre similia prodibant. Mingebat confertim crassum, subsidens. Sedimentum ( *xyurabns* ) farinæ simile, album. Extrema rursus frigida. Undecimo obiit. A principio huic usque ad finem, spiritus magnus & rarus, hypochondrii palpitatio perpetua; circiter vicesimum ætatis annum agebat.

Ægrotus Tertius.

**H**erophontem corripuit febris acuta, à ventre pauca, qualia per Tenesnum solent, inter initia egerebantur. Post hæc tenuia deiecit, biliosa, copiosa. Somni non aderant. Urinæ nigrae, tenues. Quinto die mane surditas. Exacerbabantur omnia. Lien intumescebat. Hypochondrii contentio. Ex alvo pauca nigra exibant. Desipuit. Sexto deliravit. Sub noctem sudor, refrigeratio, delirium permanebat. Septimo circumfrigebat. Striculosus fuit. Despiebat. Ad noctem rediit in mentem: dormivit. Octavo, febricitavit, lien subsidebat, intelligebat omnia. Doluit ad inguen, primumque tumor ortus est secundum rectitudinem lienis. Deinde dolores in ambabus tibias deciderunt. Noctem facile tulit. Urinæ melioris coloris, subsidentiam habebant exiguam. Nono sudavit, iudicatus est. Intermissit. Quinto reperit. Statim autem splen intumuit. Febris acuta. Rursusque surditas. Post recidivam tertio splen subsedit. Surditas minor. Crura dolabant. Noctu sudavit. Iudicatus circa 17. neque deliravit in recidiva.

Ægrotus Quartus.

**I**n Thaso, Philini uxorem quæ filiam pepererat, cum ex naturæ præscripto purgationes procederent, & alia leviter transegisset, decimo quarto post partum die, febris ardens cum rigore corripuit. Huic in initio oris ventriculi dolor contigit, & in hypochondrio dextro. Dolores muliebrium locorum. Purgatio cessavit. Apposito autem balano vel pello, hæc leviora sunt facta. Capitis verò & colli & lumborum dolores permanebant. Somni non aderant, Extrema frigida, siticulosa. Venter urividebatur. Pauca deiecit. Urinæ tenues & per initia decolores. Sexto die ad noctem deliravit multa, rursusque ad mentem rediit. Septimo siticulosa. Dejectiones biliosæ, coloratæ. Octavo rigit. Febris acuta. Convulsiones multæ cum dolore. Multum deliravit. Glande subdita ad desidendum exsurrexit, multaque deiecit cum fluxu bilis. Somni non aderant. Nono convulsiones. Decimo non nihil sapuit. Undecimo dormivit. Omnium recordata est. Sed statim rursus deliravit. Minxit autem cum convulsionibus confertim multum & raro ( nisi admonita ) crassum, album, quale fit in urinis subsidentibus cum perturbantur. Repositum per multum tempus non subsidebat. Color & crassities qualis in iumentis. Decimo quarto die totum corpus palpitationes occuparunt. Verba multa Paululum mente constitit, sed confestim rursus desipuit. Decimo septimo, obmutuit. Vigesimo obiit.

Ægrotus Quintus.

**E**picratis uxorem, quæ decumbebatur prope Archegetem, vicinam jam partui, rigor fortis apprehendit. Noc incaluit ut ferebant; sequenti die eadem adfuerunt. Tercio die peperit filiam, & alia omnia secundum rationem processerunt.



Secundo die post partum apprehendit eam febris acuta, cordis & muliebrium locorum dolor. (Insomnis erat) subdito pecto hæc facta sunt leviora. Capitis autem & colli & lumborum dolor invasit. A ventre pauca biliosa, tenuia, sincera reddidit. Urinæ tenues, subnigræ. Sexto vero postquam eam febris arripuit, sub noctem deliravit. Septimo omnia exacerbata sunt. Sine somno deliravit, siticulosa: Dejectiones omnes biliosæ, subrubræ. Octavo riguit; dormivit copiosius. Nono cum iisdem fuit. Decimo, crura cum labore dolebant, cordis (oris ventriculi) rursus dolor invasit, cum capitis gravitate, non deliravit, dormivit magis, venter restitit. 11. (sudavit) minxit urinas melioris coloris, subsidentiam habentes copiosam, melius se habuit. 14. riguit. Febris acuta. 15. vomuit biliosa, flava, subcrebra, sudavit, sine febre fuit: Per noctem autem febris acuta; urinæ crassæ albam habentes subsidentiam. 16. exacerbationem nocte habuit, & cum difficili tolerantia, non dormivit, deliravit. 18. Siticulosa: Lingua exaruit. Non dormivit. Deliravit multum, dolebant ei crura. Ad diem autem 20. mane parum riguit. Comatosa, quiesca, dormivit, vomuit biliosa pauca & nigra, sub noctem surda facta est. Circa 21. lateris sinistri gravitas undique cum dolore infestavit: parum tussit. Urinæ autem crassitiem habentes, turbidæ, subrubræ, repositæ non subsidebant. Cetera vero levius habebat, non sine febre. Statim à principio, in faucibus dolorem & ruborem habuit, & gurgulionem revulsam, fluxio acris, mordax, falsa usque ad finem perseveravit. Circa 27. sine febre fuit. Urina habuit sedimentum. Latus nonnihil dolebat. Circa 34. febris eam corripuit. Venter biliosis turbatus est. 40. vomuit pauca biliosa. Judicata est perfecte, & à febre liberata est.

## Ægrotus Sextus.

**C**Leonaetidem, qui supra Hera-  
cleum decumbebat (ὥσπερ) fe-  
bris ardens corripuit incerta perio-  
do. A principio dolor capitis & sini-  
strilateris adfuit, cæterorumq; mem-  
brorum, perinde ac ex lassitudine,  
labores. Febriles exacerbationes  
subinde & sine ordine invadebant.  
Sudores quidem nunc aderant, nunc  
minime. Maxima ex parte incide-  
bant paroxysmi in dies decretorios  
præcipue. Circa 24. frigescabant ei  
(Valesio *στασιμώτερον*, doluerunt) ex-  
tremæ manus. Vomuit flava, bi-  
liosa, satis multa, paulo post viru-  
lenta, quibus omnibus sublevatus  
est. Circa 30. diem cepit Sanguis  
fluere ex utraque nare. Et hæc erra-  
ticæ, & paulatim ad judicationem  
usque. Non abhorruit à cibo, neque  
fuit per totum tempus, neque so-  
mno caruit. Urinæ tenues non ta-  
men sine colore. 40. autem minxit  
subrubra, sedimentum multum sub-  
rubrum habentia. Sublevatus est.  
Post hæc variarunt urinæ, nunc qui-  
dem sedimentum habebant, nunc  
non. 60. urinis sedimentum mul-  
tum, & album, & læve adfuit.  
Remissa sunt omnia. Febris inter-  
misit. Urinæ rursus tenues, sed bo-  
ni coloris. 70. sine febre fuit. In-  
termisit dies decem. Octogesimo ri-  
guit. Febris eum arripuit acuta, su-  
davit multum. Urina habuit sedi-  
mentum rubrum, læve, perfecte ju-  
dicatus est.

## Ægrotus Septimus.

**E**Rasimum qui prope Bootæ tor-  
rentem habitabat febris ardens  
post cænam corripuit; noctem per-  
turbatè transiegit, diem primum  
quietum, noctem molestam habuit.  
Secundo omnia exacerbata sunt,  
sub noctem deliravit. Tertium la-  
boriosè transiegit, deliravit mul-  
tum. Quartus fuit molestissimus.  
Nocte autem nihil dormivit. In-

*Æger  
ὁκταυντα.*

*com-*



somnia aderant, & cogitationes. Deinde pejora & magna & periculosa, timor, difficilis tolerantia. Quinto manè recreatus est. Intelligebat omnia. Multum verò antè meridiem furiit, continere se non poterat. Extrema erant frigida, sublivida. Urinæ crudæ. Mortuus est sub solis occasum. Huic febres ad finem usque cum sudore erant. Hypochondria sublimia ( *υψηλὰ* ) contentio cum dolore. Urinæ nigræ habentes suspensiones rotundas, nec subsidebant, ex ventre autem reddebat stercus. Sitebat usque ad finem, non tamen vehementer. Convulsiones multæ cum sudore circa mortem usque ad finem.

Ægrotus Octavus.

*Ægrotus.*  
*Ὀκτώμηνος.* **M** Etonem febris vehemens corripuit cum lumborum gravitate & dolore. Secundo, cum multum aquæ biberet, alvus benè egressa. Tertio, capitis gravitas: dejectiones tenues; biliosæ, subrubræ. Quarto, omnia exacerbata sunt. Fluxit à dextra nare sanguis paululum bis, noctem laboriosè transegit. Dejectiones quales tertio die, urinas nigras habebat; in quibus pendebant subnigra sparsa. Non subsidebant. Quinto, copiosè sanguis fluxit sincerus ex nare sinistra. Sudavit. Judicatus est. A judicio insomnis erat, delirabat, Urinæ tenues, subnigræ. Capitis perfusione usus est. Dormivit mente constitit. Morbus non repetiit. Sed fluxit sanguis sæpe post iudicium.

Ægrotus Nonus.

**C** Ritoni in Thaso erecto, & ambulanti pedis pollex vehementer dolere cepit. Decubuit eodem die, horrescens, fastidiosus. Parum incalescens. Nocte deliravit. Secundo, tumor per totum pedem, & usque ad talum subrubens & cum contentione. Pustulæ nigræ.

Febris acuta. Insaniit. A ventre verò mera biliosa copiosa effluerunt. Mortuus est à principio secundo die.

Ægrotus Decimus.

**C** Lazomenium qui decumbebat juxta puteum Phrinichidæ, febris vehemens corripuit, à principio dolebant illi caput, & collum, & lumbi. Statim surditas accidit. Somno carebat. Febris acuta corripuit eum. Hypochondrium attollebatur cum tumore, sed contentione exigua. Lingua arida. Quarto per noctem deliravit. Quinto, cum dolore omnia sunt exacerbata.

Circa undecimum autem nonnihil remissa. Ex ventre ab initio, & usque ad 14. Multa tenuia aquei coloris reddebat, quod ad dejectiones attinet, cum bona tolerantia transigebat. Deinde venter restitit. Urinæ usque ad finem tenues quidem, boni autem coloris, & multam habebant suspensionem, dispersam, non subsidebant. 16. Minxit paulo crassius, quod habebat exiguam subsidentiam. Sublevatus nonnihil est, melius sibi constitit. 17. Rursus tenues fluxerunt. Secundum utramque autem tumor cum dolore ortus est, somno carebat. Delirabat. Crura illi dolebant. 20. Sine febre, judicatus est. Non sudavit. Omnia intelligebat. Circa autem 27. Coxæ dextræ fortis dolor ortus est, qui cito sedatus est. Qui vero ad aures tumores, neque subsidebant, neque suppurabant, dolebant tamen. 31. Ex diarrhæa multa aquosa prodierunt, cum excrementis dysentericis. Urinas crassas minxit, subsederunt qui circa aures tumores. 40. doluit dexter oculus.

Videbat obtusius. Reddit ad statum.



## Ægrotus Undecimus.

**D**Romeadæ uxorem quæ filiam pepererat, & aliis omnibus secundum rationem procedentibus. Secundo, die rigor accepit. Febris acuta. Cepit primo dolere circa hypochondrium, cum fastidio, horrore, & inquietudine corporis iactatione. Sequentibus diebus non dormivit. Spiritus magnus, & rarus. Subito revulsus, & retractus. Secundo, ab eo quo rigit, ex alvo bene processerunt stercora. Urinæ crassæ, albæ, turbidæ, quales sunt ex subfidentibus cum repositæ per multum tempus perturbantur. Non subsidebant. Noctu non dormivit. Tercio, circa meridiem cum rigore febris acuta corripuit. Urinæ similes, Hypochondrii dolor, fastidiosa, noctem difficulter tulit. Non dormivit. Sudor accidit per totum corpus frigidus. Cito autem recaluit. Quarto, circa hypochondrium non nihil sublevata est: Capitis vero gravitas cum dolore. Levis opore detenta est. Paucus est naribus sanguis stillavit. Lingua arida, Siticulosa erat; Urinæ tenues oleosæ, parum dormivit. Quinto, sitibunda, fastidiosa, urinæ similes, ab alvo nihil dejecit. Circa meridiem multum deliravit, & rursus citò parum rediit ad mentem. Surrexit, mox sopore correpta est, refrigeratio exigua, nocte dormivit, deliravit. Sexto, mane rigit, cito recaluit, toto corpore sudavit, extrema frigebant, deliravit, spiritus magnus, & rarus.

Paulo post convulsiones à capite ceperunt, subito mortua est.

## Ægrotus Duodecimus.

**H**Omo quidam incalescens largius cœnavit, & potavit, nocte vomuit omnia, febris acuta corripuit cum hypochondrii dextri dolore: phlegmone submollis ex exter-

na parte (alii ex interna parte) noctem difficulter tulit, urinæ initio rubræ crassitiem habentes.

Repositæ non subsidebant. Lingua arida, non valde siticulosus. Quarto, febris acuta corripuit cum omnium membrorum dolore. Quinto, minxit læve, oleosum, multum, febris acuta, perseveravit. Sexto, vespere multum deliravit, neque nocte dormivit. Septimo, omnia exacerbata sunt. Urinæ similes. Verba multa proferebat, nec se continere poterat, ab alvo autem cum irritatione, exierunt humida, turbata, cum lumbricis, nox similiter laboriosa, mane post rigorem, febris corripuit acuta. Sudavit multum, sine febre fieri visus est. Non multum dormivit. Ex somno refrigeratio accidit, & sputatio. Vespere multum deliravit. Paulo post vomuit nigra, pauca, biliosa. Nono, refrigeratio. Deliravit multum, non dormivit. Decimo, ei crura doluerunt. Omnia exacerbata sunt: deliravit. Undecimo, mortuus est.

## Ægrotus decimus tertius.

**M**ulierem quæ decumbebat in litore, trimestri fœtu gravidam, febris vehemens invasit. Statim ceperunt dolere lumbi. Tercio die doluit collum, & caput secundum claviculam & dextram manum, citò autem lingua privata est voce, dextra manus elanguit cum Convulsione Apoplectico modo.

Deliravit omnino.

Noctem difficulter tulit.

Non dormivit.

Venter turbatus est, biliosis, paucis, sinceris.

Quarto, Lingua privata est voce. Convulsio eorundem, dolor omnium membrorum permanebat, circa hypochondrium tumor aderat cum dolore. Non dormivit. Deliravit omnino. Venter turbatus. Urinæ tenues non boni coloris. Quinto, Febris acuta.



ta corripuit cum hypochondrii dolore. Deliravit omnino. Dejectiones biliosæ. Per noctem sudavit, & febre liberata est. Sexto, mente constitit. Omnia sublevata sunt. Circa claviculam sinistram dolor permanebat. Siticulosa. Urinæ tenues. Non dormivit. Septimo, tremor accidit, levi sopore & delirio detenta est parvo. Dolores secundum claviculam & brachium sinistrum permanebant. Alia verò sublevata sunt. Omnia intelligebat. Tribus diebus eam reliquit febris. Undecimo, rediit, & rigore suborto febris eam corripuit vehemens. 14. Vomuit biliosa, flava, copiosa, sudavit. Sine febre. Judicata est non sine dolore ex iisdem passionibus.

Ægrotus decimus quartus.

**M**Elida quæ decubuit juxta templum Junonis, cœpit caput & collum & pectus vehementer dolere. Statim eam corripuit febris acuta. Menstruus sanguis paucus apparuit. Dolores omnium horum continui erant. Sexto, sopor occupavit cum fastidio, horrore & malorum rubore. Parum deliravit. Septimo, sudavit. Febris intermisit. Permanebant dolores. Reversa est. Somni pauci, urinæ usque ad finem; boni quidem coloris, sed tenues. Dejectiones tenues, biliosæ, mordaces; valde paucæ, nigrae, fætidæ prodierunt, in urinis subsidentia alba, lævis. Sudavit. Judicata est perfecte undecimo.



## EPIDEMICORUM LIBER SECUNDUS.

Sectio Prima.

**I**N ardoribus sine pluvia, maxima ex parte absque sudore febres contingunt. In his si tenuior pluvia guttatim stillaverit, copiosiores sudores statim in febribus fiunt.

Febres ardentes æstate magis grassantur.

Ver in universum saluberrimum est, & minime lethale.

Quæ judicant in melius, ne statim appareant.

Judicatoria non judicantia, partim lethalia sunt, partim difficilis judicationis.

Quæ præmaturius judicantur, cum cruda sunt omnia, recidivas portant, sin minus, acrisiam. Fluxus sanguinis largi ex naribus solvunt multa, ut Heragoræ.

Non agnoscebant Medici. (i. e. Judicatorium, sed malum & noxium putabant.)

Sectio Secunda.

**A**Qua quæ celeriter calescit & celeriter frigescit, semper levior est.

*Aph. 6.  
sect. 5.*

Cuidam coxa dolebat antequam conciperet, postquam autem concepit, non amplius doluit. Vigesimo die a partu rursus doluit, peperit igitur masculum.

Hieronî judicatio facta est decimo quinto die, (hoc rarum, ideo ab Hippocrate notatum.)



## Sectio Tertia.

## Sectio Sexta.

*Lib. 6.  
Sect. 2.  
Apho. 9.* **O** Scitationes assiduas, longa spiratio sanat. Iis qui non bibunt, aut ne vix quidem, brevis spiratio plurimum confert.

*Aph. 12.  
Sect. 2.* Quæ relinquuntur in morbis post crisin, recidivas facere solent.

Quarto die facti sanguinis è naribus fluxus, difficilem faciunt judicationem.

*Lib. 6.  
Sect. 2.  
Aphor. 14.* Quæ febres diem unum intermitte-  
ntes, altero superrigent, judica-  
tione ad septimum circuitum termi-  
nantur.

## Sectio Quarta.

*Lib. 6.  
Epid. Sect.  
4. Aph. 11.* **I**N Æno qui leguminum esu con-  
tinenter utebantur mares & fæ-  
minæ, crurum impotentia labora-  
bant. Rursus etiam qui orobum co-  
medebant, genuum dolore torque-  
bantur.

## Sectio Quinta.

**Q**Uicumque rufi sunt & acuto na-  
so, ac parvis oculis, ii mali-  
gni sunt: Qui vero rufi, simi,  
& magnis oculis, boni. Vocis gra-  
cilitatem solvit varix ad sinistrum &  
dextrum testem subortus: absque  
horum altero fieri non potest, ut  
solvatur.

Steriles fovere, ac pharmaco uti  
oportet.

Qui repente voce privantur, si si-  
ne febre sint, iis venam secare o-  
portet.

*Apho. 35.  
Sect. 6.* Si hydropicum tussis corripiat,  
malum.

Si quis statim animo linquatur, ca-  
lidis omnibus uti debet, sin minus,  
vinum bibere, & cibis repleri.

Si auris doleat, lacte utatur.

Oris ventriculi morsum, merum in  
pane, calido exhibitum, sanat.

Vomitum solvitur exhibitio aquæ  
calidæ potu, ut vomat æger.

Nisi die legitimo recedat febris,  
necesse est redeat.

**L**ongævi plures dentes habent.  
Balbi, celeri lingua præditi,  
melancholici, biliosi, & iracundi  
sunt.

Qui magnum caput, oculos nigros  
& magnos, nasum crassum & simum  
habent, ii boni sunt.

Prædicere mortem aut vehementes  
dolores, Medico decorum est.

Numerorum tertius validissimus  
est.

Cynanchen & ophthalmiam venæ  
sectio curat.

Mulieri menstrua ut cohibeas, *Apho. 50.  
Sect. 5.* cucurbitulam maximam secundum  
mamam affigere oportet.

Trimestris fætus omnia habet ma-  
nifestè figurata.

Urinæ stillicidium solvit venæ se- *Apho. 36.  
Sect. 5.* ctio.

Gravissimos aurium dolores affixa  
cucurbitula tollit.

Ad reduvias galla nigra cum melle  
prodest.

## LIBER TERTIUS.

## EPIDEMIORUM.

## Sectio Prima.

## Ægrotus Primus.

**P**Ythion qui habitabat juxta tel-  
luris ædem.

Hunc cæpit tremor à manibus.  
Primo die, febris acuta, delirium.  
Secundo, omnia exacerbatum sunt.  
Tertio, eadem. Quarto, à ventre  
pauca, mera, biliosa fluxerunt.  
Quinto, omnia exacerbatum sunt.  
Somni tenues, & alvus restitit.  
Sexto, sputa varia, subrubra. Se-  
ptimo, os distortum est. Octavo,  
omnia exacerbatum sunt. Tremores  
perseverabant. Urinæ ab initio us-  
que ad octavum tenues, decolores,  
suspensiones habentes nebulosas. 10.  
Sudavit, sputa subcocta, judicatus  
est. Et Urinæ subtenues circa judi-  
cium.



cium. Quadraginta autem diebus poſt iudicium, ſuppuratio facta eſt circa ſedem, & ſtrangurioſus etiam abſceſſus, . . . . . probabile eſt, multitudine urinarum, die 40. ſanitatē illi contigiſſe.

Ægrotus Secundus.

**H**ermocratem qui decumbebat juxta novum murum febris ingens corripuit.

Cœpit capitis & lumborum dolore affici, hypochondrium molliter contendatur. Lingua ab initio aduſta fuit. Statim obſurduit. Inſomnis erat nec valde ſiticuloſus. Urinæ crassæ, rubræ, repositæ non ſubſidebant. A ventre uſta non pauca exibant.

5. Die minxit tenuia, habebant ſuſpensionem, non ſubſidebant. Sub noctem deliravit.

6. Iſtericus factus eſt. Omnia exacerbata ſunt. Mente non conſtabat.

7. Cum difficili tollerantia, urinæ tenues, ſimiles, ſequentibus diebus eodem modo ſe habuit.

Circa 11. verò, omnia viſa ſunt eſſe ſublevata. Coma incepit. Urinæ crassæ, ſubrubræ, infra tenues, non ſubſidebant. Placide ratiocinabatur.

14. Sine febre. Non ſudavit, dormivit; intelligebat omnia. Urinæ ſimiles.

Circa 17. rediit morbus, incaluit diebus ſequentibus, febris acuta, urinæ tenues.

Rurſus 20. iudicatus eſt, à febre liber, non ſudavit, cibum non capiebat per totum tempus. mente conſtabat. Loqui non poterat: Lingua arida, non ſitiebat, dormiebat ſoporofus.

Circa 24. calefactus eſt, alvus humida, multis tenuibus fluens. Sequentibus diebus febris acuta, lingua exuſta eſt.

27. Mortuus eſt. Huic ſurditas ſemper perſeverabat, urinæ aut crassæ

ſæ & rubræ non ſubſidentes, aut tenues & decolores, ſuſpenſum quid habentes, cibum capere non poterat. π. ε. δ. . ζ. ρ. ι. ε. π. θ. . . . . Probabile exeuntibus dejectionibus 27. mortem accidiſſe.

Ægrotus Tertius.

**Q**ui decumbebat in horto Dealcis, capitis gravitate, & dextri temporis dolore affectus per diuturnum tempus, ex levi occasione, vehementi febre correptus decubuit.

2. Ex ſiniſtra nare, paucus & ſincerus ſanguis fluxit. A ventre ſtercora bene exierunt. Urinæ tenues, varix, ſuſpensionem habentes minutatim diſperſam, farinam craſſiorem referentes & genituræ ſimiles.

3. Febris acuta, excretionēs nigræ, tenues, ſpumofæ, & quæ in dejectionibus ſubſidebant livida erant. Sopore premebatur, difficulter ſurgebat, in urinis ſubſidentia livida, ſubviſcoſa.

4. Evomit bilioſa, flava, exigua, paulo poſt æruginofa. Ex ſiniſtra nare paucus ſincerus ſanguis fluxit. Dejectiones, & urinæ ſimiles, exſudavit circa caput & claviculam. Splen elevatus intumuit; Femoris dolor accidit ſecundum rectitudinem. Hypochondrii dextri contentio ſubmolliſ. Nocte non dormivit, deliravit aliquantulum.

5. Dejectiones plures, nigræ, ſpumofæ, & quæ in dejectionibus ſubſiderant, nigræ erant. Nocte non dormivit, deliravit.

6. Dejectiones nigræ, pingues, viſcidæ, foetide, dormivit, mente melius conſtabat.

7. Lingua ſicca, ſiticuloſa, non dormivit, deliravit, urinæ tenues, non boni coloris.

8. Dejectiones nigræ, exiguæ, conſiſtentes, dormivit, intelligebat, ſiticuloſus non valde.

9. Ex rigore febris acuta corripuit,



puir, sudavit, perfrixit, deliravit; dexter oculus distortus est, lingua arida, siticulosus erat, & insomnis.

10. Eadem.

11. Intelligebat omnia, febre liberatus erat. Dormivit. Urinæ tenues circa judicationem. Duos dies febris intermisit.

14. Rediit. Statim per noctem non dormivit, mente motus est. Omnino deliravit.

15. Urina turbata qualis fit ex iis quæ subsederunt, quum agitantur, febris acuta, omnino deliravit, non dormivit. Genua & tibiæ dolebant. A ventre autem, glande apposita, nigra stercora exierunt.

16. Urinæ tenues, habebant enaerema nebulosum, deliravit.

17. Summo mane extremæ partes frigebant, contegebatur. Febris acuta, toto corpore sudavit, sublevatus est, mente melius constabat, non est à febre liberatus, siticulosus, vomuit biliosa, flava, pauca, à ventre autem stercora exierunt. Paulo post nigra, pauca, tenuia, urinæ tenues, non boni coloris.

18. Mente non constabat, sopore tenebatur.

19. Eodem erat in statu, urinæ tenues.

20. Dormivit. Intelligebat omnia, sudavit, à febre liberatus est. Non sitivit, Urinæ autem tenues.

21. Parum deliravit, parum sitiebat, hypochondrii dolor, & circa umbilicum, palpitatioque ad finem manens occupavit.

24. Urinis hypostasis, intelligebat omnia.

27. Coxæ dextræ dolor cepit. Urinæ tenues, habentes subsidentiam. Alia placidissime se habebant.

29. Dexter oculus doluit, urinæ tenues erant.

40. Egeffit pituitosa, alba, copiosa, sudavit multum, & toto corpore. Perfecit judicatus est.

## Sectio Secunda.

### Ægrotus Quartus.

**I**N Thaso, Philistes diuturno capitis dolore conflictatus, tandemque sopore aliquantulum correptus, decubuit. Excitata verò post potationem febre, dolor exacerbatus est. Nocte incaluit primum.

Primo die, vomuit biliosa, pauca, flava primum. Postea æruginosa plurima. A ventre stercora fluxerunt. Noctem difficulter tulit.

Secundo. Surditas accidit, & febris acuta, cum hypochondrii dextri contentione, quæ in partes internas vergebat. Urinæ tenues, pellucidæ, habentes suspensum genituræ simile. Parum insanivit circa meridiem.

Tertio. Graviter se habuit.

Quarto. Convulsiones acciderunt. Exacerbata sunt omnia.

Quinto. Mane mortuus est.

### Ægrotus Quintus.

**C**Herionem qui decumbebat juxta Demænetum, ex potu, febris vehemens corripuit. Statim capitis gravitate cum dolore laboravit, non dormivit, alvus turbata est tenuibus, subbiliosis.

3. Febris acuta invasit, & capitis tremor, præcipue labii inferioris. Paulo post rigor, convulsiones, omnino deliravit, noctem difficulter tulit.

4. Quievit. Parum dormivit, deliravit.

5. Laboriose se habuit, omnia exacerbata sunt, delirium, nox molesta, non dormivit.

6. Eadem.

7. Superriguit, febris acuta corripuit, toto corpore sudavit. Judicatus est. Huic perpetuo ab alvo dejectiones biliosæ, exiguæ, sinceræ prodierunt. Urinæ tenues, boni coloris, suspensum nebulosum habentes.

Circa 8. Minxit melioris coloris uris.



urinas, habentes hypotaſin albam, exiguam, mente conſtabat. Febris intermiſit, quæ 9. rediit.

14. Febris acutaprehendit, ſudavit.

16. Vomuit bilioſa, flava, ſatis multa.

17. Superriguit, febris acuta, ſudavit. A febre decretoriè liberatus eſt. Urinæ poſt recidivam, & Judicationem, melioris coloris, ſubſidentiam habentes, neque deliravit in recidiva.

18. Incaleſcebat parum, inſuper ſitiebat. Urinæ tenues, ſuſpenſum quid nebuſum habentes, parum deliravit.

Circa 19. à febre liberatus, circa cervicem habebat dolorem, urinis ſubſidentia aderat, perfectè judicatus eſt 20. *π. δ. . ε. θ. i. e.* Probabile eſt multitudine urinæ Cherionem 20. die Sanatum.

#### Ægrotus Sextus.

**E**Uryanaſtis filiam virginem febris vehemens corripuit, permansit uſque ad finem ſine ſiti, & quævis alimenta reſpuebat, à ventre pauca exierunt. Urinæ tenues, exiguæ, non boni coloris. Incipiente febre circa ſedem dolebat.

6. Die, febre libera, non ſudavit, judicata eſt. Quod autem circa ſedem, parum ſuppuratum eſt, & exivit cum judicatione.

Poſt judicationem die 7. riguit, non nihil incaluit, ſudavit.

Poſt judicationem 8. die, riguit non multum, poſtea vero extrema frigida ſemper fuerunt.

Circa 10. poſt eum quem habuerat ſudorem, deliravit, & rursus ad mentem conſeſtim rediit. Dicebant autem eam hæc pati, quod guſtaſſet racemum.

Intermittens verò, 12. rursus deliravit, venter turbatus eſt bilioſis, paucis, ſinceris, tenuibus & mordacibus, crebro ſurgebat.

17. Quo poſtremum deliraverat,

mortua eſt. Hæc incipiente morbo doluit fauces, & perpetuo ruborem habebat, & columella revulſa fuit, fluxiones multæ, exiguæ, acres, tuſſiit concocta. Nihil excreabat. Nullum cibum toto tempore accipere poterat, neque appetebat quicquam, neque ſitiebat, neque bibit quicquam notatu dignum. Tacita, nihil loquebatur, triſtis, deſperata ſtatim erat. Erat autem nativa quædam ad tabem propenſio.

#### Ægrotus Septimus.

**A**Nginoſa, quæ juxta Ariſtionem agebat. Hæc primum à lingua incepit. Obſcura vox erat, lingua rubra & reſiccata.

Primo, die horrida, incaluit.

Tertio. Rigor, febris acuta invaſit, cervicis tumor ſubruber, durus, & ſuper pectus ab utraque parte. Extrema frigida, livida, Spiritus ſublimis. Potum per nares rejiciebat, bibere non poterat, dejectiones & urinæ reſliterunt.

Quarto, omnia exacerbata ſunt.

Quinto, mortua eſt, *π. δ. . ε. θ. i. e.* *πιθανόν διὰ τὴν ὀφθαλμικὴν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ ἐπὶ τῇ* *κατὰ τὴν*. Probabile dejectionibus ſuppreſſis 5. Mortuam.

#### Ægrotus Octavus.

**A**Doleſcentem illum qui decumbebat in foro Mendacium, vehemens febris corripuit, ex laſſitudinibus & laboribus, & curſibus inſolitis.

Primo alvus turbata eſt bilioſis, tenuibus, multis. Urinæ tenues, ſubnigræ, non dormivit, ſticuloſus fuit.

Secundo, omnia exacerbata ſunt, dejectiones plures, intempeſtiores, non dormivit. Mente turbatus fuit, & levi ſudore perſuſus.

Tertium difficulter tulit, ſticuloſus, anxius, multum ſe jaſtavir, & perplexus erat, deliravit. Extrema livida, & frigida hypochondrii



drii contentio submollis utrinque .

Quarto, non dormivit, pejus se habuit.

Septimo, mortuus est. Circiter vigesimum ætatis annum agebat. π. ε. ζ. θ. Probabile insolens quiddam septimo die mortem attulisse.

#### Ægrotus Nonus.

**M**ulier, quæ decumbebat juxta Misamenum. Huic volvulosa molestè concitabantur, vomitibus multis torquebatur, potum continere non poterat, dolores aderant circa hypochondria, & in inferibus secundum ventriculum partibus. Dolores & tormina continenter affligebant, non erat siticulosa, incalescebat. Extrema frigida usque ad finem. Fastidiosa sine somno. Urinæ tenues, paucæ, excretiones crudæ, tenues, paucæ, non erat remedio locus, mortua est.

#### Ægrotus Decimus.

**M**ulierem quandam earum, quæ apud Pantimedem degebant, ex abortu recentis fœtus, vehemens febris primo die corripuit. Lingua sicca, siticulosa, fastidiosa, insomnis erat. Alvus turbata est tenuibus, multis, crudis.

Secundo. Superriguit, febris acuta invasit, ex alvo multa egressit. Non dormivit.

Tertio. Dolores augebantur.

Quarto. Deliravit.

Septimo. Mortua est. Alvus per totum morbum humida, cum dejectionibus multis tenuibus, crudis. Urinæ paucæ, tenues, febris ardens.

#### Ægrotus Undecimus.

**A**lteram ex abortu circa quintum mensem Oecetæ uxorem, febris vehemens corripuit. Initio comatosa erat, & rursus insomnis cum renum dolore, & capitis gravitate.

Secundo, alvus turbata est paucis, tenuibus, meris primum.

Tertio, plura & deteriora. Nocte nihil dormivit.

Quarto. Deliravit, timores, tristitiæ aderant, dexter oculus distortus est, sudore circa caput paucos & frigido, maduit, extrema frigida.

Quinto, omnia exacerbata sunt. Multum deliravit, & rursus celeriter ad mentem rediit, siticulosa erat, & insomnis. Alvus multis & meris, usque ad finem defluxit. Urinæ erant tenues paucæ, subnigræ, extrema frigida, sublivida.

Sexto, eadem.

Septimo, mortua est phrenitide.

#### Ægrotus Duodecimus.

**M**ulierem, quæ decumbebat in foro Mendacium, enixam primum laboriosè masculum, vehemens febris corripuit. Mox in principio siticulosa, fastidiosa, dolebat cor, lingua arida, alvus turbata tenuibus, paucis, non dormivit.

2. Parum riguit, febris acuta invasit, paucus sudor circa caput & frigidus diffusus est.

3. Laboriosè ex alvo cruda multa tenuia fluxerunt.

4. Superriguit, omnia exacerbata sunt, insomnis.

5. Laboriosè se habuit.

6. Eadem, ab alvo fluxerunt humida multa.

7. Superriguit: Febris acuta prehendit. Sitis multa aderat & corporis jactatio: circa vesperam frigidus toto corpore sudor damnavit. Perfrigit. Extrema erant frigida, nec recalescebant & rursus ad noctem superriguit. Extrema non recalescebant. Non dormivit, parum quiddam deliravit, & rursus cito mente constitit.

8. Circa medium diei recaluit, siticulosa, comatosa, fastidiosa, vomuit biliosa, pauca, flava, noctem difficulter tulit, non dormivit, minxit multum, confertim, inscia.

9. Re-



9. Remissa sunt omnia, erat comatosa, ad vesperam parum superri-  
guit. vomuit amara, biliosa.

10. Rigor accidit, febris exacer-  
bationem habuit, non dormivit quid-  
quam: Mane minxit multum, subfi-  
dentiam non habens. Extrema reca-  
lescunt.

11. Vomuit virulenta, biliosa, ri-  
guit non multo post, & rursus extre-  
ma frigida. Ad vesperam rigor, su-  
dor, vomuit multa. Noctem labo-  
riose transegit.

12. Vomuit multa, nigra, fætida,  
Singulus multus adfuit, & sitis labo-  
riosa.

13. Nigra, fætida, multa vomuit  
rigor obortus est, circa meridiem vo-  
ce privata est.

14. Fluxit sanguis de naribus. Mor-  
tua est. Huic per totum alvus humida  
fuit, & horrebat, annum ætatis age-  
bat circiter 17. Febris ardens.

### Seclio Tertia.

#### Ægroti 16.

#### Ægrotus Primus.

**I**N Thaso Parium qui decumbebat  
supra domum Artimesii, febris  
corripuit acuta, circa, initia conti-  
nua, ardens, siticulosa: ab initio  
comatosus erat, rursusque insomnis.  
Alvus turbata inter initia. Urinæ  
albæ.

6. Minxit oleosum, deliravit.

7. Exacerbata sunt omnia. Nihil  
dormivit, sed urinæ similes, & mens  
turbata. Ex alvo autem biliosa pin-  
guia fluxerunt.

Deinde 8. Parum à naribus destil-  
lavit. Vomuit virosa, pauca, parum  
dormivit.

9. Eadem adfuerunt.

10. Omnia remiserunt.

11. Sudavit non per totum, circum-  
frigit, quidem, cito autem recaluit.

12. Febris acuta fuit, dejectiones  
erant biliose, tenues, multæ, urinis  
enæorema deliravit.

Burnet Parte II.

17. Laboriose transmissus est, ne-  
que somni aderant, neque febris in-  
tendebatur.

20. Sudavit toto corpore, insomnis,  
dejectiones erant biliosæ, cibum aver-  
sabat, comatosus erat.

24. Recidiva conrigit.

34. Sine febre alvus non substitit,  
& rursus recaluit.

40. Sine febre. Alvus non diu re-  
stitit, cibum aversabat, parum rur-  
sus febricitavit, & perpetuo erratic-  
ce, aliquando à febre liber, aliquan-  
do non, si enim aliquid intermiseret,  
& allevata esset, rursus revertebatur;  
Cibariis multis & malis utebatur, fo-  
mni mali in recidivis. Delirabat.  
Urinæ tunc reddebat crassas quidem  
verum turbatas & pravas. Alvus ad-  
stricta fuit, & rursus soluta, febric-  
ulæ aderant continuæ, dejectiones  
multæ, tenues. 120. die mortuus est.  
Huic alvus ab initio ad finem usque  
lubricata erat, excernebatque biliosa,  
liquida, multa, aut si subsisteret,  
fervida & cruda. Urinæ usque ad fi-  
nem malæ. Comatosus erat, aut ple-  
rumque cum doloribus insomnis: ci-  
bos fastidiebat, & continenter febre  
ardente laborabat.

#### Ægrotus Secundus.

**M**ulierem in Thaso juxta frigi-  
dam decumbentem, cum fi-  
liam peperisset, nec purgationes pro-  
cederent.

3. Die febris acuta cum horrore  
corripuit. Multo autem ante partum  
tempore ex febre decumbebat, & ci-  
bum fastidiebat. Postquam verò ri-  
guisset, continuæ fuerunt febres acu-  
tæ & cum horrore.

8. Et sequentibus diebus multum  
deliravit, rursusque cito ad mentem  
rediit. Alvus turbata est multis, te-  
nibus & aquosa bile permixtis. Non  
stiebat.

11. Constabat mente, comatosa  
tamen erat. Urinæ multas, tenues  
& nigras reddidit, insomnis erat.

20. Parum circumfrigit, & cito

F

rur-



rursus recaluit. Parum deliravit, insomnis erat, & venter eadem demisit. Urinæ aquosæ & multæ erant.

27. A febre immunis fuit, & alvus substitit. Non multò post vehementi & diuturno dextræ coxendicis dolore vexata est. Febres rursus comitabatur, & urinæ aquosæ.

40. Coxendicis dolores remiserunt; tussis autem continuæ, humidæ multæ. Alvus substitit. Cibos averfabatur. Urinæ eadem, febres omnino quidem non desinebant, sed erraticas aliquando habebant exacerbationes, aliquando non.

60. Tussis sine signis evanuerunt, nulla enim sputorum concoctio apparuit, neque alius consuetus abscessus. Maxilla etiam dextra convulsa est, comatosa, rursus deliravit, & cito ad mentem rediit. Cæterum à cibis aversum habebat animum. Maxilla autem ad locum suum rediit. Alvus biliosa pauca reddidit. Febricitavit acutius cum horrore, & sequentibus diebus vox defecit, rursusque rediit ad mentem, & loquebatur. Et 80. Mortua est. Huic Urinæ usque ad finem erant nigræ, & tenues, & aquosæ, & coma comitabatur. Cibum non sumebat, animo erat dejecto, insomnis, ira & inquietudine torquebatur, animo erat melancholico.

### Ægrotus Tertius.

**I**N Thaso Pythionem, qui decumbebat supra Herculis fanum, ex laboribus & lassitudinibus & pravo victu; rigor magnus & febris acuta corripuit. Lingua arida erat. Siticulosus & biliosus. Non dormivit; Urinæ subnigræ suspensum quid sublimè habebant, non sudavit. Altero sub meridiem die, extremarum partium refrigeratio accidit, & maxime circa manus & caput. Obmutuit (*ἄρρωδος*) vox defecit (*ἄφωνος*) brevem spiritum traxit, post diuturnum tempus recaluit, sitiit, nocte quievit, sudavit circa caput parum.

Tertium diem quietum habuit. Vespero circa solis occasum, aliquantulum frixit, turbatio accidit. Noctem laboriosè transegit. Nihil dormivit. Ex alvo pauca stercora compacta exierunt.

Quarto mane quievit, circa meridiem omnia exacerbata sunt. Frixit, obmutuit, vox defecit, deterius se habuit, recaluit. Post aliquod tempus minxit nigra suspensum, quid habentia. Noctem quietam habuit, dormivit.

Quinto, allevatus esse visus est. Circa ventrem tamen pondus sensit cum dolore, siticulosus fuit, noctemque habuit molestam.

Sexto, mane quievit, vespere autem dolores creverunt, exacerbationem habuit injecto verò clystere vespere ex alvo probe deiecit, nocte dormivit.

Septimo die fastidiosus erat & inquietus, minxit oleosum noctem turbulente transegit, deliravit, nihil dormivit.

Octavo, mane quidem dormivit parum, mox accidit refrigeratio, vocis defectio, spiritus exilis & imminutus. Vespere rursus recaluit. Deliravit, instante jam die parum levatus est, deiectiones erant meræ, paucae, biliosæ.

Nono, soporosus erat, fastidiosus & quum excitabatur non valde siticulosus. Circa solis occasum molestè se habuit, deliravit noctem habuit incommodam.

Decimo, mane defecit vox, multa refrigeratio, febris acuta, multus sudor. Mortuus est. Labores huic diebus paribus accidebant.

### Ægrotus Quartus.

**P**Hreniticus primo die quo decubuit, vomuit æruginosa, multa tenuia, febris corripuit cum horrore, multus sudor & continuus toto corpore dimanavit, capitis & colli gravitas cum dolore. Urinæ tenues, suspensiones exiguæ, dispersæ. Non sudavit.



davit. Ab alvo ejecit ſtercus confer-  
tim, multa deliravit, nihil dormi-  
vit.

Secundo, mane vox defecit: Fe-  
bris acuta invaſit. Sudavit. Non in-  
termiſit. Palpitationes per totum  
corpus. Noſte convulſiones.

Tertio, exacerbata ſunt omnia.  
Mortuus eſt ( ſecundum Fœſium )  
quarto.

*Ægrotus Quintus.*

**I**N Lariſſa Calvus femoris dextræ  
repentino dolore correptus eſt, ni-  
hil eorum quæ offerebantur juvabat.

Primodie febris acuta & ardens,  
ſenſim corripuit, dolores autem co-  
mitabantur.

Secundo, femoris dolores remiſe-  
runt, febris autem intenſa eſt, ſub-  
moleſte ſeſe habuit, non dormivit.  
Extremæ partes frigidæ erant. Uri-  
narum non probarum copia prodibat.

Tertio, femoris dolor ſedatus eſt  
mentis autem alienatio accidit & per-  
turbatio & mala jaſtatio.

Quarto, circa meridiem mortuus  
eſt acutiſſime.

*Ægrotus Sextus.*

**A**Bderæ Periclem morbus corri-  
puit acutus, continuus cum do-  
lore. Multum ſitiebat anxius erat,  
potum continere non poterat, erat  
ſublienofus, & capitis gravitate la-  
borabat.

Primo, fluxit ſanguis multus ex  
ſiniſtra nare, febris intendeſatur,  
Minxit multum, turbatum, album,  
repositum, non ſubſidebat.

Secundo, omnia exacerbata ſunt.  
Urinæ vero craſſæ quidem erant, ſed  
magis reſidentes: & anxietas levata  
eſt, dormivit.

Tertio, febris remiſſa eſt. Urinæ  
copioſæ, coſtæ, multam hypotaſin  
habentes. Noſtem quiete tranſegit  
uſque ad medium diem, ſudavit ſu-  
dore multo calido.

Quarto die per totum corpus, à fe-

bre liberatus eſt, & judicatus. Non  
rediit. Morbus erat acutus.

*Ægrotus Septimus.*

**A**Bderæ Virginem quæ decumbe-  
bat in via ſacra, febris ardens  
corripuit. Erat autem ſiticolofa, &  
inſomnis. Fluxerunt muliebria pri-  
mum ipſi.

6. Faſtidium multum, ruborem  
contraxit cum horrore, & inquietu-  
dine.

7. Eadem perſeſerant. Urinæ  
tenues quidem, boni autem coloris,  
alvus commodè habebat.

8. Surditas accedit & febris acuta,  
inſomnis erat & anxia, horrebat, in-  
telligebat. Urinæ ſimiles.

9. Et ſequentibus eadem. Mane-  
bat item ſurditas.

14. Mens turbata, febris remiſit.

17. E naribus ſanguis fluxit mul-  
tus. Surditas parum remiſit, ſequen-  
tibus faſtidium & ſurditas aderat &  
delirabat.

20. Pedum dolor cœpit. Surditas  
& delirium intermiſit. Fluxit parum  
ſanguinis de naribus, ſudore à febre  
liberata fuit.

24. Febris rediit, ſurditas rurfus,  
pedum dolor permansiſt, alienatio  
mentis.

27. Sudavit multum, à febre libe-  
rata fuit. Surditas deſiit. Dolor pe-  
dum permanebat. Quoad alia verò  
perfectè judicata eſt.

*Ægrotus Octavus.*

**A**Bderæ Anaxionem qui decum-  
bebat ad portas Thracias febris  
acuta corripuit: lateris dextri dolor  
continuus, tuſſis erat ſicca, neque  
expuit primis diebus. Siticolofus in-  
ſomnis. Urinæ boni coloris, multæ,  
tenues. 6. Deliravit, poſt fomenta  
calida nihil remittebatur. 7. Labo-  
riofe ſe habuit, febris enim intende-  
batur, & dolores non ſunt minuti, &  
tuſſes infeſtabant & difficulter reſpi-  
rabat. 8. Venam in cubito ſecui,

F 2. fluxit



fluxit multum, ut decebat. Remissi sunt dolores. Tusses quidem aridae permanferunt. 11. Febres remiserunt, parum circa caput sudavit. Tusses adhuc durabant, & quæ à pulmone exhibant humidiora erant. 17. Incepit pauca concocta spuerere. Levatus est, sitibundus verò erat. Et eorum quæ à pulmone exhibant probæ non erant expurgationes. 20. Sudavit, à febre liberatus est. A iudicatione melius habuit. 27. Febris rediit, extussit, excreavit cocta multa. In urinis erat subsidencia multe alba, desit sitire, dormivit. 34. Sudavit toto corpore, liberatus est à febre, & omnino iudicatus.

#### Ægrotus Nonus.

**A** Bderæ Herophytus rectus, & obambulans capite dolēbat, non multo postea decubuit. Febris eum corripuit ardens acuta. Vomuit ab initio multa biliosa. Siticulosus. Difficilis tollerantia multa. Urinæ tenues, nigræ in quibus suspensum quid sublime aliquando erat, aliquando non. Noctem laboriosam habuit. Febris alias aliter exacerbescēbat plerumque sine ordine.

14. Verò surditas accidit, febres intendebantur, Urinæ eadem fuerunt.

20. Multum deliravit, & sequentibus.

40. Multus sanguis exiit de naribus & intelligebat magis. Surditas inerat quidem, minus tamen. Febres remiserunt. Sequentibus diebus sanguis erumpebat crebro & paulatim.

Circa 60. fluxus sanguinis cessaverunt. Coxæ autem dextræ dolor fortis exortus est, & febres intendebantur. Non multo tempore postea doluerunt omnes inferiores partes. Contigit autem aut febres esse majores & surditatem multam; aut hæc quidem, recedere & sublevari, infernarum verò partium circa coxam majores esse dolores.

Circa 80. remiserunt omnia; Dereliquit autem nihil. Urinæ enim

boni coloris & copiosiores subsidencias habentes prodibant, & deliria minora erant.

Circa 100. alvus multis biliosis turbata est, & tempore non exiguo multa huiusmodi prodibant; & rursus dysenterica cum dolore. Aliorum autem quies. In summa febres defecerunt & surditas cessavit. 100. die perfectè iudicatus est. Febris erat ardens.

#### Ægrotus Decimus.

**A** Bderæ Nicodemum ex venere & potu febris corripuit. Initio fastidiosus erat & cardialgicus & siticulosus. Lingua usta, urinæ tenues, nigræ.

2. Febris exacerbata est cum horrore. Fastidiosus, nihil dormivit. Vomuit biliosa flava, urinæ similes. Noctem quietam habuit, dormivit.

3. Remiserunt omnia & quies erat. Circa solis occasum rursus subdifficilem habebat tollerantiam. Noctem laboriosè transegit.

4. Rigor cepit & febris magna, omnium dolores aderant, urinæ tenues in quibus suspensum quid erat, deliravit multum.

7. Tranquillitas adfuit.

8. Alia omnia remiserunt.

10. Et sequentibus manserunt quidem dolores, leviores autem omnes accessiones & dolores, huic usque ad finem diebus paribus magis contingebant.

20. Urinam reddidit albam, cui crassities inerat, reposita non subsidebat, sudavit multum. Visus est à febre liberatus. Vesperi rursus incauit. Iidemque dolores perseverarunt cum horrore & siti, parum deliravit.

24. Urinam reddidit copiosam albam, in qua multa subsidebant. Sudore copioso & calido diffusus est per totum corpus à febre liberatus est & iudicatus.



*Ægrotus Undecimus.*

**I**N Thaso mulier morosa ex mœrore manifesto, recta adhuc & obambulans, insomnis facta est, & cibum non capiebat, siticulosa erat & anxia. Habitabat prope Pyladem in Lejo.

Primo die sub initium noctis, terrores, sermones multi, tristitia, febricula tenuis. Mane convulsiones multæ contigerunt. Cum autem intermisissent convulsiones illæ multæ, deliravit, turpia loquebatur. Multi dolores, magni, continui.

Secundo. Eadem. Nihil dormivit. Febris acutior.

Tertio. Convulsiones desierunt, coma autem & cataphora eam detinuerunt, & rursus expergefacta exiliit. Continere se non poterat. Multum delirabat, febris acuta erat. Eadem nocte sudor copiosus, & calidus toto corpore dimanavit, liberata est à febre, dormivit. Omnia intelligebat. Judicata est, circa tertium diem, urinæ nigræ, tenues erant, habebantque suspensum quid valde rotundum, non subsidebat; circa judicationem muliebria multa fluxerunt.

*Ægrotus Duodecimus.*

**L**arissæ Virginem febris corripuit ardens acuta. Insomnis, siticulosa; Lingua fuliginosa, arida. Urinæ, boni quidem coloris, sed tenues erant.

Secundo. Laboriose se habuit, non dormivit.

Tertio. Multa fluxerunt ab alvo, ut aqua biliosa, & sequentibus talia commodè prodierunt.

Quarto. Urinam reddidit tenuem, paucam, habebat suspensum quid sublimè, quod non subsidebat, deliravit sub noctem.

Sexto. Sanguis ex naribus copiosus & multus effluxit, horrore correptus est, & sudore copioso, calido perfusa per totum corpus, à febre li-

*Burnet Parte II.*

berata est & judicata. Per febres autem, & etiam perfecta judicatione muliebria tunc primum fluxerunt. Virgo enim erat. Perpetuo autem stomachi fastidio laborabat, horrebat, faciei rubor aderat, oculorum dolor, capitis gravitas. Hæc non passa est recidivam, sed judicata. Dolores paribus diebus contingebant.

*Ægrotus decimus tertius.*

**A**Pollonius Abderæ morbum diu rectus, & obambulans sustinebat. Magna illi erant viscera & circa hepar dolor confuetus multo tempore comitabatur, & tunc sane ictericus factus est, flatuosus, colore subalbido. Cum cibo & potu intempestivo uteretur, & præcipuè carne bovina; primò incaluit parum decubuit. Cum verò usus fuisset copioso lacte, cocto, crudoque caprino, & ovino, pravaque victus ratione, insignes omnium læsiones factæ sunt: Nam febres exacerbatae sunt nec venter quicquam ex ingestis effatu dignum reddidit. Urinæ tenues & paucæ prodibant. Insomnis erat. Inflatio mala aderat, multa sitis, comatosus, hypochondrii dextri elevatio cum dolore. Extrema omni ex parte subfrigida erant, parum deliravit, omnium quæ locutus est obliviscebatur, mentis compos non erat.

Circa 14. verò ex quo suborto rigore, incaluit, decubuit & insanivit, clamor, perturbatio, sermones multi, rursusque cessatio, & coma tunc temporis accessit, postea verò alvus turbata est multis, biliosis, meris, crudis. Urinæ nigræ erant, paucæ, tenues; plurima anxietas, dejectiones variæ erant, aut enim nigræ & paucæ & æruginosæ erant, aut pingues crudæ & mordaces, postea videbatur etiam lacti similes reddidisse. Circa 24. Levius, se habuit, alia verò eodem modo manserunt parum ad mentem rediit, verum ex quo decubuerat nullius recordabatur, rursus.



susque celeriter decipiebat, procedebat omnia in deterius.

Circa 30. diem febris acuta corripuit, alvi excrementa copiosa erant & tenuia, deliravit, extrema frigida erant, vox defecit. 34. Mortuus est. Huic ex quo eum vidi, ad finem usque alvus turbata fuit, urinæ tenues, nigræ comatosus insomnis, extremitates frigida, deliravit usque ad finem, phreniticus.

*Ægrotus decimus quartus.*

**I**N Cyrisco Mulierem quæ gemelas & quidem ægre pepererat, nec satis expurgata erat, Primo febris corripuit cum horrore, & acuta, capitis & cervicis gravitas cum dolore tenuit. Insomnis à principio erat, taciturna, & tetrica, & non obsecundans. Urinæ tenues erant & decolores, siticulosa, ut plurimum fastidiosa & anxiosa. Alvus ertatice turbata fuit & rursus adstricta.

Sexto, subnoctem deliravit, nihil dormivit.

Circa 11. verò insanivit, rursusque ad mentem rediit. Urinæ nigræ erant, tenues, & rursus cum intermississent, oleosæ & alvus multa tenuia, turbata, egressit.

14. Convulsionem multam exorta sunt, extremitates erant frigida, neque amplius ad mentem rediit. Urinæ suppressæ sunt, mortua est phrenitis.

*Ægrotus decimus quintus.*

**I**N Thaso, Dealcis uxorem quæ decumbebat in Lejo (vel Plano) febris cum horrore, & acuta, ex merore corripuit. A principio contegebatur, & semper usque ad finem taciturna erat, palpabat, vellebat, scalpebat, pilos legebat, plorabat, rursusque ridebat, non dormiebat, alvus irritabatur, sed nihil exhibat, exiguum, admonita, bibebat. Urinæ tenues erant & paucae, febres ad manum leves apparebant. Extremitates

partes frigeant. 9. multum deliravit, rursusque quievit, tacita.

14. Spiratio fuit rara & magna per aliquod tempus, rursusque brevis.

17. Alvus turbulentè irritata est. Deinde ipsi potus pertransibant, neque consistebant, omnium sensu privata est, & cutis arida, circumtensa.

20. Multum loquebatur, rursusque quiescebat, muta. Brevem spiratum trahebat.

21. Mortua est. Huic spiratio rara & magna fuit usque ad finem, omnium sensu privata est, semper contegebatur, aut multum loquebatur, aut taciturna erat usque ad finem, phrenitis.

*Ægrotus decimus sextus.*

**I**N Melibæa Adolescens, ex potu & multa venere, multo tempore calefactus decubuit.

Horrore concussus est, fastidiosus erat, & anxius, sine somno, & sine siti.

Ex alvo, primo die, multa stercorea prodierunt, cum multa defluxione, & sequentibus, aquosa, biliosa multa prodierunt.

Urinæ tenues, paucae, decolores. Spiritus rarus, magnus per tempus, hypochondriorum dissentio submolli, producta utrinque, cordis palpitatio perpetua usque ad finem: minxit oleosum, deliravit modice, modestus erat & quietus, cutis arida & dissenta, dejectiones multæ, tenues, aut biliosæ & pingues.

14. Omnia exacerbata sunt. Mente est motus.

Multa deliravit.

20. Insanivit, se se iactavit. Nihil minxit, vix potum continebat.

24. Mortuus est, phrenitis.



## LIBER QUARTUS EPIDEMIORUM.

**V**irgini, cum die sexto judicatio advenisset, in morbum recidit, judicata verò sunt omnia per sextum. His temporibus sexto, & octavo judicabantur circa Plejadis occasum.

Qui in Sutrina decumbebat, Sanguinem per nares fudit valde biliosum, pauca deiciebat, judicatus est septimo cum rigore.

Mulier quædam cum albis mensibus filiam peperit: Alia cum rubris, ut par erat.

Nicippus in febribus semen effudit somnians, nec quicquam in deterius processit, & hoc ipsi sæpe contigit, & nullo modo læsus est. Illi prædictum est istud cessaturum, cum febres judicatæ essent, & ita accidit.

Alcippus hæmorrhoidibus laborans, prohibebatur curari, curatus, infania correptus est, quæ febre acuta superveniente cessavit.

In acutis febribus siticulosi, à medicis vexati in potu, aut etiam sua sponte abstinentes, videntur posse bibere multum. Aqua frigida data, ut vomant, prodest, biliosa enim auferunt.

## LIBER QUINTUS EPIDEMIORUM.

**6.** **I**N Oeniadis, vir quidam morbo tenebatur, cum sine cibo permaneret, strepitum in ventre vehementem (vel secundum Valesium vehementem suctionis sensum) & dolorem percipiebat: & cum cibo assumpto & contrito, tempus etiam aliquod elapsum esset, post assumptum cibum, paulo post idem patiebatur, corpusque tabescebat, & absumebatur, neque alimentum ei accedebat ex assumptis cibis, & reliquæ ciborum pravae & exustæ per alvum de-

mittebantur. Cum vero recens cibatus esset, tum minime strepitum (suctionis sensum) sentiebat, neque dolor detinebat. Hic, assumptis omnis generis medicamentis & sursum & deorsum purgantibus, nihil allevabatur. Secta verò per vices utriusque manus vena, donec exsanguis redderetur, tum demum juvatus est, & à malo liberatus.

**25** Larissæ famula Dyseridis adhuc juvencula, cum venere uteretur, vehementi circum circa dolore afficiebatur, alias verò indolens erat, nec unquam concepit. Sexaginta autem annos nata, post meridiem dolebat vehementer, velut paritura. Cum autem ante meridiem multum comedisset porrum, & dolor, omnium præteritorum vehementissimus, ipsam corripuisset, exurgens asperum quiddam in uteri ore contrectavit. Deinde cum jam animo linqueretur, alia mulier immittens manum extraxit lapidem asperum fusi verticuli æquantem, & statim sana facta est, posteaque permansit.

**27** Autonomus in Omilo ex capitis vulnere mortuus est 16. die, cum æstate media cominus lapide fuisset percussus secundum suturas in medio sincipite. Hoc me latuit, cum sectione indigere, deceperunt enim me suturæ, in selsis jaculi læsionem continentes. Postea enim manifestum fuit.

Primum quidem ad claviculam, postea autem ad latus, dolor admodum vehemens exortus est, & convulsio utramque manum occupavit. In medio enim capitis & sincipitis habebat ulcus.

Sectus est 15. die, nec multum pus prodiit, meninx enim sine putredine apparebat.

(A futuris se deceptum esse Hipocrates memoriæ prodidit, more scilicet magnorum virorum, & fiduciam magnarum rerum habentium. Nam levia ingenia, quia nihil habent, nihil sibi detrahunt.)

**28** Famula in Omilo 12. annos na-

Corneli.  
Celsus.



ta, ex capitis vulnere moritur æstate media, 14. die, convulsio manum sinistram corripiebat, nam in dextra magis parte habebat vulnus.

40 Hermophili filius ægrotavit 11. diebus: Febris tenebat ipsum, & non descendebant cibi, primum quidem deliravit, nocte verò cessavit, sequenti die sine voce jacebat stertens, distortos habens oculos, febricitans. Penna verò immissa vomuit bilem atram, & clystere immisso stercus multum subiit.

45 Sutor qui in Pityo erat, calcem assuens sese supra genu in femur pupugit, & fere ad digiti longitudinem subulam immerfit. Huic nullus sanguis effluxit, & vulnus citò coivit, femur autem totum intumescerebat, & tumor ad inguina, & lateris inanitatem extendebatur. 3. die mortuus est.

46 Quidam juxta inguen sagitta percussus, quem nos vidimus, maxime præter opinionem servatus est. Neque enim cuspis exempta est (erat enim admodum in profundo) neque hæmorrhagia ulla fiebat mentione digna: Neque Phlegmone aderat, neque claudicavit. Nos autem cuspidem inveniētes exemimus, cum sex jam essent anni, ex quo percussus erat. Suspicio erat, inter nervos occultatam fuisse cuspidem, nullamque venam aut arteriam dissectam esse.

50. Virgo illa pulchra Nerei filia annos 20. nata, à muliercula amica ludente, lata manu percussa est secundum sinciput, & tunc quidem vertigine tenebricosa correpta est, & respiratione privata, & cum in domum venisset, statim eam febris vehemens corripuit, cum capitis dolore & faciei rubore. 7. die à dextra aure pus prodiit foetidum, subrubrum, cyatho amplius, & melius se habere videbatur, & sublevata est. Rursus intendebatur febris, & in somnum deferebatur, nec loqui poterat, & faciei pars dextra trahebatur, difficulter spirabat, & cum tremore convellebatur, & lingua cohibeba-

tur, & oculus stupidus erat, 9. mortua est.

53 Cuidam, quæ 20. ætatis annum agebat, & pharmacum corruptorum biberat, dolor contigit, & vomitus biliosorum multorum, pallidorum & porraceorum: cum bibisset, convulsio corripiebat, linguam mandebat. Cum circa 4. advenissem, ipsi lingua erat magna & nigra, oculorum vero album rubescebat, insonnis erat. Quarto die mortua est sub noctem.

74 Magnæ navis Gubernatori anchora digitum indicem & manus dextræ os infernum, confregit; inflammatio successit, sideratio & febris. Moderatè per alvum purgatus est, ex quo calores & dolores mites fuerunt. E digito quiddam decidit. Post septimum diem moderata sanies exibat. Postea dixit, se omnia non posse lingua enunciare. Prædictum est fore episthotonum, ad id conferebant maxillæ impactæ, deinde ad cervicem retractæ. Tertio verò in posteriora totus convellebatur cum sudore. Sexto die à prædictione mortuus est.

(Libro septimo ubi reperitur eadem historia, quinto die purgatus dicitur.)

85 Adolescens quidam post multum meri potum, in tentorio quodam supinus dormiebat. Hujus in os serpens arges irrepsit, & cum sensisset, nec posset loqui, stridit dentibus, & serpentem devoravit, & vehementi dolore afficiebatur, & manus efferebat, ut qui strangularetur, jactavit seipsum, & convulsus, mortuus est.

89 Uxor Epicharmi antequam pareret dysenteria laborabat, vehemens dolor aderat dejectiones subcruentæ, mucosæ, ubi peperisset, confestim sanata est.

96 Philes filium ex denudatione ossis in fronte, 9. die febris corripuit, os livorem contraxit, mortuus est.



# LIBER SEXTUS

## EPIDEMIORUM.

## Sectio Prima.

**Q**uibuscumque ex corruptione circa uterum, & tumoribus, in capitis gravitatem convertitur affectus, circa sinciput dolores præcipue accidunt.

6 Menstruæ purgationes mulieribus aquosis diu perseverant, nisi autem celeriter prodeant, intumescent.

9 Ante rigorem, urinarum suppressiones accidunt, si ex utilibus signis processerint, & alvus permeet, somnique affuerint.

## Sectio Secunda.

**D**ilatare, constringere, alia quidem oportet, alia autem non.

13 Quæ 4. die accidunt sanguinis è naribus eruptiones, difficilem faciunt judicationem.

15 Quæcunque febres naturam tertianæ induunt, noctem quæ accessionem præcedit, difficilem habent, quæ verò subsequitur, ut plurimum leviolem.

17 Nihil sine consilio suscipiendum, nec quidquam negligendum.

18 Contraria paulatim adhibere oportet, & interquiescere.

Periculosius censeo incidere in medicum, qui nesciat quiescere, quam qui nesciat contraria adhibere. Nam qui nescit quiescere, nescit occasiones contraria adhibendi, quare nescit contraria adhibere. Qui nescit contraria adhibere, tamen, si prudens est, scit quiescere, atque si prodesse non potest, tamen non obest. Præstantissimus tamen est medicus eruditus pariter ac prudens, qui novit festinare lente, pro ipsius morbi urgentia, auxiliis instare, atque in occasione uti maxime opportunis, alioqui quiescere.)

19 Capitis posteriore parte dolente, secta in fronte vena recta juvat. *Aph. 63 sect. 5.*

22 Lata exanthemata non sunt admodum pruriginosa, qualia Simon habebat per hiemem, qui cum ad ignem inungeretur, aut calida lavaretur, juvabatur. Vomitus non conferebant. Si quis calida fomenta adhibuisset, adjuvari potuisse existimo.

26 In magnis malis, facies si sit bona, signa bonum. In parvis, bonæ significationi contraria denuncians, malum significat.

33. Ut omnia circa ægrotantem sedulo administrantur, quædam de morbo sunt interroganda, videndum qualia sint, quæ narrant, ut accipiendi sermones, quænam pertinent ad ægrotantem, quæ ad affidentes, & ad externa.

## Sectio Tertia.

**C**utis raritas affert alvi densitatem, cutis compactio carni incrementum, & cerebri consumptio calvitium.

2 Corporis evacuatio, seu detractio fit cursibus, luctis (quiete) multa deambulatione, ovilla carne, maza cocta ut plurimum; Et panis exiguus convenit.

3 Cum autem jam conciderint, offerre suillam assam convenit. Cum verò reficiantur, id indicat, quod corpus floridum rursus efficitur.

4 Exercitationum modum significat sudor fluens guttatim, qui exit velut ex canalibus, aut concidentia ex elevatione.

18. Cum venere uti, aut hircire incipiunt, sanguinem fundunt.

20. Mutationes cavendæ sunt.

24. Sitim cohibet os claudere, tacere, ventum cum potu frigidum inducere.

28 Quibus in morbis, quæ facta sunt liberant, eosdem, si ante fiant, prohibent.

31 Incruenta spuentibus, sanguinis detractionem prohibet anni tempus, lateris dolor, bilis.



## Sectio Quarta.

7 **E** Grotis gratificandum est in istis rebus, ut nimirum potus & cibi mundè præparentur, & quæcunque videt, & tangit, mollia sint; In aliis etiam quæ non valde lædant, aut facile emendari queant, ut frigida, quum ea opus est. In his etiam ægroto gratificandum, qualia sunt introitus, sermones, habitus corporis, vestitus, tonsura, ungues & odores.

18 Aqua edax, vigilia edax.

20 Sanitatis tutela est, cibis non satiari, & impigrum esse ad labores.

24 Terra siccitatibus squalida, volatiliū genus bene se habet.

28 Cibos Labores præcedere debent.

## Sectio Quinta.

1 **N**aturæ morborum sunt medicatrices.

6 Morbi connutriti in senectute desinunt, concoctione, solutione & rarefactione.

9 Labor articulis & carnibus confert, visceribus verò cibus & somnus; animæ deambulatio, cogitatio hominibus.

13 Lingua humorum serum quale sit indicat, pallidæ quidem Linguae, ex bilis redundantia fiunt. (Biliosum autem à pingui) rubicundæ vero à sanguine, nigræ ab atra bile, aridæ autem ab exustione fuliginosa, & utero, albæ vero à pituita.

15 Lingua concolor est humori prædominanti, ideoque per hanc dignoscimus humores.

16 Si carnes videntur esse salsæ gustanti, redundantia signum est.

18 Hominibus aurium sordes, dulces quidem lethales, amaræ verò minime.

19 Terram mutare confert in longis morbis.

21 In diuturnis circa articulos defluxionibus, (quæ *K. δμυττ* græcis di-

cuntur) venas in auribus posteriores pertundere oportet.

22 Venus in morbis à pituita utilis.

25 Increscentes morbos coitus exasperat.

32 Ulcera exoriuntur, si quis impurus exercitatione utatur.

33 Si mulier aut capra elaterium aut cucumerem sylvestrem comederint, etiam pueri purgantur.

## Sectio Sexta.

1 **E** *Κῆρον καὶ εἰσπύρον ὅλον τοῦ σώματος* Totum corpus tam foras, quam intrò spirabile est.

9 Quartana laborantes nullo magno morbo corripuntur, si prius autem corripiantur, & quartana superveniat, liberantur.

10 Pro quibus, quinam morbi succedant, videndum.

21 Sputa rotunda delirium significant.

22 Urina multam subsidentiam habens, solvit deliria: qualis fuit Dexippi, post defluvium capillorum.

23 Quartana non producit ultra annum.

(Fœsius, non ante annum desinit.)

## Sectio Septima.

2 **A** Ngina hac tempestate (quam fuse describit) liberis duabus obortæ sunt, æque mitissimæ, servis verò exuberabant, & quibus vehementissimæ contigebant, eæ celerimè peribant.

3 Sanguinem à venis profluentem sistunt animi deliquium, figura aliorum tendens, linamentum contortum, appositio, deligatio.

Hydropicos celeriter secare oportet; tabescentes urere statim, secare caput, & huiusmodi.



Señtio Octava.

**R** Enum vitia supra quinquagesimum annum sanata non vidi.

19 Continentia, contenta & impetum facientia corpora sunt consideranda.

20 Sermonis & silentii habenda est ratio. Dicere oportet quæ velit æger; quibus sermonibus utatur videndum, siue magni sint, siue multi, siue veri, siue conficti.

46. Contraria victus ratio in morbis instituenda est.

48 Victus ratio quantum fieri potest cognoscenda, nam illius ignorantia multas affert calamitates.

49 Optimis Medicis similitudines imponunt, & difficultates pariunt, sed contraria efficit causa. Et sane difficile est curandi vias ratiocinatione assequi.

52 Satyrus in Thaso cognomento Grypalopex, cum esset annorum circiter 25. Semen per somnum effudit sæpe, & interdum quoque sæpe ipsi prodibat. Cum autem ad annum 30. pervenisset, tabe correptus mortuus est.

54 Melancholici plerumque consueverunt fieri epileptici, & epileptici melancholici: horum autem quidvis præcipue fit, prout, in alterutram partem morbus inclinaverit, etenim si in corpus, epileptici fiunt, si autem in mentem, melancholici.

55 Abderis, Phaethula Pythei conjunx, per juventam antea sæcunda fuerat, cum autem vir ipsius in exilium pulsus fuisset, muliebria multo tempore defecerunt, postea verò in articulos dolores, & rubores acciderunt; quæ cum ei contigissent, tunc corpus virile factum est, & omnino hirsutum, & barba producta est, & vox aspera reddita; & cum omnia fecissemus ut muliebria elicerentur, non profluxerunt, sed mortua est, cum non diu postea vixisset.

56 Evenit autem, & Namyfiæ Gorgippi uxori in Thaso idem. Vi-

debatur omnibus medicis, quibus & ego forte adfui, unica spes esse, ut in muliebrem naturam reduceretur, si menses secundum naturam prodirent, sed neque huic potuerunt prodire, quamvis omnia tentata. Non multo post mortua est.

LIBER SEPTIMUS

EPIDEMIORUM.

**C** Auponi, qui peripneumonia laborabat, alvus statim subiit, circa quartum diem, sudor multus accidit. Febricula soluta esse videbatur. Tussicula, nulla erat, ut ita, dicam. 5. 6. & 7. detinebat febris, sudor 8. 9. excreabat pallidum. 10. affatim, non sæpe deiciebat. Circa undecimum mitius se habuit. 14. Sanus evasit.

Prodromi filius æstate sublæsus, febre ardente laborabat, lingua ipsi subarida, obscura, dejectio multa, servatus.

Isagoræ filius posteriore capitis parte vulneratus est, contuso osse ac denigrato, die quinto liberatus: Os autem non abscessit.

Hippiæ Soror hieme phrenitide correpta est, mente aberrabat, manibus laborabat, seipsam lancinabat. 5. & 6. die, sub noctem voce destituta est. Comatosa buccas & labia veluti dormientes, inflabat. 7. die mortua est.

Capitis dolores ex utero, castoreum sedat.

Plerique hysterici affectus à flatibus ortum ducunt: indicant ructus & strepitus circa ventrem, & tumores lumborum, & dolores circa renes & coxas.

Quibus prægnantibus ex casu, aut convulsione, aut plaga, dolores accidunt moderati, intra triduum manifestè constat, an fœtum corrumperet.

Fullo qui in Syro Phrenitide laborans cum unctione tremulus fuit. Crurum color erat culicum puncturis similis,



milis, oculus magnus, exiguus mor-  
tus, vox fracta, clara tamen. Uri-  
na pura subsidentiam non habens.  
Nunquid propter dejectionem à Ta-  
psia morbus 18. remisit, sine sudore  
evanescens.



## L I B E R

## APHORISMORUM.

Πρὸς Ἀποστολὴν.

## Sectio Prima.

1 **V**ita brevis, ars longa, oc-  
casio præceps, experimen-  
tum periculosum, iudicium  
difficile. Oportet autem non modo  
seipsum exhibere, quæ oportet fa-  
cientem, sed & ægrum, & præsen-  
tes, & externa.

Aph. 2.  
Sect. 4.

2 In perturbationibus alvi, & vo-  
mitibus sponte evenientibus, si qui-  
dem, qualia oportet purgari, purgen-  
tur, confert & facile ferunt: Sin  
minus, contra. Sic & vasorum eva-  
cuatio, si quidem, qualem fieri de-  
cet, fiat, confert, & facile ferunt:  
Sin minus, contra. Respicere igitur  
oportet & regionem, & tempestatem  
& ætatem, & morbos, in quibus con-  
venit, aut non.

3 Athletarum boni habitus, ad  
summum progressi, periculosi, si in  
extremo constiterint: Neque enim  
possunt in eodem statu permanere,  
neque quiescere. Cum vero non quie-  
scant, neque ultra possunt in melius  
proficere, reliquum est, ut in dete-  
rius labantur. Horum igitur causa  
bonum habitum solvere conducit  
haud cunctanter, quo rursus renutri-  
tionis initium corpusumat. Neque  
vasorum confidentiæ ad extremum  
perducendæ: Periculosum enim. Sed  
qualis natura fuerit ejus quid perpes-  
surus est, eo usque progrediendum.

Sic & evacuationis, quæ ad extre-  
mum tendunt, periculosæ: & rur-  
sus refectiones, cum extremæ fuerint  
periculosæ.

4 Victus tenuis & exquisitus, cum  
in morbis longis semper, tum in acu-  
tis, ubi non convenit, periculosus.  
Ac rursus qui ad extremum tenuitatis  
devenit victus, gravis. Nam & re-  
pletiones ad extremum perductæ,  
graves sunt.

5 In tenui victu delinquant ægri:  
ob id magis læduntur. Quicunque e-  
nim error committitur, major in te-  
nui fit, quam in paulo pleniore victu.  
Propterea etiam sanis periculosus est  
valde tenuis victus; Quoniam erro-  
res gravius ferunt. Hac igitur de  
causa tenuis & exquisitus victus, eo  
qui sit paulo plenior, maxima ex par-  
te periculosior.

6 Ad extremos morbos extrema  
exquisite remedia optima.

7 Ubi morbus peracutus est, sta-  
tim extremos habet labores, & ex-  
treme tenuissimo victu uti necesse est.  
Ubi verò non, sed plenius licet ciba-  
re, tantum à tenui recedendum,  
quantum morbus remissior extremis  
fuerit.

8 Cum morbus in vigore fuerit,  
tum vel tenuissimo victu uti neces-  
se est.

9 Conjicere oportet, num suffi-  
ciat ægro is victus usque ad morbi vi-  
gorem, & utrum prius ille deficiet,  
neque cum eo victu perduare pote-  
rit, vel morbos ante deficiet & re-  
mittet.

11 In paroxysmis cibum subtra-  
here oportet; exhibere enim noxium.  
Et quicunque morbi per periodos exa-  
cerbantur, in eorum paroxysmis sub-  
trahere oportet.

13 Senes facillime jejunium ferunt,  
deinde qui constanti sunt ætate, mini-  
me adolescentes, omnium minime  
pueri, præsertim illi, qui inter ipsos  
sunt vividiores.

14 Quæ crescunt, plurimum ha-  
bent calidi innati: Plurimo igitur  
egent alimento: sin minus, corpus con-



consumitur. Senibus verò parum calidi inest, paucis propterea fomitibus indigent, quia à multis id extinguitur. Hanc ob causam senibus febres non perinde acutæ fiunt: frigidum enim eorum corpus.

15 Ventres hieme, & vere natura calidissimi sunt, & somni longissimi. Per ea igitur tempora copiosiora alimenta sunt exhibenda, siquidem calidi innati plus habent, unde & copiosiore indigent alimento; indicium sunt ætates & Athletæ.

16 Victus humidus febricitantibus omnibus confert, maximè verò pueris, & aliis qui tali victu uti consueverunt.

17 Et quibus semel aut bis, plura aut pauciora, & per partes offerre oporteat, considerandum. Concedendum autem aliquid tempestati anni, regioni, ætati & consuetudini.

18 Æstate & autumnu cibos difficillimè ferunt, hieme facillimè, deinde vere.

20 Quæ judicantur & judicata sunt perfectè, ne moveto, neque innovato, sive purgantibus medicamentis, sive aliis irritamentis, sed finito.

21 Quæ ducere oportet, quo maximè vergant, eò ducenda, per loca convenientia.

22 Concocta medicamento purgante educenda, & movenda, non cruda, neque per initia, nisi turgeant, ut plurimum verò non turgent.

23 Excreta non copia sunt æstimaanda, sed si qualia oportet exeant, & facile ferat æger. Atque ubi ad animi defectionem educere expedit, faciendum id quoque, si æger par esse possit.

24 In acutis morbis raro, & in principiis, medicamentis purgantibus utendum, idque diligenti ante adhibita circumspèctione faciendum.

## Sectio Secunda.

**Q**uo in morbo somnus noxam adfert, lethale. Si verò somnus profit, minimè lethale.

2 Ubi delirium somnus sedaverit, bonum.

3 Somnus, vigilia, utraque modum excedentia, malum.

5 Spontanæ lassitudines morbos denunciant.

6 Qui aliqua corporis parte dolentes, fere dolorem non sentiunt, iis mens ægrotat.

7 Quæ longo tempore extenuantur corpora, lente reficere oportet: quæ verò brevi, celeriter.

8 Si a morbo cibum capiens quispiam, vires non recipiat, copiosiore alimento corpus uti significat. Si verò cibum non capienti, idem eveniat, vacatione indigere sciendum est.

9 Corpora ubi quis purgare volet, facile fluentia reddere oportet.

10 Impura corpora, quo plus nutritiveris, eo magis lædes.

11 Facilius est potu refici, quam cibo.

12 Quæ in morbis post crisin relinquuntur, recidivas facere solent.

13 Quibus crisis fit, his nox accessionem præcedens, gravis subsequens verò, levior plerumque.

14 In profluviiis alvi, mutationes excrementorum juvant, nisi in prava mutantur.

16 Ubi fames, laborandum non est.

19 Morborum acutorum non omnino certæ sunt prædictiones, neque mortis, neque salutis.

20 Quibus per juventutem, alvi sunt humidæ, iis senescentibus exsiccantur: quibus verò in juventute, alvi sunt siccae, iis senescentibus humectantur.

21 Famem, vini potus solvit.

22 Morbos, qui à repletionem fiunt, curat evacuatio; eos verò qui ex evacuatione, repletio: & in cæteris contrarietas remedio est.

23 Morbi acuti judicantur intra dies 14.

24 Index septimi quartus. Sequentis septimanæ Octavus initium Spectandus quoque est undecimus, siquidem is secundæ septimanæ quartus.



ius est. Rursumque 17. spectandus: Is enim a quarto decimo quartus est, & ab undecimo septimus.

25 Æstivæ quartanæ plerumque breves sunt: Autumnales verò longæ, & maxime quæ ad hiemem pertingunt.

26 Febrem convulsioni supervenire satius est, quam convulsionem febri.

27 Iis quæ non cum ratione sublevant, non oportet fidere. Neque multum formidare mala quæ præter rationem eveniunt. Plurima enim horum incerta sunt, nec admodum perseverare, aut longo tempore durare consueverunt.

29 Incipientibus morbis, si quid movendum videtur move: Vigentibus autem, quiescere melius est.

31 A morbo belle comedenti, nihil proficere corpus, malum est.

33 In quovis morbo valere ratione, recteque se ad ea quæ offeruntur habere, bonum. Contrarium verò malum.

34 In morbis minus periclitantur, quorum naturæ, & ætati, & habitui, & anni tempestati morbus magis cognatus fuerit, quam quibus in nullo horum cognatus fuerit.

35 Omnibus in morbis, partes quæ ad umbilicum & imum ventrem sunt, crassitudinem habere, melius est: Valde verò tenues & tabefactas esse, prævum. Periculosum verò illud est, etiam ad infernas purgationes.

36 Sana habentes corpora, pharmacis purgati citè exolvuntur, ut & qui pravo utuntur cibo.

38 Paulo deterior, & potus, & cibus, suavior tamen, melioribus quidem, sed insuavioribus, præferendus.

39 Magnam partem Senes Juvenibus minus ægrotant: Quicunque verò morbi iis accidunt diuturni, plerumque commoriuntur.

40 Raucedines & gravedines, in valde Senibus non coquuntur.

41 Qui sæpe & vehementer, sine

causa manifesta, animo linquuntur, ii derepente moriuntur.

42 Solvere Apoplexiam, vehementem impossibile quidem, levem verò non facile.

43 Ex iis, qui strangulantur, & dissolvuntur, nec dum tamen mortui sunt, non se recolligunt, quibus spuma circa os fuerit.

44 Qui natura sunt valde crassi, magis subito moriuntur, quam graciles.

45 A Comitiali morbo, juvenes mutatione potissimum ætatis, & regionum, & victuum, liberationem accipiunt.

47 Dum pus fit, dolores ac febres accidunt magis, quam confecto.

49 Consueti solitos labores ferre, etsi fuerint invalidi aut Senes, non consuetis, quamvis robustis & Juvenibus, facilius ferunt.

50 Consueti longo tempore, etiam si deteriora sint, insuetis minus molesta esse solent; quare ad insolita quoque facienda mutatio.

51 Plurimum & repente vacuare, vel replere, vel calefacere, vel refrigerare, aut alio quovis modo corpus movere, periculosum: Omne siquidem nimium, naturæ inimicum. Paulatim vero quod fit, tutum, & præsertim si quis ab uno ad aliud transierit.

52 Omnia secundum rationem facienti, si non succedant secundum rationem, non est transeundum ad aliud, manente eo, quod ab initio visum fuit.

53 Quicunque alvos humidus habent, dum Juvenes sunt, melius degunt his qui siccas habent. At in senectute deterius degunt; nam senescentibus ut plurimum siccantur.

### Sectio. Tertia.

SEX primos Aphorismos hujus sectionis, vide supra lib. de humoribus.)

7 Per siccitates febres acutæ sunt; Et siquidem annus magna ex parte talis.



talís extiterit, qualem fecit constitutionem, ut plurimum etiam tales morbos expectare oportet.

8 Constantibus temporibus, si tempeſtíva tempeſtíve fiant, morbi ſtabiles, & boni iudicii accidunt. Inconstantibus autem, inſtabiles, & mali iudicii.

9 Autumno in univerſum morbi acutiſſimi, & pernicioſiſſimi: Ver autem ſaluberrimum & mínimé exitialé.

10 Autumnus tabidis malus.

11 Inter anni partes, ſi hiems ſicca & aquilonia, ver pluvioſum, & australe fuerit, æſtate neceſſe eſt febres acutas fieri, & ophthalmias, & dyſenterias, mulieribus præſertim, & viris natura humidioribus.

12 At ſi australis hiems, & pluvioſa, & clemens fuerit, ver autem ſiccum & aquilonium, mulieres quipus partus in ver incidit, quavis occasione abortiunt: Quæ verò pepererint, infirmos & morboſos infantes edunt, ita ut vel ſtatim intereant, vel tenues, & valetudinarii vivant. Cæteris verò mortalibus dyſenteria, & ophthalmia ſicca fiunt, & Senibus catarrhi perniciem brevi allaturi.

13 Si verò æſtas ſicca & aquilonia fuerit, autumnus autem pluvioſus, & australis, capitis dolores ad hiemem fiunt, & tuffes, & raucedines, & gravedines, nonnullis etiam tabes.

14 Si verò aquilonius ſit & ſiccus autumnus, hominibus natura humidis, & mulieribus commodus: Reliquis verò, ophthalmia ſicca accidunt, & febres acutæ, & gravedines diuturnæ, nonnullis verò etiam melancholia.

25 Ex constitutionibus anni, in univerſum ſiccitates aſſiduis imbribus ſunt ſalubriores, & minus mortiferæ.

16 Aſſiduis imbribus morbi fere fiunt, febres longæ, fluxiones alvi, putredines, epilepſia, apoplexia, angina. Siccitatibus autem, morbi

tabifici, ophthalmia, articulorum dolores, urinæ & inteſtinorum difficultates.

17 Quotidianæ autem constitutiones, aquilonia quidem, cogunt corpora, & firma, agilia, beneque colorata, ac auditu valentiora reddunt, alvum ſiccant, oculos mordent, & ſi peſtus dolor aliquis prius habuerit, exasperant: At auſtrina, corpora exolvunt, & humectant, auditum hæbetant, caput gravant, vertiginem oculis, tarditatem corporibus adferunt, alvum humectant.

18 Per tempora verò anni, vere quidem, & prima æſtate, pueri, & his ætate proximi, optime degunt, valentque maxime. Æſtate verò & autumno ad aliquam quidem partem, Senes. Reliquo autumno & hieme, qui mediam ætatem agunt.

20 Vere fiunt furores, melancholia, epilepſia, fluxiones ſanguinis, angina, gravedines, raucedines, tuffes, lepræ, impetigines, vitiligines, & puſtula ulcerosa plurimæ, tubercula, articulorum dolores.

21 Æſtate verò, nonnulli horum, & febres continuæ, & ardentes, & tertianæ plurimæ, quartanæ item, & vomitiones, alvi profluvia, ophthalmia, aurium dolores, oris ulcerationes, genitalium putredines, & ſudationes.

22 Autumno, æſtivi etiam multi morbi fiunt, & febres quartanæ, & erraticæ, lienes, aquæ inter cutem, tabes, urinæ ſtillicidia, lienteria, dyſenteria, coxæ dolores, angina, athmata, volvuli, epilepſia, infania, melancholia.

23 Hieme verò, pleuritides, peripneumoniam, lethargi, gravedines, raucedines, tuffes, pectoris, laterum, lumborum, & capitis dolores, vertigines, apoplexia.

24 In ætatibus autem talia eveniunt, parvis quidem & recens natis pueris, aphthæ, vomitus, tuffes, vigilia, pavores, umbilici inflammationes, aurium humiditates.

25 Ad dentitionem verò accedenti.



tibus, gingivarum pruritus, febres, convulsiones, alvi profluvia, & maxime ubi caninos dentes producant, & iis qui inter pueros sunt crassissimi, & qui alvos duras habent.

16 Iphis vero grandiusculis, con-  
sillarum inflammationes, vertebræ  
in occipitio introrsum luxationes,  
asthmata, calculi, lumbrici rotun-  
di, ascarides, verruæ pensiles, sa-  
tyriasmus, strumæ, & alia tubercula,  
præcipue ante dicta.

27 Grandioribus adhuc, & ad pu-  
bertatem accedentibus, plurima ex  
his, & febres diurnæ potius, & ex  
naribus sanguinis fluxiones.

29 Juvenibus autem, sanguinis  
spuitiones, tabes, febres acutæ, epi-  
lepsiæ, & alii morbi, sed præcipue  
supra nominati.

30 Ultra hanc ætatem provectis,  
asthmata, pleuritides, peripneumo-  
niæ, lethargi, phrenitides, febres  
ardentes, alvi profluvia diuturna,  
cholera, dysenteria, lienteria, hæ-  
morrhoides.

31 Senibus, spirandi difficultates,  
catarrhi tussiculosi, stranguriæ, dy-  
suria, articulorum dolores, nephri-  
tides, vertigines, apoplexiæ, mali  
corporis habitus, pruritus totius cor-  
poris, vigiliæ, alvi, oculorum, &  
narium humiditates, visus hebitudi-  
nes, glaucomata, auditus graves.

#### Sectio Quarta.

*Aph. 29.  
sect. 5.*

1 **P**Rægnantes purgabis, si mate-  
ria turgeat, quadrimestres, &  
usque ad septimum mensem, sed has  
parcius. Juniores autem & Seniores  
caute vitare oportet.

4 Æstate superiores potius ventres,  
hieme verò inferiores purgandi.

5 Sub cane, & ante canem, diffi-  
ciles sunt purgationes.

6 Graciles, & ad vomendum fa-  
ciles, sursum purgandi, caventes  
hiemem.

7 Difficiliter autem vomentes, &  
mediocriter carnosus, deorsum, caven-  
tes æstatem.

8 Tabidi verò, vitantes purgatio-  
nes per superiora.

10 Purgandum in valde acutis, si  
turgeat materia, eodem die, differre  
enim in talibus, malum.

11 Quibus tormina adsunt, & cir-  
ca umbilicum dolores, & lumborum  
dolor, qui neque medicamento, ne-  
que aliter solvatur, in siccum hydro-  
pem firmatur.

13 Ad helleboros, qui non facile  
sursum purgantur, iis ante potionem  
corpora præhumectanda, copiosiore  
alimento, & quiete.

14 Poto Helleboro, corpus mo-  
vendum potius, quam somno traden-  
dum, aut quieti. Nam vel navigatio  
indicat, motione turbari corpora.

15 Quum helleborum magis duce-  
re voles, move corpus: Quum ve-  
rò sistere, somnum concilia, nec  
move.

16 Helleborus periculosus sanas *Aph. 36.  
sect. 2.*  
carnes habentibus. Convulsionem  
enim inducit.

17 Non febricitanti, cibi fasti-  
dium, oris ventriculi morsus, verti-  
go tenebrosa, & oris amaritudo,  
purgatione per superna opus esse, si-  
gnificat.

18 Supra septum transversum do-  
lores, qui purgatione egent, sursum  
purgare opus esse, indicant. Qui ve-  
rò infra, deorsum.

19 Qui potione medica dum pur-  
gantur non sitiunt, purgandi finis non  
fit, donec sitiverint.

20 Febris expertibus si tormina  
adsint, & genuum gravitas, & dolor  
lumborum, inferna purgatione opus  
esse, significant.

21 Excrementa alvi nigra sanguini  
atro similia, sponte euntia, sive cum  
febre, sive citra febre, pessima.  
Et quanto ipsorum colores pravi fue-  
rint plures, eo deterius. A medica-  
mento autem talia exigere, melius est,  
idque quanto ipsorum plures fuerint  
colores, non malum.

22 Morbis quibusvis incipienti-  
bus, si atra bilis supra infrave exie-  
rit, lethale.

23 Qui-

*Gen.  
608.*



23 Quibus per morbos acutos, aut diuturnos, aut vulnera, aut alio modo extenuatis, atra bilis, aut velut sanguis niger, prodierit, poſtridie moriuntur.

24 Dyſenteria, ſi ab atra bile incipiat, lethalis eſt.

25 Sanguinem ſuperne quidem efferri, qualiſcunque ſit, malum. Inferne verò niger ſi deſiciatur, bonum.

28 Quibus dejectiones ſunt bilioſæ, ſurditate ſuperveniente, ceſſant: Et quibus ſurditas adeſt, bilioſis dejectis, ſinitur.

Coar. 15.

29 Febricitantibus, ſi ſextodie rigores ſiant, difficulter judicantur.

37 Frigidi ſudores, cum febre quidem acuta, mortem: Cum mitiore verò, morbi longitudinem ſignificant.

38 Qua corporis parte, ſudor eſt, ibi morbum eſſe ſignificat.

41 Sudor multus per ſomnum citra cauſam manifeſtam factus, copioſiore cibo corpus uti ſignificat: Quod ſi cibum non aſſumentem hoc accadat, vacuatione indigere ſignificat.

Aph. 62.

Seſſ. 7.

Aph. 63.

Seſſ. 7.

Aph. 64.

Seſſ. 7.

43 Febres, quæ tertio quoque die vehementius affligentes non intermittunt, periculoſiores: Quoquo modo autem intermiſerint, periculum abeſſe ſignificant.

44 Quos febres longæ exercent, iſtæ tubercula ad articulos, vel dolores ſunt.

45 Quibus tubercula ad articulos, vel dolores, poſt febres diuturnas, ſunt, ii cibariis plurimis utuntur.

46 Si rigor, febre non intermittente, ægrum jam debilem frequenter invadat, mortiferum eſt.

Aph. 1.

Seſſ. 7.

Seſſ. 7.

48 In febribus non intermittentibus, ſi partes externæ algeant, internæ utantur, & ſitiunt, lethale eſt.

57 Spasmo aut Tetano vexato, febris ſi acceſſerit, morbum ſolvit.

59 Tertianæ exquiſita ſeptennis ad ſummum circuitibus, judicatur.

60 Quibus per febres aures obſcuerint, iſis ſanguis e naribus profluens, aut perturbata alvus, ſolvit morbum.

Burnet Parte II.

61 Febricitantem niſi diebus imparibus febris reliquerit, ſolet reverti.

62 Quibus per febres icterus ſupervenerit, ante diem Septimum, malum.

63 Quibus in febribus quotidie rigores repetunt, quotidie febres ſolvuntur.

64 Quibus per febres icterus die 7. aut 9. aut 11. aut decimo quarto, ſupervenerit, bonum, niſi dextrum hypochondrium durum ſit, alioqui minimè bonum.

70 Quibus per febres urinæ turbatæ quales jumentorum, iſis dolor capitis vel adeſt, vel aderit.

71 Quibus die ſeptimo futura criſis eſt, iſis urina rubram die quarto nubeculam habet.

72 Quibus pellucidæ & albæ ſunt urinæ; malæ: Maximè verò tales in phreniticis apparent.

74 Quibus ſpes eſt ad articulos abſceſſum futurum, abſceſſu liberat urina multa, craſſa, & alba reddita: Qualis in febribus cum laſſitudinis ſenſu, quarto die exire incipit. Quod ſi ex naribus etiam ſanguis profluxerit, brevi admodum ſolutio ſit.

75 Si quis ſanguinem, aut pus mejat, renum aut veſicæ exulcerationem ſignificat.

76 Quibus cum urina craſſa, exiguae carunculæ, aut velut pili una exeunt, hi à renibus excernuntur.

77 Quibus cum urina craſſa, ſurfurea quædam ſimul minguntur, hi veſica ſcabie laborat.

78 Qui ſponte ſanguinem mejun, iſis à renibus venularum ruptam eſſe ſignificat.

79 Quibus in urina ſubſident ſabuloſa, iſis veſica calculo laborat.

80 Si quis ſanguinem, aut grumos mejat, aut urinam guttatim emittat, & dolor ad imum Ventrem, ac interſeminium incidat, ea quæ circa veſicam ſunt laborant.

81 Si quis ſanguinem, aut pus, aut ſquamulas mejat, & gravis odor adſit, veſicæ exulceratio ſignificatur.

G

83 Mi.



83 Mictus noctu plurimus parvam dejectionem significat.

### Sectio Quinta.

Ab. 25.  
f. 177.

1 Convulsio ab helleboro, lethalis.

2 Convulsio vulnere superveniens, lethalis.

3 A copioso sanguinis fluxu, singultus, aut convulsio, malum.

4 A purgatione immodica, convulsio, aut singultus superveniens, malum.

5 Si ebrius quispiam derepente obmutescat, convulsus moritur, nisi febre corripiatur, aut ubi ad horam pervenerit, qua crapulae solvuntur, vocem recuperet.

6 Qui Tetano corripiuntur, intra 4. dies intereunt: Si verò hos superaverint, incolumes evadunt.

7 Epilepsia, quibus ante pubertatem contingit, mutationem recipit: Quibus post 25. annum, eos ferè comitatur ad mortem usque.

8 Qui pleuritide laborant, nisi intra 14. dies supernè repurgentur, iis in empyema fit mali translatio.

9 Tabes iis maximè ætatibus fit, quæ à decimo octavo sunt anno, ad tricesimum quintum.

10 Quibus ex angina liberatis, ad pulmonem mali fit conversio, ii intra dies septem moriuntur. Si verò hosc effugerint, purulenti evadunt.

11 Qui tabe vexantur, si sputum quod extussiunt, carbonibus injectum olet graviter, & capilli à capite defluunt, lethale.

13 Qui spumantem sanguinem extussiunt, iis ex pulmone educitur.

14 Si tabe detento profluvium alvi superveniat, lethale.

15 Qui ex pleuritide empyi fiunt, si à ruptione intra dies 40. sursum purgentur, liberantur: Alioqui transeunt in tabem.

18 Frigidum inimicum ossibus, dentibus, nervis, cerebro, dorsali medullæ, calidum verò amicum.

24 Frigida pectori inimica, tusses

movent, sanguinis fluxiones, & destillationes efficiunt.

25 Articulorum tumores & dolores absque ulcere, atque etiam podagricos, & convulsiones, magna ex parte, frigida largè effusa levat, & extenuat, solvitque dolorem. Torpor enim modicus doloris solvendi vim habet.

28 Suffitus aromatum muliebria educit.

30 Mulierem gravidam morbo quopiam acuto corripi, lethale.

31 Mulier in utero gerens secta vena abortit: Et magis, si major fuerit foetus.

32 Mulieri sanguinem evomenti, menstruis erumpentibus, solutio fit.

33 Mulieri, menstruis deficientibus, sanguis è naribus profluens, bonum.

34 Mulieri uterum gerenti, si alvus multum fluat, periculum est ne abortiat.

35 Mulieri hystericæ, aut difficulter parienti, sternutamentum superveniens, bonum.

36 Mulieri menses decolores, nec eodem semper modo & tempore prodeuntes, purgationem indicant esse necessariam.

37 Mulieri in utero gerenti, si mammæ subito extenuentur, abortit.

39 Si mulier quæ nec prægnans, nec puerpera est, lac habet, ei menstrua defecerunt.

44 Quæ præter rationem tenues uterum gerunt, abortiunt donec habitiores evaserint.

45 Quæ mediocriter corpulentæ, abortum faciunt secundo mense, aut tertio, sine occasione manifesta, iis acetabula uteri mucoris sunt plena, nec præ pondere fætum continere possunt, sed abruptuntur.

46 Quæ præter naturam crassæ non concipiunt, iis uteri os ab omento comprimitur, & priusquam extenuentur, non concipiunt.

49 Ad secundas deturbandas, sternutatorio immisso, nares & os comprimito.



57 Menstruis abundantibus morbi eveniunt, & subsistentibus accidunt ab utero morbi.

60 Si prægnanti purgationes menstruæ cursum suum teneant, bene valere fætum est impossibile.

61 Si mulieri purgationes non prodeant, neque horrore, neque febre superveniente, cibique fastidia ei accidant, prægnantem esse putato.

62 Quæ frigidos & densos uteros habent, non concipiunt: Et quæ præhumidos uteros habent, non concipiunt: Extinguitur enim in ipsis genitura. Et quæ plus æquo siccos, & adurentes: Nam alimenti defectu semen corrumpitur. Quæ verò ex utrisque moderatam nactæ sunt temperiem, eæ fæcundæ evadunt.

64 Lac præbere capite dolentibus, malum. Malum verò & febricitantibus, & quibus hypochondria elata, aut murmurantia, & siticulosis. Malum item quibus biliosæ dejectiones, febres acutæ, copiosa sanguinis evacuatio facta est. Convenit verò tabidis non admodum febricitantibus & in febribus longis, & languidis, dum nullum ex supradictis signis adsit, & præter rationem extenuatis.

68 Parte capitis posteriore dolenti, in frontem excurrentes vena incisa, prodest.

69 Rigores incipiunt mulieribus ex lumbis magis, & per dorsum perveniunt in caput: Viris verò parte corporis posteriore magis quam anteriore, veluti ex femoribus, & cubitis. Argumento est cutis raritas quam pilus ostendit.

70 Qui quartana corripitur, non admodum convulsionibus tentantur: Si verò prius tentati fuerint, superveniente quartana, liberantur.

### Sectio Sexta.

1 **I**N diuturnis lævitatibus intestinorum, si ructus acidus superveniat, qui prius non extiterit, bonum est signum.

2 Quibus nares humidiores natu-

ra, & genitura humidior, iminus prospera valetudine fruuntur: Quibus verò hisce contraria adsunt, Salubrius degunt.

3 In longis intestinorum difficultatibus cibi fastidium, malum. Et cum febre pejus.

4 Circumglabra ulcera, maligna.

6 Renum, & vesicæ vitia in senibus difficulter curantur.

8 Hydropicis ulcera in corpore orta, non facile sanantur.

10 Caput dolenti, & vehementer laboranti, pus, aut aqua, aut sanguis per nares, os, aut aures, effluens, morbum solvit.

11 Melancholicis, & nephriticis, hæmorrhoides supervenientes, bonum.

12 A diuturnis hæmorrhoidibus curato, nisi una quæpiam servetur, periculum hydropis vel tabis impendet.

13 Singultu detento, si sternutamenta supervenerint, singultum tollunt.

14 Hydrope detento, si aqua e venis in ventrem confluerit, solutio fit.

15 Longo alvi profluvio laboranti, sponte vomitus superveniens, alvi profluvium solvit.

16 Pleuritide aut peripneumonia detento, alvi profluvium superveniens, malum.

17 Ophthalmia laborantem, alvi profluvio corripitur, bonum.

18 Cui perfecta est vesica, aut cerebrum, aut cor, aut septum transversum, aut aliquod ex intestinis tenuibus, aut ventriculus, aut hepar, lethale.

19 Ubi dissectum fuerit os, aut cartilago, aut nervus, aut genæ pars tenuis, aut preputium, neque augeatur, neque coalescit.

21 Insanis, si varices, vel hæmorrhoides supervenerint, insanix solutio.

23 Si metus, & mæstitia multo tempore perseverent, melancholicum est signum.



24 Si quod gracile intestinum perfectum sit, non coalescit.

25 Erysipelas foras intrò converti, malum: intus verò foras, bonum.

26 Quibus in febre ardente tremores fiunt, delirium solvit.

27 Quicumque empyi, aut hydro-pici uruntur, aut secantur, si pus, aut aqua universim effluxerit, omnino moriuntur.

28 Eunuchi non laborant podagra, neque calvi fiunt.

29 Mulier non laborat podagra, nisi menses ipsi defecerint.

30 Puer non laborat podagra, ante veneris usum.

31 Oculorum dolores meri potio, aut balneum, aut fomentum, aut venæ sectio, aut purgatio solvit.

33 Qui acidum ructant, aut admodum pleuritici fiunt.

35 Hydropicis tussis superveniens, malum.

36 Difficultatem urinæ phlebotomia solvit.

37 Ab angina detento tumorem fieri in collo, bonum: Foras enim, morbus vertitur.

38 Quibus occulti cancri fiunt, non curare melius: Cureti enim citius intereunt.

39 Convulsio vel à repletionem fit, vel ab inanitione: Ita verò & singultus.

41 In istericis hepar durum fieri, malum.

43 Qui lienosi dysenteria corripiuntur, iis post longam supervenientem dysenteriam, hydrops, aut lien-teria accidit, & moriuntur.

45 Quæcunque ulcera annua sunt, aut longiore tempore durant, in iis os abscedere est necesse, & cicatrices cavas fieri.

46 Qui gibbi ex asthmate aut tussi ante pubertatem fiunt, moriuntur.

47 Quibus venæ sectio, aut purgatio prodest, bis vere secanda vena, aut purgatio imperanda.

48 Lienosis dysenteria superveniens, bonum.

49 Qui podagrici morbi fiunt, fe-

data inflammatione, intra dies 40. conquiescunt.

50 Quibus divisum est cerebrum, his febrem & biliosum vomitum supervenire est necesse.

51 Qui valentes capitis repente doloribus corripiuntur, & protinus muti fiunt, & stertunt, intra dies septem intereunt, nisi febris eos prehenderit.

53 Deliria quæ cum risu fiunt, turtiora: quæ verò studio adhibito, periculosiora.

55 Dolores podagrici vere, & autumno ferè moventur.

57 Apoplectici fiunt maximè à quadragesimo anno, ad sexagesimum.

58 Si omentum exciderit, necessariò computrescit.

59 Quibus longo coxendicum dolore conflictatis, femoris summum coxa excidit, rursusque recidit, iis mucrescunt in nascentur.

60 Quibus diuturno dolore ischiadico vexatis femur excidit, iis crus contabescit, & claudicant, nisi urantur.

### Sectio Septima.

10 **A** Bileo vomitus, vel singultus, vel convulsio, vel delirium, malum.

11 A pleuritide, peripneumonia, malum.

12 A peripneumonia, phrenitis, malum.

14 Propter plagam in capite acceptam, stupor, aut desipientia, malum.

15 Ex sanguinis sputo, puris sputum, malum.

16 A puris sputo, tabes, & fluxus: quum verò sputum sistitur, moriuntur.

17 Inflammationi hepatis si supervenerit singultus, malum.

22 A diuturno partium ad ventrem attinentium dolore, suppuratio.

23 A sincera dejectione, dysenteria, malum.

27 Si prægnanti tenesmus supervenerit, abortum facit.

29 Si



29 Si Leucophlegmatia detento, fortis diarrhæa supervenerit, morbum solvit.

30 Quibus per diarrhæam spumosa, sunt alvi excrementa, iis à capite effluunt talia:

31 Quibus per febres in urinis sedimenta crassiorem farinam referunt, longam invaletudinem fore significant.

32 Quibus in urinis biliosa sedimenta, sed supra tenuia apparuerint, acutum morbum significant.

33 Quibus divulsæ sunt urinæ, iis vehemens fit in corpore perturbatio.

34 Quibus in urinis bullæ innant, nephritim, & longam fore invaletudinem significant.

35 Quibus in urina adipalis superficies est, & conferta iis nephriticum, & acutum morbum adesse significat.

37 Qui sanguinem evomunt, si sine febre, salutare; si cum febre, malum. Curatio perficitur refrigerantibus, & astringentibus.

39 Si quis sanguinem & grumos meiat, & stranguria laboret, dolore ad hypogastrium, & pectinem, & perinæum pertinente, ad vesicam loca laborant.

40 Si subito lingua impotens reddatur, vel aliqua corporis pars attonita stupeat, planè id melancholicum est.

44 Si empyis cum uruntur, aut secantur, purum & album pus effluat, evadunt: Si verò subcruentum, fæculentumque & fætidum, pereunt.

45 Quibus purulentum jecur adurit, si purum pus effluat & album, salvi fiunt: In tunica enim ipsis pus continetur. Si verò qualis amurca profluat, intereunt.

46 Dolores oculorum post meraci vini potum, & aquæ calentis copiosæ balneum, venæ sectione curato.

48 Urinæ stillicidium, ac meiendi difficultatem, vini meraci potus, & venæ sectio solvit.

50 Quibus cerebrum syderatum est, intra tres dies intereunt: Si verò hos superaverint, sani fiunt.

*Burnet Parte II.*

52 Quibus heper admodum dolet, iis febris superveniens solvit dolorem.

56 Anxietudinem, oscitationem, horrorem, vinum pari aquæ portione temperatum, solvit.

58 Quibus occasione aliqua cerebrum fuerit vehementer concussum, mutos protinus fieri necesse est.

59 Corporibus, humida carne præditis, imperanda fames est: Nam fames siccatur corpora.

## SECTIO OCTAVA.

Continens. Τα ἐξαιτιῶν.

*Ex Epistola ad Cratevam.*

**S**ucci omnes, & fluidi liquores in vitreis vasis adferantur: Folia, flores & radices, in fictilibus novis probe obturatis, ut ne ventis diffolata vim medicam perdant.

Cum ab omni arte aliena sit procrastinatio, tum verò maxime in Medicina, in qua dilatio, vitæ periculum adfert. Temporum autem opportunitates curationum sunt animæ. Multa nos mortales latent.

Neque enim ei qui in periculo constitutus est, satis sunt quæ possumus, verum etiam, quæ non possumus expetit.

*Ex Epistola ad Damagetum.*

**T**otus homo ab ipso ortu morbus est. Dum educatur inutilis, auxilium supplex implorat. Dum increvit, improbus & demens est, institutione puerili indigens; In ætatis vigore constitutus, audax; Ætate marcescens, miserabilis, suos labores per imprudentiam excolens.

Ægrotantes simul ac servati sunt, causam Diis, vel Fortunæ attribuunt.

*Ex Epistola ad Democritum.*

**I**n arte Medica, quæ recte fiunt, plerumque quidem hominum vul-



gus non admodum laudat, sæpe verò Diis attribuit. At si in aliquo repugnans natura, eum qui curatur, interemerit, Numen prætermittens, Medicos incusat: Et Ego sane plus reprehensionis, quam honoris ex arte mihi consecutus videor. Neque enim quantumvis jam Senex, ad artis medicæ finem perveni, neque etiam ipsius inventor Æsculapius.

*Ex Democrati Epistola ad Hippocratem, de Natura humana.*

**V**Esicæ vicina infantium mater, gravis calamitas, sexcentarum ærumnarum mulieri author, uterus delitescit.

*Ex Epistola ad Demetrium Regem.*

**H**umanorum morborum radix caput est, ex eoque maximæ ægrotationes adveniunt, cum enim toti corpori incumbat, eorum omnium, quæ ingeruntur reliquias, &

tenues humores, non secus ac cucurbitulam attrahere contingit.

*De purgatoriis Remediis.*

**A**Nte omnia biliosis oportet propinare cholagogum pharmacum pituitosis, phlegmagogum, hydropticis, hydrogogum, melancholicis, melanogogum.

Fæda est calamitas, pharmaco purgatorio hominem interiisse.

Qui validis febribus impliciti jacent, his non ante febris remissionem, pharmaca dare oportet; sin minus, cunctandum saltem ne intra decimum quartum diem.

*De Hominis Structura.*

**S**anguinis locus, & spiritus in corde est: A dextris quidem ejus sanguis, à sinistris verò spiritus consistit.

Venæ à corde sanguinem sumunt, per quas corpori distribuitur.

F I N I S.



Prima .

<b>J</b> Usjurandum.	pag. 1	De Corde.	41
Lex.	2	De Glandulis.	41
De Arte.	2	De Ossium natura.	41
De prisca Medicina.	2	De Aere locis & aquis.	42
De Medico.	3	De Flatibus.	44
De Decenti habitu.	4	De Morbo Sacro.	45
Præceptiones.	5		

## Secunda .

<b>L</b> iber prænotionum.	5
<b>L</b> De Humoribus.	12
De Crisibus.	13
De diebus criticis.	15
Prædictorum Liber primus.	15
Secundus.	16
Coactæ prænotiones.	17

### Tertia.

<b>D</b> E Natura hominis .	36
De Genitura .	36
De Natura pueri .	37

Quarta.

<b>D</b> E Salubri victus ratione .	45
De Victus ratione Lib. primus.	46
Secundus.	46
Tertius .	48
De Insomniis .	48
De Alimento .	49
De Ratione victus in morbis acutis .	49
De Locis in homine .	51

Quinta.

DE Morbis Liber primus. 51  
Secundus. 52  
G 4 Ter-



Tertius. 53  
 Quartus : 55

De Affectionibus. 55  
 De Internis affectionibus. 56  
 De Natura muliebri. 57  
 De Mulierum morbis. 58  
 De Is quæ uterum non gerunt. 59

## SECTION

Sexta.

DE Officina medici. 60  
 De Fracturis. 60  
 De Articulis. 61  
 De Capitis Vulncribus. 62

## SECTION

Septima.

DE Morbis Epidemics. 63  
 Liber Aphorismorum. 86

## SECTION

Octava.

E P<sup>h</sup>ila. 88





# I N D E X

## RERUM PRÆCIPUARUM

### Quæ hoc Opere conti- nentur .

## A

<b>A</b> Bortus causa .	pag. 40
<b>A</b> Futuri signum .	92
Acetum biliosis magis quam melan- cholicis confert .	50
Adolescentiæ morbi .	90
Adolescentis in foro Mendacium hi- storia .	46
Adolescentis in Melibæa historia .	80
Adolescentis in cujus os serpens irre- pserat historia .	82
Ægrotis in quibus gratificandum .	83
Æstate , morbi infestantes .	89
Alimentum quid .	39
Triplex .	45
Allii vires .	47
Alvi dejectio , quæ bona , quæ mala .	8. 34
Amazones infantes masculos luxant .	61
Anaxionis historia .	77
Anginæ prognosis .	11. 26. 92. 94
Curatio .	50
Anginæ liberis mites , servis vehe- mentissimæ .	84
Anginosæ juxta Aristionem historia .	73
Anima corporis humani portio .	46
Anni divisio .	48
Anni tempora consideranda .	41
Anni temporum maximæ mutationes observandæ .	43
Pro Anni varia constitutione varii morbi .	43

Apii facultates .	47
Aphoniam tremor solvit .	18
Apollonii historia .	79
Apoplexiæ præfagia .	30. 94
Aquæ quænam calidæ .	41
Quænam optimæ , & pravæ .	42. 69
Aquiloniæ tempestatis incommoda .	13. 89
Aqua vorax .	84
Articulus præsentī febre , suam in sedem reponendus non est .	61
Asiatici Europæis minus bellicosi .	30
Asparagi vires .	47
Astronomia ad artem medicam con- fert .	42
Athletarum habitus boni periculosi .	86
Avis fit ex ovi luteo .	39
Auris doloris præfagia .	11
Aurium affectus .	11
Aurium sordes dulces quid signifi- cent .	84
Austrinæ tempestatis incommoda .	12. 89
Autonomi historia ex capitis vulnere mortui .	81
Autumno morbi infestantes .	89

## B

<b>B</b> Etæ facultates .	47
Bilis atræ dejectio quid signifi- cet .	14
Biliosi ægre cibi abstinentiam ferunt .	91

Bra-



Brachii os fractum diebus quot fir-  
metur. 60

Brassicæ vires. 47

## C

**C** Alculum frangentia nulla dan-  
tur. 30

Calculi in vesica signum. 55

Calidum immortale vocatum. 39

Caloris & frigoris inæqualitas. 7. 14

Calvi in Larrissa historia. 77

Calvities à cerebri consumptione. 83

Canales pro cruribus fractis. 60

Cancer occultus. 94

Capitis dolores in febribus. 11

Capitis doloris cura. 93

Capitis doloris ex utero cura. 85

Capita debilia habentes numquam  
egregii potores. 42

Caput & lien morbis maximè ob-  
noxia. 55

Capitis fluxiones. 41

Capitis partes, quæ tuto secari pos-  
sunt, & quando sectio instituen-  
da. 62

Capitis os quomodo secandum. 63

Ex Capitis vulneribus perituri si-  
gna. 62

Hieme quam æstate diutius vivunt.  
62

Cardialgia quando funesta. 24

Carnis omnis generis qualitates. 47

Carus & Coma. 20

Cauonis peripneumonia laborantis  
historia. 85

Cephalalgix prognosis & cura. 20

Cerebrum glandula est. 41

Cerebri concussio. 31. 82

Cerebri sphacelismus. 52

Cherionis historia. 72

Cibus & potus paulatim addendus,  
vel detrahendus. 56

Ciceris vires. 47

Clazomenii historia. 67

Cleonactidis historia. 66

Conceptus signa, 39. Impedimentum,  
93. Remedium. 59

Concocta, non cruda, educenda. 87

Consuetudini aliquid dandum. 87

Continentia, contenta & impetum  
facientia. 85

Contrariorum contraria sunt reme-  
dia, 36. & 85. paulatim sunt ad-  
hibenda. 83

Convolvulus sanguineus. 57

Convulsio, quando & quibus fune-  
sta. 26. 92

Ejus causæ. 12. 94

Cura. 91

Cor musculus est. 41

Et sanguinis fons. 55

Corpus totum spirabile & omnia con-  
sentientia. 84

Coxendicis doloris curatio. 56. 94

Cranii fractura ejusque 5. genera.  
31. 62

Crisin quæ ostendant, 27. sexto die,  
& decimo quinto salutaris. 70

Critonis historia. 67

Cubiti os fractum quot diebus coale-  
scat. 60

Cutis raritas, & compactio quid ef-  
ficient. 9

## D

**I** N Dealcis horto decumbentis hi-  
storia. 71

Dealcis uxoris historia. 80

Deambulandum quando. 48

Decubitus quis optimus, quis ma-  
lus. 6

Dens dolens, nisi erofus & mobilis,  
non eximendus. 55

Dentitionis incommoda. 41

Dentium stridor. 6

Deliquium animi subinde recurrens  
mortiferum. 88

Digitales liventes & nigri. 8

Divinum si quid in morbis cogno-  
scendum. 5

Dromeadæ uxoris historia. 68

Dysenterix prælagia. 30. 91

Dyseridis famulæ historia. 81

Dysuriæ, & stranguriæ curatio.  
70. 94

Nil habet aliis morbis divinius.  
45



## E

## G

<b>E</b> Brietatis remedium.	51
Empyematis prognos.	92
Epicharmi uxoris historia.	82
Epicratis uxoris historia.	65
Ab Epilepsia ut juvenes liberantur.	88. 92
Quinam ea non apprehendantur.	45
Epileptici plerumque sunt melan-	
cholici, & è contra.	85
Erasini historia.	66
Erysipelatis prognos.	94
Euryanactis filiae historia.	73
Exercitationis justa mensura.	83
Excreta non copia æstimanda.	87
Experimentum periculosum.	86

## F

<b>F</b> Abarum vires.	46
Facies Hippocratica quid.	5. 22
Ex facie signa.	22. 83
Famem vini potio solvit, & ubi adest	
labor nocet.	87
Famulæ in Omilo historia.	81
Fasciæ quomodo deligandæ.	60
Fauces exulceratæ.	11. 23
Febrium signa.	11. 12. 17
Febres æstate magis grassantur.	69
Febris quartanæ cura.	55
Ejus privilegium. 84. terminus.	87
Febris tertianæ cura.	53
Terminus.	14. 90
Febres sine sudore quando contin-	
gant.	69
Femoris articulus quot modis luxetur.	61
Ferulæ quando admovendæ.	60
Fistulæ quæ pessimæ.	31
Flatus eruptio quæ probanda.	8
Fluor albus.	57
Fœtus mortui signa.	58
Fœtus quando movere incipit.	38
Frictionis vires & commoda.	60
Frigora quæ vitanda.	48
Fullonis historia.	85

<b>G</b> Enitura septem dierum.	39
Gravitas corporis.	7

## H

<b>H</b> Æmorrhagiæ commoda.	25
Hæmorrhagia narium.	7. 24
25	
Larga, solvit multa.	69
Enaribus quarto die, non proban-	
da.	70. 83
Hæmorrhoidum cura.	5
Curatio, suspecta.	81
Hæmorrhoidum fluentium commo-	
da.	26. 14
Hermocratis historia.	71
Herophontis historia.	65
Herophyti historia.	78
Hieme morbi infestantes.	89
Historia cujusdam sagitta juxta in-	
guen percussæ.	82
Hominis corpus ex pluribus con-	
stat.	37
Homo totus à natura morbus.	96
Hominis innominati historia.	68.
& 69	
Hordei facultates.	46
Hippiæ sororis historia.	85
Humeri os quomodo reponendum.	
61	
Humores pro anni temporum diffe-	
rentiis augentur.	36
Humores ducendi quo maxime ver-	
gant.	87
Humidi quatuor species.	12. 36. &
55	
Hydropis remedium.	85
Hydropis sicci signum.	90
Hydrops pulmonis, 52. & 53. &	
56	
Hypochondria in morbis qualia pre-	
bantur.	7
Hypochondriorum tumor.	7. 23.
& 24	
Hysterici affectus cura.	57



## I

<b>I</b> Cterus febribus succedens. 14. & 91	
Jejunium qui facilius ferunt. 87	
Ex igne, & aqua omnia constant. 46	
Ilei causa, signa, & cura. 48. & 53	
Infantis situs in utero. 38	
Infantium morbi. 89	
Inflammationi, quæ convenient, quæ non. 56	
Infantia quandoque utilis. 14	
Insomnia quid significant. 48	
Insulæ continenti vicinæ marinis rigidiores. 46	
Isagoræ filii historia. 85	
Judicantia in melius ne statim appareant. 69	
Quæ judicantur, & judicata sunt non movenda. 87	
Ischuria rigorem præcedit. 83	
Juvenes multo egent alimento. 87. & 88	
Juvenum morbi. 90	

## L

<b>L</b> Abores cibos præcedant. 84	
Lacti extincto, quæ medeantur. 57	
Lactis qualitates. 46	
Quibus conveniat. 93	
Larissæ virginis historia. 79	
Leguminum esus incommoda. 70	
Lentes, quas qualitates habeant. 47. & 48	
Lienes magni. 55. 57	
Lienteriæ præsagia. 30	
Lingua humorum serum quale sit indicat. 84	
Lini seminis vires. 47	
Lochiorum suppressio. 56. 57. 58. & seq.	
Lumbricus latus quando & quomodo generetur. 55	

## M

<b>M</b> Achinis quando, & quibus utendum. 60	
---	--

## Macrocephali quomodo prognati.

44	
Manuum gesticulatio. 6	
Manus luxatæ signa & cura. 61	
Medicam artem dari probatur. 2	
Ex quibus constet. 63	
Medicina artium nobilissima. 1	
Adeam cognoscendam sex adjumentis opus est. 1	
Ejus definitio. 1. 45. 46	
Deo ascripta. 3	
Medicina optima est interdum medicinam non facere. 61	
Procrastinatio ab ea absit. 95	
Medicus calculo laborantes secare non debet. 1	
Consultationes amet. 5	
Deum invocet. 48	
Instrumenta omnis generis habeat præparata. 4	
Si probus, alteri nunquam invidet. 5	
Ejus indulgentia ægrotanti sæpe nocet. 5	
Quæ eum deceat. 5. 4	
Silere jubetur. 1	
De quibus ægrotum interroget. 56	
Multarum rerum experientiam habere oportet. 61	
Mali quibus similes. 3	
Medicus nesciens quiescere periculosus. 83	
Quæ illi considerata ut recte in curatione morborum procedat. 51. & 53	
Melancholiæ præsagia. 30	
Melidæ historia. 69	
Membrorum discretio quot diebus fiat. 37	
Mensium mensura justa, & tempus. 58	
Ad menses immodicè fluentes. 60. & 70	
Menstruorum retentorum incommoda & cura. 32. 57. 58	
Menthæ facultates. 47	
Mentis humanæ sedes. 41	
Metonis historia. 67	
Molæ causa. 59	
Morborum acutorum terminus. 14. 87	
Acuti qui. 49. 55	
Acutorum incertæ prædictiones. 87	
Mor-	



Morbus cujus causa nota, facile curatur.	45
Morborum communium causa est Aer.	36
Morbi, qui lethales, dubii, aut minime lethales.	51. 55
Morbos quæ prohibent.	83
Morbis extremis extrema conveniunt remedia.	86
In morbis longis terram mutare bonum est.	84
Morbi secundum anni tempora augentur & desinunt.	36
Morbi connutriti quomodo desinant.	84
Morbus alteri succedens ut plurimum perniciosus.	56
Morbi omnes ex bile, & pituita oriuntur.	55
Mororum facultates.	48
Mulieris apud Pantamidem historia.	74
Mulieris in Cyrico decumbentis historia.	80
Mulieris in foro Mendacium historia.	74
Mulieris gravidæ historia.	68
Mulieris gravidæ signum.	93
Mulieris gravidæ cum dysenteria ad partum supersunt.	16
Mulieris gravidæ cautè secunda venæ.	92
Muliebria educit suffitus aromatum.	92
Mulieris in Thaso historia.	75. & 79
Mulieris juxta Tisamenum historia.	74
Mulieris quæ venenatum medicamentum biberat historia.	82. & sequ.
Mutationes cavendæ, & considerandæ.	13. 50. & 83

## N

N Amyssiæ historia.	85
Nasturtii vires.	47
Natura morborum medicatrix.	84. & 85
Navis gubernatoris historia.	82
Nerei filiæ historia.	82

Nervorum morbi graviores.	51
Nervorum subsultus.	19
Nicodemi historia.	78
Nimum omne naturæ inimicum.	88. & seq.

## O

O Ccipite laborante, in fronte venæ sectio juvat.	83. & 84. & 93
Oculorum affectus.	6. 22
Oculorum dolorum cura.	94
Oecetæ uxoris historia.	74
Ossa fracta habentes tenuiter cibandi.	60
Ossa luxata cum vulnere, minime sunt reponenda.	62
Ossibus frigidum inimicum.	92
Oscitationis curatio.	69

## P

P Anis vires.	46
Parii historia.	75
Paronychæ remedium.	70
Parotides quid protendant.	21
In Paroxysmo parcè cibandum.	86. & seq.
Partus sine dolore periculosus.	32. & 33
Partus ut fit.	38
Quibus mensibus vitalis.	38. 39. & 40
Octimestris.	40
Ad eum facilitandum.	59
Pectori frigida inimica.	92
Pepasmus quid.	26
Periclis historia.	77
Perepneumonix abscessus succedentes.	10
Quomodo fiat ejusque signa.	54. & 94
Ut à pleuritide differat.	51
Ejus & pleuritidis curatio.	50
Perniciosa sine signis levantia, mortifera.	15
Phaethusæ historia.	85
Philes filii historia.	83
Philini uxoris historia.	65
Philisci historia.	64
Philistis historia.	72



Phrenitici historia.	76
Phrenitici curatio.	55
Phthisis quando lethalis.	28
Quibus præcipue fit.	29. 92
Signa diagnostica.	52. 56
Piscium saxatiliū natura.	47
Pithyonis historia.	70. 76
Pleuritis quid.	55
Quænam salutaris, quæ non.	27.
& 54	
Ejus curatio.	49
In sanguinea non mittendus sanguis	
13. 27. & 83.	
Sicca funesta.	26
Quando in empyema transeat.	92.
& 93.	
Ejus tum curatio.	54
Alvi fluxu corripī malum.	54. &
93.	
Podagra quænam salutaris, quæ non.	16.
Diuturnum est malum, & ægerrime	
solvitur.	56
Polypi curatio.	55
Prisane laudes.	49
Prægnantes quando purgandæ.	90.
& 91.	
Puer in utero alimentum ore fugit.	
39.	
Puris optimi notæ.	7
Purgatio sanis periculosa.	90
Quid eam præcedere debeat.	10.
& 87.	
Purgandum quando, & quomodo.	
90.	
Pyrorum facultates.	48

## R

<b>R</b> Api facultates.	47
Rauces in senibus non co-	
quuntur.	88
Recidiva quando metuenda.	14
Quomodo fiat.	70. 87
Renum vitia, quæ non sanantur.	
85. 93	
Respirationis præfagia.	23
Rigor ante partum metuendus.	32
Ejus præfagia.	91
Rustus acidus in lienteria bonus.	93
Rutæ vires.	47

## S

<b>S</b> Anguinis mictio quid significet.	91.
Sanguinis missio purgationem præce-	
dat.	27
Quando nocet.	131
Quando mittendus in morbis acu-	
tis.	50
Sanguinem è venis fluentem sisten-	
tia.	85
Sanguinis stillæ damnosæ.	19
Sanitatis regula & tutela.	84
Satyri pollutione nocturna laboran-	
tis historia.	85
Scytharum modus vivendi, & cur	
evirati.	44
Secundas relictas expellentia.	57.
& 93.	
Semen ab omnibus corporis partibus	
procedit.	36
Senum morbi.	91
Sileni historia.	64
Sitim quid cohibeat.	83
Solanum quid efficiat.	47
Spiratio crebra dolorem significat;	
magna verò delirium.	6
Sputa rotunda, quid significant.	
84.	
Sputum quando promoveri debeat.	
27.	
Steriles fovere, ac pharmaco uti o-	
portet.	70
Succi, & humores fluidi in vasis vi-	
treis adferantur.	95
Sudor in febribus acutis copiosus est	
damnosus.	15
Sudores, quando optimi, quando	
boni, quando pessimi.	7
Sudores febricitanti si contingunt	
quid efficiant.	14
Surditas ex febribus nata quid effi-	
ciat.	22
Sutoris infortunium.	82

## T

<b>T</b> Abes dorsalis unde oriatur.	53.
Terra squalida propter siccitatem	
quomodo se habeat.	84



Testes, & pudenda quando mortis  
periculum denunciant. 8

In Thago mulieris morosæ historia.  
79.

Torpores præter consuetudinem fu-  
tura denunciant apoplectica. 30.  
& seq.

Trimestris foetus omnia habet mani-  
festè figurata. 70

Tumores quid efficiant in hypocon-  
drio. 7

## V

Veneris usus, quid efficiat. 48.  
49.

Ver saluberrimum, & minimè le-  
thale. 69

Vesicæ duræ, & dolentes exitiale pe-  
riculum minantur. 11

Victus tenuis, & exquisitus in mor-  
bis longis semper perniciosus.  
86.

Victus humidus febricitantibus con-  
fert. 87

Vini qualitates, & effectus. 47

Virginis in morbum incidentis histo-  
ria. 81

Virginis pulchræ Nerei filiæ historia.  
82.

Ulcus quando natum sit nosse oportet.  
6

Vomitus, quando utilis sit. 9

Urinæ in febricitantibus, quando  
sint signum boni eventus, quan-  
do non. 33

Urinæ stillicidium solvit venę sectio.  
70.

Urina multam subsidentiam habens  
solvit deliria. 84

F I N I S.



Handwritten text in a cursive script, likely a list or index, with some words appearing to be in a different language or dialect. The text is faint and difficult to decipher.

Handwritten text in a cursive script, continuing the list or index from the left page. The text is faint and difficult to decipher.

F I N I S



HEALTH SCIENCES LIBRARY  
UNIVERSITY OF MARYLAND  
BALTIMORE



